

Oversigt over Plantesygdomme.

178. — Juni 1931.

Lyspletsyge er stærkt udbredt i Kornmarkerne i Nord- og Vestjylland; Ajle og større Mængder Salpeter gør tydeligt nok Fortræd; rigelig Brug af Svovlsur Ammoniak forebygger ofte Skaden. Mangansulfat og Regn i Forening hjalp fortrinligt. Ogsaa i Runkelroer, Sukkerroer og Fodersukkerroer ses Lyspletsyge ret udbredt paa løse Jorder; Foraarspløjning og navnlig stærk Harvning forværrer Forholdet, Tromling er nyttig.

Gulspidssyge synes stærkt fremtrædende i det nordlige Jylland, til Dels sammen med Kalimangel. Der ses fortræffelig Virkning af Blaasten, ogsaa f. Eks. i Kløvermarker, der er behandlede i Udlægsaaret.

Brandangrebene er uden økonomisk Betydning; almindeligt ses kun ubetydelige Angreb af Nøgen Bygbrand. Derimod ses der endnu hist og her nogen Stribesyge, og stedvis et stærkt Angreb.

Der indløber talrige Beretninger om slemme Angreb af Havreaal, og Bygafrøderne Evne til at opformere Aalebestanden ses tydeligt. I Midtjylland (Ikast og Omegne) har Græsuglens Larve raseret store Engstrækninger, ogsaa paa Vardeegnene er der fundet Angreb. Stankelbenslarverne har i Almindelighed været ret godartede i Aar. Der meldes dog om flere Angreb af Betydning. Fritfluens Larve har gjort sig bemærket hist og her i sent saaede Marker.

Rodbrand i Roemarkerne, der til at begynde med var godartet, synes i det kolde Vejr og ved Nattefrosten i Maanedens Begyndelse at have vundet betydelig Udbredelse, ogsaa udover den sædvanlige Forekomst paa kalktrængende Jord. Stærkere og svagere Angreb af Vælsyge er derefter iagttaget i de fleste Egne.

Aadselbillen og dens Larve har i Aar gjort megen Skade. Baade fra Lolland-Falster, Jylland og Sjælland samt Bornholm foreligger Indberetning om alvorlige Angreb, der dog nu er overstaaet. I Maanedens sidste Dage har Bedelusen taget kraftigt fat og nødvendiggjort Dypning og Sprøjtning.

Kløveraalen optræder baade i Rød- og Hvidkløver.

Jordlopperne gjorde en Del Skade i Maj, men blev oftest hæmmet i Begyndelsen af Juni. En Del Steder har man maattet saa om, men i det store og hele har Lopperne ikke været særlig ondartede i Aar. Noget lignende gælder Glimmerbøsserne, der dog ofte fik naaet at gøre en Del Skade. Kaalthripsens Angreb, der fandtes flere Steder paa Sjælland, er nu overstaaet, og Roerne synes at klare sig ret godt. Angreb af

Krusesygegalmyggen er almindelig, men synes endnu ikke at være ondartede. Kaalfluellarverne er noget værre end sidste Aar, navnlig i Haven kan Angrebene være ret slemme.

Nattefrosten 5.—6. Juni var i mange Egne haard ved Kartofflerne.

Kartoffelaalen, der i 1929 blev fundet i en Kolonihave ved Vamdrup, er nu fundet i to Smaahaver ved Haderslev. Ethvert Fund af dette farlige Skadedyr bør straks indberettes!

Æbleskurv begyndte at optræde midt i Juni, især paa Bladene. Kærnefrugtskimmel paa Æble har været meget udbredt og ondartet; de almindelige Sommersprøjtninger med een Sprøjtning før Blomstringen har ikke kunnet bekæmpe de stærke Angreb.

Stenfrugtskimmelen paa Kirsebær har optraadt mange Steder, men de fleste Steder ikke særlig ondartet.

Stikkelsbærdræber er ualmindelig udbredt og ondartet i Aar.

Nattefrosten mellem den 5. og 6. Juni har skadet mange Planter, f. Eks. Jordbær, Bønner, Agurker, Tomater og forskellige Blomsterplanter.

Frugtbuskenes Knopper er ofte slempt afpillet af Fugle. Æblesnudebillen er værre end sædvanlig og har ofte ødelagt en meget stor Del af Blomsterne. Hindbærbillen og Jordbærnsnudebillen har gjort Skade mange Steder. For Frugttræernes og Hegnsplanternes Vedkommende kan man sige, at det er et udpræget Larveaar, idet Frostmaalere, Knopviklere, Blaa hovedet, Ringspindere, Snareorme og andre Sommerfuglelarver er optraadt i usædvanlig Grad. Blommehvepsen har ogsaa været ondartet, vi har talt indtil 77 % angrebne Frugter. Endvidere er Bladlusene slemme paa Frugttræer og andre Planter. Pæregalmyggen var ofte totalt ødelæggende, derimod er Frugttræspindemiderne ikke særlig slemme for Tiden. Det syntes, som om Angrebene standsedes noget i Begyndelsen af Juni. Vejret bliver bestemmen-

Lyngby, d. 13. Juli 1931.

Statens plantepatologiske Forsøg.

Der er for Juni Maaned modtaget 52 Beretninger; endvidere er der indkommet godt 800 Forespørgsler.

KORN.

Lyspletsyge omtales fremdeles som usædvanlig udbredt i Nord- og Vestjylland; paa Mors blev f. Eks. ca. 25 pCt. af Havremarkerne, mange Bygmarker og enkelte Hvedemarker angrebne sidst i Juni. Ajle eller større Mængder Salpeter har vist tydelig Skadevirkning; rigelig Brug af Svovlsur Ammoniak forebygger ofte Skaden — 100 kg Svovlsur Ammoniak, givet naar Kornet var 1 Kvarter højt, har ofte kunnet klare Sagen (V. Kristensen). Paa Lammefjorden bliver Angrebene især slemme, naar der pløjes for dybt, hvorved raa, kalkholdig Jord kommer op; men Mangansulfat kan i Løbet af faa Dage forvandle Havrens Udseende (F. K. Damgaard). Det fremhæves isøvrigt fra alle Sider, at Mangansulfatet og Regnen i Forening har hjulpet fortrinligt.

Gulspidssyge synes stærkt fremtrædende i det nordlige Jylland, medens den er skaansom sydpaa; i flere Tilfælde omtales, at Sygdommen optræder sammen med Kalimangel, hvorved baade Bestemmelsen gøres vanskelig og Virkningen af Blaastenen ufuldkommen. Iøvrigt mærkes den udstrakte Anvendelse af Blaasten; ogsaa Betontromlen gør sin Nytte.

Kalimangel i Havre omtales i et Par Tilfælde (se ogsaa under Gulspidssyge). I Gødningsforsøg paa Lolland ses stor Kalivirkning i Byg og til Dels i Havre; sidst i Juni var Bygget skredet igennem i de kaligødede Parceller, mens det i Parceller uden Kali var uensartet og lavere (S. Larsen Sørensen).

Meldug (*Erysiphe graminis*) optræder i fremtrædende Grad paa Hvede og Byg, under ugunstige Forhold: Tørke, Kalimangel, indelukkede fugtige Marker (H. Bagge, S. Larsen Sørensen, P. H. Hansen).

Stribesyge (*Pleospora graminea*) omtales fra enkelte Egne som yderligt sjælden, fordi alt Korn afsvampes eller fornyes; fra Aalborg Amt omtales dog, at Angreb hyppigt ses i Saasød, der er leveret som afsvampet (Aa. Knudsen). Fra de fleste Egne omtales spredte, svage Angreb, saa at der endnu er Anledning til at udvide Afsvampningen; værst er nok de sønderjydske Amter. Enkelte stærke Angreb ses, f. Eks. ved Ruds Vedby 10 pCt., ved Abbild 40—50 pCt.; i uafsvampet Opal- og Binderbyg er der i enkelte Tilfælde optalt 5 og 6 pCt.; i Marker med 6r-Byg er der set ondartede Angreb ved Lyngby og Fredericia.

En Forespørgsel om Brandsvampenes Udbredelse giver følgende Billeder:

Stinkbrand (*Tilletia caries*): 1 Iagttagelse af betydeligt Angreb.

Nøgen Hvedebrand (*Ustilago tritici*): Enkelte Angreb iagttaget.

Stængelbrand (*Urocystis occulta*): 1 Bemærkning om vel stor Udbredelse.

Nøgen Bygbrand (*Ustilago nuda*): Ubetydelige Angreb almindelige i Guld-, Opal- og Kenia-Byg, men navnlig i Binder-Byg. Optællinger paa Lolland-Falster: Binder-Byg 2 pM, Opal-Byg 1 pM; der er god Virkning af Varmvandsafsvampning (S. Larsen Sørensen).

Nøgen Havrebrand (*Ustilago avenae*): 1 Iagttagelse af spredte Angreb.

BÆLGPLANTER.

Paa Viborgegnen, hvor Gulspidssyge er udbredt, ses særlig fine Udslag for Blaasten i Kløvermarker, behandlede i Udlægsaaret; indtil 60 pCt. Merudbytte (A. P. Aidt).

Frostskade paa Lucerne blev iagttaget efter Nattefrosten 5.—6. Juni.

RODFRUGT.

Lyspletsyge i Bederne ses ret udbredt paa løse Jorder; Foraarspløjning og navnlig kraftig Harvning forværrer Angrebet, mens Tromling nedsætter det (S. Larsen Sørensen).

Rodbrand (*Pythium baryanum*, *Phoma betae*), der til at begynde med var godartet, synes i det kolde Vejr og ved Nattefrosten i Maanedens Begyndelse at have vundet betydelig Udbredelse, ogsaa udover den sædvanlige Forekomst paa kalktrængende Jord. Væltesyge synes over hele Landet at have været ret udbredt. Der udtales fra enkelte Steder Skepsis med Hensyn til Lagerafsvampningen, sammenlignet med Afsvampning kort før Saaning.

Fra Tylstrup fremhæves et Eksempel paa Rodbrand ved Kvælstofmangel; i Varde Forevisningsmark ses stærkt Angreb, hvor Runkel- og Sukkerroer dyrkes 2 Aar i Træk, mens Bestanden er god, hvor Forfrugten er Kaalroer, Turnips eller Gulerødder (S. Svendsen, A. Pedersen).

KARTOFLER.

Nattefrost sved i store Dele af Landet 5.—6. Juni Toppen paa Kartoflerne mere eller mindre.

ERNST GRAM.

FRUGTHAVEN.

Æbleskurv (*Venturia inaequalis*) synes at være ret sent paa Gled i Aar, først fra hen mod Midten af Maaneden begynder der at foreligge Meddelelser om dens Optræden og fortrinsvis paa Bladene; men sidst i Maaneden er saadanne Angreb konstateret mange forskellige Steder spredt i hele Landet. Det er naturligvis mest paa usprøjtede Træer, den findes; men nogle Steder findes der dog lidt Angreb, selv hvor der er sprøjtet eller pudret.

Om Angreb af Betydning af Pæreskurv (*Venturia pirina*) foreligger der kun Meddelelser fra Sorø og Holbæk Amter, Odense, Ribe Amt, Bjerringbro og Nordsjælland.

Kærnefrugtskimmel (*Sclerotinia fructigena*) paa Æble har været meget udbredt i Aar. Den omtales som mere eller mindre ondartet fra Københavns Amt, Vestsjælland, Odense, Lolland og Falster, Bornholm og Ribe Amt. Som særlig modtagelig nævnes: Bismarck, Filippa, Maglemer, Transparente blanche, Gyllenkroks, Astrakan, Charlamowsky, Dronning Louise, Cox' Orange (K. Larsen, E. Christensen, A. Feilberg, N. F. J. Larsen, N. Dullum, Georg Jensen, M. Sørensen). Til Lyngby er der i Juni indkommet 45 Forespørgsler angaaende denne Sygdom. De almindelige Sommersprøjtninger med kun een Sprøjtning før Blomstringen, synes ikke at kunne bekæmpe denne Sygdom. Paa Pærer har Kærnefrugtskimmelen været ret betydningsløs.

Stenfrugtskimmel (*Sclerotinia cinerea*) har været ret udbredt, men i det store og hele ikke saa alvorlig som i mere fugtige Aar. Mange Steder holdes den godt nede ved Sprøjtning med Bordeauxvædske. Fra

Bornholm skrives: »Som sædvanlig ødelægger Sygdommen omtrent hele Høsten af Syltebær, hvor man ikke sprøjter med Bordeauxvædske, hvor man har sprøjtet, er der en rig Frugtansætning, paa flere Steder ualmindelig rig« (H. Nielsen).

Fra Øster Tørslev meldes om stærke Angreb af Haglskudsyge, paa saavel rodægte Surkirsebær som Sødkiisebær (N. Gram).

Sølvglans (*Stereum purpureum*) er fundet paa Victoriablomme ved Spangsbo og paa rodægte blaa Blomme ved Boeslunde, hvert Sted kun paa et Træ (N. F. J. Larsen, E. Christensen).

Stikkelsbærdræber (*Sphaerotheca mors uvæ*) er ualmindelig udbredt og ondartet i Aar, f. Eks. meldes der, at i en Koloni med 125 Haver ved Nakskov er 90 % Buske mere eller mindre angrebet. Der har ikke de sidste 4 Aar været saa stærke Angreb (Georg Jensen).

KØKKENURTER.

Frost Natten mellem 5. og 6. Juni har gjort betydelig Skade paa Jordbær, Tomater, Bønner, Agurker og forskellige Blomsterplanter m. m. Der foreligger Meddelelser om Skade fra mange Steder paa Sjælland og Bornholm samt fra Hjordkær (Verner Nielsen, H. Nielsen, Th. Pedersen). Paa Sydøstlolland har nogle stærke Haglbyger skadet Rødbeder og Skallotter meget stærkt (G. Jensen).

Løgskimmel (*Peronospora Schleideni*) er almindelig paa Amager (K. Larsen), og ved Blangsted er der ret betydelige Angreb, som Sprøjtning med Bordeauxvædske ikke har kunnet bekæmpe saa effektivt som ønskeligt (N. Dullum).

Angreb af Kransskimmel-Sovesyge (*Verticillium albo-atrum*) paa Tomat i Drivhus ved Hjallesø er blevet standset ved Temperaturforhøjelse i 8 Dage til 23—24 ° C. (Knud C. Hansen).

PRYDPLANTER.

Hvide Lupiner har mange Steder paa Lolland og Falster kastet de midterste Blomster i Klasen, sandsynligvis paa Grund af Tørke, medens de blaa og røde under samme Forhold intet fejler (Georg Jensen).

ANNA WEBER.

KORN o. a. GRÆSSER.

Havreaal (*Heterodera Schachtii*) er fundet baade paa Havre, Byg og Hvede. I Havren synes Angrebene at tage til i adskillige Egne, og man bliver i stigende Grad klar over Bygafrøderens Rolle som Befordring af Aalebestandens Formering. De fleste Indberetninger er fra Jylland, nogle enkelte fra Sjælland og en fra Lolland-Falster.

Græsuglens Larve (*Charaas graminis*). Om det i forrige Beretning omtalte Angreb skrives, at Larverne foruden ved Ikast har vist sig i Lellerup Sogn ved Fortsættelsen af Højris Aa udfor Frølund og Rungstrup. Stedlige Folk mener, at over 1000 Td. Land er raseret. Enkelte Steder har Larverne ogsaa taget Havre, der var saaet i Engene. En Mænd meddeler, at han har prøvet Giftklid, men ikke set nogen Virkning (A. Binderup). Fra Varde: Græsuglens Larve har slet ikke været saa sjælden her paa Egnen. Jeg har modtaget Meddelelse om en Del ondartede Tilfælde Syd og Øst for Varde (Roust, Aarre, Grimstrup) (A. Pedersen).

Stankelbenslarverne (*Tipula paludosa*) har i det store og hele været ret godartede i Aar. Der meldes dog om ret alvorlige Angreb i Enge i Nørreådalene (P. Aidt). Fra Røde Kro skrives om en ødelagt Havremark (Grønjorden pløjet sidst i September 1930) (P. Pedersen). Selv i det nordlige Jylland har Larverne kun gjort ringe Skade.

Fritfluens Larve (*Oscinis frit*). Der er fundet en Del svage Angreb som sædvanlig mest i sent saae Marker. Endvidere meldes fra Skelskør: En Havremark besaaet ca. 10. Maj er stærkt medtaget af Frit-fluen. Puppen findes i næsten alle angrebne Planter (P. H. Hansen).

KORSBLOMSTREDE.

Jordlopper (*Phyllotreta-Arter*) har ikke været særlig ondartede i Aar. Hvor man havde slemme Angreb i Maj blev Loppernes Virksomhed hæmmet af Regnen i Begyndelsen af Juni. Der foreligger dog en Del Meldinger om Angreb, der har gjort Omsaaning nødvendig.

Bladribbesnudebiller (*Ceutorrhynchus quadridens*). Fra Odder: Ret stærke Angreb i Stænglerne af Hvidkaal og Blomkaal (Verner Nielsen).

Glimmerbøsser (*Meligethes aeneus*). Der foreligger en Del Beretninger om Angreb af Betydning. Fra Sydsjælland skrives saaledes: Arbejdede stærkt og længe. Frøsætningen derfor gennemgaaende daarlig (M. Bakman). Fra Skelskør: Før Midten af Maanedens stærke Angreb, men efter Regn med en Del Kulde aftagende (P. H. Hansen).

Kaalthripsen (*Thrips angusticeps*) optraadte foruden paa Kalundborgegnen og Øtoftegaard ogsaa ved Slagelse. Fra Kalundborgegnen meldes d. 16. Juni: Jeg kan nu oplyse, at Angrebet af Kaalthripsen er omtrent standset. Roerne har taget sig godt op i den sidste Ugestid. Selvom der endnu findes nogle ældre skeformede Blade og en Del Thrips, er Angrebet overstaaet (P. Grøntved).

Krusesyge (*Contarinia nasturtii*). I Almindelighed synes Angrebene at være ret svage. Fra Askov meldes dog: Angrebet er stærkt udbredt i Marker, der blev saaet omkring 1. Maj. Ogsaa paa Holbækegnen (Damgaard) og Morsø er Symptomerne almindelige (Gjertlov Hansen). Endnu kan der dog ikke siges noget bestemt om Skadens Omfang.

Kaalfluellarver (*Chortophila brassicae*) synes at optræde mere ondartet i Aar end i Fjor. Beretningerne er dog af meget forskellig Art. Fra Tylstrup skrives: Tilsyneladende optræder Kaalfluen lidt værre end sædvanlig, muligvis af den Grund at den sidste Tids kølige Vejr har været ugunstigt for Roernes Udvikling (Sv. Svendsen). Om Angreb i Mark og Have meldes endvidere fra Himmerland (N. Vester), Vejen-Brørup (Land Jensen), Hjordkjær (Th. Pedersen), Aabenraa (L. Ravn) og Københavns Omegn (K. Larsen). Fra andre Egne meldes, at man kun har mærket lidt til Angrebene.

KARTOFLER.

Kartoffelaal (*Heterodera rostochiensis*). Dette Skadedyr er nu fundet i to fjernt fra hinanden liggende Kolonihaver ved Haderslev. Aalenes Angreb er ødelæggende (Fr. Nielsen). Som bekendt er Kartoffel-aal kun fundet en Gang før her i Landet nemlig ved Vamdrup 1929. Det er af stor Vigtighed, at der ikke tages Læggekartofler fra de inficerede Omraader. Kartoffeldyrkningen bør saadanne Steder undlades for en længere Aarrække!

Kartoffelboreren (*Hydroecia micacea*). Fra Maribo meldes om ret stærke Angreb. Indsamling foretages (G. Jensen).

BEDER.

Tusindben (*Julidae*). Fra Lolland skrives: I en Sukkerroemark ved Systofte (Forfrugt Roer) er anrettet betydelig Skade af Tusindben. Roerne var saaet i ubekvem Jord og spirede langsomt. Der var et meget stort Antal Tusindben at se i Roerækkerne. De bortaad Spirerne. Muligvis bidrog Runkelroebillen (*Atomaria linearis*) til at forværre Skaden. Paa store Stykker af Marken var Omsaaning nødvendig (S. Larsen Sørensen).

Aadselbillen (*Blitophaga opaca*) har i Aar været værre end sædvanlig, og der foreligger en Række Indberetninger om Angreb af Betydning. Fra Bornholm meldes: Der har været ualmindelig mange og stærke Angreb af Aadselbillelarver. Jeg har aldrig før set saa stærke Angreb (H. Nielsen). Paa Lolland-Falster var Angrebene, som allerede nævnt, betydelige. Ogsaa fra forskellige Egne af Sjælland foreligger Beretninger om Angreb. Fra Blangstedgaard paa Fyen skrives, at Larverne har gnavet betydeligt (Dullum). Fra Jylland meldes om Angreb ved Møgeltønder, Haderslev og Aabenraa samt fra Vejen-Brørupengen, Varde og endelig Brønderslev, hvor der mærkelig nok kun er fundet et enkelt, totalt ødelæggende Angreb. Fra Varde meldes yderligere: Enkelte Landmænd har forsøgt Udstrøning af Giftklid som mod Stankelbenslarver, og det synes at være lige saa virksomt her. En Mand fra Varde fortalte mig, at han strøede Giftklid ud paa en stærkt truet Mark Fredag d. 19. ds. Søndag Form. var de fleste Larver døde eller syge. Det var allerede i Fjor, jeg hørte om Forsøg i den Retning og har tilskyndet flere til at prøve Giftklid (A. Pedersen).

Bedelus (*Aphis papaveris*). I Maanedens sidste Dage har Bedeluse mange Steder begyndt at hærge Frømarkerne. Man bekæmper naturligvis Ondet ved Sprøjtning og Dypning i Nikotin.

Bedefluens Larve (*Pegomyia hyoscyami*). Angrebene maa i Aar betegnes som godartede. Ret stærke Angreb er dog bemærket ved Pjedsted (M. Olsen), Askov (H. Agergaard) og Haderslev, her dog ikke saa stærkt som sidste Aar (Fr. Nielsen). Om-svage Angreb foreligger talrige Indberetninger.

BÆLGPLANTER.

Kløveraal (*Tylenchus dipsaci*). Som sædvanlig foreligger en Del Beretninger om Angreb i Rødkløver. Fra Askov skrives: I 2. Aars Marken er der et meget stærkt Angreb, der omtrent har ødelagt hele Forsøget. Angrebet er i en Mark med Avlsstedsformer af tidlig Rødkløver (20 ialt). Forskellig Modstandskraft mod Aalene synes ikke at være til Stede (H. Agergaard). Fra Lolland-Falster: Der er i Forsøg med Stammer af Rødkløver fundet Angreb i polsk tidlig Rødkløver, Øtofte tidlig og Øtofte halvsildig, medens Hjælmkløveren synes at være modstandsdygtig (Larsen Sørensen).

Om Angreb i Hvidkløver meldes fra Dybvad (Bachmann Olesen), Viborg (Aidt) og Nordjylland. Her synes Virkningen af Angrebene at være forstærket efter Nattefrosten og Kulden siden 5. Juni. I Demonstrationer med forskellige Kløverformer, Udsaaning ved Eftersaaning paa Aalepletterne, giver de fleste prøvede Former ringe eller ingen Bestand, medens

Frø stammende fra gamle engelske Græsmarker i flere Tilfælde har givet god Bestand (N. A. Olesen).

KØKKENURTER.

Snudebillelarver. I et Gartneri paa Amager fandtes et ejendommeligt Angreb i Gulerødder. Det viste sig, at en lille Snudebillelarve gnavede i den nederste Del af Bladstilkene og i Rodhalsen, der blev ejendommeligt indsnøret. Muligvis drejer det sig om Arten *Ceutorrhynchidius terminatus*, der vides at leve paa Gulerødder og er fundet som Skadedyr paa Gulerødder i Tyskland (Börner).

Porremøllet (*Acrolepia assectella*). Anden Generation er nu ved at klækkes og de første Æg iagttoges paa Bladene d. 6. Juli. Hvor man ventte Angreb, kan det tilraades at forsøge gentagne Sprøjtninger med Nikotin i den førstkommende Tid. Æglægningen strækker sig over en ret lang Periode.

FRUGTTRÆER OG BUSKE.

Fugle. Fra Jylland skrives: I mange Haver her paa Egnen er saa godt som alle Knopperne paa Ribsbuskene afpillet af Fugle nu sidste Vinter. Udbyttet af saadanne Buske bliver af den Grund ganske ubetydeligt (Jens Thorsen).

Æblesnudebilleren (*Anthonomus pomorum*) synes at være særlig slem i Aar. Mange Steder er Angrebsprocenten saa stor, at der sikkert kan være Tale om virkelig Skade.

Hindbærbillerne (*Bythurus tomentosus*) var stærkt paa Færde.

Hindbærnsnudebilleren (*Anthonomus rubi*) ødelagde mange Jordbærblomster.

Larver af Frostmaaler (*Cheimatobia brumata*, *Hibernia defoliaria* m. m.) samt Blaahovedet (*Diloba coeruleocephala*) har i Aar optraadt i særdeles stort Tal, ligesaa Knopviklere (*Tortricidae*). For Frugttræer og Hegnsplanters Vedkommende kan man sige, at det har været et udpræget Larveaar! Ogsaa Snareormene (*Hyponomeuta*) har gjort megen Skade.

Blommehvepsen (*Hoplocampa fulvicornis*) har mange Steder optraadt ødelæggende. Vi har talt op til 77 % angrebne Frugter.

Rosenborenen (*Ardis bipunctata*). Ved Fastrup pr. Merløse var 75 % af Skudene ødelagt (E. Christensen). Ogsaa andre Steder er stærke Angreb set.

Bladlus (*Aphididae*) er særdeles slemme i Aar, og baade Frugttræer, Buske og Prydplanter er ofte slemme besat med Lus.

Pæregalmyggen (*Contarinia pyrivora*). Dette Skadedyr synes at blive værre og værre. Ofte optræder det totalt ødelæggende.

Frugttræspindemider (*Paratetranychus pilosus*) har ikke hidtil haft gode Udviklingsbetingelser paa Frugttræerne. Derfor er Angrebene i Almindelighed ikke særlig slemme. Hvor man i Maj havde stærk Besætning af Mider, kan det nu være svært at finde dem. Fra Maribo meldes dog om ret stærke Angreb (G. Jensen).

PROSPER BOVIEN.