

Oversigt over Plantesygdomme.

185. — Juni 1932.

Lyspletsyge har, navnlig i Jylland, været meget fremtrædende. Stærk Kalktilførsel, Brug af Salpeter og Jordens Løshed er som Regel de forværrende Faktorer; rigelig Brug af Svovlsur Ammoniak virker gunstigt. Gode Udslag for Mangansulfat ses, omend Tørken nogle Steder har ladet Virkningen udeblive. Sort fransk Havre er modstandsdygtig.

Gulspidssyge er i sidste Halvdel af Juni blevet meget ondartet, særlig hvor Jorden er for stærkt bearbejdet. Virkningen af Blaasten er udmærket, ofte endog ved sen Udstrøning, og tidligere Aars Udstrøning fremmer Kløverens Udvikling i Aar.

De Brandsygdomme, der kan bekæmpes ved Kemikalier, er nærmest sjældne; men Stribesyge har atter stukket Hovedet frem paa flere Egne, som det angives: Man har sparet Afsvampningen. Enkelte Steder bemærkes Nøgen Hvedebrand og over hele Landet er Nøgen Bygbrand iøjnefaldende; vel er Angrebene ofte kun minimale, men der ses dog en Del Tilfælde, som kalder paa Varmvandsafsvampning.

Der er indløbet over 30 Beretninger om alvorlige, ofte ødelæggende Angreb af Havreaal. Byg angribes ligesaa ofte som Havre og Angreb paa Hvede er meget almindelige. Selvom disse Kornsorter sjældent lider alvorligt ved Angrebet, opformerer de Aalebestanden i Jorden, og Vanskelighederne ved at lægge et fornuftigt Sædskifte paa smittet Jord er derfor iøjnefaldende.

Som tidligere meddelt bragte Aaret slemme Angreb af Stankelbens-larver. Følgerne af disse Angreb har ofte været alvorlige.

Der berettes om en Del nye Angreb af Aal i Hvidkløver. Særlig paa Mors og i det nordlige Jylland er Skaden uhyre udbredt i Græsmarkerne, naar disse er 2—3 Aar gamle. Angreb er ogsaa fundet sydligere i Jylland.

Kalimangel i Rødkløver og Hvidkløver, kendelig ved talrige smaa Bladpletter, er fundet flere Steder.

Kalktrang slaar haardt i Aar, Rodbrand er blevet meget ondartet i Runkel- og Sukkerroer, og der ses en Del Væltesyge; Afsvampning har mange Steder tydeligt nok været en Hjælp, men der er ogsaa Tilfælde, hvor den ikke har forslaaet.

Aadselbillen har gjort en Del Skade i Sukker- og Runkelroer. Udstrøning af Giftklid har vist sig at hjælpe godt. Bedefluens Larve har kun lokalt optraadt i skadelig Grad.

Kaalfluellarverne har optraadt meget forskelligt. Nogle Steder har man mod Sædvane intet mærket til dem, medens de andre Steder har gjort megen Skade.

Baade Glimmerbøsser og Jordlopper har været usædvanlig godartede i Aar. Gulerodskrusesygen, der ikke er bemærket meget i de senere Aar, synes at være almindelig og ret ondartet.

Kartoffelskimmel er fundet enkelte Steder i tidlige Sorter, forspirede eller i Bænk.

Æbleskurv tog flere Steder godt fat først i Juni, Pæreskurv optræder meget uens, ofte ondartet paa usprøjtede Træer. Langt værre er dog i Aar Kærnefrugtskimmelen i Landets sydlige Dele, der fik megen Regn i Blomstringstiden; under de værste Forhold har Sprøjtningen ikke forslaaet, men Renskæring har haft en fortrinlig Virkning. Ogsaa Stenfrugtskimmel er ualmindelig ondartet, hvor den ikke er bekæmpet ved Renskæring og Sprøjtning.

Paa Frugttræerne har der været meget Larvegnav, og Æblesnudebille, Pæregalmyg og Blommehveps har gjort megen Skade.

Hindbærbillerne var ikke saa slemme som sidste Aar. En Del Steder blev de med Held bekæmpet med Derrispræparater. Jordbærrene led ofte under Angreb af Hindbærnsnudebillen og Jordbærvikleren optraadte mere ondartet end sædvanlig.

Stikkelsbældræberen er i Aar meget udbredt, men atter viser det sig, at Udtynding, Vintersprøjtning med Blaasten og Fortsættelser med Sommersprøjtning kan holde den nede. Stikkelsbær-Skaalrust er ualmindelig udbredt i Jylland i Aar, ogsaa paa Ribs.

I Tomathusene er Mosaiksyge, Stribesyge og Fløjlsplet meget udbredte. Forskellige Stængelangreb, hvoraf Kransskimmel og Koldbrand vel er ansvarlige for en Del, synes at gøre en nærmere Undersøgelse ønskelig.

Lyngby, 12. Juli 1932.

Statens plantepatologiske Forsøg.

Gulrust paa Hvede. Prof. Roemer, Landwirtschaftliche Versuchstation, Halle a. S., anmoder om Tilsendelse af Hvedeblade med Gulrust; de frisk plukkede Hvedeblade kan sendes mellem et Par Blade Karduspapir, med Angivelse af Tid og Sted for Indsamlingen, Hvedesortens Navn og Afsenderens Navn og Adresse.

Der er for Juni modtaget 63 Beretninger; endvidere er der indkommet godt 1200 Forespørgsler.

KORN.

Lyspletsyge synes at optræde omtrent i normalt Omfang paa Øerne, men i Jylland er der udbredte og stærke Angreb i alle fire Kornsorter. I Hedebrugets Forsøg ses Angreb i Rug og Havre, hvor der i 1920 tilførtes 20 t kulsur Kalk pr. ha; Udbredelsen er meget pletvis i nøje Overensstemmelse med Reaktionstallets stærke Svingninger; Mangansulfat har hæmmet Sygdommen, men ikke helt udelukket den (B. Davidsen). Løs Jord er som sædvanlig værst. Flere Steder er Manganvirkningen sinket af Tørke. Paa Lundgaard har 8 t Kalk givet svage Angreb, 16 og 32 t stærke Angreb; paa Tystofte har 200 kg Chile- eller Kalksalpeter givet stærkt Angreb, mindre Mængder svagt Angreb og Sv. Ammoniak (navnlig ved større Mængder) næsten sund Havre (H. Agergaard, H. Bagge). Fra Vestsjælland rejstes det Spørgsmaal, om Ophør af Fosforsyre-gødskning kan betinge Fremkomsten af nye Angreb (A. M. Frederiksen); der er tidligere iagttaget positiv Virkning af Superfosfat. Ørn-Havre er blevet angrebet senere end Kron-Havre; i Odsherred er Sej-, Sølv- og Ørnhavre angrebet, mens Sort fransk Havre er sund (A. Pedersen, N. Aa. Christensen).

Gulspidssyge er blevet meget fremtrædende i sidste Halvdel af Juni, og adskillige nye Lokalteter findes, bl. a. efter stærk Bearbejdning, saaledes paa kold Lermuld i Vrensted Enge (af Hensyn til Tidsler bearbejdet stærkt, men tromlet let) — og paa Lammefjorden i Blandsød efter Hvede (V. Kristensen, F. K. Damgaard); Fjedertandsharven kan gøre megen Fortrød (A. Skarregaard). Et enkelt stærkt Angreb i Hede-Havre er set ved Aabenraa (P. Rasmussen). Virkningen af Blaasten har været god, ofte endog ved sen Udstrøning, og fra flere Steder omtales den udmærkede Virkning af tidligere Aars Udstrøning paa Kløver i Aar.

Meldug (*Erysiphe graminis*) synes mere almindelig og ondartet end sædvanlig, bl. a. i eftersaaet Havre.

Gulrust (*Puccinia glumarum*) er flere Steder stærkt iøjnefaldende; Standard-Hvede er ofte stærkt angrebet, Panser-Hvede i et Tilfælde meget stærkt angrebet (M. Greve). Paa Vestlolland ses ofte Byg med helt gulstribede Blade (Poul la Cour).

Hvedens Stinkbrand (*Tilletia caries*) omtales som sjælden; af Rugens Stængelbrand (*Urocystis occulta*) findes enkelte Eksemplarer og nogle faa stærkere Angreb. Nøgen Havrebrand (*Ustilago avenae*) er sjælden. Nøgen Hvedebrand (*Ustilago tritici*) er fundet ved København, Slagelse, Høng, Aarhus og Aabenraa. Dækket Bygbrand (*Ustilago hordei*) omtales fra en enkelt Lokaltet. Nøgen Bygbrand (*Ustilago nuda*) er udbredt og iøjnefaldende, man kan i værste Fald se 15—20 Aks pr. m²; i de fleste Tilfælde viser en Optælling dog kun enkelte Promille syge. Angreb er iagttaget i alle Sorter, visse Prøver er — uden Afsvampning — blevet mindre angrebne end i Fjor (H. A. B. Vester-gaard).

Stribesyge (*Pleospora graminea*) omtales som Regel som sparsom; enkelte Egne har sløjet af med Afsvampningen (Syd- og Vestsjælland,

Sønderjylland) og ikke uden Resultat. Paa Vestlolland findes Tilfælde med 30—50 pCt. Stribesyge i Opal-Byg; ogsaa Kenia- og Juli-Byg kan være slemt befængt.

BÆLGPLANTER.

Kalimangel i Rød- og Hvidkløver, kendelig ved talrige smaa Bladpletter, er fundet enkelte Steder.

Kløver-Stængelsyge (*Gloeosporium caulivorum*) er fundet i 3 Frømarker ved Skelskør, een maatte afhugges (P. H. Hansen).

RODFRUGT.

Rodbrand (*Phoma betae*, *Pythium baryanum*) i Runkel- og Sukkerroer er blevet meget ondartet paa kalktrængende Jord — »Kalktrang slaar haardt i Aar« (M. Bakman). Den stærke Regn, som sidst i Maj faldt Syd og Vest i Landet, har aabenbart gjort megen Skade. I Løbet af Juni ses en Del Væltesyge. Om Afsvampning af Roefrøet fremhæves vel, at der er adskillige stærke Angreb trods Afsvampning, men der ses ogsaa Tilfælde, hvor Afsvampning har været en Betingelse for at opnaa en taalelig Bestand.

KARTOFLER.

Nattefrost sved først paa Maaneden flere Steder Kartoffeltoppen.

Kartoffelskimmel (*Phytophthora infestans*) er fundet:

10. Juni Sorø: Webbs og Askebladet i aaben Bænk (V. Nielsen).

19. Juni Gørlev: Webbs (primært Angreb) A. M. Frederiksen).

22. Juni Gislinge: Webbs (J. Hansen).

30. Juni Tillitse: Webbs (forspirede) (Georg Jensen).

1. Juli Esbjerg: Goldperle (forspiret i Potter) (Edv. Christiansen).

FRUGTTRÆER.

Æbleskurv (*Venturia inaequalis*) tog først i Juni godt fat mange Steder. Virkningen af Bekæmpelsen synes at aftage i følgende Orden: Bordeauxvædske, Svovlkalk, Svovlpudder. Paa Bregentved synes de to sidste Behandlinger at blive overgaaet af 6 % Blaasten lige i Knopbrydningstiden (W. Prior); fra anden Side omtales stærk Svidning af denne Sprøjtning, rimeligvis fordi den er udført for sent.

Pæreskurv (*Venturia pirina*) er meget uens udbredt, flere Steder ondartet paa ubehandlede eller pudrede Træer.

Kærnefrugtskimmel (*Sclerotinia fructigena*) har været ualmindelig ondartet i Aar, paa Grund af den stærke Regn i Blomstringstiden; Hornum, Salling og Lemvigegnen har godartede Angreb, Nedbøren var ringe. Under de værste Forhold forslog Sprøjtning ikke — hverken de stærke Foraarssprøjtninger eller Beskyttelsessprøjtninger lige før Blomstringen; ellers ses der gode Udslag. Men navnlig Renskæring af de i Fjor dræbte Skud har haft en fortrinlig Virkning. Værst medtaget er Keswick Codlin, derefter Filippa, Bismarck og Pederstrup; yderligere nævnes Charlamowsky, Cox' Orange, Cox' Pomona, Dronning Louise, Maglemer, Manks Codlin, Ribston, Säfstaholm, Transparente blanche.

Stenfrugtskimmel (*Sclerotinia cinerea*) er ualmindelig ondartet mange Steder; der ses god Virkning af Sprøjtning og Renskæring.

FRUGTBUSKE.

Stikkelsbærdræber (*Sphaerotheca mors uvae*) er i Aar meget udbredt, hvor den ikke bekæmpes. Udtynding og Vintersprøjtning med Blaa-sten har flere Steder været tilstrækkeligt, andre Steder maatte der fort-sættes med Sommersprøjtning; flere Steder er brugt Sæbe-Formalin eller Formalin (1 %) med godt Resultat; alkalisk Kobbersodavædske har i et Tilfælde ikke kunnet holde Angrebet nede. Sprøjtning af Buske, der var begyndt at grønnes, med 8 % Triumf sved Buskene alvorligt, men nu er der ret godt med Blade og mange Bær, og intet Angreb (N. P. E. Peder-sen).

Stikkelsbær-Skaalrust (*Puccinia Pringsheimiana*) er ualmindel-ig udbredt i Jylland i Aar; der er indsendt flere angrebne Prøver Ribs.

TOMATER.

Mosaiksyge og Stribesyge er stærkt udbredt i Tomathusene om-kring Odense, under meget varierende Former.

Kransskimmel (*Verticillium alboatrum*) er ogsaa meget almindelig; men det er ikke givet, at al Sovesyge skyldes denne Svamp.

Mange Steder dør Planterne pletvis af ikke nærmere bestemte Angreb, i andre Tilfælde er Rødderne saa ødelagte, at Planterne hænger stærkt i Solskin og ikke giver nævneværdigt med Frugter.

Koldbrand (*Didymella lycopersici*), ogsaa kaldet Rodsvamp og Stængelsvamp, er ret udbredt.

Fløjlsplet (*Cladosporium fulvum*) er meget udbredt, men kan i stor Udstrækning holdes i Ave ved Luftning og Fyring.

(Meddelelser fra Konsulenterne Verner Nielsen og Chr. Fich).

ERNST GRAM.

KORN.

Havreaal (*Heterodera schachtii*). Der er indløbet over 30 Beretnin-ger om alvorlige, ofte ødelæggende Angreb i Havre, og det kan siges, at Skaden er alvorligere end nogensinde. Angreb paa Byg er vistnok ligesaa almindelige som Angreb paa Havre, dog har man kun i faa Tilfælde kon-stateret virkelig Skade paa Byg som Følge af Angrebet. Af de mange Beretninger vælges følgende i Flæng. Fra Vejen-Brørupegnen: Havreaal er her paa Egnen meget udbredt særlig paa de gode, sandmuldede eller lettere lermuldede Jorder, men ogsaa paa de helt lette Sandjorder, der tid-ligere laa i Hede, kan Aalen træffes. Hist og her er Angrebet saa stærkt, at ogsaa Byg lider synligt derunder. Angreb paa Rajgræs er iagttaget (H. Land Jensen). Fra Haderslev: Havreaalsangrebene breder sig Aar for Aar og i de værste Omraader er det saa slemt, at Havren ikke naar at skride igennem (Fr. Nielsen). Fra Samsø: Havreaal er i Aar ualmindelig ondartede i mange Havremarker. I mange Tilfælde betyder det fuldstæn-dig Misvækst. Grønjordshavre synes mindst udsat for Angreb (Riis Ve-stergaard). Fra Kalundborg-Jyderupegnen: Ved alle Markvandringer træffer man Aaleangreb. Især hvor man har været meget inde paa Bland-sæddyrkning er der ofte flere syge end sunde Marker. Efter mit Skøn er Havreaalen her i Nordvestsjælland nu ved at spille en lignende Rolle for Havredyrkningen som Kaalbrok i mange Aar har gjort for Kaalroedyrk-

ningen (P. Grøntved). Fra mange andre Egne af Jylland, Fyn og Sjælland foreligger Meddelelser af lignende Indhold.

Smælderlarver (*Agriotes sp.*). Fra Viborg skrives om enkelte stærke Angreb (A. P. Aidt). Fra Veddum: Smælderangreb i Hvede efter varigt Græs. Angrebet tydeligt værst i en Firkant, hvor der gennem 4—5 Aar har ligget Forsøg til Slæt. Jorden derved løsere end udenom, hvor Kreaturerne har trampet (N. A. Olesen).

Stankelbenslarver (*Tipula paludosa*). Hvor man ikke i Tide anvendte Giftklid, har Følgerne af de talrige stærke Angreb ofte været meget alvorlige. Naar Angrebene har været værst i Sønderjylland, skyldes det det Forhold, at denne Del af Landet havde den højeste Nedbør i August Maaned 1931. Fugtighedsforholdene om Efteraaret er som bekendt af største Betydning for de nyklækkede Larvers Trivsel.

Fritfluelarver (*Oscinis frit*). Kun enkelte Meddelelser om Angreb af Betydning og da altid i sent saaet Havre.

BEDER.

Skumcikader (*Philaenus sp.*) gjorde Skade i en Runkelroemark paa Møen. Bladene blev misdannet og voksede ikke. Hverken Kaalroer eller Sukkerroer, der stod i Nærheden blev angrebet (H. Hansen).

Bedelus (*Aphis fabae*). Fra Tystofte meldes, at de første Lus saas d. 24. Juni. Endnu foreligger dog ingen Beretninger om Angreb af Betydning.

Aadselbillen (*Blitophaga opaca*). Fra en Del nye Lokalteter indløb i Juni Maaned Meddelelse om Angreb. Skaden var ofte betydelig. En Del Steder forsøgte man Bekæmpelse. Fra Nordslesvig meldes, at Pudring med 6 kg Cuprodyl pr. ha virkede tilfredsstillende. Ogsaa Sprøjtning med Schweinfurtergrønt er anvendt med Held, men særlig Interesse har flere Beretninger om godt Resultat med Udstrøning af Giftklid (som til Stankelbenslarver). Saadanne Resultater foreligger fra Varde (A. Pedersen), Kalundborg (A. M. Frederiksen) og Kollekolle (P. G. Hansen).

Bedefluens Larve (*Pegomyia hyoscyami*) har kun gjort meget ringe Skade i Aar. Om Angreb af Betydning meldes kun fra Pjedsted (M. Olsen) og Brønderslev (V. Kristensen). Hist og her har Frøroerne lidt noget, og et Sted var Rødbeder stærkt angrebet (K. Larsen).

KORSBLOMSTREDE.

Smældere (*Agriotes sp.*). Fra Roskilde meldes: Stærkt Angreb i en Kaalroemark efter vedvarende Græs. Raagerne rykkede hele Afgrøden op for at finde Larverne. Der levnedes næsten ikke en Plante. Larverne blev dog ingenlunde helt udryddet (M. Greve).

Krusesygegalmyggen (*Contarinia nasturtii*). Hidtil synes Angrebene at være ret svage baade i Kaal og Kaalroer.

Kaalfluelarver (*Chorthophila brassicae*). Beretningerne har meget forskellig Ordlyd. Nogle Steder er man gaaet helt fri for Angreb, medens Skaden andre Steder siges at være betydelig.

Jordlopper (*Phyllotreta sp.*). Ligesom Glimmerbøsserne har Jordlopperne optraadt ualmindelig godartet i Aar. Adskillige Beretninger siger, at man ikk mindes at have set saa lidt til Jordlopperne i mange Aar. Fra Bjerringbro meldes dog, at Lopperne har været slemme (N. P. Johansen) og fra Aalborg skrives, at de har været ondartede i sent saaede

Turnips og Fodermarvkaal (J. Chr. Andersen-Lyngvad). Fra Skelskør skrives, at Jordlopperne har været slemme ved nyplantet Kaal og Radiser (P. H. Hansen).

Glimmerbøsser (*Meligethes aeneus*) har gjort ualmindelig lidt Skade i Aar. Mange Steder er de overhovedet ikke bemærket. Andre Steder fra meldes, at Angrebet var ret kraftigt, da Blomstringen begyndte, men at Regn og Blæst fik Billerne til at forsvinde.

Skulpesnudebillen (*Ceutorhynchus assimilis*) er iagttaget mange Steder, men har næppe gjort større Skade. Ved Varde er der dog set et betydeligt Angreb i en Kaalroe-Frømark (A. Pedersen).

GULERØDDER.

Gulerodskrusesygen (*Trioza viridula*), der kun har været bemærket meget lidt i de senere Aar, synes at være temmelig fremtrædende i Aar. Fra Aalborg skrives: Tegner til at blive ret ondartet i Aar (J. Chr. Andersen-Lyngvad). Fra Holstebro: Alvorligt Angreb i Forevisningsmarken (P. O. Overgaard). Viborg: Krusesyge paa Gulerødder særlig fremtrædende i Aar (A. P. Aidt). Hobro: Set et Par stærke Angreb ca. 20. Juni (N. A. Olesen). Fra Tørring meldes ogsaa om et stærkt og flere svagere Angreb (S. K. Larsen).

BÆLGPLANTER.

Kløveraal (*Tylenchus dipsaci*). I Rødkløver er Angreb som sædvanlig almindelige, men bliver ofte overset eller tydet forkert.

Om Angreb i Hvidkløver foreligger Meddelelser fra Morsø og det nordlige Jylland, hvor Skaden er værst. Fra Morsø skrives: Som tidligere er Kløveraalen ogsaa i Aar iagttaget i overordentlig mange Tilfælde. Ved en systematisk Undersøgelse af en Snæs Græsmarker fandtes den i alle 3-aarige, i de fleste 2-aarige samt i enkelte 1-aarige Marker (Gjerløv Hansen). Fra Vejen-Brørupengen, hvor Angreb i Hvidkløver ikke før er bemærket, skrives: Efter Undersøgelse af en Del ældre Hvidkløvergræsgange viser det sig, at Kløveraal i adskillige Tilfælde er Aarsag til Hvidkløverbestandens ret pludselige Tilbagegang (H. Land Jensen).

Snudebillelarver. Fra Odder indsendtes Rødkløver angrebet af Kløveraal, men i Hovedroden fandtes endvidere Gnav af en Snudebillelarve, antagelig en Sitona-Art (N. Primdahl).

GRÆSSER.

Timothevikler (*Tortrix paleana*). Fra Roskilde skrives, at et mindre Areal med Timothe til Frøavl var stærkt angrebet af Timothevikler og Timothefluens (*Cleigastra flavipes*) (M. Greve).

FRUGTTÆRER.

Gaasebiller (*Phyllopertha horticola*) er flere Steder iagttaget sværmende i uhyre Masser. Udover noget Gnav paa Æbler er ingen særlig Skade bemærket.

Æblesnudebillen (*Anthonomus pomorum*) har mange Steder tilintetgjort et betænkelig stort Antal af Blomsterne.

Blommehvepsen (*Hoplocampa fulvicornis*) har mange Steder gjort betydelig Skade.

Frugttræerne har ofte været stærkt gnavet af forskellige Larver særlig Ringspinderlarverne (*Malacosoma neustria*) har optraadt i stort Tal.

Pæregalmyggen (*Contarinia pyrivora*) har som sædvanlig gjort megen Skade. Følgende Beretninger har Interesse: Paastrøning af Kainit synes ikke at hjælpe. Enkelte Steder har man prøvet at fjerne et 5—10 cm tykt Jordlag med udmærket Resultat (E. Christensen). Fra Esbjerg: Temmelig stærke Angreb. Godt Resultat er opnaaet i tidligere Aar ved ugentlig, overfladisk Jordbehandling i April—Juni (M. Sørensen). Fra Vestsjælland: Et gammelt Pæretæ, der hvert Aar har været plaget af Galmyg, er i Aar saa godt som fri derfor, idet Jorden i 15 cm's Dybde blev afgravet omkring Træet i Efteraaret (A. Andersen-Kjær). Paa Fejø har man bemærket, at Træer, der staar, hvor Hønsene færdes, er fri for Angreb (G. Jensen).

Frugttræspindemider (*Paratetranychus pilosus*). Endnu foreligger kun Beretning om enkelte Angreb af Betydning.

FRUGTBUSKE.

Hindbærbillerne (*Bythurus tomentosus*) har været paa Færde i noget ringere Grad end sidste Aar. Derrisholdige Midler har ogsaa i Praksis vist sig meget virksomme.

KØKKENURTER OG FRUGTBUSKE.

Hindbærnsnudebiller (*Anthonomus rubi*) har mange Steder gjort megen Skade. Fra Vejen skrives saaledes: Hindbærnsnudebilleren har flere Steder her paa Egnen anrettet betydelig Skade paa Jordbærrerne. Hos en Gartner her anslaaes Tabet af Bær paa et stort Stykke 4-aarige Planter til 70—80 % (Jens Thorsen).

Jordbærvikleren (*Acalla comariana*) har i Aar været mere ondartet end sædvanlig. Fra Københavns Omegn skrives: Mange Steder stærke Angreb, der sætter Udbyttet stærkt ned. Enkelte Stykker er blevet pløjet om, inden Bærplukningen er begyndt. Ogsaa andre Steder fra foreligger Beretninger om usædvanlig slemme Angreb. Man bør i Tide sprøjte med Nikotin (0,2 %) og anvende en fin Forstøver!

Spindemider (*Tetranychus telarius*) har flere Steder angrebet Jordbær meget stærkt.

PRYDPLANTER m. m.

Bladhvepselarver (*Lophyrus rufus*) gjorde hist og her en Del Skade paa Fyr i Haver.

Bladhvepselarver. Adskillige Steder var Bladene af Elm i paa-faldende høj Grad angrebet af en minerende Bladhvepselarve (*Caliosyphinga ulmi*).

PROSPER BOVIEN.
