

Oversigt over Plantesygdomme.

193. — Juli 1933.

Gulspidssygen vækker lige inden Høst fornyet Opmærksomhed ved de mange golde Aks i Havre og Byg; store Arealer er allerede med



Spidsraad paa Sukkerroer.

udmærket Resultat behandlet med Blaasten, og man bør nu mærke sig de Arealer, som staar tilbage.

Fodsyge i Hvede er godartet, med Undtagelse af enkelte Egne; derimod ses der en Del Angreb i Rug og Byg.

Enkelte stærke Angreb af Stribesyge i Byg — der er fundet indtil

en Trediedel syge Planter — minder om, at der maa være en Grænse for Beparelserne.

Havreaalene er mange Steder saa slemme, at Angrebene maa betegnes som katastrofale for Havredyrkningen. Hvedemyggene synes i Almindelighed at være ret godartede i Aar. I mange Hvede- og Bygmarker optraadte Halmhvepsen i usædvanlig Grad. Ofte var ca. 10 % af Straaene knækket ved Grunden. Paa svagt gødet Jord, hvor man har haft meget Korn i Sædskiftet, var der undertiden ret stærke Angreb af Havremiden.

Der indløb talrige Meddelelser om Angreb af Aal baade i Rød- og Hvidkløver og i Rødkløverfrømarkerne kunde man ofte konstatere, at Spidsmussnudebillerne gjorde mere Skade end sædvanlig. Undertiden finder man 10—15 Larver i hvert Hoved. Hvidkløver gnaves af en nærstaaende Art.

De gule Blade i Runkelroe- og Sukkerroemarkerne, der de sidste Aar har været saa fremtrædende i visse Egne, ses sidst i Juli paa Vestfyn og Lolland.

Bedelusene har været slemme, og megen Sprøjtning har været nødvendig. Derimod har Bedefluen været uden Betydning.

Stedvis ses der stærke Angreb af Kaalbrok. Krusesygegalmyggen har foraarsaget mange ondartede Angreb baade i Markerne, hvor Hjerteforraadnelsen er udbredt og i Haverne. Ogsaa Kaallusene har hærget slem og gjort virkelig Skade. Ved stærke Angreb i Blomkaal er Hovederne næsten ikke til at rense. Kaalfluellarverne har særlig gjort Skade i Haverne.

I Jylland er stærke Angreb af Krusesyge almindelige i Gulerødderne, hvor Ødelæggelsen er særlig slem i Haver. Gentagne Sprøjtninger med Nikotin hjalp godt, hvor de blev udført i Tide. Ogsaa Gulerodsflyuens Larve har været ret ondartet i Aar.

Der blev sidst i Juni og i de første Dage af Juli iagttaget enkelte Angreb af Kartoffelskimmel; efter 15. Juli har Angrebet bredt sig stærkt, hvor der ikke er sprøjtet rettidigt.

Æbleskurven optræder gennemgaaende godartet; hvor Sommer-sprøjtning er gennemført, findes der kun svage Angreb.

Kærnefrugtskimmel paa Æblerne er almindelig. Haglskade kan danne Indgangsport.

Paa Frugttræerne træffes Bladlusene ofte i stor Mængde, især paa Blomme og unge Æbletræer, hvis Aarsskud kan være helt overtrukket af Lusene. En Del Steder findes ret stærke Angreb af Frugttræspindemider baade paa Æble, Blomme og Pære. Et nyt Tilfælde af Blodlus fandtes i København.

Der foreligger Meddelelse fra Sønderjylland om tilfredsstillende Resultat af 2 rettidige Sprøjtninger med alkalisk Kobbarsodavædske mod Stikkelsbædræber.

Stribesyge og Sovesyge i Tomater er mindre almindelig end sædvanlig, ja Stribesygen er helt sjælden.

Storknoldet Bægersvamp er almindelig i Melon, Tomat, Agurk, Zinnia m. m.

Løgskimmel har flere Steder været ondartet.

Paa Rhododendron fandtes to Angreb af Tæger (*Stephanitis*). Dette Angreb, der skyldes Tæger, hvis Hjemsted er Østasien, er kun fundet en enkelt Gang tidligere her i Landet og fortjener Opmærksomhed.

Lyngby, den 9. August 1933.

Statens plantepatologiske Forsøg.

Der er for Juli indkommet 52 Beretninger; endvidere er der besvaret 605 Forespørgsler.

KORN.

Gulspidssygen vækker lige inden Høst fornyet Opmærksomhed ved mange slemme Angreb i Byg og Havre (N. Mølgaard, Sv. A. Rasmussen). I et Sortsforsøg i Byg, hvor der er Angreb af Lyspletsyge, viser en stedlig 6r-Byg langt bedre Kærnesætning end Juli-, Opal- og Archer-Byg (J. Chr. Andersen-Lyngvad).

Fodsyge (*Ophiobolus graminis*, *Fusarium culmorum* etc.) i Hvede synes mere godartet i Aar end de sidste Aar; der er vel adskillige svage Angreb, men mere betydende Angreb nævner kun 6 af 32 Medarbejdere. Nordjylland og Sydvestjylland synes mest udsatte. Flere Steder er Lejesæd — et enkelt Sted Haglskade — forværret af Fodsyge. Af Fodsyge i Rug er der derimod paafaldende mange stærke Angreb — ved Tylstrup stærke Angreb i Rug efter Kartofler i en 8 Marks Drift med 2 Gange Vintersæd, ved Aalborg sund Rug efter Kartofler, men stærk Fodsyge efter Byg — ved Sædskitteomlægninger (Sv. Svendsen, J. Chr. Andersen-Lyngvad). Rug efter Rug kan give op mod en Trediedel knækkede Straa, men ogsaa i Rug efter Rundbælg + Agerhejre kan ses ondartede Angreb (L. Ravn). Ved Borris er Staalrug noget angrebet, Petkus-, Borris- o. a. Rugsorter er kun svagt angrebet (N. Klitgaard). Ogsaa om stærk Fodsyge i Byg tales der, mærkeligt nok flere Steder i Byg efter Roer. I en Bygmark paa velgødet, men stærkt kalktrængende Jord var Rødderne ødelagt af Rodbrand (P. O. Overgaard). Fodsyge i Havre ses derimod kun ganske lidt.

Stribesyge (*Pleospora graminea*). Et Par Marker med 10 % (C. A. Nørholm), 10—20 % — snarest i Blandsæd — (A. Pedersen), og en med ca. 33 %, Opalbyg, der ikke var afsvampet 2 Aar (A. M. Frederiksen). Kostbare Bespareser!

Nøgen Bygbrand (*Ustilago nuda*) er meget udbredt, og der er derfor rig Lejlighed til at iagttage, hvorledes Angrebene kan variere, naar et

Parti Saasæd saas flere Steder; giver man Karakter 0—10 (10 værst) faar Maja-Byg 8, Kenia-Byg 7, Binderbyg 6, Opalbyg 5 og Archer-Byg 2 (J. Chr. Andersen-Lyngvad).

Dækket Bygbrand (*Ustilago hordei*) ses kun sjældent.

RODFRUGT.

De gule Blade i Runkel- og Sukkerroemarkerne, der de sidste Aar har været saa fremtrædende i visse Egne, ses sidst i Juli paa Lolland og Vestfyn.

Bedeskimmelen (*Peronospora Schachtii*) ses spredt og omtrent i sædvanlig Grad.

En Prøve Sukkerroer fra Lolland og en Prøve Frørunkelroer fra Stevns var angrebet af Spidsraad. Sygdommen er under Navnet Rübenschwanzfäule velkendt i mellemeuropæiske Sukkerroeegne, hvor Roer dyrkes vedvarende eller med for korte Mellemrum. Aarsagen angives at være Bakterier; Sukkeret inverteres, hvorved Roerne gøres uegnede til Sukkerfabrikation.

Kaalbrok (*Plasmodiophora brassicae*) har sidst i Juli faaet mange Kaalroer til at falde i Østjylland, fra Vendsyssel til Randers-Hadsten (N. A. Olesen); ogsaa paa Bornholm ses stærke Angreb.

KARTOFLER.

Sortbensyge (*Erwinia carotovora*). Ved Give ses et Tilfælde, hvor i to Rækker næsten alle Planter var angrebne; sandsynligvis har Læggemaskinen knust nogle syge Knolde og tværet Resten ud over de følgende (S. K. Larsen).

Af Kartoffelskimmel (*Phytophthora infestans*) iagttoges enkelte spredte Angreb sidst i Juni og de første Dage af Juli; efter 15. Juli har Angrebet bredt sig jævnt og stærkt, hvor der ikke er sprøjtet rettidigt.

Rodfiltsvamp (*Rhizoctonia solani*) optræder flere Steder i paafaldende Grad; ved Brande var Svalöf Birgitta normale ved tidlig Lægning, men stærkt angrebne ved sen Lægning, rimeligvis fordi Svampen i Kulen har bredt sig til Spirerne (S. K. Larsen).

ERNST GRAM.

FRUGTHAVEN.

Æbleskurv (*Venturia inaequalis*) optræder gennemgaaende godartet. Fra mange Lokaliteter meldes der, at der kun findes svage Angreb, hvor Sommersprøjtning er gennemført. Paa usprøjtede Træer af modtagelige Sorter findes der derimod flere Steder en Del Skurv, som dog gennemgaaende optræder godartet.

Fra Bornholm skrives, at det synes som om Angrebet, der blussede op sidst i Juni, har kulmineret (H. Nielsen). Fra Lolland-Falster foreligger der følgende Udtalelse om Pudring: »Pudringens Virkning svinger ret ofte fra Sted til Sted« (Georg Jensen).

Ved Horsens er det iagttaget, at der fandtes smaa Skurvpletter paa

Frugterne, uden at det var muligt at finde Sygdommen paa Blade i Haver, der var sprøjtet saaledes: Bordeaux—Svovlkalk — Svovlkalk—Hvid Bordeaux (Chr. A. Nørholm).

Ved Hornum optræder Skurven ligeledes ret stærkt paa Frugterne, der skrives: »Til Trods for mange Sprøjtninger er der noget Angreb paa Frugterne af Skurv. Bladene derimod er ikke saa slemt angrebne som i 1932 (Hakon Sørensen). Fra Midtsjælland meddeles: »Skurven er nu d. 20. Juli ret udbredt paa de modtagelige Sorter, hvor der ikke er sprøjtet siden lige efter Blomstringen. Folk var ligesom i Fjor ganske trygge, da der i Juni næsten ikke fandtes Skurv paa Æbletræerne (Tørken!), hvorfor man mange Steder undlod den sidste Sprøjtning« (A. Andersen Kjær).

Kærnefrugtskimmel (*Sclerotinia fructigena*) er mange Steder i Jylland ondartet (Lars Hansen). Ved Lyngby er der set angrebne Æbler, hvor Saar fremkaldt af Hagl øjensynligt har dannet Indgangsport for Svampen.

Fra Jylland meddeles, at »Junidrysset« har været kolossalt mange Steder. Visse Sorter, som blomstrede meget rigt, har kun lidt Frugt tilbage, f. Eks. Rødt Ananas, Belle de Boskoop m. fl. De Sorter, som blomstrede forholdsvis mindst og sidst, har sat bedst (Lars Hansen).

Sølvglans (*Stereum purpureum*) og »Apoplexi« tager flere Steder nogle Træer af og til (Lars Hansen).

Om Stikkelsbældræber (*Sphaerotheca mors uvae*) skrives fra Mariager: »Takket være mere udbredt Anvendelse af Sommersprøjtning har Stikkelsbældræberen ikke den Betydning, den har haft (Sv. A. Rasmussen).

Ved Hjordkær blev der i Aar gennemført 2 Sprøjtninger rettidigt med alkalisk Kobbarsodavædske, og Resultatet har været tilfredsstillende. Kun hvor Buskene staar tæt og indelukket, er der svage Angreb af Stikkelsbældræberen (Th. Pedersen).

Paa Als findes Sygdommen i mange Haver, hvor man sprøjter for lidt. Havvand er prøvet, men var uden tilstrækkelig Virkning (Niels Gram).

KØKKENURTER.

Bladpletter foraarsaget af *Septoria apii* og *Cercospora apii* optræder mange Steder paa Lolland-Falster meget slemt paa Selleri. Afsvampning af Frøet har givet gode Resultater. Sprøjtning med Bordeauxvædske virker i Almindelighed godt (Georg Jensen).

Stribesygge i Tomater er sjælden i Aar (Verner Nielsen). Kransskimmel-Sovesygge, *Verticillium albo-atrum*, er mindre slem end sædvanlig (Lars Hansen).

Fløjlsplet (*Cladosporium fulvum*) er meget udbredt, det synes, som om 100 g salicylsurt Natron + 200 g Sæbe til 100 Liter Vand hjælper godt, men nogle Steder har det svedet (Lars Hansen).

Storknoldet Bægersvamp (*Sclerotinia sclerotiorum*) er i Aar mere udbredt end sædvanlig i Melon, Tomater, Agurker, Zinnia m. m. (C. Fich, Verner Nielsen).

Løgskimmel (*Peronospora Schleideni*) er nogle Steder ondartet.

Ved Stige er iagttaget et meget stærkt Angreb paa et lavtliggende Areal. Stærkest angrebet var Ailsa Craig, mindre Danoars og mindst Gul Zittauer (H. Øhlers).

PRYDPLANTER.

Meldug (*Sphaerotheca pannosa*) er ret udbredt i Hus, fordi de lave Priser paa Roser bevirker, at der kun fyres lidt.

I en Bøgehæk ved Lyngby var mange Skud angrebne af *Mycosporium carneum*.

ANNA WEBER.

KORN O. A. GRÆSSER.

Havreaal (*Heterodera schachtii*). Fra mange Egne skrives om Angreb i Havre, Byg og Hvede. Angrebene er i visse Egne saa stærke, at de maa betegnes som katastrofale for Havredyrkningen.

Halmhvepsen (*Cephus pygmaeus*), der kun har gjort sig bemærket en enkelt Gang i de senere Aar, har i Aar optraadt særdeles talrigt mange Steder paa Sjælland. Paa Jerslevengen var der praktisk talt ikke en Hvedemark, hvor ikke en betydelig Procentdel af Straaene var knækket som Følge af Angrebet (ofte over 10 %). Ogsaa i Byg var Angrebet almindeligt. Ogsaa ved Tystofte, paa Slagelseegnen og ved Roskilde er Symptomerne almindelige. Skaden menes ikke at være større, da Kærnen er nogenlunde veludviklet selv paa de angrebne Straa. Skillevejggene i Straaet er gennemgnavet, og man finder Larven helt nede ved Grunden af Straaet, hvor den har spundet sig en gennemsigtig Kokon. Det er indlysende, at Angrebet let ved en overfladisk Betragtning kan tydes forkert.

Hvedemyg (*Contarinia tritici* og *Sitodiplosis mosellana*). Angrebene synes i Almindelighed at være ret godartede i Aar. Fra Tystofte skrives, at de er mindre end iagttaget i mange Aar (H. Bagge). Paa Ringstedegnen bærer Markerne dog saa tydelige Spor af Angrebet, at det menes at ville have en mærkbar Indflydelse paa Udbyttet. Pajbjerg 184 synes mest angrebet (K. Larsen). Ogsaa ved Abed er Angrebet noget stærkere end formodet.

Havremider (*Tarsonemus spirifex*). Der er indløbet yderligere Meddelelser om Angreb særlig paa svagt gødet Jord, hvor man har dyrket vel meget Korn i Sædsiftet.

KORSBLOMSTREDE.

Kaaltægen (*Strachia oleracea*). Fra en Lokaltet ved Hovborg skrives: En enkelt Turnipsmark — ca. $\frac{1}{2}$ Td. Land — var meget stærkt angrebet. Paa en enkelt Plante kunde ofte ses flere Hundrede Tæger i alle Stadier. Det hævdes, at Skadedyrene har holdt til paa bestemte Ejenomme i flere Aar. De synes stærkt lokaliserede (H. Land-Jensen).

Kaallusen (*Brevicoryne brassicae*). Angrebene er mange Steder særdeles slemme i Aar baade i Kaal og Kaalroer. Der meldes om et ødelæggende Angreb i Kaalroer ved Hersnap (H. K. Olsen). Ved Besøg paa

dette Sted, viste det sig dog, at Snyltere (Svamp og Hvepse) havde gjort Ende paa Ødelæggelsen. Fra Slagelse: Kaalen (alle Arter) er helt misdannet af Lus. Blomkaal er næsten umulig at gøre ren (E. Christensen). Lignende Meddelelse foreligger fra Maribo (G. Jensen).

Bladribbesnudebillens Larver (*Ceutorrhynchus quadridens*). Fra Frederiksborg skrives: Høstturnips, Majturnips og Østersundom lider stærkere end Fynsk Bortfelder, Dales, Greyston og Yellow Tankard. Iagttagelsen gjort i Forevisningsmarken (H. Hansen).

Krusesyge-Galmyg (*Contarinia nasturtii*). Stærke til ondartede Angreb er iagttaget i Østjylland fra Aarhus og mod Nord, Salling og Fjends Herreder, Lemvig Opland, samt Frederiksborg Amt og Slagelseegnen; fra 15—25 % indtil 40—50 % ødelagte Planter med vidt fremskreden Hjerteforraadnelse. Iøvrigt er svage Angreb iagttaget i mange Egne. Der synes næppe at være Forskel paa Sorternes Modtagelighed, saaledes fremhæves Wilhelmsburger baade som svagt og stærkt angrebet.

Kaalflue (*Chortophila brassicae*). Der meldes næsten udelukkende om svage, godartede Angreb uden stor økonomisk Betydning. Kun enkelte Steder er der iagttaget stærke Angreb i Markerne, saaledes ved Omsaaning efter mislykkede Runkelroer, paa lav, vandlidende Jord — og i Overensstemmelse hermed — i sentsaaede Kaalroer. Derimod har dette Skadedyr voldt megen Ødelæggelse i Haver, hvor alle Kaalsorter er angrebet stærkt — ofte er 20—25 % af Planterne ødelagt.

BEDER.

Bedelus (*Aphis papaveris*). Stærke Angreb var en Del udbredte, især paa Øerne og et Par Steder i Østjylland, ved Maanedens Begyndelse, stærkt i Frømarker, mindre stærkt og almindeligt i 1. Aars Roer. Regnen standsede Angrebene, der dog ved Maanedens Slutning atter var i Tiltagende. Bekæmpelse er udført i Frøroer i stor Udstrækning med Nikotin eller Sæbe + Sprit, ofte er Virkningen heraf for svag, navnlig med sidstnævnte Vædske. I et enkelt Tilfælde er Sprøjtning udført 4 Gange. Mindst ligesaa vigtig som Vædskens Sammensætning og Koncentration er den anvendte Vædskemængde, der pr. Gang hellere maa ligge over end under 2000 Liter pr. ha. Svage Angreb, ofte svagere end sædvanligt, er iagttaget overalt i Landet, men de har været af saa ringe Betydning, at man ikke har iværksat Bekæmpelse.

Bladbiller (*Chrysomela fastuosa*). Fra Holsted indløb først i Maanedens en Meddelelse om Billeangreb paa Runkelroer. Det drejer sig om ovennævnte Art, der normalt lever paa *Lamium*, *Stachys* og *Galeopsis*. Den sidstnævnte Plante var almindelig i Markens Ukrudtsbestand (H. Land-Jensen).

Bedefluen (*Pegomyia hyoscyami*). Angrebene har i Aar været ualmindelig svage og praktisk talt uden Betydning. I mange Egne er de overhovedet ikke bemærket.

BÆLGPLANTER.

Kløveraal (*Tylenchus dipsaci*). Der er indløbet talrige Beretninger om Angreb baade i Rød- og Hvidkløver. Fra Varde skrives, at Øtofte tid-

lig er mindre angrebet end Tystofte 40. De staar Side om Side med 4 Gentagelser (A. Pedersen). Angaaende Hvidkløverstammerne skrives fra det nordlige Jylland: Ogsaa i Aar viser det sig, at baade engelsk og dansk vild Hvidkløver har god Modstandsevne mod Sygdommen (N. A. Olesen). Nogle Indberetninger hævder, at Hvidkløver kan være sund, men Rødkløver angrebet (eller omvendt) i samme Mark, medens andre finder begge Slags Kløver angrebet. Spørgsmaalet om, hvorvidt vi har at gøre med een eller to Aalacer, er derfor ingenlunde afgjort.

Ærtelus (*Macrosiphum pisi*). Fra Mariager meldes: Bladlus i Ærter er i Aar konstateret i saa uhyggelig Grad som aldrig før. Ved Rystning af de angrebne Planter dryssede Lusene af i et tommetykt Lag. Virkningen paa Planterne var selvfølgelig ødelæggende. Regnen har hæmmet Angrebet (Sv. A. Rasmussen).

Spidsmussnudebiller (*Apion spp.*). I Rødkløverfrømarkerne synes Arterne *A. apricans* og *assimile* at gøre megen Skade i Aar. Særlig slemt er det paa Møen, hvor man ofte i de tidlig ansatte Hoveder kan finde 10—15 Larver. Ogsaa fra Lokaliteter paa Vest- og Sydsjælland berettes om Angreb, der menes at ville forringe Frøudbyttet. Hvidkløverfrømarkerne angribes af en anden Art (*A. flavipes*), der dog først gør sig bemærket, naar Marken er slaaet. Billerne, der nu ses i uhyre Mængder, æder af Bladene eller vandrer ind i tilstødende Udlægsmarker, hvor de kan gøre stor Skade. Arten synes at være temmelig nøje knyttet til Hvidkløver, saaledes at den kun i Nødstilfælde forgriber sig paa Rødkløver.

KØKKENURTER.

Gulerods-Krusesyge (*Trioza viridula*). Stærke Angreb meget almindelige i Jylland langs Højderyggen, Vest for denne samt i Vendsyssel. Fra Øerne meldes især om svage Angreb, hvoriblandt enkelte fra Steder hvor Skadedyret ikke tidligere er iagttaget. Ondartede, ødelæggende Angreb fortrinsvis i smaa Marker og i Haver. Sprøjtning med Nikotin anvendes almindeligt og med godt Resultat; et Par Steder blev den dog begyndt for sent, da Angrebet i Aar faldt usædvanligt tidligt.

Skærmpplantemøl (*Depressaria sp.*). Fra Tystofte skrives: I en Gulerodsfrømark op til Forsøgsstationen findes et ret stærkt Angreb, idet ca. 15 m i Markens Yderkant er fuldstændig ødelagt, og over hele Arealet (ca. $\frac{3}{4}$ ha) findes mange ødelagte Skærme. Ejeren af den paagældende Mark paastaar, at Møllarverne i Fjor ødelagde hele Marken, saa han ikke fik Spor af Frø (H. Bagge).

Knoporme (*Agrotis sp.*). Ved Hatting fandtes et ondartet Angreb i en Blomkaalsmark (Chr. A. Nørholm), og ved Hillerød blev en Roemark helt ødt af, saa kun Kvikrødderne var tilbage (O. Holt).

Gulerodsfluen (*Psila rosae*). Larverne har gjort megen Skade, og der foreligger talrige Indberetninger om alvorlige Angreb baade i Mark og Have.

FRUGTTREER OG FRUGTBUSKE.

Dværgcikader (*Euperyx stellulata*). Fra Skelskør indsendtes Kirsebærblade, der var suget ret kraftigt af smaa Cikader. Hr. Jensen-Haarup

oplyser, at Arten kun er iagttaget een Gang tidligere her i Landet (paa Lind). I Rusland optræder den paa Ahorn og Æble. Arten er altsaa i Modsætning til de fleste andre Arter af Slægten polyfag. Det er af Interesse, at et saa sjældent Insekt pludselig kan optræde i stort Antal som Skadedyr.

Bladlus (*Aphididae*) er meget udbredt paa Frugttræerne, særlig Blomme og unge Æbletræer, hvis nye Skud ofte er helt overtrukket med Lus.

Blodlus (*Schizoneura lanigera*) konstateredes paa Æble i København (»De Gamles By«).

Frugttræspindemiden (*Paratetranychus pilosus*). En Del Steder findes stærke Angreb baade paa Æble og Blomme. En ret stærk Midebesætning fandtes paa Pæretræer ved Fredensborg. Fra Blangstedgaard skrives: Paa Æbletræer plantet 1926 er der nu Masser af Rødt Spind, hvor Svovlkalk (2 %) 1 eller 2 Gange i Foraaret ikke er anvendt. Bordeauxsprøjtede Træer er mindre angrebet end usprøjtede (N. Dullum).

Spindemider (*Tetranychus telarius*). Ikke faa Lindetræer paa Frederiksberg var gule midt i Maaneden (V. Nielsen).

PRYDPLANTER.

Rhododendrontæger (*Stephanitis sp.*). Fra Kongerslev i Himmerland og fra en Villahave i København indsendtes Blade af Rhododendron, der var suget af Tæger og plettet af disses Ekskrementer. Efter velvillig Meddelelse fra Hr. Lærer Jensen-Haarup drejer det sig ikke om Arten *Stephanitis rhododendri*, men vistnok om *S. ambigua*. Helt udelukket er det dog ikke, at det kunde være en nærstaaende, ubeskrevet Art. Slægtens Hjemsted er Mellem- og Østasien (Japan!). *Stephanitis*-Angreb paa Rhododendron har længe været kendt i Amerika og er gentagne Gange iundet i Tyskland. Her er Angrebet kun bemærket en enkelt Gang tidligere. Man bør sprøjte kraftigt med Nikotin plus Sæbe, naar Angrebet viser sig.

Galmider (*Eriophyes vitis*). Angreb paa Bladene af Vin fandtes flere Steder paa Nord-Als.

PROSPER BOVIEN.



