

Oversigt over Plantesygdomme.

251. — September 1941.

Der er for September Maaned indkommet Beretninger fra 52 Medarbejdere; endvidere er der besvaret 304 Forespørgsler.

Lufttemperaturen laa omtrent paa Normalen 11—12° hele Maaned igennem, dog et Par Grader højere i Maanedens Begyndelse.

Nedbøren blev kun henimod Halvdelen af Normalen og faldt fortrinsvis i Ugerne 6.—13. og 13.—20. I Maanedens 27 første Døgn faldt følgende Nedbørsmængder for de forskellige Landsdele maalt i mm med Normalen i () ; i disse Tal mangler saaledes Mængderne for Maanedens sidste 3 Døgn: Vendsyssel 19 (53), Vestjylland 27 (67), Midtjylland 27 (62), Østjylland 22 (55), Sydjylland 29 (69), Sønderjylland 25 (69), Fyn 22 (53), Midt- og Vestsjælland 29 (48), Nordøstsjælland 27 (52), Sydøstsjælland og Møn 29 (49), Lolland og Falster 35 (51) og Bornholm 45 (58).

KORN.

Stinkbrand (*Tilletia caries*). I et Par indsendte Prøver fandtes saa store Mængder af hele Brandkorn, at Hveden var uegnet til Saaning.

Sortrust (*Puccinia graminis*) blev konstateret paa Havre i en Mark paa Møn.

Kronrust (*Puccinia lolii*). I Egtvedegnen blev Svampen fundet i 2 Marker med sentsaaet Havre, der endnu ikke var skredet ved Maanedens Udgang; Markerne var helt røde af Rust.

Goldfodsyge foraarsaget af Hvededråbersvamp (*Ophiobolus graminis*) blev fundet paa en indsendt Bygprøve.

Majsbrand (*Ustilago zeae*) fandtes et Par Steder paa Majs bl. a. ved Hammel (J. Jakobsen).

BÆLGPLANTER.

Kløverens Bægersvamp (*Sclerotinia trifoliorum*). Der er modtaget 13 Beretninger, hvor der i de 11 meldes om ingen Angreb og i de to om svage, ubetydelige Angreb. Rødkløverbestanden synes at være ret tynd i mange Udlægsmarker. Trods den store Nedbør i August synes Svampen ikke hidtil at have bredt sig.

Almindelig Meldug (*Erysiphe communis*) blev fundet med stærke Angreb paa Rødkløver flere Steder, især i Udlægsmarker (Fr. Nielsen, Haderslev; Tage Pedersen, Galten), og ogsaa paa Alsike fandtes stærke Angreb (N. Engvang Hansen, Ulsted).

Hvidribbede eller Gulribbede Blade hos Rødkløver fandtes i flere Marker (Erik Boesen, Øster Lindet; P. Pedersen, Horsens).

Skivesvamp (*Pseudopeziza medicaginis*). I Udlægsmarker blev iagttaget ret kraftige Angreb paa Lucerne ved Tystofte (Jacob Wested), samt ligeledes paa Lucerne ved Aabenraa (Johs. Pedersen) og ved Aarhus (A. Diederich); Svampen fandtes tillige paa Humleagtig Sneglebælg ved Svendborg.

Sneglebælgens Stængelsvamp (*Phoma medicaginis*) iagttoges paa Lucerne til Frø paa Øtoftegaard (H. N. Frandsen).

Virus blev fundet hos Lupin paa indsendte Planter fra Stensballe ved Horsens.

Storknoldet Bægersvamp (*Sclerotinia sclerotiorum*) angreb Sojabønne stærkt paa Spangsbjerg.

HAMP.

Storknoldet Bægersvamp (*Sclerotinia sclerotiorum*). Et svagt Angreb fandtes i Hamp paa Dyndjord (Kr. Knudsen, Nykøbing Sj.).

BEDER.

Bormangel, Tørforraadnelse. Der modtoges 17 Beretninger, og i 14 af disse omtales Angrebet som yderst svagt; i 2 Beretninger fremhæves, at det er flere Aar siden, at der er set saa faa og svage Angreb (P. Trosborg, Brande; O. K. Toudal, Nordvesthimmerland). I 3 Beretninger meldes om stærke Angreb paa stærkt kalket Jord (S. Andreassen, Haslev; E. Boesen, Øster Lindet; Tage Pedersen, Galten), hvad der tyder paa, at Aaret virkede fremmende paa Sygdommen, hvor den ikke blev bekæmpet ved Anvendelse af Borax.

Virus-Gulsot, der foraarsager gule, stive Blade, synes vedvarende at være meget godartet; i de fleste Beretninger nævnes, at der kun blev iagttaget faa og yderst svage Angreb. Allerede først i Juli saas der ved Ullerslev paa Fyn tydelige Angreb i et Par Frømarker, men der blev i Løbet af August-September kun fundet svage Angreb i enkelte Pletter i nærliggende 1. Aars Marker. Svage Angreb iagttoges ligeledes i andre Egne, saaledes ved Askov, Vejle, Horsens og Brørup, og paa Sjælland: Slagelse-Gørlev og Kalundborg, men kun faa Steder fandtes der smaa Pletter i Marken med typiske Angreb af Gulsot. Vest for Glostrup blev dog fundet et Par Marker med ret stærkt Angreb. I Skelskøregnen synes Angrebene at være ret almindelige og at have bredt sig i Maanedens sidste Halvdel (H. Wraae-Jensen). Hist og her fandtes enkelte gule Pletter i Marken, som dog i de fleste Tilfælde maa tilskrives Næringsmangel (H. E. Jensen, Hillerød; S. Nørlund Christensen, Aulum; H. Rasmussen, Næsgaard).

Kronisk Rodbrand, hvor Siderødderne var stærkt angrebet, fandtes ved Lemvig (N. Mølgaard) og ved Vejle (N. C. Georgsen).

Manganmangel, Lyspletsyge, ødelagde Bladene stærkt paa overkalket Jord (S. Andreassen, Haslev).

Kalimangel konstateredes paa indsendte Roer fra Borris (K. Vadgaard).

KORSBLOMSTREDE.

Kaalbrok (*Plasmiodiophora brassicae*). Angrebene synes at have været godartede næsten overalt, dog fandtes der hist og her enkelte Marker, der var stærkt angrebet »som Regel paa Grund af forkert Sædskiye eller Anvendelse af smittet Staldgødning« (O. K. Toudal, Nordvesthimmerland).

Bormangel, Marmorering, har hidtil saa godt som ikke været iagttaget, men den tørre September foraarsager temmelig sikkert megen Bormangel i Kaalroer, hvor Anvendelse af Boraks ikke er almindelig (P. Trosborg, Brande).

Mosaiksyge blev næsten ikke iagttaget; i en enkelt større Mark fandtes 4—5 svagt angrebne Planter, og paa en Ejendom ved Slagelse, hvor der dyrkes meget Frø, fandtes ret udbredte Angreb i Kaalroerne.

Bakterioser synes i flere Egne at være ret almindelige og under tiden med stærke Angreb (Tage Pedersen, Galten), der især forekom paa vandsyg Jord (N. C. Georgsen, Vejle).

Skulpesvamp (*Alternaria brassicae*) fandtes paa gamle Blade af Kaalroer ved Lundgaard og paa adskillige Blade af Turnips ved Virumgaard og Bække.

Svampen *Cylindrosporium brassicae* blev konstateret i en Kaalroemark ved Egtved, hvor der var et ret stærkt Angreb paa de gamle Blade. Ved Askov iagttoges ligeledes et stærkt Angreb paa enkelte Pletter i Kaalroemarken.

Rødbladede Kaalroer var fremtrædende i Kvælstofforsøg paa Virumgaard i Parcellerne uden Kvælstof; samme Sted ytrer dette Fænomen sig noget forskelligt hos Stammerne, hvoraf Yderbladene hos nogle var stærkt røde, hos andre stærkt gule. Ved Lundgaard er en lignende Rødfarvning set i ugødede Kaalroer. Men tillige synes dette Farvefænomen at kunne tiltage med Anvendelse af Kaligødning, idet det var stærkere efter 4 Tons end efter 2 Tons Kaligødning.

KARTOFLER.

Kartoffelskimmel (*Phytophthora infestans*). Skimmelen fortsatte sit voldsomme Angreb ind i September, og for Størstedelen af Landet blev usprøjtede Kartoffler ødelagte i Begyndelsen af September, hvilket er sent for udprægede Skimmelaar. Angrebet var ofte saa voldsomt, at Toppen faldt paa 2—3 Dage.

I Vendsyssel saas de første svage Skimmelangreb omkring Midten af Maaneden paa usprøjtede Kartoffler (Sv. Svendsen, Tylstrup). I Kær Herred Nord for Limfjorden var Angrebet mildt paa de middelsildige og sildige Sorter, der vanskeligt slipper Toppen ved Optagning (N. Engvang Hansen, Ulsted).

For Landet som Helhed synes ingen Sorter at være gaaet fri for Angreb; selv Sorter som Alpha og Svaløf Birgitta er angrebet stærkt

omend sent (J. Hansen, Grindsted), og det samme gælder Gustav Adolf (Mogens Hansen, Toftlund).

Sprøjtetiden har i Aar øjensynligt haft stor Betydning i Bekæmpelsen. 1. Sprøjtning sidst i Juli har ikke kunnet holde, derimod gik det bedre, hvor Sprøjtningen blev udført omkring Midten af August (Fr. Heick, Jynde vad).

Knoldsmitten har hidtil ikke været stor, hvilket i de fleste Beretninger tilskrives det tørre Vejr i September; men Kartoffeloptagningen var ikke lige langt fremme i alle Egne ved Udgangen af September, hvorfor dette Forhold endnu ikke helt kan bedømmes. Enkelte Steder blev der dog iagttaget stærkt Knoldangreb hos Sorter med modtagelige Knolde (A. P. Aidt, Viborg; Kr. Knudsen, Nykøbing Sj.), og det menes at blive nødvendigt at sortere Knoldene stærkt før Kuling.

Vaadforraadnelse (Bakterioser) blev kun fundet enkelte Steder med svage Angreb, hvilket kan skyldes det tørre, gunstige Vejr for Kartoffeloptagning sidst i September.

Kartoffel-Rodfiltsvamp (*Rhizoctonia solani*). Svage Angreb blev fundet paa Knoldene enkelte Steder (H. Jensen, Lammefjorden).

Kartoffelskurv (*Actinomyces scabies*) konstateredes paa 9 indsendte Kartoffelprøver, der fortrinsvis stammede fra Haver.

Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*). Landbrugsministeriets Tilsyn med smitsomme Plantesygdomme meddeler, at Sygdommen er konstateret i: Hobro Købstad (Randers Amt), Skjern Sogn (Ringkøbing Amt), Malt Sogn (Ribe Amt), Bevtøft og Sommersted Sogne (Haderslev Amt), Hylleholt Sogn (Præstø Amt) og Rødovre Sogn (Københavns Amt).

HANS R. HANSEN.

SYGDOMME PAA HAVEBRUGSAFGRØDER.

Besvarelse af 16 Skemaer har givet nedenstaaende Resultat:

Sygdomme paa Havebrugsplanter	Intet Angreb	Angreb ikke almindelige		Angreb almindelige	
		svage	stærke	svage	stærke
Æbleskurv	0	5	2	10	1
Pæreskurv	0	6	1	9	2
Gul Monilia — Æble	2	3	1	6	5
Gul Monilia — Pære	3	5	1	3	3
Gul Monilia — Blomme	2	2	1	8	2
Aspargesrust	2	1	1	1	1
Chrysanthemumrust	0	2	0	1	0

Æbleskurv (*Venturia inaequalis*) synes gennemgaaende at være godartet. Om godartede Angreb meldes saaledes fra Hornum, Horsens, Esbjerg, flere Steder paa Sjælland, Næstved, Sorø Amt, Vejrhø (Hans Christensen, C. A. Nørholm, Edv. Christiansen, Asger Klougart. M. E.

Elting, Agnes Værløse, Aton Andersen). Fra Svendborg Amt skrives, at Skurven i Almindelighed er godartet, stærkest angrebet synes Graastener at være, medens Bismarck og Boiken næsten er helt fri (Hans Larsen). Ved Studsgaard er det særlig Filippa, som er angrebet (Chr. Esbensen). Iøvrigt skrives fra Fyn, at Skurven er begyndt at brede sig sidst paa Maaneden, og at den er slem i usprøjtede Haver (R. Hansen, Chr. Greve). I Maribo Amt ses stærke Skudangreb, stærkere end de er set i adskillige Aar paa denne Tid (Georg Jensen). I Spørring har der været lidt Skurv paa Bramley, Belle de Boskoop og Boiken og meget paa Bismarck efter Sprøjtning med 10 pCt. Svovlkalk i April og 2 pCt. Svovlkalk henholdsvis efter Blomstringen og 2 Gange i Juli (N. Gram).

Pæreskurv (*Venturia pirina*) regnes flere Steder for at være værre end Æbleskurv, men som Helhed synes den at være ret godartet.

Gul Monilia (*Monilia fructigena*) er alvorlig mange Steder paa Æble, f. Eks. skrives fra Horsens: »En Del spredte, ondartede Angreb« (Chr. A. Nørholm), fra Svendborg Amt: »Meget almindelig i alle Haver og hist og her meget slem« (Hans Larsen), fra Haslev: »Angrebet er almindeligt og usædvanlig stærkt« (H. Wedege), fra Næstved: »Efter Regnperioden i August bredte Angrebene sig stærkt og har ødelagt og ødelægger stadigt mange Frugter« (M. E. Elting). Fra Sorø Amt fremhæves Høve Reinet som ondartet angrebet, desuden findes undertiden Angreb paa Bismarck (Agnes Værløse). I Kolonihaver i Københavns Omegn er den begrænset til bestemte Sorter, især Charlamowsky, Cox' Pomona, Gul Richard, Maglemer Stribling og Guldborgæble (Alf. Rasmussen). Fra mange Sider fremhæves den store Betydning »Ormehullerne«, frembragte af Æbleviklerlarverne, har som Indfaldsporte for Svampen.

Paa Pære er Gul Monilia ikke saa almindelig som paa Æble, det er dog mange Steder gaaet slem ud over Graapærerne, fordi disse har haft Revner, som er blevet Indfaldsporte for Svampen.

Om Gul Monilia paa Blomme foreligger der kun faa Indberetninger, den synes at forekomme almindelig, men ikke at være særlig ondartet.

Gul Monilia paa Hasselnødder er fundet paa flere Partier, der er sendt ind til Undersøgelse. De angrebne Nødder er som Regel golde, sandsynligvis er det fortrinsvis de golde Nødder, som angribes, men det har i et enkelt nærmere undersøgt Tilfælde i en stor Nøddeplantage i Jylland ikke været muligt at paavise Aarsagen til, at mange Nødder er golde.

Priksyge har optraadt saa alvorligt paa Tyrrestrup i en Have i Spørring, at Frugterne sad og raadnede af det paa Træerne (N. Gram). Ved Gissfeldt har mange af Æblerne, maaske Halvdelen, i Sorterne Graastener, Filippa og Bodil Neergaard ligesom Pletter af Fingeraftryk. Det er det imidlertid ikke, thi Pletterne kan ogsaa findes, medens Æblerne endnu sidder paa Træerne. Ved Snit igennem Æblerne ses det, at Pletterne gaar 1—2 mm ned i Kødet. Dette er ofte blakket helt igennem Æblet og kan have svagt brunfarvede Partier (H. Wedege).

Dette Fænomen minder en Del om den »Brunfarvning i Æblerne«, som saas en Del sidste Aar, især paa Graastener, kun var Pletterne da ikke saa tydelige. (Se Oversigt over Plantesygdomme, 245, Oktober 1940). Denne Brunfarvning er ogsaa set i flere Tilfælde i Aar.

Glasæbler forekommer ret almindeligt.

Kikkertæbler optræder en Del i Belle de Boskoop i Svendborg Amt (Hans Larsen).

Paa vor Forespørgsel om Resultatet af Sprøjtning af Frugttræer med Kobberoxyklorid (»Kobberkalk«) og andre Erstatningsmidler eller Specialpræparater, er der indkommet 9 Besvarelser. Ingen af dem giver Oplysning om Kobberoxyklorid, thi der er ikke set Anvendelse deraf. De fleste Steder er der sprøjtet med Bordeauxvædske og Svovlkalk.

Kartoffelskimmel (*Phytophthora infestans*) har mange Steder været slem ved Frilandstomaterne, hvor disse ikke er blevet sprøjtede eller pudrede tilstrækkeligt.

Stemphylium botryosum (= *Macrosporium parasiticum*) har angrebet Yderbladene af Gul Zittauerløg paa et over 2 ha stort Areal paa Amager (Paul Neergaard).

Aspargesrust (*Puccinia asparagi*) er saa alvorlig paa Samsø, at der klages meget over den; enkelte sprøjter; men mange gør det ikke (Henrik Nielsen). Paa Spangsbjerg Forsøgsstation er Gødningsforsøget med Asparges blevet sprøjtet med Bordeauxvædske, og her er der kun lidt Angreb. I Sortsforsøget var Væksten saa kraftig, at det næsten ikke var til at færdes mellem Rækkerne, og her blev ikke sprøjtet, og Rusten er nu stærkere her end paa det sprøjtede Areal (E. Christiansen).

Chrysanthemumrust (*Puccinia chrysanthemi*) synes endnu at optræde svagt eller ret svagt (N. Flensted-Andersen, Fuglebjerg; Asger Klougart, København; H. Wedege, Haslev).

ANNA WEBER.

SKADEDYR PAA LAND- OG HAVEBRUGSAFGRØDER.

Chrysanthemumaal (*Aphelenchus Ritzema Bosi*). Fugtigheden i Efteraaret har befordret Angrebene, saa de modtagelige Sorter nu staar med kun faa sunde Blade (A. Klougart).

Roeaal (*Heterodera Schachtii*). Pletvis kniber det med Sukkerroerne paa Lammefjorden. Roerne er meget smaa og »skæggede« (H. Jensen).

Tæger (*Capsidae*) paa Chrysanthemum. Vi har modtaget følgende Beretning: »I de fleste Gartnerier (paa Sjælland) var der først i September slemme Angreb. Tægerne er ikke alene gode Sortskendere, men forstaar ogsaa at skelne mellem de forskellige Stikkehold. De synes altid værst, naar Endeknoppen har vist sig« (A. Klougart). Fra Sorø skrives, at gentagne Pudringer med Svovlpudder iblandet 20 pCt. Cryocid synes at holde Tægerne noget paa Afstand fra Chrysanthemum (N. Flensted-Andersen).

Blodlusen (*Schizoneura lanigera*). Selvom de to strenge Vintre har været en haard Prøvelse for Blodlusen, er den dog ingenlunde blevet totalt udryddet. I Dronningens Vænge ses Lusene nu igen, og der klages over, at »Blodlusene er ved at blive ondartede i Plantager paa Sjælland, der var plaget før Fimbulvintrene« (A. Klougart). Der er al mulig Grund til at anvende kraftige Bekæmpelsesforanstaltninger nu, hvor Lusene endnu optræder moderat!

Öldenborrelarver (*Melolontha vulgaris*). Ved Anneberg Skov (Nykøbing Sj.) har Larverne ødelagt Dele af en Lucernemark. For tre Aar siden var der en daarlig Roeafgrøde paa samme Sted (H. Jensen).

Gaasebillelarver (*Phyllopertha horticola*). Fra Hornum skrives, at Angreb, der pletvis kan være ret stærke, er fundet i Rug efter Græs (F. Rasmussen).

Smælderlarver (*Agriotes spp.*). Fra Ø.- og Vestre Hassing skrives, at Larverne er meget almindelige og ofte kan findes ved hver Kartoffelplante ved Prøveopgravning (N. Engvang Hansen).

Jordlopper (*Halticinae*). Fra Haslev skrives, at større Partier af en Mark med Udlæg af Kaalroer til Frø, udlagt i Byg, er fuldstændig ødelagt af Lopperne. Andre Steder er iagttaget svagere Angreb (S. Andreassen).

Nøddesnudebillen (*Balaninus nucum*). Fra Gisselfeld skrives, at Angrebet er meget slemt, og at Larverne endnu sidst i September findes i stort Tal i Nødderne, hvis Kærne de kun har ædt en lille Del af (H. Wedege). Lignende Iagttagelser har vi gjort i Lyngby, hvor der d. 3. Oktober fandtes mange Larver i Nødderne. Saa sent som d. 20. September fandt vi paafaldende smaa Larver, der kun havde fortæret en ringe Del af Kærnen.

Kaalbladhvepsen (*Athalia spinarum*). Hvepsens 2. Larvegeneration har hærget stærkt i Aar og vistnok stærkere end hidtil set. Endnu i Slutningen af Maanedens indløb der Meddelelse om Angreb, hvoraf de fleste forekom paa Sjælland, enkelte i Jylland. Larverne angreb Turnips, Kaalroer, Kaal, Sennep og Peberrod. Det bemærkedes ofte, at en stor Procentdel af Larverne var belagt med hvide Æg af Snyltefluer (*Tachiner*). Ved sidste Hudskifte (hvor Larvens Udseende skifter fra næsten sort til en blaalig Tone) afkastes dog en stor Del af Æggene, før de er klækket. Foruden 16 skriftlige eller telefoniske Beretninger om Angreb, har vi modtaget 5 Rapporter ved Maanedens Slutning. Fra Aarhus skrives, at der i Begyndelsen af September var Angreb paa Sennep og Kaalroer til Frø. Angrebene begyndte paa gul Sennep (A. Diederich). Fra Odsherred: »Angreb har i hele Maanedens været almindelige paa udlagte Arealer med Korsblomstrede til Frøavl: Kaalroe, Glaskaalrabi og sent saaede Turnips. Stubmarken med mange korsblomstrede Ukrudsplanter synes at være Arnested for Hvepsens Udvikling. Heraf synes særlig Hyrdetaske, Pengeurt og Agersennep at foretrækkes af »Fløjsormene« (Kr. Knudsen). Fra Lammefjorden, hvor der nu er ret ondartede Angreb paa Turnips, var Blyarsenatpudder (40 pCt.) effektivt (H. Jensen). Om stærke Angreb paa Kaalroer til Frø skrives fra Roskildeegnen (M. Greve) og paa Turnips fra Bregentved (S. Andreassen).

Syrehvepsen (*Ametastegia glabrata*). I Maribo Amt er der iagttaget ret stærke Angreb i flere Erhvervsplantager (G. Jensen).

Æblevikler (*Carpocapsa pomonella*). Ogsaa de i denne Maaned indkomne Beretninger fremhæver Angrebene som mere ondartede end nogensinde før. Selv i velsprøjtede Haver kan en stor Del af Frugten være angrebet.

Kaalorme (*Pieris brassicae*). Det er ofte gaaet slemt ud over Kaa-

len, og Kaalroerne har ogsaa lidt en Del. Skadevirkningen har dog vist sig ringere end oprindelig ventet. Efteraarsvejret har begunstiget Svampeangreb, der ofte har dræbt en meget stor Procentdel af Larverne. Om særlig ondartede Angreb meldes fra Skelskør (H. Wraae-Jensen), Kær Herred (N. Engvang Hansen) og Brande (P. Trosborg).

Knoporme (*Agrotis spp.*). Svage Angreb ses hyppigt, men der foreligger kun faa Beretninger om alvorlig Skade. Fra Langeland skrives saaledes om et meget stærkt Angreb paa Udlægsroer til Overvintring (J. Jensen). Paa Skelskøregnen (H. Wraae-Jensen) er det i enkelte Marker gaaet slemt ud over Kartofflerne, og fra Haderslev skrives om ret stærke Angreb i Fodersukkerroer til Frø (Fr. Nielsen). Ved Viborg er der en Del Gnav i Kartofflerne (A. P. Aidt), og paa Aarhusegnen er det gaaet ud over et Par Marker med Kaalroer til Frøavl (A. Diederich).

Uglelarver (*Mamestra trifolii*) angreb midt i Maaneden Rødbeder til Frø paa Spangsbjerg (E. Christiansen).

Krusesygegalmyg (*Contarinia nasturtii*). I 14 af de 17 indkomne Beretninger tales der om svage Angreb uden alvorlige Følger. Fra Nordvesthimmerland skrives imidlertid, at ca. Halvdelen af Roerne er angrebet i mange Marker. Det synes dog, som om Forraadnelsen ikke er slem til at trænge ned i Roen (O. K. Toudal). Fra Galten meldes, at Forraadnelsen er slem i mange Kaalroemarkers og værst i Wilhelmsburger (T. Pedersen). Ogsaa ved Haderslev er Roerne ofte slemt medtaget af Halsforraadelse (Fr. Nielsen).

Kaalfluellarver (*Chortophila spp.*). Fra Grindstedegnen skrives, at Larverne findes i mange Kaalroemarkers. I nogle Marker er de fleste Planter mærket med Gange og raadnende Partier (J. Hansen). Noget endeligt om Angrebsstyrken kan ikke siges, før Optagningen er endt.

Frugttræspindemiden (*Paratetranychus pilosus*). Selvom stærke Angreb findes hist og her, har Betydningen af »Rødt Spind« været ringe i Aar.

Jordbærmiden (*Tarsonemus fragariae*). I flere 2-aarige Stykker er der set saa slemt Angreb, at der næsten ingen grønne Blade kom frem (A. Klougart).

PROSPER BOVIEN.