

Oversigt over Plantesygdomme.

266. — Oktober 1943.

Der er for Oktober Maaned indkommet Beretninger fra 63 Medarbejdere; endvidere er der besvaret 273 Forespørgsler.

SYGDOMME PAA LANDBRUGSPANTER.

Varmeskade. Det usædvanlig milde Oktobervejr har medført, at Kartofler mange Steder spirer i Kulerne, et Varsko om, at der maa passes paa med Ventilation og Dækningen (J. Wested, Tystofte; Th. Kristensen, Skals). Ogsaa med tidlig sammenkørte Roer bør der passes paa — A. Diederich, Aarhus, nævner et Eksempel paa, at Sukkerroer, kørt sammen 10. Oktober, nu har lange Spirer, og paapeger i den Anledning Nødvendigheden af en passende Ventilation ogsaa i Roekuler, navnlig efter tidlig Sammenkørsel.

KORN.

Nøgen Bygbrand (*Ustilago nuda*). Fra Lolland skrives, at en speciel Undersøgelse af et Bygparti fra Høst 1943 indtil nu viser 4 pCt. Brand, saaledes at der maa foretages Varmvandsafsvampning (Rs. E. Rasmussen).

Spiringsfusariose (*Fusarium sp.*). Eet enkelt alvorligt Angreb iagttaget efter uafsvampet Saasæd. Rugen gik bort i store Pletter, og Kærnerne kunde findes med en tyk Skimmelpels i Jorden (Mogens Hansen, Toftlund).

BÆLGPLANTER.

Kløverens Bægersvamp (*Sclerotinia trifoliorum*) optræder særdeles godartet trods det milde Vejr og den høje Luftfugtighed, som har hersket i Oktober Maaned, og trods en meget kraftig Kløverbestand mange Steder. Th. Kristensen, Skals, skriver: »Hele Besætningen er endnu paa Græs i det gode Vejr, saa den kraftige Vækst i Udlægsmarken ædes i Tide«, og tilsvarende ytrer adskillige andre sig.

Storknoldet Bægersvamp (*Sclerotinia sclerotiorum*) konstateres paa Lucerneplanter, som indsendtes af Landbrugskand. Hj. Møller Nielsen, Skanderborg.

Kransskimmel (formentlig *Verticillium albo-atrum*) gjorde paa Midtfyn alvorlig Skade i 2 Lucernemarker, i hvilke talrige Planter dræbtes, saa der fremkom store Pletter i Markerne (A. L. Nielsen, Ringe).

Skorpessvamp (*Phyllachora trifolii*) fandtes paa Rødkløver, som indsendtes af F. K. Damgaard, Faarevejle, og Fr. Krogh, Jyderup.

Stemphylium sarciniforme gjorde væsentlig Skade paa Lucerne flere Steder, bl. a. ved Nykøbing F., Køge og Sønderlyng, samt paa Rødkløver ved Odder. Paa Lucernens Blade opstaar der lyse Pletter med en mørkebrun Rand, Bladene visner efterhaanden, oftest fra Rand og Spids, bliver krøllede og falder af. Det ser ud, som Frost er gaaet over Markerne.

BEDEROER.

Bormangel (Tørforraadnelse) forekommer i S. V.-Himmerland paa Jorder med for højt Kalkindhold (Th. Kristensen, Skals), og fra Østlolland berettes om fortrinlig Virkning af 20 kg Borax pr. ha paa sort-sandet Jord (Rs. E. Rasmussen).

Bedernes Virus-Gulsot. Fra Egne, hvor Virus-Gulsot i Efter-sommeren var fremtrædende i Bederøemarkerne, berettes om en væsentlig Nedsættelse af Toppens Værdi til Opfodring og Ensilering, et Forhold, hvor andre Aarsager, f. Eks. Bederust (*Uromyces betae*), Pletskimmel (*Ramularia betae*), Sortskimmel (*Alternaria*) m. m. ogsaa er medvirkende. Fra Lolland lyder det, at det dernede er en almindelig Iagttagelse, at virus-syge Roeblade efter Aftopningen kun holder sig 2—3 Dage (Rs. E. Rasmussen).

Krongalle (*Phytophthora tumefaciens*) fandtes paa Fodersukkerroer i et Forsøg i Outrup — dog kun enkelte Roer (V. Sørensen).

Bedeskimmel (*Peronospora Schachtii*). Efter stærke Angreb i Sommer spores stadig alvorlige Eftervirkninger med daarlig udviklet Top, Flertoppethed, Nekroser i den øvre Del af Roelegemet og frem for alt en mangelfuld Roed udvikling.

Bedens Pletskimmel (*Ramularia betae*) rapporteredes fra Varde (A. Pedersen) og Morsø (Engelhart Jensen). Førstnævnte skriver, at en Del Blade visner helt som Følge af dette Angreb.

Violet Rodfiltsvamp (*Rhizoctonia violacea*) fandtes paa indsendte Bederøer fra Nykøbing F.

KORSBLOMSTREDE (KAALROER M. M.).

Bormangel (Marmorering) forekom i adskillige Kaalearmarker paa Holstedegnen (A. Dam Kofoed) og i et Saatidsforsøg paa Aarslev, hvor der trods Gødskning med 15 kg Borax pr. ha var en Del Angreb, stærkere i 1. og 2. Saatid end i 3. og 4. (Asger Larsen).

Mosaiksyge forekommer i de fleste Kaalearmarker paa Skælskørgnen, dog kun med svage Angreb (H. Wraae-Jensen). Ved Slagelse findes ogsaa Angreb, bl. a. i Frøkaalroer (E. V. Ellehauge). Sygdommen, der trængtes tilbage til et Minimum af Frostvintrene, er altsaa ved at vinde Indpas igen.

Bakteriose. Halsraad, der oftest følger efter Krusesygegalmygens Angreb, har været almindelig udbredt Landet over, men praktisk

talt kun med ubetydelige til svage Angreb. Fra Statens Forsøgsstation, Aarslev, meldes om stærkest Angreb i Wilhelmsburger (Asger Larsen).

Brunbakteriose (*Phytomonas campestris*) ødelagde paa en Ejendom paa Sorøegnen $\frac{1}{4}$ af Kaalroerne (O. Møller Larsen).

Meldug (*Erysiphe polygoni*) har paa flere jyske Lokalteter været slem paa Kaalroer (P. O. Overgaard, Holstebro; V. Sørensen, Lunde; Jørg. M. Pedersen, Aarhus). Sidstnævnte skriver: »Meldug paa Kaalroer er almindeligt i alle Kaalroemarken og nedsætter den ellers kraftige Kaalroetops Værdi. Enkelte Landmænd paastaar, at Køerne ikke kan taale de meldugbefængte Blade, men faar Diarrhoe, naar de fodres dermed«.

Tørforraadnelse (*Phoma lingam*) optraadte paa Tylstrup, særlig i Bangholm Stammerne (Sv. Svendsen).

KARTOFLER.

Kartoffelskimmel (*Phytophthora infestans*). Tørforraadnelse paa Knoldene forekommer paa alle Lokalteter Landet over, talrige Steder med ondartede Angreb. Af de 38 Indberettere karakteriserer de 15 Angrebene som almindelig udbredte og stærke (A. Juel-Nielsen, Bornholm; B. Munch, Haslev; Johs. Johansen, St. Heddinge; H. Wraae-Jensen, Skælskør; Laur. Pedersen, Odsherred; P. M. Dreisler, Ebberup; Aage Buchreitz, Skærbæk; Fr. Nielsen, Haderslev; J. J. Jakobsen, Grindsted; A. Pedersen, Varde; M. Olsen, Pjedsted; A. Diederich, Aarhus; P. O. Overgaard, Holstebro; P. Ørndrup, Skive; B. Jacobsen, Hobro). Som Eksempel paa, hvor galt det kan være, nævner O. K. Toudal et Tilfælde fra Nordvesthimmerland, hvor 80 pCt. af Knoldene (Up to date) var angrebne. Heldigvis er der dog Lyspunkter ind imellem, f. Eks.: »Angrebene ikke nær saa udbredte og ondartede som i Fjor« (P. Riis Vestergaard, Samsø) og »meget ringe Angreb af Kartoffelskimmel paa Knoldene i Aar — indtil nu!« (Sv. Svendsen, Tylstrup). Den sidste Bemærkning tyder paa, at man ikke føler sig helt tryk — mange Steder tales der da ogsaa om, at Angrebene har bredt sig i Kulerne. Flere Steder anses det fine Vejr under Optagningen, som bevirkede, at Knolde kunde kules tørre ned, for at have modvirket Angrebets Udbredelse (Fr. Nielsen, Haderslev; Th. Kristensen, Skals), medens paa den anden Side det meget milde Efteraarsvejr mange Steder har fremmet Angrebet, navnlig i for store eller stærkt dækkede Kuler. A. Juel-Nielsen, Bornholm, skriver f. Eks.: »Flere Steder har man maattet sortere Kartoffelkulerne 2 Gange igennem for at faa fjernet de skimmelangrebne Knolde«, og det maa kraftigt tilraades stadig at passe paa, først med en grundig Sortering inden den egentlige Vinterdækning, som bør trækkes ud saa længe som muligt, og dernæst med en hensigtsmæssig Dækning af Kulerne, afpasset nøje efter Vejrforholdene, en gennemført Ventilering og endelig Kontrol med Temperaturen i Kulerne, saa der kan gribes ind, hvis en Forraadnelse tager Fart.

Fra mange Sider (Aage Buchreitz, Skærbæk; Hans Larsen, Svendborg; M. Olsen, Pjedsted; B. Jacobsen, Hobro; Engelhart Jensen, Morsø; S. Nørlund Christensen, Aulum, m. fl.) fremhæves det, at Angrebet er værst paa tidlige og middeltidlige Spisekartofler, blandt hvilke King Ed-

ward og Bintje nævnes særlig hyppigt, men Juli, Goldperle og Di Vernon nævnes ogsaa. Engelhart Jensen, Morsø, skriver, at Angrebet er af mindre Betydning paa Foder- og Industrikartofler.

V. Sørensen, Nr. Nebel, meddeler, at Angrebene er værst paa de ikke sprøjtede Arealer, og O. Møller Larsen, Sorø, frygter med Rette det vanskelige i at skaffe sygdomsfri Læggekartofler.

Vaad Forraadnelse (Bakterioser) forekommer almindeligt, men langt fra i en saa alvorlig Grad som Tørforraadnelsen, selv om der spredt findes Tilfælde, der er slemme nok; f. Eks. skriver Aage Buchreitz, Skærbæk: »Mange Kartoffelbeholdninger er slemt angrebet — nogle er allerede helt ødelagt«. Om stærke Angreb berettes ogsaa af A. Skarre-gaard, Ringkøbing; P. O. Overgaard, Holstebro; B. Jacobsen, Hobro; B. Munch, Haslev; Johs. Johansen, St. Heddinge, og Rs. E. Rasmussen, Sakskøbing, medens mange andre taler om svage Angreb, der kan befrygtes at starte alvorligere Angreb, saafremt der ikke sørges for Fra-sortering, Ventilation og hensigtsmæssig Dækning som nævnt ovenfor.

Kartoffelskurv (*Actinomyces scabies*) optræder som sædvanlig mange Steder med stærke Angreb, først og fremmest paa overkalkede Jorder. Fra Hornum (Frede Rasmussen) skrives, at Alma er mest angrebet, Karma mindst, medens Bintje og King Edward staar herimellem.

GULERØDDER.

Violet Rodfiltsvamp (*Rhizoctonia violacea*) er konstateret i alvorlig Grad paa indsendte Gulerødder fra København og Sdr. Tranders.

CHR. STAPEL.

SYGDOMME PAA HAVEBRUGSPANTER.

Besvarelse af 17 af de udsendte Skemaer har givet følgende Resultat:

Sygdomme paa Havebrugsplanter	Intet Angreb	Angreb ikke almindelige		Angreb almindelige	
		svage	stærke	svage	stærke
Priksyge	2	9	3	5	0
Glasæbler	11	4	0	1	0
Selleri-Bladpletsyge	2	0	1	8	9

FRUGTTRÆER OG FRUGTBUSKE.

Sprøjtning af Frugttræer. Virkningen af det samme Middel kan variere stærkt, og Skurven optræde meget forskelligt. Da der har været en Del Vejrskade i Sommer, er det vanskeligt at sige noget sikkert om Sprøjteskade, hvor det hele er behandlet ens, saa der hverken findes anderledes behandlede eller ubehandlede Træer til Sammenligning.

Angaaende den varierende Virkning, som man ofte ser, skrives der fra Fyn, at et godt Resultat af Sprøjtningerne baade er afhængigt af Behandlingernes Antal, Arbejdets Udførelse og Tidspunktet; saaledes

kan nogle faa Dages Udsættelse af Sprøjtningen i Skurvvejr faa stor Indflydelse paa Resultatet (Hans Larsen). Hvor varierende Virkningen af et Middel kan være, kan man bl. a. se deraf, at der skrives fra Stevns-Fakseegnen, at der i mange Haver er sprøjtet een Gang med Sulsol med det Resultat, at Frugten er pæn og veludviklet, uden Skurv og Sprøjteskade, og Løvet har holdt sig pænt. Det tilføjes dog, at Skurvangrebet i Aar har været meget svagere, end det plejer at være, og derfor er det gaaet godt med denne ene Sprøjtning (Ph. Helt). Som Mod-sætning hertil skrives om det samme Middel fra Fyn, at det gennem-gaaende har givet et daarligt Resultat; nogle Frugtavlere har endda spurgt, om Skurven breder sig ved Anvendelse af dette Middel. Det til-føjes, at det daarlige Resultat muligvis kan ligge i, at Midlet er slemt til at bundfældes og derfor ikke er blevet rørt tilstrækkeligt op, før Op-blandingen med Vand er foretaget (R. Hansen). Fra Næstved skrives om det samme Middel, at det er blevet anvendt til anden Sommersprøjtning; Virkningen har været ret god, men der blev en Del Sprøjteskade paa Reinetter og Cox' Orange (M. E. Elting). Fra Hunstrup skrives, at der er anvendt Svovlkalk før Blomstringen og saa Sulsol to Gange efter Blomstringen. Med Undtagelse af et Sted, hvor der er særlig fugtigt, har Virkningen været tilfredsstillende. Der tilføjes dog, at der maaske bør bruges Bordeauxvædske til den første Sprøjtning og bør sprøjtes med Sulsol en eller to Gange mere (Chr. Greve).

Fra Midtjylland skrives, at Æbler, som d. 27. Maj var blevet sprøjtet med et Svovlmiddel, d. 15. Juni blev sprøjtet med 1 pCt. Apa Bordeauxcreme og derefter fik meget stærkt Bladfald paa de fleste Sorter, uden at der var nogen som helst synlig Virkning mod Skurven, der straks efter angreb saavel Blade som Frugter meget stærkt (Arne Pallesen).

I et Sprøjtningsforsøg ved Holsted, hvor der er sprøjtet med Abolin i 1. Uge af April og med Bordeauxvædske + Gift sidst i April og med 2 % Svovlkalk først i Maj og derefter 3 Gange med enten Hvid Bordeauxvædske, Svovlkalk, Pomarsol eller Sulsol eller pudret med Svovl, er Hvid Bordeauxvædske og de to Specialpræparater (Pomarsol og Sulsol) omtrent ens, medens Svovlkalk er ringere, og endnu ringere er Pudring (M. Sørensen).

Fra Hornum skrives, at Forsøgsstationens Træer praktisk talt har været fri for Skurv ved Anvendelse af Standardsprøjtning, idet der før Blomstringen kun er sprøjtet een Gang, nemlig med Svovlkalk. I en nærliggende større Frugtplantage har der derimod været stærke Skurvangreb, især paa Bramley, ved Anvendelse af samme Sprøjtninger, der er gennemført paa samme Tid og i begge Tilfælde med Motorsprøjte. Man regner med til næste Aar at ville anvende 1 % Bordeauxvædske før Blomstringen (Hakon Sørensen).

I Maribo Amt har hverken $\frac{3}{4}$ % Pomarsol eller $\frac{1}{2}$ % Sulsol eller 2 % Svovlkalk kunnet holde Skurven nede (Georg Jensen).

Fra Horsens meldes, at Kobberkalk lige efter Blomstringen har faaet Bladene til at falde fuldstændigt paa Cox' Orange, og at det i det hele taget er meget risikabelt at anvende, og at det samme i Almindelighed kan siges om Calciumarsenat (Chr. A. Nørholm). I Mod-sætning hertil

berettes fra Jelling, at Kobbekalk, 300—400 g til 100 Liter, er anvendt til Sommersprøjtning af Æbler sammen med Sprøjtning af Kartoffler henimod Midten af Juli og først i August paa flere forskellige Sorter, uden at der er set nogen Skadevirkning. Skurven blev ikke effektivt bekæmpet, men det tilskrives Skurvens tidlige Forekomst og Vanskelighederne ved de første Sprøjtninger (K. M. Hove).

Fra Flakkebjerg meldes, at Kobberkalk før Blomstringen, ja endnu medens Blomsterknopperne sad i tæt Klynge, har bevirket, at en Del Frugter har faaet saa megen skrubben Hud, at de maatte i 2. Sortering, men Behandlingen har lagt en god Bund for Skurbekæmpelsen (Agnes Værløse). Fra Fyns Stift skrives, at baade Kobberkalk og Calciumarsenat mange Steder har forvoldt Sprøjteskade og Bladfald paa flere Sorter (R. Hansen).

Priksyge i Æbler synes ikke at være fremtrædende i Aar, omend den som sædvanligt kan findes paa store Æbler fra unge, kraftigt voksende Træer. Som angrebne nævnes: Lord Suffield, Husmoder, Signe Tillisch, Rød Ananas, Beauty of Kent og især Venus og Tyrrestrup.

Glasæbler er sjældne i Aar.

Sten i Pærer har ødelagt mange Pærer, især Grev Moltke i Privathaver. Naar Pæerne langt hyppigere er stenede i Privathaver end i Frugtplantager, skyldes det formentligt, at Vækstforholdene ofte er daarligere i Privathaver, en stor Del af Rødderne vokser under Græs, Gange el. lign. En medvirkende Aarsag er det maaske ogsaa, at Træerne i Privathaver sandsynligvis ofte er Dværgtræer.

Hindbær-Stængelsyge (*Didymella applanata*). Fra Jylland skrives, at baade svage og stærke Angreb er almindelige (N. Gram).

KØKKENURTER.

Selleri-Bladpletsyge (*Septoria apii*) har været almindelig og ofte alvorlig. Fra Hornum skrives: »Optræder pletvis uden Hensyn til Sprøjtning« (Hakon Sørensen). Fra forskellige Steder i Jylland meldes: »Har meget vekslende Udbredelse. Der synes at være Sammenhæng mellem Sygdommen og Ernæringspletter i Jorden; mange Steder kommer Sygdommen vistnok, fordi Planterne i Forvejen er daarlige af Bormangel, Kvælstofmangel, for lav Reaktion el. lign.« (Lars Hansen). Fra Sjælland skrives, at stærke Angreb er almindelige, hvor der ikke er sprøjtet i Tide. Det spiller ogsaa en Rolle med Gødningen — paa stærkt kaligødet Jord skal der bruges meget Kvælstof for at holde Væksten vedlige, saa Svampen ikke faar Overhaand (A. Klougart). Paa Esbjerg-Vareegnen er Angrebene ikke alene lige saa udbredte som sædvanlig, men kraftigere og breder sig hurtigere. Angrebene findes ofte »egnssvis«, saa Tanken henledes paa Sortsspørgsmaalet og Frøets Kvalitet (M. Sørensen). I en Have i Jelling er Sygdommen værre paa Blegselleri end paa Knoldselleri (K. M. Hove). Paa Spangsbjerg Forsøgsstation har Sygdommen bredt sig en Del, særlig i Oktober, der er særdeles gode Udslag for Sprøjtning (Edv. Christiansen). I Svendborg Amt er Sygdommen ret almindelig og har hærget slemt i mange Haver (Hans Larsen).

Baade fra Gisselfeld og Slagelse-Skælskøregnen skrives om stærke

Angreb, men Betydningen af de friske Blade, som Planterne har skudt i det milde Vejr, fremhæves (H. Wedege, Agnes Værløse); ogsaa fra Holbækegnen og Københavns Omegn skrives om alvorlige Angreb (Henrik Nielsen, Alfr. Rasmussen).

Storknoldet Bægersvamp (*Sclerotinia sclerotiorum*) har vanskeliggjort Opbevaringen af Julesalat, som fra Marken har slemme Angreb af Svampen med Hvileknolde (A. Klougart).

PRYDPLANTER.

Rodhalsraad har været alvorlig paa unge Planter af Stedmoder i gamle Gartnerier, hvor der har været dyrket Viola-Arter i mange Aar. Det er tydeligt at se, at hvor Jorden er frisk, er Angrebet uden Betydning. Det er slemt saa mange Steder, at man maa frygte Mangel paa Stedmoder til Foraaret (A. Klougart).

Meldug (*Oidium begoniae* og *O. chrysanthemi*) er mange Steder alvorlig paa Begonia og Chrysanthemum (Lars Hansen).

ANNA WEBER.

SKADEDYR PAA LANDBRUGSPLANTER. KORN OG GRÆSSER.

Fritfluellarver (*Oscinis frit*) i Vintersæd. Fra Sjælland foreligger 2, fra Jylland 2, fra Lolland-Falster 2 og fra Bornholm 1 Meddelelse om stærke Angreb, der i nogle Tilfælde menes at ville nødvendiggøre hel eller delvis Omsaaning. Sen Pløjning af Grønjorden fremhæves som Aarsag til Angrebet.

Agersnegle se Diverse.

Gulspurv (*Emberiza citrinella*). Fra Abed skrives: »Disse Fugle har været usædvanlig talrige her og har sat sine Spor i Plantebestanden i Hvedemarken. Selv om jeg mener, at Sæden har været godt dækket, har de alligevel været i Stand til at faa den pillet op. Overalt i Marken ligger der »Hvedeklid«. Fuglene æder nemlig kun den indvendige Del af Kærnen og lader Skallen ligge« (E. Vestergaard).

Markmus se Diverse.

BEDER.

Roeaal (*Heterodera Schachtii*). Fra Maribo skrives om et stærkt Angreb i en Mark, hvor der var dyrket Sukkerroer 8 Aar i Træk. Smitten var sikkert kommet fra et Vandløb, der førte Spildevand fra Fabrikken.

Bedefluellarver (*Pegomyia hyoscyami*). Fra S. V.-Himmerland skrives, at Bedetoppen i næsten alle Marker er mere eller mindre ødelagt af Bedefluellarver. Dette i Forbindelse med Næringsmangel, Virus-Gulst, Lyspletsyge og Tørforraadnelse har bevirket, at Toppens Værdi til Ensilage bliver tvivlsom (Th. Kristensen).

Markmus se Diverse.

KORSBLOMSTREDE.

Krusesygegalmyg (*Contarinia nasturtii*). Fra Haderslev (Fr. Nielsen) og Samsø (P. Riis Vestergaard) skrives om iøjnefaldende Angreb. De øvrige Indberetninger melder om svage Angreb uden større Skadevirkning.

Kaalfluelarver (*Chorthophila floralis*). Fra Jylland foreligger 9 Indberetninger om alvorlige, sene Angreb, der sikkert fortrinsvis skyldes Arten *Ch. floralis*. Fra Holsted skrives om enkelte slemme Angreb (A. Dam Kofoed). Fra Studsgaard meldes, at praktisk talt alle Kaalroerne er mineret i Roelegemets nederste Del (N. A. Drewsen). Ogsaa ved Skjern er fundet Angreb af Betydning (G. Foldager). Om alvorlige Angreb skrives fra Himmerland (O. K. Toudal, Th. Kristensen), Aulum (S. Nørlund Christensen), Kjær Herred (N. Engvang Hansen) og Tylstrup (Sv. Svendsen).

Markmus se Diverse.

FRUGTTRÆER.

Frugtræspindemiden (*Paratetranychus pilosus*). Angrebene har talrige Steder bredt sig stærkt i Efteraarets Løb, og det fremhæves ofte, at der er lagt mange Vinteræg paa Grenene. Fra Gisselfeld skrives saaledes: »Rødt Spind synes mange Steder at brede sig foruroligende« (H. Wedege). Fra Svendborg: »Har stadig bredt sig i de sidste Par Maaned« (H. Larsen). Ogsaa fra andre Lokalteter paa Sjælland og i Jylland meldes om stærke Angreb. Nogle Beretninger (Esbjerg, Hornum) karakteriserer dog Angrebene som svage og uden større Betydning.

KØKKENURTER.

Rodaal se Diverse.

Gulerodsfluen (*Psila rosae*). Fra Jylland skrives: »Angrebene er slemme i Aar, ogsaa i Markgulerødder« (N. Gram).

Løgmider (*Rhizoglyphus echinopus*). Fra Nr. Broby: »I et Parti Skallotter med en hel Del bløde, raadnende Løg var de bløde Løg vrimlende fulde af de smaa, klare Mider. Løgstykket havde været gødet stærkt med Kvælstof og havde som Følge heraf udviklet en meget kraftig Top, der faldt meget sent. Dette har rimeligvis disponeret for Angreb af Løgskimmel, der atter har banet Vej for Miderne« (H. Larsen).

PRYDPLANTER.

Rodaal se Diverse.

Springhaler (*Isotomurus sp.*). Ved Ordrup blev smaa Frøplanter af *Thuja occidentalis* angrebet af Springhaler, der skrællede Barken af Stængelen med det Resultat, at Planterne visnede i stor Udstrækning. Dyrene dræbtes ved Vanding med Forbiat (1 pCt.) (A. Klougart).

DIVERSE.

Rodaal (*Heterodera radicicola*). Fra Kastrup indsendtes Gulerødder med Angreb af Rodaal. Ved Vejle fandtes et stærkt Angreb paa *Chrysanthemum uliginosum* paa Friland. Planterne var stærkt svækkede (Lars Hansen).

Smælderlarver (*Agriotes spp.*). Fra Præstø skrives om et ondartet Angreb paa Kaalroer til Frø (B. Munch). Fra Morsø (Engelhart Jensen) og S. V.-Himmerland (Th. Kristensen) meldes om betydelige Angreb paa Spisekartofler.

Agersnegle (*Agriolimax agrestis*) har en Del Steder optraadt ondartet i Vintersæd, ligesom de har begnavet Kaal, Lucerne, Rødkløver m. m. Fra Aarhus skrives: »Enkelte, meget heftige Angreb. Et Sted blev Rugen fuldstændig afgnavet, efterhaanden som Sneglene kom frem. Angrebet begyndte fra den ene Side af Marken. I Naboskiftet havde der Aaret forud været Rug« (Jørg. M. Pedersen). Fra Aarhus: »En Mark paa ca. 1 Td. Land blev 1 Uge efter, at Rugen var kommet op, fuldstændig afgnavet« (A. Diederich). Ogsaa fra Aulum og Rødding skrives om alvorlige Angreb paa Rug (S. Nørlund Christensen, E. Boesen).

Markmus (*Arvicola agrestis*). Fra Aarhusegnen skrives: »Markmusen har i Efteraaret anrettet hidtil ukendte Ødelæggelser, idet de flere Steder har afædt store Pletter i Vintersædsmarkerne og andre Steder har anrettet betydelige Ødelæggelser i Nyudlæg af Kløvergræs. Efter Udlæg af Strykninhvede er fundet et betydeligt Antal døde Mus« (A. Diederich). Fra samme Egn meldes om yderligere Skade i Græsmarkerne (J. M. Pedersen). Fra Aalborg skrives om Skade paa Frøet af sent indkørt Hør (J. Vang). I Sønderjylland har Markmus (antagelig *Arvicola arvalis*) ogsaa gjort stor Skade. Fra Skærbæk skrives, at 3—4 pCt. af Kaalroerne er helt udhulet (Aa. Buchreitz). Ved Haderslev ødelægges Græsmarkerne i stor Udstrækning, og Musene er saa talrige, at det anses for haabløst at udlægge Gift (Fr. Nielsen). Fra Tystofte skrives om voldsomme Angreb paa Sukkerroer (J. Wested), og ved Sorø blev ca. $\frac{1}{10}$ af Bederoerne i Kulerne begnavet i Hjerteskuddene (O. Møller Larsen). Det maa erindres, at der i saadanne Tilfælde ogsaa kan være Tale om andre Musearter.

PROSPER BOVIEN.

