

Oversigt over Plantesygdomme.

267. — Vintermaanederne og April 1944.

Der er for Vintermaanederne og April indkommet Beretninger fra 80 Medarbejdere; endvidere er der i Maanederne Januar—April incl. besvaret 967 Forespørgsler.

Lufttemperaturen laa i April et Par Grader over Normalen paa nær Maanedens første Uge, hvor Temperaturen blev 3 à 4 Grader under Normalen; Maanedens højeste Temperaturer var i Ugen 22.—29. paa 8 à 9° C. Nattefrost forekom flere Steder i Maanedens Løb, men især omkring Maanedens Midte.

Nedbøren i April maalttes i de fleste Landsdele til ca. Halvdelen af Normalen med Undtagelse af Nordøstsjælland og Bornholm; de største Nedbørsmængder faldt i Ugen 15.—22. For de forskellige Landsdele blev Nedbøren i Tiden 1.—29. i mm følgende med Normalen i (): Vendsyssel 20 (40), Vestjylland 24 (40), Midtjylland 27 (41), Østjylland 31 (42), Sydjylland 34 (41), Sønderjylland 36 (43), Fyn 34 (39), Midt- og Vestsjælland 23 (36), Nordøstsjælland 19 (40), Sydøstsjælland og Møn 21 (37), Lolland og Falster 22 (37) og Bornholm 12 (36).

SYGDOMME PAA LANDBRUGSPLANTER. KORN.

Rug og Hvede synes at have overvintret udmærket overalt i Landet, omend der hist og her blev iagttaget nogen Udvintring af Hvede paa lave Arealer (A. Juel-Nielsen, Rønne), samt ved sent saaet Rug og Hvede (Mogens Hansen, Toftlund). Paa Samsø iagttoges enkelte Steder: »at Rug efter god Spiring og normal Udvikling i Efteraaret nedvisnede totalt, uden at det har været muligt at faa Aarsagen forklaret. Sygdomsbilledet mindede om Lyspletsyge, men Undersøgelse af Jordprøver gjorde ikke i alle Tilfælde denne Aarsag sandsynlig« (P. Riis Vestergaard).

Manganmangel, Lyspletsyge, blev iagttaget hos Rug i flere Egne og i Forbindelse dermed Udvintring (S. Nørlund Christensen, Au-

lum; K. Bank, Ulfborg); i et enkelt Tilfælde fandtes saadanne syge Pletter i Marken allerede 5. Marts (A. Pedersen, Varde).

Paa Møn blev undersøgt en Rugmark med stærkt Angreb af Svampen *Ascochyta graminicola*, hvor Rugens Yderblade var graa og med mange døde Blade allerede fra Efteraaret; Marken, hvis Forfrugt var Gul Sennep, blev isaaet Byg. En anden Rugmark i umiddelbar Nærhed af den ødelagte og med Forfrugt Sukkerroer havde normal Plantebestand. Paa Stevns fandtes et lignende meget stærkt Angreb af ovennævnte Svamp, og kun faa Planter stod med enkelte Blade i oprejst Stilling, ellers laa Bladene tæt til Jorden mere eller mindre visne. Marken viste i Foraaret 1943 stærk Fosforsyremangel (Ft: 2.1, 1.2, 1.2 og 5 Prøver paa 0.6—0.8).

Sneskimmel (*Fusarium minimum*) synes at have været uden Betydning.

Spiring hos Vaarsæd synes at være god i alle Egne paa nær enkelte Undtagelser, der især gjaldt Havre (P. Grøntved, Næstved; Johs. Johansen, Store Heddinge; O. Ruby, Kolding, og Engelhart Jensen, Mors).

Skade ved Jordfygning i Stormdagene omkring 22. til 28. April nævnes fra flere Steder, hvor Vaarsæd, Ærter og Lupiner led betydelig Skade (A. Pedersen, Varde; K. Bank, Ulfborg; N. Engvang Hansen, Vester Hassing og Rs. E. Rasmussen, Saxkøbing).

BÆLGPLANTER.

Overvintring var tilsyneladende god for Flertallet af Bælgplanterne, men adskillige eetaarige Lucernemarker (Udlæg 1943) udvintrede flere Steder af en eller anden Aarsag, »dog er det gaaet stærkt ud over den italienske Lucerne, der er saaet 1943. I Efteraaret stod Lucernen godt, men mange Marker ser nu meget sløje ud« (O. Ruby, Kolding), »at Nyudlæg af Lucerne, der sidste Efteraar stod meget kraftigt, ikke har klaret sig saa godt, som Nyudlæg, der blev afpudset sent, men med lang Stub. — Aarsagerne hertil kan vel være forskellige« (Erik Boesen, Rødding), »i den sidste Tid fældet Dødsdom over ikke saa helt faa 1. Aars Lucernemarker, der af ukendte Aarsager har staaet med en altfor daarlig Plantebestand« (J. Jeppesen Jensen, Odense), og i Ringstedegnen blev iagttaget flere saadanne daarlige Marker (Chr. M. Bundgaard, Ringsted). Det bør mærkes, at Udvintring af Lucerne ikke er almindelig, og at Frost sandsynligvis ikke er Aarsagen, thi selv under særdeles strenge Vintre i 1940, 1941 og 1942 klarede eetaarige Lucernemarker sig godt i Forhold til f. Eks. Rødkløver, ja, det blev den Gang fremhævet, at Lucernen overvintrede fortræffeligt. Der maa være andre Aarsager til denne Udvintring, og det er ikke usandsynligt, at disse maa søges i Frøets Avlssted samt vel i adskillige Tilfælde i den almindelige Mangel paa Gødning.

Kløverens Bægersvamp (*Sclerotinia trifoliorum*). I flere Egne blev iagttaget stærkt, undertiden ødelæggende Angreb, der stedse synes

at være hyppigst i Rødkløver til Frø og fortrinsvis, hvor Kløveren var saadet med Afstand, medens Angrebene var svage, hvor Saaning var sket med alle Maskinens Tragte. Svampen synes tillige navnlig at optræde egnsvis, hvilket maaske kan forklares ved, at den har særligt gode Kaar i Egne, hvor Frøavl er almindelig, men der nævnes dog flere Tilfælde, hvor Frømarken er stærkt angrebet, medens Angreb er svage i Græsmarken. »Mellem en Trediedel til Halvdelen af Marker til Frø er nok pløjet« (Johs. Johansen, Store Heddinge), »flere Steder er Frømarkerne pløjet, og mange andre Steder er Bestanden daarlig« (A. Jørgensen, Korkendrup). »Det har flere Steder været iøjnefaldende, at lave Arealer, Nordskraaninger eller Arealer med Fald mod Nord har været stærkt angrebne og i nogle Tilfælde maatte pløjes, medens Bakketoppe eller Arealer med Fald mod Syd, Sydpøst eller Sydvest havde langt svagere Angreb« (M. Greve, Roskilde). Iagttagelser om Afgræsningens Indflydelse paa Angrebets Styrke var ret forskellige: »I et Tilfælde var Halvdelen af Marken afgræsset, og her stod Kløveren godt, i den anden Halvdel var ikke foretaget Afgræsning, og her maatte Marken delvis pløjes« (K. M. Nielsen, Roskilde). »Det synes, som om ret sen Afgræsning intet har hjulpet« (H. Rasmussen, Roskilde), »paa en Mark, hvor der paa en Stribe havde været stærk Kørsel, og Kløveren derfor uden Blade af Betydning, var Overvintringen betydelig bedre, end hvor der ikke havde været kørt« (B. Munch, Haslev). I mange Egne var Angrebet kun svagt, og Frømarken havde en god Plantebestand, selv om denne var tyndet en Del ved Svampens Angreb.

I Græsmarkerne synes Svampens Angreb at have været svagt. Af 59 Beretninger omtales ret stærke Angreb i 5, svage Angreb i 28, og i 26 Beretninger blev Angrebet ikke iagttaget eller skønnedes at være saa svagt, at det var uden Betydning. Enkelte stærke Angreb iagttoges nogle Steder (O. Møller Larsen, Sorø; Jørgen Jensen, Gørlev; Johs. Johansen, Store Heddinge og O. Ruby, Kolding). I det vestlige Vendsyssel fandtes mange stærke Angreb, og i et enkelt Tilfælde taltes 20 pCt. dræbte Planter, »hvilket Tal antageligt er for lille, da de af Bægersvampen dræbte Planter var helt forsvundet for et stort Antals Vedkommende« (O. Kirk Jacobsen, V. Hjermitslev).

BEDEROER.

Frostskade i Kulerne forekom næppe, dog nævnes, at i et enkelt Tilfælde havde Roerne nogen Frostskade, inden Kuling (F. Bek Pedersen, Hobro).

Forraadnelse iagttoges flere Steder i Kuler, hvor disse var for stærkt dækkede. Varmeskaden synes dog ikke at have haft stort Omfang, omend der nævnes nogle Tilfælde med stærke Angreb af Drueskimmel og ret stor Udbredelse af Tørforraadnelse; stærke Angreb af Drueskimmel eller, som den nu kaldes, Graaskimmel (*Botrytis cinerea*) konstateredes i nogle Egne (A. Diederich, Aarhus; P. Grøntved, Næstved). Det var ikke ualmindeligt, at Roerne spiredes stærkt i Kulerne.

Bormangel, Tørforraadnelse, blev konstateret paa indsendte Stiklingroer.

Bederust (*Uromyces betae*) iagttoges sidst i Maaneden paa Stiklingroer (Rs. E. Rasmussen, Saxkøbing).

KARTOFLER.

Frostskade synes ikke at have forekommet. Men Forraadnelse i Kulerne som Følge af Varmeskade, stærk Tørforraadnelse og Vaad Forraadnelse var ret udbredt og især under daarlige Opbevaringsforhold. Forraadnelsen foraarsagede dog som Helhed ikke store Tab, omend den i enkelte Tilfælde har været ret betydelig.

Indvendige Rustpletter fandtes i et lille Parti Up-to-Date, der var stærkt angrebet (Thorvald Kristensen, Skals).

GULERØDDER.

Nattefrost i April ødelagde flere Steder Marker med Karotter (H. Wraae-Jensen, Skelskør; K. Iversen, Klippinge), derimod ikke Foder-gulerødder.

INDUSTRIPLANTER.

VALMUE.

Storm sidst i April ødelagde totalt Kimplanterne i en Valmuemark paa Lolland; Planterne blev slidt op (Rs. E. Rasmussen, Saxkøbing).

HANS R. HANSEN.

SYGDOMME PAA HAVEBRUGSPLANTER.

Den milde Vinter har været gavnlig for mange Planter. Man har Lov at haabe, at mange af de Træer, som har været svækkede af de strenge Vintre, og som var begyndt at komme sig lidt efter den sidste ret milde Vinter, nu har haft saa godt af denne Vinter i Aar, at de vil kunne komme sig helt. Man maa dog regne med, at nogle frostsvækkede Træer, især Stenfrugttræer, vil gaa ud, fordi Bakteriekræft og Purpur Lædersvamp (Sølvglans) har faaet Indpas i de frostsvækkede Træer og efterhaanden dræber dem.

Vejret i Marts og først i April var haardt ved mange Planter; der klages saaledes fra Jylland over, at f. Eks. Jordbær og Stedmoder har taget megen Skade, og Frilandsspinnen er sat langt tilbage (Lars Hansen).

FRUGTTRÆER.

Æblernes Holdbarhed har gennemgaaende været ringe, omend der er Undtagelser. Mange Steder ved man intet om Æblernes Holdbarhed, fordi Æblerne har været udsolgt eller spist paa et tidligt Tidspunkt. I Vejle Amt har Æbler, som normalt holder sig til December—Januar,

holdt sig temmelig daarligt, medens sent modne og sent plukkede Æbler som Bramley, Boiken og Dumelow endnu ved Udgangen af April praktisk talt intet fejlede. Det paapeges, at en medvirkende Aarsag hertil maaske er det, at det i Aar sjældent er forekommet, at modne eller overmodne Æbler er blevet opbevaret sammen med de senere Sorter (P. Pedersen, Vejle). Iøvrigt skrives fra Slagelse-Skelskør, at der allevegne klages over, at Æblerne har holdt sig daarligt (Agnes Værløse). Fra store Dele af Sjælland meddeles, at naar man tager den tidlige Modenhed i Betragtning, har Holdbarheden været jævnt god (Asger Klougart). Opbevaringen er meget afhængig af Opbevaringsrummene, det har dog mange Steder knebet med at holde Æblerne i de sidste Maaneder (H. J. Rasmussen). Fra Holbæk Amt skrives, at gennemgaaende har Folk hele Vinteren klaget over Æblernes daarlige Holdbarhed; der menes, at dette i flere Tilfælde skyldes, at Folk ikke sidste Aar var opmærksomme paa, at Æblerne paa Grund af det tidlige Foraar og den dermed følgende lange Vækstperiode var tidligt plukkemodne, men fik plukket dem for sent (Henrik Nielsen). Paa Næstvedegnen har Ingrid Marie, Belle de Boskoop og Lyngbytorp holdt sig ret godt, alle andre Sorter daarligere end normalt. Bodil Neergaard har haft Tendens til Skold (M. E. Elting). Ved Gisselsfeld har det vist sig, at de store Æbler har haft en paaafaldende Tilbøjelighed til at modne meget tidligt, medens normalt store Æbler fra samme Træ har holdt sig godt i Kølehus ved 3° C (H. Wedege). Fra Sorø og Omegn skrives, at hvor Æblerne har været sprøjtet grundigt, har de holdt sig særdeles godt, endnu i April har der været fine Belle de Boskoop og Cox' Pomona (Ejner Jensen). Fra Skive skrives, at Æblerne har holdt sig ca. 1 Maaned kortere end ellers, dog er Boiken, Tønnesæble og Dumelow Seedling pæne endnu, Bramley er borte fra Markedet for en Maaned siden (J. C. Myrhøj).

Ved Hornum modnede Efteraars- og tidlige Vinteræbler en Maaned for tidligt, medens Foraarsæbler som Boiken og Belle de Boskoop o. lign. har holdt sig normalt (Hakon Sørensen). Ved Horsens har Æblerne i Almindelighed ikke holdt sig godt, men nogle Steder har de holdt sig udmærket, f. Eks. har smaa Pederstrup holdt sig udmærket til i Midten af April (Chr. A. Nørholm). Fra Sønderjylland karakteriseres Holdbarheden som knapt saa god som ellers (Arne Diemer) og som daarlig (M. Surlykke Petersen). Ved Spangsbjerg Forsøgsstation har Holdbarheden været ringere end sidste Aar (Edv. Christiansen). I en Privathave ved Aarhus, hvor Boiken var nedkulet i Tørvestrøelse i Jordkule, har de holdt sig godt, til de blev taget op først i April. Andre Steder har Belle de Boskoop og Dronning Louise o. lign. Sorter været pakket ned i Tørvestrøelse og holdt sig godt til i Marts (A. Gylling). Fra Blangstedgaard skrives, at Frugten i sig selv har haft en ganske almindelig Holdbarhed, men den ekstra milde Vinter har medført, at Salgstidspunktet er faldet relativt tidligt (N. Dullum). Fra Svendborg paapeges den store Indflydelse, Træernes Vækstforhold og Sundhedstilstand, Plukketiden og Opbevaringsforholdene har paa Holdbarheden. Der nævnes et Eksempel paa,

hvordan en Kasse hjemmeavlede, sent plukkede Belle de Boskoop har holdt sig udmærket, medens en Kasse indkøbte Frugter er svampede, sandsynligvis paa Grund af, at de har faaet for lidt Sol og er plukket for tidligt (Hans Larsen). Fra Koldingegnen med flere Steder skrives, at man mange Steder har maattet sælge Æblerne for tidligt, fordi de ikke kunde holde sig (Lars Hansen).

PRYDPLANTER.

I Jylland har der været ualmindelig stærkt Knopsvind i Hortensia, hvilket tilskrives det milde Efteraar og den fugtige Vinter, der har fremmet Angreb af Graaskimmel¹⁾ (*Botrytis cinerea*) og anden Forraadnelse i Knopperne (Lars Hansen).

Jordbær-Meldug (*Sphaerotheca macularis*) har i Jylland været meget stærk paa Jordbærkultur i Potte. Man kunde ikke finde en grøn eller en halvmoden Frugt uden, at den var overtrukket med »Vat« (Lars Hansen).

Bladpletsyge (*Coniothyrium hellebori*). Fra Sønderjylland skrives, at det er næsten sjældent at se sunde Juleroser (M. Surlykke Petersen).

Gulbakteriose (*Pseudomonas hyacinthi*) er fundet paa Hyacinter indsendt fra et Frøfirma paa Lolland.

Angaaende Løgvæksters Sygdomme og Udvikling skrives bl. a. følgende: »I de tidlige Tulipaner har der mange Steder i Jylland været alt for stort Svind, det skyldes utvivlsomt, at man fik Løgene for sent lagt og alligevel vilde drive dem til normal Tid. Maaske blev det noget forværret af det meget milde Vejr i Oktober-November, der ikke alene kan have haft en uheldig Indflydelse paa de Løg, der var længe undervejs, men maaske tillige har været Aarsag til, at Jordtemperaturen har været for høj, den ganske vist forholdsvis korte Tid, Løgene laa i Kulerne. De hollandske Løg, som kom hjem i god Tid, og som sammen med de danske blev lagt rettidigt, har der vistnok ikke været noget i Vejen med, i alt Fald ikke mere end normalt. Det er utvivlsomt store Tab, der er lidt ved, at Løgene er kommet for sent hjem« (Lars Hansen). Fra Sjælland skrives: »De hollandske Løg var ikke gode alle Steder, formentlig paa Grund af for sen Lægning. De senere Tulipaner fik en god Udvikling. Det milde Vejr medførte, at man var tvungen til ofte at drive, før man havde planlagt« (Asger Klougart). Ved Gisselfeld drev det første Hold Tulipaner meget langsomt, og hos Sorten »Red Star« var der en Tilbøjelighed til, at et af Kronbladene knækkede midt over

¹⁾ Vi er gaaet over til at kalde Drueskimmel for Graaskimmel, thi det karakteristiske for denne Svamp er, at den danner en graa, laadden Belægning paa de angrebne Plantedele. Det, at Knopcellerne sidder samlede i Drueklaser, og som har givet Svampen Navnet, er kun synligt under Mikroskop, og dens Forekomst paa Druer er af underordnet Betydning i Forhold til dens Forekomst paa mange andre Planter. Ved at kalde den Graaskimmel, er Navnet bragt i Overensstemmelse baade med det norske og det svenske Navn.

hos 10—15 pCt. af Blomsterne; det var importerede Løg (H. Wedege). Fra Spangsbjerg Forsøgsstation skrives, at Tulipaner i Bænk til Drivning ser meget sunde og kraftige ud. Paa Friland har Bestanden overvintret godt, og ser sund og kraftig ud (Edv. Christiansen). Der skrives fra flere Steder, at de forskellige Frilandsløg er gode, det ser f. Eks. ud til, at Paaske- og Pinseliljer, der var saa svækkede af de strenge Frostvintre, nu er ved at komme sig.

Tulipan-Graaskimmel (*Botrytis tulipae*). Se om Ændringen af Navnet Drueskimmel til Graaskimmel Side 6. Fra Aarhus skrives, at der nu i den sidste Tid er iagttaget mange Angreb af Graaskimmel paa Tulipaner i Privathaver (A. Gylling). Ved Hornum er ikke set særlige Angreb af Graaskimmelen (Hakon Sørensen). I Jylland har der været en Del Klage over, at Blomsterne paa de drevne Løg har været plettede af Graaskimmel (Lars Hansen).

Tulipan-Rodfiltsvamp (*Rhizoctonia tuliparum*) har vist sig nogle Steder, særlig i ældre Gartnerier (Asger Klougart).

Vintergæk-Graaskimmel (*Botrytis galanthina*) fandtes ved Vordingborg i Begyndelsen af Marts (H. J. Rasmussen).

ANNA WEBER.

SKADEDYR PAA LAND- OG HAVEBRUGSPANTER. KORN OG GRÆSSER.

Smælderlarver se Diverse.

Stankelbenlarver (*Tipula paludosa*). Der foreligger fra Jylland 7 Indberetninger om betydelige og 3 om svage Angreb. Fra Skærbæk skrives om voldsomme Angreb i Havre efter Grønjord (Aa. Buchreit) ogsaa fra Rødding, Grindsted, Varde, Brande og Aulum meldes om kraftige Angreb fortrinsvis i Vaarsæd. Fra Øerne foreligger ingen Indberetninger om Angreb.

Haarmyglarver (*Bibionidae*). Fra Korkendrup paa Fyn skrives, at Haarmyglarver (*Bibio*) efter nogle Aars Pause igen er optraadt nogle Steder i Byg efter Roer (A. Jørgensen). Et ret alvorligt Angreb fandtes paa Endelave i den Del af en Bygmark, hvor Staldgødning til Roer i 1943 var udkørt i Maj (Aksel Nielsen). For første Gang saas et lignende Angreb paa Skelskøregnen (H. Wraae-Jensen).

Angreb af Arten *Dilophus vulgaris* er rapporteret fra Bramminge. Det forekom i Korn (efter Grønjord?) (K. Jakobsen).

Brakfluen (*Hylemyia coarctata*). Kun betydningsløse Angreb er set.

Fritfluellarver (*Oscinis frit*). Fra Bornholm skrives: »Af 10 Tdr. Land Hvede efter Engsvingel til Frø maatte de 8 Tdr. Land ompløjes, men Smælderlarver var ogsaa medvirkende til Ødelæggelsen« (A. Juel-Nielsen). Fra Grindsted skrives om et ret kraftigt Angreb i Rug efter Sneglebælg (J. J. Jakobsen). Ogsaa paa Roskildeegnen har Fritfluellarver gjort Skade i Forbindelse med Mus og Smælderlarver (M. Greve).

Markmus se Diverse.

Kløveraal (*Tylenchus dipsaci*). Ved Kolding fandtes et stærkt Angreb i en Mark, hvor Kløver og Lucerne var saaet i Blanding. Ogsaa Lucernen var angrebet (O. Ruby). Dette behøver dog ingenlunde at betyde, at der har fundet Smitte Sted fra Kløver til Lucerne eller omvendt.

KORSBLOMSTREDE.

Jordlopper (*Phyllotreta spp.*). Fra Lolland-Falster skrives, at Jordlopperne d. 15. April raserede 1.5 ha Kaalroer ved Saxkøbing. Senere har Vejret hemmet Angrebets Udvikling (Rs. E. Rasmussen).

FRUGTTRÆER OG FRUGTBUSKE.

Bladlus (*Aphididae*). Det meddeles, at de første Bladlus var klækket ved Sundeved d. 12. April og ved Feldborg d. 20. April. Op til 50 Lus saas paa een Æbleknop. Der var mange Mariehøns fremme (N. Gram). Usædvanlig mange Mariehøns saas ogsaa ved Spangsbjerg (E. Christianen). Ogsaa fra Vejle (P. Pedersen) og Ærø (H. Larsen) skrives om talrig Forekomst af Bladlus paa Æbletræerne.

Pæregalmyg (*Contarinia pyrivora*) klækkedes ved Lyngby fra d. 28. April. Myggene kom frem i meget stort Antal.

Solbærmider (*Eriophyes ribis*). Der er indløbet adskillige Meddelelser om stærke Angreb paa Solbærbuskene.

Markmus se Diverse.

Mosegris se Diverse.

PRYDPLANTER.

Narcisaal (*Tylenchus dipsaci*). Fra Fyen (Chr. Fich) indsendtes en Prøve Narcisløg, der var stærkt angrebne af Aal.

Chrysanthemumgalmyg (*Diarthronomyia chrysanthemi*). Et Angreb rapporteredes fra Holbæk.

Narcisfluer (*Eumerus sp.*). Ved Gisselfeld var hjemmeavlede Narcisser af Sorten »Bicolor Victoria« temmelig medtaget af Angreb af Narcisfluer (H. Wedege).

DIVERSE SKADEDYR.

Smælderlarver (*Agriotes sp.*). Fra Sorø skrives om et stærkt Angreb i Jordbær udplantet i August 1943 (E. Jensen). Ved Sorø fandtes Angreb paa Kartofler og Byg i samme Mark (O. Møller Larsen). Ved Skærbæk er set et Par stærke Angreb i Vaarsæd (A. Buchreitz).

Graaspurve (*Passer domesticus*). Paa Slagelse-Skelskøregnen har Spurvene været slemme ved Frugtbuskene, navnlig Ribs staar mange Steder ganske uden Knopper (Agnes Værløse).

Mosegrise (*Arvicola amphibius*). Fra Ringsted skrives, at de ligesom Musene optræder i stor Stil og gør Skade i Frugtplantager (Chr. M. Bundgaard). Ogsaa andre Meddelelser om Skade foreligger.

Markmus (*Arvicola arvensis*). Fra Aarhus skrives: »Musene har Vinteren igennem fortsat Ødelæggelserne i Vintersædsmarker, Lucerne-marker og Græsmarker. Skaden er mange Steder af alvorlig Karakter, Mus er absolut det værste Skadedyr her paa Egnen i Aar« (J. Pedersen). Fra Ringstedegnen skrives om stor Skade i Vintersæd, Frøgræsmarker og Kløverfrømarker (C. M. Bundgaard). Ogsaa fra Tofthund, Kolding, Vestfyn m. m. meldes om alvorlig Skade. Lucerneknopper synes Musene at holde meget af (Rs. E. Rasmussen). Ogsaa i Haverne har Musene gjort sig ufordelagtigt bemærket. Fra Aarhus skrives saaledes: »I en ældre Frugthave, hvor man i nogle Aar med godt Resultat har brugt Jorddækning med gammel Halm o. lign., uden at Mus har holdt til, har disse i Vinter gnavet stærkt i Barken« (N. Gram). Ved Lyngby gjorde Musene Skade i Drivbænke paa nylig udplantet Salat og fremspirende Gulerødder (H. Øhlens).

PROSPER BOVIEN.
