

Sorts- og stammeforsøg med efterårs- og vinterporre, 1957-60

Forsøgene er udført ved Virum og Blangstedgaard på henholdsvis lettere lermuldet jord og svær lerjord, samt ved Spangsbjerg og Hornum, der har god sandmuldet og lettere sandmuldet jord. I forsøgene har oprindeligt deltaget 20 sorter og stammer, men 3 er udgået i løbet af forsøgsperioden.

Da forsøgene har omfattet både efterårs- og vinterporre, er disse udført med en tidlig optagning omkring 15. september samt optagning omkring 1. december og efter overvintring på voksestedet.

Ved optagningen er rødderne afpudset til ca. 2 cm, visne blade fjernet, og der er foretaget en let topafpudsning, planterne er derefter sorteret i: 1. I sortering (skaftet mindst 16 cm langt og 25 mm i diameter), 2. II sortering (skaftet mindst 8 cm langt og 20 mm i diameter), 3. Suppeporre og 4. Frasorterede (grenede, tynde, stokløbere og syge). Der er bestemt antal og vægt af hver sortering. Der er ligeledes foretaget følgende målinger på 2×50 planter: Plantens længde, skaftets længde og tykkelse, samt »løgets« tykkelse og givet karakterer for visse egenskaber af betydning for dyrkningsværdien.

Opgørelsen omfatter ialt 10 forsøg og resultaterne ses i omstående bilag.

For at få et samlet udtryk for de enkelte sorter og stammers dyrkningsværdi, er der opstillet en række pointsummer, som danner grundlaget for klassificeringen af stammerne. Ved udregningen af disse er der især lagt vægt på antallet af I sortering samt på karaktererne for ensartethed, fri for løgdannelse og værdi som handelsvare.

Navnene er af navneudvalget under Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter korrigeret og godkendt ved bedømmelser i marken.

Af de prøvede stammer er anerkendt 5 efterårssporrer. Disse er samtidig blandt de bedste ved den tidlige optagning og vedføjles S 1960.

Til overvintring er anerkendt 4, som vedføjles S 1961.

Beskrivelse af stammerne

EFTERÅRSPORRE

Lbnr. 16. Gennevilliers, Ny Munkegaard S 1960. Ejer: Fa. J. E. Ohlsens Enke, København. Tidligere anerkendt som S 1949.

Kraftigvoksende med ret stive, smalle, frisk grønne blade. Skaftets længde 19.1 cm og tykkelse 3.1 cm med ret svagt udviklet løgformet basis. Den har givet det største antal I sortering ved både tidlig optagning og efterårsoptagning.

Lbnr. 11. Hafnia, Toftø S 1960. Ejer: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og Danske Landboforeningers Frøforsyning.

Kraftigvoksende med lidt bløde, ret smalle, nærmest lysegrønne blade. Skaftets længde er 17.1 cm og tykkelse 3.0 cm med svagt udviklet løgformet basis. Den har givet et stort antal I sortering både ved tidlig optagning og efterårsoptagning og har opnået høje karakterer ved efterårsoptagningen.

Lbnr. 2. Elefant, Hunderup S 1960. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt Odense. Tidligere anerkendt som S 1949.

Kraftigvoksende, noget opret, med lysegrønne, brede blade. Skaftets længde er 16.1 cm, tykkelse 3.0 med svagt udviklet løgformet basis. Den har givet et stort antal I sortering ved både tidlig optagning og efterårsoptagning og har opnået en høj pointsum ved tidlig optagning.

Lbnr. 10. Københavns Torve, Toftø S 1960. Ejer: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og Danske Landboforeningers Frøforsyning. Tidligere anerkendt som S 1949.

Noget kraftig vækst med ret stive, brede, grønne blade. Skaftets længde 16.2 cm, tykkelse 2.9 cm med meget svagt udviklet løgformet basis. Har givet et stort udbytte af I sortering, især ved efterårsoptagningen.

Lbnr. 13. Erda, Stensballe S 1960. Ejer: A/S Østergaards Frøavl, Stensballe, Horsens.

Ret kraftig vækst med lidt bløde, grønne til mørkegrønne, smalle blade. Skaftets længde er 17.2 cm og tykkelse 2.8 cm med noget udviklet løgformet basis. Har givet et stort antal I sortering ved både tidlig optagning og efterårsoptagning.

VINTERPORRE

Lbnr. 7. Siegfried, Toftø S 1961. Ejer: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og Danske Landboforeningers Frøforsyning. Tidligere anerkendt som S 1949.

Middelkraftig, lav, noget udbredt vækst med smalle, stive, meget mørkegrønne blade. Skaflets længde 14.3 cm og tykkelse 2.7 cm med ret svagt udviklet løgformet basis. Den er meget hårdfør og har givet det største antal I sortering efter overvintring på voksestedet.

Lbnr. 6. Siegfried, Clause S 1961. Ejer: L. Clause, Bretigny-Sur-Orge, Frankrig, repræsenteret ved M. Kock, Vejle.

Middelkraftig, lav, noget udbredt vækst med ret stive, smalle, mørkegrønne til blågrønne blade. Skaflets længde er 12.7 cm og tykkelse 2.8 cm med noget udviklet løgformet basis. Den er hårdfør, ret kortskaflet og har givet et ret beskedent antal I sortering, men et stort antal II sortering og har det største antal friske planter efter overvintring på voksestedet.

Lbnr. 5. Siegfried, Hunderup S 1961. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Odense.

Middelkraftig, lav, noget udbredt vækst med ret stive, smalle, mørkegrønne til blågrønne blade. Skaflets længde er 13.6 cm og tykkelse 2.9 cm med noget udviklet løgformet basis. Den er hårdfør og har givet et ret stort antal I sortering efter overvintring.

Lbnr. 18. Kong Vinter, Hunderup S 1961. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Odense.

Middelkraftig, lav, lidt udbredt vækst med noget bløde, ret brede, mørkegrønne til blågrønne blade. Skaflets længde 15.1 cm og tykkelse 3.0 cm med ret svagt udviklet løgformet basis. Den er hårdfør og har givet et stort antal I sortering efter overvintring på voksestedet. Efter antallet af I sortering ved efterårsoptagningen at dømme, er den noget tidligere udviklet end de øvrige vinterporrer.

Fodnote til oversigtstabel

I: 16 cm × 25 mm.

II: 8 cm × 20 mm.

1. (3 × I sort. ant. + II sort. ant.): 10.

2. (3 × I sort. ant. + II sort. ant.): 10 + karakter for topfarve + 5 × karakter for ensartethed + 5 × karakter for fri for løgdannelse + 5 × karakter for værdi som handelsvare.

3. (3 × I sort. ant. + II sort. ant.): 10 + 5 × karakter for værdi som handelsvare forår.

Sorts- og stammeforsøg med efterårs- og vinterporre, 1957-60. Gennemsnit af 10 forsøg. Antal og kg pr. a.

Sorts- og stammenavn	Tidlig optagning				Efterårsoptagning				Efter overvintring på voksestedet				Karakterer 0—10 (10 = bedst) efterårsoptagning								Pointsum		
	I ant.	II ant.	ialt		I ant.	II ant.	ialt		I ant.	II ant.	ialt		vækstkræft	topfarve	ensartethed	skaflets længde efter opt.	fri for lægdann.	værdi som handelsvare	værdi som handelsvare forår	tidlig optagning ¹	efterårsopt. ²	overvintring på voksestedet ³	
			ant.	kg			ant.	kg			ant.	kg											
16. Gennevilliers, Ny Munkegaard S 1960	438	528	1214	214	765	325	1232	294	129	276	556	65	7	7	7	9	7	7	4	184	374	86	
11. Hafnia, Toftø S 1960	401	512	1162	228	619	384	1156	278	133	308	625	73	7	6	8	8	8	8	3	172	350	86	
2. Elefant, Hunderup S 1960 ...	401	601	1191	243	643	424	1225	313	169	396	751	100	7	6	6	7	8	7	4	180	346	110	
10. Kbhvs. Torve, Toftø S 1960	346	578	1181	224	618	386	1162	283	133	327	666	81	8	7	7	7	8	7	4	162	341	93	
13. Erda, Stensballe S 1960	334	603	1253	219	583	489	1240	275	88	349	696	69	7	7	7	7	5	7	5	161	326	86	
7. Siegfried, Toftø S 1961	204	658	1211	193	394	560	1172	235	189	524	983	116	6	8	7	6	7	6	8	127	282	149	
6. Siegfried, Clause S 1961	145	832	1241	205	258	783	1234	248	79	747	1078	129	6	8	7	4	5	4	8	127	244	138	
5. Siegfried, Hunderup S 1961	219	674	1168	205	308	655	1204	254	120	575	963	116	6	8	7	5	6	5	6	133	256	124	
18. Kong Vinter, Hunderup S 1961	200	648	1143	186	454	542	1203	259	145	441	845	101	6	8	8	6	7	7	7	125	308	123	
12.	346	490	1122	207	598	358	1122	250	146	261	611	70	7	6	6	7	7	7	4	153	321	90	
3.	367	639	1214	239	519	500	1199	284	86	441	745	88	8	7	6	6	8	6	5	174	313	95	
17.	300	602	1225	197	563	470	1226	268	96	362	713	75	6	7	6	7	6	6	6	150	313	95	
14.	304	620	1235	209	540	480	1207	262	97	380	752	77	7	7	7	7	6	6	5	153	312	92	
15.	293	445	1122	172	519	339	1090	220	31	139	302	27	7	7	7	9	7	5	2	132	292	33	
8.	243	681	1205	221	431	577	1187	269	93	509	819	95	6	7	6	5	7	6	5	141	289	104	
4.	212	744	1187	233	364	700	1235	283	47	607	869	100	7	6	6	5	7	5	4	138	275	95	
1.	181	812	1244	240	352	735	1236	290	85	634	957	118	7	7	6	5	6	5	5	136	271	114	
Gennemsnit	290	627	1195	214	502	512	1196	269	110	428	761	88											