

Sorter af blomkål

Varieties of cauliflower

GITTE KJELDSSEN

Resumé

I 1989-90 blev der afprøvet sorter af tidlige, højsommer og efterårs blomkål (*Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*). Der deltog 12 tidlige sorter af blomkål, med og uden netdækning (hold I), 14 sorter af højsommer blomkål (hold II), samt 13 sorter af efterårsblomkål (hold III) i sortsafprøvningen.

Sorterne blev høstet efter tjenlighed, vejjet, størrelses- og kvalitetssorteret. Kvalitetsfejlene blev registreret.

Ud fra sortsafprøvningen er det muligt at finde egnede sorter til dyrkning under danske forhold hele sæsonen (maj-november).

Nøgleord: Blomkål, sorter, *Brassica oleracea*, tidlig, højsommer, efterår, netdækning, tidlighed, kvalitet, dyrkningsværdi.

Summary

In 1989 and 1990 varieties of early, summer, and autumn cauliflower (*Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*) were tested.

12 early varieties (experiment I) were compared covered with plastic net and uncovered. 14 varieties of summer cauliflower (experiment II) were compared, and 13 varieties of autumn cauliflower (experiment III) were compared.

The curds were cut at maturity and graded according to size, and quality. Any defects occurring were noted.

The range of the varieties makes it possible to select cauliflower varieties of high quality from May to November.

Key words: Cauliflower, varieties, *Brassica oleracea*, early, summer, autumn, covering, maturity, quality, growing value.