

221. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg.

1. Meddelelse fra
**KANINKONTROLSTATIONEN
PAA FAVRHOLM**
1944—45

Af

Johs. Jespersen og Sv. Hoffman Hansen.



1946

KØBENHAVN

221. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg.

1. Meddelelse fra KANINKONTROLSTATIONEN PAA FAVRHOLM 1944—45

Af

Johs. Jespersen og Sv. Hoffman Hansen.

Kontrolstationens Bygning og Indretning.

Af

H. G. Skovgaard.



I Kommission hos Ejvind Christensens Forlag,
Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1946

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallesø, *Formand*,
Gaardejer *P. M. Pedersen*, Skjerring, Mørke,
valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.
Konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,
Parcellist *Sofus Jensen*, Atterup, Grevinge,
valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.
Forstander *L. Lauridsen*, Graasten, *Næstformand*,
valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby, Sporup,
valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.
Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,
valgt af Statens Fjerkræudvalg.
Udvalgets Sekretær: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. agro. *Aage Lund*,
— cand. polyt. *I. G. Hansen*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,
— Landbrugskandidat, Dr. agro. *V. Steensberg*,
Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m. m.:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,
— Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,
— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*.
Statens Foderstofkontrol:
Inspektør: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*,
Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Harald M. Petersen*.

Kontor og Sekretariat

Leder: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*,
Bogholder: *A. Lindahl*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.

Til

Statens Husdyrbrugsudvalg!

Undertegnede fremsender hermed en Beretning vedrørende Kaninkontrolstationen paa Favrholt og forespørger, om Udvalget kan tiltræde, at den offentliggøres som 221. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

København, Februar 1946.

Ærbødigst

Johs. Jespersen.

Ovennævnte Beretning har været forelagt *Statens Husdyrbrugsudvalg* og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Odense, Marts 1946.

Johs. Petersen-Dalum,
Formand.

INDHOLD

	Side
Forord	5
A. KØD- OG PELSKANINER	7
Kontrolholdenes Sammensætning	7
Kontrolholdenes Racefordeling	7
Racernes Gruppering efter Vægt og deres Ideal- og Afgangsvægt	8
Fodringen	8
Foderplan	8
Fodermidler	9
Sundhedstilstanden	10
<i>Kontrolresultater</i>	11
De forskellige Racers Tilvækst og Foderforbrug	11
Den daglige Tilvækst	11
I Forhold til Alderen ved Modtagelsen paa Kontrolstationen	12
I Forhold til Vægten ved Modtagelsen paa Kontrolstationen	14
Foderforbruget pr. kg Tilvækst	15
Ved forskellig daglig Tilvækst	16
Ved forskellig Begyndelsesalder	18
Ved forskellig Begyndelsesvægt	18
Slagtesvindet	18
Kødfylden	20
Fedningsgraden	21
Bedømmelsesskala for Fedningsgrad	21
De forskellige Racers Fedningsgrad	21
Fedningsgraden i Forhold til Vækstevnen	21
Undersøgelser vedrørende Dyrenes Kroplængde	22
Skindene	24
Skala for Skindenes Klassificering	25
Points ved Skindbedømmelserne i de forskellige Maaneder	25
Skindenes Klassificering i de forskellige Maaneder	26
De forskellige Racers Skindkvalitet og Skindvægt	26
Kønnets Indflydelse paa Skindenes Kvalitet	26
Afgangsalderens Indflydelse paa Skindkvalitet og Skindvægt	27
B. ANGORAKANINER	28
Fodringen	28
Foderplan	28
Fodermidler	28
Sundhedstilstanden	28
<i>Kontrolresultater</i>	29
Kønnets og Legemsvægtens Indflydelse paa Uldens Mængde	29
Systemer for Uldens Sortering	29
Kønnets Indflydelse paa Mængden af Uld i Forhold til Mængden af Filt	30
Kønnets Indflydelse paa Uldens Længde	30
Uldens Kvalitet i Forhold til dens Mængde	32
Uldens Mængde og Kvalitet for 3 Hold efter Han A. 898	32
Kønnets Indflydelse paa Uldkvaliteten	33
Foderforbrug pr. Dyr og pr. 100 g Uld ved forskellig Legemsvægt	34
KONTROLSTATIONENS BYGNING OG INDRETNING	35
HOVEDTABELLER	41
Kød- og Pelskaniner	42
Angorakaniner	52

Forord.

Efter en Henvendelse fra Formanden for Fællesudvalget til Kaninavlens Fremme, Sekretær *Aage Fogh*, i Foraaret 1943 blev det ved et Møde i Statens Husdyrbrugsudvalg den 18. Maj vedtaget at træde i Samarbejde med det omtalte Fællesudvalg vedrørende Oprettelsen af en Kaninkontrolstation, og Resultatet blev, at Fællesudvalget stillede Midler til Bygning af en saadan Station til Raadighed, dog kun til selve Stationen, derimod ikke til Opførelse af en Tjenestebolig.

Stationen blev opført paa Favrholt i Efteraaret 1943 og overtaget af Statens Husdyrbrugsudvalg den 28. Januar 1944. Stationen var paa det Tidspunkt allerede taget i Brug, da de første Hold Kaniner var modtaget den 20. Januar. Det drejede sig om nogle Hold Angorakaniner; de første Hold Kød- og Pelskaniner kom i Marts Maaned.

Hensigten er at føre Avls- og Stammerkontrol dels med Kød- og Pelskaniner, dels med Angorakaniner. Hvad de førstnævnte angaar, er Reglen den, at Avlscentre og Avlere, der deltager i den af Fællesudvalget foranstaltede Landskonkurrence mellem hele Kaninhold, skal sende et Kontrolhold af 3 Ungdyr til Kontrolstationen for hver 5 Avlshunner i Besætningen, og Kontrollen omfatter Vækstevne, Foderforbrug i Forhold til Tilvækst, Slagtekvantitet og Skindkvantitet.

Af Angorakaniner skal Avlscentre samt Avlere, der deltager i Landskonkurrencen, indsende et Kontrolhold bestaaende af 2 Ungdyr for hver 50 Dyr i Besætningen.

Kontrolstationen sorterer under Statens Husdyrbrugsudvalg. Der er nedsat et Underudvalg bestaaende af Repræsentanter for Statens Husdyrbrugsudvalg og fra Fællesudvalget til Kaninavlens Fremme, som træffer de fornødne Forholdsregler vedrørende Stationens Drift, og som fører Tilsyn med Stationen. Den daglige Drift ledes af en af Forsøgslaboratoriets Medarbejdere, for Øjeblikket Assistent, Landbrugskandidat *Sv. Hoffman Hansen*.

Slagtningen af de kontrollerede Kød- og Pelskaniner finder Sted paa Andelsfjerkræslagteriet i Ringsted, og ved Bedømmelsen af de slagtede Kaniner har Direktør *A. Thøsing Jørgensen* og Forvalter *O. Jensen*, Andelsfjerkræslagteriet, samt Konsulent *S. Buus*, Ringsted, og Konsulent *H. M. Olsen*, København, været behjælpelige. Ved Bedømmelsen af Skindene har desuden medvirket: Direktør *O. Storm Nielsen*, København, Grosserer *K. O. Christensen*, Ringsted Andelsfjerkræslagteris Salgskontor, København, Grosserer *T. Fjeldsøe-Nielsen*, København, samt Dommer i Kaninavl *A. H. Harris*, København. Ved Bedømmelsen af Angoraulden har Direktør *B. Feldthusen*, Scandinavian Rabbit Company, været behjælpelig. Forsøgslaboratoriet er disse Herrer megen Tak skyldig for den udmærkede Bistand ved disse Bedømmelser.

A. Kød- og Pelskaniner.

Der er i Aarets Løb fra 67 forskellige Avlere modtaget 177 Hold Kød- og Pelskaniner paa Kontrolstationen; hvert Hold bestaar af 3 Kuldsøskende. Ifølge Reglerne skal de leveres til Kontrolstationen umiddelbart efter Fravænnings 2 Måned efter Fødslen.

Alle Kaniner, som ankommer til Kontrolstationen, bliver eftersat for mulige Mangler; Dyrene vejes og bliver af Hensyn til den efterfølgende Kontrol tatoveret i højre Øre.

Kontrolholdenes Sammensætning.

	Antal	pCt.
3 Hanner	5	2,8
2 Hanner + 1 Hun	94	53,1
1 Han + 2 Hunner	74	41,8
3 Hunner	4	2,3

De 3 Dyr, der danner et Hold, gaar i samme Bur, og Kontrollen gennemføres, selv om et af Dyrene afaar for tidligt.

Ikke færre end 14 Racer har været kontrolleret.

Tabel 1. Kontrolholdenes Racefordeling.

Race	Antal Hold	Gennem- førte Hold	Opløste Hold	Race	Antal Hold	Gennem- førte Hold	Opløste Hold
Alaska	1	1		Hvid Wiener ..	1	1	
Belgisk Hare ..	1		1	Bourgogne	10	8	2
Havanna	1	1		Stor Chinchilla ..	15	13	2
Lille Chinchilla ..	4	4		Stor Sølv	7	6	1
Lille Sølv	2	2		Fransk Vædder	10	9	1
Hvid Landkanin	87	65	22	Belgisk Kæmpe	5	1	4
Blaa Wiener ...	29	25	4	Hvid Kæmpe ..	4	3	1

En stor Del af de opløste Hold er opløst ret hurtigt efter Kontrollens Begyndelse. 49 pCt. af de kontrollerede Dyr har hørt til Hvid Landkanin, 16 pCt. til Blaa Wiener, og de øvrige 35 pCt. har været fordelt paa de øvrige 12 Racer.

Racerne grupperes efter Størrelse (Vægt), og Dyrene slagtes ved en i Forhold til deres Standard- eller Idealvægt i Forvejen fastsat Afgangsvægt.

Idealvægten svarer til den Vægt, et udvokset Avlsdyr skal have, medens Afgangsvægten er den Vægt, der maa anses for passende at slagte Dyret ved, naar der tages Hensyn til saavel Opdrætningsomkostningerne som til Dyrets Slagte-

Racernes Gruppering efter Vægt og deres Ideal- og Afgangsvægt.

	Ideal- vægt kg	Afgangs- vægt kg
<i>Smaa Racer:</i>		
Alaska, Belgisk Hare, Havanna, Lille Chinchilla og Lille Sølv	ca. 2,8	ca. 2,5
<i>Mellemstore Racer:</i>		
Hvid Landkanin	> 3,8	< 3,0
<i>Godt mellemstore Racer:</i>		
Blaa Wiener, Hvid Wiener, Bourgogne, Stor Chinchilla og Stor Sølv	> 4,8	> 3,5
<i>Store Racer:</i>		
Fransk Vædder	> 5,5	> 4,0
<i>Kæmperacer:</i>		
Belgisk Kæmpe, Hvid Kæmpe	> 7,5	> 5,0

kvalitet. Slagter man først Dyrene ved en Vægt, der nærmer sig Idealvægten, bliver Omkostningerne pr. kg Tilvækst for store, og slagter man dem ved en for lav Vægt, bliver Slagte kvaliteten, Fedningsgraden, for ringe. Det er dog kun delvis muligt at levere Dyrene ved den fastsatte Afgangsvægt, idet Dyrene ikke maa leveres, naar de er i Fældning, da Skindenes Værdi derved forringes stærkt.

Fodringen maa tilrettelægges saaledes, at Dyrenes Vækstevne hele Tiden udnyttes fuldt ud. Derfor vejes Dyrene hver 14. Dag, og Foderet ændres i Forhold til Vægten.

Der var i Begyndelsen en Del Vanskeligheder med at faa Fodringen ind i faste Rammer, og ganske naturligt, eftersom der er Tale om Dyr af forskelligt Alderstrin og forskellig Størrelse, bortset fra at det drejede sig om Dyr fra mange forskellige Racer. For at faa et Holdepunkt at gaa ud fra prøvede man at lave en Plan paa Grundlag af Forsøgslaboratoriets Forsøg med Hvid Landkanin og svenske Angivelser om Kaninens Foderbehov. Paa Grundlag heraf er Kaninens Foderbehov:

Dyrets Vægt, kg	Under 1,0	1,0—2,0	2,0—3,0	3,0—4,0
g F. E. daglig	50	85	115	140

Ved Anvendelse af disse Normer viste det sig ret hurtigt, at navnlig de ganske unge Kaniner fik for lidt, hvorfor det blev nødvendigt at forhøje Normen for Dyr under 1,0 kg. Normen har dog ingenlunde været anvendt skematisk.

Der er fodret 2 Gange daglig; ved hver Fodring er der givet Kraftfoder og om Sommeren Grønt og periodisk lidt Hø; i den øvrige Del af Aaret er der ved hver Fodring foruden Kraftfoderet givet Kaalroer og Hø. Foderplanen har været følgende:

Vægt, kg	g pr. Dyr daglig			
	Kraftfoder, hele Aaret	Grønt i Sommertiden	Den øvrige Hø	Del af Aaret Kaalroer
Under 1,0 kg	40	200	50	100
1,0—2,0	50	300	70	200
2,0—3,0	60	400	90	300
3,0—4,0	60	500	110	400

Den anførte Plan har dog ikke kunnet følges slavisk. De smaa Racer kunde paa et ret tidligt Tidspunkt af Udviklingen ikke æde det, som Planen angiver, medens de store Racer i enkelte Tilfælde har maattet sættes en Foderklasse højere end anført paa Planen.

Kraftfoderblandingen blev fra Begyndelsen sammensat saaledes, at Proteinindholdet i det samlede Foder begyndte med ca. 6 g Protein pr. Dyr daglig og derefter steg til ca. 18 g Protein pr. Dyr daglig ved Kontroltidens Afslutning for de større Racer. For at komme op paa denne Proteinmængde var det nødvendigt at anvende en ret stor Mængde Kød-Benmel i Blandingen (28 pCt.). Kaninerne var dog ret uvillige til at æde denne Blanding; det blev derfor nødvendigt at nedsætte Indholdet af Kød-Benmel i Blandingen til 10 pCt. I Januar 1945 blev der Mulighed for at tilsætte 7 pCt. Sennepsskraa til Kraftfoderblandingen.

Sammensætningen af Kraftfoderblandingen har været følgende:

	Foraar 1944		Sommer 1944	Efteraar og Vinter 1944/45	
	Indtil 16/5	17/5— 18/6	14/6— 19/9	20/9— 24/1	Efter 25/1
Byg	28,0	32,0	44,5	39,5	36,0
Havre	28,0	32,0	44,5	39,5	36,0
Kød-Benmel	28,0	10,0	0	10,0	10,0
Lucernemel	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0
Sennepsskraa ...	0	0	0	0	7,0
Maltspirer	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Tørgær	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kridt	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Salt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ialt pCt.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

De egentlige Kornarter i Kraftfoderblandingen er malet, idet Kaninerne ellers er tilbøjelige til at frasortere de finere Bestanddele, Kød-Benmel og lignende. I den Tid af Aaret, hvor der ikke fodres med Grønt, er der iblandet $\frac{1}{2}$ cm³ Detrimin pr. kg Kraftfoder.

Det Hø, der var til Raadighed ved Kontrollens Begyndelse i Foraaret 1944, bestod hovedsagelig af Græsser, det var groft og af en ringe Beskaffenhed. Sagen var nemlig den, at Kontrolstationen ikke var endelig vedtaget den forudgaaende Sommer, saaledes at der kunde være blevet taget Hensyn hertil ved Fordelingen af de forskellige Høkvaliteter. Foderværdien af dette Hø er skønsmæssigt ansat til 3,0 kg til en Foderenhed. Høet af Høsten 1944 var fra en 1. Aars Græsmark og bestod af halvsildig Rødkløver, Timothe samt lidt Lucerne; det var grovstænglet, men ellers af en god Kvalitet. Foderværdien er ansat til 2,2 kg til en Foderenhed.

Græs og Grønt er taget fra 1. og 2. Aars Mark og har væsentlig bestaaet af halvsildig Rødkløver, Timothe samt lidt Hundegræs og Lucerne. I første Halvdel af August fik Kaninerne ren Lucerne. Lucernen var meget tør, og Dyrene var meget uvillige til at æde den. Ved Kontrollens Begyndelse blev der anvendt Kaal-

roer (Bangholm), disse slap for tidligt op, hvorfor der i Stedet blev anvendt Runkelroer. Angorakaninerne fortærede disse uden Vanskelighed af nogen Art, mens de unge Kød- og Pelskaniner ikke taalte denne Rodfrugt; der blev en hel Del Tilfælde af Diarré, og det blev derfor nødvendigt i en kortere Periode, indtil Grønt kunde fremskaffes, helt at tage Rodfrugterne fra disse Dyr. I Efteraaret og Vinteren 1944—45 blev der hele Tiden anvendt Kaalroer (Wilhelmsburger), som var mere eller mindre angrebne af Kaalbroksvamp.

I den første Del af Kontroltiden gav man Kaninerne en Blødfoderblanding bestaaende af 40 pCt. Kraftfoder, 40 pCt. kogte Kartofler samt 20 pCt. syrnet Skummetmælk; desuden fik Dyrene Hø af den tidligere omtalte Beskaffenhed og Rodfrugter. Der indtraf i denne Periode en Del Tilfælde af Diarré, hvorfor man gik over til at give Kaninerne Kraftfoderet i tør Tilstand, og dette bibeholdt man man Kontroltiden ud.

I Foraaret 1944 prøvede man at give Kød- og Pelskaninerne syrnet Skummetmælk, men da mange af Holdene ikke vilde drikke den, maatte det opgives igen. For at være sikker paa at Kaninerne fik deres Vandbehov dækket, var det nødvendigt i næsten hele Juli og en Del af August Maaned, hvor Vejret var meget tørt og varmt, at væde Grøntfoderet med Vand.

Sundhedstilstanden. Medens Sundhedstilstanden blandt Angorakaninerne, saaledes som der gøres opmærksom paa i et Afsnit om disse, var meget god, var den ikke tilfredsstillende for Kød- og Pelskaninernes Vedkommende. Af 530 paa Kontrolstationen modtagne Kød- og Pelskaniner afgik 138, altsaa 26 pCt., før Kontroltiden var forbi.

En Del af de døde Kaniner er undersøgt paa Veterinær- og Landbokøjskolens patologisk-anatomiske Afdeling, og det viste sig, at over Halvdelen af de obducerede Dyr havde været angrebet af enten Tarm- eller Leverkoccidiose eller af begge Former. Ca. to Trediedele af de angrebne Dyr har vist nok haft Koccidiose, men foruden Koccidiose har man konstateret Mave-Tarmbetændelse, Kolik, Diarré og andre Lidelser i Fordøjelsesorganerne. Endvidere er enkelte Hanner døde efter Kastreringen; denne er foretaget saa tidlig som muligt, oftest naar Dyrene har været 3½—4½ Maaned.

Dødsfaldene har været ret ligelig fordelt blandt Holdene fra de forskellige Avlere. Fra alle Besætninger, hvorfra der har været indsendt over 6 Kød- og Pelskaniner til Kontrolstationen, er der paa en enkelt Undtagelse nær død mindst et Dyr, og for de Besætninger, der har leveret et større Antal Dyr til Kontrolstationen, er det procentvise Antal for tidligt afgaaede Dyr nogenlunde ens. At dømme efter det foreliggende Materiale synes der heller ikke at være nogen udtalt Forskel mellem de forskellige Racers Modtagelighed over for de forskellige Sygdomme, der har optraadt i Aarets Løb.

Efter Anvisning af Dyrlægen er der prøvet forskellige Midler, men i det store og hele har Virkningen ikke været helt tilfredsstillende.

Mod Diarré er anvendt Vismut enten i fast eller flydende Tilstand. Mod Forstoppelse er givet Istizin- eller Sagralintabletter; men Virkningen udeblév saavel efter en som efter baade to og tre Tabletter daglig; over tre Tabletter pr. Dyr dag-

lig er ikke prøvet. Endvidere er der mod Forstoppelse anvendt amerikansk Olie. Mod Oppustning er der givet Parafinolie.

Hannernes Kastrering er enten foretaget af Dyr lægen eller af Assistent Hoffmann Hansen.

Kontrolresultater.

De forskellige Racers Tilvækst og Foderforbrug.

Paa Forhaand maatte der regnes med, at Dyr af de store Racer vilde have en større daglig Tilvækst end Dyr af de smaa Racer. Dette har ogsaa været Tilfældet, men en jævnt stigende Linie i Forholdet mellem den daglige Tilvækst og Vægten ved Slagtningen er der dog ikke Tale om. Det kunde man iøvrigt heller ikke paa Forhaand gaa ud fra, at der skulde være; det er nemlig ikke givet, at den benyttede Slagtevægt i Forhold til de udvoksede Dyrs Vægt er akkurat lige mange Procent lavere for alle Racer. Dertil kommer, at for enkelte Racers Vedkommende har der kun været nogle faa Dyr under Kontrol, saa Tilfældigheder kan her have paavirket Gennemsnitsresultatet stærkt.

Tabel 2. Daglig Tilvækst og Foderforbrug pr. kg Tilvækst for forskellige Racer.

Race	Antal Dyr	Gennemsnitlig pr. Dyr		F. E. pr. kg Tilvækst
		Vægt ved Slagtning, kg	Daglig Tilvækst, g	
Alaska	2	2,45	13,2	6,62
Havanna	2	2,70	10,4	10,53
Lille Chinchilla	10	2,49	13,8	7,30
Lille Sølv	5	2,23	10,9	9,27
Hvid Landkanin	163	3,01	16,7	6,41
Blaa Wiener	62	3,44	20,3	5,42
Hvid Wiener	3	3,22	15,9	7,44
Bourgogne	20	3,31	16,2	6,91
Stor Chinchilla	35	3,54	17,5	6,74
Stor Sølv	15	3,46	18,6	6,06
Fransk Vædder	24	3,97	18,1	6,60
Belgisk Kæmpe	3	4,83	18,5	6,79
Hvid Kæmpe	9	4,49	13,0	10,45

Et synes at være Tilfældet, og det er, at Blaa Wiener har en større daglig Tilvækst end Bourgogne, Stor Chinchilla og Stor Sølv, naar disse Racer slagtes ved samme Vægt; i nærværende Tilfælde har de ogsaa haft større Tilvækst end Dyr af de store Racer som Vædder- og Kæmpekaniner. Samtidig med at Blaa Wiener har haft en forholdsvis stor daglig Tilvækst, har den ogsaa klaret sig med forholdsvis lidt Foder til en given Tilvækst.

Slagtes Kaninerne ved den her benyttede Vægt, bruger de mellemstore og store Racer 6 à 7 F. E. til 1 kg Tilvækst. Gaar man ud fra, at de Tal, der foreligger for Hvid Landkanin og Blaa Wiener, er forholdsvis sikre, da der af disse to Racer har været kontrolleret et forholdsvis stort Antal Dyr, maa der dog

regnes med, at slagtes Hvid Landkanin ved en Vægt af ca. 3 kg og Blaa Wiener ved en Vægt af ca. 3½ kg, bruger Hvid Landkanin 1 F. E. mere til 1 kg Tilvækst end Blaa Wiener. At Blaa Wiener har klaret sig med et forholdsvis lille Foderforbrug skyldes muligvis bl. a., at Afgangsvægten er sat lavere i Forhold til de udvoksede Dyr's Vægt end for de andre Racer.

Dyr af de smaa Racer kan ikke klare sig med 6 à 7 F. E. til 1 kg Tilvækst; for disse Racers Vedkommende maa der regnes med noget mere, men med hvor meget, kan der ikke af nærværende Undersøgelser drages nogen sikker Slutning; dertil har der været kontrolleret for faa Dyr.

Den daglige Tilvækst i Forhold til Alderen ved Modtagelsen paa Kontrolstationen.

Skal den forsøgstekniske Side være fuldstændig i Orden, skal Dyrene inden for hver Race ved Modtagelsen være af samme Alder og samme Vægt. Paa Forhaand var man klar over, at dette Krav ikke lige straks lod sig opfylde. Man havde saa Valget mellem samme Alder eller samme Vægt og valgte af praktiske Grunde Alderen, idet man vedtog, at Kød- og Pelskaniner skulde leveres, naar de var 2 Maaneder gamle, og denne Bestemmelse gjaldt for alle Racer.

Skønt der i og for sig ikke skulde være noget i Vejen for at faa dette Krav opfyldt, har det dog vist sig, at mange af de modtagne Kaniner har været ældre. En Del af Kaninerne har — saaledes som det kan ses af Tabel 3 — ved Modtagelsen været ca. 3 Maaneder; enkelte Hold inden for de hvide Landkaniner har endog været over 3 Maaneder.


Paa Forhaand kunde der være Grund til at vente, at den daglige Tilvækst i Kontroltiden vilde komme til at staa i Forhold til den Alder, Kaninerne var i ved Modtagelsen, saaledes at de Kaniner, der blev leveret ved en forholdsvis høj Alder, vilde faa den laveste daglige Tilvækst. Dette har imidlertid ikke været Tilfældet, idet den, bortset fra Gruppen med den højeste Alder, praktisk talt har været lige stor. Deles de 64 af de 65 gennemførte Hold Landkaniner i 8 Grupper à 8 Hold, og paa tilsvarende Maade 25 Hold Blaa Wiener i 5 Grupper à 5 Hold, faas følgende Resultat:

Tabel 3. Daglig Tilvækst ved forskellig Begyndelsesalder.

(Gennemsnitlig pr. Dyr).

Alder i Dage ved Kontrollens Begyndelse	Daglig Tilvækst g	Alder i Dage ved Kontrollens Begyndelse	Daglig Tilvækst g
Hvid Landkanin.			
61,0	17,0	77,0	16,9
66,1	18,4	80,3	17,6
70,3	17,3	89,4	18,1
73,6	17,0	103,5	14,6
Blaa Wiener.			
60,4	20,6	77,0	21,8
68,0	20,6	89,2	18,8
72,0	21,0		

Fig. I. Daglig Tilvækst ved forskellig Begyndelsesalder og Begyndelseshvægt.
Hvid Landkanin.



Figuren omfatter alle gennemførte Hold af Hvid Landkanin. Holdets Begyndelsesalder og Begyndelseshvægt kan aflæses direkte af de skraverede Søjler, mens den daglige Tilvækst pr. Dyr fremgaar af de sorte Søjler. Den i Figuren anførte Maaleenhed = 10 g Tilvækst pr. Dyr daglig.

Den daglige Tilvækst i Forhold til Vægten ved Modtagelsen paa Kontrolstationen.

Selv om Kaninerne var blevet sendt til Kontrolstationen ved den vedtagne Alder af 2 Maaneder, maatte der regnes med, at de vilde være af ret forskellig Vægt, og denne Forskel er nødvendigvis blevet endnu større som Følge af den forskellige Alder. Til Trods herfor har den gennemsnitlige daglige Tilvækst i Kontrolperioden været ret ens for de kontrollerede Dyr, naar der kun tages Hensyn til Vægten ved Modtagelsen og ikke til Afstamningen. Der kunde ellers have været Grund til at vente, at man her stod over for et Usikkerhedsmoment, som ikke helt lod sig fjerne, og som ogsaa vanskeligt lod sig udligne ad beregningsmæssig Vej. Bl. a. kunde der være Grund til at frygte for, at Dyr, som ved Ankomsten var meget tunge, vilde have opnaaet en lille, og Dyr, som var forholdsvis lette ved Ankomsten, i en Del Tilfælde vilde have opnaaet en stor daglig Tilvækst. I Tabel 4 ser man ogsaa, at de Hold Landkaniner, som gennemsnitlig har vejlet 1,9 kg ved Ankomsten, har haft en kendelig mindre daglig Tilvækst end de øvrige; men Dyr af en Vægt fra 0,8 kg til 1,6 kg har nok svinget en Del i Tilvækst, men det er ikke saadan, at der i Kontrolperioden har været et bestemt Forhold mellem Vægten ved Ankomsten til Kontrolstationen og den daglige Tilvækst. Og det samme gør sig gældende for Blaa Wiener. Den tungeste Gruppe har haft en mindre daglig Tilvækst i Kontroltiden end de andre:

Tabel 4. Daglig Tilvækst ved forskellig Begyndelsesvægt.


(Gennemsnitlig pr. Dyr).

Vægt ved Kontrollens Begyndelse, kg	Daglig Tilvækst g	Vægt ved Kontrollens Begyndelse, kg	Daglig Tilvækst g
Hvid Landkanin.			
0,75	17,6	1,40	16,6
0,99	17,4	1,51	17,6
1,18	16,9	1,64	18,4
1,31	18,6	1,91	14,6
Blaa Wiener.			
0,79	20,2	1,44	20,6
1,04	20,2	2,01	19,8
1,19	22,0		

Det ser efter dette saaledes ud til at være mindre væsentligt, om Kaninerne er 2 eller 3 Maaneder gamle ved Kontrollens Begyndelse, og ligeledes om Dyrenes Begyndelsesvægt er 0,8 eller 1,6 kg. Dette udelukker dog ikke, at der kan være en Forskel, men en saadan vil kun kunne paavises og Størrelsen heraf kun kunne konstateres, hvis Materialet er meget stort og under Forudsætning af, at man ved en Undersøgelse vedrørende dette Forhold holder den ene af Faktorerne konstant.

At man her staar over for et Par Forhold, som kan skabe Usikkerhed i de opnaaede Resultater, bør man i al Fald ikke se bort fra; der er derfor Anledning til saa nøje som muligt at overholde Kravet om at sende Kaninerne til Kontrolstationen, naar de er 2 Maaneder gamle. Muligvis vil der ad Aare saa ogsaa kunne findes en Vægt, som vil være den mest hensigtsmæssige ved Afsendelsen til Kontrolstationen.

Fig. II. Daglig Tilvækst ved forskellig Begyndelsesalder
og Begyndelsesvægt.
Blaa Wiener.



Figuren omfatter alle gennemførte Hold af Blaa Wiener. Holdets Begyndelsesalder og Begyndelsesvægt kan aflæses direkte af de skraverede Søjler, mens den daglige Tilvækst pr. Dyr fremgaar af de sorte Søjler. Den i Figuren anførte Maaleenhed = 10 g Tilvækst pr. Dyr daglig.

Foderforbruget pr. kg Tilvækst.

Kaninerne forholder sig som de andre Husdyr; jo større daglig Tilvækst, desto mindre Foder til 1 kg Tilvækst. Deles de hvide Landkaniner i 8 Grupper à 8 Hold og Blaa Wiener i 5 Grupper à 5 Hold efter stigende daglig Tilvækst, fremkommer følgende:

Tabel 5. Foderforbruget pr. kg Tilvækst ved forskellig daglig Tilvækst.


(Gennemsnitlig pr. Dyr).

Daglig Tilvækst i Kontrolperioden, g	F. E. pr. kg Tilvækst	Daglig Tilvækst i Kontrolperioden, g	F. E. pr. kg Tilvækst
Hvid Landkanin.			
13,1	8,29	17,5	5,95
15,0	7,44	18,3	5,53
16,0	6,35	19,0	5,80
16,8	6,29	21,3	5,05
Blaa Wiener.			
17,0	6,43	21,4	5,34
19,0	5,73	25,0	4,57
20,4	5,27		

Samtlige Hold med under 16 g daglig Tilvækst pr. Dyr har haft et Foderforbrug paa over 7 F. E. pr. kg Tilvækst, for de øvrige Hold er der nogen Variation i Foderforbruget, men som det fremgaar af Kurverne i Fig. III og IV, har Holdene med

Fig. III. Forholdet mellem daglig Tilvækst og Foderforbruget pr. kg Tilvækst.

Hvid Landkanin.




den største daglige Tilvækst som Helhed det laveste Foderforbrug pr. kg Tilvækst, og man maa altid tilstræbe at faa den størst mulige daglige Tilvækst; en langsom Tilvækst, hvad enten den skyldes Kaniner, som i Kraft af arvelige Anlæg vokser langsomt, eller Fejl ved Fodringen, giver altid en forholdsvis dyr Produktion.

I det foregaaende har man set, at bortset fra de Kaniner, der var særlig gamle eller tunge ved Modtagelsen paa Kontrolstationen, stod den daglige Tilvækst ikke i Forhold til Alderen ved Modtagelsen. Naar dette er Tilfældet, kan der, bortset fra den ældste og tungeste Gruppe inden for hver Race, heller ikke være nogen Forskel paa Foderforbruget til 1 kg Tilvækst hos Kaniner, der er modtaget ved forskellig Alder og Vægt.

For de hvide Landkaniners Vedkommende har de Grupper, der har været yngst ved Modtagelsen paa Kontrolstationen, haft et lidt lavere Foderforbrug pr. kg Tilvækst end de andre, men en regulær Stigning i Forhold til øget Alder er der ikke Tale om. En væsentlig Stigning mærkes først for den Gruppe, der har været over 3 Maaneder ved Modtagelsen.

Fig. IV. Forholdet mellem daglig Tilvækst og Foderforbruget pr. kg Tilvækst.
Blaa Wiener.



Tabel 6. Foderforbruget pr. kg Tilvækst ved forskellig Begyndelsesalder.

(Gennemsnitlig pr. Dyr).

Alder i Dage ved Kontrollens Begyndelse	F. E. pr. kg Tilvækst	Alder i Dage ved Kontrollens Begyndelse	F. E. pr. kg Tilvækst
Hvid Landkanin.			
61,0	5,86	77,0	6,81
66,1	5,76	80,3	6,57
70,3	6,04	89,4	6,31
73,6	6,45	103,5	8,17
Blaa Wiener.			
60,4	5,08	77,0	5,24
68,0	5,52	89,2	6,24
72,0	5,27		

For de blaa Wieners Vedkommende har den ældste Gruppe i Overensstemmelse med den forholdsvis lille daglige Tilvækst ogsaa haft et større Foderforbrug til en given Tilvækst end de andre Grupper, men bortset fra denne Gruppe kan der heller ikke her paavises nogen Forbindelse mellem Foderforbruget og Alderen ved Modtagelsen.

Tabel 7. Foderforbruget til 1 kg Tilvækst ved forskellig Begyndelsesvægt.

(Gennemsnitlig pr. Dyr).

Vægt ved Kontrollens Begyndelse kg	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt ved Kontrollens Begyndelse kg	F. E. pr. kg Tilvækst
Hvid Landkanin.			
0,75	5,47	1,40	6,61
0,99	6,12	1,51	6,61
1,18	6,68	1,64	6,15
1,31	6,08	1,91	8,21
Blaa Wiener.			
0,79	5,18	1,44	5,40
1,04	5,36	2,01	6,17
1,19	5,24		

Bortset fra det tungeste Hold, og for Hvid Landkanin ogsaa for det letteste Hold, har der ikke været en klar Forskel i Foderforbruget til 1 kg Tilvækst i Forhold til Vægten ved Kontrollens Begyndelse, saaledes at der har været en jævn Stigning i Foderforbruget, alt som Vægten har tiltaget.

Slagtesvindet.

I efterfølgende Tabel 8 ses det gennemsnitlige Slagtesvind for de forskellige Racer.

Man maa paa Grundlag af denne Opgørelse ikke slutte, at Alaska Racen har et meget lille og Havanne Racen et meget stort Slagtesvind. I alle de Tilfælde, hvor vedkommende Race kun er repræsenteret ved et lille Antal Individier, og det

Tabel 8. Slagtesvindet for de forskellige Racer.

Race	Antal Dyr	Levende Vægt paa Slagteriet, kg pr. Dyr	Slagtesvindet	
			kg pr. Dyr	pCt.
Alaska	2	2,45	0,92	37,6
Havanna	2	2,70	1,14	42,2
Lille Chinchilla	10	2,49	1,03	41,4
Lille Sølv	3	2,23	0,89	39,9
Hvid Landkanin	163	3,01	1,22	40,5
Blaa Wiener	62	3,44	1,44	41,9
Hvid Wiener	3	3,22	1,19	37,0
Bourgogne	20	3,31	1,30	39,3
Stor Chinchilla	35	3,54	1,43	40,4
Stor Sølv	15	3,46	1,41	40,8
Fransk Vædder	24	3,97	1,68	42,3
Belgisk Kæmpe	3	4,83	1,88	38,9
Hvid Kæmpe	9	3,95	1,53	38,7

vil praktisk talt siges for alle Racer bortset fra Hvid Landkanin, maa man ikke regne med, at det i Tabel 8 anførte Slagtesvind svarer til vedkommende Races gennemsnitlige Slagtesvind. Kun hvor Antallet af de kontrollerede Dyr er nogenlunde stort, kan de forskellige Tilfældigheder, som altid forekommer, udligne hverandre. Selv i de Tilfælde, hvor Antallet af slagtede Kaniner har været 20—30 som for Bourgogne Racen og for Fransk Vædder, maa Tallene for Slagtesvindet tages med største Forbehold. Men selv om man er nødt hertil, tyder de dog nærmest paa, at Slagtesvindet paa det nærmeste er ens for Racer, der er slagtet ved en lille og for Racer, der er slagtet ved en større Vægt.

Slagtesvindet ved forskellig Væksthastighed.

Det ser ud til, at Slagtesvindet bliver lidt større hos Kaniner af stor end hos Kaniner af en lille Væksthastighed.

Tabel 9.

Daglig Tilvækst pr. Dyr, g	Levende Vægt paa Slagteriet, kg pr. Dyr	Slagtesvindet	
		kg pr. Dyr	pCt.
Hvid Landkanin.			
13,1	2,93	1,18	40,3
15,0	2,99	1,20	40,1
16,0	2,86	1,05	40,4
16,8	3,04	1,22	40,1
17,5	3,06	1,20	39,2
18,3	3,05	1,22	40,0
19,0	3,08	1,27	41,2
21,3	3,08	1,32	42,9
Blaa Wiener.			
17,0	3,72	1,53	41,1
19,0	3,51	1,49	42,5
20,4	3,39	1,42	41,9
21,4	3,40	1,39	40,9
25,0	3,51	1,50	42,7

Kødfylden.


Kødfylden hos de forskellige Racer.

Af de Racer, der er repræsenteret ved et større Antal Dyr, har Fransk Vædder det højeste Pointtal for Kødfylde, nemlig 9,2 Points i Gennemsnit for samtlige kontrollerede Dyr, hvilket maa siges at være et særdeles smukt Resultat. De øvrige Racer, der er repræsenteret ved flere Hold, ligger nogenlunde ens; lavest ligger Bourgogne med 7,9 Points.

Tabel 10.

Race	Antal Dyr	Points for Kødfylde		
		Ryg	Laar	Ialt
Alaska	2	3,0	3,0	6,0
Havanna	2	5,0	4,0	9,0
Lille Chinchilla	10	4,5	4,3	8,8
Lille Sølv	5	4,0	4,2	8,2
Hvid Landkanin	163	4,2	4,1	8,3
Blaa Wiener	62	4,3	4,3	8,6
Hvid Wiener	3	4,3	5,0	9,3
Bourgogne	20	4,0	3,9	7,9
Stor Chinchilla	35	4,1	4,2	8,3
Stor Sølv	15	4,3	4,3	8,6
Fransk Vædder	24	4,5	4,7	9,2
Belgisk Kæmpe	3	4,3	4,3	8,6
Hvid Kæmpe	9	3,9	4,1	8,0

Fig. V. En Samling ensartede Kroppe med god Kødfylde.



Fedningsgraden.

Ved Bedømmelsen af Fedningsgraden har man benyttet følgende Skala:

Klasse I	udmærket
» If	for fede
» Iff	meget for fede
» II	letfede
» III	magre

De forskellige Racers Fedningsgrad.

Fransk Vædder, Stor Sølv og Stor Chinchilla har haft det største Antal Dyr i I. Klasse og som Helhed den jævnest og bedste Fordeling i de forskellige Klasser, medens Kaninerne af de smaa Racer har været for fede ved Leveringen til Slagteriet. Det samme har været Tilfældet for Bourgogne Kaninerne. Iøvrigt viser Hvid Landkanin ogsaa en Tendens til lovlig stærk Fedningsgrad, medens Blaa Wiener har forholdsvis mange Dyr i vel mager Tilstand.

Tabel 11.

Race	Antal Dyr	pCt. Dyr i Klasse				
		I	If	Iff	II	III
Alaska	2	100,0				
Havanna	2	50,0	50,0			
Lille Chinchilla	10	20,0	70,0	10,0		
Lille Sølv	5	40,0	60,0			
Hvid Landkanin	163	63,8	25,1	3,1	7,4	0,6
Blaa Wiener	62	59,7	3,2		33,9	3,2
Hvid Wiener	3	33,3	66,7			
Bourgogne	20	45,0	40,0	10,0		5,0
Stor Chinchilla	35	65,7	17,1	8,6	8,6	
Stor Sølv	15	66,7	20,0		13,3	
Fransk Vædder	24	75,0	12,5	4,2	8,3	
Belgisk Kæmpe	3		100,0			
Hvid Kæmpe	9	55,6	22,2		22,2	

Fedningsgraden i Forhold til Vækstevnen.

Da det er en Kendsgerning, at Kaniner, der slagtes i de første Efteraarsmaaned, har en lavere Fedningsgrad, end de, som slagtes senere paa Efteraaret og først paa Vinteren, er det sandsynligt, at Aarstiden eller den Fodring, der præsteres paa de forskellige Aarstider, har en afgørende Indflydelse paa Fedningsgraden. Der er Grund til at tro, at man kan regulere Fedningsgraden noget ved at levere de smaa Racer ved en lidt lavere og Blaa Wiener ved en noget højere Vægt.

Det er muligt, at man skal søge Forklarnigen til, at forholdsvis mange af de blaa Wiener var vel magre, i den Kendsgerning, at de blaa Wiener har haft en stor daglig Tilvækst. En Opgørelse over Sammenhængen mellem Vækstevnen og Fedningsgraden for Hvid Landkanin for sig og for Blaa Wiener for sig synes at tyde paa, at de for magre Individer fortrinsvis findes blandt de hurtigst voksende.


Tabel 12.

Daglig Tilvækst g	pCt. Dyr i Klasse				
	I	I f	I ff	II	III
		Hvid Landkanin.			
13,1	47,6	38,1	4,8	9,5	
15,0	60,9	26,1	4,3	8,7	
16,0	75,0	25,0			
16,8	61,9	28,5	4,8	4,8	
17,5	66,7	16,5	5,6	5,6	5,6
18,3	57,9	26,3		15,8	
19,0	85,0	15,0			
21,3	63,2	15,8	5,2	15,8	
		Blaa Wiener.			
17,0	75,0	8,3		16,7	
19,0	40,0	10,0		40,0	10,0
20,4	57,1			42,9	
21,4	57,1			35,7	7,2
25,0	66,7			33,3	

Undersøgelser vedrørende Dyrenes Kroplængde.

Ved Slagtebedømmelserne er foretaget en Maaling af Dyrenes Kroplængde. Denne Maaling er foretaget paa de paa Slagteriet færdigbehandlede Kroppe, og Maalet er Afstanden fra Halerod til Nakkekam maalt langs Ryggen. Formailet

Fig. VI. Fra Slagtebedømmelse paa Ringsted
Andels-Fjerkræslagteri.



med disse Maalinger er at skaffe Materiale til Belysning af Spørgsmaalet, om der i Avlen skal lægges Vægt paa de lange eller de korte Typer, og selv om Materialet endnu er ufuldstændigt, er der dog for de to Racer Hvid Landkanin og Blaa Wiener foretaget Opgørelser over Sammenhængen mellem Dyrenes Kroplængde og den daglige Tilvækst, Foderforbruget pr. kg Tilvækst, den opnaaede Fedningsgrad samt Dyrenes Kødfylde.

Holdene er inddelt efter Kroplængde i henholdsvis 8 Grupper à 8 Hold og 5 Grupper à 5 Hold.

Tabel 13. Daglig Tilvækst og Foderforbruget pr. kg Tilvækst ved forskellig Kroplængde.
(Gennemsnitlig pr. Dyr).

Kroplængde cm	Daglig Tilvækst g	F.E. pr. kg Tilvækst
Hvid Landkanin.		
38,9	16,0	6,83
39,7	16,1	7,07
40,7	17,5	6,38
40,9	16,9	6,25
41,1	17,5	6,33
41,7	16,1	6,63
42,4	18,0	5,95
43,4	18,8	5,88
Blaa Wiener.		
43,0	23,6	5,08
43,9	20,2	5,29
44,1	19,4	5,80
44,6	19,6	5,34
45,2	20,0	5,58

Det ser ud til, at inden for Hvid Landkanin har de længste Dyr haft den største daglige Tilvækst og det laveste Foderforbrug pr. kg Tilvækst; med andre Ord, at de længste Dyr skulde være de triveligste. Noget tilsvarende har ikke gjort sig gældende for Blaa Wiener.

Tabel 14. Sammenhæng mellem Dyrenes Kroplængde og den opnaaede Fedningsgrad.

Krop- længde i cm	pCt. Dyr i Klasse				
	I	If	Iff	II	III
Hvid Landkanin.					
38,9	55,5	38,9		5,6	
39,7	66,7	23,9	4,7	4,7	
40,7	68,4	26,3		5,3	
40,9	59,1	40,9			
41,1	81,8	13,7		4,5	
41,7	60,0	30,0		10,0	
42,4	55,0	20,0	15,0	5,0	5,0
43,4	68,4	5,3		26,3	
Blaa Wiener.					
43,0	61,5	7,7		23,1	7,7
43,9	40,0	10,0		50,0	
44,1	61,5			38,5	
44,6	75,0			16,7	8,3
45,2	57,1			42,9	

De korte Dyr er tilbøjelige til at blive vel fede, medens der mellem de lange Dyr er en Del, der vanskeligt bliver fede nok, medmindre man lader dem blive noget ældre, inden de slagtes; dette gælder i særlig Grad for Blaa Wiener, som er forholdsvis sent slagtemoden.

Tabel 15. Sammenhæng mellem Dyrenes Kroplængde og Kødfylde.
(Gennemsnitlig pr. Dyr).

Kroplængde i cm	Points for Kødfylde		
	Ryg	Laar	Ialt
Hvid Landkanin.			
38,9	4,3	4,1	8,4
39,7	4,4	4,2	8,6
40,7	4,2	4,1	8,3
40,9	4,5	4,4	8,9
41,1	4,2	4,0	8,2
41,7	4,2	4,0	8,2
42,4	4,3	4,1	8,4
43,4	4,2	4,3	8,5
Blaa Wiener.			
43,0	4,1	4,1	8,2
43,9	4,5	4,5	9,0
44,1	4,2	4,3	8,5
44,6	3,9	4,2	8,1
45,2	4,2	4,5	8,7

Efter ovenstaaende synes der ikke at være Forskel paa Kødfylden for lange og korte Dyr, men det er muligt, at en saadan Forskel vil kunne paavises, naar Materialet bliver stort nok til, at man kan udvælge et tilstrækkeligt stort Antal Dyr af samme Race med fuldstændig samme Slagtevægt, men det foreliggende Materiale er — selv for Hvid Landkanin — for lille til, at en Beregning paa Grundlag af dette kan blive nogenlunde sikker.

Der er ifølge ovenstaaende en Del, der tyder paa, at mens man for visse Racer, som f. Eks. Hvid Landkanin, skal stræbe efter at faa Typen lidt længere, end den er for Tiden, saa er der for andre Racers Vedkommende, som f. Eks. Blaa Wiener, ingen Grund til at søge Dyrenes Længde øget. Ja, det er endog muligt, at man for enkelte Racer maa lægge Hovedvægten paa de korteste Typer.

Skindene.

Skindene er vejjet umiddelbart efter Slagtningen og straks spilede og tørrede, hvorefter de er gemt hen, indtil samlede Bedømmelser har kunnet finde Sted.

Skindbedømmelserne foregaar dels i Ringsted og dels i København, saaledes at alle Skind bedømmes begge Steder; efter den sidste Bedømmelse foretages en Vejning af de tørrede Skind. De to Bedømmelser foregaar uafhængig af hinanden og foretages delvis af forskellige Dommere.

Ved Bedømmelsen gives hvert Skind Points efter en Skala, der gaar til 10 Points, og Skindene klassificeres saaledes:

10 —7,5 Points	=	I Klasse
7,4—5,5 »	=	II »
under 5,5 »	=	III »

Inden den endelige Klassificering foretages, sammenholdes dog Tallene fra de to Bedømmelser, og Gennemsnittet af de opnaaede Points beregnes, og det er dette Gennemsnitstal, der er afgørende for Skindenes Klassificering.

Man var paa Forhaand klar over, at hvis Skindbedømmelserne tydeligt skulde vise de racemæssige og individuelle Forskelle, vilde det være nødvendigt at indføre en Korrektion for Aarstidens Indflydelse paa Skindenes Kvalitet, idet man vidste, at Skindene fra Kaniner, som slagtedes i August—September, var af en betydelig ringere Kvalitet end Skindene fra Dyr, der slagtedes senere om Efteraaret.

For at faa det bedst mulige Grundlag for en Bedømmelse af Aarstidens Indflydelse paa Skindenes Kvalitet, og saa stort et Materiale som muligt at beregne en Korrektion paa, var det nødvendigt at foretage en Bedømmelse af Skind fra forskellig Aarstid og af et ret stort Antal Kaniner samtidig.

En saadan Bedømmelse fandt Sted i Januar 1945, og paa Grundlag af de ved denne Bedømmelse fundne Tal, beregnedes for de 5 sidste Maaneder af 1944 de Korrektioner, som fremgaar af sidste Rubrik i Tabel 16.

Gennemsnittet af de opnaaede Points for ca. tre Hundrede Skind var 6,5 Points, og Korrektionen er Forskellen mellem de 6,5 Points og Gennemsnittet for Skindene fra den enkelte Maaned.

Tabel 16. Points ved Skindbedømmelserne i de forskellige Maaneder.

Maaned for Slagtning	Points ved Skindbedømmelsen			
	Ringsted	København	Gennemsnit	Korrektion
August 1944	5,0	4,6	4,8	+1,7
September 1944	5,2	4,8	5,0	+1,5
Oktober 1944	7,4	6,9	7,2	÷0,7
November 1944	7,9	7,8	7,9	÷1,4
December 1944	7,9	7,3	7,6	÷1,1
Januar—Februar 1945	7,1	6,9	7,0	÷0,5
April 1945	5,0	4,3	4,7	+1,8

De Skind, der er bedømt i de første Maaneder af 1945, er ogsaa korrigeret efter Gennemsnittet 6,5, fordi det viste sig at være fuldt ud korrekt frem for at lave en ny Korrektionsberegning paa Grundlag af de forholdsvis faa Skind, det drejede sig om.

I Tabel 17 er foretaget en Opgørelse over Skindenes Klassificering, efter at Korrektionen er foretaget; det fremgaar heraf, at medens der i Maanederne Ok-

tober, November og December er opnaaet en forbavsende ensartet Fordeling i de tre Klasser — en Fordeling, der beviser Korrektionens Sikkerhed — har der i Maanederne September og Januar—Februar været en lidt afvigende Fordeling, idet der i disse Maaneder er lidt flere af baade I og III Klasses Skind.

Tabel 17. Skindenes Klassificering i de forskellige Maaneder.

Maaned for Slagtning	pCt. Skind i		
	I. Klasse	II. Klasse	III. Klasse
August 1944	9,1	81,8	9,1
September 1944	23,9	55,7	20,4
Oktober 1944	9,5	82,5	8,0
November 1944	10,0	80,0	10,0
December 1944	10,0	86,0	4,0
Januar—Februar 1945	23,9	58,7	17,4
April 1945		100,0	
Gennemsnit for alle Skind	16,0	71,1	12,9

De forskellige Racers Skindkvalitet og Skindvægt.

Der er ikke nogen udpræget Forskel paa Skindkvalitet mellem Racerne, dog er det saaledes, at de fleste I Klasses Skind findes blandt de hvide Landkaniner, medens det ofte kniber med Pelsens Tæthed hos flere af de andre Racer, navnlig de blaa Wienere. Skindene af Hvid Landkanin har i Forhold til de øvrige Racers Skind opnaaet en særdeles pæn Placering med kun 6,1 pCt. af Skindene i III Klasse, men det maa dog fremhæves, at Skindene selv for denne Race kan blive meget bedre endnu, og det er meget vigtigt, at der i Avlsarbejdet lægges Vægt paa Pelsens Tæthed.

Tabel 18. Skindkvalitet og Skindvægt for de forskellige Racer.

Race	Antal Skind	pCt. Skind i			Vægt pr. Skind, g	
		I. Klasse	II. Klasse	III. Klasse	frisk	tørret
Alaska	2	50,0	50,0		260	130
Havanna	2	50,0	50,0		293	140
Lille Chinchilla	10		70,0	30,0	277	141
Lille Sølv	5		80,0	20,0	238	113
Hvid Landkanin	163	22,1	71,8	6,1	324	160
Blaa Wiener	62	8,1	58,0	33,9	320	161
Hvid Wiener	3	33,4	33,3	33,3	350	180
Bourgogne	20	15,0	70,0	15,0	349	170
Stor Chinchilla	35	11,4	74,3	14,3	366	183
Stor Sølv	15		73,4	26,6	315	145
Fransk Vædder	24		95,8	4,2	417	214
Belgisk Kæmpe	3		100,0		517	273
Hvid Kæmpe	9	22,2	44,5	33,3	419	224

Kønnetts Indflydelse paa Skindenes Kvalitet.

Hannernes Skind er af en noget finere Kvalitet end Hunnernes; saaledes har det i al Fald været for Hvid Landkanins og Blaa Wieners Vedkommende.

Tabel 19. Skindkvalitet og Skindvægt for Dyr af forskelligt Køn.

		Antal Dyr	pCt. Skind i			Vægt pr. Skind, g	
			I Klasse	II Klasse	III Klasse	frisk	tørret
Hvid Landkanin.							
Hanner		85	29,4	68,2	2,4	337	168
Hunner		78	14,1	75,6	10,3	311	152
Blaa Wiener.							
Hanner		29	13,8	62,1	24,1	333	162
Hunner		33	3,0	54,6	42,4	308	142

Afgangsalderens Indflydelse paa Skindkvalitet og Skindvægt.

Ved Undersøgelsen over Skindkvalitet og Skindvægt ved forskellig Afgangsalder er Holdene inddelt efter Alder ved Afgangen i henholdsvis 8 Grupper à 8 Hold og 5 Grupper à 5 Hold.

Det har ikke været muligt paa Grundlag af foreliggende Materiale at finde nogen Sammenhæng mellem Dyrenes Alder ved Slagtning og Skindkvaliteten. For Hvid Landkanin har de ældste og de yngste Dyr haft daarligere Skind end de Dyr, der er leveret ved Alderen 200—220 Dage; men Resultaterne er for forskelligartede til, at der kan fastslås at være nogen Sammenhæng mellem Dyrenes Afgangsalder og Skindkvaliteten.

Det er ganske naturligt, at Skindene af de Kaniner, som er slagtet ved den laveste Vægt, er de letteste, og at Skindene af de Kaniner, der er slagtet ved den højeste Vægt, er de tungeste, men en jævn Stigning i Skindenes Vægt i Forhold til Dyrenes Vægt ved Slagtningen har der ikke været Tale om.

Tabel 20. Skindkvalitet og Skindvægt ved forskellig Afgangsalder.

Alder i Dage ved Slagtning	pCt. Skind i			Vægt pr. Skind, g	
	I. Klasse	II. Klasse	III. Klasse	frisk	tørret
Hvid Landkanin.					
164,6	9,4	81,2	9,4	298	142
185,9	22,2	77,8	0	312	144
195,4	5,0	90,0	5,0	321	164
202,0	31,8	59,1	9,1	335	165
207,5	25,0	70,0	5,0	335	167
212,1	40,9	50,0	9,1	334	162
222,0	33,3	66,7	0	327	165
235,5	5,3	89,4	5,3	332	171
Blaa Wiener.					
167,0	0	61,5	38,5	317	144
190,5	7,7	38,5	53,8	312	143
194,8	0	58,3	41,7	290	142
208,7	15,4	76,9	7,7	324	152
231,4	18,2	54,5	27,3	328	157

B. Angorakaniner.

Der har været kontrolleret 66 Hold fra 23 forskellige Avlere. Hvert Hold bestaar af 2 Dyr (Kuldsøskende), der gaar i Enkelthur. Det er bedst, om Holdet bestaar af en Han og en Hun, og det har ogsaa været Tilfældet for de 62 Holds Vedkommende. I de andre 4 Hold var der kun Hunner.

De modtages i en Alder af 4 til 8 Maaneder, d. v. s. paa et Tidspunkt, hvor den egentlige Vækstperiode nærmer sig sin Afslutning. Kaninerne er mærket ved Ankomsten.

Kontrolperioden omfatter 1 Aar. Dyrene er nyklippet ved Ankomsten og bliver klippet hver 3die Maaned, altsaa 4 Gange i Løbet af Kontrolperioden. Umiddelbart efter sidste Klipping sendes de tilbage til Ejeren.

Fodringen. Da der ikke har været Tale om en Fedning, som for Kød- og Pelskaninerne, men blot om en Fodring, saa Dyrene hele Tiden har kunnet være ved godt Huld og i god Kondition, har Fodringen været forholdsvis enkel. Om Sommeren er der om Morgenens givet tørt Kraftfoder, som iøvrigt har været af samme Sammensætning som Kød- og Pelskaninernes. Desuden har de faaet Grønt. Om Aftenen har de kun faaet Grønt, og Morgenens og Aftenens Grøntfodermængde har beløbet sig til ca. 350 g pr. Dyr. Om Vinteren er der om Morgenens foruden tørt Kraftfoder givet ca. 80 g Hø pr. Dyr og om Aftenen ca. 200 g Kaalroer pr. Dyr samt ca. 40 g Hø til de Dyr, der helt eller delvis havde ædt deres Høration fra om Morgenens. Yderligere er der lagt noget Byghalm i Burene ca. 3 Gange ugentlig. Hvad Foderets Mængde iøvrigt angaar, har der været fodret efter følgende Plan:

Dyrets Vægt, kg	pr. Dyr daglig	
	g F.E.	g Kraftfoder
Under 2,5 kg	ca. 90	35
Over 2,5 kg	> 105	50

Sundhedstilstanden har været god. Kun i eet af de 66 Hold er begge Kaniner døde. Desuden er der død en af Kaninerne i 5 Hold, ialt er 5,3 pCt. af Dyrene afgaaet inden Kontrollens Afslutning. Afgangsårsagen har i de fleste Tilfælde været Tarmbetændelse. Enkelte Dyr havde dog en vedholdende Snue, som dog ikke var værre, end at de kunde blive ved med at være under Kontrol, og det lykkedes i alle Tilfælde at begrænse Lidelsen til disse isolerede Tilfælde; om nogen Smittespredning var der ikke Tale. Mod Snue er givet indtil 3 Sulfanilamid-tabletter pr. Dyr daglig, desuden har man prøvet at dyppe de angrebne Dyrs Snuder i en Kloraminopløsning eller dryppe den med Jod.

Kontrolresultater.

Uldmængden. Hannernes gennemsnitlige Uldmængde har været 304 g og Hunnernes 327 g. Hunnerne har saaledes givet lidt mere Uld end Hannerne.

Kaninernes Vægt har ikke haft nogen Indflydelse paa Uldmængden, hvad Tallene i efterfølgende Tabel 21 viser.

Tabel 21. Kønnets og Legemsvægtens Indflydelse paa Uldens Mængde.

Gruppe Nr.	Gennem- snitsvægt ved sidste Klipning	Gennemsnitlig Uldmængde	
		ved sidste Klipning g	ved alle 4 Klipninger g
Hanner.			
1	2,40	88	297
2	2,65	88	308
3	2,91	88	307
Alle 3 Grupper	2,65	88	304
Hunner.			
1	2,66	98	326
2	3,00	102	330
3	3,28	96	323
Alle 3 Grupper	2,98	99	327

Uldmængden har saaledes været den samme, enten Dyrene har vejet $2\frac{2}{3}$ eller $3\frac{1}{3}$ kg ved sidste Klipning. Rigtignok giver Hunnerne, som er de tungeste, lidt mere Uld end Hannerne, men dette skyldes ikke Vægtforskellen; Hanner og Hunner af samme Vægt giver nemlig ikke lige megen Uld. I Tabel 21 vejer Hannerne i Gruppe 2 det samme som Hunnerne i Gruppe 1, men Hannerne har haft den mindste Uldydelse.

Uldens Kvalitet. I første Omgang foretoges en grovere Sortering i Filt og Uld i Forbindelse med en Sortering efter Længde.

	Sortering			Filt I	Filt II
	I	II	III		
Før 26. September 1944, cm	over 6	4—6	$2\frac{1}{2}$ —4	under $2\frac{1}{2}$ + ren Filt	snavset Filt
Fra og med 26. September 1944, cm	»	$7\frac{1}{2}$	6— $7\frac{1}{2}$ 4 —6	under 4 + ren Filt	snavset Filt

Indtil 26. September 1944 foretoges Sorteringen efter de paa vedkommende Tidspunkt i Handelen gældende Regler for Angorauldsortering, men ved et Møde paa Kaninkontrolstationen i Sommeren 1944 blev det vedtaget, at man snarest vilde gaa over til at sortere Ulden efter de før Krigen anvendte, langt strengere Regler, saa Resultaterne ogsaa kunde faa Betydning ud over Krigsperiodens unormale Aar, og som Skæringsdato valgtes den 26. September, da man derved opnaaede, at den overvejende Del af de i første Kontrol afsluttede Hold fik 2 Klipninger efter hver af de to Bedømmelser. Af de 57 Hold, hvori der har været

2 Dyr af forskelligt Køn under Kontrol, har de 51 haft 2 Klipninger før og 2 Klipninger efter den 26. September.

I og for sig havde der ikke været noget i Vejen for at samle alle 4 Klipningsresultater under eet, da I Sortering efter det først benyttede System svarer til I og II Sortering efter det nugældende System, II Sortering svarer til III Sortering, III Sortering + Filt I svarer til Filt I, og Filt II er det samme ved begge Bedømmelsessystemer, men en saadan Opgørelse vilde være behæftet med den væsentlige Ulempe, at den Uld, som nu deles i I og II Sortering, kom i samme Klasse, men da det netop er Ydelsen i disse to Sorteringer, som betyder mest, idet det gælder om at finde de Dyr, der giver den længste Uld, og i Særdeleshed Dyr, der giver Uld over $7\frac{1}{2}$ cm, har man valgt at foretage særskilte Opgørelser for henholdsvis Klipninger før 26. September og for Klipninger efter 26. September 1944.

Kønnets Indflydelse paa Mængden af Uld i Forhold til Mængden af Filt.

Hannerne giver betydeligt mere Filt end Hunnerne. Af Tallene i Tabel 22 vil man se, at det er især ved Klipningerne før den 26. September, at der har været meget Filt blandt Ulden, hvad man iøvrigt ogsaa paa Forhaand maatte regne med, da Angorakaninerne giver den korteste Uld og den meste Filt i Foraars- og Sommermaanederne.

Tabel 22. Kønnets Indflydelse paa Filtmængden.

Gennemsnit af Klip-		pCt. Uld	pCt. Filt
ninger før 26. Sep-	Hanner	63,8	36,2
tember 1944	Hunner	80,8	19,2
Gennemsnit af Klip-			
ninger efter 26. Sep-	Hanner	78,8	24,2
tember 1944	Hunner	88,6	11,4

Tabel 23. Kønnets Indflydelse paa Uldens Længde.

(Filtten ikke medregnet).


		Sortering		
		I	II pCt. Uld	III
Klipninger før 26.	Hanner	56,2	30,2	13,6
September 1944	Hunner	51,9	29,5	18,6
Klipninger efter 26.	Hanner	6,4	61,0	32,6
September 1944	Hunner	10,0	57,2	32,8

Disse Tal viser, at naar der ses bort fra Filtten, er der ingen Forskel paa Hannerne og Hunnerne Uld. Hunnerne, som giver den meste Uld, giver derfor saavel i I som i II og III Sortering mere Uld end Hannerne. I følgende Tabel og grafiske Fremstilling ses Forholdet.

Tabel 24.

		Ydelse i de enkelte Sorteringer, g				
		I	II	III	Filt I	Filt II
Klipninger før 26. September 1944	Hanner	47,6	25,6	11,5	31,1	17,0
	Hunner	56,4	32,0	20,2	13,0	12,8
Klipninger efter 26. September 1944	Hanner	8,7	83,5	44,5	35,0	1,8
	Hunner	17,5	100,1	57,4	18,8	3,7

Fig. VII. Kønnets Indflydelse paa Uldydelsen.



Paa den grafiske Fremstilling i Fig. VII vil man se, at i de første 3 Sorteringer ligger Kurverne for Hunnerne over Kurverne for Hannerne, hvorimod Kurverne for Hannerne ligger øverst paa Filtomraadet.

Der gør sig naturligvis ret store individuelle Forskelle gældende. I enkelte Hold har Hannen givet væsentlig mere Uld end Hunnen; det gælder baade for højtydende og lavtydende Hold, f. Eks. har i Hold Nr. 7 Hannen givet 383 g og Hunnen 360 g Uld, i Hold Nr. 60 har Hannen givet 62 g Uld mere end Hunnen, og i Hold Nr. 67 har Hannen endog givet 86 g Uld mere end Hunnen. Den store Forskel i sidstnævnte Hold skyldes dog sikkert, at Hunnen var usædvanlig slem til at plukke sig.

Den indbyrdes Variation mellem Hunnernes Ydelse er betydelig større end Variationen mellem Hannernes Ydelse. Medens de højstydende Hunner har givet over 400 g Uld ialt for alle 4 Klipninger, den højstydende endog 429 g, har den lavestydende kun givet 163 g. I dette Tilfælde har Hunnen dog ogsaa været slem til at plukke sig inden Klipningerne. Hannernes samlede Ydelse svinger fra 383 til 219 g.

Uldens Kvalitet i Forhold til dens Mængde.

Uldens Kvalitet er den samme, enten Dyret giver megen eller lidt Uld. Til Belysning af dette Forhold er de 51 Kuldsøskendepar delt i 3 Grupper efter samlet Ydelse, og for hver Gruppe er Uldens procentvise Fordeling i de enkelte Sorteringer undersøgt.

Tabel 25. Uldens Kvalitet i Forhold til dens Mængde.

Gruppe Nr.	g pr. Dyr gennem- snitlig	Ydelse i de enkelte Sorteringer, pCt.				
		I	II	III	Filt I	Filt II
Hanner ved Klipninger før 26. September 1944.						
1	154,8	33,9	20,0	8,6	25,3	12,2
2	129,8	39,0	19,4	9,0	20,1	12,5
3	113,9	34,9	18,1	8,4	24,7	13,9
Hunner ved Klipninger før 26. September 1944.						
1	160,3	43,6	23,1	14,4	10,2	8,7
2	133,5	40,4	23,8	15,0	8,9	11,9
3	109,4	41,5	24,8	16,0	9,9	7,8
Hanner ved Klipninger efter 26. September 1944.						
1	193,1	5,3	47,5	25,2	20,8	1,2
2	174,7	5,5	47,1	26,5	19,8	1,1
3	152,6	4,1	50,1	25,2	20,0	0,6
Hunner ved Klipninger efter 26. September 1944.						
1	222,4	9,0	49,3	28,7	10,9	2,1
2	200,2	10,2	50,0	29,1	8,8	1,9
3	169,9	7,1	53,3	29,6	8,6	1,4

Det er altsaa ikke tilstrækkeligt, at der i Avlsarbejdet lægges Vægt paa Dyr, der giver megen Uld, man maa samtidig lægge Mærke til, hvilke Dyr, der giver lang Uld, saaledes at en langt større Del af Produktionen bliver i Form af Uld, der er længere end $7\frac{1}{2}$ cm.

Som Eksempel paa et Avlsdyr, der har givet Afkom med lang Uld, kan nævnes Han A. 898. Efter denne Han er 3 Hold, Nr. 22, 23 og 24, blevet kontrolleret, og Ydelsens procentvise Fordeling i de enkelte Sorteringer for disse 3 Hold ses i Tabel 26.

Tabel 26. Uldens Mængde og Kvalitet for 3 Hold efter Han A. 898.

		g Uld pr. Dyr gennem- snitlig	Ydelse i de enkelte Sorteringer, pCt.				
			I	II	III	Filt I	Filt II
Klipninger før 26. September 1944.							
Hanner		127,0	42,3	17,8	7,1	15,7	17,1
Hunner		132,0	45,7	20,0	13,9	8,8	11,6
Klipninger efter 26. September 1944.							
Hanner		161,0	29,0	40,0	13,9	16,1	1,0
Hunner		185,7	16,7	53,1	22,5	6,1	1,6

Dyrene i Hold 22 og 24 er iøvrigt fra samme Kuld, og Dyrene i Hold 23 er efter samme Morfar som Dyrene i Hold 22 og 24.

Uldmængden for disse 3 Hold har været under Stationens Gennemsnit, Kvaliteten har derimod ligget betydeligt over; selv efter Indførelsen af de strengere Regler den 26. September 1944 er ikke mindre end 29 pCt. af Hannernes Uld gaaet i I Sortering. Hunnernes Uld er knap saa god, men 16,7 pCt. Uld i I Sortering er dog et fint Resultat i Betragtning af, at som Gennemsnit for de 51 Hunner har ikke mere end 8,8 pCt. af Ulden været i I Sortering.

Uldens Klassificering.

Foruden den grovere Sortering efter Længde er der foretaget en finere Sortering eller Klassificering. Ved denne tages der ikke blot Hensyn til Længden af Ulden, men man undersøger Mængden af Dækhaar og af Uldhaar, og der tages desuden Hensyn til Uldhaarenes Krusning. Jo færre Dækhaar og jo flere Krusninger paa Uldhaarene desto bedre Uld. Denne Bedømmelse foretages paa Grundlag af en lille Tot Uld, som er taget ved Klippingen om Efteraaret fra Dyrets Side bag Forlemmerne.

Kønnets Indflydelse paa Uldkvaliteten.

Ved denne Bedømmelse har Hannerne været Hunnerne overlegne, og endda ret betydeligt. Ulden er delt i 4 Klasser, men bortset fra 4. Klasse er Klasserne delt i Underklasser, saaledes som fremstillet i Tabel 27.

Tabel 27. Kønnets Indflydelse paa Uldkvaliteten.

		Klasse							
		I	I+	II+	II	II+	III+	III	IV
Hanner	Antal	17	2	12	21	1	2	2	0
	pCt.	29,8	3,5	21,1	36,8	1,8	3,5	3,5	0
Hunner	Antal	4	0	0	12	12	1	25	3
	pCt.	7,0	0	0	21,1	21,1	1,8	43,8	5,2

Man vil lægge Mærke til, at Hannernes Uld kun i enkelte Tilfælde er gaaet under II Klasse, medens det nærmest er undtagelsesvis, at Ulden af en Hun er kommet i I Klasse. Hannernes Uld er saaledes den bedste.

Foderforbruget til en given Vægt Uld i Forhold til Legemsvægten.

I Almindelighed har Handyr et større Vedligeholdelsesbehov end Hundyr. Ifald dette ogsaa gælder for Angorakaniner, maa Foderforbruget til en given Mængde Uld være større for Hannernes end for Hunnernes Vedkommende. Dette har ogsaa været Tilfældet her. Hanner, som gennemsnitlig ved sidste Vejning vejede 2,65 kg, har, saaledes som man kan se af Tabel 28, brugt 10,7, medens Hunner, der vejede 2,66 kg, brugte 9,8 F.E. til Produktion af 100 g Uld, og


Hanner, der har vejet 2,91 kg, har brugt 11,1, medens Hunner, der vejede 3,00 kg, har klaret sig med 10,2 F.E. til Produktion af 100 g Uld. Selvom Hunnerne gennemsnitlig er tungere end Hannerne, ligger deres Foderforbrug til Produktion af 1 kg Uld gennemsnitlig under Hannernes.

Tabel 28. Foderforbrug pr. Dyr og pr. 100 g Uld ved forskellig Legemsvægt.

Gruppe	Gennemsnitlig Vægt ved sidste Klipping kg	F.E. ialt pr. Dyr	Samlet Uldydelse g	F.E. pr. 100 g Uld
Hanner.				
1	2,40	32,5	297	10,9
2	2,65	33,0	308	10,7
3	2,91	34,0	307	11,1
Alle 3 Grupper	2,65	33,1	304	10,9
Hunner.				
1	2,66	31,9	326	9,8
2	3,00	33,5	330	10,2
3	3,28	34,1	323	10,6
Alle 3 Grupper	2,98	33,1	327	10,1

Naar Uldmængden, som tidligere vist, paa det allernærmeste er den samme for tunge og lette Handyr og den samme for tunge og lette Hundyr, kunde der være Grund til at vente, at de store Dyr krævede lidt mere Foder til en vis Vægt Uld, end de smaa Dyr, da store Dyr nemlig kræver et større dagligt Vedligeholdelsesfoder end de smaa. Ved nærværende Undersøgelser har de lette Hunner ogsaa krævet ganske lidt mindre Foder til Produktion af 100 g Uld end de tunge, medens en saadan Forskel ikke har været til Stede for Hannernes Vedkommende.

I denne Forbindelse skal der dog gøres opmærksom paa, at det ikke er muligt at kontrollere helt nøjagtigt, hvor meget de enkelte Dyr har ædt, idet der altid spildes lidt af Grovfoderet (Grøntfoder, Hø og Halm), og dette Spild kan have været lidt større for nogle af Dyrene end for andre.



Kontrolstationens Bygning og Indretning.

Af *H. G. Skovgaard.*

Plan-Disposition.

For at staa friest muligt med Hensyn til at belægge Burene med de forskellige Racer, havde man tidligt opgivet at indrette særskilt Angorastald og var enedes om at have alle Racer i eet Rum. Der skulde være Plads til ca. 1000 Dyr, og der skulde være 3 forskellige Burstørrelser. Den endelige Deling blev:

189 Stk. A Bure	102 × 102 cm
78 Stk. B Bure	82 × 82 cm
186 Stk. C Bure	68 × 68 cm


Ialt 453 Bure

til ca. 900—1000 Dyr, hvortil føjedes en udendørs Sygestald med 12 Bure.

Af økonomiske Grunde valgtes en bred Stald med 3 Gange og 6 Burrækker og belyst med Ovenlys over Gangene. Bygningshøjden bestemtes af Burhøjden 220 cm, som faas med 3 Etager, hvor øverste Burbund ligger 154 cm over Gulv, hvad der er Maksimum for praktisk Fodring, og nederste Bund 23 cm over Gulv, bestemt af det Krav, at der under Burene skulde være Plads til løse Foderkasser for hvert Bur, altsaa under hver Kolonne. Hele Bygningen maaler 340 m² og 1110 m³ brutto. Staldrummets Nettoareal er 246 m².

Materialer.

Bygningen er rejst over et let Skelet af Bindingsværk, som bærer Taget og støtter Vægbeklædningen. Væggen bestaar af 10 cm Gasbeton berappet udvendig og afkostet og hvidtet indvendig. Da Væggen ligger udenpaa Stolperne kunde den



mures i Forbandt og derved blive langt tættere. Den staar altsaa som en Skalmur og er holdt paa Plads dels med Søm i Stolperne og dels derved, at Tagremmen ogsaa er lagt udenpaa Stolperne. Gasbetonvæggen faar derved noget af Tagets Tryk.

En saa spinkel Konstruktion som denne vil selvsagt give nogen Bevægelse, og Gasbetonpladerne vil altid arbejde i saa store Flader. Hvad der er kommet af Revnedannelse er dog ganske uden Betydning. Skalmuringen har endvidere bevirket, at der opstod et Hulrum mellem Burene og Væggen, som er af stor Værdi for Isoleringen og Ventileringen.

Taget, hvis Hældning er 11° , bestaar af Tagpap paa Brædder og er isoleret med 35 mm Træbetonplader, oplagt paa Trekantlister imellem Spærene, inden Taget blev lukket. Dette er en billig Metode, bl. a. fordi man da kan udkaste Træbetonen Plade for Plade, mens man har dem nede. Fæstnelsen paa Lister paa Spærsiderne er ogsaa mere tiltalende end at sømme de tunge Plader under Spærene, hvilket rummer den Fare, at Sømhovederne efterhaanden arbejder sig op i Pladerne.


Belysning.

Ovenlysvinduerne er udført med kitfri Sprosser (Omega) med Dugrender og har vist sig meget tætte. De er ikke anbragt som gennemløbende Baand, men derimod punktvis hen over Gangene. Lyset er dog tilfredsstillende jævnt fordelt, og passende stærkt og Tagets Vandafledning er derved blevet meget lettere. Af Hensyn til Tætheden og Økonomien er der ikke indrettet Opluk i Ovenlysvinduerne. Forholdet mellem Ovenlys og Gulvareal er 1 : 4 og mellem netto Glas- og Gulvareal 1 : 4,9. Disse Tal maa kun med Forsigtighed anvendes ved Sammenligning med andre Stalde, fordi Burreolerne næsten spalter Rummet fra Gulv til Loft, saa at Rummet ikke kan betragtes som en Enhed.

Ventilation.


Anlægget er dimensioneret af Civilingeniør Jörn Høgsbro.

Paa Grund af Materialesituationen er Udsugnings-Skorsten og -Hætte udført som en 6-kantet Trækonstruktion 2,3 m høj, beklædt udvendig og indvendig med



Plan og Vestfacade.

H. G. Skovgaard. Arkitekt. M. A. A.




Eternitplader med Rockwoolmaatter imellem. Det 6-kantede Udsugningsareal maa-
ler 13 000 m², og hvis man kun regner med den indskrevne Cirkels Areal faas
11 900 m² eller 12 cm² pr. Kanin. Til Friskluftsindsugning er der anbragt 20 Stk.
Ventiler med Reguleringsklap lavt i Murene, ialt 8000 cm².

Ved en Stald som denne maa der tages ekstra Hensyn til Udluftning i Sommer-
tiden, der er derfor under Tagskægget i hele Bygningens Længde indrettet en
10 cm Spalte, som om Vinteren lukkes med løse Bræddeklapper. Desuden er der
regnet med aabentstaaende Døre i Sommertiden. I nogle af Dørene kan den øverste
Halvdel aabnes for sig. Den samlede Varmetransmission fra Stalden bliver $\Sigma F \times$
 $k = 698 \text{ kg}^\circ \text{ ved } 1^\circ \text{ Temperaturdifferens}$, idet der for Væggens Varmeledning
sættes $k = 1,2$ og for Loftet $k = 0,8$. Regnes med fuld Belægning, 1000 Dyr,
faas da Varmetabet pr. Kanin til $0,70 \text{ kg}^\circ \text{ ved } 1^\circ \text{ Differens}$.

Kaninburene.

Disse er udført helt i høvlet Træ. Sider og Bagvæg og løse Bunde af $\frac{1}{2}$ " pl.
Brædder, hvor Siderne danner det bærende Led. Forsiderne har dels smalle,
hængslede Laager og dels en aftagelig Ramme, som spænder over 2 Bure i Bredden,
og hvori Foderspalte og -brædt er indbygget. Disse Laager og Rammer aabner




for alle 3 Etager under eet. Bundene er lette at udtage og rense. De er imprægnerede, men vil dog næppe holde mange Aar. Under normal Materialesituation bør de udføres af noget mindre forgængeligt end Træ f. Eks. Eternit. Burene er fremstillet fabriksmæssigt af Sorø Sfakitfabrik efter min Tegning og kostede i 1943 ca. 26 Kr. pr. Rum incl. de løse Foderkasser. (Se Tegningen paa næste Side).

Foderrum m. m.

Ved Staldens Nordende er tilbygget en Lade til Straafoder, Grøntfoder og Strøelse. Den er højere end Stalden, og Gulvet er sænket, saa selvom den er lille i Plan, rummer den godt (240 m³). Ladens Vægge er kun af pløjede Brædder.

I Sydenden er Bygningen forlænget 3 m, hvorved der er blevet Plads til et Antal nødvendige Smaarum: Redskabsrum med Vand og Haandvask, Roerum med sænket Gulv, som rummer ca. 18 m³ Roer, Kartoffelrum, Kraftfodersilo, saadan indrettet, at Foderet kan udtages med Haandskuffe lige over Vægtbordet, som staar paa Staldens Tværgang. Derefter følger en Klippestue med Klippestol og et Bord med nedsænkede, lette Trækasser til de 5 Sorteringer af Ulden og Filten og endelig et lille Kontor. I Klippestuen er opstillet en Ovn til Kartoffelkogning, som tillige giver Varme i de smaa Rum.



Kaninbure. Type A.

H. G. Skovgaard, Arkitekt. M. A. A.

Til Fodringen er bygget en rummelig Fodervogn paa gummibelagte Kugleleje-hjul, som er let at trille, og som trods sin Størrelse kan sno sig om Hjørnerne. Baade Langgange og Tværgange er kun 1,5 m brede.

HOVEDTABELLER

KØD- OG PELSKANINER 1944

	Holdets				Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Alder i Dage ved	
	Nr.	Fød- sels- dato	Fader	Moder	Begyndelse		Slutning		Kontrollens Beg.	Lev. til Slagteri
					Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		
Alaska.										
V. Dalentoft, Rindum, Ringkøbing	78	12-3	JO11	826H	2	1	2	0	65	222
Havanna.										
I. Christensen, Vejlands Allé, Kbh. S.	64	8-1	314G	1D07	1	1	1	1	73	232
Lille Chinchilla.										
W. F. Frøberg, Højskole Allé 9, Kastrup, Amager	94	18-3	OL52	68R5	2	1	2	1	87	232
» »	175	17-8	OL52	69R5	2	1	1	1	103	211
Legind Hansen, Bøgildgaard pr. Kjellerup	109	8-4	783U	823U	2	1	2	1	66	184
» » »	114	20-4	58E7	893S	1	2	1	1	68	205
Lille Sølv.										
P. Bredtoft, Slotsvænget 43, Hillerød	58	23-2	43MO	45KO	2	1	1	1	83	193
Holger Jeppesen, Vindinge pr. Roskilde	90	25-2	F76	6L50	2	1	2	1	109	218
Hvid Landkanin.										
Aagaard Andersen, Nørregade, Rødskærsbro	89	9-3	50ÆO	6X79	1	1	1	1	96	185
Erik Andersen, Øvej, Slangstrup	31	3-3	251Æ	248Æ	1	2	1	2	60	206
» »	39	6-3	246Æ	252Æ	1	2	0	2	71	188
» »	146	19-6	251Æ	08B8	1	2	1	2	78	191
» »	147	20-6	3B56	252Æ	2	1	1	1	77	181
Kr. Andreassen, Strandbygaard, Vejby	55	1-3	697S	0G24	2	1	2	1	76	234
» »	95	28-3	697S	700S	2	1	2	1	77	219
C. J. Benediktson, Grauballe	166	2-7	O2N1	98NO	2	1	1	1	78	158
J. Enemark, E/V Ansager	47	1-3	139G	148G	1	2	0	2	76	223
» »	138	6-6	JR28	ZO76	2	1	1	1	77	194
» »	139	10-6	JR28	95E5	1	2	1	2	73	200
A. Frederiksen, Springstrup pr. Holbæk	61	5-5	O2U4	90C1	1	2	1	2	67	190
Robert Groth, Katterød, Fyn	72	11-3	4900	4L98	1	2	1	1	66	223
L. Hansen, Gredsted pr. Gredstedbro	15	19-2	Z486	Z484	2	1	1	1	73	237
» » »	16	22-2	Z486	Z481	2	1	2	1	70	206
R. Hansen, Danmarksgade 43, Horsens	24	29-2	O1Z7	451Æ	2	1	2	1	64	226
» » »	136	8-5	4500	4460	1	2	1	1	93	170

Dyrenes Vægt i kg ved		Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit pr. Dyr						Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g		Antal Skind i Klasse			Døde Kaniner	
Kon- trol- lens Beg.	Lev. til Slag- teri			Levende Vægt på Slagteriet kg	Slagtet Vægt kg	% Slagte- svind	Krop- længde cm	Points for Kodfyde (0-10)	I	If	Iff	II	III	Frisk	Tør- ret	I	II	III	Antal	Dato	
0,86	2,64	13	6,62	2,45	1,53	37,8	38,5	6,0	2					260	130	1	1		1	11- 7	
1,22	2,90	10	10,53	2,70	1,56	42,4	38,5	9,0	1	1				293	140	1	1		1	19- 3	
1,50	2,75	11	9,28	2,50	1,48	40,7	36,7	9,4	1	2				297	158		3				
1,47	2,67	12	8,15	2,45	1,48	39,6	37,0	8,5		2				278	126	1	1	1	1	4-12	
0,89	2,74	18	5,43	2,47	1,42	42,6	37,7	8,6	1	1	1			252	122	2	1				
0,96	2,90	13	7,65	2,55	1,50	41,2	38,5	8,5		2				285	158	1	1	1	1	12- 7	
1,29	2,54	10	9,86	2,37	1,46	38,6	37,0	8,0	1	1				230	110		2		1	8- 6	
1,12	2,38	12	8,89	2,13	1,27	40,6	36,0	8,3	1	2				243	115	2	1				
1,56	3,09	18	6,38	2,83	1,73	38,9	39,5	8,5	2					288	128	2			1	1- 6	
0,85	3,29	18	5,66	2,93	1,77	39,8	42,0	7,7	2		1			265	122	2	1				
1,00	3,17	18	5,96	2,90	1,75	39,7	41,5	8,5	1	1				288	133	1	1		1	17- 7	
1,57	3,42	19	5,96	3,05	1,90	37,7	40,7	8,0	2	1				327	165		3				
1,39	3,39	20	5,55	3,03	1,73	43,0	41,5	8,0	2					300	148	2			1	12- 9	
1,12	3,37	14	7,56	3,00	1,83	38,9	39,7	9,3		1	1	1		307	150		3				
1,27	3,23	15	7,23	2,97	1,78	39,9	42,3	7,7		1	1	1		332	170		3				
1,33	3,35	22	4,80	2,98	1,65	44,5	40,0	8,0	1			1		283	140	1	1	1	1	1-10	
1,39	3,46	13	8,03	3,10	1,90	38,7	42,0	9,5		2				345	170	2			1	27- 8	
1,57	3,98	19	6,29	3,55	2,08	41,6	42,0	8,5	2					408	207		2		1	14-10	
1,34	3,41	18	6,11	3,07	1,88	38,6	40,0	9,0	2	1				327	178	1	2				
1,19	3,49	19	5,32	3,05	1,75	42,6	42,0	7,7	3					353	177	1	2				
0,67	3,11	16	6,02	2,80	1,65	41,1	41,0	7,9	2					295	145		2		1	21- 5	
0,79	3,61	18	5,18	3,29	2,03	38,4	42,5	10,0			1		1	313	158	2			1	1- 6	
0,84	3,16	20	4,86	2,93	1,70	42,1	43,3	7,9	2			1		300	137	2	1				
0,76	3,24	16	6,12	2,95	1,77	40,1	42,3	8,3	2	1				315	158	2	1				
1,79	3,55	19	5,77	3,18	1,75	44,9	43,5	8,9	2					330	158		2		1	11- 9	

KØD- OG PELSkanINER 1944

	Holdets				Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Alder i Dage ved	
	Nr.	Fød- sels- dato	Fader	Moder	Begyndelse		Slutning		Kontrollens Beg.	Lev. til Slagteri
					Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		
<i>Folmer Jensen,</i>										
Stagsted, Hjallerup	132	12-5	08A4	94PP	2	1	2	1	88	229
» »	133	20-5	08A4	82PZ	2	1	2	1	80	211
<i>Axel Jørgensen,</i>										
Rødkærbro	79	9-3	50ÆO	6X78	2	1	2	1	68	238
<i>Søllestedgaards Kaninstutteri,</i>										
Søllested	30	3-3	R244	04B1	2	1	1	1	60	231
»	33	4-3	8B74	179Æ	1	2	1	1	59	198
»	37	6-3	R244	03B7	2	1	2	1	71	188
»	38	6-3	R244	181Æ	1	2	1	1	71	181
»	50	2-3	300Æ	J8R0	2	1	2	1	75	207
»	51	4-3	03B5	182Æ	1	2	1	1	73	212
»	54	3-3	300Æ	04B6	2	1	2	0	74	235
»	113	3-3	40	07-42	2	1	2	1	116	202
<i>H. Larsen,</i>										
Botofte Kaninfarm pr. Tranekær	134	29-5	M2680	773J	2	1	1	1	71	202
» » » »	135	23-5	M2680	770J	2	1	1	1	77	154
<i>J. Larsen,</i>										
Reerslev pr. Hedehusene	41	6-3	48G3	5100	2	1	1	1	71	188
» » »	42	6-3	6003	U754	2	1	1	1	71	210
» » »	137	25-5	6003	406B	2	1	2	0	75	207
» » »	155	30-6	6003	39B1	2	1	2	1	81	217
» » »	156	2-7	6003	414B	2	1	2	0	79	196
» » »	158	20-6	6003	6L72	2	1	2	1	91	213
» » »	159	20-6	6003	X	2	1	1	1	91	230
» » »	160	19-6	6003	9B49	2	1	2	0	92	196
» » »	161	28-6	6003	96B3	2	1	1	1	83	207
» » »	162	29-6	6003	OB19	2	1	1	1	82	221
» » »	164	20-6	6003	5100	2	1	2	1	91	213
<i>H. Løjmand,</i>										
Bødkegaarden, Karleby Falster	10	7-2	E535	E2276	2	1	2	1	85	211
» » »	11	12-2	E535	4D31	2	1	2	1	80	197
» » »	100	8-4	U1320	70C4	1	2	0	2	66	163
» » »	101	8-4	U1320	69C4	2	1	2	1	66	196
» » »	106	9-4	E535	B18	1	2	1	2	65	159
» » »	107	9-4	3N57	99B7	1	2	1	2	65	198
» » »	108	8-4	E535	M2682	1	2	1	2	66	166
» » »	111	13-4	U1320	68E4	2	1	1	1	61	253
» » »	112	13-4	U1320	32	2	1	2	1	61	196
<i>Knud Messerschmidt,</i>										
Sønderskov pr. Birkerød	84	18-3	f. 1942	f. 1941	2	1	2	1	87	229
<i>Eilif Nielsen,</i>										
Jyderup pr. Vig	128	22-5	H2079	87FO	1	2	1	1	78	209
» » »	129	21-5	H2079	R587	1	2	0	2	79	183
<i>Grove Nielsen,</i>										
Frølund pr. Hejnsvig	26	2-3	E2095	519G	2	1	1	1	61	213

Dyrenes Vægt i kg ved		Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit pr. Dyr						Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g		Antal Skind i Klasse			Døde Kaniner	
Kon- trol- lens Beg.	Lev. til Slag- teri			Levende Vægt paa Slagteriet kg	Slagtet Vægt kg	% Slagte- svind	Krop- længde cm	Points for Kødfyld (0-10)		I	If	Iff	II	III	Frisk	Tør- ret	I	II	III	Antal	Dato
1,56	3,33	15	7,91	2,98	1,80	39,7	40,0	8,6	3						373	190	2	1			
1,51	3,41	15	7,53	3,15	1,88	40,2	39,3	8,0	2	1					357	188	3				
0,97	3,52	17	6,07	3,15	1,92	39,2	40,7	8,7	1	1	1				358	198	1	2			
0,58	3,37	16	5,53	2,98	1,80	39,5	41,0	8,0	1	1					348	175	2			1	28- 7
0,59	3,12	18	5,35	2,74	1,65	39,8	42,5	7,5	2						300	138	2			1	17- 5
1,37	3,29	17	5,96	3,05	1,78	41,5	41,7	8,3	2	1					322	142	3				
1,45	3,24	17	6,30	2,89	1,81	37,5	40,5	9,0	2						299	133	2			1	14- 8
1,33	3,25	15	7,19	2,90	1,45	39,7	40,7	8,0	3						293	138	2	1			
1,40	3,32	14	7,86	2,98	1,83	38,7	40,5	8,0	1	1					298	145	1	1	1	1	1- 6
1,09	3,23	14	7,21	2,83	1,60	43,4	39,0	8,0	2						315	153	2			1	27- 7
1,92	3,05	13	9,01	2,76	1,58	42,6	40,0	8,0	2	1					320	142	3				
1,69	3,82	17	6,62	3,48	2,13	38,9	44,5	8,5	1	1					400	205	1	1		1	13-10
1,85	3,35	18	6,92	2,85	1,65	42,1	43,0	7,5	2						255	118	1	1	1	1	5-10
0,92	2,99	16	6,39	2,73	1,65	39,5	39,5	8,5	2						275	118	2			1	9- 6
1,02	3,25	16	6,33	2,85	1,70	40,4	41,5	7,5	2						293	135	2			1	25- 6
1,27	3,94	23	4,89	3,58	2,08	42,0	42,5	9,0		1	1				423	210	1	1		1	29- 8
1,23	3,15	16	7,00	2,73	1,67	39,0	39,7	8,0	2	1					323	177	1	2			
1,04	3,10	18	6,18	2,73	1,70	37,6	37,5	8,0	1	1					325	158	1	1	1	1	6-10
1,38	3,21	19	5,82	2,95	1,75	40,7	40,0	8,3	2	1					345	175	2		1		
1,61	3,35	18	6,42	2,95	1,78	39,8	39,0	8,5	1	1					308	168	2			1	8-10
1,56	3,37	19	6,23	2,98	1,78	40,3	39,5	9,0	1	1					325	160	2			1	29- 9
1,24	3,08	16	7,00	2,70	1,68	38,0	39,0	8,5	1	1					325	170	1	1		1	2-11
1,43	3,32	16	6,94	2,98	1,90	36,1	40,5	8,5	1	1					350	180	2			1	9-11
1,30	3,41	22	5,15	2,97	1,98	33,2	41,3	8,0	2	1					338	170	1	2			
1,36	3,27	16	6,96	3,07	1,78	42,0	43,0	8,7	2	1					325	153	2	1			
1,94	3,80	19	6,14	3,60	2,18	39,4	43,0	10,0				3			332	153	3				
1,00	3,18	22	4,61	3,00	1,70	43,3	41,0	7,5	2						283	128	2			1	24- 6
1,08	3,12	16	6,82	2,85	1,67	41,5	41,3	7,7	3						285	153	1	2			
1,19	3,03	19	5,38	2,88	1,68	41,6	40,7	8,0	3						260	125	1	2			
1,38	3,57	17	6,31	3,17	1,83	42,1	41,0	9,0	3						367	187	3				
1,60	3,46	21	5,17	3,18	1,85	41,9	43,0	9,4	2			1			305	137	1	2			
0,98	3,31	14	7,45	3,00	1,85	38,3	41,0	8,5	1	1					313	163	2			1	23- 7
1,01	3,41	18	5,79	3,02	1,77	41,6	41,0	8,0	3						290	148	3				
1,28	3,26	16	6,80	2,95	1,75	40,7	41,0	7,7	1		2				328	185	1	2			
1,68	3,71	17	6,54	3,35	2,05	38,8	44,0	8,0	2						320	163	2			1	15- 8
1,51	3,68	19	6,25	3,20	1,90	40,6	43,0	8,5	2						345	160	2			1	18- 8
0,90	3,38	19	5,13	3,10	1,78	42,7	39,5	9,0		2					340	173	2			1	23- 8

KØD- OG PELSkanINER 1944

	Holdets				Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Alder i Dage ved	
	Nr.	Fød- sels- dato	Fader	Moder	Begyndelse		Slutning		Kontrollens Beg.	Lev. til Slag- teri
					Han- ner	Hun- ner	Han- ner	Hun- ner		
<i>Oluf Olsen,</i>										
Køgevej, Thorslunde pr. Taastrup	116	19-4	7L49	09K7	2	1	2	1	69	179
» » » »	123	6-5	7L49	6D24	2	0	2	0	66	206
» » » »	152	29-6	41M5	6D28	1	2	1	2	68	200
» » » »	154	7-7	41M5	6D07	2	1	1	1	60	163
<i>Charles Pedersen,</i>										
Svendborgvej, Hjallelse	117	15-3	4048	484J	1	2	1	2	117	207
» » » »	118	28-3	4048	477J	0	3	0	3	105	207
<i>Rs. Rasmussen,</i>										
Kishjerg pr. Nymark, Fyn	81	14-3	V1319	Z160	2	1	1	1	91	202
» » » »	126	11-5	V1319	Z1168	2	1	2	1	75	207
<i>Johs. Woidemann,</i>										
Helsingø	44	5-2	17B1	41K1	1	2	1	2	101	218
»	45	6-2	17B1	13K1	1	2	1	2	100	212
»	46	11-2	17B1	95KO	1	2	1	2	95	207
Blaa Wiener.										
<i>Anna Andersen,</i>										
Ved Lundegaard Teglværk, Bred	25	2-3	4L20	6L32	1	2	1	2	61	227
<i>Viggo Beck,</i>										
Agerskov pr. Over Jersdal	80	17-3	B898	096D	1	2	1	2	88	192
<i>S. Børgesen,</i>										
Tamsborgvej 52, Hillerød	92	28-3	76Z4	R196	2	1	2	1	77	181
» »	93	29-3	76Z4	R197	1	2	1	1	76	165
» »	110	5-4	E059	R155	2	1	2	1	69	195
<i>H. Daugaard,</i>										
Karrebæk pr. Karrebæksminde	32	3-3	HS131	518Æ	2	1	1	1	60	191
» » »	67	1-3	HS131	2105	2	1	2	0	76	193
» » »	68	3-3	HS131	2405	1	2	1	2	74	191
» » »	69	3-3	HS131	2505	1	1	1	1	74	191
» » »	103	3-4	HS131	2205	1	2	1	2	71	180
» » »	104	5-4	HS131	1905	3	0	3	0	69	160
» » »	105	5-4	HS131	1805	1	2	1	2	69	204
<i>Jens Gravesen,</i>										
Vig	57	8-3	17R5	20R5	2	1	1	1	69	194
<i>B. Henriksen,</i>										
Kirkegade 110, Esbjerg	91	9-2	Z701	Z682	1	2	1	2	114	204
<i>Erik W. Hou,</i>										
Klostervang, Hillerød	27	2-3	R204	543Z	2	1	2	0	61	240
» »	36	4-3	R204	R211	1	2	1	2	59	219
» »	74	16-3	R204	R205	0	2	0	2	61	205
» »	170	25-7	R204	R206	1	2	1	2	70	188
<i>Børge Jensen,</i>										
Rørby pr. Kallundborg	6	22-2	34FO	23FO	1	2	0	2	71	223
» » »	7	16-2	34FO	22FO	1	2	1	1	77	229
» » »	8	12-2	34FO	21FO	2	1	1	1	81	211

Dyrenes Vægt i kg ved		Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit pr. Dyr						Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g		Antal Skind i Klasse			Døde Kaniner	
Kon- trol- lens Beg.	Lev. til Slag- teri			Levende Vægt paa Slagteriet kg	Slagtet Vægt kg	% Slagte- svind	Krop- længde cm	Points for Kødryde (0-10)		I	If	Iff	II	III	Frisk	Tør- ret	I	II	III	Antal	Dato
1,58	3,26	17	6,58	3,00	1,70	43,3	41,0	7,7	2				1		327	163	1	1	1		
1,78	3,77	15	6,36	3,38	2,05	39,3	41,0	9,5		2					420	213		2		*)	
1,45	3,34	17	6,54	3,03	1,92	36,8	40,0	8,3	2	1					360	210	1	2			
1,30	3,20	17	6,25	2,83	1,63	42,5	38,5	8,5	2						338	170		2		1	13-10
2,06	3,26	15	7,56	2,82	1,58	43,8	41,7	7,4	1	1			1		303	143		3			
2,03	3,25	12	9,56	2,93	1,73	40,9	41,7	8,7	2	1					312	150		2	1		
1,44	3,49	20	5,46	3,08	1,88	39,0	40,5	8,0	1	1					343	163	1	1		1	2- 8
1,42	3,60	17	6,61	3,23	1,92	40,7	40,7	7,7	1	2					400	217		3			
1,85	3,12	11	9,85	2,85	1,70	40,4	39,3	8,3	1	1			1		302	137	1	2			
1,81	3,27	14	8,40	3,04	1,84	39,3	41,3	9,0	2	1					315	150	1	2			
1,83	3,32	15	7,99	3,07	1,85	39,7	41,0	8,6	2	1					343	142	1	2			
0,72	3,94	20	5,20	3,35	1,88	43,8	44,7	8,0	3						307	147	1	2			
1,65	3,78	21	5,55	3,53	1,95	44,8	44,0	8,3	3						352	162	1	2			
1,75	3,95	25	4,51	3,58	2,07	42,3	43,3	8,6	1				2		333	152		2	1		
1,39	3,78	30	3,73	3,58	1,98	44,8	43,0	8,0	1				1		318	135		1	1	1	15- 6
1,52	3,77	18	6,29	3,31	1,97	40,6	43,3	8,3	2	1					315	155	1	2			
0,64	3,74	24	4,34	3,43	2,03	40,9	44,0	9,0	1				1		303	135			2	1	17- 5
1,34	3,84	19	5,98	3,58	2,15	39,9	44,0	9,0	2						353	158	1	1		1	25- 5
1,26	3,74	22	4,65	3,48	2,10	39,7	45,0	9,3	1				2		312	132		2	1		
1,11	3,71	22	4,92	3,48	2,05	41,0	43,5	9,0	1				1		289	132		1	1	1	15- 5
1,13	3,43	21	5,27	3,10	1,85	40,3	43,0	7,7	2					1	288	135			3		
1,08	3,93	22	5,04	3,52	2,03	42,2	45,0	8,3	3						330	175		3			
1,11	3,54	20	5,64	3,16	1,85	41,4	44,0	7,4	1				2		310	153		3			
1,22	3,81	19	5,48	3,39	1,98	41,7	44,5	7,5					1	1	255	128		2		1	3- 6
2,10	3,66	20	5,84	3,48	1,98	43,1	45,3	9,0					3		300	133	1	2			
0,74	3,91	17	5,92	3,48	2,15	38,2	44,0	9,0	1				1		320	155		2		1	6- 8
0,91	4,05	21	4,97	3,58	2,10	41,4	44,7	9,0	2				1		347	172	1	2			
0,95	3,75	21	4,87	3,35	2,03	39,6	44,5	8,0	2						335	138		1	1	1	16- 5
1,78	3,84	21	5,73	3,43	2,13	37,9	44,0	9,0	1				2		293	147			3		
1,31	4,14	19	5,91	3,67	2,25	38,7	46,0	9,0	1				1		375	170		2		1	14- 5
0,94	3,86	19	5,51	3,48	2,10	39,7	44,0	9,0		1			1		373	190	1		1	1	22- 5
1,42	3,77	19	5,81	3,45	2,05	40,6	44,0	9,0	1				1		338	160		2		1	13- 5

*) Kun to Dyr.

KØD- OG PELSKANINER 1944

	Holdets				Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Alder i Dage ved	
	Nr.	Fød- sels- dato	Fader	Moder	Begyndelse		Slutning		Kontrollens Beg.	Lev. til Slag- teri
					Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		
<i>Georg Madsen,</i>										
Sorring pr. Toustrup	62	2-5	5G67	6H60	2	1	1	1	84	198
» » »	63	6-5	5G67	OX36	2	1	2	1	80	194
<i>P. Skovborg Nielsen,</i>										
Serridslev pr. Tvingstrup	169	31-7	69L9	31L9	1	1	1	1	64	139
<i>Laurits M. Peyk,</i>										
Skodborg, Jylland	14	13-2	ZO6	ZO9	1	2	0	2	79	240
Hvid Wiener.										
<i>H. Johansen,</i>										
Dalgas Avenue 19, Aarhus	168	1-7	5E03	O5N3	1	2	1	2	80	239
Bourgogne.										
<i>Egekrogens Kaninfarm,</i>										
Nærum	17	24-2	2S36	E264	1	2	1	2	68	255
»	18	24-2	K1058	E263	2	1	1	1	68	243
»	21	24-2	K547	K541	2	1	1	1	68	261
<i>Anton Hansen,</i>										
Hannerup pr. Hobro	28	25-2	4X93	01X0	1	2	0	2	67	277
<i>P. E. Mikkelsen,</i>										
Sorring pr. Toustrup	150	11-6	6H40	OX57	1	2	1	2	86	208
» » »	151	20-6	760U	OX62	2	1	1	1	77	209
<i>Fr. Nielsen,</i>										
Vedskølle pr. Vallø	9	13-2	2613	1.	2	1	2	1	79	225
» » »	102	5-4	2613	1668	1	2	1	2	69	169
Stor Chinchilla.										
<i>Peder Bredtoft,</i>										
Teglværksvej, Hillerød	59	1-3	4E30	597K	2	1	1	1	76	272
<i>Chr. Hansen,</i>										
Roskildevej 5, Benløse, Ringsted	144	8-6	W615	W639	2	1	2	1	75	211
» » »	145	3-5	505H	Tysk Impt.	2	1	2	1	111	210
<i>Aage Jacobsen,</i>										
Mølholm, Vejle	12	22-2	M682	79L9	1	2	1	2	70	206
» »	13	28-2	876U	77L9	2	1	2	1	64	232
» »	148	17-6	876U	80L9	2	1	2	1	79	182
» »	149	7-6	M682	O5M7	3	0	3	0	90	193
» »	174	30-7	M682	79L9	1	2	1	2	93	169
<i>Poul Nielsen,</i>										
Emdrupvej 31, Kbh. Ø.	142	26-5	E275	E278	2	1	1	1	88	205
» »	143	25-5	E275	E280	1	2	1	2	89	216
<i>Hans Pedersen,</i>										
Plantagevej, Frederikssund	29	25-2	800D	1D93	2	1	1	1	67	301
<i>Knud Messerschmidt,</i>										
Birkerød	86	16-3	A. J.	S.Th.	1	2	1	2	89	245
»	87	17-3	A. J.	S.Th.	3	0	2	0	88	221

Dyrenes Vægt i kg ved		Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit pr. Dyr					Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g		Antal Skind i Klasse			Døde Kaniner	
Kon- trol- lens Beg.	Lev. til Slag- teri			Levende Vægt paa Slagteriet kg	Slagtet Vægt kg	% Slagte- svind	Krop- længde cm	Points for Kødfyde (0-10)	I	If	Iff	II	III	Frisk	Tør- ret	I	II	III	Antal	Dato
2,19	3,99	17	7,09	3,40	1,90	44,1	44,5	7,5	2				310	148			2	1	23- 8	
2,10	4,10	17	7,30	3,63	2,07	43,1	44,7	8,0	3				350	178		2	1			
1,87	3,70	24	5,06	3,43	1,93	43,8	42,5	8,0	2				315	160		2		1	6-10	
0,94	3,69	16	6,17	3,18	1,98	37,8	44,5	9,0	1		1		275	128			2	1	1- 8	
1,09	3,63	16	7,44	3,22	2,03	36,8	41,3	9,3	1	2			350	180	1	1	1			
0,71	3,71	17	6,56	3,18	1,95	38,7	42,7	9,3	2		1		362	180	1	2				
0,73	3,57	16	6,65	3,43	1,93	43,8	43,0	8,0	2				323	165		2		1	27- 4	
0,48	3,54	17	6,46	3,13	1,93	38,4	43,5	8,0		2			343	185		2		1	29- 4	
0,79	3,88	14	7,46	3,38	2,15	36,3	44,5	6,5		1	1		373	203		1	1	1	27- 5	
2,02	3,92	18	7,09	3,52	2,25	36,0	43,0	9,0		3			373	195		3				
1,19	3,64	18	6,29	3,25	1,98	39,2	43,0	7,5	1	1			325	173		2		1	11- 9	
1,66	3,70	14	7,73	3,37	2,02	40,1	42,7	7,3	2	1			373	147	2	1				
2,08	3,69	16	7,27	3,24	1,87	42,5	44,7	7,0	2			1	308	130		1	2			
1,50	4,16	15	7,85	3,70	2,25	39,2	42,0	9,5			2		448	250		2		1	1- 8	
1,50	3,89	18	6,48	3,40	2,10	38,2	42,3	8,6	3				340	170		1	2			
2,34	4,10	19	7,09	3,70	2,12	42,8	44,7	8,3	3				380	185		3				
1,45	3,69	18	6,92	3,47	2,05	41,0	44,7	8,4				3	347	157	2	1				
1,32	3,80	15	7,79	3,37	1,93	42,6	44,3	7,3	1	2			367	177	2	1				
1,55	3,88	24	4,81	3,55	2,10	40,9	43,7	8,3	3				338	155		2	1			
1,78	4,01	23	5,42	3,72	2,13	42,6	45,0	8,6	3				390	182		3				
2,30	3,98	22	6,05	3,57	2,15	39,7	44,3	8,3	2	1			375	202		3				
1,85	3,97	18	6,73	3,58	2,13	40,5	42,0	8,0	2				345	185		1	1	1	28- 8	
1,92	3,99	18	6,96	3,65	2,27	37,9	43,3	8,3	1	2			360	187		3				
1,04	3,72	12	9,86	3,35	2,15	35,8	40,0	9,0		1	1		335	185		2		1	20- 5	
1,28	3,71	16	7,30	3,45	1,97	43,0	44,0	8,0	3				348	178		2	1			
1,37	3,98	22	4,87	3,58	1,95	45,5	43,0	8,0	2				403	190		2		1	3- 8	

KØD- OG PELSKANINER 1944

Holdets						Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Alder i Dage ved	
Nr.	Fød- sels- dato	Fader	Moder	Begyndelse		Slutning		Kontrollens Beg.	Lev. til Slagteri		
				Hanner	Hunner	Hanner	Hunner				
Stor Sølv.											
Erik Hansen, Lidemark pr. Bjæverskov	124	26-4	2B36	B199	2	1	1	1	77	216	
» » »	125	28-4	2B36	1S07	2	1	2	1	74	179	
» » »	176	30-9	U.U.248	O.47D.	2	1	2	0	73	186	
» » »	177	23-9	U.U.248	B.199	1	2	1	2	80	193	
Wald. Rørbæk, Slauggaard, Vorbasse	75	1-3	Z312	21Z5	1	2	1	1	76	215	
» »	76	9-3	8H70	Z517	2	1	2	1	68	185	
Fransk Vædder.											
K. Ellingsøe, Nørregade 17, Nykøbing M.	70	4-3	U.U.168	U.U.185	1	2	1	2	73	276	
» »	71	6-3	U.U.168	P75P	2	1	2	0	71	188	
Knud Løje, Storehedinge	96	25-3	2015	55	1	2	1	2	80	236	
»	97	28-3	2663	54	2	1	2	1	77	245	
»	98	22-3	17	2604	2	1	2	1	83	239	
»	99	24-3	17	2664	2	1	1	1	81	249	
K. W. Nielsen, Tinggaard, Kbh. S.	173	15-8	U.U.168	42P.P.	2	1	2	1	63	193	
M. Nielsen, Agnethevej, Frederikshavn	65	7-1	16T7	5B05	2	1	2	0	74	269	
Fr. Wanning, P. Rørdamsvej 9, Lyngby	119	29-4	72	96B0	1	2	1	2	73	213	
Belgisk Kæmpe.											
Frands Rasmussen, Ring Øbjerg pr. Lundby	82	16-3	5H01	3900	3	0	3	0	89	271	
Hvid Kæmpe.											
Jørgen Moos, Stolbro pr. Guderup	130	20-5	3L17	10E3	2	1	2	1	80	211	
» »	131	10-5	0L50	28E3	2	1	2	1	90	254	
Chr. Olsen, Gadevang pr. Hillerød	153	27-6	F953	23MO	2	1	2	1	84	243	

Dyrenes Vægt i kg ved		Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit pr. Dyr						Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g		Antal Skind i Klasse			Døde Kaniner	
Kon- trol- lens Beg.	Lev. til Slag- teri			Levende Vægt paa Slagteriet kg	Slagtet Vægt kg	% Slagte- svind	Krop- længde cm	Points for Kødfyld (0-10)		I	II	III	II	III	Frisk	Tør- ret	I	II	III	Antal	Dato
1,55	4,09	15	7,48	3,60	2,15	40,3	45,0	8,5	1	1					338	170	1	1	1	24-	8
1,78	3,82	21	5,72	3,45	1,93	44,0	44,3	8,3	3						308	150	3				
1,78	3,78	17	6,55	3,58	2,18	39,1	42,0	8,0		2					318	155	2		1	28-	12
1,77	3,73	19	5,99	3,53	2,15	39,0	43,7	9,0	3						317	143	3				
1,21	3,89	19	5,75	3,43	2,05	40,2	43,5	9,5	2						333	155	2		1	29-	5
1,38	3,59	20	5,53	3,27	1,95	40,3	43,0	8,0	1		2				290	113	1	2			
1,37	4,55	16	7,15	4,08	2,33	42,9	44,7	9,0	2	1					448	242	3				
1,27	3,68	19	5,85	3,35	1,93	42,5	43,0	8,0	1			1			340	145	2		1	24-	5
1,49	4,25	20	5,82	3,82	2,25	41,1	43,0	9,4	2		1				367	192	2	1			
1,65	4,29	16	7,64	3,82	2,20	42,4	43,0	8,5	2			1			408	212	3				
1,86	4,64	17	7,18	4,07	2,32	43,0	45,0	9,0	3						432	223	3				
1,78	4,83	18	6,58	4,33	2,58	40,5	45,5	10,0	1	1					455	235	2		1	25-	6
1,47	4,42	24	5,03	3,95	2,35	40,6	43,7	9,7	3						423	218	3				
1,46	4,56	15	7,25	4,25	2,45	42,4	45,0	9,0	1	1					468	220	2		1	14-	5
1,99	4,41	18	6,88	4,10	2,30	43,9	46,0	9,3	3						418	227	3				
2,27	5,38	18	6,79	4,83	2,95	39,0	49,7	8,6		3					517	273	3				
2,37	4,33	15	9,25	3,77	2,20	41,6	46,0	7,4	1			2			392	202	1	1	1		
2,81	4,99	10	10,87	4,47	2,75	38,4	48,0	8,7	3						497	270	1	1	1		
2,38	4,15	11	11,24	3,62	2,30	36,5	45,0	8,0	1	2					368	202	2	1			

ANGORAKANINER

Avler	Holdets			
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder
<i>Erh. Andersen</i> , Rødkilde, Stege	2	28- 5-43	55	32
» » »	3	1- 6-43	14	94
<i>Angorafarmen »Lilleø«, Korsør</i>	8	19- 5-43	J1468	1459
» » »	9	10- 5-43	O16	1330
» » »	10	1- 6-43	Kaiser	Tysk Imp.
» » »	11	22- 6-43	K128	1076
» » »	12	26- 6-43	J1468	A175
» » »	58	20- 7-43	H132	F298
» » »	59	25- 7-43	O16	D153
» » »	60	29- 7-43	J1468	L319
» » »	61	25- 7-43	V76	2078
» » »	62	18- 7-43	Kaiser	FF18
<i>E. Damgaard</i> , Øverup, Tingsted	16	27- 7-43	1721	V187
» » »	17	4- 7-43	Rex	823
» » »	18	1- 7-43	Roy	679
<i>David Hansen</i> , Frølund, Korsør	52	20- 7-43	31	84
» » »	53	23- 7-43	31	82
<i>Erik Hansen</i> , Aalebæk, Borre	63	12- 9-43	O13Æ	5
» » »	64	14- 9-43	O15Æ	6
» » »	65	5- 9-43	O13Æ	28
<i>Cl. Jørgensen</i> , Broager, Graasten	66	16-12-43	2L30	B7
» » »	67	3- 1-44	C498	7G79
<i>Hans Larsen</i> , Møllebo, Køllergaarde	34	24- 8-43	H100	4
» » »	35	29- 8-43	358	47
» » »	36	14- 8-43	H100	54
<i>H. Th. Lauritsen</i> , Møllesøen, Dunkær, Ærø	7	8- 7-43	F61	18
» » »	68	5- 2-44	F61	16
<i>H. Løjmand</i> , Bødkegaarden, Karleby	54	ikke opl.	J146	O17Æ
<i>B. Verner Nielsen</i> , Angorafarmen Viemose	55	1- 8-43	10	17
<i>G. Bastholm Nielsen</i> , Sorøvej, Skælskør	1	19- 6-43	C696	34
<i>Max M. Nielsen</i> , Egedal, Horsens	37	17- 7-43	41Z6	22Z6
» » »	38	2- 6-43	41Z6	606B
» » »	39	14- 6-43	41Z6	32Z6
<i>Niels Nielsen</i> , Haraldskær	56	21- 7-43	81Z9	2026

Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Vægt i kg ved Kontrollens				F. E. pr. Dyr ialt	Klipningsresultater				Bemærkninger	
Beg.		Slutn.		Begyndelse		Slutning			Hanner		Hunner			
Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		Samlet Udtydelse g	Udskvalitet	Samlet Udtydelse g	Udskvalitet		
1	1	1	1	2,45	2,38	2,80	2,94	35,7	291	II	307	II	Hannen død 3-6-44	
1	1	0	1	2,30	2,00	—	3,22	35,8	—	—	333	IV		
1	1	1	1	3,14	3,32	3,13	3,30	38,9	348	II	393	III		
1	1	1	1	2,31	2,70	2,50	3,25	35,6	240	II	331	III		
1	1	1	1	2,77	2,80	3,20	3,39	37,9	306	II	349	II	Hannen død 27-5-44	
1	1	1	1	2,21	2,16	2,52	3,14	34,7	336	III+	380	III		
1	1	1	1	2,27	2,57	2,75	3,04	36,9	295	II+	360	III+		
1	1	0	1	2,07	2,45	—	2,70	32,6	—	—	429	II÷		
1	1	1	1	2,52	2,38	2,45	2,75	32,1	321	II	367	I		
1	1	1	1	2,31	2,37	2,85	2,86	32,7	347	II+	285	II		
1	1	1	1	2,21	2,61	2,52	3,44	32,8	300	I	303	II÷		
1	1	1	1	2,88	2,59	3,17	3,05	33,6	342	II	384	II÷		
1	1	1	1	1,68	1,69	2,43	2,87	31,1	286	I	317	IV		
1	1	1	1	1,49	1,68	2,02	3,05	31,8	260	I	346	II		
1	1	1	1	1,97	1,76	2,82	2,68	34,9	263	II+	362	II÷		
1	1	1	1	1,90	2,26	2,67	3,46	33,6	368	II	407	I		
1	1	1	1	1,95	2,15	2,63	2,88	33,6	339	II	369	III		
1	1	1	1	1,75	1,77	2,56	2,77	32,8	348	II	340	II÷		
1	1	1	1	1,75	1,85	2,09	3,13	32,5	285	II	340	II		
1	1	1	1	1,83	1,87	2,45	3,00	31,7	321	II	316	III		
1	1	1	1	1,98	1,83	2,85	3,22	33,3	256	II+	249	II÷		
1	1	1	1	1,89	2,05	2,86	2,90	33,4	249	II+	163	III		
1	1	1	1	2,04	1,97	2,87	3,09	29,8	329	I	349	III		
1	1	1	1	1,93	2,06	2,52	3,32	33,0	297	II	401	II		
1	1	1	1	2,21	2,09	2,69	2,79	30,8	362	II+	413	II		
1	1	1	1	2,20	2,00	2,69	2,92	33,9	383	III	360	II		
1	1	1	1	1,94	1,81	2,84	3,32	31,6	261	I÷	293	I		
1	1	1	1	2,66	2,70	2,68	3,03	34,3	314	I	373	II÷		
0	2	0	2	—	2,54	—	3,46	35,9	—	—	316	II&III		2 Hunner
1	1	1	1	1,92	2,20	2,46	3,14	33,1	273	I	247	III		
1	1	1	1	1,95	2,09	2,71	3,19	32,9	251	I÷	257	III		
1	1	1	1	1,96	1,89	2,63	3,14	31,0	224	II	321	III		
1	1	1	1	1,92	1,64	2,57	2,54	29,9	219	II+	224	IV		
1	1	1	1	2,35	2,02	2,91	2,90	33,2	343	II	397	III		

ANGORAKANINER

Avler	Holdets			
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder
<i>A. Neumann, Lintrup, Brørup</i>	57	30- 8-43	2-12	20Z3
<i>Odense Kaninfarm, Falen 10, Odense</i>	22	23- 7-43	A898	B419
» » » »	23	25- 7-43	A898	B430
» » » »	24	23- 7-43	A898	B419
» » » »	25	28- 7-43	13	B527
» » » »	46	25- 7-43	13	B416
» » » »	47	25- 7-43	HO35	B426
» » » »	48	25- 7-43	HO35	B751
» » » »	49	28- 7-43	13	B527
» » » »	50	25- 7-43	3	B443
» » » »	51	23- 7-43	F776	F775
<i>A. Chr. Olesen, Langebæk</i>	40	30- 9-43	83	22
<i>R. Petry, Aablink, Allingaabro</i>	4	23- 5-43	263	13
» » » »	5	2- 6-43	263	24
» » » »	6	19- 6-43	2	17
» » » »	41	20- 6-43	2	3
» » » »	42	19- 6-43	2	4
» » » »	43	11- 8-43	252	34
<i>Astrid Rasmussen, Græsbjerg, Vordingborg</i>	33	22- 7-43	O32Æ	O19Æ
<i>E. B. Rasmussen, Bymarken, Brande</i>	13	9- 7-43	A	34Æ
» » » »	14	7- 7-43	A	12
<i>P. Rasmussen, Arnagerbro, Køllergaarde</i>	31	28- 5-43	Svensk H.	409R
» » » »	32	7- 6-43	74	11
<i>J. Sigurdsson, Solbjerg, Havrebjerg</i>	19	6- 9-43	O43	284
» » » »	20	30- 8-43	89P14	287
» » » »	21	5- 9-43	O43	281
<i>Inger Funch Thomsen, Ndr. Stationsvej 8, Slagelse</i>	26	10- 6-43	143	212
» » » »	27	12- 6-43	Svensk H.	Engelsk
» » » »	28	12- 6-43	198	193
» » » »	29	17- 6-43	Svensk H.	Svensk
» » » »	30	29- 6-43	M13	632N

Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Vægt i kg ved Kontrollens				F. E. pr. Dyr ialt	Klipningsresultater				Bemærkninger
Beg.		Slutn.		Begyndelse		Slutning			Hanner		Hunner		
Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		Samlet Uldydelse g	Uldkvalitet	Samlet Uldydelse g	Uldkvalitet	
0	2	0	2	—	1,84	—	2,92	32,1	—	—	346	III&IV	2 Hunner
1	1	1	1	2,01	1,97	2,64	3,04	32,7	300	II+	282	II	
1	1	1	1	2,01	2,09	2,64	2,44	32,1	276	I	316	III	
1	1	1	1	2,08	2,00	2,62	3,08	33,3	288	I	355	III	
1	1	1	1	1,94	2,16	2,98	3,30	33,0	334	II+	363	III	
1	1	1	1	1,95	2,15	2,75	2,85	32,1	337	I	273	III	
1	1	1	1	2,00	2,51	2,63	3,40	35,0	303	II	271	III	
1	1	1	1	1,85	1,80	2,40	2,53	30,9	374	II+	388	II	
1	1	1	1	1,92	2,03	2,16	3,30	32,5	282	I	304	III	
1	1	1	1	2,12	1,88	2,65	2,69	32,1	327	II	330	II÷	
1	1	1	1	1,80	1,94	2,49	3,13	31,6	261	II+	269	II÷	
1	1	1	1	1,43	1,44	2,17	2,75	32,0	280	I	342	IV	
1	1	1	1	1,91	1,82	2,57	3,13	33,3	359	I	418	III	
1	1	1	1	1,83	1,69	2,56	2,66	33,5	319	I	303	I	
1	1	1	1	1,83	2,08	2,66	3,20	34,1	299	I	362	II	
1	1	1	1	1,80	1,81	2,39	2,68	31,5	287	II+	322	III	
1	1	1	1	1,87	1,84	2,50	2,84	31,7	318	II	369	II÷	
1	1	0	1	1,70	1,58	—	2,72	32,0	—	—	286	II÷	Hannen død 17-2-44
1	1	1	1	2,85	2,66	2,86	2,84	31,5	338	I	308	III	
1	1	0	1	2,15	2,45	—	3,32	33,5	—	—	427	III	Hannen død 13-9-44
1	1	1	1	2,30	2,34	2,70	3,33	33,9	284	II÷	314	III	
0	2	0	2	—	2,47	—	3,17	33,7	—	—	267	II÷&III	2 Hunner
0	2	0	1	—	2,25	—	2,83	32,5	—	—	313	II	2 Hunner, hvoraf den ene er død 3-6-44
1	1	1	1	1,44	1,54	2,50	2,71	30,2	312	III	345	II	
1	1	1	1	1,62	1,67	2,73	2,74	31,8	290	III+	323	III	
1	1	1	1	1,48	1,48	2,77	1,99	30,8	307	II	265	II	
1	1	1	1	2,32	2,23	2,69	2,36	33,3	267	I	326	II÷	
1	1	1	1	1,92	2,36	2,52	3,01	34,6	294	II	276	II÷	
1	1	1	1	2,15	2,33	2,63	3,00	34,5	347	I	322	III	
1	1	1	1	2,61	2,01	3,11	2,93	36,5	295	II	319	II÷	
1	1	1	1	2,47	2,62	2,97	3,39	37,6	306	II	259	III	

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Klip- nings- dato	Hanner						Hunner						
		Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
1	18- 4-44	31	4	1	14	19	69	18- 4-44	19	10	1	0	5	35
	17- 7-44	15	13	2	12	6	48	17- 7-44	8	15	4	9	1	37
	14-10-44	0	32	24	14	0	70	14-10-44	12	37	13	8	5	75
	16- 1-45	0	46	20	20	0	86	16- 1-45	0	67	22	8	3	100
2	6- 5-44	16	17	14	10	4	61	6- 5-44	33	17	6	18	13	87
	5- 8-44	13	18	13	8	8	60	5- 8-44	16	23	15	6	3	63
	4-11-44	0	40	31	14	0	85	4-11-44	0	41	23	10	2	76
	6- 2-45	0	36	33	15	1	85	6- 2-45	0	48	25	8	0	81
3	18- 4-44	28	4	1	9	5	47	18- 4-44	54	17	2	0	3	76
	17- 7-44							17- 7-44	14	19	7	3	3	46
	14-10-44							14-10-44	0	46	44	13	1	104
	16- 1-45							16- 1-45	0	65	28	13	1	107
4	17- 4-44	43	16	4	1	15	79	17- 4-44	49	19	5	1	4	78
	15- 7-44	32	24	10	8	8	82	15- 7-44	45	21	13	4	6	89
	14-10-44	0	45	26	14	2	87	14-10-44	36	20	39	7	15	117
	15- 1-45	0	81	13	14	3	111	15- 1-45	0	76	45	11	2	134
5	17- 4-44	33	0	1	9	23	66	17- 4-44	56	11	1	0	4	72
	15- 7-44	25	15	6	9	7	62	15- 7-44	23	18	14	3	1	59
	14-10-44	16	25	31	11	1	84	14-10-44	24	44	14	4	2	88
	15- 1-45	0	54	33	19	1	107	15- 1-45	0	65	14	5	0	84
6	17- 4-44	24	4	2	17	10	57	17- 4-44	46	33	3	3	7	92
	15- 7-44	11	20	10	5	13	59	15- 7-44	10	11	12	13	8	54
	14-10-44	19	24	21	13	2	79	14-10-44	36	20	30	11	2	99
	15- 1-45	0	49	21	33	1	104	15- 1-45	22	61	24	7	3	117
7	17- 4-44	46	18	1	7	15	87	17- 4-44	45	24	2	0	8	79
	15- 7-44	31	18	3	16	20	88	15- 7-44	26	16	16	9	6	73
	14-10-44	0	32	40	19	1	92	14-10-44	0	45	37	10	1	93
	15- 1-45	0	69	20	27	0	116	15- 1-45	0	60	43	11	1	115
8	10- 5-44	22	11	3	27	12	75	18- 4-44	35	26	13	1	7	82
	7- 8-44	23	30	14	7	7	81	17- 7-44	10	27	14	9	16	76
	7-11-44	0	49	26	15	1	91	14-10-44	0	40	55	18	2	115
	8- 2-45	0	47	27	27	0	101	16- 1-45	0	29	53	37	1	120
9	18- 4-44	20	2	3	18	6	49	10- 5-44	17	13	4	10	9	53
	17- 7-44	12	12	7	5	6	42	7- 8-44	11	25	19	4	5	64
	14-10-44	11	28	17	14	0	70	7-11-44	23	55	29	9	3	119
	16- 1-45	0	35	26	18	0	79	8- 2-45	17	42	26	6	4	95
10	18- 4-44	40	0	1	20	21	82	19- 4-44	51	11	8	4	5	79
	17- 7-44	14	14	8	12	9	57	18- 7-44	21	24	20	3	7	75
	14-10-44	0	32	22	13	8	75	14-10-44	13	27	42	10	3	95
	19- 1-45	0	44	25	23	0	92	19- 1-45	0	67	20	11	2	100

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Klip- nings- dato	Hanner						Klip- nings- dato	Hunner					
		Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer. g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
11	19- 4-44	31	1	1	26	16	75	19- 4-44	41	10	5	2	5	63
	18- 7-44	12	11	3	26	18	70	18- 7-44	30	21	18	0	18	87
	14-10-44	32	25	12	19	3	91	14-10-44	14	51	26	7	8	106
	19- 1-45	0	26	29	45	0	100	19- 1-45	23	56	29	11	5	124
12	19- 4-44	39	6	2	11	5	63	19- 4-44	43	24	8	3	8	86
	18- 7-44	18	20	8	14	4	64	18- 7-44	16	18	12	7	13	66
	18-10-44	0	38	25	15	1	79	18-10-44	32	27	24	10	3	96
	19- 1-45	0	43	24	22	0	89	19- 1-45	0	58	34	18	2	112
13	12- 4-44	61	6	7	1	9	84	12- 4-44	69	14	7	1	5	96
	13- 7-44	13	21	6	11	10	61	13- 7-44	38	26	18	3	14	99
								11-10-44	37	65	24	6	3	135
								11- 1-45	0	70	16	11	0	97
14	12- 4-44	14	1	5	35	5	60	12- 4-44	50	9	7	0	3	69
	13- 7-44	10	5	2	27	11	55	13- 7-44	23	16	8	3	3	53
	11-10-44	0	50	18	7	0	75	11-10-44	28	39	23	5	1	96
	11- 1-45	0	47	20	27	0	94	11- 1-45	0	52	31	13	0	96
16	25- 4-44	27	10	2	13	1	53	25- 4-44	45	18	5	0	5	73
	24- 7-44	13	23	8	20	7	71	24- 7-44	0	23	11	6	5	45
	24-10-44	0	37	20	20	0	77	24-10-44	18	38	35	6	0	97
	24- 1-45	0	42	18	25	0	85	24- 1-45	0	50	42	6	4	102
17	25- 4-44	20	6	1	21	4	52	25- 4-44	45	8	2	0	5	60
	24- 7-44	12	17	5	20	5	59	24- 7-44	26	23	8	3	8	68
	24-10-44	0	36	16	19	0	71	24-10-44	25	45	26	12	0	108
	24- 1-45	0	33	18	27	0	78	24- 1-45	15	59	29	7	0	110
18	20- 4-44	25	6	0	13	11	55	25- 4-44	41	18	7	2	9	77
	18- 7-44	4	10	4	21	5	44	24- 7-44	22	18	12	18	11	81
	18-10-44	0	40	18	16	0	74	24-10-44	19	44	26	10	1	100
	22- 1-45	0	53	14	23	0	90	24- 1-45	0	55	30	16	3	104
19	3- 4-44	54	11	9	0	1	75	3- 4-44	45	14	9	0	3	71
	6- 7-44	30	19	2	8	5	64	7- 7-44	25	13	7	12	13	70
	11-10-44	15	43	14	5	2	79	11-10-44	14	37	38	6	1	96
	6- 1-45	0	63	19	12	0	94	6- 1-45	0	62	40	6	0	108
20	3- 4-44	40	8	5	6	6	65	3- 4-44	45	13	11	1	2	72
	6- 7-44	10	8	0	32	20	70	7- 7-44	18	22	14	2	12	68
	11-10-44	0	41	15	19	0	75	11-10-44	28	39	26	5	1	99
	6- 1-45	0	48	14	18	0	80	6- 1-45	0	48	32	4	0	84
21	3- 4-44	51	12	8	0	9	80	3- 4-44	45	9	6	8	4	72
	7- 7-44	10	16	3	21	17	67	7- 7-44	12	14	0	32	1	59
	11-10-44	0	45	19	14	0	78	11-10-44	0	40	18	9	0	67
	6- 1-45	0	50	21	11	0	82	6- 1-45	0	40	18	9	0	67

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
22	3- 4-44	34	10	3	4	6	57	3- 4-44	37	10	5	0	1	53
	6- 7-44	15	10	0	26	23	74	6- 7-44	17	10	8	10	12	57
	10-10-44	23	28	13	17	2	83	10-10-44	19	50	18	6	3	96
	5- 1-45	23	30	13	20	0	86	5- 1-45	0	50	20	6	0	76
23	3- 4-44	30	16	7	0	2	55	3- 4-44	35	20	12	1	5	73
	6- 7-44	20	17	6	11	8	62	6- 7-44	11	16	9	17	11	64
	10-10-44	23	33	8	12	0	76	11-10-44	12	56	15	9	2	94
	5- 1-45	30	33	8	12	0	83	5- 1-45	0	48	31	6	0	85
24	3- 4-44	37	7	10	1	6	61	3- 4-44	52	11	9	2	4	78
	6- 7-44	25	8	1	18	20	72	6- 7-44	29	12	12	5	13	71
	10-10-44	41	22	10	8	0	81	11-10-44	41	46	16	3	4	110
	5- 1-45	0	47	15	9	3	74	5- 1-45	21	46	25	4	0	96
25	4- 4-44	41	11	2	5	6	65	4- 4-44	43	17	9	2	0	71
	6- 7-44	7	17	0	35	18	77	6- 7-44	24	17	13	10	5	69
	11-10-44	10	28	13	34	0	85	11-10-44	48	36	23	8	2	117
	5- 1-45	0	65	24	18	0	107	5- 1-45	0	64	31	11	0	106
26	19- 4-44	29	1	1	15	5	51	19- 4-44	46	20	8	3	14	91
	17- 7-44	16	13	3	5	12	49	18- 7-44	11	20	20	4	3	58
	18-10-44	0	40	21	12	0	73	18-10-44	0	39	22	11	2	74
	22- 1-45	0	38	13	42	1	94	19- 1-45	0	51	33	19	0	103
27	20- 4-44	39	9	2	5	5	60	20- 4-44	36	11	8	0	4	59
	19- 7-44	24	22	7	7	5	65	18- 7-44	15	13	13	3	7	51
	18-10-44	0	37	23	9	3	72	18-10-44	0	44	15	9	3	71
	22- 1-45	11	42	26	16	2	97	19- 1-45	0	63	25	7	0	95
28	20- 4-44	50	14	3	3	5	75	20- 4-44	51	13	4	2	4	74
	19- 7-44	18	27	5	16	7	73	18- 7-44	10	22	8	4	3	47
	18-10-44	0	57	21	9	0	87	18-10-44	12	37	27	9	2	87
	22- 1-45	20	40	32	20	0	112	19- 1-45	0	73	30	9	2	114
29	20- 4-44	28	10	1	11	4	54	20- 4-44	23	11	12	3	7	56
	19- 7-44	19	21	7	6	4	57	18- 7-44	8	14	2	10	20	54
	18-10-44	0	54	20	13	1	88	18-10-44	20	41	28	11	3	103
	22- 1-45	0	63	21	12	0	96	19- 1-45	0	45	40	21	0	106
30	25- 4-44	23	3	1	25	1	53	25- 4-44	29	15	3	0	3	50
	24- 7-44	10	12	10	16	7	55	24- 7-44	8	10	10	5	1	34
	25-10-44	0	40	28	16	2	86	25-10-44	21	36	31	5	2	95
	26- 1-45	0	61	27	24	0	112	26- 1-45	0	56	15	7	2	80
31								13- 4-44	36	15	6	4	1	62
								14- 7-44	28	7	6	5	3	49
								13-10-44	0	50	19	7	2	78
								12- 1-45	0	53	18	7	0	78

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
32								14- 4-44	44	7	9	0	1	61
								14- 7-44	45	13	12	0	9	79
								13-10-44	0	45	32	5	0	82
								12- 1-45	0	57	25	9	0	91
33	3- 4-44	32	3	3	17	2	57	3- 4-44	55	18	5	4	6	88
	6- 7-44	18	7	1	47	13	86	6- 7-44	15	19	13	2	7	56
	10-10-44	13	41	35	8	5	102	10-10-44	18	40	13	4	1	76
	5- 1-45	0	53	23	13	4	93	5- 1-45	0	70	11	7	0	88
34	18- 4-44	53	9	4	10	7	83	18- 4-44	56	22	7	1	7	93
	15- 7-44	10	25	4	21	8	68	17- 7-44	7	6	9	12	4	38
	14-10-44	0	30	33	15	0	78	14-10-44	0	45	29	12	2	88
	15- 1-45	0	48	27	23	2	100	15- 1-45	0	70	46	5	9	130
35	18- 4-44	34	12	5	5	8	64	18- 4-44	53	17	11	0	9	90
	17- 7-44	11	17	4	11	8	51	17- 7-44	27	22	13	5	10	77
	14-10-44	0	37	25	17	1	80	14-10-44	0	55	37	14	4	110
	15- 1-45	0	65	19	17	1	102	16- 1-45	0	78	28	18	0	124
36	27- 3-44	60	10	7	3	5	85	27- 3-44	64	5	14	4	2	89
	26- 6-44	28	12	5	36	11	92	26- 6-44	56	18	9	10	6	99
	26- 9-44	8	19	34	16	3	80	26- 9-44	12	53	15	14	1	95
	23-12-44	0	62	26	13	4	105	23-12-44	0	94	23	11	2	130
37	12- 4-44	35	1	4	5	8	53	12- 4-44	34	5	9	0	2	50
	13- 7-44	16	15	3	12	13	59	13- 7-44	13	14	7	2	6	42
	13-10-44	0	33	27	11	0	71	13-10-44	0	38	39	3	1	81
	11- 1-45	0	35	21	12	0	68	11- 1-45	0	45	31	8	0	84
38	13- 4-44	34	6	4	2	4	50	13- 4-44	40	13	5	1	7	66
	13- 7-44	16	13	6	1	7	43	13- 7-44	21	10	16	2	11	60
	13-10-44	0	38	14	8	0	60	13-10-44	0	50	33	4	2	89
	11- 1-45	0	43	19	9	0	71	11- 1-45	0	63	32	7	4	106
39	13- 4-44	34	8	4	2	4	52	13- 4-44	37	4	5	4	7	57
	14- 7-44	9	12	3	12	7	43	13- 7-44	18	6	10	4	2	40
	13-10-44	0	20	22	8	1	51	13-10-44	0	28	23	8	1	60
	11- 1-45	0	42	20	11	0	73	11- 1-45	0	46	13	8	0	67
40	6- 5-44	20	5	3	23	9	60	6- 5-44	17	3	4	27	10	61
	4- 8-44	30	20	11	6	7	74	4- 8-44	14	17	22	3	10	66
	3-11-44	0	41	18	12	3	74	3-11-44	0	53	30	9	4	96
	5- 2-45	0	33	30	8	1	72	5- 2-45	0	77	33	7	2	119
41	10- 5-44	23	14	4	15	5	61	10- 5-44	19	17	7	16	8	67
	7- 8-44	15	25	9	13	8	70	7- 8-44	20	12	13	4	14	63
	7-11-44	0	40	24	11	0	75	7-11-44	25	36	12	10	2	85
	8- 2-45	0	41	25	15	0	81	8- 2-45	18	60	14	12	3	107

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
42	11- 5-44	30	15	2	16	8	71	11- 5-44	29	13	5	23	5	75
	7- 8-44	19	28	10	15	10	82	7- 8-44	25	11	20	5	8	69
	7-11-44	0	44	20	12	1	77	7-11-44	8	45	33	12	3	101
	8- 2-45	13	50	10	15	0	88	8- 2-45	30	45	27	21	1	124
43								11- 5-44	33	13	14	3	6	69
								7- 8-44	30	11	15	5	4	65
								7-11-44	18	34	20	5	1	78
								8- 2-45	0	50	20	3	1	74
46	11- 5-44	21	14	15	6	12	68	11- 5-44	9	27	6	6	5	53
	9- 8-44	22	18	17	6	8	71	9- 8-44	0	21	27	1	8	57
	10-11-44	26	38	16	10	2	92	10-11-44	0	48	26	6	0	80
	10- 2-45	0	60	24	21	1	106	10- 2-45	0	44	35	4	0	83
47	11- 5-44	23	10	7	5	1	46	11- 5-44	15	14	5	13	8	55
	9- 8-44	31	17	15	10	9	82	9- 8-44	0	0	2	10	0	12
	10-11-44	20	22	24	13	0	79	10-11-44	41	26	24	10	1	102
	10- 2-45	23	27	14	31	1	96	10- 2-45	0	52	39	10	1	102
48	12- 5-44	27	12	1	40	10	90	12- 5-44	28	25	15	11	5	84
	9- 8-44	24	10	10	22	14	80	9- 8-44	30	31	15	4	8	88
	10-11-44	35	20	20	13	0	88	10-11-44	24	46	13	6	1	90
	10- 2-45	8	47	20	41	0	116	10- 2-45	15	82	20	4	5	126
49	12- 5-44	0	10	5	31	10	56	12- 5-44	11	22	13	7	5	58
	9- 8-44	10	15	25	8	7	65	9- 8-44	0	10	30	8	5	53
	10-11-44	0	40	25	12	3	80	10-11-44	0	61	32	8	2	103
	10- 2-45	0	30	31	17	3	81	10- 2-45	0	23	57	9	1	90
50	12- 5-44	21	8	4	28	6	67	12- 5-44	21	14	9	22	6	72
	9- 8-44	26	19	14	16	6	81	9- 8-44	17	17	14	9	10	67
	10-11-44	0	60	10	13	0	83	10-11-44	12	44	21	7	0	84
	10- 2-45	0	58	14	24	0	96	10- 2-45	0	69	30	8	0	107
51	12- 5-44	9	11	2	28	5	55	12- 5-44	11	13	10	4	4	42
	9- 8-44	15	9	7	12	10	53	9- 8-44	9	17	10	6	4	46
	10-11-44	0	45	20	10	0	75	10-12-44	42	30	21	6	2	101
	10- 2-45	0	39	25	13	1	78	10- 2-45	0	33	38	9	0	80
52	15- 5-44	23	19	12	26	4	84	15- 5-44	33	18	10	21	6	88
	15- 8-44	11	26	13	23	23	96	15- 8-44	32	25	13	13	6	89
	15-11-44	0	51	21	14	0	86	15-11-44	24	43	33	12	4	116
	14- 2-45	0	54	21	26	1	102	14- 2-45	0	82	15	16	1	114
53	16- 5-44	22	24	15	11	3	75	16- 5-44	31	20	12	3	3	69
	15- 8-44	6	20	13	17	10	66	15- 8-44	20	19	33	1	9	82
	15-11-44	0	44	32	13	1	90	15-11-44	0	60	37	8	0	105
	14- 2-45	0	57	32	19	0	108	14- 2-45	0	53	53	5	2	113

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
54	5- 5-44	11	2	1	60	11	85	5- 5-44	26	15	3	50	10	104
	4- 8-44	7	21	20	11	6	65	4- 8-44	0	30	26	5	8	69
	3-11-44	0	37	28	17	0	82	3-11-44	0	41	37	9	3	90
	5- 2-45	0	28	33	21	0	82	5- 2-45	0	55	41	13	1	110
55								21- 5-44	7	21	23	4	3	58
								24- 8-44	8	20	21	5	3	57
								23-11-44	0	46	44	7	3	100
								21- 2-45	0	46	44	10	1	101
56	1- 6-44	11	23	7	33	6	80	1- 6-55	40	15	12	14	6	87
	1- 9-44	26	17	4	15	11	73	1- 9-44	51	19	6	1	10	87
	2-12-44	21	28	24	22	1	96	2-12-44	28	56	21	5	2	112
	28- 2-45	0	48	21	24	1	94	28- 2-45	0	82	23	5	1	111
57								10- 6-44	14	12	9	29	3	67
								13- 9-44	23	20	9	5	5	62
								11-12-44	33	31	36	8	1	109
								10- 3-45	0	71	25	12	0	108
58								21- 6-44	18	5	1	39	18	81
								21- 9-44	58	17	6	1	6	88
								18-12-44	0	26	77	13	6	122
								19- 3-45	0	63	55	13	7	138
59	21- 6-44	20	9	3	24	8	64	21- 6-44	31	15	6	15	6	73
	21- 9-44	53	11	3	8	3	78	21- 9-44	55	13	8	3	2	81
	18-12-44	0	42	26	24	0	92	18-12-44	0	52	37	16	0	105
	19- 3-45	0	37	23	26	1	87	19- 3-45	0	55	28	23	2	108
60	21- 6-44	20	11	8	30	2	71	21- 6-44	16	8	13	5	4	46
	21- 9-44	43	21	7	12	0	83	21- 9-44	19	27	9	1	0	56
	18-12-44	0	37	34	22	3	96	18-12-44	0	55	36	6	3	100
	19- 3-45	0	38	25	34	0	97	19- 3-45	0	47	28	7	1	83
61	21- 6-44	12	2	2	28	11	55	21- 6-44	23	11	8	7	5	54
	21- 9-44	40	15	8	6	3	72	21- 9-44	60	13	7	3	1	84
	18-12-44	0	39	37	17	0	93	18-12-44	0	48	38	10	2	98
	19- 3-45	0	29	18	33	0	80	19- 3-45	0	33	25	8	1	67
62	21- 6-44	0	8	0	65	9	82	21- 6-44	31	9	10	14	8	72
	21- 9-44	32	12	14	4	4	66	21- 9-44	60	12	9	1	0	82
	18-12-44	0	56	25	17	1	99	18-12-44	0	82	26	12	1	121
	19- 3-45	0	46	28	19	2	95	19- 3-45	0	49	47	13	0	109
63	19- 7-44	23	21	11	9	14	78	19- 7-44	30	17	8	8	9	72
	18-10-44	0	46	26	10	3	85	18-10-44	27	24	21	7	6	85
	19- 1-45	35	16	22	16	4	93	19- 1-45	42	29	18	8	2	99
	19- 4-45	0	49	33	10	0	92	19- 4-45	0	47	28	9	0	84

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Klip- nings- dato	Hanner						Hunner						
		Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Ydelse i de enkelte Sorteringer. g						
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
64	19- 7-44	0	17	3	40	6	66	19- 7-44	15	19	12	8	13	67
	18-10-44	0	36	20	7	3	66	18-10-44	0	41	32	10	2	85
	22- 1-45	0	46	25	17	0	88	22- 1-45	0	58	32	10	1	101
	19- 4-45	0	31	25	9	0	65	19- 4-45	0	36	41	6	4	87
65	19- 7-44	20	10	3	29	9	71	19- 7-44	15	12	7	20	9	63
	18-10-44	0	40	23	3	1	67	18-10-44	20	23	32	6	0	81
	22- 1-45	0	67	21	13	0	101	22- 1-45	13	51	30	8	1	103
	19- 4-45	0	34	39	9	0	82	19- 4-45	0	33	31	5	0	69
66	5- 8-44	29	15	9	0	21	65	5- 8-44	11	22	17	4	5	59
	4-11-44	0	15	43	19	0	77	4-11-44	0	18	35	16	4	73
	6- 2-45	0	28	12	21	3	64	6- 2-45	0	14	41	16	2	73
	7- 5-45	0	17	20	10	3	50	7- 5-45	0	0	31	13	0	44
67	5- 8-44	8	21	13	3	8	53	5- 8-44	0	0	26	6	1	33
	7-11-44	0	28	31	16	1	76	7-11-44	0	0	25	11	0	36
	6- 2-45	0	35	13	20	3	71	6- 2-45	0	0	17	9	0	26
	7- 5-45	0	13	20	14	2	49	7- 5-45	0	10	50	8	0	68
68	1- 9-44	35	14	4	8	7	68	1- 9-44	36	12	8	6	4	66
	2-12-44	0	46	23	4	3	76	2-12-44	0	54	19	9	0	82
	28- 2-45	0	32	22	11	0	65	28- 2-45	0	48	22	7	0	77
	31- 5-45	0	22	21	9	0	52	31- 5-45	0	32	28	6	2	68