

230. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg.

**3. Meddelelse fra
KANINKONTROLSTATIONEN PAA FAVRHOLM
1946—47**

samt

KANINFORSØG
Fodringsforsøg med Angorakaniner
Slagtningsforsøg

af

Johs. Jespersen og Sv. Hoffman Hausen



KØBENHAVN

1948

230. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg.

3. Meddelelse fra Kaninkontrolstationen paa Favrholm 1946—47

samt

Kaninforsøg Fodringsforsøg med Angorakaniner Slagtningsforsøg

At

Johs. Jespersen og Sv. Hoffman Hansen.



I Kommission hos Ejvind Christensens Forlag,
Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1948

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, *Formand*,

Gaardejer *Johs. Jensen*, Tostrup, Stege,

valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.

Konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,

Parcellist *Sofus Jensen*, Atterup, Grevinge,

valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

Forstander *L. Lauridsen*, Graasten, *Næstformand*,

valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

— — — — —
valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,

valgt af Statens Fjerkræudvalg.

Udvalgets Sekretær: Kontorchef, Landbrugskandidat *Holger Ærsoe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,

Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*.

— Landbrugskandidat, Dyrlæge *Johs. Moustgaard*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,

— Landbrugskandidat, Dr. agro. *V. Steensberg*,

— Landbrugskandidat, Dyrlæge, Dr. *K. Rottensten*.

Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m. m.:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

— Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,

— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,

Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*.

Statens Foderstofkontrol:

Inspektør: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.

Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Harald M. Petersen*.

Kontor og Sekretariat

Kontorchef: Landbrugskandidat *Holger Ærsoe*,

Sekretær: Landbrugskandidat *H. Bundgaard*,

Bogholder: *A. Lindahl*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til

Statens Husdyrbrugsudvalg!

Undertegnede fremsender hermed en Beretning om Kaninkontrollen paa Favrholt 1946—47 samt om Fodringsforsøg og Slagtningsforsøg med Kaniner og forespørger, om Udvalget kan tiltræde, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Kontrolstationens daglige Drift er ledet af Assistent, Landbrugskandidat *Sv. Hoffman Hansen*, Favrholt. Assistent, Landbrugskandidat *V. E. H. Hansen*, København, har medvirket ved Opgørelse af Talmaterialiet.

De kontrollerede Kød- og Pelskaniner er slagtet paa Ringsted Andels-Fjerkræslagteri, hvor Direktør *A. Thøssing Jørgensen* og Forvalter *O. Jensen* samt Konsulenterne *S. Buus*, Ringsted, og *O. Göttsche*, København, har ydet velvillig Bistand ved Bedømmelsen af saavel Slagtekroppe som Skind. Ved Skindbedømmelsen i København har endvidere medvirket Direktør *O. Storm Nielsen*, København, og Grosserer *H. O. Christensen*, København.

Ved Bedømmelsen af Angoraaulden, der er foretaget paa Forsøgslaboratoriet, medvirkede Direktør *B. Feldthusen*, København, Bestyrer *K. Mygind*, Korsør, og Konsulent *O. Göttsche*, København.

15

København, Februar 1948.

Ærbødigst

Johs. Jespersen.

Ovennævnte Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Odense, Februar 1948.

Johs. Petersen-Dalum,
Formand.

INDHOLD

	Side
A. KØD- OG PELSKANINER	5
Kontrolholdenes Sammensætning	5
Kontrolholdenes Racefordeling	5
Fodringen	6
Antal Dødsfald og Dødsårsager	6
De forskellige Racers Alder og Vægt ved Modtagelsen	7
<i>Kontrolresultater</i>	8
Variation i daglig Tilvækst og Foderforbrug	8
Daglig Tilvækst og Foderforbrug pr. kg Tilvækst	9
Slagtesvindet	9
Kødfylden	10
Fedningsgraden	10
Kroplængden	10
Skindene	11
Points for Skind i de forskellige Maaneder	11
Skindenes Klassificering i de enkelte Maaneder	12
Skindkvalitet og Skindvægt for de forskellige Racer	12
Fremhævede Hanner	13
Ændringer i Reglerne for Modtagelse af Kød- og Pelskaniner til Kontrol	13
Den mest passende Slagtevægt for Blaa Wiener	13
B. ANGORAKANINER	16
Antal Dødsfald og Dødsårsager	16
Angorakaninernes Gennemsnitsvægt	16
<i>Kontrolresultater</i>	17
Kønnets Indflydelse paa Uldydelsen	17
Uldens Klassificering	18
Fremhævede Hanner	18
Ændring i Reglerne for Modtagelse af Angorakaniner	19
HOVEDTABELLER	20
Kød- og Pelskaniner	20
Angorakaniner	30
Tillæg til Hovedtabel for Angorakaniner	36
FODRINGSFORSØG MED ANGORAKANINER	45
A. Forsøg med forskellig Proteinmængde	45
B. Forsøg med forskelligt Protein- og Mineralstofindhold	47
SLAGTNINGSFORSØG MED HVID LANDKANIN	52

A. Kød- og Pelskaniner.

I det forløbne Aar er der fra 57 Kaninavlere modtaget 161 Hold Kød- og Pelskaniner paa Kaninkontrolstationen paa Favrholm.

Fra 40 Avlere, der tidligere har indsendt Dyr til Kontrol, er modtaget 128 Hold, og fra 17 nye Avlere 33 Hold.

Kontrolholdenes Sammensætning.

	Antal Hold	pCt.
3 Hanner	4	2,5
2 Hanner + 1 Hun	84	52,2
1 Han + 2 Hunner	68	42,2
3 Hunner	5	3,1

Hold bestaaende af 3 Hanner og 3 Hunner bør ikke indsendes til Kontrol, og Hold af denne Sammensætning vil i Fremtiden ikke blive modtaget, men returneret til Ejerne.

I Aarets Løb er der kontrolleret 11 forskellige Racer. Tysk Kæmpeschecke er ikke repræsenteret, men ellers er det de samme Racer som i 1945—46.

Tabel 1. Kontrolholdenes Racefordeling.

	Antal Hold		
	Mod- tagne	Gennem- førte	Opløste
Lille Chinchilla	21	21	0
Lille Sølv	6	6	0
Hvid Land	46	42	4
Blaa Wiener	33	31	2
Hvid Wiener	2	2	0
Bourgogne	7	7	0
Stor Chinchilla	14	14	0
Stor Sølv	4	3	1
Fransk Vædder	17	15	2
Belgisk Kæmpe	9	7	2
Hvid Kæmpe	2	2	0
Ialt 1946—47	161	150	11
„ 1945—46	146	133	13
„ 1944—45	177	139	38

I de 3 Kontrolaar er der sket en gradvis Udjævning i Fordelingen mellem Racerne. Alle Racer er repræsenteret med 2 eller flere Hold; men det er som i

tidligere Aar Hvid Land og Blaa Wiener, der er stærkest repræsenteret med henholdsvis 28,6 og 20,5 pCt. altsaa noget mindre for Hvid Land og noget mere for Blaa Wiener end i 1945—46, hvor de tilsvarende Tal var 31 og 15 pCt.

Fodringen. I det forløbne Aar har Fodringen i Hovedsagen været gennemført efter de samme Linier, som er anført i foregaaende Aars Beretning, og Foderordenen har været følgende:

Sommer 1946:

Morgenfoder: Tørt Kraftfoder + Grønt.
Aftenfoder: Blødfoder + Grønt + lidt Hø.

Vinter 1946—47:

Morgenfoder: Tørt Kraftfoder + Kaalroer + Hø.
Aftenfoder: Blødfoder + Kaalroer + Hø.

Fra Kontrollens Begyndelse til henimod Høst var der ingen Vanskeligheder ved Fodringen, og Dødeligheden blandt Dyrene var meget lille; men sidst i Juli og i de tre følgende Maaneder var der en ret stærk Stigning i Antallet af Dødsfald som vist i følgende Tabel.

Tabel 2. Antal Dødsfald og Dødsarsagen.

	Hanner	Hunner	Kokcidlose	Forstoppelse	Betændelser	Forblødning v. Kastrering	Andre Aarsager	Ukendte Aarsager
Juni	2	1	1		1	1		
Juli	5	6	6	1	1	3		
August	7	4	3	1	1	1	1	4
September	8	4	2	4	1	2	1	2
Oktober	9	5		3	3		1	7
November	3	6	1	1				7
December	1	2		1	1		1	

Som Følge af Kastrering er 7 Hanner døde. Ser man bort fra dette, har Dødsfaldene fordelt sig med 28 paa hvert Køn. Aarsagen til de ret hyppige Dødsfald af Forstoppelse i September-Oktober Maaned kan rimeligvis søges i, at det daglige Foder blev sat lidt op, da det ved de periodiske Vejninger konstateredes, at Væksthastigheden var for lille. Med Foderforøgelsen vilde man sikre sig, at Dyrene fik det, de kunde fortære. Nogle Dyr har derved ædt mere, end de kunde taale, hvilket antagelig har foraarsaget de forholdsvis mange Tilfælde af Forstoppelse. I Rubrikken for Betændelser er sammenfattet Lunge-, Brysthinde-, Galdeblære-, Lever- og Tarmbetændelse, og Rubrikken »Andre Aarsager« omfatter Hjertesvækkelse og Drejesyge.

Da der omkring Høst var en længere Regnperiode, blev Høet af en temmelig grov Beskaffenhed, og af samme Grund maatte der fodres alt for længe med Grønt af 1. Slæt, saaledes at det Grovfoder (Grønt og Hø), der var til Raadighed, i en lang Periode var groft og meget bladfattigt. Endvidere var Vejret regnfuldt

i Høstens Tid, hvorved Grøntfoderet blev for vaadt og derfor maatte anvendes med megen Varsomhed De noget ugunstige Fodringsforhold har formodentlig været Aarsag til, at Dødeligheden er blevet forholdsvis stor og Væksthastigheden noget mindre end normalt.

I Oktober og November Maaned var der nogle Dødsfald, som vistnok kan henføres under Trommesyge eller Roeforgiftning. Efter Anvisning fra Dyrlægen blev Kaalroerationen i en kortere Periode sat ned til det halve med gunstig Virkning. De Dødsfald, hvor Dødsårsagen ikke har kunnet konstateres, er i Tabellen opført under Rubrikken: Ukendte Aarsager.

Fodringen med Grønt varede fra 1. Juni til 6. Oktober.

De benyttede Kaalroer (Wilhelmsburger) har været udmærkede.

I Kontrolaaret er 11 Hold opløst mod 13 det foregaaende Aar. Af de 150 Hold, hvormed der er gennemført Kontrol, har de 44 kun været paa 2 Dyr. 2 Dyr var døde ved Ankomsten. Ialt er der modtaget 481 Dyr, og 63 Dyr eller 13 pCt. er døde inden Kontrollens Afslutning mod 12 pCt. i 1945—46. Der er Grund til at antage, at det under gunstige Forhold vil være muligt at mindske Antallet af Dødsfald noget.

De forskellige Racers Alder og Vægt ved Modtagelsen. Ifølge Reglerne skal Hold, som indsendes til Kontrol, være 2 Maaneder gamle ved Modtagelsen paa Stationen. I Tabellen nedenfor gives en Oversigt over dette Forhold.

Tabel 3. Racernes Vægt og Alder ved Modtagelsen.

	Alder i Dage ved Kontrollens Begyndelse			Vægt, kg		
	Gennem- snit	ynge	ældre	Gennem- snit	mindste	største
Lille Chinchilla	74	67	85	1,28	0,98	1,73
Lille Sølv	72	67	84	0,96	0,84	1,18
Hvid Land	79	65	102	1,50	1,01	2,12
Blaa Wiener	74	61	87	1,65	1,17	2,13
Hvid Wiener	70	67	72	1,31	1,29	1,32
Bourgogne	80	64	93	1,76	1,25	2,24
Stor Chinchilla	82	72	95	1,81	1,26	2,40
Stor Sølv	91	90	93	1,83	1,54	2,00
Fransk Vædder	78	61	97	1,80	0,95	2,36
Belgisk Kæmpe	88	84	94	2,51	2,31	2,81
Hvid Kæmpe	66	64	67	1,60	1,58	1,62

Efter Modtagelsen har Dyrene en Tilvænningsperiode paa 6—16 Dage, inden de indgaar i Kontrollen, saa Alderen gennemsnitlig bliver ca. 70 Dage ved Kontrollens Begyndelse. Herfra er dog undtaget Belgisk Kæmpe, som først indgaar i Kontrollen ved en Alder af 85 Dage. Som Regel er Dyrene lidt for gamle ved Modtagelsen, og Aldersforskellen er alt for stor. Det henstilles indtrængende til Avlerne at indsende Dyrene saa nær 2 Maaneders Alderen, som det er muligt. Kæmperacerne bør indsendes i 2½ Maanedes Alderen. Vejetallene illustrerer tydeligt, at det er et meget uensartet Materiale, der indsendes; men Mindstevægten er gennemgaaende større, end den var i det første Kontrolaar.

Kontrolresultater.

De forskellige Racers Tilvækst og Foderforbrug.

Den daglige Tilvækst og Foderforbruget har været mere ensartet i Aar end foregaaende Aar. De smaa Racer, Lille Chinchilla og Lille Sølv, har haft en lidt større daglig Tilvækst og et tilsvarende mindre Foderforbrug, medens de mellemstore og godt mellemstore Racer har haft en noget mindre daglig Tilvækst og et større Foderforbrug. Kæmperacerne, Belgisk Kæmpe og Hvid Kæmpe, har som de smaa Racer haft en større Væksthastighed og et mindre Foderforbrug.

Man har gennem Vækstperioden været opmærksom paa den lille Væksthastighed hos Bourgogne og Hvid Wiener, men det har ikke været muligt at faa disse Hold til at æde mere.

De 2 smaa Racer, Lille Chinchilla og Lille Sølv, slagtes ved samme Vægt, 2,50 kg. 3 Aars Kontrol har vist, at Lille Chinchilla har et væsentlig mindre Foderforbrug og en betydelig større daglig Tilvækst end Lille Sølv. De godt mellemstore Racer, Blaa Wiener, Hvid Wiener, Bourgogne, Stor Chinchilla og Stor Sølv, er hidtil blevet slagtet ved en Vægt af 3,50 kg. Af disse Racer har Blaa Wiener stadig givet de bedste Resultater med Hensyn til daglig Tilvækst og Foderforbrug.

Det vil blive undersøgt, om Slagtevægten bør ændres for nogle af disse Racer.

Variationen i Væksthastighed og Foderforbrug mellem Hold af samme Race er stadig meget stor. For de Racer, der er repræsenteret med et tilstrækkelig stort Antal Dyr, har Variationen været følgende:

Tabel 4. Variation i daglig Tilvækst og Foderforbrug.

		Variation i			
		Daglig Tilvækst g pr. Dyr		F.E. pr. kg Tilvækst	
		største	mindste	største	mindste
Lille Chinchilla	1944—45	18	11	9,28	5,43
	1945—46	20	13	7,52	4,40
	1946—47	22	12	6,82	3,43
Hvid Land	1944—45	23	11	9,85	4,89
	1945—46	31	12	9,71	2,93
	1946—47	24	13	8,14	4,04
Blaa Wiener	1944—45	30	16	7,30	3,73
	1945—46	31	19	6,82	3,88
	1946—47	27	17	6,90	3,95
Stor Chinchilla	1944—45	24	12	9,86	4,81
	1945—46	27	17	7,37	4,05
	1946—47	24	17	7,92	4,74
Fransk Vædder	1944—45	24	15	7,64	5,03
	1945—46	30	21	7,32	4,70
	1946—47	24	15	7,90	5,00

Forskellen i Foderforbrug inden for de i Tabel 4 anførte Racer svinger mellem 3 og 5 F.E., fra laveste til højeste, dog forholdsvis mindre for Fransk Vædder. Det fremgaar med al ønskelig Tydelighed, at der ligger et stort Arbejde forude med Udvalg af de Stammer, der har den største Væksthastighed og dermed det lille Foderforbrug i Forhold til en given Tilvækst.

Tabel 5. Daglig Tilvækst og Foderforbrug pr. kg Tilvækst for de forskellige Racer.

	Antal Dyr	Gennemsnitlig pr. Dyr		
		Vægt ved Slagtning kg	Daglig Tilvækst g	F. E. pr. kg Tilvækst
Lille Chinchilla	56	2,56	15,7	5,32
Lille Sølv	14	2,39	10,6	7,72
Hvid Land	114	3,06	17,6	5,98
Blaa Wiener	86	3,55	22,1	5,13
Hvid Wiener	6	3,45	13,6	8,36
Bourgogne	18	3,49	16,0	7,20
Stor Chinchilla	38	3,51	19,5	6,27
Stor Sølv	6	3,58	20,7	5,52
Fransk Vædder	44	3,98	19,7	6,50
Belgisk Kæmpe	18	4,83	22,8	6,90
Hvid Kæmpe	6	4,70	19,2	7,62

Den Slagtevægt, der tilstræbes, er for de smaa Racer 2,5, Hvid Land 3,0, de godt mellemstore Racer 3,5, Fransk Vædder 4,0 og for Kæmperacerne 5,0 kg.

De Racer, hvis Vægt ved Slagtning ligger væsentlig under den tilstræbte Vægt, har i den sidste Del af Fedningstiden en saa lille daglig Tilvækst, at det maa anses for uøkonomisk at bringe dem op til den tilstræbte Slagtevægt. Dette gælder navnlig Lille Sølv og de 2 Kæmperacer. Naar Slagtevægten i andre Tilfælde ligger over den tilstræbte Vægt, maa Aarsagen hertil søges i, at flere eller færre Dyr har været i Fældning, hvorfor Leveringen til Slagteriet er blevet udskudt 1 à 2 Maa-neder.

Som tidligere nævnt har Lille Chinchilla klaret sig betydeligt bedre end Lille Sølv. Som det fremgaar af Tabel 5, er der nogen Forskel paa den Vægt, de 2 Racer er leveret ved, og dersom Lille Sølv skal bringes op paa samme Slagtevægt som Lille Chinchilla, vil den blive endnu ugunstigere stillet ved en Sammenligning.

Slagtesvindet.

Det gennemsnitlige Slagtesvind ligger i det væsentlige paa Linie med Slagtesvindet det foregaaende Aar, for flere Racer en Kende lavere og for enkelte lidt højere.

Tabel 6. Slagtesvindet for de forskellige Racer.

	Antal Dyr	Vægt ved Slagtning kg pr. Dyr	Slagtesvind		Slagtesvind, pCt.	
			kg pr. Dyr	pCt.	laveste Hold	højeste Hold
Lille Chinchilla	56	2,56	1,08	42,1	36,8	45,3
Lille Sølv	14	2,39	0,93	39,1	34,6	44,0
Hvid Land	114	3,06	1,26	41,2	37,6	44,4
Blaa Wiener	86	3,55	1,52	42,9	37,9	46,6
Hvid Wiener	6	3,45	1,38	39,9	39,1	40,6
Bourgogne	18	3,49	1,47	42,1	39,3	43,5
Stor Chinchilla	38	3,51	1,49	42,5	40,0	45,6
Stor Sølv	6	3,58	1,50	42,0	41,1	42,5
Fransk Vædder	44	3,98	1,73	43,4	41,5	45,0
Belgisk Kæmpe	18	4,83	1,97	40,8	38,4	44,2
Hvid Kæmpe	6	4,70	1,95	41,4	40,7	42,0

Kødfylden.

Alle de kontrollerede Racer med Undtagelse af Belgisk Kæmpe har haft en noget bedre Kødfylde end foregaaende Aar. Fransk Vædder har nu paa tredie Aar haft den bedste Kødfylde.

Tabel 7. Points for Kødfylde for de forskellige Racer.

	Antal Dyr	Points for Kødfylde				
		Ryg	Laar	Ialt	laveste Hold	højeste Hold
Lille Chinchilla	56	4,0	4,0	8,0	6,0	9,3
Lille Sølv	14	4,1	4,2	8,3	7,7	9,0
Hvid Land	114	4,2	4,1	8,3	7,3	9,3
Blaa Wiener	86	4,1	4,2	8,3	7,7	9,5
Hvid Wiener	6	4,7	4,5	9,2	9,0	9,3
Bourgogne	18	4,2	4,1	8,3	7,0	9,5
Stor Chinchilla	38	4,2	4,2	8,4	7,3	9,3
Stor Sølv	6	4,7	4,8	9,5	9,5	9,5
Fransk Vædder	44	4,7	4,9	9,6	8,3	10,0
Belgisk Kæmpe	18	4,4	4,5	8,9	7,5	10,0
Hvid Kæmpe	6	4,5	4,3	8,8	8,3	9,3

Fedningsgraden.

Ved Bedømmelsen af Fedningsgraden paa Slagteriet var det paafaldende, at der ikke var saa mange Dyr, der var for fede i Aar som det foregaaende Aar. Næsten alle Racer har haft en Del Dyr, som har været noget for magre og derfor er gaaet i II Klasse; dette gælder navnlig Hvid Land, Stor Chinchilla, Fransk Vædder og i særlig Grad Blaa Wiener, som endog har haft 11 Dyr eller 12,8 pCt. i III Klasse.

Tabel 8. Fedningsgraden for de forskellige Racer.

	Antal Dyr	pCt. Dyr i Klasse				
		I	I f	I ff	II	III
Lille Chinchilla	56	64,3	21,4	1,8	12,5	0
Lille Sølv	14	71,4	14,3	14,3	0	0
Hvid Land	114	60,5	12,3	1,8	25,4	0
Blaa Wiener	86	29,1	1,1	0	57,0	12,8
Hvid Wiener	6	50,0	50,0	0	0	0
Bourgogne	18	83,3	11,1	0	5,6	0
Stor Chinchilla	38	55,3	10,5	0	34,2	0
Stor Sølv	6	83,3	0	0	16,7	0
Fransk Vædder	44	70,5	4,5	0	25,0	0
Belgisk Kæmpe	18	72,2	0	0	27,8	0
Hvid Kæmpe	6	33,4	33,3	0	33,3	0

Kroplængden.

For de smaa Racer, samt for Hvid Land, Blaa Wiener, Bourgogne og Fransk Vædder, er der, inden for de enkelte Racer næsten ingen Forskel i Kroplængden i

Forhold til 1945—46. For Stor Chinchilla, Stor Sølv samt Kæmperacerne er der en Afvigelse i Længden fra foregaaende Aar paa 1—2 cm.

For alle Racer gælder, at de største Forskelle fra Gennemsnittet er ret smaa.

Tabel 9. Kroplængde for de forskellige Racer.

	Antal Dyr	Kroplængde, cm		
		Gennemsnit	mindste	største
Lille Chinchilla	56	38,8	37,3	40,7
Lille Sølv	14	36,8	36,0	37,0
Hvid Land	114	41,1	39,3	43,7
Blaa Wiener	86	44,0	42,5	46,0
Hvid Wiener	6	40,2	39,7	40,7
Bourgogne	18	43,3	41,7	44,5
Stor Chinchilla	38	42,7	40,5	44,3
Stor Sølv	6	42,8	41,5	44,0
Fransk Vædder	44	43,8	42,7	44,7
Belgisk Kæmpe	18	50,4	49,5	51,0
Hvid Kæmpe	6	47,7	47,0	48,3

Skindene.

Alle Skind er, ligesom i Fjor, bedømt baade i Ringsted og København. Bedømmelsen fandt Sted i Marts Maaned. Gennemsnittet af de to Bedømmelser er lagt til Grund for de enkelte Skinds Klassificering. Det viser sig ogsaa i Aar, at der som alle Kaniner leveres til Slagtning i Tiden fra og med Oktober til og med Marts Maaned, vil en Korrektion for Aarstidens Indflydelse paa Kvaliteten være næsten overflødig, saaledes som det fremgaar af efterfølgende Tabel.

Tabel 10. Points for Skind i de forskellige Maaneder.

Slagtemaaned		Antal Skind	Points for Skindbedømmelsen			
			Ring- sted	Køben- havn	Gennem- snit	Korre- ktion
August	1946	15	5,0	5,1	5,1	+ 2,0
September	»	55	5,7	5,9	5,8	+ 1,3
Oktober	»	98	6,6	7,1	6,9	+ 0,2
November	»	131	7,3	7,7	7,5	÷ 0,4
December	»	35	7,4	7,6	7,5	÷ 0,4
Januar	1947	58	7,4	7,5	7,5	÷ 0,4
Februar	»	14	7,6	7,4	7,5	÷ 0,4
Alle Skind	1946—47	406	6,9	7,2	7,1	
»	» 1945—46	383	6,9	7,8	7,4	
»	» 1944—45	358	6,7	6,3	6,5	

Det gennemsnitlige Antal Points for Skindene har været knap saa stort som i 1945—46, men større end i 1944—45. De høje Points er først opnaaet fra og med November Maaned. Antal Points i Oktober Maaned afviger dog kun lidt fra Aarsgennemsnittet, der er paa 7,1 Points.

I Tabel 11 er der foretaget en Opgørelse over Skindenes Klassificering i de enkelte Maaneder, efter at Korrektionen er foretaget.

Tabel 11. Skindenes Klassificering i de enkelte Maaneder.

Slagtemaaned	Antal Skind	pCt. Skind i Klasse		
		I	II	III
August 1946	15	46,7	40,0	13,3
September »	55	40,0	49,1	10,9
Oktober »	98	38,8	54,1	7,1
November »	131	37,4	62,6	0
December »	35	42,8	54,3	2,9
Januar 1947	58	43,1	53,4	3,5
Februar »	14	42,9	57,1	0
Alle Skind 1946—47	406	39,9	55,7	4,4
» » 1945—46	383	61,4	32,9	5,7
» » 1944—45	358	16,0	71,1	12,9

Skindkvaliteten har ikke været saa god som i 1945—46. Kun $\frac{2}{\%}$ af samtlige Skind er kommet i I Klasse imod godt $\frac{3}{\%}$ i 1945—46. Der har været mange flere Skind i II Klasse, medens det procentvise Antal Skind i III Klasse i det væsentlige er uændret. Ca 83 pCt. af samtlige Kaniner er slagtet i Maanederne efter September. Der kan derfor ikke i Slagtetidspunktet findes nogen Grund til den ringere Skindkvalitet. Om det vaade og regnfulde Vejr i Efteraaret har haft nogen Indflydelse paa Skindkvaliteten, er det ikke muligt at udtale sig.

Af efterfølgende Tabel fremgaar det klart, at kun Hvid Land har haft omtrent lige saa mange Skind i I Klasse som Aaret før. Alle de øvrige Racer har haft færre pCt. i I Klasse. Lille Chinchilla har haft godt 21 pCt. i I Klasse mod 60 pCt. det foregaaende Aar. Fransk Vædder har i Aar 47,7 pCt. Skind i I Klasse mod 91,4 i 1945—46. Belgisk Kæmpe er den Race, der procentvis har det største Antal Skind i I Klasse.

Tabel 12. Skindkvalitet og Skindvægt for de forskellige Racer.

	Antal Skind	Gennemsnitspoints for Skind	pCt. Skind i Klasse			Vægt pr. Skind, g frisk
			I	II	III	
Lille Chinchilla	56	7,0	21,4	75,0	3,6	270
Lille Sølv	14	6,1	21,4	57,2	21,4	236
Hvid Land	114	7,3	50,9	45,6	3,5	308
Blaa Wiener	86	6,9	37,2	54,7	8,1	339
Hvid Wiener	6	7,5	50,0	50,0	0	357
Bourgogne	18	6,9	27,7	66,7	5,6	375
Stor Chinchilla	38	7,2	34,2	65,8	0	347
Stor Sølv	6	7,0	16,7	83,3	0	333
Fransk Vædder	44	7,4	47,7	52,3	0	408
Belgisk Kæmpe	18	7,4	72,2	27,8	0	451
Hvid Kæmpe	6	6,8	33,3	66,7	0	443

Vægten af de friske Skind er for alle Racer mindre end i 1945—46.

Ved en Bedømmelse af de garvede Skind foretaget i Maj Maaned, viste det sig, at Bedømmelsen faldt ret nøje sammen med tidligere foretagne Bedømmelser. Der var kun smaa Afvigelser baade for de enkelte Racer og for Skind af Kaniner slagtet paa forskellig Aarstid. Efter dette vil det være tilstrækkeligt med en Bedømmelse af de tørrede raa Skind.

Fremhævede Hanner.

I Tabel 13 er anført nogle Hanner, hvis Afkom har klaret sig forholdsvis godt med Hensyn til Væksthastighed og Foderforbrug. Der er enkelte Afkomshold, der ligger lige saa godt eller bedre end de fremhævede, men for disse gælder, at der kun har været eet Hold med samme fædrene Afstamning til Kontrol. De i Tabel 13 anførte Hold har ikke i alle Henseender opnaaet det bedste Resultat. I enkelte Tilfælde har Slagtesvindet saaledes været større og Points for Kødfylde mindre end Gennemsnittet for den paagældende Race.

Efterhaanden som Kravene skærpes, bør Points for Skind og Skindkvalitet ogsaa ligge i et højere Niveau end for de her anførte Hold, ligesom Fødningsgraden for Blaa Wiener bør være betydelig bedre.

For alle de fremhævede Hold gælder dog, at Faderen til disse har haft Anlæg for stor Væksthastighed og lille Foderforbrug.

Ændringer i Reglerne for Modtagelse af Kød- og Pelskaniner til Kontrol.

Da det har vist sig, at der kan være ret stor Forskel paa Kontrolresultaterne for Hold af samme Afstamning, bl. a. fordi der er en Forskel paa Fodringen om Sommeren og den øvrige Aarstid, er det ønskeligt at faa Tidsrummet for Modtagelse af Kød- og Pelskaniner til Kontrol indsnævret. Det er derfor vedtaget, at Tidsrummet for Modtagelse af Kød- og Pelskaniner bliver fra 15. Juni til 15. August fra 1948 at regne.

Ved en saadan Afkortning af Modtagelsestiden kan man gennemføre en mere ensartet Fodring og dermed opnaa større Sikkerhed i Kontrolresultaterne. Kontrollen med Kød- og Pelskaniner vil kunne afsluttes saa tidligt paa Vinteren, at Meddelelse om Kontrolresultaterne formodentlig vil kunne udsendes inden næste Avlssæsons Begyndelse.

Den mest passende Slagtevægt for Blaa Wiener.

Blaa Wiener er den Race, der har haft den største daglige Tilvækst og det mindste Foderforbrug igennem de 3 Aar, der har været ført Kontrol med Kød- og Pelskaniner paa Favrholm. Det har dog vist sig, at den i andre Henseender lader en Del tilbage at ønske. Bl. a. har den for ringe Kødfylde og er placeret meget daarligt i Sammenligning med de øvrige kontrollerede Racer med Hensyn til Fødningsgrad. I det nu afsluttede Kontrolaar er det den eneste Race, der har haft Dyr i III Klasse.

For at konstatere, om en Ændring af Slagtevægten vil forbedre disse Egenskaber, vil det være ønskeligt, om der kan gennemføres Slagtningsforsøg med denne Race i Lighed med de Forsøg, der er gennemført for Hvid Land. Pladsforholdene har endnu ikke tilladt dette.

For dog at have et Holdepunkt ved en eventuel Ændring af Slagtevægten, har

Tabel 13. Fremhævede Hanner.

Race og Ejer	Holdets Fader	Antal Hold	Daglig Til- vækst	F.E. pr. kg Til- vækst	pCt. Slagte- svind	Krop- længde, cm	Points for Kød- fyldte	Fødningsgrad Antal i Klasse				Points for Skind	Skind i Klasse		
								I	I f	II	III		I	II	III
Lille Chinchilla, Legind Hansen, Kjellerup	37N.9	3	19	4,26	40,1	39,9	7,2	4	4			7,3	5	1	2
Lille Sølv, I. M. Bjergvang, København	83A.4	2	13	5,92	41,5	36,8	8,4	4	1			6,9	1	4	
Hvid Land, Chr. B. Dahl, Sdr. Harritslev	69H.6	2	23	4,51	42,6	40,0	8,3	3		1		7,3	1	3	
Blaa Wiener, Kaj Nielsen, Karrebæksminde	O.U56	3	26	4,23	40,9	45,3	8,3	3		4		6,6	1	6	
Blaa Wiener, Kaj Hjorth, København	37D.2	3	24	4,54	42,4	43,9	8,0	2		5	2	6,8	4	3	2
Blaa Wiener, Georg Madsen, Sorring	50N.4	4	23	4,97	41,7	43,8	8,6	1		8	3	6,9	5	6	1
Georg Madsen, Sorring	49N.4	5	23	5,09	43,1	44,0	8,6	2		9	4	6,3	3	8	4
Stor Sølv, Sv. Aa. Sørensen, Frederiksværk	421W.	2	21	5,32	41,8	42,8	9,5	3		1		6,9	1	3	
Fransk Vædder, Jørgen Hansen, Haldagerlille	404	2	23	5,44	44,0	43,7	9,9	6				7,6	2	4	
Belgisk Kæmpe, Frands Rasmussen, Lundby	21R.8	4	23	6,77	40,6	50,3	8,1	7		2		7,4	6	3	

man sorteret det Materiale, der findes om Blaa Wiener fra de 2 sidste Aars Kontrol, og delt det i Grupper med Vægten paa Slagteriet før Slagtning som Grundlag.

Grupperingen er foretaget med $\frac{1}{4}$ kg Spillerum, og Resultatet ses i følgende Tabel:

Tabel 14. Resultaterne ved forskellig Slagtevægt.

Gruppe Nr.	Antal Dyr	Vægt paa Slagteri, kg	Slagte-vægt, kg	Daglig Til-vækst, g	pCt. Slagte-svind	Antal Dage i Kontrol	Krop-længde, cm	Skindets Vægt, g frisk	Points for Kødfylde			Points for Skind
									Laar	Ryg	Ialt	
1	45	3,38	1,96	21,4	42,0	98	43,8	337	4,0	3,9	7,9	6,4
2	62	3,59	2,04	20,9	43,2	107	43,8	343	4,1	4,1	8,2	7,2
3	31	3,83	2,17	21,9	43,3	108	44,2	374	4,2	4,1	8,3	7,5
4	10	4,10	2,35	22,6	42,7	117	45,5	418	4,3	4,3	8,6	7,4

Ved en Forøgelse af Slagtevægten fra 3,38 til 4,10 kg foregaar der en gradvis Ændring af de forskellige Forhold, som man lægger Vægt paa hos de slagtede Dyr. PCt. Slagtesvind har været ganske svagt stigende, Kroplængden er forøget med knap 2 cm, Skindets Vægt er forøget en Del, Points for Kødfylde og Points for Skind er stigende med en Forøgelse af Slagtevægten.

Med Hensyn til Klassificering efter Fedningsgrad og Skindkvalitet har Opgørelsen vist følgende:

Gruppe Nr.	Fedningsgrad, pCt.					pCt. Skind i Klasse		
	I	If	If	II	III	I	II	III
1	33,3	4,5	2,2	51,1	8,9	26,7	60,0	13,3
2	37,1	1,6	0	50,0	11,3	43,5	50,0	6,5
3	61,3	6,5	0	32,2	0	64,5	35,5	0
4	80,0	10,0	0	10,0	0	60,0	30,0	10,0

Det viser sig, at med større Slagtevægt faar man en bedre Fedningsgrad og flere Skind i Klasse I.

Tanken om at ændre Slagtevægten for Blaa Wiener har tidligere været paa Tale, men man er veget tilbage for at gennemføre en Ændring, før man med Sikkerhed er klar over, hvor den ideelle Slagtevægt ligger.

Efter denne Opgørelse vil det sikkert være rigtigt at slagte Blaa Wiener ved en Vægt af ca. 4,00 kg i Stedet for som hidtil ved 3,50 kg. Efter Tabel 14 er der ingen Nedgang i den daglige Tilvækst, selvom Slagtevægten sættes op til 4,10 kg. Det maa dog bemærkes, at der i Gruppe 4 kun er 10 Dyr, og derfor er Tallene i denne Gruppe ikke saa vel underbyggede som ønskeligt. Ved en Forøgelse af Slagtevægten for Blaa Wiener fra 3,38 til 4,10 kg kan man altsaa med Sikkerhed forvente en meget bedre Fedningsgrad og mange flere Skind i I Klasse, men samtidig maa der regnes med et lidt større Foderforbrug pr. kg Tilvækst.

Det har ikke været muligt ved den foretagne Inddeling at beregne Foderforbruget pr. kg Tilvækst, idet der fra samme Hold kan være Dyr i flere af Grupperne. Da Dyrene i hvert Hold er fodret under eet, kan man ikke beregne det gennemsnitlige Foderforbrug for hver Gruppe.

B. Angorakaniner.

I Kontrolaaret 1. April 1946—31. Marts 1947 er der gennemført Kontrol med 84 Hold fra 28 forskellige Avlere. Af disse var 12 nye Avlere, medens 16 tidligere har haft Hold til Kontrol paa Stationen. Der er ingen opløste Hold, men 1 Hold blev hjemsendt, fordi Dyrene var for unge og for medtagne af Snue ved Ankomsten.

Alle de kontrollerede Hold har bestaaet af 1 Han og 1 Hun. I 9 af Holdene er et Dyr afgaaet inden Kontrollens Afslutning, og Beregningerne omfatter derfor kun 75 Hold imod 89 det foregaaende Aar.

Ved Obduktionen viste det sig, at de afgaaede Dyr havde følgende Sygdomme:

Dødsårsag	Hanner	Hunner
Lungelidelser	2	2
Hjertesvækkelse	0	2
Pseudotuberkulose	1	0
Kokcidiose	1	0
Ukendt Årsag	0	1

Der er stadig en Del Tilfælde af Snue, og enkelte Dyr var ved Hjemsendelsen ret haardt angrebet af denne Lidelse.

Udsætterprocenten har været 5,4 mod 5,1 Aaret før.

Fodringen er foregaaet efter de Retningslinier, som er anført i 1. Meddelelse herfra. Trods den lange og strenge Vinter har det været muligt at give Dyrene ufrosne Roer hele Tiden, men jævnlig er Dyrenes Roeration frosset i Burene, hvorfor en Del Dyr knap har ædt den Ration, de skulde.

For at faa et Indtryk af Angorakaninernes Vægt og Trivsel gennem de sidste 3 Aar er nedenfor anført Vægttal ved Ankomsten til og Afgangen fra Kontrolstationen.

Tabel 15. Angorakaninernes Gennemsnitsvægt, kg.

Aar	Ankomst		Afgang	
	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner
1944—45	2,07	2,11	2,65	2,99
1945—46	2,12	2,14	2,82	3,08
1946—47	2,21	2,19	2,76	3,07

De to Køns Gennemsnitsvægt er omtrent ens ved Ankomsten til Stationen, og der er sket en jævn Stigning af Vægten ved Modtagelsen gennem de 3 Aar, Stationen har været i Gang. Årsagen til den stigende Vægt maa søges i to Forhold, for det første, at der sendes bedre Dyr til Kontrol og for det andet, at næsten alle Avlere har fulgt en Henstilling om først at indsende Dyrene i en Alder af 7—8 Maaneder. Tidligere var flere Hold kun 5 à 6 Maaneder gamle ved Indsendelsen.

At Kaninerne det sidste Kontrolaar har en lidt mindre Afgangsvægt trods den lidt større Vægt ved Modtagelsen, skyldes vistnok den strenge Vinter, hvor det

kunde ses, at Dyrenes Huld ikke var saa godt som tidligere, samt den ringere Kvalitet af Høet, som omtales under Afsnittet om Kød- og Pelskaniner.

Rationen af Kraftfoder blev i Foraaret øget med 10 g daglig pr. Dyr.

Kontrolresultater.

Tabel 16. Uldydelsen hos Dyr af de to Køn, g.

		Sortering			Filt		Ialt
		I	II	III	I	II	
Hanner	1945—46	25	137	87	69	2	320
	1946—47	11	144	66	103	2	326
Hunner	1945—46	42	163	97	43	4	349
	1946—47	34	184	83	50	3	354

Ydelsens procentvise Fordeling.

Hanner	1945—46	7,8	42,8	27,1	21,6	0,7	100,0
	1946—47	3,6	44,2	20,2	31,5	0,5	100,0
Hunner	1945—46	12,1	46,8	27,7	12,2	1,2	100,0
	1946—47	9,4	52,1	23,5	14,0	1,0	100,0

Som det fremgaar af Tabellen, er der en lille Stigning i den samlede Uldydelse, men saaledes at der er samme Forhold mellem de to Køns Uldydelse, som de to foregaaende Aar. Inden for de enkelte Sorteringer er der en Forskydning, saaledes at det samlede Resultat er lidt daarligere i 1946—47 end i 1945—46. Der er mindre Uld i første Sortering (over 7½ cm) og i tredje Sortering, medens Uldmængden i anden Sortering og Filt I er noget større i 1946—47, navnlig er Stigningen i Filt I hos Hannerne stor, fra 21,6 til 31,5 pCt.

Udregnes den samlede Uldmængdes Værdi i Penge, faar man et mere klart og overskueligt Billede af de to Aars Uldydelse. En Undersøgelse viser, at ⅔ af Filt I, med de nugældende Sorteringsregler, gaar i tredje Sortering. Anvendes dette ved Beregningen, betales Ulden med følgende Beløb:

Hanner	1945—46	27,97 Kr.
	1946—47	27,28 „
Hunner	1945—46	31,70 Kr.
	1946—47	32,17 „

Ulden fra 1946—47 er gennemsnitlig betalt med 22 Øre mindre pr. Hold end i 1945—46. Den virkelige Kvalitetsforringelse er dog noget større, end dette Beløb giver Udtryk for, idet Uld i 1. og 2. Sortering betales med samme Pris efter de gældende Afregningsregler, hvor al Uld over 6 cm afregnes ens.

Den største Forskel mellem 2 Kuldsøskendes Uldydelse forekommer i Hold Nr. 227, hvor Hunnen har ydet 156 g Uld mere end Hannen.

I de 75 Hold, Kontrollen omfatter, ligger Hannen højest i Ydelse i 21 Hold, i Hold Nr. 215 er Ydelsen ens for Hannen og Hunnen, og i 53 Hold har Hunnen den største Uldydelse.

Den samlede Ydelse varierer for Hannerne fra 242 til 461 g og for Hunnerne fra 221 til 471 g. Antallet af Dyr med over 400 g i Aarsydelse er i Aar 6 Hanner og 16 Hunner mod henholdsvis 5 og 21 i 1945—46. 6 Hold mod 7 i 1945—46 har haft en Aarsydelse paa over 400 g i Gennemsnit.

Uldens Klassificering. Da det har vist sig, at den hidtil anvendte Skala til Bedømmelse af Uldens Kvalitet giver Anledning til Misforstaaelser og Utilfredshed, er man nu gaaet over til at anvende en Talskala fra 1—10. Denne Skala har den store Fordel, at man let kan beregne et Gennemsnit og derved faa et Sammenligningsgrundlag for Uldens Kvalitet fra Aar til Aar.

Skala til Bedømmelse af Uldens Kvalitet.

Anvendt i 1945—46....	IV	IV÷	III+	III	III÷	II+	II	II÷	I+	I
— - 1946—47....	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

10 Points er det højeste, der kan tildeles en Uldprøve. En Oversigt over de enkelte Uldprøvers Placering findes i følgende Tabel.

Tabel 17. Fordelingen af Uldprøverne efter Antal Points.

Points	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Antal Prøver har faaet										
Hanner	0	0	7	24	27	19	2	1	0	0
Hunner	0	1	1	15	10	22	13	13	3	1

Ligesom de foregaaende Aar har Hannernes Uld været betydelig bedre end Hunnernes. Det gennemsnitlige Antal Points er for Hannerne 6,15 og for Hunnerne 4,94.

I den kommende Tid vil det sikkert være nødvendigt for Angoraavlerne at have Opmærksomheden stærkere henvendt paa Uldens Kvalitet, end det hidtil har været Tilfældet. Skal Ulden i spindeteknisk Henseende være tilfredsstillende, maa mange flere Prøver placeres i Skalaens øverste Ende. Alt for mange af de kontrollerede Kaniner har for mange Dækhaar i Forhold til Uldhaar. Nogle Dyr har haft en meget fin Uld med mange Krusninger; men Ulden har været for fin, hvorfor den har maattet sættes i en lavere Klasse. Nogle faa Dyr har haft en Del krusede Ulddækhaar, hvilket maa regnes for ganske udmærket. De fleste Kaniner har Uld med mange Dækhaar og for faa Krusninger i Uldhaarene.

Ved en skærpet Konkurrence paa Uldmarkedet kan det let gaa saaledes, at det bliver nødvendigt at inddrage andre Egenskaber end Uldens Længde i Afregningen, hvorfor det vil være rimeligt allerede nu at have Opmærksomheden henvendt paa disse Forhold.

Fremhævede Hanner.

I det følgende er nævnt de Hanner, hvis Afkom ved dette Aars Kontrol har opnaaet et Uldudbytte over Gennemsnittet og samtidig en Uldkvalitet fra 6,5 Points og opad.

Tabel 18. Fremhævede Hanner.

Ejer	Han Nr.	Antal Hold	Gennemsnit Ydelse, Kvalitet, g Points	Bemærk- ninger
K. Jensen, Refs Vindinge	M.A.44	1	353 7,5	
O. Munch, Haderslev	Z.069-L.57	2	347 7,3	3 Dyr
H. Jensen, Guldager, Vraa	30D.0	1	348 7,0	
Angorafarmen Lilleø, Korsør ...	D.164	1	364 7,0	
„ „ „ ...	C.261	3	366 6,7	
R. Jørgensen, Ore, Vordingborg	177	1	436 6,5	

Ændring i Reglerne for Modtagelse af Angorakaniner.

Da Uldydelsen varierer baade med Aarstiden og med Dyrenes Alder, er det nødvendigt af Hensyn til Sammenligningsgrundlaget, at Indsendelse af Dyr til Kontrolstationen sker inden for et begrænset Tidsrum.

Det er derfor vedtaget, at Angorakaniner kun modtages til Kontrol i Tiden fra 15. Oktober til 15. December. Dyrene skal være nyklippede ved Ankomsten og ikke over 8 Maaneder gamle.

KØD- OG PELSKANINER 1946—47.

					Antal Dyr ved				Dyrenes Alder i Dage ved					
					Kontrollens				Leve- ring til Slagteri		Kontrol- lens		Lev. til Slag- teri	
					Begynde		Slut- ning							
					Han- ner	Hun- ner	Han- ner	Hun- ner	Han- ner	Hun- ner	Beg.	Slut- ning		
					Holdets									
					Nr.	Fød- sels- dato	Fader	Moder						
Lille Chinchilla.														
W. Felix Frøbjerg,														
Højskole Allé 9, Kastrup		102	21-5	D382	071	1	2	1	2	1	2	78	162	181
»	»	103	21-5	D382	0L57	2	1	1	1	1	1	78	162	178
»	»	104	22-5	D382	70R5	2	1	2	1	2	1	77	175	202
»	»	105	22-5	7X58	46	3	0	3	0	3	0	77	175	187
»	»	106	21-5	D382	7F5	2	1	2	1	2	1	78	203	223
»	»	107	21-5	D382	823U	2	1	2	1	2	1	78	162	186
»	»	108	22-5	7X58	69R5	1	2	1	2	1	2	77	161	180
»	»	137	25-6	D382	F49	2	1	1	1	1	1	71	141	153
»	»	138	24-6	7X58	45	2	1	2	1	2	1	72	154	169
»	»	139	24-6	7X58	070	2	1	2	1	2	0	72	154	157
O. Legind Hansen,														
Bøgildgaard, Kjellerup		3	5-2	37N9	53S0	1	2	1	2	1	2	85	141	178
»	»	17	15-3	37N9	821U	2	1	2	1	2	1	75	145	185
»	»	18	15-3	37N9	974S	2	1	2	1	2	1	75	117	140
»	»	49	17-4	54S0	38N9	1	2	1	2	1	2	70	154	182
»	»	50	13-4	54S0	56S0	1	2	1	2	1	2	74	172	199
Gunnar D. Jensen,														
Frederiksdal, Kjellerup		12	8-3	13	28F9	2	1	2	1	2	1	68	138	172
»	»	13	9-3	13	32N9	2	1	2	0	2	0	67	165	191
»	»	97	24-5	39R7	28F9	2	1	2	0	2	0	75	145	145
»	»	98	25-5	39R7	32N9	2	1	2	1	2	1	74	158	177
Rs. Petersen,														
Hegnet, Vamdrup		43	2-4	6E24	23H7	2	1	2	1	2	1	71	168	194
»	»	109	27-5	6E24	8L04	2	1	1	1	1	1	72	142	152
Lille Sølv.														
J. M. Bjergvang,														
Lergravsvej 39, Kbhvn. S.	...	34	3-4	81C6	4505	2	1	2	1	2	1	70	251	251
»	»	82	18-5	83A4	382T	1	2	1	2	1	2	67	191	211
»	»	83	17-5	83A4	31	1	2	1	1	1	1	68	192	192
Holger Jeppesen,														
Vindinge pr. Roskilde		110	15-5	86H8	OK48	2	1	1	1	1	1	84	195	202
Gule Sølv.														
Niels Jensen,														
Frederiksværksg. 90, Hillerød	112	11-6	64S4	78F7	1	2	1	1	1	1	1	71	228	228
	113	8-6	64S4	80F7	2	1	1	1	1	1	1	74	231	231
Hvid Land.														
J. Petersen Bach,														
Arbejdsanstalten, Aalborg	...	76	9-4	58A0	767F	2	1	2	1	2	1	92	175	191
C. J. Benediktson,														
Grauballe pr. Silkeborg		51	16-3	08N9	04R7	1	2	0	2	0	2	102	144	184
»		52	28-3	94N0	95N0	2	1	2	1	2	1	90	174	197

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Kødfyld (0-10)	Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g	Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Dyr	
Kontrollens		Lev. til Slag- teri						I	If	Iff	II	III			I	II	III	Antal	Dato
Be- gyn- delse	Slut- ning																		
1,39	2,54	2,74	14	6,09	43,6	38,7	8,0	3					258	6,7	3				
1,27	2,59	2,83	15	5,21	41,3	39,0	9,0	2					265	6,9	2		1	3- 9	
1,15	2,51	2,71	14	5,99	43,0	37,3	8,3	3					285	6,4	3				
1,22	2,63	2,76	14	5,77	44,9	38,3	8,7	3					267	6,4	3				
0,98	2,63	2,69	13	6,61	43,0	38,3	7,3	2	1				298	7,1	3				
1,09	2,50	2,80	17	4,82	41,6	38,0	8,3	2		1			283	6,4	3				
1,34	2,57	2,87	15	5,54	41,3	38,7	9,3	3					287	7,3	1	2			
1,34	2,57	2,81	18	5,09	45,3	38,5	8,0	2					255	6,6	2		1	5- 9	
1,20	2,67	2,89	18	4,87	45,1	39,7	8,0	2	1				265	7,3	1	2			
1,23	2,63	2,63	17	5,11	44,1	39,5	8,0	1			1		245	6,9	2			*	
1,46	2,45	2,85	18	4,40	36,8	40,7	7,7	2	1				235	6,0	1		2		
1,28	2,55	2,90	18	4,46	41,6	39,0	8,0		3				313	8,3	3				
1,65	2,51	2,81	20	3,91	41,8	40,0	6,0	2					228	7,5	1	1			*
1,28	2,53	2,73	15	5,46	43,2	39,3	7,7	3					263	8,2	3				
1,36	2,57	2,85	12	6,82	41,8	38,7	8,0		3				280	7,5	1	2			
1,02	2,56	2,85	22	3,43	37,3	39,0	8,0	1			2		243	6,6		3			
1,02	2,67	2,78	16	4,96	37,8	39,0	8,0		1		1		268	7,3		2		1	23- 7
1,32	2,63	2,63	16	5,03	44,4	38,5	7,5				2		253	6,5		2		1	26- 9
1,33	2,57	2,78	15	5,70	43,1	38,0	8,0	3					283	6,4		3			
1,26	2,61	2,86	14	5,75	41,7	38,0	8,3	1	2				323	7,4	1	2			
1,73	2,64	2,84	13	6,62	42,2	39,0	8,5	1			1		263	6,4		2		1	9-10
0,91	2,46	2,46	9	9,75	34,6	37,0	7,7	1		2			240	7,3	2	1			
0,87	2,50	2,57	13	5,95	38,9	37,0	8,7	2	1				245	6,8	1	2			
0,90	2,53	2,53	13	5,89	44,0	36,5	8,0	2					250	6,9		2		1	21- 7
1,18	2,54	2,65	12	6,59	40,0	37,0	9,0	2					260	5,6		1	1	1	27- 8
0,84	2,49	2,49	11	7,86	38,9	37,0	8,0	1	1				225	5,6		2		1	25- 8
1,10	2,36	2,36	8	10,28	38,2	36,0	8,5	2					198	4,1		2		1	27- 9
1,56	3,03	3,36	18	5,78	42,5	41,7	8,0	2			1		312	7,5	2	1			
2,12	3,05	3,54	21	5,00	42,7	42,5	9,0	2					315	6,1		1	1	1	11- 7
1,70	3,02	3,20	16	6,72	42,7	41,3	8,0	3					300	7,9	2	1			

KØD- OG PELSkanINER 1946—47.

	Holdets				Antal Dyr ved						Dyrenes Alder i Dage ved			
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Kontrollens				Leve-ring til Slagteri		Kontrol-lens		Lev. til Slag-teri	
					Begynde-lse		Slut-ning		Han-ner	Hun-ner	Beg.	Slut-ning		
					Han-ner	Hun-ner	Han-ner	Hun-ner				Han-ner		Hun-ner
<i>C. J. Benediktson,</i>														
Grauballe pr. Silkeborg	53	29-3	94N0	99N0	1	2	1	1	1	1	89	159	186	
» » »	91	11-5	94N0	04N1	1	2	1	2	1	2	88	172	178	
» » »	92	11-5	08N9	06N1	2	1	2	1	2	1	88	172	196	
» » »	121	27-5	94N0	60Æ0	1	2	1	2	1	2	86	182	197	
» » »	160	21-7	08N9	96N0	2	1	1	1	1	1	87	170	199	
<i>Chr. Dahl,</i>														
Pedersker St., Bornholm	10	26-2	80H2	442Æ	2	1	2	0	2	0	78	162	217	
<i>Chr. B. Dahl,</i>														
Sdr. Harritslev, Hjørring	124	3-6	69H6	52V7	1	2	1	1	1	1	79	163	175	
» » »	125	1-6	69H6	8-2	2	1	1	1	1	1	81	165	177	
<i>Knud Dahl,</i>														
Pedersker St., Bornholm	150	2-7	80H2	E2	2	1	2	0	2	0	78	204	213	
<i>Robert Groth,</i>														
Katterød, Fyn	28	24-3	4900	76R9	1	2	1	2	1	2	66	177	191	
» »	29	22-3	4900	97N6	1	2	0	2	0	2	68	166	193	
<i>Rud. Hansen,</i>														
Danmarksgade 43, Horsens ..	1	11-2	279M	452Æ	1	2	1	2	1	2	79	135	172	
» » » ..	2	9-2	86S1	459Æ	1	2	1	2	1	2	81	137	174	
<i>F. Hansen,</i>														
Thinggaarden 15, Kbhvn. S. ..	23	18-3	64Æ0	6C97	1	2	1	2	1	2	72	170	191	
» » » » ..	24	18-3	6C96	66Æ0	2	1	2	0	2	0	72	170	217	
» » » » ..	114	2-6	64Æ0	6C98	2	1	2	1	2	1	80	191	201	
<i>Chresten Jensen,</i>														
Overeven, Snese	40	31-3	56Æ0	59S3	2	1	2	1	2	1	73	171	207	
» »	41	1-4	56Æ0	60S3	2	1	2	1	2	1	72	156	177	
» »	42	30-3	56Æ0	17Æ1	1	2	1	1	1	1	74	144	170	
» »	80	29-4	56Æ0	Y059	2	1	2	1	2	1	72	142	170	
» »	94	1-6	Y058	17Æ1	2	1	2	1	2	1	67	150	155	
» »	95	25-5	Y058	14Æ1	2	1	2	1	2	1	74	158	177	
<i>Erik Kjer,</i>														
Lauravej 30 ² , Valby	127	5-6	T932T	936T	1	2	1	1	1	1	77	174	196	
» » »	128	10-6	T932T	943J	1	2	1	2	1	2	72	211	224	
<i>Hartvig Larsen,</i>														
Botofte, Tranekær	151	29-6	M2680	771J	1	2	1	2	1	2	81	159	179	
<i>Army C. Mortensen,</i>														
Vesterled, Rutsker pr. Hasle..	45	8-4	980D	73H2	1	2	1	2	1	2	79	162	176	
<i>Olaf Munch,</i>														
Sønderottingg. 20, Haderslev .	88	14-5	18F1	1055	2	1	1	1	1	1	85	175	175	
<i>Eilif Nielsen,</i>														
Jyderup pr. Vig	21	16-3	H2079	Y614	1	2	1	2	1	2	74	144	184	
» » »	64	29-4	H2079	3C63	0	3	0	3	0	3	72	155	171	
» » »	65	19-4	H2079	Y616	1	2	1	2	1	2	82	152	181	
» » »	96	15-5	54Æ0	88F6	2	1	2	1	2	1	84	168	186	
<i>Fr. Grove Nielsen,</i>														
Trøllund, Heinsvig	33	25-3	E2095	23H4	0	3	0	3	0	3	79	163	185	

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Kedfyde (0-10)	Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g	Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Dyr	
Kontrollens		Lev. til Slagter						I	If	Iff	II	III			I	II	III	Antal	Dato
Be- gyn- delse	Slut- ning																		
1,69	3,00	3,40	19	5,60	38,5	40,5	8,5	1	1				305	7,3	1	1		1	16- 7
1,51	3,21	3,34	20	5,35	43,0	40,7	8,0	3					282	7,8	3				
1,67	3,13	3,51	17	6,25	40,7	41,0	8,7	2	1				298	8,1	3				
1,64	3,10	3,28	15	7,02	44,0	41,7	8,0	2			1		290	7,9	3				
1,41	3,16	3,53	21	5,09	42,4	42,5	9,0	2					348	7,6	1	1		1	7-10
1,39	3,02	3,63	19	4,98	39,4	40,0	9,0	1	1				393	9,3	2			1	4- 7
1,07	3,00	3,19	23	4,53	43,3	40,5	8,0	1			1		265	6,9		2			*
1,19	3,10	3,31	23	4,49	41,8	39,5	8,5	2					285	7,6	1	1			*
1,05	3,09	3,12	16	6,46	38,5	41,0	8,0	2					303	6,9	1	1		1	4-10
1,35	3,15	3,31	16	6,36	42,9	40,7	8,0	3					348	6,7		3			
1,55	3,03	3,20	15	7,14	44,4	40,5	7,5	1			1		335	7,8	1	1		1	14- 6
1,63	3,00	3,54	24	4,04	37,6	41,3	9,0	3					282	7,3	1	2			
1,73	3,01	3,35	23	4,30	38,9	43,0	8,0	3					303	8,0	3				
1,12	3,01	3,22	19	5,06	40,3	41,3	8,0	2			1		313	6,4	1	1	1		
1,15	3,03	3,45	19	5,32	42,4	41,0	8,5	1		1			343	7,7	2				*
1,49	3,09	3,17	14	7,03	39,1	41,7	7,3	3					275	6,8	1	2			
1,48	2,99	3,23	15	6,93	40,2	40,7	8,7	1	1		1		298	7,8	2	1			
1,61	3,13	3,31	18	5,89	41,0	42,0	8,7	1			2		283	7,1	1	2			
1,71	3,16	3,41	20	5,00	41,9	42,5	8,0				2		263	6,8	1	1		1	2- 8
1,69	3,02	3,27	19	5,06	43,3	40,3	8,0	1			2		293	8,2	3				
1,46	2,95	3,21	19	5,88	42,6	41,7	8,0				3		272	6,6		3			
1,72	3,05	3,26	16	6,66	42,4	41,7	9,3	1	1		1		273	7,4	2	1			
1,40	3,08	3,41	16	6,12	41,3	41,0	8,5	1			1		293	7,6	1	1		1	5-11
1,43	3,21	3,40	13	8,14	40,5	40,0	8,0	3					283	6,9	1	2			
1,81	3,07	3,31	16	7,01	43,2	41,3	7,3	1	2				323	7,1	2	1			
1,98	3,21	3,36	15	7,39	40,6	40,3	8,0	2	1				355	7,7	2	1			
1,54	3,14	3,14	18	6,13	40,9	40,5	9,0	1			1		315	7,2	1	1			*
1,77	3,18	3,54	20	5,03	38,4	43,7	8,0	2			1		325	6,8	1	2			
1,76	3,05	3,36	15	7,30	40,0	42,3	8,0				3		302	5,7		3			
2,00	3,08	3,46	15	7,05	42,4	42,7	8,3	2			1		363	7,0	1	2			
1,81	3,28	3,64	18	6,20	40,5	41,0	8,3	2	1				350	7,8	3				
1,51	3,04	3,24	18	5,62	40,7	40,3	8,7	1			2		298	6,4	1	1	1		

KØD- OG PELSkanINER 1946—47.

	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Dyr ved						Dyrenes Alder i Dage ved		
					Kontrollens						Kontrol-		
					Begyndelse		Slutning		Levering til Slagteri		lens		Lev. til Slagteri
					Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Beg.	Slutning	
<i>Holger Nielsen,</i>													
Sandvaadet, Nakskov	74	17-4	315Æ	02J2	2	1	2	1	2	1	84	196	215
„ „	75	14-4	315Æ	102T	1	2	1	2	1	2	87	199	223
„ „	136	2-6	315Æ	52Æ0	2	1	2	1	2	1	94	219	239
<i>Rs. Rasmussen,</i>													
Kishbjerg, Harndrup	72	22-4	V1319	67H3	2	1	2	1	2	1	79	191	204
<i>Hans P. Svendsen,</i>													
Bergsvej 5, Kolding	11	2-3	394S	2U33	1	2	1	2	1	2	74	190	198
„ „ „	22	13-3	83Æ0	U2U34	2	1	2	1	2	1	77	175	192
„ „ „	39	8-4	83Æ0	2U32	1	2	1	2	1	2	65	162	181
<i>Blaa Wiener.</i>													
<i>H. Daugaard,</i>													
Karrebaek, Karrebæksminde ..	46	3-4	Y626	Y352	3	0	3	0	3	0	84	181	197
„ „ ..	47	3-4	Y626	Y363	3	0	3	0	3	0	84	168	191
„ „ ..	48	3-4	Y626	2305	1	2	1	2	1	2	84	168	196
„ „ ..	144	23-6	Y626	1408	2	1	2	1	2	1	87	184	200
<i>Valdemar Eversen,</i>													
Kragenæs pr. Torrig	5	24-2	10Æ0	09Æ0	2	1	2	0	2	0	80	178	204
„ „ „	25	17-3	10Æ0	E197	2	1	2	1	2	1	73	184	198
„ „ „	63	25-4	10Æ0	12V1	2	1	1	1	1	1	76	160	174
<i>Kaj Hjorth,</i>													
Østerdalsgade 3 B, 3., Kbh. S.	35	7-4	37D2	27S5	2	1	2	1	2	1	66	163	182
„ „ „	36	12-4	24S5	38D2	2	1	2	1	2	1	61	159	187
„ „ „	37	7-4	37D2	26S5	2	1	2	1	2	1	66	164	181
„ „ „	38	7-4	24S5	34D2	2	1	2	0	2	0	66	178	192
„ „ „	56	23-4	37D2	84M1	1	2	1	2	1	2	64	148	165
<i>E. Hou,</i>													
Nyvej, Birkerød	54	20-4	61H9	0U61	2	1	2	1	2	1	67	165	186
„ „	55	20-4	61H9	0U61	2	1	2	1	2	1	67	164	180
„ „	145	3-7	R204	R208	1	2	1	2	1	2	77	174	190
„ „	146	13-7	61H9	0U58	2	1	2	1	2	1	67	164	180
„ „	147	12-7	61H9	0U67	1	2	1	2	1	2	68	160	171
<i>Georg Madsen,</i>													
Sorring pr. Toustrup	6	26-2	50N4	57H9	1	2	1	2	1	2	78	162	202
„ „ „	7	24-2	49N4	34N4	1	2	1	2	1	2	80	164	204
„ „ „	8	3-3	50N4	51H9	2	1	2	1	2	1	73	157	197
„ „ „	9	3-3	49N4	52H9	2	1	2	1	2	1	73	171	197
„ „ „	73	8-5	49N4	54N4	1	2	1	2	1	2	77	161	174
„ „ „	84	7-5	50N4	44N4	1	2	1	2	1	2	78	147	163
„ „ „	85	12-5	49N4	53H9	1	2	1	2	1	2	73	142	152
„ „ „	86	6-5	50N4	80N0	1	2	1	2	1	2	79	148	171
„ „ „	87	12-5	49N4	0X40	1	2	1	2	1	2	73	143	164

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F.E. pr. kg Tilvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Kedryde (0-10)	Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g	Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Dyr	
Kontrollens		Lev. til Slag- teri						I	II	III	IV	V			I	II	III	Antal	Dato
Be- gyn- delse	Slut- ning																		
1,37	3,07	3,31	15	6,87	40,5	40,0	9,3	3					350	8,3	3				
1,48	3,11	3,41	15	7,16	38,6	40,3	9,3	1	1	1			333	7,9	3				
1,19	3,06	3,26	15	6,98	39,9	40,3	8,7	1	2				302	7,1	2	1			
1,01	3,18	3,44	19	5,42	43,8	39,7	8,7	2		1			307	7,1		3			
1,13	3,03	3,20	16	6,18	40,0	40,7	7,7		2	1			275	5,8		2	1		
1,15	3,06	3,31	19	5,02	40,9	39,3	8,0	1		2			290	7,1		3			
1,15	3,00	3,23	19	5,46	42,8	41,7	8,0	3					302	7,1		3			
1,92	3,55	3,85	17	6,90	42,1	43,3	8,3	1	1		1		360	7,0	1	2			
1,80	3,50	3,75	20	5,48	43,4	43,7	8,0	1		2			343	7,4	2	1			
1,95	3,51	3,79	19	5,96	42,4	44,3	8,0	1		2			348	7,7	3				
1,71	3,70	3,99	20	5,64	46,6	44,0	8,0	1		2			348	7,8	3				
1,49	3,54	3,82	22	5,10	39,1	43,0	9,5	2					378	7,6	1	1		1	11- 7
1,58	3,61	3,76	18	6,07	43,3	43,7	8,3	1		2			362	7,4	1	2			
1,66	3,50	3,73	22	5,21	45,4	44,0	8,0				2		323	8,2	2			1	3- 7
1,33	3,61	3,87	23	4,69	43,9	44,3	8,3	2		1			350	7,2	2	1			
1,17	3,55	3,87	24	4,52	44,7	44,0	8,0			3			323	7,4	1	2			
1,31	3,61	3,79	24	4,66	41,5	43,3	8,0			3			348	6,5	1	1	1		
1,18	3,51	3,76	21	5,05	45,7	43,5	8,0			2			325	7,5	1	1		1	5- 7
1,49	3,59	3,81	25	4,26	41,7	44,0	7,7			1	2		340	6,7	1	1	1		
1,52	3,51	3,81	20	5,51	42,9	43,3	8,3	2		1			345	7,3	1	2			
1,70	3,54	3,85	19	5,92	41,3	44,3	8,7	1		2			343	7,2	1	2			
1,77	3,68	3,99	20	5,87	42,7	44,3	8,3	1		2			310	7,1	1	2			
1,75	3,79	4,12	21	5,49	46,5	45,3	8,3	2		1			345	6,8		3			
1,79	3,63	3,83	20	5,71	43,3	43,3	8,0	2		1			337	6,8		3			
1,58	3,52	4,00	23	4,76	39,7	44,0	9,3			3			328	7,6	1	2			
1,45	3,51	4,00	25	4,45	38,6	44,7	9,3			2	1		328	6,1		2	1		
1,49	3,58	4,00	25	4,43	37,9	44,3	9,0			2	1		292	6,8	1	2			
1,40	3,55	3,86	22	5,09	42,6	43,7	9,0	1		2			327	6,1	1	1	1		
1,73	3,56	3,83	22	5,45	44,1	43,0	8,0			3			343	7,0	1	2			
2,13	3,62	3,88	21	5,44	43,7	43,3	8,0	1			2		332	6,5	1	2			
2,03	3,57	3,72	22	5,25	43,8	43,7	8,3			1	2		293	5,9		2	1		
1,98	3,53	3,95	22	5,24	45,3	43,7	8,0			3			333	6,5	2		1		
1,98	3,55	3,92	22	5,22	46,2	45,0	8,3	1		1	1		338	6,3	1	1	1		

KØD- OG PELSkaniner 1946—47.

Holdets					Antal Dyr ved						Dyrenes Alder i Dage ved			
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Kontrollens		Leve-ring til Slagteri		Han-ner	Han-ner	Han-ner	Kontrol-lens		Lev. til Slag-teri
					Begyn-delse	Slut-ning	Beg.	Slut-ning						
Kaj Nielsen,														
Syvhojegaard, Karrebæksminde	44	29-3	0U56	Y386	0	3	0	2	0	2		75	145	171
»	78	24-4	0U56	Y381	1	2	0	2	0	2		77	147	159
»	79	1-5	0U56	Y642	1	2	1	2	1	2		70	153	176
P. Skovborg Nielsen,														
Serritslev pr. Tvingstrup	141	1-7	69L9	286M	1	2	0	2	0	2		79	155	170
»	142	1-7	84H7	288M	2	1	2	0	2	0		79	148	170
Hvid Wiener.														
Harald Johansen,														
Dalgas Avenue 19, Aarhus	57	20-4	308W	70A4	2	1	2	1	2	1		67	225	244
»	58	15-4	65V7	05N3	2	1	2	1	2	1		72	239	259
Bourgogne.														
P. E. Mikkelsen,														
Sorring pr. Toustrup	117	20-5	75N4	83N4	1	2	0	2	0	2		93	163	179
»	118	23-5	6H40	0X52	1	2	1	2	1	2		90	215	236
Fr. Nielsen,														
Vedskølle pr. Vallø	129	5-6	Y342	Y331	2	1	1	1	1	1		77	174	180
Sv. Br. Nielsen,														
Marediget 6, Charlottenlund	30	19-3	80S5	151T	2	1	1	1	1	1		71	169	188
»	31	26-3	147T	24F9	2	1	2	1	2	1		64	231	236
»	122	3-6	80S5	151T	1	2	1	2	1	2		79	237	238
»	140	25-6	80S5	87S5	2	1	2	1	2	1		85	182	198
Stor Chinchilla.														
Ejner Kyed,														
Melhede, Tørring	99	20-5	G14	0Æ78	1	2	1	2	1	2		79	189	189
»	100		0Æ70	33J1	2	1	2	1	2	1				
»	101	18-5	0Æ70	163W	2	1	1	1	1	1		81	192	199
Verner Larsen,														
Sjællandsgade 55, Aarhus	70	17-4	Z602	331W	2	1	2	1	2	1		84	167	177
»	149	1-7	Z602	331W	1	2	1	2	1	2		79	176	201
»	153	3-7	Z602	31H5	2	1	2	1	2	1		77	164	193
Hans E. Petersen,														
Plantagevej, Frederikssund	19	16-3	94F9	24P0	1	2	1	2	1	2		74	185	212
»	20	18-3	50	2K83	2	1	2	1	2	1		72	170	192
Ejner Pedersen,														
Bregninge pr. Kettinge	156	29-6	42S8	00Æ3	2	1	2	1	2	1		95	173	193
»	157	30-6	42S8	45-5	1	2	0	2	0	2		94	162	163
Henry Sørensen,														
Schüttesvej, Horsens	32	16-3	28N9	43J1	1	2	1	2	1	2		88	185	201
Sigvald Thygesen,														
Kokkedalsgaard pr. Rønde	81	8-5	304W	64N5	2	1	1	1	1	1		77	188	191
»	135	6-6	304W	44J1	0	3	0	2	0	2		90	160	172
Astrid Warming,														
Gammelgaard, V. Skerninge	4	26-2	55-5	45	2	1	2	1	2	1		78	176	202

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F.E. pr. kg Tilvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Kæfhyde, (0-10)	Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g	Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Dyr	
Kontrollens		Lev. til Slag- teri						I	If	Iff	II	III			I	II	III	Antal	Dato
Begyn- delse	Slut- ning																		
1,79	3,68	4,09	27	3,95	40,1	45,5	9,0	1			1		363	7,3	1	1		1	17- 6
1,78	3,63	3,71	26	4,02	41,9	44,5	8,0				2		360	6,0		2		1	31- 7
1,54	3,50	3,98	24	4,72	40,8	46,0	8,0	2			1		397	6,5		3			
1,66	3,52	3,84	25	4,72	44,5	42,5	8,0	1			1		328	7,1	1	1		1	12- 9
1,61	3,50	3,97	25	4,32	43,6	43,5	8,5	1			1		325	6,1		2		1	10-11
1,29	3,51	3,66	14	8,23	39,1	39,7	9,3	2	1				347	7,4	2	1			
1,32	3,50	3,74	13	8,48	40,6	40,7	9,0	1	2				367	7,6	1	2			
2,24	3,64	3,94	20	6,59	43,5	44,5	8,5	1			1		373	6,4		2		1	3- 9
2,02	3,50	3,69	12	9,90	41,5	44,0	7,7	3					378	7,3	2	1			
1,98	3,57	3,70	15	6,75	43,4	43,5	7,0	2					330	7,1		2		1	6-10
1,70	3,65	3,89	20	5,60	40,8	43,5	9,5	1	1				395	6,0		1	1	1	14- 6
1,25	3,55	3,69	15	7,58	39,3	41,7	9,0	2	1				410	7,5	2	1			
1,28	3,57	3,62	15	7,68	43,3	42,7	8,0	3					365	6,8		3			
1,88	3,64	3,94	18	6,29	43,2	43,3	8,3	3					375	7,3	1	2			
1,68	3,70	3,70	18	6,05	45,6	44,3	8,0				3		277	6,4		3			
1,57	3,57	3,72	18	6,03	42,0	43,3	7,3	2			1		327	6,8		3			
1,58	3,51	3,71	17	6,59	41,7	42,5	8,5		2				355	7,1		2		1	31-10
2,04	3,59	3,71	19	6,03	41,2	42,7	9,3	3					363	7,4	2	1			
1,72	3,63	3,97	20	5,84	43,9	43,0	8,3	2			1		395	7,1	1	2			
1,86	3,76	4,17	22	5,39	44,9	43,0	8,3	1			2		377	6,9	1	2			
1,35	3,66	3,90	21	5,46	40,8	42,3	8,3	1	1		1		367	7,7	2	1			
1,26	3,56	3,80	24	4,74	41,0	41,7	9,0	3					377	8,3	3				
2,32	3,70	3,95	18	7,02	43,7	43,7	8,7	3					377	6,8		3			
2,40	3,67	3,67	18	7,92	41,3	40,5	8,0	2					335	7,1	1	1		1	25-10
1,89	3,66	3,80	18	6,50	41,3	43,0	8,3	1			2		342	7,1		3			
1,72	3,69	3,78	18	7,09	43,3	42,5	8,5				2		288	6,6		2		1	28- 7
2,07	3,63	3,83	21	6,31	43,8	42,5	9,0	1			1		310	7,1		2		1	30- 9
1,85	3,50	3,81	17	6,87	40,0	43,0	8,0	2	1				372	8,6	3				

KØD- OG PELSCHANINER 1946—47.

	Nr.	Fødselsdato	Holdets		Antal Dyr ved								Dyrenes Alder i Dage ved		
					Kontrollens				Leve- ring til Slagteri				Kontrol- lens		Lev. til Slag- teri
					Begyndelse		Slut- ning		Han- ner	Hun- ner	Han- ner	Hun- ner	Han- ner	Hun- ner	
					Han- ner	Hun- ner	Han- ner	Hun- ner							
Stor Sølv.															
<i>Vald. Rørbæk,</i>															
Slauggaard, Vorbasse	116	22-5	66B0	6E46	2	1	1	1	1	1	91	174	177		
<i>Svend A. Sørensen,</i>															
Strandgade 17, Frederiksværk	111	23-5	421W	48S4	2	1	2	0	2	0	90	174	186		
„ „ „	161	15-7	421W	47S4	1	2	1	1	1	1	93	191	205		
Fransk Vædder.															
<i>Jørgen Hansen,</i>															
Haldagerlille pr. Fuglebjerg..	14	4-3	404	027	2	1	2	1	2	1	72	211	221		
„ „ „ ..	15	2-3	400	406	2	1	2	1	2	1	74	186	213		
„ „ „ ..	16	1-3	404	405	1	2	1	2	1	2	75	200	219		
<i>Jens Chr. Jensen,</i>															
Værløse pr. Fakse	158	15-7	02S4	74C1	2	1	2	1	2	1	79	157	179		
<i>Knud Jensen,</i>															
Aale St.	130	20-5	6528	00S4	1	2	1	2	1	2	93	218	234		
„ „	131	8-6	98S3	99S3	2	1	2	1	2	1	74	199	215		
<i>Edvin Jørgensen,</i>															
Skolevænget 29, Kastrup	132	30-5	817D	36S6	0	3	0	3	0	3	97	213	223		
<i>Martin Nielsen,</i>															
Agnetevej, Frederikshavn ...	68	10-5	68D2	004W	1	2	1	2	1	2	61	173	189		
„ „ „ ...	69	5-5	68D2	57H6	2	1	2	1	2	1	66	196	202		
<i>Sv. Br. Nielsen,</i>															
Marediget 6, Charlottenlund ..	123	3-6	6605	93S3	2	1	2	1	2	1	79	185	195		
<i>Børge Lund Petersen,</i>															
Breth, Barrit	93	14-5	37S2	284M	2	1	2	1	2	1	85	219	230		
<i>F. Wanning,</i>															
Baunehøjvej 20, Kgs. Lyngby	59	23-4	73J1	74J1	2	1	2	1	2	1	78	190	209		
„ „ „ „	60	23-4	73J1	78J1	2	1	2	1	2	1	78	185	203		
„ „ „ „	61	23-4	73J1	77J1	2	1	2	1	2	1	78	190	208		
„ „ „ „	62	23-4	73J1	6805	3	0	2	0	2	0	78	176	196		
Belgisk Kæmpe.															
<i>Henry Jensen,</i>															
H. C. Ørstedesvej 23, Aarhus..	71	24-4	A5	298W	2	1	2	1	2	1	91	189	208		
<i>Frands Rasmussen,</i>															
Ring Øbjerg pr. Lundby	66	10-4	J377	Kram13	2	1	2	1	2	1	91	220	222		
„ „ „ „	67	7-4	J377	3900	1	2	1	2	1	2	94	232	232		
„ „ „ „	89	14-5	21R8	19R8	2	1	1	1	1	1	85	195	195		
„ „ „ „	90	13-5	21R8	N80	2	1	1	1	1	1	86	184	196		
„ „ „ „	119	28-5	21R8	491Æ	1	2	0	2	0	2	85	196	196		
„ „ „ „	120	29-5	21R8	37Æ0	1	2	1	2	1	2	84	195	205		
Hvid Kæmpe.															
<i>Ove Hansen,</i>															
St. Paulsgade 40 A, Aarhus ..	26	23-3	9X01	26R8	1	2	1	2	1	2	67	245	245		
„ „ „ „ ..	27	26-3	9X01	28R8	1	2	1	2	1	2	64	244	249		

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F.E. pr. kg Tilvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for kødflyde (0-10)	Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g	Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Dyr	
Kontrollens		Lev. til Slagte- teri						I	If	Iff	II	III			I	II	III	Antal	Dato
Be- gyn- delse	Slut- ning																		
2,00	3,71	3,81	21	5,92	42,3	43,0	9,5	2					315	7,1		2		1	28- 8
1,96	3,61	3,92	20	5,89	41,1	44,0	9,5	1			1		315	6,4		2		1	22- 8
1,54	3,69	3,86	21	4,75	42,5	41,5	9,5	2					370	7,4	1	1		1	1-12
0,95	4,22	4,35	23	5,13	44,4	44,0	10,0	3					467	7,0		3			
1,34	4,02	4,34	24	5,00	42,0	44,3	9,7	2			1		427	7,1	1	2			
1,38	4,09	4,32	22	5,74	43,6	43,3	9,7	3					423	8,1	2	1			
2,36	3,77	4,32	18	6,96	42,6	43,7	8,3	3					398	7,1		3			
2,20	4,10	4,47	15	7,72	43,6	44,3	9,7	2			1		412	7,6	3				
1,98	4,23	4,62	18	6,50	44,0	44,3	10,0	2			1		438	7,8	3				
1,95	4,20	4,31	19	6,48	42,2	44,0	9,3	2			1		400	7,1	1	2			
1,72	4,00	4,23	20	5,90	43,9	42,7	10,0	2			1		393	7,4	2	1			
1,65	4,12	4,25	19	6,14	43,0	44,3	9,3	1			2		370	6,9		3			
2,16	3,90	4,01	16	7,90	41,5	44,7	9,3	2			1		380	7,8	2	1			
1,61	4,09	4,27	18	6,87	43,2	43,3	9,3	2	1				400	6,8		3			
1,86	4,00	4,18	19	6,78	43,6	43,3	10,0	3					385	7,4	2	1			
1,92	4,09	4,33	20	6,36	45,0	42,7	10,0	1			2		372	7,5	2	1			
1,97	4,00	4,21	18	7,12	43,1	43,7	9,7	2			1		395	7,3	1	2			
2,01	4,06	4,44	18	6,95	44,8	44,5	10,0	1	1				453	7,6	2			1	21- 9
2,49	5,10	5,37	27	5,72	42,6	50,3	10,0				3		450	6,9	1	2			
2,31	5,16	5,18	22	7,37	41,0	50,7	10,0	3					472	7,6	3				
2,53	5,15	5,15	19	8,16	39,9	50,3	9,7	3					457	7,9	3				
2,65	5,11	5,11	22	7,16	44,2	49,5	8,0				2		415	7,4	1	1		1	26- 9
2,81	5,03	5,27	23	7,21	39,8	50,5	8,0	2					455	7,6	1	1		1	10- 8
2,32	5,14	5,14	23	6,31	39,9	50,5	7,5	2					440	7,1	1	1		1	22-10
2,49	5,13	5,30	24	6,38	38,4	51,0	9,0	3					465	7,6	3				
1,58	5,05	5,05	20	7,47	42,0	48,3	8,3	1	1		1		458	6,9	1	2			
1,62	5,00	5,10	19	7,76	40,7	47,0	9,3	1	1		1		427	6,6	1	2			

ANGORAKANINER

Avler	Holdets			
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder
Valborg Andersen, Fladholte, Slagelse	201	12- 3-45	147	54
» » » »	202	23- 6-45	197	56
Angorafarmen »Lilleø«, Korsør	172	9- 2-45	8338	H136
» » »	173	9- 2-45	2156	2343
» » »	174	6- 2-45	FK27	E49
» » »	175	6- 2-45	C261	471X
» » »	176	6- 2-45	MF04X	AB38
» » »	177	9- 2-45	3599	L457
» » »	178	9- 2-45	3599	JA23
» » »	179	6- 2-45	»J«	2392
» » »	190	21- 2-45	C261	1919
» » »	191	19- 2-45	DA87	1806
» » »	192	23- 2-45	AB67	2746
» » »	193	19- 2-45	FA84	AB50
» » »	194	23- 2-45	C261	H147
» » »	226	28- 6-45	DA87	3606
» » »	227	4- 6-45	8338	PG03
» » »	244	25- 7-45	DA82	F319
» » »	245	25- 7-45	D164	KA85
» » »	246	23- 7-45	FA84	SS07
» » »	247	18- 7-45	3599	FA58
» » »	248	18- 7-45	AB67	669
» » »	249	18- 7-45	Z009	F5B/3
Chr. Christiansen, Karlstrup pr. Taastrup	243	7- 6-45	110	328T
E. Eriksen, Højbjerg, Ballerup	180	10- 3-45	90	9
» » » »	181	11- 3-45	H81	45
David Hansen, Frelunde, Korsør	219	2- 5-45	KD04	89
» » » »	220	14- 5-45	KD04	3018
P. Hansen, Tornby St.	185	26- 4-45	81V7	103
» » » »	186	26- 4-45	2331	83VJ
» » » »	187	17- 4-45	69V5	75V4
Th. Hansen, Løkkevej 8, Lindholm, Nr. Sundby	222	29- 8-45	649V	F864
» » » » »	223	15- 5-45	13V4	31M9
K. Hjarsen, Vejlbj, Aalsøe	215	1- 5-45	75	X79
» » » »	250	15- 8-45	583W	591W

Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Vægt i kg ved Kontrollens				F. E. pr. Dyr ialt	Klipningsresultater				
Beg.		Slutn.		Begyndelse		Slutning			Hanner		Hunner		
Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		Samlet Udvaldelse, g	Udkvali- tet, Points	Samlet Udvaldelse, g	Udkvali- tet, Points	
1	1	1	1	2,42	2,56	2,87	3,50	34,2	331	5	268	5	Han død 5-6-46
1	1	0	1	1,93	1,72	—	3,15	33,7	—	—	309	2	
1	1	1	1	2,12	2,45	2,66	3,03	34,0	316	7	369	5	Hun død 21-12-45
1	1	1	1	2,30	2,65	2,74	3,01	34,8	338	6	273	4	
1	1	1	1	2,73	2,37	3,40	3,18	34,8	318	7	285	5	
1	1	1	1	2,00	2,17	2,16	2,95	32,1	263	7	418	5	
1	1	1	1	2,61	2,52	3,23	3,25	35,9	309	6	272	7	
1	1	1	1	2,33	2,34	2,94	3,28	34,3	331	8	353	5	
1	1	1	1	2,44	2,28	3,04	3,21	34,2	343	7	327	7	
1	1	1	1	2,81	2,42	3,54	3,34	35,2	289	5	404	5	
1	1	1	1	2,38	2,57	2,71	2,97	34,6	361	7	332	7	
1	1	1	1	2,34	2,66	2,92	3,46	34,2	299	6	404	4	
1	1	1	0	2,40	2,25	2,76	—	34,1	301	6	—	—	
1	1	1	1	2,53	2,55	3,07	3,05	35,5	345	5	421	4	
1	1	1	1	2,06	2,25	2,40	2,72	30,3	365	7	457	7	
1	1	1	1	2,91	2,75	3,26	3,65	36,1	362	6	410	4	
1	1	1	1	2,46	2,44	2,90	3,24	34,5	275	6	431	5	
1	1	1	1	2,55	2,45	3,26	3,43	34,5	371	6	404	3	
1	1	1	1	1,90	2,36	2,52	2,82	31,3	339	7	389	7	
1	1	1	1	2,20	2,36	2,75	2,86	34,0	357	6	362	6	
1	1	1	1	1,90	2,28	2,47	3,13	33,8	286	5	337	5	
1	1	1	1	2,24	2,35	2,56	2,91	33,9	370	6	327	5	
1	1	1	1	2,62	2,33	3,19	3,16	35,4	312	6	325	3	
1	1	1	1	1,88	1,89	2,62	2,80	32,0	313	5 for fin	344	4	Han død 5-11-45
1	1	1	1	2,70	2,22	3,21	2,93	35,1	428	5	424	3	
1	1	1	1	2,30	2,37	2,79	3,00	34,0	429	5	454	6	
1	1	1	1	2,57	2,40	3,27	3,47	34,5	427	5	348	3	
1	1	1	1	2,38	2,17	3,28	3,41	34,7	396	6	336	6	
1	1	1	1	1,77	2,10	2,44	3,16	31,5	301	6	411	6	
1	1	0	1	1,76	1,72	—	2,56	31,0	—	—	283	6	
1	1	1	1	1,92	1,70	2,41	3,02	32,2	293	6	326	7	
1	1	1	1	1,81	1,67	2,39	2,81	31,3	358	5	329	5	
1	1	1	1	2,37	2,19	2,70	2,68	33,0	402	6 glansf.	293	5	
1	1	1	1	2,51	2,30	3,12	3,42	35,3	333	6	333	3	
1	1	1	1	2,17	1,94	2,76	2,97	33,5	339	7	356	4	

ANGORAKANINER

Avler	Holdets			
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder
<i>E. Jensen</i> , Osager, Lejre	169	2-10-44	970D	43T7
» » » »	195	14- 3-45	68	969+
» » » »	196	18- 3-45	68	129
» » » »	197	4- 3-45	68	E439
» » » »	235	2- 7-45	5	104
<i>H. Jensen</i> , Guldager pr. Vraa	205	27- 4-45	30D0	32D0
<i>K. Jensen</i> , Lindekær, Refs-Vindinge	233	19- 8-45	MA44	4032
<i>P. Ruus Jørgensen</i> , Ore, Vordingborg	218	4- 5-45	177	19C
<i>Sv. D. Larsen</i> , Hasmark Mk., Otterup	209	3- 5-45	89	14
<i>Olaf Munch</i> , Sønderottinggade 20, Haderslev	170	13- 4-45	Z069-L57	6Æ54
» » » » »	171	12- 4-45	Z059-L57	0H80
» » » » »	212	6- 8-45	26W6	08H0
» » » » »	213	5- 8-45	26W6	Z070
» » » » »	214	6- 8-45	26W6	6E54
<i>G. Bastholm Nielsen</i> , Sorøvej, Skelskør	182	23- 3-45	Y318	492T
» » » » »	183	10- 4-45	Y318	493T
» » » » »	184	25- 4-45	Y318	491T
<i>H. Nielsen</i> , Skovbovej 29, Svendborg	224	4- 8-45	040T	224T
<i>Th. Nielsen</i> , Spangsbro, Kalundborg	206	12- 4-45	LJ93	5283
» » » » »	207	14- 4-45	155	5284
<i>V. Nielsen</i> , Angorafarmen, Viemose	199	24- 2-45	+75-963Æ	212
» » » » »	208	24- 4-45	+75-963Æ	215
» » » » »	210	3- 5-45	+75-963Æ	962Æ
» » » » »	211	14- 5-45	+75-963Æ	212
» » » » »	234	29- 7-45	+87-821Æ	962Æ
<i>N. Olrik</i> , Angorafarmen, Nivaa, Nivaa St.	217	2- 5-45	1	0
<i>O. Olsen</i> , Borup, Rønnede	188	25- 3-45	3613	95
» » » » »	189	2- 4-45	3365	32
» » » » »	200	6- 5-45	3613	30F5
<i>Fr. Rabeck</i> , Nøddebo, Klemensker	221	20- 6-45	66H2	69H2
<i>Chr. L. Rasmussen</i> , Bilstoft, Næshjerg	228	26- 6-45	5230	4H96
» » » » »	229	27- 6-45	5230	606B

Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Vægt i kg. ved Kontrollens				F. E. pr. Dyr ialt	Klipningsresultater				
Beg.		Slutn.		Begyndelse		Slutning			Hanner		Hunner		
Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		Samlet Uddyde- lse, g	Udkval- tet, Points	Samlet Uddyde- lse, g	Udkval- tet, Points	
1	1	1	1	2,14	2,28	2,30	2,70	30,1	292	7	333	5	Hun død 22-3-46
1	1	1	1	2,13	2,23	2,62	2,95	34,5	270	5 glansf.	376	6	
1	1	1	1	2,31	2,07	2,81	3,04	34,5	320	6	357	3	
1	1	1	1	2,37	2,20	2,73	3,17	33,8	283	5	431	7	
1	1	1	0	2,20	2,48	2,59	—	32,4	333	7	—	—	
1	1	1	1	2,28	2,23	2,54	3,12	33,5	305	8 glansf.	390	6	
1	1	1	1	2,45	2,21	2,96	3,25	34,7	308	7	398	8	
1	1	1	1	2,43	2,40	2,85	3,23	34,1	441	6	431	7	
1	1	1	1	2,12	2,00	2,74	3,29	34,5	281	8	362	7	
1	1	0	1	2,03	1,99	—	3,51	35,3	—	—	371	7	Han død 8-1-46
1	1	1	1	1,71	2,41	2,66	2,82	33,4	314	8	357	7	
1	1	1	1	2,22	2,05	2,92	2,97	33,3	298	6	336	7	
1	1	1	1	2,00	1,84	2,62	3,01	32,3	295	7	360	5	
1	1	1	1	1,90	1,65	2,45	2,47	30,1	284	7	321	6	
1	1	1	1	1,65	1,73	2,67	3,00	32,2	293	4	328	4	
1	1	1	1	1,83	1,60	2,70	2,50	33,7	307	3	306	2	
1	1	1	1	1,70	1,66	2,67	3,17	34,1	278	4	417	3	
1	1	1	0	1,51	1,71	2,18	—	25,5	259	7	—	—	Hun død 1-8-46
1	1	1	1	2,71	2,56	3,02	3,10	34,4	336	7	359	4	
1	1	1	1	2,70	2,58	3,14	3,23	35,6	350	7	317	3	
1	1	1	1	2,62	2,75	2,78	3,12	35,1	385	6	471	5	
1	1	1	0	2,66	2,38	2,88	—	33,9	379	8	—	—	Hun død 19-5-46
1	1	1	1	3,00	2,50	3,19	3,16	35,5	461	6	368	5	
1	1	1	1	2,70	2,95	3,10	3,29	34,7	368	6	406	5	
1	1	1	1	2,82	2,77	3,01	3,60	35,1	347	7	370	3	
1	1	1	1	1,96	2,21	2,80	3,37	34,7	345	5	362	3	
1	1	1	1	2,35	2,25	2,61	3,11	34,0	306	7	340	7	
1	1	1	1	2,76	2,17	2,65	3,10	35,0	302	5 for fin	316	3	
1	1	1	1	2,24	2,42	2,66	3,44	34,3	322	6	340	4	
1	1	1	1	2,23	2,40	2,60	3,37	34,0	280	7	349	9	
1	1	1	1	2,67	2,22	3,06	3,15	34,5	342	5	263	7	
1	1	1	1	2,37	2,33	2,89	2,95	33,8	275	8	320	7	

ANGORAKANINER

Avler	Holdets			
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder
<i>M. Rasmussen</i> , Kisbjerg, Harndrup	204	2- 4-45	30H2	73H3
» » » »	203	30- 3-45	509J	719J
<i>J. Sigurdsson</i> , Solbjerg, Havrebjerg	236	24- 7-45	043	59
» » » »	237	13- 7-45	043	286
» » » »	238	13- 7-45	043	62
» » » »	239	13- 7-45	043	85
» » » »	240	13- 7-45	043	287
» » » »	241	13- 7-45	043	287
» » » »	242	13- 7-45	043	287
<i>Skelbygaard</i> , Fiskebæk, Falster	166	14- 9-44	1851	314
» » » »	167	17- 9-44	1886	1499
» » » »	168	20- 8-44	AA14	468
<i>Sv. A. Svendsen</i> , Agerledet, Sindal	216	4- 6-45	9	20
<i>P. Sørensen</i> , Ansager	198	31- 3-45	919J	6465
<i>I. Funch Thomsen</i> , Ndr. Stationsvej 8, Slagelse	230	13- 7-45	776	411
» » » » » »	231	3- 8-45	476	496
» » » » » »	232	18- 6-45	3U58	475

Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Vægt i kg ved Kontrollens				F. E. pr. Dyr ialt	Klipningsresultater				
Beg.		Slutn.		Begyndelse		Slutning			Hanner		Hunner		
Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		Samlet Udtydelse, %	Udkvali- tet, Points	Samlet Udtydelse, %	Udkvali- tet, Points	
1	1	1	1	2,02	2,13	2,68	3,05	33,0	325	7	365	4	Hun død 15-8-46
1	1	1	1	2,10	1,84	2,61	—	31,1	265	7	—	—	
1	1	1	1	2,43	2,30	2,94	2,84	33,6	345	7	305	5	
1	1	1	1	1,90	1,95	2,51	2,95	31,4	305	6	328	5	
1	1	1	1	1,92	2,13	2,32	2,65	31,4	287	6	235	2	
1	1	1	1	2,30	1,91	2,81	2,74	31,9	351	5	334	4	
1	1	1	1	2,03	2,11	2,53	2,64	30,9	291	5	305	5	
1	1	1	1	2,03	2,20	2,47	2,71	31,0	303	6	341	6	
1	1	1	1	1,82	2,36	2,43	3,17	31,8	289	6	387	3	
1	1	1	1	1,34	1,40	2,05	2,54	29,9	263	7	345	5	
1	1	1	1	1,72	1,34	2,75	2,76	32,5	359	8	397	5	
1	1	1	1	1,50	1,75	2,58	3,23	32,3	287	6	327	5	
1	1	1	1	2,01	2,21	2,73	3,47	34,3	242	7	221	1	
1	1	1	1	2,09	2,08	2,58	2,98	33,3	332	5	370	4	
1	1	1	1	1,50	1,56	2,42	2,91	31,8	307	5	364	4	
1	1	1	1	1,62	1,57	2,40	2,68	31,8	256	5	288	6	
1	1	0	1	1,79	1,94	—	3,49	34,5	—	—	375	3	

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
166	7- 9-45	0	36	18	5	0	59	7- 9-45	0	53	12	6	0	71
	10-12-45	30	25	14	11	0	80	10-12-45	0	75	17	9	0	101
	4- 3-46	0	19	23	15	0	57	4- 3-46	0	25	53	4	1	83
	6- 6-46	0	25	15	26	1	67	6- 6-46	0	67	7	7	9	90
167	7- 9-45	7	33	29	8	0	77	7- 9-45	0	56	14	7	0	77
	10-12-45	57	22	18	9	0	106	10-12-45	17	77	16	8	0	118
	4- 3-46	0	55	20	11	1	87	4- 3-46	0	60	37	5	0	102
	6- 6-46	0	30	33	25	1	89	6- 6-46	0	57	28	11	4	100
168	7- 9-45	0	25	15	17	6	63	7- 9-45	19	20	14	10	2	65
	10-12-45	30	21	11	20	0	82	10-12-45	46	22	8	16	0	92
	4- 3-46	0	16	34	23	0	73	4- 3-46	0	43	30	5	1	79
	7- 6-46	0	10	5	51	3	69	7- 6-46	0	52	23	11	5	91
169	13- 9-45	5	29	29	13	0	76	13- 9-45	27	22	13	6	0	68
	14-12-45	50	23	14	11	1	99	14-12-45	75	10	18	8	0	111
	11- 3-46	0	36	19	8	0	63	11- 3-46	0	63	16	4	0	83
	14- 6-46	0	22	17	15	0	54	14- 6-46	0	47	14	8	2	71
170	19-11-45	11	38	11	30	0	90	19-11-45	21	34	22	29	0	106
								18- 2-46	0	59	20	9	0	88
								20- 5-46	0	59	20	5	1	85
								20- 8-46	0	67	12	11	2	92
171	19-11-45	14	22	14	42	5	97	19-11-45	16	45	22	28	4	115
	18- 2-46	0	16	6	47	0	69	18- 2-46	0	49	29	8	0	86
	20- 5-46	0	21	5	40	0	66	20- 5-46	0	42	24	12	0	78
	20- 8-46	0	27	17	35	3	82	20- 8-46	0	41	16	21	0	78
172	20-12-45	25	28	16	20	1	90	20-12-45	41	24	16	15	0	96
	22- 3-46	8	26	22	26	0	82	22- 3-46	33	60	5	8	2	108
	27- 6-46	0	27	9	34	1	71	27- 6-46	0	44	11	8	2	65
	24- 9-46	12	34	18	9	0	73	24- 9-46	19	61	12	6	2	100
173	20-12-45	0	54	12	29	0	95	20-12-45	0	33	29	11	0	73
	22- 3-46	0	34	16	34	0	84	22- 3-46	0	35	33	6	0	74
	27- 6-46	0	25	16	41	0	82	27- 6-46	0	26	25	12	0	63
	26- 9-46	0	36	20	21	0	77	26- 9-46	0	34	24	5	0	63
174	19-12-45	28	38	16	25	0	107	19-12-45	0	37	30	22	0	89
	21- 3-46	10	36	21	21	0	88	21- 3-46	0	27	26	11	0	64
	25- 6-46	0	23	13	26	0	62	25- 6-46	0	8	39	18	0	65
	23- 9-46	0	32	12	17	0	61	23- 9-46	0	42	17	8	0	67
175	20-12-45	0	0	41	46	2	89	20-12-45	25	41	18	18	0	102
	22- 3-46	0	8	9	57	0	74	22- 3-46	33	42	24	16	0	115
	27- 6-46	0	0	9	44	0	53	27- 6-46	0	45	25	21	4	95
	26- 9-46	0	0	11	36	0	47	26- 9-46	14	70	12	6	4	106

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Klip- nings- dato	Hanner						Klip- nings- dato	Hunner					
		Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
176	19-12-45	0	68	16	19	0	103	19-12-45	0	7	52	10	0	69
	21- 3-46	0	41	14	25	0	80	21- 3-46	0	32	21	5	0	58
	25- 6-46	0	15	18	19	0	52	25- 6-46	0	10	11	24	0	45
	23- 9-46	0	38	25	11	0	74	23- 9-46	12	62	13	10	3	100
177	20-12-45	0	58	19	19	0	96	20-12-45	0	63	19	16	0	98
	22- 3-46	12	32	18	20	0	82	22- 3-46	26	36	28	4	0	94
	27- 6-46	0	32	13	28	0	73	27- 6-46	0	32	15	15	1	63
	26- 9-46	5	45	17	13	0	80	26- 9-46	8	50	25	15	0	98
178	20-12-45	0	58	22	23	0	103	20-12-45	0	51	27	20	0	98
	22- 3-46	6	35	16	34	0	91	22- 3-46	11	38	29	11	0	89
	27- 6-46	0	26	8	39	0	73	27- 6-46	0	24	13	11	0	48
	26- 9-46	0	40	21	15	0	76	26- 9-46	22	40	23	7	0	92
179	20-12-45	25	29	15	13	0	82	20-12-45	36	24	21	20	0	101
	21- 3-46	0	40	21	11	0	72	21- 3-46	14	44	33	7	0	98
	25- 6-46	0	27	25	14	0	66	25- 6-46	0	57	23	19	0	99
	24- 9-46	0	34	25	10	0	69	24- 9-46	0	70	29	7	0	106
180	14- 1-46	0	66	18	27	4	115	14- 1-46	0	53	25	15	0	93
	16- 4-46	0	45	20	60	1	126	16- 4-46	12	64	25	26	5	132
	15- 7-46	0	32	15	32	0	79	15- 7-46	0	31	42	7	1	81
	14-10-46	0	72	25	11	0	108	14-10-46	0	80	24	13	1	118
181	16- 1-46	51	17	27	20	0	115	16- 1-46	25	43	19	16	1	104
	16- 4-46	14	36	36	39	2	127	16- 4-46	0	72	30	17	5	124
	15- 7-46	0	32	24	34	0	90	15- 7-46	0	53	37	10	1	101
	18-10-46	0	66	12	19	0	97	18-10-46	0	103	17	5	0	125
182	12- 1-46	0	38	17	19	1	75	12- 1-46	0	48	19	23	0	90
	13- 4-46	0	39	11	24	1	75	13- 4-46	0	37	38	12	1	88
	12- 7-46	0	28	18	14	0	60	12- 7-46	0	25	20	10	0	55
	11-10-46	0	60	15	8	0	83	11-10-46	0	71	16	8	0	95
183	12- 1-46	0	41	13	29	0	83	12- 1-46	0	44	22	15	0	81
	13- 4-46	0	51	14	17	0	82	13- 4-46	0	39	28	15	1	83
	12- 7-46	0	33	10	21	0	64	12- 7-46	0	23	26	15	3	67
	14-10-46	0	53	15	10	0	78	14-10-46	0	46	17	12	0	75
184	12- 1-46	0	53	14	17	0	84	12- 1-46	22	46	18	17	0	103
	13- 4-46	0	41	8	16	0	65	13- 4-46	0	66	37	13	1	117
	12- 7-46	0	18	14	11	3	46	12- 7-46	10	31	31	10	1	83
	14-10-46	0	59	17	7	0	83	14-10-46	11	68	25	10	0	114
185	23- 1-46	0	29	20	35	3	87	9- 1-46	0	45	18	26	2	91
	23- 4-46	0	5	23	46	0	74	10- 4-46	0	59	27	21	0	107
	19- 7-46	0	7	20	30	0	57	8- 7-46	0	56	32	19	0	107
	21-10-46	0	51	13	19	0	83	8-10-46	10	54	25	16	1	106

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
186								9- 1-46	0	45	18	13	1	77
								10- 4-46	7	43	22	5	1	78
								8- 7-46	0	24	19	13	0	56
								8-10-46	0	47	14	11	0	72
187	23- 1-46	0	9	25	56	5	95	11- 1-46	0	34	34	14	1	83
	23- 4-46	0	11	2	59	0	72	10- 4-46	0	66	18	11	5	100
	19- 7-46	0	14	14	23	0	51	11- 7-46	0	33	32	6	1	72
	21-10-46	5	30	12	28	0	75	10-10-46	13	36	17	5	0	71
188	16- 1-46	32	30	13	22	0	97	16- 1-46	16	51	17	8	0	92
	17- 4-46	0	24	23	39	1	87	17- 4-46	0	62	20	10	2	94
	15- 7-46	0	8	21	19	0	48	15- 7-46	0	32	34	7	0	73
	18-10-46	0	54	10	10	0	74	18-10-46	11	46	17	7	0	81
189	16- 1-46	17	37	9	22	0	85	16- 1-46	29	24	12	22	0	87
	17- 4-46	0	20	25	32	0	77	17- 4-46	0	52	22	13	1	88
	15- 7-46	0	19	19	22	0	60	15- 7-46	0	15	33	19	0	67
	18-10-46	0	45	15	20	0	80	18-10-46	8	45	12	9	0	74
190	11- 1-46	0	36	6	80	1	123	11- 1-46	0	40	39	26	3	108
	10- 4-46	0	23	12	59	0	94	10- 4-46	0	34	20	26	0	80
	11- 7-46	0	23	4	44	0	71	11- 7-46	0	26	9	21	1	57
	10-10-46	0	43	15	15	0	73	10-10-46	11	59	11	5	1	87
191	11- 1-46	0	42	27	27	0	96	11- 1-46	32	27	19	20	0	98
	10- 4-46	0	35	17	24	0	76	10- 4-46	18	38	18	11	2	87
	11- 7-46	0	23	10	27	0	60	11- 7-46	0	59	35	11	0	105
	10-10-46	10	35	14	8	0	67	10-10-46	22	62	23	7	0	114
192	11- 1-46	0	49	15	28	3	95							
	12- 4-46	0	45	16	19	0	80							
	11- 7-46	0	17	15	23	0	55							
	10-10-46	0	46	13	12	0	71							
193	11- 1-46	0	49	22	33	1	105	11- 1-46	0	65	37	13	1	116
	12- 4-46	0	36	13	44	0	93	12- 4-46	7	81	20	9	5	122
	11- 7-46	0	22	15	33	0	70	11- 7-46	0	36	27	18	3	84
	10-10-46	0	47	18	12	0	77	11-10-46	0	65	28	6	0	99
194	11- 1-46	0	36	23	45	0	104	11- 1-46	0	80	26	20	1	127
	12- 4-46	0	12	6	74	0	92	12- 4-46	0	76	31	12	1	120
	11- 7-46	0	24	16	42	0	82	11- 7-46	0	48	28	17	4	97
	11-10-46	0	57	11	19	0	87	11-10-46	10	78	15	7	3	113
195	28- 1-46	0	36	20	18	0	74	28- 1-46	10	38	20	11	1	80
	29- 4-46	0	19	20	24	0	63	29- 4-46	0	62	18	8	2	90
	29- 7-46	0	18	20	18	0	56	29- 7-46	0	53	28	11	6	98
	28-10-46	0	39	21	17	0	77	28-10-46	32	48	19	8	1	108

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
196	30- 1-46	0	6	21	53	0	80	30- 1-46	20	36	20	6	0	82
	29- 4-46	0	15	8	55	0	78	29- 4-46	0	58	27	7	2	94
	29- 7-46	0	24	10	32	0	66	29- 7-46	0	55	19	6	3	83
	28-10-46	0	70	17	9	0	96	28-10-46	28	54	6	10	0	98
197	23- 1-46	0	42	18	14	0	74	23- 1-46	31	40	18	10	0	99
	23- 4-46	0	47	15	13	0	75	23- 4-46	22	64	11	19	2	118
	22- 7-46	0	13	37	16	0	66	22- 7-46	12	70	10	7	2	101
	21-10-46	0	45	14	9	0	68	21-10-46	28	73	5	7	0	113
198	28- 1-46	21	37	10	29	0	97	28- 1-46	22	46	21	17	0	106
	29- 4-46	0	32	14	32	0	78	29- 4-46	10	40	17	10	0	77
	29- 7-46	0	20	21	23	0	64	29- 7-46	0	47	21	16	1	85
	28-10-46	0	63	17	13	0	93	28-10-46	8	63	22	9	0	102
199	30- 1-46	2	45	21	31	1	100	30- 1-46	25	55	13	10	1	104
	30- 4-46	0	40	24	37	2	103	30- 4-46	30	52	19	15	4	120
	31- 7-46	0	30	16	37	0	83	31- 7-46	24	55	20	8	0	107
	31-10-46	5	57	21	16	0	99	31-10-46	35	86	8	11	0	140
200	4- 3-46	0	38	20	32	0	90	4- 3-46	0	36	31	9	0	76
	6- 6-46	0	12	5	62	2	81	6- 6-46	0	41	15	20	4	80
	4- 9-46	0	31	12	16	0	59	4- 9-46	0	51	21	6	2	80
	4-12-46	0	55	19	17	1	92	4-12-46	8	69	17	10	0	104
201	14- 1-46	0	34	25	43	1	103	14- 1-46	0	47	23	10	0	80
	13- 4-46	0	45	17	38	0	100	13- 4-46	0	37	10	12	1	60
	12- 7-46	0	29	10	31	0	70	12- 7-46	0	5	18	10	0	33
	14-10-46	0	0	15	43	0	58	14-10-46	8	62	18	6	1	95
202	26- 1-46	0	31	24	14	0	69	26- 1-46	6	44	18	8	0	76
	23- 4-46	0	38	17	16	0	71	23- 4-46	12	56	18	12	2	100
								22- 7-46	0	24	27	6	0	57
								23-10-46	0	59	13	4	0	76
203	23- 1-46	15	29	12	20	0	76	23- 1-46	30	17	15	26	2	90
	23- 4-46	0	33	24	15	0	72	23- 4-46	0	63	25	12	0	100
	19- 7-46	0	20	20	20	0	60	19- 7-46	0	22	32	13	0	67
	21-10-46	0	37	9	11	0	57							
204	28- 1-46	21	27	13	31	0	92	28- 1-46	30	25	27	13	0	95
	29- 4-46	0	40	13	34	0	87	29- 4-46	0	51	17	14	0	82
	29- 7-46	0	28	11	34	0	73	29- 7-46	0	48	25	6	0	79
	28-10-46	0	47	12	14	0	73	28-10-46	30	55	16	8	0	109
205	27- 2-46	14	32	11	22	0	79	27- 2-46	15	35	16	13	1	80
	29- 5-46	0	35	13	17	5	70	29- 5-46	16	40	17	10	4	87
	30- 8-46	18	35	10	8	1	72	30- 8-46	38	52	4	8	4	106
	29-11-46	10	54	10	10	0	84	29-11-46	73	31	6	5	2	117

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
206	26- 2-46	14	28	14	36	0	92	26- 2-46	0	65	20	15	0	100
	24- 5-46	0	31	16	20	1	68	24- 5-46	0	55	20	7	3	85
	24- 8-46	0	55	7	17	0	79	24- 8-46	11	44	13	7	3	78
	22-11-46	0	64	25	8	0	97	22-11-56	8	72	11	5	0	96
207	26- 2-46	0	46	19	34	0	99	26- 2-46	0	11	41	19	0	71
	24- 5-46	0	20	20	36	3	79	24- 5-46	0	11	17	15	4	47
	24- 8-46	0	31	9	29	0	69	24- 8-46	0	41	23	20	0	84
	22-11-46	0	65	29	9	0	103	22-11-46	0	75	32	8	0	115
208	22- 2-46	20	25	14	49	0	108	22- 2-46	40	9	32	12	0	93
	22- 5-46	0	35	22	38	0	95							
	24- 8-46	0	26	10	46	0	82							
	22-11-46	0	66	21	7	0	94							
209	18- 3-46	34	19	8	11	0	72	18- 3-46	18	39	23	6	0	86
	18- 6-46	0	35	12	12	0	59	18- 6-46	18	41	22	8	2	91
	16- 9-46	0	40	14	8	0	62	16- 9-46	17	31	27	6	0	81
	17-12-46	11	48	19	10	0	88	17-12-46	20	62	12	10	0	104
210	6- 3-46	41	33	40	17	0	131	6- 3-46	11	46	30	7	0	94
	7- 6-46	0	35	25	54	10	124	7- 6-46	17	52	17	11	2	99
	4- 9-46	0	38	16	31	0	85	4- 9-46	0	49	20	7	0	76
	4-12-46	13	64	20	24	0	121	4-12-46	7	70	14	8	0	99
211	6- 3-46	0	35	18	34	0	87	6- 3-46	0	67	20	24	0	111
	7- 6-46	0	32	15	36	2	85	7- 6-46	17	20	25	22	7	91
	4- 9-46	0	52	17	14	0	83	4- 9-46	0	50	24	10	2	86
	4-12-46	11	63	20	19	0	113	4-12-46	20	59	26	13	0	118
212	18- 3-46	0	22	20	23	0	65	18- 3-46	0	25	37	10	0	72
	20- 6-46	0	16	15	29	3	63	20- 6-46	19	20	16	13	3	71
	20- 9-46	0	35	25	19	0	79	20- 9-46	0	59	15	15	1	90
	20-12-46	0	58	22	11	0	91	20-12-46	0	77	17	9	0	103
213	18- 3-46	0	30	24	19	0	73	18- 3-46	0	18	34	18	0	70
	20- 6-46	0	24	12	28	2	66	20- 6-46	0	28	13	19	4	64
	20- 9-46	0	39	11	18	0	68	20- 9-46	0	54	42	13	4	113
	20-12-46	0	58	18	12	0	88	20-12-46	0	75	26	12	0	113
214	18- 3-46	0	34	14	21	0	69	18- 3-46	0	38	25	19	0	82
	20- 6-46	0	22	10	31	3	66	20- 6-46	22	28	14	15	4	83
	23- 9-46	0	36	12	15	0	63	23- 9-46	14	23	20	8	0	65
	20-12-46	0	55	17	14	0	86	20-12-46	0	61	20	10	0	91
215	27- 2-46	0	35	20	22	0	77	27- 2-46	0	30	22	14	1	67
	29- 5-46	0	17	15	54	2	88	29- 5-46	0	55	30	11	1	97
	30- 8-46	0	18	23	30	0	71	30- 8-46	0	45	24	9	3	81
	29-11-46	0	59	25	13	0	97	29-11-46	8	58	17	5	0	88

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
216	6- 4-46	0	26	15	15	1	57	6- 4-46	0	12	28	8	0	48
	5- 7-46	0	21	10	16	0	47	5- 7-46	0	2	24	14	0	40
	7-10-46	5	36	11	9	0	61	7-10-46	0	12	31	20	0	63
	8- 1-47	8	49	9	11	0	77	8- 1-47	0	25	38	7	0	70
217	12- 4-46	0	41	8	47	0	96	12- 4-46	0	51	37	16	0	104
	12- 7-46	0	7	23	40	0	70	12- 7-46	0	10	26	17	0	53
	11-10-46	0	52	10	17	0	79	11-10-46	0	77	13	3	0	93
	13- 1-47	0	62	5	33	0	100	13- 1-47	0	72	30	10	0	112
218	14- 6-46	0	43	28	34	0	105	14- 6-46	0	33	23	28	0	84
	12- 9-46	0	53	17	27	0	97	12- 9-46	0	0	45	29	0	74
	10-12-46	0	75	17	24	2	118	10-12-46	8	86	33	11	1	139
	13- 3-47	0	45	29	47	0	121	13- 3-47	21	50	30	33	0	134
219	5- 4-46	0	28	0	65	7	100	5- 4-46	14	50	22	5	0	91
	4- 7-46	0	29	7	45	0	81	4- 7-46	0	27	12	13	0	52
	5-10-46	20	32	24	38	9	123	5-10-46	0	67	17	9	2	95
	4- 1-47	15	48	12	48	0	123	4- 1-47	48	47	7	8	0	110
220	5- 4-46	0	0	38	29	0	67	5- 4-46	0	50	20	11	0	81
	4- 7-46	0	42	12	50	0	104	4- 7-46	0	24	19	8	2	53
	5-10-46	0	46	22	51	0	119	5-10-46	0	67	17	13	3	100
	6- 1-47	0	68	12	26	0	106	6- 1-47	51	36	8	7	0	102
221	23- 4-46	0	38	17	19	0	74	23- 4-46	0	61	18	13	0	92
	19- 7-46	0	24	18	15	0	57	19- 7-46	0	12	53	11	1	77
	21-10-46	9	39	7	11	0	66	21-10-46	5	73	13	7	0	98
	20- 1-47	0	51	7	25	0	83	20- 1-47	8	45	20	9	0	82
222	6- 4-46	0	39	24	35	0	98	6- 4-46	0	52	19	20	2	93
	6- 7-46	0	20	13	50	0	83	6- 7-46	0	23	14	26	0	63
	7-10-46	5	38	15	24	0	82	7-10-46	6	25	19	11	2	63
	8- 1-47	0	45	14	36	0	95	8- 1-47	20	52	15	20	3	110
223	6- 4-46	0	39	29	37	0	105	6- 4-46	0	36	20	9	1	66
	4- 7-46	0	34	11	42	0	87	4- 7-46	0	30	11	8	0	49
	5-10-46	0	56	20	28	0	104	5-10-46	0	59	15	12	0	86
	6- 1-47	12	63	10	21	0	106	6- 1-47	58	20	7	7	0	92
224	7- 5-46	0	38	6	18	0	62	7- 5-46	0	18	18	36	0	72
	7- 8-46	0	30	21	23	0	74							
	8-11-46	0	40	8	12	0	60							
	4- 2-47	0	36	12	15	0	63							
226	30- 4-46	0	27	30	44	2	103	30- 4-46	0	45	31	17	2	95
	31- 7-46	0	22	10	31	0	63	31- 7-46	0	52	27	15	0	94
	31-10-46	18	46	12	13	0	89	31-10-46	19	61	10	8	0	98
	31- 1-47	0	47	18	42	0	107	31- 1-47	0	65	34	24	0	123

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
227	30- 4-46	0	30	12	15	0	57	30- 4-46	0	56	23	12	3	94
	31- 7-46	0	27	14	15	0	56	31- 7-46	9	67	14	7	5	102
	31-10-46	0	42	21	14	0	77	31-10-46	46	51	6	5	1	109
	31- 1-47	0	27	30	28	0	85	31- 1-47	35	61	18	11	1	126
228	20- 5-46	0	27	18	41	0	86	20- 5-46	0	18	10	21	0	49
	20- 8-46	0	34	10	31	7	82	20- 8-46	0	26	12	13	0	51
	19-11-46	0	41	25	21	0	87	19-11-46	0	66	15	4	0	85
	18- 2-47	0	40	9	38	0	87	18- 2-47	0	38	32	8	0	78
229	20- 5-46	16	14	6	32	0	68	20- 5-46	20	21	16	10	0	67
	20- 8-46	0	28	11	15	3	57	20- 8-46	0	25	15	19	5	64
	19-11-46	0	52	15	7	0	74	19-11-46	13	72	12	7	2	106
	18- 2-47	0	30	22	24	0	76	18- 2-47	0	27	23	33	0	83
230	7- 5-46	0	20	4	49	0	73	7- 5-46	13	27	11	32	0	83
	5- 8-46	0	19	22	23	0	64	5- 8-46	0	35	32	13	0	80
	7-11-46	0	41	14	16	0	71	7-11-46	20	59	15	5	0	99
	4- 2-47	0	48	16	33	2	99	4- 2-47	10	65	19	7	1	102
231	13- 4-46	0	23	12	27	0	62	13- 4-46	0	30	16	12	0	58
	13- 7-46	0	30	14	19	0	63	13- 7-46	0	33	21	11	0	65
	14-10-46	0	41	8	9	0	58	14-10-46	0	41	14	13	0	68
	13- 1-47	12	35	13	13	0	73	13- 1-47	21	55	9	12	0	97
232	23- 4-46	9	40	16	16	4	85	23- 4-46	0	48	20	20	0	88
								22- 7-46	0	30	27	11	0	68
								23-10-46	22	55	12	5	0	94
								21- 1-47	48	57	10	8	2	125
233	13- 4-46	0	21	13	49	0	83	13- 4-46	0	35	26	22	2	85
	12- 7-46	0	23	13	31	0	67	12- 7-46	0	40	40	13	0	93
	11-10-46	0	32	20	13	0	65	11-10-46	16	59	20	6	1	102
	13- 1-47	0	59	12	22	0	93	13- 1-47	15	64	27	11	1	118
234	27- 5-46	5	35	30	18	0	88	27- 5-46	3	32	21	7	0	63
	26- 8-46	0	9	9	50	0	68	26- 8-46	0	56	14	14	2	86
	25-11-46	0	66	11	11	0	88	25-11-46	16	81	5	8	0	110
	25- 2-47	0	69	14	20	0	103	25- 2-47	24	74	5	7	1	111
235	10- 6-46	0	23	30	23	0	76							
	9- 9-46	0	35	25	18	1	79							
	6-12-46	0	61	17	14	0	92							
	6- 3-47	0	28	22	36	0	86							
236	27- 5-46	0	32	42	14	0	88	27- 5-46	0	38	23	12	0	73
	26- 8-46	0	42	7	23	0	72	26- 8-46	0	39	20	8	0	67
	27-11-46	0	61	20	11	0	92	27-11-46	15	56	12	7	0	90
	26- 2-47	0	56	24	13	0	93	26- 2-47	0	39	27	8	1	75

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
237	27- 5-46	0	30	21	19	0	70	27- 5-46	0	44	14	11	0	69
	26- 8-46	0	38	20	15	1	74	26- 8-46	0	45	22	12	0	79
	27-11-46	0	53	14	11	0	78	27-11-46	22	58	10	7	0	97
	26- 2-47	0	44	14	25	0	83	26- 2-47	0	61	18	4	0	83
238	27- 5-46	0	43	10	22	2	77	27- 5-46	0	25	15	16	0	56
	28- 8-46	0	31	11	18	0	60	28- 8-46	0	30	9	15	0	54
	27-11-46	6	42	14	12	0	74	27-11-46	0	58	13	12	0	83
	26- 2-47	0	30	20	26	0	76	26- 2-47	0	0	21	21	0	42
239	27- 5-46	0	52	8	11	1	72	27- 5-46	0	44	16	18	0	78
	28- 8-46	0	53	20	21	0	94	28- 8-46	0	42	16	11	0	69
	27-11-46	0	61	27	6	0	94	27-11-46	16	62	13	9	0	100
	26- 2-47	0	37	29	25	0	91	26- 2-47	0	39	36	12	0	87
240	29- 5-46	0	35	20	15	0	70	29- 5-46	0	33	14	25	0	72
	28- 8-46	0	42	13	15	0	70	28- 8-46	0	34	21	13	1	69
	27-11-46	7	47	17	12	0	83	27-11-46	0	64	21	7	0	92
	27- 2-47	0	38	15	15	0	68	27- 2-47	0	32	21	19	0	72
241	29- 5-46	0	56	14	11	0	81	29- 5-46	0	39	22	15	0	76
	28- 8-46	0	47	13	12	1	73	28- 8-46	0	46	25	8	0	79
	29-11-46	0	58	15	8	0	81	29-11-46	17	63	20	4	0	104
	27- 2-47	0	41	15	12	0	68	27- 2-47	0	49	28	5	0	82
242	29- 5-46	0	42	17	14	0	73	29- 5-46	9	48	24	14	2	97
	28- 8-46	0	31	11	19	0	61	28- 8-46	0	57	17	5	1	80
	29-11-46	6	58	6	13	0	83	29-11-46	24	64	10	8	0	106
	27- 2-47	0	42	20	10	0	72	27- 2-47	0	72	22	10	0	104
243	20- 6-46	6	0	2	59	0	67	20- 6-46	20	0	10	52	2	84
	23- 9-46	0	40	10	21	0	71	23- 9-46	12	39	21	12	1	85
	20-12-46	0	55	13	21	0	89	20-12-46	0	56	22	12	2	92
	21- 3-47	0	33	25	28	0	86	21- 3-47	0	34	30	19	0	83
244	13- 6-46	0	13	18	53	0	84	13- 6-46	20	44	16	9	1	90
	10- 9-46	0	31	29	14	0	74	10- 9-46	0	58	16	7	0	81
	9-12-46	0	70	21	22	0	113	9-12-46	25	79	4	6	0	114
	10- 3-47	0	38	28	32	2	100	10- 3-47	12	85	10	12	0	119
245	13- 6-46	0	37	4	43	0	84	13- 6-46	0	37	21	19	2	79
	10- 9-46	0	41	25	9	0	75	10- 9-46	10	60	14	7	0	91
	10-12-46	12	42	15	17	0	86	10-12-46	69	23	13	11	0	116
	10- 3-47	0	46	21	27	0	94	10- 3-47	8	61	25	9	0	103
246	13- 6-46	0	4	0	75	0	79	13- 6-46	0	18	20	15	0	53
	10- 9-46	0	31	22	26	0	79	10- 9-46	0	47	25	10	0	82
	10-12-46	0	69	11	23	0	103	10-12-46	28	70	15	8	1	122
	10- 3-47	0	27	33	36	0	96	10- 3-47	0	57	30	18	0	105

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
247	13- 6-46	0	24	6	9	0	39	13- 6-46	0	18	15	18	0	51
	10- 9-46	0	37	15	12	0	64	10- 9-46	0	38	26	10	0	74
	10-12-46	0	65	12	16	2	95	10-12-46	9	62	30	11	0	112
	10- 3-47	0	19	22	47	0	88	10- 3-47	0	39	25	36	0	100
248	13- 6-46	27	28	13	41	0	109	13- 6-46	32	22	4	9	0	67
	12- 9-46	0	34	21	14	0	69	12- 9-46	15	43	8	9	0	75
	10-12-46	5	62	20	14	0	101	10-12-46	30	42	14	9	0	95
	10- 3-47	0	45	20	26	0	91	10- 3-47	10	53	15	12	0	90
249	13- 6-46	10	16	14	38	0	78	13- 6-46	0	28	19	16	0	63
	12- 9-46	0	33	17	10	0	60	12- 9-46	0	32	18	11	0	61
	10-12-46	6	57	12	12	0	87	10-12-46	11	66	16	9	0	102
	13- 3-47	0	42	18	27	0	87	13- 3-47	9	42	36	12	0	99
250	14- 6-46	0	37	13	26	0	76	14- 6-46	0	42	18	19	0	79
	12- 9-46	0	35	17	15	0	67	12- 9-46	0	41	20	10	0	71
	14-12-46	5	71	15	8	1	100	14-12-46	14	58	16	15	0	103
	13- 3-47	0	54	10	32	0	96	13- 3-47	0	77	10	10	6	103

Fodringsforsøg med Angorakaniner.

Af Sv. Hoffman Hansen.

Den stærke Udvikling, der i de senere Aar har været i Produktionen af Angorauld, har nødvendiggjort et Forsøgsarbejde ogsaa paa dette Omraade for Forsøgslaboratoriets Husdyrbrugsafdeling.

I November Maaned 1944 blev der til Fodringsforsøg indkøbt 40 Angorakaniner, som blev indsat i Forsøg paa Kaninkontrolstationen. Heraf var de 20 Hanner og Resten Hunner. Alle Dyr var født den foregaaende Sommer. Fra Modtagelsen og indtil Dyrenes første Klipning paa Stationen (7 Maaneders Klipningen) blev de alle fodret ens.

Efter 7 Maaneders Klipningen blev Dyrene inddelt i to Forsøgshold med 19 Dyr paa hvert Hold, da der i Mellemtiden var udgaaet 1 Dyr. Holdinddelingen skete paa Grundlag af de enkelte Dyrs Uldydelse ved den foretagne Klipning samt efter Vægt og Køn, saaledes at Holdene med Hensyn til disse 3 Forhold var fuldstændig ens. Dyrene gik i Enkeltbure og blev fodret individuelt.

A. Forsøg med forskellig Proteinmængde.

Forsøgsplanen anlagdes med det Formaal at konstatere, om forskellig Mængde fordøjeligt Renprotein i Dyrenes daglige Foder havde nogen Indflydelse paa Dyrenes Uldydelse eller Uldens Kvalitet. Planen for det daglige Foder var følgende:

Tabel 1. Plan for dagligt Foder, g.

Hold	1	2
Kraftfoder (Dyr under 2,5 kg Vægt)	35	35
» (» over » » »)	50	50
Hø	40	80*)
Kaalroer	200	200
Halm	Efter Behag	
g-F.E. pr. Dyr pr. Dag	78	93
g fordøjeligt Renprotein pr. Dyr pr. Dag	5,6	9,8

*) + 40 g ekstra til dem der vilde æde det.

For at holde Hold 1 nede paa den anførte Proteinmængde var det nødvendigt kun at give det en lille Høration, og det nødvendige Behov

for Straafoder maatte dækkes ved Fortæring af Halm, som der var rigeligt af i Burene til alle Dyrene i begge Hold. Kraftfoderblandingsens S sammensætning har været følgende angivet i Procent.

Tabel 2. Kraftfoderblandingsens S sammensætning.

Hold	1	2
Byg	49,0	36,0
Havre	49,0	36,0
Kød-Benmel	0	10,0
Lucernemel	0	4,5
Sennepsskraa	0	7,0
Maltspirer	0	2,5
Tørgær	0	1,5
Kridt	1,5	1,5
Salt	0,5	0,5
Trækul	0	0,5
Ialt	100,0	100,0

Da de to Forsøgshold har faaet Græs og Grønt i Sommertiden, og der derved er sket en Udligning mellem Holdenes Proteinmængder, maa denne Periode udelades. Til Rest bliver to Kontrolperioder, nemlig de tre første Maaneder i Aarene 1945 og 1946. Fra Oktober Maaned har Holdene været paa ens Foder i de to Aar. Oktober Kvartal er dog ikke medtaget i Opgørelsen, da der maa regnes med en eventuel Efter-virkning af Sommerens Fodring.

Tabel 3. Uldydelsen ved forskellig Proteinmængde.

Forsøgsperiode	7-1—5-4-45		8-1—5-4-46	
Forsøgsperiodens Længde i Dage ..	89		88	
Hold	1	2	1	2
Antal Dyr i Forsøg	19	19	19	18
g-F. E. pr. Dyr pr. Dag	75	88	81	96
g ford. Renprotein pr. Dyr pr. Dag	5,4	8,5	5,8	10,0
Vægt ved Periodens Begyndelse, kg ..	2,32	2,32	2,87	2,91
» » » Slutning, kg ..	2,40	2,44	2,85	2,92
Uldydelse pr. Dyr, g:				
1. Sortering over $7\frac{1}{2}$ cm	0	0	0	0
2. » 6— $7\frac{1}{2}$ »	30	37	43	40
3. » 4—6 »	35	27	24	22
Ren Filt	17	18	15	15
Snavset Filt	1	1	0	0
g Uld ialt pr. Dyr	83	83	82	77

Vægttallene tyder paa, at Hold 1 har fortæret en Del Halm, men dog ikke nok til at kunne holde Vægten paa Højde med Hold 2.

Ved at forhøje den daglige Mængde af fordøjeligt Renprotein med 3 à 4 g pr. Dyr fra mellem 5 og 6 til 9 à 10 g er der ingen paaviselig Forskel i Angorakaninernes Uldydelse i nærværende Forsøg.

B. Forsøg med forskelligt Protein- og Mineralstofindhold.

Efter Afslutning af det foran omtalte Forsøg blev de samme Kaniner indsat i et Forsøg efter følgende Plan:

Tabel 4. Forsøgsplan.

Hold	1	2	3	4
Antal Dyr	9	9	9	9
g-F. E. pr. Dyr daglig	84	83	88	87
g Protein pr. Dyr daglig	6	6	11	11
mg Calcium pr. Dyr daglig	333	625	388	679

Holdinddelingen er foretaget saaledes, at de Kaniner, som i det foran omtalte Forsøg fik den lille Mængde fordøjeligt Renprotein i Foderet, stadig er holdt paa den lille Mængde, og det samme gælder de Kaniner, som fik den større Mængde fordøjeligt Renprotein pr. Dyr pr. Dag.

Tabel 5. Fordelingen mellem de to Køn.

Hold	1	2	3	4
Hanner	4	5	5	4
Hunner	5	4	4	5

Det daglige Foder har bestaaet af 35—50 g Kraftfoder, 40 g Hø og 200 g Kaalroer. Kaninerne har gaaet paa det samme Foder et helt Aar, dog saaledes at de i ca. 2½ Maaned fra sidst i Juli og til først i Oktober ingen Kaalroer fik, men en lidt større Ration Hø, som de dog var noget uvillige til at æde. I nævnte Tidsrum blev der sat Skaale med Vand ind til alle Dyrene for at sikre, at deres Behov for Væde blev dækket. Kraftfoderblandingerne til de 4 Hold havde følgende Sammensætning i Procent:

Tabel 6. Kraftfoderblandingsens Sammensætning.

Hold	1	2	3	4
Byg	50,0	49,0	30,0	29,5
Havre	50,0	49,0	30,0	29,5
Høfrøkager	0	0	20,0	19,5
Solsikkekager	0	0	20,0	19,5
Kridt	0	1,5	0	1,5
Salt	0	0,5	0	0,5
Ialt	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 7. Gennemsnitligt Foder pr. Dyr i Forsøgstiden.

Hold	g F. E. pr. Dag	g ford. Renprotein pr. Dag	F. E. pr. Aar	pCt. af Foderet i		
				Kraftfoder	Hø	Kaalroer
1	78	6,0	28,5	57	22	21
2	77	5,9	28,1	57	22	21
3	79	10,4	28,8	58	21	21
4	81	10,6	29,6	58	21	21

Forsøgsdyrene har ikke optaget saa stor en daglig Fodermængde som forudset i Forsøgsplanen. Aarsagen hertil er, at Kaninerne i Efter-sommeren og det tidlige Efteraar, hvor der ingen Rodfrugter var til Raadighed, har optaget et noget mindre Foder end ønskeligt. Det maa dog antages, at alle Dyr har ædt noget af den Halm, som stadig var til Stede i rigelig Mængde i Burene. Hvor stor en Halmmængde, der er fortæret, er det ikke muligt at udtale noget om.

Ved en Bedømmelse af Forsøgets Resultater maa bemærkes, at navnlig Hold 3 har haft nogle Dyr, som har været ret uvillige til at æde deres Ration. Foruden den regelmæssige Ændring i Foderets Størrelse, som er foretaget efter Kaninernes Klipping, har der været følgende Antal Foderændringer, som er foretaget uden for de ordinære Ændringer:

Hold	1	2	3	4
Uregelmæssige Foderændringer	11	7	36	15

Det fremgaar heraf, at Holdene 3 og 4 med den store Proteinmængde i Foderet og navnlig Hold 3 ikke helt har optaget det Foder, der efter Planen var tiltænkt dem.

Kaninerne er klippet med tre Maaneders Mellemrum i de første Dage af et Kvartals Begyndelse. Uldydelsens Størrelse og Fordelingen af denne i de enkelte Sorteringer fremgaar af efterfølgende Tabel. Tilsammen har de 36 Kaniner givet 12 g Filt II (snavset Filt), som ikke er medtaget i Opgørelsen.

Tabel 8. Gennemsnitlig Uldydelse pr. Dyr i g ved de enkelte Klippinger.

Hold Nr.	Klippings- dato	Sortering			Filt I	Ialt
		1 ov. 7 $\frac{1}{2}$ cm	2 6-7 $\frac{1}{2}$ cm	3 4-6 cm		
1	1- 7-46	0	22	16	23	61
	1-10-46	0	33	25	17	75
	2- 1-47	5	59	18	13	95
	1- 4-47	0	37	28	22	87
2	1- 7-46	0	20	17	24	61
	1-10-46	0	23	21	17	61
	2- 1-47	4	47	23	16	90
	1- 4-47	0	32	29	21	82
3	1- 7-46	0	20	17	21	58
	1-10-46	2	34	21	18	75
	2- 1-47	7	58	16	15	96
	1- 4-47	0	32	26	20	78
4	1- 7-46	0	27	18	23	68
	1-10-46	8	33	16	13	70
	2- 1-47	26	44	13	14	97
	1- 4-47	0	43	20	15	78

Tabel 9. Gennemsnitlig Uldydelse pr. Dyr pr. Aar.

Hold Nr.	Sortering			Filt	Ialt
	1 ov. 7½ cm	2 6—7½ cm	3 4—6 cm		
1	5	151	87	75	318
2	4	122	90	78	294
3	9	144	80	74	307
4	34	147	67	65	313

Paa Grundlag af den samlede Uldydelse eller Ydelsen i de enkelte Sorteringer er der intet Udslag at konstatere for et Tilskud af Kridt og Salt. Dog maa det tilraades at give et saadant Tilskud navnlig til unge Dyr, indtil mere omfattende Forsøg nærmere har belyst Spørgsmaalet. Derimod er der et lille, men klart Udslag til Fordel for den større Mængde fordøjeligt Renprotein i det daglige Foder, naar Proteinmængden gives i Oliekager. Udslaget viser sig ikke i Uldydelsens Størrelse, men i den bedre 1. Sortering.

Tabel 10. Uldydelsens procentvise Fordeling.

Hold	Sortering		Filt I	Ialt
	1+2	3		
1	49	27	24	100
2	43	31	26	100
3	50	26	24	100
4	58	21	21	100

Naar Hensyn tages til det noget svækkede Hold 3, er der en mindre, men tydelig Forskydning i Uldmængden fra de kortere til de længere Sorteringer for de Hold (3 og 4), som har faaet den største daglige Mængde fordøjeligt Renprotein i Oliekager.

I den efterfølgende Tabel er Holdene med den lave Proteinmængde og Holdene med den større Proteinmængde sammendraget.

Tabel 11. Gennemsnitlig aarlig Uldydelse, g.

Hold	Sortering			Filt I	Ialt
	1	2	3		
1 + 2	5	136	89	76	306
3 + 4	22	145	74	69	310

Procentvis Fordeling.

	Sortering			Ialt
	1+2	3	Filt	
1 + 2	46	29	25	100
3 + 4	54	24	22	100

Det fremgaar af Tabellen, at en Forøgelse af fordøjeligt Renprotein i det daglige Foder fra 6 til 10,5 g kun har haft en ringe Indflydelse paa Uldmængden; men derimod har den forbedret Uldens Kvalitet saaledes, at der er 8 Procent mere Uld i 1. og 2. Sortering, naar Proteinmængden er givet i Høfrø- og Solsikkekager.

Beregnes Uldens Værdi efter de nugældende Priser, faar man følgende Sum:

Tabel 12. Uldens Værdi i Kr.


Hold	Sortering			Filt I	Ialt	Forskel
	1	2	3			
1 + 2	14,10	8,01	2,24	1,35	25,70	1,01
3 + 4	16,70	6,66	2,24	1,11	26,71	

Ved Prisberegningen maa det erindres, at al Uld med en Længde af 6 cm og derover, altsaa baade 1. og 2. Sortering efter de nugældende Afregningsregler betales med ens Pris, at 3. Sortering afregnes som 2. Sortering, og at $\frac{2}{3}$ af Filten afregnes i 3. Sortering, idet Sorteringen af Ulden er foretaget efter de saakaldte »internationale Regler«, medens Prisberegningen er foretaget efter de nugældende Afregningsregler.


I Forsøgstiden har man haft Opmærksomheden henvendt paa Forholdet med de »bare Pletter« (d. v. s. større eller mindre Partier paa Ryg, Sider og Laar, hvor der ingen Uld vokser, eller hvor den kun er vokset ud i spredte Totter).

I alle fire Hold har der været Kaniner, som har haft »bare Pletter«, og der er i dette Forsøg intet, der tyder paa, at et Tilskud af Kridt og Salt paa 2 pCt. i Kraftfoderblandingen samt en Forøgelse i Mængden af fordøjeligt Renprotein fra 6 til 10,5 g pr. Dyr pr. Dag har haft nogen Indflydelse paa de Kaniner, som har haft »bare Pletter«. Saaledes havde Hold 4 tre Dyr, som havde »bare Pletter« ved den første Klipning og ligeledes tre Dyr ved den sidste Klipning 9 Maaneder senere, skønt Holdet gennem hele Forsøgsaaret gennemsnitlig har faaet 10,6 g fordøjeligt Renprotein pr. Dyr pr. Dag.

Da Forsøget er gennemført med ensartet Fodring hele Aaret rundt, og da de sæsonmæssige Svingninger i Uldydelsen, man altid træffer hos Angorakaninerne, heller ikke er udeblevet her, viser det, at disse Svingninger maa skyldes arvelige Egenskaber og ikke Ændringer i Fodersammensætningen.



Angorakanin med fin Pels.



Angorakanin med bare Pletter.

Slagtningsforsøg med Hvid Landkanin.

Af Sv. Hoffman Hansen.

Spørgsmaalet om, paa hvilket Tidspunkt Kaninerne skal slagtes, har længe været paatrængende. Da Kontrollen med Kød- og Pelskaniner blev igangsat i 1944, var man paa det rene med, at Slagte-tidspunktet kunde være afgørende for den enkelte Races Placering i Forhold til de øvrige Racer. Det blev derfor besluttet, at de enkelte Racers Afgangsvægt skulde være en vis Procentdel af Racens Idealvægt, og saaledes at denne Procentdel er stigende med Racens Størrelse. Saaledes har der kun været ca. 10 pCt. Forskel mellem Afgangsvægt og Idealvægt for de smaa Racer, medens Forskellen har været 33 pCt. for de store Racer, idet det paa Forhaand var givet, at Foderomkostningerne vilde blive alt for store for de store Racer, dersom de først blev slagtet ved en Vægt, som kun var 10 pCt. under Idealvægten.

Det rette Tidspunkt for Slagtning af Kød- og Pelskaniner maa være, naar Kroppen af den slagtede Kanin har en saadan Størrelse, at den tilfredsstiller Markedets Krav, samtidig med at Fedningsgraden er god; det vil sige, at den kommer i 1. Klasse. Den slagtede Kanin maa hverken være for fed eller for mager. Endvidere maa Kødansætningen paa Laar og Ryg være saa god, at Kødfylden ved en Bedømmelse opnaar det mest mulige, og endelig maa det forlanges, at Pelsen er fuldmoden, at der ikke er Fældepletter i den. Tidspunktet for Kaninernes Slagtning er inde, naar alle disse Krav eller saa mange af dem, som kan forenes med et saa lavt Foderforbrug, som muligt, er opfyldt.

For at faa de bedste Oplysninger om alle disse Spørgsmaal vilde det være ønskeligt at gennemføre Forsøg med Kaniner af de her i Landet mest benyttede Racer. Pladsforholdene og den forhaandenværende Hjælp tillader ikke saa omfattende Forsøg. For dog at faa nogen Vejledning er der i Avlssæsonen 1946—47 ved Kaninforsøgene paa Trollesminde gennemført et Slagtningsforsøg med Hvid Landkanin. Forsøget omfattede 194 Dyr, deraf er 14 udsat eller døde, saaledes at der foreligger Slagtningsresultater for 180 Dyr. Alle Dyr er fodret ens,

og Planen har været den samme, som anvendes paa Kaninkontrolstationen paa Favrholt.

Slagtningsforsøget paabegyndtes i Juni 1946 og har omfattet 5 Grupper, som er slagtet ved stigende Vægt. Der er i flere Perioder sat nye Dyr ind i alle Grupper, efterhaanden som der er avlet Unger til Forsøget. Forsøget blev afsluttet i Februar Maaned 1947.

Tabel 1. Vægt og Slagtesvind.

Gruppe Nr.	Vægt ved Forsøgets		Paa Slag- teriet	Slagte- vægt	Slagtesvind		Skin- dets Vægt g	Krop- længde cm
	Begyn- delse	Slut- ning			kg	pCt.		
1	1,88	2,87	2,61	1,51	1,10	42,1	268	39,3
2	1,20	3,10	2,90	1,67	1,23	42,4	294	40,7
3	1,29	3,28	3,07	1,82	1,25	40,7	342	41,1
4	1,27	3,61	3,37	1,97	1,40	41,5	362	41,1
5	1,60	3,71	3,46	2,01	1,45	41,9	383	41,2

Forsøgsdyrene er slagtet og bedømt paa Ringsted Andels-Fjerkræslagteri. Forskellen mellem Slutvægt og Vægten paa Slagteriet er Transportsvind, idet alle Kaninerne er vejede kort forinden Afhentningen til Slagteriet og paa Slagteriet i levende Tilstand. Svindet er 200—250 g. Gruppe 1 afviger dog noget fra de øvrige Grupper, idet Kaninerne i denne Gruppe har haft et Transportsvind paa 260 g, for de 4 øvrige Grupper er der — naar der regnes med kg — et stigende Svind med stigende Vægt, men man kan ikke i dette Forsøg finde nogen Forskel i Procent Slagtesvind, naar Kaninernes Vægt inden Slagtning paa Slagteriet er stigende fra 2,61 kg til 3,46 kg. Derimod fremgaar det klart, hvad ogsaa maatte forventes, at Skindets Vægt er stigende med Vægten af Dyret ved Slagtningen. Med Kroplængden forholder det sig paa samme Maade; jo ældre Dyret bliver, og jo mere det vejer ved Slagtning, des længere er det.

Ved Bedømmelsen af Fedningsgraden gælder følgende Skala:

Klasse I	udmærkede
» If	for fede
» Iff	meget for fede
» II	letfede
» III	magre

Det fremgaar af Tabel 2, at med stigende Vægt ved Slagtning sker der en Ændring af Fedningsgraden, idet Dyr, som er slagtede ved en Gennemsnitsvægt af 2,61 kg, har haft knap 50 pCt. af alle Dyr i II og III Klasse, medens der i Gruppen med Dyr, som er slagtede ved en Gennemsnitsvægt af 3,46 kg, har været 50 pCt., som har været for fede:

Tabel 2. Bedømmelse af Fedningsgrad og Kødfylde.

Gruppe	Fedningsgrad										Points for Kødfylde		
	Antal					Procent							
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Laar	Ryg	Ialt
1	15	0	0	10	5	53,6	0	0	35,7	10,7	3,8	4,1	7,9
2	20	0	0	10	2	62,5	0	0	31,3	6,2	4,1	4,0	8,1
3	20	2	0	4	0	76,9	7,7	0	15,4	0	4,2	4,6	8,8
4	25	19	3	1	0	52,1	39,6	6,2	2,1	0	4,3	4,6	8,9
5	21	20	3	2	0	45,7	43,5	6,5	4,3	0	4,6	4,7	9,3

6,5pCt. af disse har endog været meget for fede. Da man paa Slagteriet hverken ønsker Kaniner, som er for magre eller for fede, bør Hvid Landkanin sendes til Slagteriet, naar dens Vægt paa Opdrætningsstedet er ca. 3,25 kg. Dens Vægt vil da paa Slagteriet komme til at ligge i Nærheden af 3,00 kg; og det kan forventes, at ca. $\frac{3}{4}$ af Kaninerne vil gaa i I Klasse med Hensyn til Fedningsgrad. At der i de to Grupper, hvor Kaninerne er slagtet ved den lave Vægt, er for mange magre Dyr, er kun, hvad der var at vente, idet der hos Kaninerne som hos de øvrige Husdyr, efterhaanden som de nærmer sig Idealvægten, sker en gradvis Ændring i Aflejringen af Væv fra Muskelvæv, altsaa proteinrigt Væv, til Fedtvæv.

Med Hensyn til Kødfylden er Forholdet som ved Fedningsgraden. Jo større Kaninerne er ved Slagtning, jo bedre er Kødfylden. Det ser dog ud til, at Kødfylden tidligere nærmer sig det opnaaelige for Ryggen end for Laarene, hvor Kødfylden først bliver nogenlunde tilfredsstillende ved den største Slagtevægt.

Tabel 3. Gennemsnitlig daglig Tilvækst og Foderforbrug.

Gruppe	Daglig Tilvækst g	g F. E. pr. Dyr pr. Dag	F. E. ialt pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst
1	16,9	112	9,9	6,62
2	17,9	112	11,9	6,25
3	16,2	116	14,3	7,17
4	16,6	126	17,8	7,59
5	13,4	134	21,0	9,52

Kaninerne i Hold 5, som har vejet mest ved Slagtningen, har haft den mindste daglige Tilvækst. Det har sin Aarsag deri, at de i den sidste Del af Fedningsperioden stærkt har nærmet sig den Vægt, de vilde opnaa i fuldt udviklet Tilstand, og jo mere, de nærmer sig dette Punkt, desto mindre daglig Tilvækst.

Jo tungere Kaninerne er ved Slagtning, desto større Foderforbrug pr. kg Tilvækst, og det ligger i, at efterhaanden som Dyret bliver ældre, tiltager Kalorieindholdet i Tilvæksten, der skal derfor mere Foder til

1 kg Tilvækst. Naar der er saa stor Forskel paa F. E. pr. kg Tilvækst for Kaninerne i Hold 4 og 5, til Trods for, at der kun er en lille Forskel paa Afgangsvægten, skyldes det, at den sidste Tilvækst i Hold 5 har krævet et meget stort Foder. Naar Kaninerne nærmer sig den Vægt, de har i fuldt udviklet og fedet Tilstand, stiger Foderforbruget til 1 kg Tilvækst ganske naturligt overordentligt stærkt. I nærværende Forsøg har Kaninerne i Hold 1, som har været de letteste ved Slagtningen, haft et forholdsvis højt Foderforbrug.

Tabel 4. Skindenes Kvalitet.

Gruppe Nr.	1	2	3	4	5
Points for Skind	6,0	6,3	6,9	7,4	7,7
Efter Korrektion	6,6	6,9	7,3	7,1	7,4

Kaninerne er leveret til Slagteriet i Tiden fra midt i September 1946 til midt i Februar 1947. Det er almindelig bekendt, at Aarstiden, Dyrene slagtes paa, øver en meget stor Indflydelse paa Skindkvaliteten. Det vil derfor være nødvendigt at korrigere for Aarstidens Indflydelse paa Skindkvaliteten, naar man vil sammenligne denne ved forskellig Slagtevægt. Da Materialet er for lille til at finde en retfærdig Korrektion, er her benyttet Korrektionen, som er fundet paa Skind af Kaniner paa Kontrolstationen, som er leveret i samme Tidsrum som Forsøgskaninerne. Undersøgelsen viser, at samtidig med, at der sker en stærk Stigning i Skindets Vægt, naar Slagtevægten stiger fra 2,61 til 3,46 kg, sker der en væsentlig Forbedring af Skindkvaliteten, idet Skindene for de Dyr, som har haft en stor Slagtevægt, har opnaaet knap 1 Point mere end Dyr, som er slagtet ved en lav Slagtevægt.

Meddelelser fra Kaninkontrolstationen.

1946. 221. Ber. Kaninkontrolstationen paa Favrholt, I, 1944—45 (75 Øre)
1946. 223. — Kaninkontrolstationen paa Favrholt, II, 1945—46 (75 Øre)
1948. 230. — Kaninkontrolstationen paa Favrholt, III, 1946—47 (75 Øre)