

344. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

52. BERETNING OM

SAMMENLIGNENDE FORSØG MED SVIN

FRA STATSANERKENDTE AVLSCENTRE

1962—63

Af

HJALMAR CLAUSEN, R. NØRTOFT THOMSEN

OG O. K. PEDERSEN

Summary in English



København

1964

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Larsen*, Greve, Tåstrup, formand,
gårdejer *S. Grue-Sørensen*, Hjerm,
(valgte af De samvirkende danske Landboforeninger),
konsulent *Henning Rasmussen*, Ringkloster, Hylke,
parcellist *Alfred Richardt*, Ll. Torøje, Fakse,
(valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger),
forstander *L. Lauridsen*, Graasten, næstformand,
(valgt af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab),
gårdejer *Verner Andersen*, Gundsøllille, Roskilde,
(valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse),
parcellist *Olav Rasmussen*, Frøslev, Store Heddinge,
(valgt af Landsudvalget for Fjerkræavl),
forpagter *J. Filipssen*, Holmelund, Korinth.
(valgt af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig
sædooverføring).
Udvalgets sekretær: Kontorchef, agronom *H. Ærsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk afdeling

Forstander: professor *P. E. Jakobsen*.
Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*.
— lic. agro. *Grete Thorbek*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med kvæg:
Forstander: professor, dr. med. vet. *A. Neimann-Sørensen*.
Forsøgsleder: agronom *Johs. Brolund Larsen*,
— agronom *E. O. Nielsen*,
— agronom *Preben E. Andersen*,
— agronom *H. Ejlersen Hansen*.
— agronom *Sigvald Klausen*.

Forsøg med svin, heste og pelsdyr:

Forstander: professor, dr. *Hjalmar Clausen*.
Forsøgsleder: agronom *N. J. Højgaard Olsen*,
— agronom *R. Nørtoft Thomsen*,
— dr. agro *Arne Madsen*,
— agronom *Per Jonsson*,
— agronom *H. E. Nielsen*.

Forsøg med Fjerkræ:

Forstander: lektor, agronom *J. Bælum*.
Forsøgsleder: agronom *Vagn Pedersen*.

Avlsbiologiske forsøg:

Leder: forsøgsleder, dr. agro. *J. Nielsen*.

Kemisk afdeling

Forstander: cand. polyt. *J. E. Winther*.
Afdelingsleder: ingeniør *H. C. Beck*,
— mejeribrugskandidat *K. Steen*.

Kontor og sekretariat

Kontorchef: agronom *H. Ærsøe*.
Ekspeditionssekretær: agronom *H. Bundgaard*.
Bogholder: Sv. *Vind-Hansen*.

Udvalgets, forsøgslaboratoriets og afdelingernes adresse er:

Røllighedsvej 25, København V.

Tell. 35 81 00 (omst.).

344. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

52. BERETNING OM SAMMENLIGNENDE FORSØG MED SVIN FRA STATSANERKENDTE AVLSCENTRE

1962—63

AF

HJALMAR CLAUSEN, R. NØRTOFT THOMSEN
OG O. K. PEDERSEN

Summary in English



I kommission hos August Bangs forlag,
Ejvind Christensen.

Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1964

Indholdsfortegnelse.

Forsøgsmaterialet.	Side
1. Forsøgsmaterialets omfang og oprindelse	3
2. Forsøgsholdenes sammensætning	5
3. Indsendelse af forsøgsgrise	6
Arbejdet på forsøgsstationerne.	
1. Forsøgsgrisenes fodring	9
2. Indkøb og opbevaring af foder	10
3. Fodermidlernes kemiske sammensætning og foderværdi ..	11
4. Den fremtidige fodring på de faste svineforsøgsstationer ..	13
Bedømmelse af forsøgsgrisenes slagtekvallitet	15
Forsøgsresultaterne.	
I. Sundhedstilstanden på forsøgsstationerne	16
II. Væksthastighed og foderforbrug	19
1. Gennemsnitsresultater	19
2. Variationen i væksthastighed og foderforbrug	20
3. Væksthastighed og foderforbrug hos galte og sogrise	21
4. Kontrol med forsøgsgrisenes foderforbrug	22
III. Resultaterne fra bedømmelsen af de slagtede forsøgsgrise	23
1. Slagtesvind, eksportflæsk og tilskæringssvind	23
2. Rygspækkets og sidespækkets tykkelse	23
3. Bugens tykkelse	30
4. Kroplængden	31
5. Points for skønmæssigt bedømte egenskaber	33
6. Særlige forhold vedrørende kødfylden	34
a. Fremgangsmåden ved opmåling af karbonadearealet ..	34
b. Resultaterne af opmålingen	35
c. Ændringerne i vurderingen af karbonadens kødfylde ..	36
7. Klassificering efter fedme	39
8. Kødfarve	44
Sammendrag	51
Summary	57
Hovedtabeller.	
1. kvartal	65
2. »	85
3. »	109
4. »	129

Forsøgsmaterialet.

Denne 52. beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre indeholder de resultater, der er opnået på de 4 faste svineforsøgsstationer »Sjælland«, »Fyn«, »Jylland« og »Vestjylland« i tiden fra 1. september 1962 til 31. august 1963.

1. Forsøgsmaterialets omfang og oprindelse.

Avlscentrene er fordelt mellem de 4 forsøgsstationer på følgende måde:

»Sjælland« modtager grise fra 1., 2. og 3. distrikt.

»Fyn« modtager grise fra 4. og 7. distrikt med undtagelse af følgende centre i 7. distrikt: Bindsbøl, Bryggergaarden, Hammel, Hovmarksgaard og Langemark.

»Jylland« modtager grise fra alle centre i 5. og 8. distrikt med undtagelse af de under »Vestjylland« nævnte samt de under »Fyn« og »Vestjylland« nævnte centre fra 7. distrikt.

»Vestjylland« modtager grise fra alle centre i 6. og 9. distrikt og fra følgende centre i 5. og 8. distrikt: Erslev Kirkegaard, Karby, Tilsted, Vils, Elkjærgaard, Funder, Grauballe Nygaard samt Bindsbøl i 7. distrikt.

Bevarelse af Store Bælt som skillelinie efter »Vestjylland«s opførelse har medført, at der til »Sjælland« er knyttet et større antal kårede søer end til de 3 andre stationer, og flere end der ved normal tilgang kan afprøves på denne station. Det er derfor hensigten, at »Fyn«, der har det færreste antal søer efter den nye fordeling, skal aflaste »Sjælland« i det omfang, det bliver nødvendigt.

Den her nævnte fordeling af avlscentrene mellem de 4 stationer skal ikke betragtes som absolut bindende. Navnlig for de centre, som ligger i grænseområderne mellem stationerne, vil forsøgsvirkomheden så vidt muligt stille sig imødekomende over for ønsker fra centerejernes side om ændring i tilhørsforholdet. Iøvrigt vil det ligesom hidtil blive nødvendigt for fuld udnyttelse af stationernes kapacitet at sende hold til en anden station end den, de ifølge fordelingsplanen tilhører.

Tabel 1 viser antallet af grise, hvormed der er afsluttet forsøg på de 4 stationer i beretningsåret; til sammenligning er der anført resultater fra tidligere år.

Tabel 1. Forsøgsmaterialets omfang.

Antal grise i afsluttede forsøg.

Forsøgsstation	1962/63	1961/62
»Sjælland«	1388*)	1372
»Fyn«	1252	1244
»Jylland«	1244	1272
»Vestjylland«	1200	1260
Ialt 1962/63.....	5084	Ialt 1956/57..... 3612
» 1961/62.....	5148	» 1946/47..... 2320
» 1960/61.....	4844	» 1936/37..... 3160
» 1959/60.....	3912	» 1926/27..... 2160

I sammenligning med 1961/62 er der en mindre tilbagegang i antal afprøvede grise fra 5148 til 5084 eller 64 grise. Denne tilbagegang er ikke større, end den kan bero på en tilfældighed, men man kan dog ikke se bort fra, at den lidt langsommere vækst hos forsøgsgrisene i 1962/63 kan have været medvirkende.

Såfremt grisene fodres individuelt fra de indgår i forsøget ved 20 kg levendevægt, er de 4 stationers samlede kapacitet 4800-5000 grise årlig afhængig af, hvor jævn tilgangen er i årets løb.

Denne normalkapacitet har allerede i flere år været utilstrækkelig til rettidig afprøvning af det stadigt stigende antal kårede søer i avlscentrene. For at bøde på dette forhold, gav forsøgsrådene i 1959 tilladelse til, at grisene måtte gå sammen to og to de første 14 dage af forsøgstiden i perioder, hvor presset på forsøgsstationerne var særlig stærkt.

Denne dispensation fra de gældende regler for forsøgenes gennemførelse har gjort det muligt at afprøve mere end 5000 grise i begge de 2 sidst afsluttede forsøgsår, og den blev givet med den begrundelse, at den forsøgsmæssige fejl, der eventuelt opstår ved, at grisenes individuelle foderforbrug ikke kan bestemmes de to første uger, kun er ringe i sammenligning med den avlsmæssige værdi, der ligger i at få en rettidig afprøvning af et større antal søer. Ved et forsøgsrådsmøde d. 31. maj 1963, hvor disse spørgsmål blev drøftet, vedtog man, at grisene i samtlige forsøgshold under alle omstændigheder skal gå sammen 2 og 2, indtil de vejer ca. 30 kg, hvilket vil være tilfældet ca. 3 uger efter forsøgets begyndelse. Derved opnår man for det første, at alle hold stilles lige med hensyn til tidspunktet for adskillelse, og for det andet at stationernes kapacitet yderligere forøges.

Det vil herefter være muligt under gunstigste omstændigheder at afprøve ca. 1400 hold eller 5600 grise årligt, hvilket svarer til rettidig afprøvning af 2800 kårede søer. Da der pr. 1. september 1963 var 3031 kårede søer i avlscentrene, vil der dog stadig være et vist behov for afprøvning, som ikke kan imødekommes. (Se nærmere herom i afsnittet om indsendelse af forsøgsgrise).

*) inclusive 1 forsøgshold afprøvet på »Sjælland II«.

2. Forsøgsholdenes sammensætning.

Da sogrise giver en betydelig bedre slagte kvalitet end galte, er det af hensyn til sammenligningen mellem de forskellige forsøgshold meget vigtigt, at disse er reglementeret sammensatte, d. v. s. at de består af 2 galte og 2 sogrise.

Tabel 2. Forsøgsholdenes sammensætning.

År	Pct. hold bestående af:				
	4 galte	3 galte + 1 sogris	2 galte + 2 sogrise	1 galt + 3 sogrise	4 sogrise
1932-33.....	2.4	14.1	51.1	24.6	7.8
1942-43.....	0	2.4	89.3	8.3	0
1952-53.....	0	1.7	92.1	6.2	0
1958-59.....	0	0	94.3	5.7	0
1959-60.....	0	0.2	96.3	3.5	0
1960-61.....	0	0.2	97.6	2.2	0
1961-62.....	0	0.1	99.1	0.8	0
1962-63.....	0	0	99.2	0.8	0

I 1932/33 var kun ca. halvdelen af forsøgsholdene reglementeret sammensatte. I de følgende 10 år skete der en meget betydelig stigning i antallet af reglementerede hold til 89.3 pct. Derefter går udviklingen noget langsommere, men der er stadig en ikke uvæsentlig fremgang fra år til år. I 1962/63 opnåedes det hidtil bedste resultat, idet 99.2 pct. af de indsendte hold var reglementeret sammensatte.

Antallet af reglementeret sammensatte hold er nu så nær 100 pct. i gennemsnit for hele landet, at det ikke længere skønnes nødvendigt at foretage en speciel opgørelse for de enkelte svineavlsdistrikter. Det skal dog bemærkes, at af de 10 ureglementerede hold, som blev indsendt, stammede halvdelen fra 5. distrikt.

Selv om udviklingen på dette område må betegnes som tilfredsstillende, er spørgsmålet om forsøgsholdenes sammensætning ikke dermed løst, idet et hold bliver ureglementeret, når en gris dør eller udsættes af forsøget på grund af sygdom.

Sådanne hold er langt hyppigere end de, der er ureglementeret sammensatte ved indsendelsen. I 1962/63 drejede det sig om 56 hold mod 10 ved indsendelsen, og i 1961/62 var de tilsvarende tal henholdsvis 68 og 12.

I alt bliver der i beretningsåret 66 hold, som på grund af kønsforskellen ikke kan sammenlignes med hold bestående af 2 galte og 2 sogrise, før der er foretaget en korrektion.

Forsøgsvirksomheden har hidtil benyttet den fremgangsmåde at udsende og offentliggøre de ukorrigerede resultater og samtidig i årsberetningen anviser, hvorledes gennemsnitsresultaterne for ureglementerede hold kan korrigeres.

Til en sådan korrektion kan tabel 3 benyttes. Tallene angiver, hvor meget der skal lægges til eller trækkes fra de oprindelige gennemsnitstal ved forskelligt antal galte og sogrise i holdet.

Tabel 3. Korrektion for ureglementeret sammensatte hold.

Holdets sammensætning							
galte	0	1	1	2	3	3	
sogrise	3	3	2	1	1	0	
Korrektion for holdets gennemsnit:							
Rygspækkets tykkelse, cm	+0.13	+0.06	+0.04	÷0.04	÷0.06	÷0.13	
Sidespækkets » »	+0.24	+0.12	+0.08	÷0.08	÷0.12	÷0.24	
Points for:							
Bov	÷0.2	÷0.1	÷0.1	+0.1	+0.1	+0.2	
Skinker	÷0.5	÷0.3	÷0.2	+0.2	+0.3	+0.5	
Kødfylde, hel	÷0.5	÷0.3	÷0.2	+0.2	+0.3	+0.5	
Kødfylde, overskåret ..	÷0.7	÷0.4	÷0.2	+0.2	+0.4	+0.7	
Bacontype	÷0.6	÷0.3	÷0.2	+0.2	+0.3	+0.6	
Areal af lange rygmuskel, cm ²	÷1.2	÷0.6	÷0.4	+0.4	+0.6	+1.2	

Tabellen er i år udvidet således, at den omfatter alle de af hovedtabellernes resultater, for hvilke der er konstateret en højt signifikant forskel på galte og sogrise.

Spørgsmålet om korrektion af resultaterne inden offentliggørelse har tidligere været drøftet, men forsøgsledelsen har hidtil været betænkelig ved at afvige fra det hævdevundne princip, at originalresultaterne skal offentliggøres.

I efteråret 1963 blev spørgsmålet påny bragt på bane, idet landskonsulent *Rs. P. Jeppesen* på de jyske svineavlscentres årsmøde den 18. november udtalte ønsket om, at resultaterne for de ureglementerede hold korrigeres, og at korrektionen udføres af forsøgslaboratoriet inden resultaternes udsendelse.

Forsøgsledelsen stiller sig velvillig overfor dette ønske, men finder, at spørgsmålet er af så principiel karakter, at det bør drøftes ved et fælles forsøgsrådsmøde, inden den endelige afgørelse træffes.

3. Indsendelse af forsøgsgrise.

Ifølge reglerne for oprettelse og drift af statsanerkendte avlscentre har disse pligt til gennemsnitlig at indsende 2 grise, altså 0.5 forsøgshold årlig pr. kåret so, til forsøgsstationerne. Dette antal svarer til, at alle søer i centrene kan blive afprøvet i hvert fald én gang under forudsætning af, at der sker en normal udskiftning af søerne. I de seneste år har mange centerejere imidlertid været nødt til at foretage en hurtigere udskiftning end tidligere på grund af de strengere kvalitetsmæssige krav, navnlig til kødfylden i karbonaden. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at indsende flere end 2 grise årlig pr. kåret so for at få alle søerne afprøvet.

På den anden side er der også avlscentre, hvor der er opnået så gode resultater for et flertal af søerne, at disse bevares, så længe de er avlsduelige, og behovet for afprøvning bliver derfor for sådanne centre i hvert fald en overgang mindre, end der kræves ifølge reglerne.

I årene 1960/61 og 1961/62 blev der leveret henholdsvis 0.49 og 0.48 hold pr. kåret so, eller på det nærmeste det foreskrevne antal. I 1962/63 er der en mindre nedgang til 0.44 hold pr. so. Denne nedgang skyldes sandsynligvis et mindre udskiftningsbehov som følge af de gode slagtningsresultater, der er opnået i de sidste halvandet år.

Den aftagende tilgang i beretningsåret har bevirket, at forsøgsstationerne ikke har måttet afvise så mange af de tilmeldte hold, som det kunne forventes i henhold til soantallet. Til trods for, at soantallet steg fra 2694 pr. 1. september 1961 til 2908 pr. 1. september 1962, er antallet af afviste hold kun steget fra 16 til 19.

Alle andre forhold lige er det oftest således, at et år med en forholdsvis ringe tilgang følges af et med en tilsvarende større. Da soantallet er steget yderligere til 3031 pr. 1. september 1963, vil det næppe være muligt at modtage alle de hold, der ønskes indsendt trods de særforanstaltninger, der er truffet til forøgelse af stationernes kapacitet, således som omtalt side 4.

Da der, som omtalt side 3, hører et forholdsvis stort antal kårerede søer til forsøgsstationen »Sjælland«, er der i de senere år sendt adskillige sjællandske hold til afprøvning på de 3 stationer vest for Store Bælt, hvilket fremgår af hovedtabellerne.

Reglerne for indsendelse af forsøgsgrise.

Opførelsen af de nuværende forsøgsstationer var et led i bestræbelserne for opnåelse af mere sikre forsøgsresultater. For at kunne udnytte de forsøgsmæssige forbedringer, disse stationer byder på i form af individuel fodring i sammenligning med de gamle stationer med holdfodring, er det af stor betydning, at de forskellige forsøgshold så vidt muligt starter på forsøgsstationen med de samme forudsætninger. Med henblik herpå har de 3 forsøgsråd i fællesskab vedtaget følgende regler for indsendelse af forsøgsgrise:

Da grisene fodres individuelt, *indgår hver enkelt gris i forsøget ved en vægt af 20 kg^{*)}*. Heraf følger, at ingen gris ved ankomsten til forsøgsstationen bør veje over 20 kg. Avlscenterejerne må ved vejning af grisene før afsendelsen medvirke til, at denne regel overholdes. Grisene skal så vidt muligt indsendes ved en alder af 8-9 uger og ved en vægt af 16-19 kg. De skal så vidt muligt repræsentere kuldets gennemsnit, og de skal være så ensartede i størrelsen som muligt. *Ingen gris må ved modtagelsen veje under 14 kg.*

Grisene skal anmeldes til forsøgsstationen senest en uge efter fødselen, og de må kun indsendes, dersom forsøgsstationen har meddelt, at de kan modtages. Såfremt det viser sig, at tilmeldte hold af en eller anden grund alligevel ikke kan indsendes, skal afmelding ske til forsøgsstationen så hurtigt som muligt.

Forsøgsstationens ugentlige modtagelsesdag må nøje overholdes,

^{*)} Se dog side 4.

og avlscenterejerne må forinden afsendelsen af grisene forhøre på afsendelsesstationen, hvornår grisene skal indleveres for som ilgods at nå frem til forsøgsstationen på hurtigste måde og til det for modtagelsen fastsatte tidspunkt.

Svineforsøgsstationen Sjælland modtager grise torsdag formiddag.

Svineforsøgsstationen Fyn modtager grise fredag formiddag.

Svineforsøgsstationen Jylland modtager grise tirsdag formiddag.

Svineforsøgsstationen Vestjylland modtager grise fredag formiddag.

Der modtages kun forsøgshold efter kårede avlsdyr.

Grisene må i enhver henseende være sunde og normale. Tvekønnede grise og grise med brok må ikke, selv om de er opererede, indsendes til forsøg. Det samme gælder grise med vædskeansamlinger i det ydre øre.

Stamtavle skal senest indsendes til forsøgsstationen samtidig med grisenes levering. Stamtavleblanketter fås gratis på forsøgsstationerne.

Forsøgsholdene skal bestå af 2 so- og 2 galtgrise. Hvor dette ikke er muligt, kan der undtagelsesvis opnås tilladelse til indsendelse af ureglementerede hold, der dog ikke må bestå af 4 grise af samme køn. Denne tilladelse må indhentes skriftlig hos det pågældende distrikts assistent i svineavl, og den skriftlige tilladelse må være forsøgsstationen i hænde, inden det ureglementerede hold indsendes. Blanketter til ansøgning om indsendelse af ureglementerede hold fås gratis på forsøgsstationerne eller hos det pågældende distrikts assistent i svineavl.

Grisene må helst ikke indsendes til forsøgsstationen lige fra soen. De bør på centret gennemgå en fravænningsperiode, i hvilken de vænnes til det på forsøgsstationen benyttede foder.

Kastration af ornegrise, der skal indsendes til forsøg, må ske i så god tid, at kastrationssårene er helt lægte, forinden grisene afsendes til forsøgsstationen.

Søer og smågrise bør på avlscentret fodres alsidigt med tilstrækkelige mængder af protein, mineralstoffer og vitaminer, så de forskellige forsøgshold så vidt muligt starter på forsøgsstationen med ens forudsætninger.

Forsøgsholdenes alder i forhold til gennemsnitsvægten må ved modtagelsen på forsøgsstationerne ikke overstige følgende:

Højeste tilladelige alder for forsøgshold ved modtagelse på de faste svineforsøgsstationer:

Holdets vægt, gns., kg	1. lægs søer alder ikke over	Andre søer
15	70 dage	65 dage
16	75 »	70 »
17	80 »	75 »
18	85 »	80 »
19	90 »	85 »
20	95 »	90 »

Denne skala er baseret på, at gennemsnitsalderen ved forsøgets begyndelse (20 kg levendevægt) ikke må overstige 95 dage for hold efter gylte og 90 dage for hold efter ældre søer.*)

Midlertidige foranstaltninger i tilfælde af pladsmangel på forsøgsstationerne. I perioder, hvor der er pladsmangel på forsøgsstationerne, vil der kun rent undtagelsesvis, når særlige forhold taler derfor, blive modtaget hold fra søer, som tidligere er afprøvet. Hold af 2. kuld, hvis mødre ikke er afprøvet efter 1. faring, vil ikke blive afvist. Alle andre forhold lige har egentlige avlscentre forret frem for prøvecentre. Hold fra prøvecentre vil kun blive modtaget, såfremt der ikke er mulighed for at sende dem til en lokal forsøgsstation.

Arbejdet på forsøgsstationerne.

På hver af de 4 forsøgsstationer er ansat 2 assistenter, hvoraf den ene er overassistent og ansvarlig for det daglige arbejdes gennemførelse. På *Svineforsøgsstationen Sjælland* er ansat overassistent, argonom *J. C. Madsen* og assistent *Erik Pedersen*, der 1. november 1963 afløste assistent *Verner Kok*. På *Svineforsøgsstationen Fyn* er ansat overassistent, argonom *J. K. Hansen* og assistent *Lars Helge Rasmussen*, på *Svineforsøgsstationen Jylland* overassistent *C. Uldum* og assistent *A. Chr. Hansen*, og på *Svineforsøgsstationen Vestjylland* overassistent, argonom *Hans Brunsgaard* og assistent *Harry Thisted*. På forsøgsstationernes kontor på *Forsøgslaboratoriet* er ansat videnskabelig assistent, argonom *O. K. Pedersen*, assistent, argonom *K. Bruhn* og assistent *O. Beck*, som alle tillige medvirker ved bedømmelsen af de slagtede forsøgsgrise. Endvidere er ansat assistenterne, argonom *Frederik Andersen*, *G. Aalstrup Poulsen*, *Rita Eiland* og *Asta Madsen*. Forsøgsleder, beregner *P. Jonsson* har bistået ved den statistiske bearbejdning af talmaterialet.

1. Forsøgsgrisenes fodring.

Som omtalt i sidste årsberetning (336. beretning fra forsøgslaboratoriet, 1963) er der for første gang siden 1925 foretaget en revision af den foderplan, der anvendes på de faste svineforsøgsstationer. Ved revisionen er der for det første givet erstatning for manglende protein i byggen af høsten 1961 og 1962, og for det andet er proteinkoncentrationen som helhed øget en del ud fra den betragtning, at den stadig stigende køddannelse hos forsøgsgrisene også har øget disses proteinbehov. (Dette forhold er mere udførligt omtalt i sidste års beretning side 11–16).

I første omgang blev det ekstra proteintilskud givet i form af større mængder skummetmælk, men fra 1. december 1962 er en del af mælken ombyttet med sojaskrå, således at der gives 100 g pr. gris daglig gennem hele forsøgstiden. Foderplanen blev herefter følgende:

*) Vedtaget på forsøgsrådsmøde 31/5–1963 og gældende fra 1. septbr. 1963.

Foderplan for grise på de faste svineforsøgsstationer.

Grisenes vægt, kg	F. e. pr. gris dgl.	kg foder pr. gris dgl.		
		mælk	byg	sojaskrå
16-18.....	0.75	0.8	0.5	0.1
19-21.....	0.89	1.0	0.6	0.1
22-24.....	1.02	1.2	0.7	0.1
25-27.....	1.15	1.4	0.8	0.1
28-30.....	1.29	1.6	0.9	0.1
31-33.....	1.42	1.8	1.0	0.1
34-36.....	1.55	2.0	1.1	0.1
37-39.....	1.69	2.2	1.2	0.1
40-42.....	1.82	2.4	1.3	0.1
43-45.....	1.95	2.6	1.4	0.1
46-48.....	2.09	2.8	1.5	0.1
49-51.....	2.22	3.0	1.6	0.1
52-54.....	2.32	3.0	1.7	0.1
55-57.....	2.44	3.1	1.8	0.1
58-60.....	2.54	3.1	1.9	0.1
61-64.....	2.65	3.2	2.0	0.1
65-68.....	2.75	3.2	2.1	0.1
69-73.....	2.87	3.3	2.2	0.1
74-78.....	2.97	3.3	2.3	0.1
79-83.....	3.09	3.4	2.4	0.1
84-88.....	3.19	3.4	2.5	0.1

Foderplanen anvendes iøvrigt som tidligere. Den tjener fortsat i første række til at angive forholdet mellem mængderne af de forskellige fodermidler. Med hensyn til selve størrelsen af det daglige foder i forhold til grisenes vægt, skal den kun være retningsgivende, idet det er reglen, at grisene skal have det foder, de vil æde. Der stilles dog det krav, at grisene skal æde rent op i løbet af 20 minutter, da man ved at presse grisene for stærkt risikerer, at de taber ædelysten, så der fremkommer en kortere eller længere standsning i deres udvikling.

Grisenes foder udvejes 1 gang om dagen, og der fodres 3 gange daglig. Til de udvejede mængder af byg, syrnnet skummetmælk og sojaskrå sættes så meget vand, at foderet får konsistens som en tynd grød. For at dække grisenes behov for vitamin A og D gives tilskud af levertran, indtil grisene vejer 60-65 kg. Det daglige tilskud pr. gris er 3 g indtil 40 kg og derefter 1.5 g til 60 kg levendevægt. Der anvendes tran, som indeholder 2000 int. A- og 200 int. D-enheder pr. gram. Endvidere gives der 5-10 g pr. gris daglig af en mineralstofblanding bestående af 80 pct. kridt og 20 pct. kogsalt.

2. Indkøb og opbevaring af foder.

For at sikre et så ensartet foder som muligt til alle forsøgsgrisene, indkøbes byggen i partier, der dækker 2-3 måneders forbrug, og hvert parti fordeles til de 4 stationer efter disses behov. Der anvendes normalt kun dansk byg og altid af den bedste kvalitet, der på det pågældende tidspunkt kan fremskaffes.

Byggen opbevares i forsøgsstationernes kornsiloer, der er forsynet

med elevatorer, således at kornet kan »kastes«, så ofte man skønner det nødvendigt for at opnå den bedst mulige opbevaringstilstand.

Kornet formales på stationerne, og for at sikre en ensartet og tilfredsstillende formalingsgrad på alle 4 stationer, foretages der af overassistenten sigteprøver med regelmæssige mellemrum.

Følgende mejerier leverer for tiden skummetmælk til de 4 stationer: *Borup Andelsmejeri* til »Sjælland«, *Langeskov Mejeri* til »Fyn«, *Aalum Mejeri* til »Jylland« og *Ansager Andelsmejeri* til »Vestjylland«. Mælken leveres i usyrnet tilstand og synes i rustfri stålkar på forsøgsstationerne, idet der kun anvendes syrnnet mælk til forsøgsgrisene.

3. Fodermidlernes kemiske sammensætning og foderværdi.

Der udtages med regelmæssige mellemrum prøver til kemisk analyse af det til forsøgene anvendte foder. Samtlige analyser udføres på forsøgslaboratoriets kemiske afdeling under ledelse af forstander, cand. polyt. *J. E. Winther*.

Hver gang der indkøbes et nyt parti byg, udtages der prøver heraf til kemisk analyse omfattende bestemmelse af råprotein, råfedt, kvælstoffri ekstraktstoffer, træstof, aske og vand. Desuden foretages en renproteinbestemmelse.

Til og med 1960 har afvigelserne i bygtørstoffets sammensætning været så små, at det var unødvendigt at tage hensyn hertil ved beregning af foderværdien og ved regulering af foderets proteinindhold. Imidlertid viste det sig, at byggen af høsten de 2 følgende år havde en fra det normale afvigende sammensætning, således som det fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Byggens kemiske sammensætning.

	Høsten 1962				Gns. for alle 4 stationer		
	»Sjælland«	»Fyn«	»Jylland«	»Vestjylland«	1962	1961	1960
Råprotein	8.07	8.34	8.49	8.54	8.36	8.75	9.91
Råfedt	1.78	1.73	1.75	1.80	1.77	1.68	1.80
N-fri ekstraktstoffer	69.45	69.21	69.07	68.93	69.17	68.84	67.80
Træstof	3.75	3.74	3.72	3.72	3.73	3.74	3.49
Aske	1.95	1.98	1.96	2.01	1.98	1.99	2.00
Renprotein	7.68	7.78	7.97	8.03	7.87	8.26	9.38

Resultaterne er korrigeret til 85 pct. tørstof.

Den kemiske sammensætning af byggen fra 1960 må betegnes som normal. I sammenligning hermed indeholdt byggen fra de 2 følgende år betydeligt mindre protein, og det gælder navnlig for byggen fra 1962, der havde ca. 1.5 procentenheder protein mindre end normalt. Resultaterne fra de 4 stationer er ikke helt så ensartede som ønskeligt. Særlig på »Sjælland« har proteinindholdet været meget lavt, nemlig kun 8.1 pct. råprotein. Imidlertid er der ved udarbejdelsen af foderplanen regnet med kun 8.0 pct., således at der

i alle tilfælde skulle være fuld dækning for byggens lave proteinindhold.

Da der er givet erstatning for manglende protein, har man fundet det forsvarligt fortsat at regne med 1 kg byg med 85 pct. tørstof til 1 f. e. Der er som i tidligere år hver måned udtaget en prøve af den formalede byg til tørstofbestemmelse, og på grundlag af tørstofindholdet er beregnet hvor meget byg, der i den pågældende måned er medgået til 1 f. e.

Tabel 5. Tørstofindhold og foderværdi i den anvendte byg.

Måned	»Sjælland«	»Fyn«	»Jylland«	»Vest-jylland«	Gns. 1962/63	Gns. 1952/53-1961/62
Pct. tørstof						
September ...	84.81	85.08	84.77	84.84	84.88	84.53
Oktober	83.71	84.84	84.60	84.55	84.43	84.35
November ...	83.57	83.37	84.84	84.77	84.14	84.03
December ...	84.77	83.82	85.15	83.97	84.43	83.93
Januar	84.72	83.29	85.01	83.89	84.23	84.15
Februar	83.58	83.33	83.38	83.63	83.48	83.86
Marts	83.76	83.36	83.79	83.21	83.53	84.29
April	83.90	81.79	83.47	83.48	83.16	84.11
Maj	85.50	85.93	85.08	85.04	85.39	84.18
Juni	84.30	83.87	83.44	83.90	83.88	84.39
Juli	84.18	83.87	83.99	82.45	83.62	84.79
August	84.14	83.69	84.34	83.72	83.97	84.94
Gns.	84.25	83.85	84.32	83.95	84.09	84.30
Kg byg til 1 f. e.						
September ...	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01
Oktober	1.02	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01
November ...	1.02	1.02	1.00	1.00	1.01	1.01
December ...	1.00	1.01	1.00	1.01	1.01	1.01
Januar	1.00	1.02	1.00	1.01	1.01	1.01
Februar	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.01
Marts	1.01	1.02	1.01	1.02	1.02	1.01
April	1.01	1.04	1.02	1.02	1.02	1.01
Maj	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01
Juni	1.01	1.01	1.02	1.01	1.01	1.01
Juli	1.01	1.01	1.01	1.03	1.02	1.00
August	1.01	1.02	1.01	1.02	1.02	1.00
Gns.	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01

Som det ofte er tilfældet har byggens tørstofindhold også i 1962/63 været mindre end 85 pct. Variationen fra måned til måned har været lidt større end sædvanligt, men årsgennemsnittet på de 4 stationer er meget nær ens, således at der på dem alle er medgået 1.01 kg til 1 f. e.

Der udtages hver dag en prøve af den anvendte skummetmælk, og de daglige prøver opsamles i en flaske tilsat konserveringsmiddel, indtil den for prøveindsendelsen fastsatte dag. Efter omhyggelig omrystning udtages og indsendes en blandingsprøve til kemisk analyse.

Tidligere indsendtes der en prøve 2 gange månedlig, men i de

senere år er man gået over til at indsende prøve hver uge i sommerhalvåret, da det ofte kniber med at holde mælkeprøverne friske, når opbevaringsperioden er 14 dage.

Ved analysen bestemmes indholdet af tørstof, fedt og protein. Tabel 6 viser gennemsnitsresultaterne for hver station og for de 4 stationer under et. Til sammenligning er anført resultater fra tidligere år.

Tabel 6. Skummetmælkens kemiske sammensætning.

Forsøgsstation	Pct. tørstof	Pct. fedt	Pct. protein
»Sjælland«	9.27	0.08	3.56
»Fyn«	9.33	0.07	3.70
»Jylland«	9.25	0.07	3.64
»Vestjylland«	9.44	0.09	3.48
Gns. 1962/63.....	9.32	0.08	3.60
– 1961/62.....	9.42	0.08	3.63
– 1955/56–1959/60.....	9.45	0.07	3.63

Det gennemsnitlige indhold af såvel tørstof som protein er en ubetydelighed lavere end i tidligere år. Hvad resultaterne for de enkelte stationer angår, er billedet det samme som i fjor. Mælken på »Fyn« har igen i år det højeste og mælken på »Vestjylland« det laveste proteinindhold. Til gengæld har mælken på »Vestjylland« haft det højeste tørstofindhold. Som helhed må mælkens sammensætning betegnes som ensartet og tilfredsstillende.

Analyserne af den anvendte sojaskrå viser et gennemsnitligt råproteinindhold på 45.22 pct. De indkøbte partier har med enkelte undtagelser været ensartede i sammensætning. Yderpunkterne har været 46.48 og 43.76 pct. råprotein.

4. Den fremtidige fodring på de faste svineforsøgsstationer.

Den for nylig gennemførte revision af foderplanen skal ikke betragtes som en endelig løsning af spørgsmålet om fodringen på de faste svineforsøgsstationer. En mere gennemgribende ændring har i længere tid været under overvejelse, således som omtalt i det tilsvarende afsnit side 14–16 i sidste årsberetning (336. beretning fra forsøgslaboratoriet, 1963).

Det blev her påpeget, at der måtte tilstræbes en fodring, som foruden at give fuld dækning for grisenes næringsbehov er billigere og mindre arbejdskrævende. Da anvendelse af skummetmælk som hovedproteinkilde giver både en dyr og arbejdskrævende fodring, måtte det vigtigste spørgsmål blive, om denne hidtil uovertrufne proteinkilde kunne erstattes med andre fodermidler, uden at det gik ud over slagtekvantiteten. Ved et forsøgsrådsmøde d. 10. maj 1962, hvor spørgsmålet blev drøftet, var man enige om, at resultaterne fra de seneste års omfattende fodringsforsøg vedrørende slagterisvinenes proteinbehov tydede på, at der var en mulighed herfor. Man var dog betænkelig ved direkte at overføre resultaterne

på avlscentergrisene, der har en større køddannelse og dermed også et større proteinbehov end almindelige slagterisvin.

Man blev derfor enige om, inden den endelige afgørelse træffes, at gennemføre en sammenlignende fodring på de 4 forsøgsstationer, således at 2 grise (en af hvert køn) af et vist antal hold fodres efter en plan udarbejdet på grundlag af resultaterne fra fodringsforsøgene, medens de 2 andre grise af de samme hold fodres efter den nugældende reviderede plan. Det var hensigten at iværksætte dette forsøg i efteråret 1962, men planen blev udskudt, først og fremmest for at afvente resultaterne fra igangværende fodringsforsøg af betydning for spørgsmålet.

Forsøget blev påbegyndt i efteråret 1963 efter den skitserede plan og omfatter 50 hold på hver af de 4 stationer. Der anvendes en foderblanding, som indeholder 18 pct. proteingivende fodermidler og er tilsat vitaminer og mineralstoffer. Blandingen, der er slået i piller, har følgende sammensætning:

81 dele	dansk byg
12 »	sojaskrå
3 »	kødbenmel
3 »	skummetmælkspulver (spray)
0.9 »	mineralblanding
0.1 »	vitamin- og mikromineralblanding
100	

Mineralblanding:	55 dele	kridt
	25 »	dicalciumfosfat
	20 »	kogsalt

Vitamin- og mikromineralblanding:

	Indhold pr. g	
50 mg	zinkkarbonat	3000 int. enh. A-vitamin
125 »	kobbersulfat	600 int. enh. D ₃ -vitamin
125 »	jernsulfat	5 mg riboflavin
123 »	mangansulfat	5 » d-pantotensyre
5 »	coboltsulfat	0.02 » B ₁₂ -vitamin
1 »	kaliumjodid	

Det ses, at man ikke helt har udeladt skummetmælken, idet der i blandingen indgår spraytørret dansk skummetmælkspulver. På tidspunktet for denne beretnings udarbejdelse er alle 200 hold modtaget. Pillerne udvejes en gang ugentlig, og det viser sig ikke at volde vanskeligheder at fordele foderet på ugens syv dage, og at pillerne ikke tager skade af staldklimaet. Grisene æder gerne pillerne, og med hensyn til udseende, tilvækst og foderforbrug har de hidtil været på linie med de normalt fodrede, der har fået skummetmælk, sojaskrå og byg.

Sideløbende hermed gennemføres et andet forsøg, hvor selvfodring med fri adgang til foder sammenlignes med håndfodring 3 gange daglig. Hensigten med dette forsøg er at få konstateret, om

avlscentergrisene nu er nået så langt med hensyn til anlæg for køddannelse, at de kan tåle selv fodring uden at blive for fede. Forsøget gennemføres med dobbelthold à 8 kuldsøskende fra avlscentre, således at de 4 grise fodres fra selv fodringsapparat med samme 18 pct.s blanding, som anvendes i det ovenfor omtalte forsøg, dels i mel- og dels i pilleform, medens de 4 andre grise håndfodres efter forsøgsstationernes normale plan med mælk, sojaskrå og byg, og derfor betragtes som regulære forsøgshold. Der er ialt indsat 18 dobbelthold i dette forsøg. 5 af disse er anbragt på den faste forsøgsstation »Sjælland I« og resten på »Sjælland II«.

En del af grisene i selv fodringsforsøget er slagtede, og de foreløbige resultater tyder på, at sogrisene – med enkelte undtagelser – kan tåle den frie adgang til foder uden at blive federe end de håndfodrede kuldsøskende, medens størstedelen af galtene gennemgående bliver federe ved selv fodring end ved håndfodring.

Bedømmelse af forsøgsgrisenes slagtekvantitet.

Når forsøgsgrisene har nået en levendevægt af 90 kg, leveres de til det nærmeste andelsslagteri, hvor bedømmelsen finder sted dagen efter slagting. Bedømmelsen udføres af forsøgslaboratoriets forsøgsleder eller dennes stedfortræder. Grisene fra *Svineforsøgsstationen Sjælland* slages og bedømmes på *Roskilde Andels-Svineslagteri*, grisene fra *Svineforsøgsstationen Fyn* på *Andelsselskabet Odense Eksporthagteri*, grisene fra *Svineforsøgsstationen Jylland* på *Randers Andels-Svineslagteri* og grisene fra *Svineforsøgsstationen Vestjylland* på *Ansager Andelsslagteri*.

Forsøgslaboratoriet benytter hermed lejligheden til at takke de pågældende slagteriernes ledelse for værdifuld støtte ved bedømmelsens gennemførelse.

Der er i årenes løb med visse mellemrum sket udvidelse og skærpelse af slagtekvantitetsbedømmelsen. Udvidelsen gælder navnlig indførelse af nye mål, medens skærpelsen udelukkende gælder for den skønsmæssige bedømmelse. I overensstemmelse med de stadig stigende krav til slagtekvantiteten i retning af større kødfylde er det i første række bedømmelse af denne egenskab, der fra tid til anden er blevet skærpet. Selv om kvalitetskravene havde været uforandrede gennem tiderne, og altså idealgrisen et uforanderligt begreb, ville det alligevel have været nødvendigt at skærpe den skønsmæssige bedømmelse, fordi gennemsnittet oprindeligt blev placeret i pointsskalaens øverste halvdel i stedet for dens midte. Som følge deraf vil der ske en ophobning af resultaterne ved skalaens top (14–15 points) efterhånden som avlsdyrmaterialet forbedres.

I 1962/63 er der ikke sket nogen ændring af den skønsmæssige bedømmelse, og resultaterne for de 2 sidste år er derfor direkte sammenlignelige. Ved overgangen til forsøgsåret 1963/64 skete der på ny en skærpelse, der, ligesom i tidligere tilfælde, først og frem-

mest rammer kødfylden, navnlig i overskåret side. Samtidig blev arealet af den lange rygmuskel anført på såvel holdoppgørelserne til centerejerne som i beretningernes hovedtabeller. (Se nærmere herom i afsnittet: Særlige forhold vedrørende kødfylden side 34).

Forsøgsresultaterne.

Så snart et hold er færdigt på forsøgsstationen, opgøres resultatet, og meddelelse herom sendes til vedkommede centerejer og til repræsentanter for svineavlens ledelse. Desuden offentliggøres 4 gange om året foreløbige meddelelser fra svineforsøgsstationerne med resultater for de hold, hvormed der er afsluttet forsøg i de foregående 3 måneder. Endelig udsendes 1 gang årlig en samlet beretning over resultaterne fra det forløbne år.

En oversigt over særlig gode hold bliver efter hvert afsluttet kvartal offentliggjort i landbrugets fagblade.

Reglerne for, at et hold kan blive fremhævet, er skærpet fra 1. september 1963 og er herefter følgende:

1. Holdet skal bestå af 2 galte og 2 sogrise ved forsøgets afslutning.
2. De enkelte grise i holdet skal have opnået mindst 12.5 points for type, og holdets gennemsnit skal være mindst 13.1 points.
3. Sidespækmålet må ikke overstige 2.6 cm hos de enkelte grise i holdet.
4. Foderforbruget skal være lavere end stationens gennemsnit eller lavere end 3.10 f. e. pr. kg tilvækst.
5. Hold, hvori der har været 1 eller flere grise med synlig nyse-syge, kan ikke fremhæves.
6. Hold, hvis gennemsnitlige pointsantal for kødfarve er mindre end 2.0, kan ikke fremhæves.

Tabel 7 viser en oversigt over de i 1962/63 opnåede resultater for de 4 stationer og gennemsnittet for hele landet. Resultaterne for de enkelte hold, med undtagelse af karbonadens kød- og spækareal, findes i beretningens hovedtabeller.

1. Sundhedstilstanden på forsøgsstationerne.

Som udtryk for grisenes sundhedstilstand benyttes udsætterprocenten, der omfatter grise, som er udsatte eller døde i selve forsøgstiden, inclusive udsættere fra opløste hold, d. v. s. hold, hvorfra mere end 1 gris er udsat samt grise, der ganske vist har nået slagtevægten, men som har været syge i så lang tid, at de må betegnes som unormale, og derfor er udskudte efter forsøgets afslutning. Resultaterne for årene 1953/54—1962/63 er anført i tabel 8.

Tabel 7. Hovedresultater af de sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre fra 1. september 1962 til 31. august 1963.

	»Sjælland«*)	»Fyn«	»Jylland«	»Vestjylland«	Ialt og gns.	
Antal forsøgsgrise	1388	1252	1244	1200	5084	
Heraf var {						
galtgrise	692	625	617	599	2533	
sogrise	696	627	627	601	2551	
Pct. udsættere	1.7	1.4	1.1	1.0	1.3	
Alder i dage v. 20 kg levendevægt	79	75	80	82	79	
Alder i dage v. 90 kg levendevægt	181	182	185	187	184	
Vægt i kg v. lev. til slagteriet...	89.5	89.9	89.7	89.8	89.7	
Vægt i kg efter slagtning, kold..	65.2	65.4	65.3	65.4	65.3	
Daglig tilvækst i g	688	660	670	670	673	
F. e. pr. kg tilvækst	2.95	3.04	2.99	2.90	2.97	
Pct. svind ved slagtning	27.1	27.2	27.2	27.3	27.2	
Pct. eksportflæsk	60.7	60.4	60.4	60.7	60.6	
Pct. svind ved tilskæring (affald)	12.2	12.4	12.4	12.0	12.2	
Tykkelse i cm af {						
rygspæk**) ..	2.64	2.65	2.68	2.67	2.66	
sidespæk	2.23	2.24	2.30	2.29	2.26	
bug	3.33	3.27	3.31	3.29	3.30	
Kroplængde i cm	96.4	95.9	96.5	96.1	96.2	
Points (0-15) ved bedømmelse af {	spækkets fasthed....	13.7	13.6	13.6	13.6	13.6
	bov	12.8	12.7	12.7	12.8	12.8
	rygsp. fordeling....	13.1	13.2	13.1	13.2	13.2
	bugens tykkelse og kvalitet	13.2	13.0	13.1	13.1	13.1
	skinkernes form og størrelse	13.2	13.0	13.1	12.8	13.0
	finhed af hoved, ben og svær	13.5	13.4	13.4	13.5	13.4
	kødfylde {					
	hel	13.3	13.3	13.2	13.2	13.3
	oversk. .	13.2	13.2	13.2	13.1	13.2
	bacontype	13.1	13.1	13.1	13.0	13.1
Karbonadens kødareal, cm ²	33.8	34.4	34.3	34.3	34.2	
Areal af lange rygmuskel, cm ² ..	27.7	27.8	28.0	27.8	27.8	
Karbonadens spækareal, cm ² ...	31.1	30.4	31.2	31.2	31.0	
Points for kødfarve (0-5)	2.29	2.31	2.30	2.24	2.28	
Pct. af svinene kom i klasse {						
A1.	40	41	40	41	41	
A	57	55	57	55	56	
B	3	4	3	4	3	
C	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	

I årene 1953/54 til 1959/60 var udsætterprocenten meget nær den samme. I 1960/61 skete der en tydelig forbedring, idet den gennemsnitlige udsætterprocent faldt fra 2.5 til 1.7. Nedgangen fortsatte i de 2 følgende år og i 1962/63 blev der kun udsat 1.3 pct. af grisene.

*) Incl. 1 hold afprøvet på »Sjælland II«.

**) Det normale gennemsnit af mål over nakke, midte og lænd.

Tabel 8. Pct. udsættere på forsøgsstationerne.

(Døde, syge, utrivelige og udskudte).

År	»Sjælland«	»Fyn«	»Jylland«	»Vestjylland«	Gns.
1953/54–1955/56	2.5	2.9	2.5	—	2.6
1956/57–1957/58	2.4	2.4	2.5	—	2.4
1958/59–1959/60	2.6	2.7	2.2	—	2.5
1960/61	2.9	1.8	1.3	0.6	1.7
1961/62	1.8	1.5	2.1	0.6	1.5
1962/63	1.7	1.4	1.1	1.0	1.3

Forsøgsstationen »Vestjylland« har en væsentlig andel i den lave gennemsnitlige udsætterprocent i de sidste 3 år. Selv om der på denne station er udsat lidt flere grise i 1962/63 end i de 2 foregående år, er resultatet stadig bedre end på de 3 andre stationer. Af disse har »Jylland« i 1962/63 den største forbedring, idet udsætterprocenten er faldet fra 2,1 til 1,1, men også på »Fyn« og »Sjælland« er udsætterprocenten lavere end i 1961/62.

Tabel 9 viser udsætterprocenten hos galte og sogrise siden 1926/27. Da denne oversigt også omfatter resultater fra de gamle stationer med holdfodring, er de udskudte grise, af hensyn til sammenligningen, ikke medregnet.

Tabel 9. Udsætterprocenten hos galte og sogrise.

Udskudte grise ikke medregnet.

År	Ialt	Udsætterprocent		a b
		galte a	sogrise b	
1926/27–1931/32	6.8	8.7	5.0	1.74
1932/33–1937/38	5.3	6.4	4.3	1.51
1938/39–1943/44	4.1	4.5	3.7	1.20
1944/45–1949/50	4.3	4.7	3.8	1.24
1950/51–1955/56	2.0	2.1	1.8	1.17
1956/57–1959/60	1.6	1.7	1.6	1.09
1960/61	1.3	1.3	1.4	0.93
1961/62	1.2	1.3	1.2	1.10
1962/63	1.0	0.9	1.1	0.82

I den periode, tabellen omfatter, er der sket en meget betydelig ændring i forholdet mellem udsættere hos de 2 køn. Ved periodens begyndelse blev der udsat betydeligt flere galte end sogrise, men i tidens løb ændredes billedet, og i de senere år har snart det ene og snart det andet køn de fleste udsættere. I gennemsnit for de sidste 6 år har der ikke været nogen forskel i udsætterprocenten hos galte og sogrise. Dette tyder på, at det ikke var fjernelsen af kønskirtlerne, der nedsatte galtenes modstandsevne overfor sygdomme eller andre uheldige påvirkninger.

Det er derimod overvejende sandsynligt, at den forholdsvis store udsætterprocent hos galtene for år tilbage skyldtes manglende omhu ved kastrationen og en heraf følgende infektionsrisiko, eller en for sen kastration, således at sårene ikke var lægte ved grisenes afsendelse til forsøgsstationen.

Tuberkulose er i årets løb konstateret hos 2 forsøgsgrise, 1 på »Sjælland« og 1 på »Vestjylland«, hvilket er det hidtil laveste antal tilfælde af tuberkulose i et enkelt år.

Tryneundersøgelser. Siden 1955 er trynerne af samtlige forsøgsgrise indsendt til *Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles afdeling for speciel Patologi og Terapi*, hvor de undersøges for anatomiske forandringer. Undersøgelsen foretages af dyrlæge P. Gørtz, og resultaterne vil i nær fremtid blive offentliggjort i en særlig beretning fra forsøgslaboratoriet.

II. Væksthastighed og foderforbrug.

Såvel den daglige tilvækst som forbruget af f.e. pr. kg tilvækst beregnes for hver enkelt gris nøjagtig for perioden 20—90 kg. I den periode, hvor grisene går sammen 2 og 2, således som omtalt side 4, kan det individuelle foderforbrug ikke direkte bestemmes, og foderet fordeles da til hver gris i henhold til dens vægt. For grise, hvis vægt ved forsøgets begyndelse og slutning afviger mere end 0.5 kg fra henholdsvis 20 og 90 kg, bliver der foretaget en korrektion. Derefter udregnes holdets gennemsnit som simpelt gennemsnit af de enkelte grisenes tilvækst og foderforbrug. Ved denne beregningsmåde får alle 4 grise i holdet lige stor indflydelse på gennemsnitsresultatet. Benyttes derimod sumtallene, får de langsomt voksende grise større indflydelse på gennemsnittet end de hurtigt voksende, fordi de bruger længere tid til at vokse fra 20 til 90 kg levendevægt.

1. Gennemsnitsresultater.

Den daglige tilvækst blev i 1962/63 kun 673 g i gennemsnit for alle 4 stationer mod 686 g året forud og 696 g i 1960/61. Den nedgang, der konstateredes i fjor, er således fortsat i beretningsåret i forstærket grad. Det bedste resultat er opnået på »Sjælland« med 688 g, hvilket ikke er langt under det normale (ca. 690 g), og det dårligste på »Fyn«, hvor grisene kun voksede 660 g daglig, eller ca. 30 g mindre end normalt. Heller ikke på de 2 jyske stationer har tilvæksten været fuldt tilfredsstillende, idet den kun blev 670 g daglig.

Da nedgangen i den daglige tilvækst begyndte samtidig med overgang til korn af høsten 1961 med det lave proteinindhold, var det naturligt at sætte de 2 forhold i forbindelse med hinanden. Det er imidlertid ikke lykkedes at finde et sikkert bevis for, at den nedsatte væksthastighed skyldes det lave proteinindhold i byggen. For det første havde grisene på »Sjælland« en normal daglig tilvækst i 1961/62 på 694 g, og nedgangen i 1962/63 til 688 g er mindre end nedgangen på de andre stationer, til trods for, at den på »Sjælland« i 1962/63 anvendte byg har haft det laveste proteinindhold.

Det har tilsyneladende ikke hjulpet at give erstatning for det manglende protein i form af mælk eller sojaskrå, selv om erstatningen er baseret på kun 8.0 pct. råprotein i byggen.

Udover at have et for lavt proteinindhold har byggens sundheds-

mæssige tilstand i de 2 vanskelige høstår 1961 og 1962 ikke været helt så god som ønskelig. I foråret 1963 påbegyndtes en undersøgelse af svampeindholdet i den anvendte byg. Det viste sig, at der var ret betydelige variationer i svampeindholdet i byggen på de 4 stationer, men i gennemsnit af de undersøgte prøver er der dog ringe forskel på stationerne, og der har ikke kunnet påvises noget sikkert samspil mellem daglig tilvækst og svampeindhold. Spørgsmålet om svampeindholdets betydning for byggens fodringsmæssige kvalitet er for tiden genstand for nærmere undersøgelser.

Ved slutningen af 1962/63 og i begyndelsen af det nye forsøgsår 1963/64 rettede den daglige tilvækst sig på stationerne »Sjælland« og »Vestjylland«, på sidstnævnte station endog meget betydeligt. Da fremgangen skete inden overgangen og holdt sig efter overgangen til korn af ny høst, må årsagen søges i andre forhold end byggens sammensætning. På de 2 andre stationer var der i samme tidsrum ikke nogen nævneværdig ændring i den daglige tilvækst.

2. Variationer i væksthastighed og foderforbrug.

Væksthastighed og foderforbrug er egenskaber, der påvirkes stærkt af ydre kår. Efter overgangen til de nuværende stationer med individuel fodring og bedre og mere ensartede staldforhold, kunne der da også konstateres en mere ensartet væksthastighed hos grisene. Hvorledes det forholdt sig med den individuelle variation i foderforbruget hos grisene på de gamle stationer kunne ikke konstateres på grund af holdfodring.

Efter overgangen til den individuelle fodring har der hvert år været foretaget beregninger over den individuelle variation i såvel daglig tilvækst som foderforbrug pr. kg tilvækst. Resultaterne af en sådan beregning fremgår af tabel 10.

Tabel 10. Variationen i daglig tilvækst og foderforbrug.

	Antal grise	G ± m	Variations- bredde	Standard- afvigelse ±
	Daglig tilvækst, g.			
»Sjælland«	1370	688 ± 0.89	556-797	32.0
»Fyn«	1236	660 ± 0.97	526-758	34.1
»Jylland«	1197	670 ± 1.05	533-761	36.3
»Vestjylland«	1192	670 ± 1.15	487-798	39.6
Ialt og gns. 1962/63..	4995	673 ± 0.52	487-798	36.9
» » » 1961/62..	5078	686 ± 0.48	522-823	34.1
Gns. 1952/53-1960/61.	3658	670 ± 0.55	507-823	32.9
F. e. pr. kg tilvækst.				
»Sjælland«	1370	2.95 ± 0.0041	2.50-3.63	0.151
»Fyn«	1236	3.04 ± 0.0042	2.61-3.57	0.149
»Jylland«	1197	2.98 ± 0.0048	2.56-3.61	0.167
»Vestjylland«	1192	2.90 ± 0.0051	2.30-3.61	0.177
Ialt og gns. 1962/63..	4995	2.97 ± 0.0024	2.30-3.63	0.169
» » » 1961/62..	5078	2.95 ± 0.0021	2.39-3.79	0.153
Gns. 1952/53-1960/61.	3658	2.98 ± 0.0025	2.44-3.66	0.147

Indenfor det tidsrum, disse beregninger har været udført, kunne der indtil i fjor ikke konstateres nogen væsentlig ændring i variationen, hverken ved sammenligning mellem år eller stationer. I 1961/62 noteredes en begyndende tendens til en stigende variation, især for foderforbrugets vedkommende, og denne tendens slog tydeligt igennem i 1962/63, hvor der navnlig på de 2 jyske stationer var en betydelig stigning i variationen såvel for væksthastighed som for foderforbrug.

Det fremgår af resultaterne fra »Vestjylland«, at det laveste foderforbrug for en enkelt gris nu er nede på 2.30 f. e. pr. kg tilvækst.

3. Væksthastighed og foderforbrug hos galte og sogrise.

På de gamle forsøgsstationer med holdfodring voksede galtene gennemgående noget hurtigere end sogrisene.

I forsøgsåret 1948/49 var forskellen 15 g daglig, hvilket svarer nogenlunde til resultater opnået ved tilsvarende forsøg i andre lande.

På de nuværende forsøgsstationer med individuel fodring er forholdet omvendt, her vokser sogrisene lidt hurtigere end galtene og bruger samtidig lidt mindre foder pr. kg tilvækst, således som det fremgår af tabel 11. For foderforbrugets vedkommende kan der ikke drages nogen sammenligning på grund af holdfodringen på de gamle stationer.

Der er næppe tvivl om, at den stedfundne ændring i forholdet mellem galte og sogrise med hensyn til væksthastighed på en eller anden måde har tilknytning til ændringen i fodringsmåden, overgangen fra holdfodring til individuel fodring, men det har ikke været muligt på grundlag af det foreliggende materiale at få dette bekræftet eller at finde andre årsager.

Tabel 11. Forskel i væksthastighed og foderforbrug hos galte og sogrise.

	Daglig tilvækst, g			F. e. pr. kg tilvækst		
	galte	sogrise	forskel s ÷ g	galte	sogrise	forskel s ÷ g
»Sjælland«	685	690	+ 5	2.97	2.92	÷ 0.05
»Fyn«	657	663	+ 6	3.07	3.01	÷ 0.06
»Jylland«	665	675	+ 10	3.03	2.94	÷ 0.09
»Vestjylland« ...	666	674	+ 8	2.94	2.85	÷ 0.09
Gns. 1962/63.....	669	676	+ 7	3.00	2.93	÷ 0.07
» 1961/62.....	682	689	+ 7	2.98	2.92	÷ 0.06
» 1960/61.....	694	699	+ 5	2.93	2.88	÷ 0.05
» 1952/53- 1959/60.....			+ 8			÷ 0.07

Der er i årenes løb kun sket ganske betydningsløse ændringer i forskellen i væksthastighed og foderforbrug hos grisene af de 2 køn. En overgang var der tendens til en aftagende forskel, men i de 2 sidste år er denne på ny steget. Forskellen er dog så lille, at den ikke har nogen nævneværdig praktisk betydning.

4. Kontrol med forsøgsgrisenes foderforbrug.

Da alt foderet til forsøgsgrisen indkøbes, er man i stand til at beregne svindet ved foderets opbevaring, tilberedning og udvejning, og derved få en ekstra kontrol med de fundne foderforbrugstal. For kornets vedkommende er det nødvendigt at tage hensyn til forskydninger i lagerbeholdningen fra år til år, idet forbruget af korn, svindet iberegnet, skal svare til lagerbeholdningen ved forsøgsårets begyndelse plus mængden af indkøbt korn minus beholdningen ved årets slutning. Der foretages derfor ved hver overgang til et nyt forsøgsår pr. 1. september en nøjagtig opgørelse af den mængde byg, forsøgsstationerne ligger inde med. Denne opgørelse overværes og kontrolleres af et forsøgsrådsmedlem for den pågældende forsøgsstation.

Da man ofte ligger inde med ret store beholdninger af byg, må der regnes med et vist opbevaringssvind, særlig i forbindelse med den hyppige kastning. Hertil kommer et uundgåeligt svind ved bygens formaling og den daglige udvejning til forsøgsgrisen.

Da de nuværende forsøgsstationer blev taget i brug, benyttedes som grundlag for, hvad man måtte betragte som et rimeligt kornsvind, resultaterne fra møllerierne. Da man her regnede med et svind ved opbevaring og formaling på 2 pct., blev det betragtet som tilfredsstillende, når det samlede svind på forsøgsstationerne ikke oversteg denne størrelse.

Tabel 12 viser kornsvindet på de 4 stationer i beretningsåret og til sammenligning er der anført gennemsnitsresultater fra tidligere år.

Tabel 12. Kornsvindet på forsøgsstationerne.

Forsøgsstation	Indvejet kg	Udvejet kg	Svind	
			kg	pct.
»Sjælland«	230.885	225.442	5.443	2.36
»Fyn«	207.803	204.088	3.715	1.79
»Jylland«	200.100	197.926	2.174	1.09
»Vestjylland«	202.657	199.473	3.184	1.57
Ialt og gns. 1962/63....	841.445	826.929	14.516	1.73
» » » 1961/62....	871.000	866.808	4.192	0.48
» » » 1952/53-				
1960/61....	6.087.414	6.000.065	87.349	1.43

Medens kornsvindet i fjor var unormalt lille, er det i beretningsåret af en mere normal størrelsesorden, nemlig 1.73 pct. Det er dog noget højere end gennemsnittet for de tidligere år, hvilket skyldes, at der på »Sjælland« har været et unormalt stort svind på 2.36 pct. Det er dog sket enkelte gange tidligere, at kornsvindet har oversteg 2 pct.

Det samlede mælkeforbrug var 1.466.505 kg, og svindet 0.04 pct.

III. Resultaterne fra bedømmelsen af de slagtede forsøgsgrise.

1. Slagtesvind, eksportflæsk og tilskæringssvind.

Slagtesvindet blev i gennemsnit for alle 4 stationer 27.2 pct. mod 27.0 pct. i 1961/62. Hvad de enkelte stationer angår, har der været en mindre nedgang på »Sjælland«, der i fjor havde det højeste slagtesvind, medens der på de 3 andre stationer har været en stigning, således at forskellen mellem stationerne er formindsket.

Stigningen i slagtesvindet har medført en tilsvarende nedgang i mængden af eksportflæsk, nemlig fra 60.8 til 60.6 pct. Det vil sige, at tilskæringssvindet har været uforandret 12.2 pct. i gennemsnit for de 4 stationer. Sammenligner man stationerne indbyrdes, kan man konstatere det største tilskæringssvind på stationerne »Fyn« og »Jylland«, hvor det var 12.4 pct., og det laveste på »Vestjylland«, nemlig 12.0 pct.

Ser man på udviklingen, som den har formet sig i årenes løb (tabel 27), kan man konstatere, at slagtesvindet holdt sig ret konstant i årene fra 1926/27 til 1936/37, hvorefter der fulgte en periode med aftagende svind, og det laveste nåedes i 1950/51 med 26.3 pct.

Da tilskæringssvindet også faldt, øgedes mængden af eksportflæsk yderligere og nåede i 1950/51 61.3 pct. Der fulgte nu ca. 10 år med ret konstante resultater, men derefter begyndte såvel slagtesvindet som tilskæringssvindet at stige, hvilket medførte et ret betydeligt fald i mængden af eksportflæsk. Medens den seneste stigning i slagtesvindet er en naturlig følge af den stedfundne ændring af typen til længere og mere magre grise, kan der ikke gives nogen forklaring på de seneste års stigning i tilskæringssvindet. Det skyldes i hvert fald ikke vægten af hoved og flomme. I gennemsnit vejede hovedet 3.77 kg mod 3.82 kg i 1956/57 og vægten af flommen faldt fra 1.45 til 1.28 kg.

2. Rygpækkets og sidespækkets tykkelse.

Fra 1926/27 til 1952/53 faldt den gennemsnitlige rygpæktykkelse hos grisene på de faste svineforsøgsstationer fra 4.05 til 3.43 cm, en nedgang på 0.62 cm, eller 15.3 pct. i løbet af 26 år.

Fra 1952/53 til 1962/63 faldt gennemsnittet til 2.66 cm, en nedgang på 0.77 cm eller 22.4 pct. Det vil sige, at der i de sidste 10 år, hvor selektionen har været særlig intensiv, er opnået en større samlet nedgang i rygpæktykkelsen end i de forudgående 26 år. I alt er rygpækkets tykkelse siden 1926/27 faldet fra 4.05 til 2.66 cm, eller med 34.3 pct.

Resultaterne fra de seneste år viser, at det kan være vanskeligt at vurdere udviklingen fra år til år til trods for, at årsgennemsnittene repræsenterer ca. 5000 grise.

I årene 1960/61 og 1961/62 var nedgangen i rygpæktykkelsen henholdsvis kun 0.04 og 0.03 cm, medens den i de 7 foregående år gennemsnitlig var 0.08 cm. Det ville være ret naturligt at betragte denne aftagende nedgang som et tegn på, at *Landracens* rygpæktykkelse

efter mange års konstant nedgang efterhånden nærmer sig det muliges grænse for yderligere nedgang, og at man herefter må regne med gradvis aftagende virkning af selektionen.

Resultaterne for 1962/63 tyder imidlertid stærkt på, at der fortsat er gode muligheder for yderligere nedgang i rygspæktykkelsen. Gennemsnittet faldt fra 2.82 til 2.66 cm, eller det dobbelte af den gennemsnitlige årlige nedgang i de sidste 10 år.

Ligeledes har resultaterne for 1962/63 vist, at teorien om en minimumsgrænse for rygspæktykkelse ved 2 cm ikke er holdbar til trods for, at den syntes meget vel underbygget af tidligere års resultater. Allerede i 1961/62 havde 5 grise og i 1962/63 20 grise passeret denne grænse. Blandt disse havde en enkelt gris kun 1.7 cm rygspæk, hvilket er det hidtil laveste.

Den væsentligste årsag til den meget betydelige nedgang i rygspæktykkelsen i 1962/63 er sikkert, at der blandt avlsdyrbestanden i dette år har været et forholdsvis stort antal avlsdyr med meget stabile anlæg for tyndt rygspæk og god slagte kvalitet i det hele taget, og at disse er benyttet meget stærkt. I hvilken udstrækning dette forhold

Tabel 13. Rygspækkets tykkelse og variation.

År	Antal grise	Rygsp. tykk. i cm*) G ± m		Variations- bredde, cm	Standard afvigelse ± cm
Galte.					
1926/27.....	975	4.16	0.016	2.9-6.5	0.508
1936/37.....	1446	3.64	0.011	2.6-5.1	0.399
1946/47.....	1076	3.46	0.010	2.4-4.7	0.321
1956/57.....	1724	3.24	0.007	2.4-4.7	0.307
1960/61.....	2290	2.97	0.006	2.2-4.0	0.283
1961/62.....	2526	2.93	0.005	2.1-4.2	0.271
1962/63.....	2494	2.78	0.006	1.8-4.1	0.278
Sogrise.					
1926/27.....	1041	3.92	0.013	2.6-5.9	0.408
1936/37.....	1587	3.34	0.008	2.3-4.7	0.316
1946/47.....	1154	3.21	0.009	2.1-4.5	0.289
1956/57.....	1802	2.97	0.006	2.1-4.0	0.263
1960/61.....	2328	2.71	0.005	1.9-4.1	0.249
1961/62.....	2552	2.68	0.005	1.8-3.7	0.250
1962/63.....	2501	2.52	0.005	1.7-3.7	0.262
Galte + sogrise.					
1926/27.....	2016	4.03	0.010	2.6-6.5	0.441
1936/37.....	3029	3.48	0.007	2.3-5.1	0.388
1946/47.....	2230	3.33	0.007	2.1-4.7	0.331
1956/57.....	3526	3.11	0.005	2.1-4.7	0.315
1960/61.....	4618	2.84	0.004	1.9-4.1	0.297
1961/62.....	5078	2.80	0.004	1.8-4.2	0.290
1962/63.....	4995	2.65	0.004	1.7-4.1	0.296

*) De angivne gennemsnitstal for rygspækkets tykkelse falder ikke ganske sammen med de i tabel 7 og teksten angivne. Dette skyldes, at G i tabel 7 efter sædvane er beregnet som gennemsnit af holdgennemsnittene, medens det i denne tabel er beregnet som middel af de enkelte grise.

kan påvirke resultaterne i 1963/64 og de følgende år er vanskeligt at sige, men en fremgang svarende til den, der opnåedes i 1962/63, kan næppe forventes. De usædvanligt gode resultater i 1962/63 ændrer heller ikke den kendsgerning, at nedgangen i rygspektykkelsen før eller senere må aftage.

Selv med en mere moderat fremgang vil det dog sikkert lykkes indenfor overskuelig fremtid at nå ned på den for afsætningen passende gennemsnitstykkelse, der for øjeblikket må skønnes at være ca. 2.4 cm.

Den omstændighed, at teorien om en minimumsgrænse ved 2 cm har vist sig uholdbar, har medført en mindre stigning i variationen omkring gennemsnittet, hvilket fremgår af tabel 13. I modsætning til tidligere år er resultaterne i beretningsåret beregnet særskilt for galte og sogrise for at få konstateret, om de 2 køn har udviklet sig forskelligt i årenes løb, såvel med hensyn til nedgangen i gennemsnitstykkelsen som til variationen omkring gennemsnittet. De hertil svarende variationskurver er anført i figur 1 og 2. Nederst i tabellen findes til sammenligning de sædvanlige resultater, hvor galte og sogrise er behandlet under et.

Sammenlignes gennemsnitstallene, kan man se, at forskellen mellem de to køn har holdt sig meget nær konstant på ca. 0.25 cm i det tidsrum, tabellen omfatter. Med hensyn til spredningen, udtrykt ved standardafvigelsen, er forskellen derimod blevet mindre med årene, men sogrisene er dog stadig betydelig mere ensartede end galtene. Dette kan også iagttages på variationskurverne, figur 1 og 2. Sogrisenes kurver er gennemgående slankere og mere regelmæssige end galtenes, men til gengæld har galtenes forandret sig mest i årenes løb.

Da galte og sogrise har forskellig gennemsnitlig rygspektykkelse, følger det af sig selv, at spredningen og dermed standardafvigelsen bliver større, når resultaterne for begge køn behandles under et, således som det vil fremgå af en sammenligning mellem tabellens nederste afsnit og de to øverste.

Sidespækkets tykkelse viser en tilsvarende nedgang som tykkelsen i ryglinien. Gennemsnittet blev i beretningsåret 2.26 cm mod 2.43 cm i 1961/62.

Tabel 14 viser en sammenligning mellem gennemsnitstykkelsen i ryglinien, det midterste rygmål og sidespækmålet hos grisene på de 4 forsøgsstationer.

Det fremgår af tabellen, at der på alle 3 målesteder er ret nøje overensstemmelse mellem stationerne. Forskellen i sidespækkets tykkelse hos grisene på »Sjælland« og grisene på de 3 andre stationer, der for år tilbage var ret udpræget, er nu på det nærmeste udlignet.

Tallene i tabel 15 viser variationen i spækkets tykkelse i rygliniens midte og sidespækkets tykkelse. Også i dette tilfælde er der foretaget særskilte beregninger for galte og sogrise. De dertil svarende variationskurver er vist i figur 3 og 4.




Fig. 1. Variationskurver for rygspækkets tykkelse hos galte.




Fig. 2. Variationskurver for rygspækkets tykkelse hos sogrise.

Tabel 14. Rygspækkets tykkelse i cm i ryggens midtlinie og 8 cm ude på siden (sidespækmålet).

År	»Sjælland«	»Fyn«	»Jylland«	»Vestjylland«	Gns.
Gns. af alle 3 mål:					
1957/58.....	3.10	3.01	3.04	—	3.05
1958/59.....	3.00	2.95	2.97	—	2.97
1959/60.....	2.91	2.86	2.90	—	2.89
1960/61.....	2.87	2.82	2.87	2.83	2.85
1961/62.....	2.80	2.82	2.81	2.84	2.82
1962/63.....	2.64	2.65	2.68	2.67	2.66
Ryg midte:					
1957/58.....	2.28	2.22	2.19	—	2.23
1958/59.....	2.22	2.16	2.14	—	2.17
1959/60.....	2.13	2.08	2.06	—	2.09
1960/61.....	2.06	2.03	2.06	2.01	2.04
1961/62.....	2.01	2.03	2.02	2.03	2.02
1962/63.....	1.86	1.87	1.89	1.87	1.87
Sidespæk:					
1957/58.....	2.63	2.92	2.71	—	2.75
1958/59.....	2.54	2.82	2.62	—	2.66
1959/60.....	2.46	2.63	2.59	—	2.56
1960/61.....	2.38	2.48	2.47	2.58	2.47
1961/62.....	2.34	2.47	2.43	2.49	2.43
1962/63.....	2.23	2.24	2.30	2.29	2.26

Tabel 15. Rygspækkets (rygliens midte) og sidespækkets gennemsnitstykkelse og variation.

År	Rygspæk*)			Sidespæk*)		
	Tykkelse gns. cm	Variations- bredde cm	Standard- afvigelse ± cm	Tykkelse gns. cm	Variations- bredde cm	Standard- afvigelse ± cm
Galte.						
1958/59....	2.30	1.5-3.5	0.323	2.92	1.7-4.8	0.457
1959/60....	2.22	1.4-3.5	0.300	2.81	1.4-4.4	0.432
1960/61....	2.17	1.3-3.4	0.300	2.71	1.5-4.6	0.432
1961/62....	2.15	1.2-3.3	0.290	2.67	1.5-4.4	0.426
1962/63....	2.00	1.2-3.5	0.290	2.51	1.1-4.2	0.431
Sogrise.						
1958/59....	2.04	1.3-3.3	0.248	2.39	1.4-3.9	0.395
1959/60....	1.96	1.2-3.5	0.236	2.29	1.2-3.8	0.374
1960/61....	1.91	1.0-3.1	0.243	2.21	1.0-3.9	0.360
1961/62....	1.89	0.9-2.9	0.251	2.18	1.0-3.9	0.360
1962/63....	1.75	1.0-2.8	0.251	2.00	1.0-3.5	0.370
Galte + sogrise.						
1958/59....	2.17	1.3-3.5	0.316	2.66	1.4-4.8	0.502
1959/60....	2.09	1.2-3.5	0.299	2.56	1.2-4.4	0.480
1960/61....	2.04	1.0-3.4	0.304	2.46	1.0-4.6	0.470
1961/62....	2.02	0.9-3.3	0.300	2.42	1.0-4.4	0.464
1962/63....	1.87	1.0-3.5	0.298	2.25	1.0-4.2	0.475

*) Se fodnote til tabel 13.





Fig. 3. Variationskurver for spækkets tykkelse i rygliniens midte og 8 cm ude på siden.





Fig. 4. Variationskurver for spækkets tykkelse i rygliniens midte og 8 cm ude på siden.

For sogrisenes vedkommende har der siden 1959/60 været en stigende variation i spækkets tykkelse i rygliniens midte, medens der i samme tidsrum har været en faldende variation hos galtene. Dette forhold kan også iagttages på variationskurverne. Når resultaterne for begge køn slås sammen, tilsløres denne forskel.

Med undtagelse af en mindre stigning i beretningsåret har variationen i sidespækkets tykkelse været aftagende, men den er dog stadig betydelig større end variationen i rygliniens midte. Dette er en naturlig følge af, at sidespækmålet først blev indført i 1957 og derfor kun har været genstand for selektion i 6 år. Når forskellen nu er aftagende, er det sikkert en virkning af selektionen, idet det må erindres, at det er lettere at opnå fremskridt for en egenskab, der kun er drevet udvalgt efter i kort tid end for en, der i mange år har været genstand for selektion.

Figur 5 side 32 og tabel 27 side 48-49 viser de stedfundne ændringer i rygspækkets tykkelse siden 1926/27 og i sidespækkets tykkelse siden 1957/58.

3. Bugens tykkelse.

Indtil 1953/54 blev der ved vurderingen af bugens kvalitet fortrinsvis lagt vægt på selve tykkelsen. Man kan da også konstatere, at den gennemsnitlige bugtykkelse indtil dette år var stigende. Det viste sig imidlertid, at en fortsat forøgelse af gennemsnitstykkelsen meget vanskeligt kunne opnås, uden at der samtidig skete en stigende fedtaflejring i bugen, navnlig i lyskepartiet.

I erkendelse heraf og i overensstemmelse med den rådende tendens på afsætningsmarkederne i retning af mere kød og mindre fedt, ændrede man fra januar 1954 bedømmelsen af bugens kvalitet således, at der i højere grad toges hensyn til bugens kødfylde end til den absolutte tykkelse, og de meget fede bug med fedtansamling i lysken har siden da været vurderet meget lavt.

Der tages dog stadig et vist hensyn til selve tykkelsen. Som forholdene er for øjeblikket på vort vigtigste marked, det britiske baconmarked, må en kødfuld bug på ca. 3.3 cm betragtes som det ideelle. En væsentlig tyndere bug vil give for små skiver, og bliver den væsentlig tykkere, får man for få skiver pr. vægtenhed. Stiger gennemsnitstykkelsen som følge af en øget fedtaflejring, betyder det en afgjort forringelse af kvaliteten.

Siden den ændrede vurdering af bugens kvalitet blev indført i 1954, har der været en svagt faldende tendens i bugens gennemsnitstykkelse fra 3.34 cm i 1953/54 til 3.30 i 1962/63. I de mellemliggende år har der været mindre variationer i op- eller nedadgående retning.

Som følge af, at den optimale gennemsnitstykkelse er ca. 3.3 cm, vil bugens kvalitet i væsentlig grad afhænge af variationen omkring gennemsnittet.

Som det fremgår af tabel 16 er standardafvigelsen faldende, hvilket er udtryk for, at bugen er blevet stadig mere ensartet. I 1962/63 er

Tabel 16. Bugens tykkelse og variation.

År	Antal grise	Bugens tykkelse i cm*) G ± m		Variations- bredde, cm	Standard- afvigelse ± cm
1926-27.....	2016	3.05	0.006	2.0-4.1	0.250
1936-37.....	3029	3.25	0.005	2.1-4.4	0.262
1946-47.....	2230	3.24	0.005	2.4-4.2	0.237
1956-57.....	3526	3.31	0.003	2.6-4.2	0.193
1959-60.....	3801	3.28	0.003	2.6-4.0	0.164
1960-61.....	4618	3.30	0.003	2.5-4.0	0.176
1961-62.....	5078	3.32	0.002	2.2-4.0	0.163
1962/63.....	4995	3.29	0.002	2.7-4.0	0.150

der opnået det hidtil bedste resultat. Fremgangen i karakteren for bugens kvalitet fra 13.0 til 13.1 points skyldes sikkert dette forhold.

Figur 5 side 32 og tabel 27 side 48-49 viser de stedfundne ændringer i bugens tykkelse og kvalitet siden 1926/27.

4. Kroplængden.

For år tilbage benyttedes kroplængden i stor udstrækning som en regulator for andre egenskaber og i særlig grad for rygspækkets tykkelse. Som følge af den negative korrelation mellem de to egenskaber kan rygspækket automatisk gøres tyndere ved en forøgelse af kroplængden. De resultater, der i de senere år er opnået ved direkte udvalg efter tyndt rygspæk, har bevirket, at kroplængden har mistet sin betydning som regulator for denne egenskab. Også andre egenskaber er mindre påvirkelige af ændringer i kroplængden end tidligere, f. eks. spækkets fasthed og sværens finhed, og selv om det fortsat er således, at stigende kroplængde giver mindre skinker, er det lykkedes gennem avlen at modarbejde dette afhængighedsforhold således, at skinkerne er forbedret trods den forøgede længde.

Disse forhold har medført, at der kan opnås en tilfredsstillende slagte kvalitet ved et betydeligt større kroplængdeinterval end tidligere. Det er i virkeligheden således, at slagte kvaliteten praktisk taget ikke påvirkes af en variation i kroplængden fra 93 til 98 cm.

Til trods herfor må der advares mod en fortsat forøgelse af kroplængden. Siden 1951/52 er gennemsnitslængden steget jævnt og støt fra 93.2 til de nuværende 96.2 cm, eller en stigning på nøjagtig 3 cm.

Fortsætter denne udvikling, kan den i det lange løb svække mulighederne for at øge kødarealet i karbonaden, selv om dette kun i ringe grad påvirkes af kroplængden.

Som det fremgår af tabel 17 er der stadig en stor variation i kropslængden. I 1962/63 varierede den fra 89 til 103 cm, og standardafvigelsen var omtrent den samme som året forud. I de senere år er der ikke opnået nogen forøget ensartethed med hensyn til kropslængden.

De forandringer, der er sket i kropslængden siden 1926/27 fremgår af figur 5 side 32 og tabel 27 side 48-49.

*) Se fodnote til tabel 13.




Fig. 5. Kroplængde, tykkelse af rygspek, sidespek og bug hos forsøgsgrise gennem årene 1926/27 til 1962/63.

Tabel 17. Kroplængdens gennemsnit og variation.

År	Antal grise	Kroplængde i cm G $\pm$ m		Variationsbredde cm	Standard- afvigelse $\pm$ cm
1926-27.....	2016	88.88	0.060	79.5- 99.0	2.670
1936-37.....	3029	92.81	0.043	84.0-101.5	2.349
1946-47.....	2230	93.39	0.044	85.5-100.5	2.086
1956-57.....	3526	94.39	0.035	86.0-103.0	2.063
1959-60.....	3801	95.61	0.032	88.0-103.5	1.981
1960-61.....	4618	95.67	0.030	88.5-102.5	2.055
1961-62.....	5078	95.86	0.028	88.0-103.5	2.024
1962-63.....	4995	96.21	0.029	89.0-103.0	2.032

5. Points for skønsmæssigt bedømte egenskaber.

En række egenskaber, der ikke kan bedømmes ved måling eller vejning, bliver skønsmæssigt bedømt ved hjælp af en pointsskala fra 0 til 15. På denne måde bedømmes rydspækkets fasthed, bovens størrelse og bygning, rydspækkets fordeling, bugens tykkelse og kvalitet, skinkernes form og størrelse, finhed af hoved, ben og svær, kødfylde samt bacontype. De i beretningsåret opnåede resultater på de enkelte stationer er anført i tabel 7, side 17. De gennemsnitlige årsresultater fra 1926/27 til 1962/63 er ligesom de øvrige gennemsnitsresultater samlet i tabel 27 side 48-49.

I sammenligning med 1961/62 er der opnået et uforandret pointsantal for spækkets fasthed og finhed, medens der for de øvrige egenskaber har været fremgang.

Fremgangen er størst for kødfylde i hel side, nemlig 0.3 point, hvilket er ret usædvanligt, men skyldes den store nedgang i rydspækketykkelsen. For 3 andre egenskaber, rydspækkets fordeling, skinker og kødfylde overskåret, er der opnået 0.2 point, og for bov og bugens kvalitet 0.1 point mere end året forud. En så generel forbedring vil naturligvis give sig udslag i karakteren for bacontype, der er steget fra 12.9 til 13.1 points.

Tabel 18 viser, hvorledes det forholder sig med variationen i det opnåede pointsantal for bacontype siden 1926/27. Den stigende standardafvigelse fra 1926/27 til 1959/60 skyldes i højere grad en skærpet bedømmelse end en reel forøget uensartethed blandt forsøgsgriserne. Fra 1959/60 er standardafvigelsen faldende, trods en fortsat skærpet bedømmelse. Der er således ingen tvivl om, at bestanden i de senere år er blevet betydeligt mere ensartet med hensyn til bacontype.

Tabel 18. Points for bacontype.

År	Antal grise	Points for type G $\pm$ m		Variations- bredde points	Standard- afvigelse $\pm$ points
1926-27.....	2016	12.17	0.021	6.0-15.0	0.921
1936-37.....	3029	12.53	0.019	5.0-15.0	1.021
1946-47.....	2230	12.58	0.022	7.0-15.0	1.037
1956-57.....	3526	12.75	0.019	5.0-15.0	1.150
1959-60.....	3801	12.90	0.019	6.0-15.0	1.198
1960-61.....	4618	12.86	0.016	6.0-15.0	1.117
1961-62.....	5078	12.85	0.015	7.0-15.0	1.104
1962-63.....	4995	13.06	0.014	6.0-15.0	1.010

6. Særlige forhold vedrørende kødfylden.

For at få yderligere oplysninger om kødfylden i karbonaden og et bedre grundlag for en sammenligning af resultaterne over en længere periode end pointstallene kan give, er den skønsmæssige bedømmelse af kødfylden hos grisene fra de faste svineforsøgsstationer siden 1957/58 foruden sidespækmålet blevet suppleret med opmåling af kød- og spækarealet i karbonadetværsnittet.

a. Fremgangsmåden ved opmåling af karbonadearealet.

Opmålingen, der foretages med planimeter, blev de 2 første år udført på tegninger af den efter overskæring ved bageste ribben fremkomne snitflade. Da det viste sig, at tegningen var for usikker og gennemgående gav for høje tal, gik man i 1959 over til fotografering, og opmålingen er herefter blevet udført på fotografier af snitfladen, efter den i figur 6 viste fremgangsmåde.




Fig. 6. Fremgangsmåden ved opmåling af karbonadens kød- og spækareal.

Fra grænsen mellem kød og spæk i ryggens midtlinie, punkt A, trækkes en ret linie (1) gennem det punkt, hvor den lange rygmuskel bøjer af fra den indre side af bugvæggen, punkt B. Fra punkt C, der ligger 10 cm fra A, trækkes en ny linie (2) vinkelret på den første ud til sværen. Området til venstre for denne linie indgår i opmålingen. Først måles tværsnittets totalareal, dernæst det samlede kødareal og den lange rygmuskel særskilt. Spækarealet fremkommer da som differensen mellem det totale tværsnitsareal og det totale kødareal.

Sidespækmålet angiver spæklagets tykkelse 8 cm fra sværens rand i ryggens midtlinie.

b. Resultaterne af opmålingen.

Resultaterne af opmålingen sammenlignet med sidespækkets tykkelse og points for kødfylde, overskåret er anført i tabel 19.

Resultaterne fra de 2 første år, da opmålingen skete på aftegninger, er af forannævnte grunde udeladt.

Tabel 19. Kødfylden i karbonaden hos grisene på de 4 forsøgsstationer.

	Kødareal, cm ²		Spækareal cm ²	Spækareal i % af kødareal	Sidespæk- mål, cm	Points for kødfylde overskåret
	lange ryg- muskel	total				
»Sjælland«	27.7	33.8	31.1	92	2.23	13.2
»Fyn«	27.8	34.4	30.4	88	2.24	13.2
»Jylland«	28.0	34.3	31.2	91	2.30	13.2
»Vestjylland«	27.8	34.3	31.2	91	2.29	13.1
Gns. 1962/63.....	27.8	34.2	31.0	91	2.26	13.2
» 1961/62.....	28.1	34.7	33.0	95	2.43	13.0
» 1960/61.....	28.5	34.9	33.9	97	2.47	13.2
» 1959/60.....	27.9	34.2	33.5	98	2.56	13.1

Grisene på »Sjælland« havde i de første år, opmålingen blev udført, et betydeligt mindre spækareal end grisene på de 3 andre stationer og fik derfor ved meget nær det samme kødareal et højere pointsantal for kødfylde overskåret. Denne forskel udlignedes efterhånden, og i 1962/63 er stillingen ændret således, at grisene på »Fyn«, der oprindeligt havde det største spækareal af alle stationerne, nu har overtaget »Sjælland«s tidligere position som stationen med det mindste spækareal. Da grisene på »Fyn« tillige har det største kødareal, bliver forholdet mellem kød og spæk, udtrykt ved spækareal i pct. af kødareal, gunstigere for »Fyn« end for de andre stationer. Dette burde også have givet sig udtryk i et højere pointtal for kødfylde, men dette har ikke været tilfældet. En del af forklaringen må søges i, at pointsniveauet har ligget så højt, at der på grund af den ikke ubetydelige spredning er sket en ophobning ved 15 points, som har forhindret, at den fulde forskel kom til udtryk. Da »Fyn« har haft den største og »Sjælland« den mindste ophobning, blev det gennemsnitlige pointtal for lavt for »Fyn« i forhold til de andre stationer og navnlig i forhold til »Sjælland«. Dette forhold understreger nødvendigheden af med visse mellemrum at skærpe bedømmelsen inden ophobningen bliver for stor. (Se næste afsnit side 36).

I sammenligning med 1961/62 har der foruden en væsentlig nedgang i spækarealet også været en nedgang i kødarealet. Nedgangen er størst på »Sjælland«, nemlig fra 34.9 til 33.8 cm², eller 1.1 cm², og mindst på »Fyn« med kun 0.1 cm². På »Jylland« og »Vestjylland« var nedgangen henholdsvis 0.4 og 0.3 cm². En væsentlig del af nedgangen hos grisene på »Sjælland« skyldes et mindre areal af bimusklerne (m. multifidus dorsi), som beskadiges en del ved tilskæring. Selv meget små forskelle ved tilskæringen kan forringe sammenligningsgrundlaget.

Sammenligner man derimod arealet af den lange rygmuskel, der

ikke berøres ved tilskæringen, er der meget ringe forskel på stationerne, og nedgangen, sammenlignet med sidste år, er betydelig mindre end for det totale kødareal.

Siden 1959/60, altså i løbet af 3 år, er spækarealet formindsket med 2.5 cm², medens der i samme tidsrum ikke er sket nogen forøgelse af kødarealet. Det kunne således se ud til, at udvalg af avlsdyr på grundlag af points for kødfylde, overskåret og sidespækmålet er velegnet til formindskelse af spækarealet, men ikke til forøgelse af kødarealet. Dette forhold ligger til grund for de ændringer i vurderingen af kødfylden, som er omtalt i det følgende afsnit.

Galtene er betydeligt federe og har en tilsvarende dårligere kødfylde end sogrisene. Denne forskel er særlig fremtrædende i karbonadetværsnittet, således som det fremgår af tabel 20.

Tabel 20. Kødfylden i karbonaden hos galte og sogrise.

	Galte		Sogrise		Galte ÷ sogrise	
	1962/63	1961/62	1962/63	1961/62	1962/63	1961/62
Totalt kødareal, cm ²	32.8	33.4	35.5	36.0	÷2.7	÷2.6
Lange rygm., cm ²	26.6	27.0	29.0	29.3	÷2.4	÷2.3
Spækareal, cm ²	33.7	35.8	28.2	30.4	÷5.5	+5.4
Spækareal i pct. af kødareal	103	107	79	84	+24	+23
Rygspæk, tykk. gns. cm..	2.78	2.93	2.52	2.68	+0.26	+0.25
Rygmidte, cm	2.00	2.15	1.75	1.89	+0.25	+0.26
Sidespæk, cm	2.51	2.67	2.00	2.18	+0.51	+0.49
Points for kødfylde, hel	12.74	12.49	13.74	13.46	÷1.00	÷0.97
do. overskåret	12.50	12.28	13.85	13.67	÷1.35	÷1.39

c. Ændringen i vurderingen af karbonadens kødfylde.

Udvalget af avlsdyr efter karbonadens kødfylde har hidtil været foretaget udelukkende på grundlag af pointstallene og sidespækkets tykkelse. Man havde håbet, at denne fremgangsmåde skulle være tilstrækkelig såvel til formindskelse af spækarealet som til forøgelse af kødarealet. Resultaterne (tabel 19 side 35) tyder imidlertid på, at dette ikke er tilfældet. Der er opnået en ret anselig nedgang i spækarealet, men kødarealet er nøjagtig det samme som for 3 år siden. Det er ret naturligt, at selektionen på det hidtidige grundlag har været mere virksom for spækkets end for kødets vedkommende. Dels er spækarealet i højere grad end kødarealet arveligt betinget, dels har man ved den skønsmæssige bedømmelse, navnlig i de første år, lagt betydelig mere vægt på spækarealet end på kødarealet, og endelig har avlerne tillige haft sidespækmålet som støtte for udvalg.

Et opskæringsforsøg omfattende 320 grise fra de faste svineforsøgsstationer og senere suppleret med yderligere 100 grise viste, at points for kødfylde overskåret er det sikreste enkeltudtryk for kødprocenten i hele siden. På grundlag heraf forekommer det ejendommeligt, at det ikke skulle være muligt at forøge kødarealet ved selektion på grundlag af pointstallene.

Forsøgsledelsen har imidlertid taget til efterretning, at kødarealet

ikke er øget, og med gyldighed fra 1. september 1963 ændret vurderingen af karbonadens kødfylde i overensstemmelse hermed.

For det første er der sket en omlægning og skærpelse af pointsbedømmelsen, og for det andet får centerejerne nu oplysning om arealet af den lange rygmuskel, således at de får mulighed for at foretage udvalg direkte herefter.

Når man har valgt arealet af den lange rygmuskel i stedet for det totale kødareal, skyldes det, som før omtalt, at bimusklerne beskades mere eller mindre ved tilskæringen, medens den lange rygmuskel ikke berøres heraf og derfor er mere sikker som grundlag for selektion.

Den skønsmæssige bedømmelse skal ligesom tidligere fortrinsvis give udtryk for forholdet mellem kød og spæk. Der skal også fortsat lægges vægt på den lange rygmuskels form, spæklagets fordeling og udviklingen af bugmuskulaturen, specielt den del, der ligger nærmest ved rygmusklen. Samtidig bliver der lagt større vægt på kødarealet, således at karbonadetværsnit, der er tilfredsstillende med hensyn til forholdet mellem kød og spæk, men med for lille rygmuskel, får nedslag i pointstallet. Grænsen for et sådant nedslag er et areal af den lange rygmuskel på ca. 28 cm², hvilket er racens nuværende gennemsnit. Det kan derfor hændes, at pointstallet må korrigeres et halvt point ned, når opmålingsresultatet foreligger. På den anden side vil et stort muskelareal ikke blive præmieret, såfremt spækarealet samtidig er for stort. Udover det her nævnte sker der en generel stramning på ca. 0.2 point. Gennemsnittet, der i 1962/63 var 13.2 points, skulle således med uforandret kødfylde falde til 13.0 points i 1963/64. Denne generelle skærpelse vil fortrinsvis ramme de dårligste grise.

Ved at skærpe bedømmelsen, som her beskrevet, skulle denne have fået et for tiden naturligt leje baseret på, at 13.0 points skal være udtryk for en god kvalitet og på at undgå en sådan ophobning ved 15 points, som på grund af fremgangen og den ret store variation i kødfylden fandt sted i 1962/63.

Ved vurdering af arealet af den lange rygmuskel som grundlag for udvalg må racens gennemsnit være udgangspunktet. Da det er ønskeligt at øge muskelarealet, må man tilstræbe et areal, der er over gennemsnittet. Her må erindres, at forskellen på galte og sogrise er ca. 2 cm², idet gennemsnittet for de 2 køn er henholdsvis ca. 27 og 29 cm².

Da pointstallene, som allerede nævnt, først og fremmest udtrykker forholdet mellem kød og spæk, og da spækarealet ved samme kødareal kan variere meget, er det indlysende, at der aldrig kan blive fuld overensstemmelse mellem muskelareal og points. Hvis dette var tilfældet, var det unødvendigt at benytte begge dele.

Til nærmere orientering om forholdet mellem arealer og points tjener tabel 21 og fig. 7. Materialet, der er benyttet til udarbejdelsen af tabellen, kan selvsagt ikke være fra forsøgsåret 1962/63, da den ændrede vurdering af kødfylden først skete efter 1. september 1963. Opgørelsen omfatter ca. 200 grise fra hver forsøgsstation, eller ialt ca. 800 grise slagtet i tiden fra 15. oktober til 31. december 1963. Perioden 1. september til 15. oktober må betragtes som en overgangs-

Tabel 21. Areal af lange rygmuskel, spækareal og sidespækmål sammenlignet med points for kødfylde overskåret.

Areal af lange ryg- muskel, cm ²	Spækareal fra - til cm ²	Galte		points for kødf. oversk.	Sogrise		points for kødf. oversk.
		antal	sidespæk- mål cm		antal	sidespæk- mål cm	
under 24.0	23.1-27.0	3	2.03	12.5	1	2.10	13.0
	27.1-31.0	9	2.36	12.4	-	-	-
	31.1-35.0	13	2.51	11.7	1	2.50	12.0
	35.1-39.0	26	2.80	11.2	-	-	-
	39.1-43.0	7	3.39	9.4	-	-	-
	over 43.0	6	3.67	7.5	-	-	-
Ialt og gns.		64	2.79	11.0	2	2.30	12.5
24.0-25.9	under 23.1	-	-	-	3	1.63	13.7
	23.1-27.0	5	2.10	12.6	2	1.75	13.8
	27.1-31.0	19	2.24	12.7	13	2.12	13.0
	31.1-35.0	30	2.53	12.1	15	2.27	12.6
	35.1-39.0	24	2.75	11.5	2	2.60	11.5
	39.1-43.0	10	3.07	10.2	-	-	-
	over 43.0	2	3.40	9.0	-	-	-
Ialt og gns.		90	2.58	11.8	35	2.15	12.9
26.0-27.9	under 23.1	2	1.80	13.5	5	1.46	14.3
	23.1-27.0	8	1.95	13.4	24	1.81	13.7
	27.1-31.0	28	2.17	12.9	27	2.14	13.2
	31.1-35.0	48	2.41	12.4	17	2.37	12.7
	35.1-39.0	31	2.70	11.9	4	2.58	12.1
	39.1-43.0	11	3.01	11.0	1	2.70	12.0
	over 43.0	2	3.25	10.0	-	-	-
Ialt og gns.		130	2.46	12.3	78	2.07	13.2
28.0-29.9	under 23.1	1	1.40	14.5	11	1.57	14.5
	23.1-27.0	9	1.91	13.6	28	1.82	13.8
	27.1-31.0	25	2.17	13.2	51	2.09	13.4
	31.1-35.0	22	2.40	12.6	19	2.32	13.0
	35.1-39.0	16	2.73	11.8	3	2.73	12.2
	39.1-43.0	6	2.97	11.2	1	2.60	12.5
	over 43.0	1	3.50	8.0	-	-	-
Ialt og gns.		80	2.39	12.6	113	2.03	13.5
30.0-31.9	under 23.1	2	1.65	14.5	20	1.54	14.7
	23.1-27.0	11	1.91	13.9	38	1.84	14.0
	27.1-31.0	9	2.29	13.0	29	2.06	13.6
	31.1-35.0	16	2.44	12.6	13	2.35	13.2
	35.1-39.0	8	2.76	11.9	3	2.70	12.5
	39.1-43.0	1	3.00	11.5	-	-	-
Ialt og gns.		47	2.32	12.9	103	1.93	13.9
32.0 og derover	under 23.1	-	-	-	24	1.52	14.8
	23.1-27.0	3	1.80	14.7	49	1.85	14.3
	27.1-31.0	7	2.09	13.4	14	2.09	13.8
	31.1-35.0	3	2.67	12.5	3	2.33	13.5
	35.1-39.0	1	3.00	12.0	1	2.30	13.0
Ialt og gns.		14	2.21	13.4	91	1.82	14.3

periode, i hvilken omstillingen af bedømmelsen fandt sted. Tabellen svarer derfor heller ikke til den, der er benyttet ved avlscentermøderne i efteråret 1963.

Ved samme muskelareal varierer spækarealet meget nær 100 pct., noget mere for galte end for sogrise. Variationen i spækarealet er meget lidt påvirket af muskelarealets størrelse og først når dette overstiger 30 cm² aftager variationen i spækarealet.

Det fremgår iøvrigt af tabellen, hvorledes pointstallene varierer i forhold til såvel muskel- som spækareal. Ved samme muskelareal må man regne med, at kødfyldekarakteren kan variere med 4 points, alt efter spækarealets størrelse.

I gruppen med et areal af den lange rygmuskel under 24 cm² har galtene gennemsnitlig opnået 11.0 points og sogrisene 12.5 points for kødfylde, overskåret. Karakteren stiger med stigende muskelareal, og i gruppen med mere end 32 cm² har de opnåede karakterer været 13.4 og 14.3 points for henholdsvis galte og sogrise.

Ved samme muskelareal har sogrisene mindre spækareal end galtene. Bortset fra gruppen med mindre end 25 cm² rygmuskelareal, hvor der kun er 2 sogrise, har galtene i alle grupper 0.4 cm tykkere sidespæk end sogrisene. Den dertil svarende forskel i pointstallene er 0.9—1.0.

Ved såvel samme spækareal som muskelareal har sogrisene opnået ca. 0.3 points mere end galtene, hvilket antagelig skyldes rygmuskulens form og bugmuskulaturens udvikling.

Fotografierne i figur 7 er udvalgt af det samme materiale, som ligger til grund for tabel 21.

Billede nr. 1 og 2 viser yderpunkterne, den bedste og den dårligste kødfylde og giver et tydeligt indtryk af den meget store variation.


De øvrige 4 billeder skal sammenlignes 2 og 2 såvel vandret (3 med 4 og 5 med 6) som lodret (3 med 5 og 4 med 6). Billederne nr. 3 og 4 viser 2 karbonader, som begge har fået 13.5 points for kødfylde trods en forskel i muskelareal på ca. 6 cm². Når nr. 4 har fået det samme pointstal som nr. 3, skyldes det et mindre spækareal og dermed et bedre forhold mellem kød og spæk. Dette berettiger i virkeligheden til 14.0 points, men på grund af den for lille rygmuskel opnås kun 13.5 points. Noget tilsvarende gør sig gældende ved sammenligning mellem 5 og 6, men her er blot tale om karbonader med et betydeligt større spækareal. Nr. 3 og 5 har samme muskelareal, og forskellen i pointstallet skyldes et forskelligt spækareal. Et tilsvarende forhold gør sig gældende ved sammenligning af 4 og 6. De 6 billeder illustrerer således resultaterne i tabel 21 og viser, at samme pointtal kan opnås ved vidt forskelligt muskelareal, og at samme muskelareal kan give et stærkt afvigende pointtal for kødfylde som følge af variationen i spækarealet.

7. Klassificering efter fedme.

Som et led i bedømmelsen af slagte kvaliteten er forsøgsgrisene siden 1924 blevet klassificeret efter rygspækkets tykkelse. Denne

Points f. kødf. oversk. 15.0
 Lange rygmuskel, cm² 37.0
 Spækareal, cm² 22.5
 Sidespækmål, cm 1.6

1



Points f. kødf. oversk. 13.5
 Lange rygmuskel, cm² 31.9
 Spækareal, cm² 27.1
 Sidespækmål, cm 2.0

3



Points f. kødf. oversk. 12.0
 Lange rygmuskel, cm² 32.8
 Spækareal, cm² 38.5
 Sidespækmål, cm 3.0

5






Fig. 7. Sammenhængen mellem karbonadens kød-




Points f. kødf. oversk. 5.0
 Lange rygmuskel, cm² 19.1
 Spækareal, cm² 48.2
 Sidespækmål, cm 3.9

2



Points f. kødf. oversk. 13.5
 Lange rygmuskel, cm² 26.2
 Spækareal, cm² 21.7
 Sidespækmål, cm 1.5

4



Points f. kødf. oversk. 11.5
 Lange rygmuskel, cm² 26.2
 Spækareal, cm² 34.0
 Sidespækmål, cm 2.8

6

og spækareal og points for kødfylde, overskåret,

klassificering har altid været og er stadig uafhængig af den, der udføres på slagterierne under Baconkontrollens tilsyn, og som ligger til grund for grisenes afregning. Selv om man i princippet har fulgt de samme regler, har forsøgsvirksomhedens og slagteriernes klassificering dog på enkelte punkter afvejet fra hinanden, således at resultaterne ikke direkte har kunnet sammenlignes.

I 1935 var den gennemsnitlige rygspæktykkelse hos grisene fra de faste forsøgsstationer faldet så meget, at en del af grisene havde tyndere rygspæk end ønskeligt efter datidens krav. Forsøgsledelsen foretog da en deling af 1. klasse, hvorefter grise, hvis spæklag på ryggens midte var mindre end 2.0 cm uden hensyn til tykkelsen over hov og lænd, blev betegnet som »for tynde«, medens de øvrige grise i 1. klasse betegnes som »letfede«.

Klassen »for tynde« var ikke nogen direkte parallel til slagteriernes 1 L sortering, som omfattede svin, der målte mindre end 2.6 cm på ryggens midte og samtidig havde blødt og svampet spæk.

For de øvrige måls vedkommende fulgte forsøgsvirksomheden derimod slagterierne, når disse med mellemrum skærpede kravene i takt med udviklingen.

Den stærkt stigende efterspørgsel efter tynde og kødfulde svin i løbet af 1950'erne medførte imidlertid, at betegnelsen »for tynde« efterhånden blev temmelig misvisende. Stærkt medvirkende hertil var også den omstændighed, at spækkets fasthed og sværens finhed gennem avlsarbejdet var forbedret så meget, at grisene kunne tåle at blive væsentlig tyndere end tidligere, uden at spækket samtidig blev blødt og sværen grov.

Som følge af disse forhold besluttede man i 1954 at ændre betegnelsen »for tynde« til »tynde«. Kravene til selve tykkelsen forblev derimod uændrede, mindre end 2 cm midt på ryggen, idet man nødigt ville give afkald på muligheden for at sammenligne resultaterne fra det ene år til det andet.

Det viste sig dog, at denne løsning ikke var holdbar i det lange løb. De fortsat stigende krav til kødfylden bevirkede, at stadig flere af de »tynde« grise ikke længere var tynde nok, navnlig fordi der ikke blev taget hensyn til spækkets tykkelse over nakke og lænd. Forsøgsledelsen besluttede derfor i 1961 at gå over til den af slagterierne i 1957 indførte deling af 1. klasse i en A1 og A sortering.

Herefter har der været overensstemmelse mellem forsøgsvirksomhedens og slagteriernes klassificering med hensyn til den tilladte spæktykkelse på de traditionelle målesteder. Denne er for de enkelte sorteringer i øjeblikket følgende:

Højest tilladte mål i cm.

Klasse (sortering)	Ryggens midtlinie			sidespæk
	nakke	midte	lænd	
A1	4.0	2.0	2.0	2.8
A	4.7	2.9	2.7	3.1
B	5.2	3.4	3.2	3.7
C	mere end B			

Målet på rygliniens midte skal ikke alene holde på det punkt, der ligger midt imellem målestederne over nakke og lænd, men tillige på et stykke, der strækker sig 7 cm på hver side af dette punkt. Grise, hvis sidespækmål ikke svarer til de stillede krav, betegnes som kødfattige og må ikke eksporteres. Dette gælder dog ikke for A1-grise, der overføres til klasse A, såfremt sidespækkets tykkelse ikke overstiger målet for A-klassen.

I sammenligning med 1961/62 er der ikke sket nogen ændring for målene i ryggens midtlinie, men kravet til sidespækmålet er skærpet med 0.2 cm for alle klasser.

Selv om målegrænserne nu er de samme ved forsøgsvirksomhedens og slagteriernes klassificering, bliver resultaterne dog ikke helt overensstemmende for A1 og A sortering. Dette skyldes, at slagterierne ikke klassificerer blåstemplede, beskadigede og andre ikke saltningsegnede svin som A1, selv om de opfylder de stillede krav til rygspæktykkelsen. Dette gælder også for 1L svinene.

Da forsøgsresultaterne og herunder også resultaterne for klassificeringen skal benyttes som grundlag for udvalg af avlsdyr, og da de nævnte kvalitetsfejl, bortset fra det bløde og svampede spæk hos 1L svinene, ikke har nogen forbindelse med grisenes arvelige anlæg for rygspæktykkelse, lades de ude af betragtning ved den af forsøgsvirksomheden foretagne klassificering, der således udelukkende er baseret på rygspæktykkelsen. Når 1L svinene af forsøgsvirksomheden altid klassificeres som AL, dersom de opfylder kravet til spæktykkelsen, skyldes det, at man ved den skønsmæssige bedømmelse har mulighed for at oplyse avlerne om, at vel har selve spæktykkelsen været tilfredsstillende, men kvaliteten alligevel mangelfuld, hvilket vil fremgå af en lav karakter for spækkets fasthed og evt. også for sværens finhed.

De her nævnte forhold bevirker, at den ved forsøgene gennemførte klassificering giver flere A1 svin end den slagterimæssige, og en direkte sammenligning af resultaterne er derfor ikke mulig.

I tabel 22 er anført resultaterne for klassificeringen af grisene på de 4 forsøgsstationer i 1962/63, samt gennemsnitsresultaterne for de sidste 5 år.

Tabel 22. Forsøgsgrisenes klassificering.

	pct. grise i klasse				pct. kødfattige
	I		II	III	
	A1	A	B	C	
»Sjælland«	40	57	3	0.2	1.9
»Fyn«	41	55	4	0.1	1.9
»Jylland«	40	57	3	0.2	2.8
»Vestjylland«	41	55	4	0.1	2.4
Gns. 1962/63	41	56	3	0.1	2.2
» 1961/62	21	72	7	0.3	1.3
» 1960/61	38	56	6	0.4	1.9
» 1959/60	30	63	7	0.3	2.8
» 1958/59	22	66	11	1.0	3.8

De meget ensartede resultater for de 4 stationer er i overensstemmelse med ensartetheden i rygspæktykkelsen. Overgangen fra klassen »tynde« i 1960/61 til A1 i 1961/62 ses tydeligt, og iøvrigt er det bemærkelsesværdigt, at en nedgang i rygspæktykkelsen fra 2.82 til 2.66 har medført meget nær en fordobling af antal A1 svin. Det skyldes, at rygspæktykkelsen hos et meget stort antal af forsøgsgrisene ligger så nær grænsen mellem A1 og A, at en forskydning af gennemsnittet på blot 1 mm kan give et stort udslag i klassificeringen.

Trods nedgangen i sidespækkets tykkelse hos forsøgsgrisene er antallet af kødfattige svin steget fra 1.3 til 2.2 pct., hvilket som tidligere omtalt skyldes, at den højest tilladte tykkelse er nedsat 0.2 cm for alle klasser. For de øvrige mål er der ingen ændringer i årets løb, og resultaterne for de 2 sidste år kan derfor direkte sammenlignes. Vil man derimod danne sig et begreb om udviklingen over en længere årrække, er resultaterne i tabel 22 uegnede, som følge af de stadig strengere sorteringsregler. Hvis man imidlertid anvender de nugældende regler på materialet fra tidligere år, får man et mere rigtigt billede af den fremgang, der er sket i forsøgsgrisenes klassificering. Resultaterne af en sådan beregning omfattende perioden 1926/27–1962/63 er anført i tabel 23.

Tabel 23. Forsøgsgrisenes klassificering efter nugældende regler fra 1926/27 til 1962/63.

	A1	A	B	C
1926/27.....	—	2	18	80
1936/37.....	—	27	50	23
1946/47.....	1	41	47	11
1952/53.....	—	32	52	16
1954/55.....	1	51	40	8
1956/57.....	3	66	27	4
1958/59.....	16	67	16	1
1960/61.....	18	73	9	(0.4)
1961/62.....	21	72	7	(0.3)
1962/63.....	41	56	3	(0.1)

Dersom forsøgsgrisene i 1926/27 var blevet klassificeret efter de nugældende regler, ville resultatet være blevet 2 pct. i klasse A1 og A, 18 pct. i B og 80 pct. i C. Nu er forholdet meget nær omvendt med 97 pct. i klasserne A1 og A og kun godt 3 pct. i klasse B og C. Såfremt der ikke sker en yderligere skærpelse af klassificeringsreglerne, vil det ikke vare mange år, før forsøgsmaterialet vil samle sig i A1 og A sortering med ca. 50 pct. i hver, medens B og C sortering efterhånden vil forsvinde.

8. Kødfarve.

Med hensyn til baggrunden for inddragelse af kødfarven i bedømmelsen af forsøgsgrisenes slagtekvælitet, og hvorledes det unormalt lyse kød opstår, henvises til tidligere års beretninger.

Kødfarven bedømmes efter følgende skala:

Points	Kødets udseende
0.5	helt affarvet, som kogt kød, væskedrivende, grov og trevlet struktur.
1.0	næsten helt affarvet, væskedrivende, grov struktur.
1.5	ret stærkt affarvet, væskedrivende, noget grov struktur.
2.0	lidt lysere end ønskeligt, ingen væsentlig strukturændring.
2.5-3.0	frisk rødt, ideel farve, strukturen normal.
3.5-4.0	noget mørkere.
4.5-5.0	meget mørkt.

Det vil af skalaen fremgå, at ikke alene selve farven, men i høj grad også strukturen, spiller en rolle ved pointsansættelsen.

Som et supplement til farvebedømmelsen er der i tiden fra 1958 til 1963 foretaget en måling af reaktionstallet (pH) i den lange rygmuskel ca. 45 minutter efter stikning. Målingen foretages på det sted, hvor grisen skæres over dagen efter slagtning. Resultaterne af farvebedømmelsen og pH-målingen i det nævnte tidsrum fremgår af tabel 24.

Tabel 24. Points for kødfarve og kødets pH i årenes løb.

	Kødfarve				pH	
	»Sjælland«	»Fyn«	»Jylland«	»Vestjylland«	Gns.	Gns.
1958/59.....	2.37	2.29	2.40	—	2.55	6.04
1959/60.....	2.33	2.19	2.28	—	2.26	6.00
1960/61.....	2.37	2.20	2.32	2.15	2.27	5.98
1961/62.....	2.34	2.36	2.35	2.29	2.34	6.06
1962/63.....	2.28	2.30	2.30	2.22	2.28	6.00

I 3 på hinanden følgende år 1955/56–1957/58 opnåedes det samme pointsantal for kødfarve, nemlig 2.38, hvorefter der fulgte en nedgang til 2.26 points i 1959/60. I det følgende år var stillingen nærmest uforandret, men i 1961/62 skete der en meget væsentlig forbedring fra 2.27 til 2.34 points. Fremgangen var dog ikke holdbar, idet farvekarakteren faldt til 2.28 points i 1962/63.

Da pH-tallene fra år til år ret nøje har fulgt pointstallenes bevægelser og således udtrykker meget nær det samme, er målingen af pH indstillet fra 1. september 1963.

Variationen i kødfarve fremgår af tabel 25.

De periodiske svingninger i gennemsnitsresultaterne afspejler sig også i variationen omkring gennemsnittet. En sammenligning af de 2 sidste års resultater viser, at et fald i den gennemsnitlige karakter for kødfarve fra 2.34 til 2.28 har bevirket, at antallet af grise med tilfredsstillende farve (2.5 points og derover) er faldet fra 66 til 62 pct., og antallet med utilfredsstillende farve (1.5 points og derunder, muskeldegenereret kød) er steget fra 15 til 18 pct., hvorimod antallet i overgangsgruppen med 2.0 points for farve kun er steget fra 19 til 20 pct. Noget tilsvarende gør sig gældende ved sammenligning med tidligere års resultater. Det vil sige, at en ændring

Tabel 25. Variationen i points for kødfarve.

	1962/63 pct.	1961/62 pct.	1960/61 pct.	1959/60 pct.	1958/59 pct.	1955/56- 1957/58 pct.
0.5.....	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.1
1.0.....	3.3	2.5	3.9	4.6	2.2	2.3
1.5.....	14.9	12.4	15.9	16.1	13.1	8.8
2.0.....	19.4	19.1	22.4	21.6	24.3	25.3
2.5.....	49.9	49.8	41.8	39.3	37.7	41.8
3.0.....	11.7	14.6	13.9	16.0	19.3	18.9
3.5.....	0.5	1.2	1.5	1.9	3.0	2.5
4.0.....	0.1	0.1	0.3	0.03	0.2	0.3
gns.....	2.28	2.34	2.27	2.26	2.35	2.38
Tilfredsst. kødfarve	62	66	58	57	60	64
Lidt for lyst kød ..	20	19	22	22	24	24
Afjort for lyst kød	18	15	20	21	16	12

af gennemsnittet i op- eller nedadgående retning ikke påvirker antallet i overgangsgruppen nævneværdigt, men kommer til udtryk i de 2 ydergrupper med henholdsvis tilfredsstillende og utilfredsstillende kødfarve. Der synes iøvrigt at være en tendens til, at antallet i overgangsgruppen ved samme gennemsnitlige farvekarakter er aftagende i årenes løb. Dette fremgår af en sammenligning af resultaterne fra 1958/59 og 1961/62, da gennemsnitskarakteren var meget nær den samme.

Forhold, som har indflydelse på kødfarven.

Der er i årenes løb gennemført adskillige forsøg til belysning af, hvilken indflydelse forskellige ydre kår, transportforholdene, slagteprocessens varighed m. v. har på kødfarven hos de slagtede forsøgsgrise. Disse forsøg, der for størstedelen er gennemført i samarbejde med *Slakteriernes Forskningsinstitut*, er omtalt i tidligere års beretninger (317., 327., 331. og 336. beretning fra forsøgslaboratoriet), og resultaterne skal derfor kun kort resumeres.

1. Forsøg med en af forskningsinstituttet konstrueret grime, der påsættes grisene før læsning, og som ved at hindre slagsmål og aflede grisenes opmærksomhed fra omgivelserne, forbedrede den gennemsnitlige kødfarve noget og delvis udlignede forskellen mellem stationerne. Siden 1. september 1960 er denne grime anvendt på samtlige forsøgsgrise fra de faste svineforsøgsstationer.

2. Forsøg med halvsøskendehold afprøvet på stationerne »Sjælland« og »Fyn« viste, at der i en vis periode var sikker forskel på de 2 stationer med hensyn til grisenes kødfarve.

3. Forsøg med stikning af grisene i stien på forsøgsstationen sammenlignet med stikning på slagteriet. Forsøget, der blev udført med et lige stort antal kuldsøskende på hvert hold, viste, at transportbelastningen forringede kødfarven, men ikke i så høj grad, som ventet.

4. Et forsøg, gennemført på *Hillerød Andelsslagteri* med grise fra *Statens Forsøgsgårde*, gik ud på at undersøge, hvilken indflydelse tidsintervallet fra stikning til organudtagning har på kødets farve og pH. Det viste sig, at en forlængelse af dette tidsinterval fra 24 til 50 minutter resulterede i en nedgang i karakteren for kødfarve fra 2.22 til 1.77 points og en nedgang i pH fra 6.02 til 5.73.

Resultaterne af det sidst nævnte forsøg gav anledning til, at der i forsøgsåret 1962/63 blev gennemført en undersøgelse over de ugentlige variationer i slagteprocessens varighed på de 4 slagterier, der slagter forsøgsgrisene fra de faste svineforsøgsstationer, og hvorledes sådanne variationer, navnlig i tiden fra stikning til organudtagning, påvirker grisenes kødfarve. Resultaterne af denne undersøgelse fremgår af tabel 26.

Tabel 26. Points for kødfarve ved varierende tidsinterval fra stikning til organudtagning.

	Gns. min.	20 min. eller derunder		21-25 min.		26-30 min.		over 30 min.	
		antal grise	points f. kødf.	antal grise	points f. kødf.	antal grise	points f. kødf.	antal grise	points f. kødf.
September 1962-marts 1963.									
Roskilde	26	—	—	294	2.36	241	2.32	118	2.23
Odense	25	21	2.29	398	2.39	270	2.41	—	—
Randers	22	265	2.36	275	2.33	59	2.27	—	—
Ansager	22	234	2.21	339	2.19	24	2.25	26	2.17
Sum og gns. .		520	(2.29)	1306	2.32	594	2.31	144	(2.20)
April-august 1963.									
Roskilde	25	29	2.33	230	2.20	89	2.21	40	2.06
Odense	26	—	—	196	2.15	26	2.17	61	2.09
Randers	23	14	2.29	244	2.26	47	2.29	—	—
Ansager	23	63	2.33	232	2.18	33	2.05	—	—
Sum og gns. .		106	(2.32)	902	2.20	195	2.18	101	(2.08)

Når man tager i betragtning, at slagteprocessen på de danske slagterier er så ens, at den kan betegnes som standardiseret, forekommer de observerede variationer temmelig store. Det vil dog næppe være muligt at opnå væsentlig større ensartethed. Når alt går normalt, vil tiden fra stikning til organudtagning ikke overstige 30 minutter. Når dette er sket i enkelte tilfælde, skyldes det særlige forhold, maskinskade e. l.

Det fremgår af tabellen, at der i tiden fra september til marts først er sket en forringelse af kødfarven, når det nævnte tidsinterval oversteg 30 minutter. I sommermånederne er der derimod sket en forringelse af kødfarven, når der er hengået mere end 20 minutter fra stikning til organudtagning. Der er ingen tvivl om, at det varme vejr har været medvirkende hertil. En beregning, udført på materialet fra de 3 sommer måneder 1963, viste en negativ korrelation på 0.5 mellem den ydre temperatur ved forsøgsstationen på

Tabel 27. Frem- eller tilbagegang

År 1/8—31/8	Antal dyr	Daglig tilvækst, g 20—90 kg	F. e. pr. kg tilvækst	Pct. slagtesvind	Pct. eksport- flæsk	Tykkelse i cm af			Kroplængde, cm	fasthed	bov	rygspekets fordeling
						rygspek	sidespek	bug				
1926-27	2160	623	3.44	27.2	59.5	4.05	-	3.06	88.9	12.7	12.2	-
1927-28	2476	643	3.38	27.3	59.8	4.02	-	3.08	89.1	12.7	12.3	-
1928-29	2332	667	3.34	26.7	60.0	4.00	-	3.14	89.2	12.6	12.2	-
1929-30	2064	634	3.39	27.0	59.7	3.94	-	3.14	89.4	12.6	12.2	12.6
1930-31	2632	639	3.37	27.2	59.8	3.83	-	3.17	89.9	12.8	12.4	12.7
1931-32	3048	639	3.35	27.0	60.4	3.66	-	3.23	90.7	12.9	12.4	13.0
1932-33	2771	633	3.35	27.1	60.3	3.62	-	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9
1933-34	2796	630	3.31	27.2	60.2	3.54	-	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9
1934-35	2696	624	3.35	26.9	60.3	3.56	-	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7
1935-36	2748	623	3.31	27.0	60.3	3.53	-	3.26	92.4	12.9	12.5	12.7
1936-37	3160	628	3.28	27.2	60.2	3.49	-	3.26	92.8	13.0	12.5	12.7
1937-38	3004	647	3.26	27.1	60.4	3.51	-	3.30	93.4	13.1	12.5	12.6
1938-39	2696	647	3.24	27.0	60.5	3.48	-	3.30	93.7	13.1	12.6	12.7
1939-40	3268	656	3.22	26.9	60.7	3.48	-	3.31	93.8	13.2	12.7	12.6
1940-41	1728	654	3.26	27.0	60.5	3.43	-	3.30	93.6	13.2	12.8	12.9
1941-42	1836	648	3.33	26.9	60.5	3.42	-	3.29	94.1	13.2	12.7	12.7
1942-43	2236	647	3.25	26.7	60.7	3.42	-	3.32	93.8	13.2	12.7	12.7
1943-44	2484	638	3.30	26.6	60.8	3.44	-	3.32	93.7	13.3	12.7	12.7
1944-45	2296	633	3.31	26.9	60.5	3.39	-	3.26	93.7	13.2	12.7	12.8
1945-46	2548	635	3.29	26.9	60.5	3.36	-	3.28	93.8	13.3	12.8	12.9
1946-47	2320	637	3.28	26.7	60.8	3.34	-	3.26	93.4	13.2	12.7	12.8
1947-48	2364	660	3.19	26.8	60.7	3.34	-	3.24	93.6	13.3	12.8	12.9
1948-49	2684	674	3.15	26.6	61.1	3.39	-	3.26	93.3	13.3	12.8	12.8
1949-50	2856	672	3.15	26.6	61.0	3.40	-	3.28	93.6	13.2	12.8	12.9
1950-51	2796	667	3.14	26.3	61.3	3.40	-	3.29	93.2	13.4	12.7	12.8
1951-52	3167	674	3.06	26.4	61.3	3.42	-	3.30	93.4	13.6	12.7	12.8
1952-53	3424	665	3.06	26.5	61.3	3.43	-	3.32	93.4	13.6	12.4	12.7
1953-54	3496	675	3.03	26.6	61.3	3.33	-	3.34	93.7	13.6	12.6	12.8
1954-55	3560	678	3.03	26.7	61.2	3.26	-	3.33	93.8	13.6	12.6	12.8
1955-56	3552	680	3.01	26.9	61.2	3.21	-	3.32	94.1	13.6	12.6	12.9
1956-57	3612	681	2.97	26.8	61.2	3.12	-	3.32	94.4	13.7	12.6	13.0
1957-58	3728	685	2.95	26.7	61.3	3.05	2.75	3.31	94.8	13.7	12.6	12.8
1958-59	3684	685	2.96	26.8	61.3	2.97	2.66	3.31	95.1	13.7	12.7	12.8
1959-60	3912	684	2.95	27.1	60.9	2.89	2.56	3.29	95.6	13.7	12.7	12.9
1960-61	4844	696	2.91	26.9	61.0	2.85	2.47	3.31	95.7	13.6	12.7	12.9
1961-62	5148	686	2.95	27.0	60.8	2.82	2.43	3.33	95.9	13.6	12.7	13.0
1962-63	5084	673	2.97	27.2	60.6	2.66	2.26	3.30	96.2	13.6	12.8	13.2

i forsøgsresultaterne siden 1926-27.

Points (0-15) ved bedømmelse af							Karbonadeareal, cm ²				Pct. i klasse			
bug	skinker	finhed	kødfylde		bacontype	kødfarve (0-5)	total kød	lange rygmuskel	spæk	spæk i pct. af kød	I		II	III
			hel	oversk.							A1 *	A	B	C
12.0	12.3	12.5	12.4	-	12.2	-	-	-	-	-	50		28	22
12.2	12.4	12.7	12.4	-	12.3	-	-	-	-	-	48		27	25
12.3	12.3	12.6	12.3	-	12.3	-	-	-	-	-	49		25	26
12.3	12.3	12.6	12.4	-	12.3	-	-	-	-	-	52		26	22
12.5	12.5	12.7	12.6	-	12.5	-	-	-	-	-	63		23	14
12.7	12.6	12.8	12.8	-	12.6	-	-	-	-	-	73		20	7
12.9	12.5	12.8	12.7	-	12.6	-	-	-	-	-	71		22	7
12.9	12.5	12.9	12.8	-	12.6	-	-	-	-	-	5	70	18	7
12.8	12.4	12.8	12.6	-	12.5	-	-	-	-	-	6	70	18	6
12.8	12.4	12.8	12.7	-	12.5	-	-	-	-	-	5	74	16	5
12.9	12.4	12.8	12.7	-	12.5	-	-	-	-	-	7	73	16	4
13.0	12.3	12.9	12.7	-	12.6	-	-	-	-	-	7	74	15	4
13.0	12.3	13.0	12.7	-	12.6	-	-	-	-	-	6	76	15	3
13.1	12.3	13.1	12.7	-	12.6	-	-	-	-	-	6	76	15	3
13.1	12.4	13.1	12.8	-	12.7	-	-	-	-	-	6	80	12	2
13.0	12.4	13.0	12.8	-	12.6	-	-	-	-	-	8	78	12	2
13.1	12.3	13.1	12.8	-	12.6	-	-	-	-	-	8	79	11	2
13.1	12.4	13.1	12.8	-	12.6	-	-	-	-	-	7	78	13	2
12.9	12.3	13.1	12.9	-	12.5	-	-	-	-	-	8	80	11	1
13.0	12.3	13.1	12.9	-	12.6	-	-	-	-	-	10	80	9	1
12.9	12.4	13.1	12.9	-	12.6	-	-	-	-	-	9	82	8	1
12.8	12.4	13.0	12.9	-	12.6	-	-	-	-	-	9	81	9	1
12.9	12.5	13.1	12.9	-	12.6	-	-	-	-	-	7	82	10	1
12.9	12.5	13.1	12.8	-	12.6	-	-	-	-	-	5	83	11	1
13.0	12.6	13.1	12.9	-	12.5	-	-	-	-	-	5	82	12	1
13.1	12.5	13.1	12.9	-	12.6	-	-	-	-	-	3	83	12	2
13.2	12.6	13.1	12.8	-	12.5	-	-	-	-	-	4	81	14	1.5
13.3	12.6	13.3	12.9	-	12.6	-	-	-	-	-	4	86	9	0.7
13.1	12.6	13.3	12.8	12.8	12.6	2.30	-	-	-	-	6	85	9	0.5
13.2	12.6	13.3	12.9	12.9	12.7	2.38	-	-	-	-	7	85	8	0.4
13.2	12.7	13.4	13.0	12.9	12.8	2.38	-	-	-	-	11	80	8	0.6
13.1	12.7	13.5	12.9	12.6	12.6	2.38	35.1	-	38.6	110	14	74	11	0.8
13.1	12.9	13.5	12.9	12.8	12.8	2.35	35.4	-	37.4	106	22	66	11	1.0
13.1	12.9	13.5	13.0	13.1	12.9	2.26	34.2	27.9	33.5	98	30	63	7	0.3
12.9	12.7	13.5	13.0	13.2	12.9	2.27	34.9	28.5	33.9	97	38	56	6	0.4
13.0	12.8	13.4	13.0	13.0	12.9	2.34	34.7	28.1	33.0	95	21	72	7	0.3
13.1	13.0	13.4	13.3	13.2	13.1	2.28	34.2	27.8	31.0	91	41	56	3	0.1

*) Gælder først fra 1961/62. Tidligere anvendtes klassen »tynde«. Se nærmere herom i afsnittet om klassificering side 39.

slagtetagen og det opnåede pointsantal for kødfarve dagen efter slagtning.

Det vil imidlertid være vanskeligt at fremskynde slagteprocessen så meget, at organerne kan være udtaget 20 minutter efter stikning, og derfor må der regnes med, at der kan ske en forringelse af kødfarven i perioder, hvor vejret er meget varmt, således som det var tilfældet i sommeren 1963.

Gennemsnitlig har slagtningen været lidt længere i Roskilde og Odense end på de 2 jyske slagterier. Der er næppe tvivl om, at dette forhold har medvirket til den meget dårlige kødfarve hos grise fra »Sjælland« og »Fyn« i månederne juni, juli og august, således som det fremgår af tabel 28.

Tabel 28. Årstidens indflydelse på kødfarven.

	Sept., okt., nov.	Dec., jan., febr.	Marts, apr., maj	Juni, juli aug.	Gns.
»Sjælland«	2.36	2.34	2.36	2.14	2.30
»Fyn«	2.43	2.43	2.33	2.08	2.32
»Jylland«	2.26	2.36	2.23	2.34	2.30
»Vestjylland«	2.22	2.21	2.30	2.23	2.24
Gns. 1962/63.	2.32	2.33	2.31	2.19	2.28
» 1961/62.	2.36	2.39	2.29	2.32	2.34
» 1960/61.	2.26	2.30	2.23	2.25	2.27
» 1959/60.	2.35	2.40	2.20	2.14	2.26
» 1958/59.	2.37	2.43	2.29	2.32	2.35
» 1955/58.	2.37	2.43	2.34	2.32	2.38

Den lave gennemsnitskarakter for kødfarve i de 3 sommermåneder skyldes udelukkende stationerne »Sjælland« og »Fyn«, medens grisene på de jyske stationer tilsyneladende ikke er påvirket af vejrforholdene. Der er sikkert også andre faktorer, som har medvirket til forskellen mellem stationerne, selv om sådanne ikke er blevet iagttaget.

Årstidsvariationer er ikke noget isoleret fænomen for 1962/63. Sådanne har kunnet iagttages hvert år, siden farvebedømmelsen blev indført. Af tabellens nederste del fremgår det, at kødfarven hvert år har været bedst i de kolde vintermåneder december, januar og februar og som oftest dårligst i sommermånederne juni, juli og august. I 1959/60 var kødfarven i sommertiden lige så dårlig som i beretningsåret.

Det kan desværre ikke bortforklares, at resultater opnået i sådanne perioder har forringet værdi som grundlag for udvalg af avlsdyr. Forsøgsvirksomheden vil derfor søge at finde frem til en brugbar korrektion for årstidens indflydelse.

Til trods for den usikkerhed, resultaterne for kødfarve hos en del forsøgshold bliver behæftet med som følge af disse forhold, er der dog mulighed for en forbedring af grisenes kødfarve ved selektion. Selv om det i mange tilfælde er vanskeligt at se nogen linie i de fremkomne resultater, er det ganske åbenbart, at der findes avlsdyr eller linier af avlsdyr, der gennemgående giver afkom med

god kødfarve, ligesom der findes nogle, der oftest giver afkom med dårlig kødfarve.

Det er også forlængst blevet fastslået ad statistisk vej, at kødfarven eller de processer, der fremkalder forskelle i kødfarven, er arveligt betinget. I tabel 29 er anført resultater af forsøgsleder *Per Jonsson's* beregninger over, hvor stor en del af totalvariationen i kødfarven der skyldes additiv genvirkning (se nærmere herom i sidste årsberetning, 336. beretning fra forsøgslaboratoriet).

Tabel 29. Pct. af variationen i kødfarve, der skyldes additiv genvirkning.

År	Galte	Sogrise	År	Galte	Sogrise
1955/56.....	3	40	1959/60.....	44	31
1956/57.....	0	47	1960/61.....	35	34
1957/58.....	17	44	1961/62.....	43	48
1958/59.....	0	63	1962/63.....	16	46

Indtil 1959/60 kunne der kun konstateres en sikker additiv genvirkning hos sogrisene. Som følge heraf besluttede forsøgsvirksomheden og svineavlens ledelse i 1961 at henstille til avlerne kun at basere udvalget for kødfarve på resultaterne for sogrisene samtidig med, at man kun offentliggjorde resultaterne for disse.

Efter at der i 3 på hinanden følgende år, 1959/60–1961/62 var opnået lige så sikre resultater for galte som for sogrise, vendte man fra 1. september 1963 tilbage til den tidligere fremgangsmåde at benytte resultaterne for alle 4 grise i holdet. Denne fremgangsmåde bliver bibeholdt indtil videre, selv om galtene påny i 1962/63 har vist usikre resultater.

Sammendrag.

I forsøgsåret 1. september 1962 til 31. august 1963 er der på de 4 forsøgsstationer »Sjælland«, »Fyn«, »Jylland« og »Vestjylland«, hvor de sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre gennemføres, afsluttet forsøg med ialt 5084 grise. Sammenlignet med året 1961/62 er det en nedgang på 64 grise eller 16 hold. Nedgangen er muligvis tilfældig, men den kan også skyldes, at grisenes daglige tilvækst i 1962/63 har været lavere end i 1961/62.

De 4 stationers samlede årlige kapacitet er 4800–5000 svin, når svinene skal fodres individuelt i hele forsøgsperioden. Antallet af kårede søer i avlscentrene er imidlertid nu steget til 3031, hvilket ifølge reglerne vil kræve afprøvning af 6062 svin årligt. For at imødekomme det her nævnte større behov, som ligger betydeligt over stationernes normale kapacitet, er den fra sidste år gældende regel om, at grisene *måtte* gå sammen to og to i de 2 første uger, efter at de havde nået en vægt af 20 kg, nu udvidet til, at alle 4 grise i et hold *skal* gå sammen, indtil den største gris vejer 30 kg, d. v. s. i

ca. 3 uger. Trods denne foranstaltning, som har forøget kapaciteten til ca. 5600 grise årligt, vil det stadig ikke være muligt at afprøve alle kårede søer så hurtigt som ønskeligt.

Da sogrisene har en betydelig bedre slagtekvantitet end galtene, skal de indsendte hold bestå af 2 sogrise og 2 galte. Kun når særlige forhold taler herfor, kan der dispenseres fra denne regel. I beretningsåret er dette sket i 10 tilfælde, således at 99.2 pct. af holdene har været reglementerede ved modtagelsen. En del forsøgshold bliver i løbet af forsøgsperioden ureglementerede sammensatte, fordi 1 gris udgår på grund af sygdom eller dødsfald. For at sammenligne sådanne holds gennemsnitsresultater med resultaterne for hold bestående af 2 grise af hvert køn, er det nødvendigt at foretage en korrektion. På side 6 er i tabel 3 anført, hvor meget et holds gennemsnitsresultater skal korrigeres ved forskellig, uregelmæssig sammensætning.

Fodringen på forsøgsstationerne.

På forsøgsstationerne fodres svinene individuelt, dog med de tidligere omtalte undtagelser. Forsøgsperioden omfatter vægtintervallet 20–90 kg levende vægt. Foderet bestod tidligere udelukkende af formalet byg og syrnede skummetmælk samt tilskud af vitaminer og mineralstoffer. Det lave proteinindhold i byggen fra de senere år i forbindelse med grisenes stigende proteinbehov, som følge af den stigende kødfylde, har nødvendiggjort en revision af foderplanen. I den reviderede plan side 10, der er anvendt fra 1. september 1962, er proteinkoncentrationen øget ved at give et tilskud på 100 g sojaskrå pr. gris daglig. Iøvrigt gennemføres fodringen som hidtil.

Byggen indkøbes i store partier og fordeles til de 4 stationer. Af hvert parti udtages en prøve til fuldstændig analyse af byggens kemiske sammensætning; herudover foretages hver måned en tørstofbestemmelse i den formalede byg. Resultaterne af tørstofbestemmelsen danner grundlag for beregning af foderværdien, idet 1 kg byg med 85 pct. tørstof sættes lig 1 f. e. I skummetmælken bestemmes på grundlag af gennemsnitsprøver indholdet af tørstof, protein og fedt. Der regnes altid med 6.0 kg skummetmælk til 1 f. e.

Byggens tørstofindhold har stort set været normalt, men indholdet af råprotein har ligget betydeligt under det normale, som er ca.

Tabel 1. Det anvendte foders sammensætning.

	Byg			Skummetmælk	
	Tørstof pct.	Råprotein pct.	kg til 1 f. e.	Tørstof pct.	Protein pct.
»Sjælland«	84.25	8.07	1.01	9.27	3.56
»Fyn«	83.85	8.34	1.01	9.33	3.70
»Jylland«	84.32	8.49	1.01	9.25	3.64
»Vestjylland«	83.95	8.54	1.01	9.44	3.48
Gns. 1962/63	84.09	8.36	1.01	9.32	3.60

10 pct. Som tidligere nævnt er der givet kompensation for dette lavere proteinindhold i form af sojaskrå.

Den stedfundne ændring af foderplanen på de faste svineforsøgsstationer må ikke betragtes som en endelig løsning på dette spørgsmål. Da anvendelsen af skummetmælk som proteinkilde er både dyr og arbejdskrævende, og da omfattende forsøg med slagterisvin har vist, at det er muligt at sammensætte en proteinblanding, der på det nærmeste giver samme slagtekvantitet som skummetmælk, overvejes det at erstatte skummetmælken med en sådan blanding. For at undersøge, om der opnås samme resultater med grise fra avlscentrene, får 2 grise (1 af hvert køn) i 50 hold på hver station i øjeblikket proteintilskud i form af skummetmælk og sojaskrå, medens de 2 andre grise i holdene fodres med en blanding indeholdende 18 pct. proteinrige fodermidler. Resultaterne for disse 200 hold ventes at foreligge omkring 1. april 1964.

Samtidig gennemføres et forsøg, hvor selvfodring med ovennævnte foderblanding sammenlignes med håndfodring efter nugældende plan. Forsøget gennemføres med dobbelthold bestående af 8 kuldsøskende, hvoraf de 4 grise har fri adgang til foder og de 4 andre fodres med hånd. De foreløbige resultater tyder på, at sogrisene med enkelte undtagelser kan tåle at have fri adgang til foderet, medens galtgrisene gennemgående bliver for fede.

Sundhedstilstand, væksthastighed og foderforbrug.

Som det fremgår af tabel 2, har sundhedstilstanden på forsøgsstationerne gennem flere år været tilfredsstillende. For beretningsåret blev udsætterprocenten 1.3, hvilken er den hidtil laveste. I dette tal er inkluderet alle døde grise, alle grise, der på grund af sygdom er udskudt af forsøget, samt grise fra opløste hold.

I 1961/62 skete der et fald i den daglige tilvækst og en stigning i foderforbruget, denne udvikling er fortsat i 1962/63. Som det fremgår af tabel 7, side 17, er det navnlig grisene på forsøgsstationerne »Fyn« og »Jylland«, der har haft en for lav daglig tilvækst og et for højt foderforbrug.

Det har ikke været muligt at finde årsagen til den lavere tilvækst og det højere foderforbrug. Man mente en overgang, at de dårlige høstforhold og det lavere proteinindhold i byggen var årsagen, men da et øget proteintilskud i sojaskrå ikke har haft nogen virkning, kan dette næppe være årsagen.

Tabel 2. Udsætterprocent, daglig tilvækst og f. e. pr. kg tilvækst.

	Udsætterprocent	Daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilv.
1951/52.....	2.7	6.74	3.06
1957/58.....	2.0	685	2.95
1958/59.....	2.4	685	2.96
1959/60.....	2.5	684	2.95
1960/61.....	1.7	696	2.91
1961/62.....	1.5	686	2.95
1962/63.....	1.3	673	2.98

Slagtekvaliteten.

Slagtesvindet har gennem de senere år været stigende og nåede i 1962/63 op på 27.2 pct., det største slagtesvind siden 1936/37. Denne stigning skyldes i nogen grad ændringen i svinenes type, idet lange kødfulde svin har et større slagtesvind end korte fede svin.

Mængden af eksportflæsk er som følge af det større slagtesvind faldet fra 60.8 pct. i 1961/62 til 60.6 pct. i 1962/63.

I tabel 3 er anført resultater for kropslængden, rygspækkets, sidespækkets og bugens tykkelse.

Tabel 3. Kropslængde og tykkelse af rygspæk, sidespæk og bug.

	Kropslængde cm	rygspæk	Tykkelse i cm af sidespæk	bug
1926/27.....	88.9	4.05		3.06
1936/37.....	92.8	3.49		3.26
1946/47.....	93.4	3.36		3.26
1956/57.....	94.4	3.12		3.32
1957/58.....	94.8	3.05	2.75	3.31
1958/59.....	95.1	2.97	2.66	3.31
1959/60.....	95.6	2.89	2.56	3.29
1960/61.....	95.7	2.85	2.47	3.31
1961/62.....	95.9	2.82	2.43	3.33
1962/63.....	96.2	2.66	2.26	3.30

Kropslængden er nu 96.2 cm, og en yderligere stigning er ikke ønskelig, men der er stadig en betydelig variation (fra 89.0 til 103.0 cm). Man bør i avlsarbejdet bestræbe sig på at indskrænke denne variation.

Rygspækkets tykkelse er stadig aftagende. Nedgangen fra 1961/62 til 1962/63 har været 0.16 cm eller den hidtil største i et enkelt år siden 1932/33. På grundlag af de seneste års resultater ventedes det, at nedgangen i rygspæktykkelsen ville blive aftagende; dette har imidlertid ikke været tilfældet, men det må dog i fremtiden forventes, at nedgangen bliver aftagende. Årsagen til den meget stærke nedgang i år er formentlig, at enkelte orner med sikker nedarvning af tyndt rygspæk har været benyttet meget stærkt.

Tykkelsen af sidespækket er ligesom rygspæktykkelsen faldet meget betydeligt, nemlig med 0.17 cm.

Bugens tykkelse er med ca. 3.3 cm tilfredsstillende, og det gælder her som for kropslængden, at variationen bør indskrænkes.

Figur 5 side 32 og tabel 27 side 48-49 viser udviklingen for kropslængden, rygspækkets, sidespækkets og bugens tykkelse siden 1926/27. I figurene 1 til 4 side 26-29 er vist variationen i rygspæk- og sidespæktykkelse for galte og sogrise.

Følgende egenskaber, der er af betydning for baconkvaliteten, bedømmes skønsmæssigt ved hjælp af en pointsskala fra 0 til 15: Spækkets fasthed, bovns størrelse, rygspækkets fordeling, bugens kvalitet, skinkernes form og størrelse, finhed af hoved, ben og svær, kødfylde, bedømt såvel på den hele som på den overskårne side,

samt bacontype. For nogle af de vigtigste egenskaber har udviklingen været som vist i tabel 4.

Bedømmelsen af disse egenskaber er gentagne gange blevet skærpet i takt med markedets stigende krav til svinenes slagtekvalitet. Den kvalitetsmæssige fremgang kan derfor ikke vurderes på grundlag af pointstallene, men som selektionsgrundlag, hvor det hovedsagelig drejer sig om at sammenligne resultaterne mellem enkelte

Tabel 4. Points for skønsmæssigt bedømte egenskaber.

	Bov	Rygspækkets fordeling	Skinker	Kødfylde hel	oversk.	Bacontype
1926/27.....	12.2	—	12.3	12.4	—	12.2
1936/37.....	12.5	12.7	12.4	12.7	—	12.5
1946/47.....	12.7	12.8	12.4	12.9	—	12.6
1956/57.....	12.6	13.0	12.7	13.0	12.9	12.8
1957/58.....	12.6	12.8	12.7	12.9	12.6	12.6
1958/59.....	12.7	12.8	12.9	12.9	12.8	12.8
1959/60.....	12.7	12.9	12.9	13.0	13.1	12.9
1960/61.....	12.7	12.9	12.7	13.0	13.2	12.9
1961/62.....	12.7	13.0	12.8	13.0	13.0	12.9
1962/63.....	12.8	13.2	13.0	13.3	13.2	13.1

forsøgshold slagtet indenfor et begrænset tidsrum, har disse tal stor betydning.

Da der ikke er sket nogen ændring i bedømmelsen siden sidste år, kan resultaterne for 1961/62 og 1962/63 direkte sammenlignes. Der er sket en betydelig fremgang, hvilket skyldes den tidligere omtalte nedgang i spæktykkelsen og den deraf følgende forøgelse af kødfylden. Bedømmelsen af kødfylde, overskåret foretages efter, at siden er skåret over ved spidsen af bageste ribben. Sidespækkets tykkelse måles også på denne snitflade.

Foruden den skønsmæssige bedømmelse af kødfylden i karbonaden foretages på fotografier en opmåling af totalt kødareal, som omfatter såvel den lange rygmuskel (m. longissimus dorsi) som de såkaldte bimuskler (m. multifidus dorsi), samt arealet af den lange rygmuskel alene og spækarealet i karbonadetværnsnittet. Fremgangsmåden ved denne opmåling er illustreret i fig. 6 side 34.

Overskæringen påbegyndtes i 1954/55, og i 1957–58 indførtes opmåling på tegninger af snitfladen. Disse tegninger gav imidlertid for store arealer, hvorfor man i 1959/60 gik over til at fotografere snitfladerne, og foretage opmålingen på fotografier i naturlig størrelse. Resultaterne for de 2 første år er derfor ikke sammenlignelige med de senere års og er udeladt af tabel 5, der viser resultaterne fra 1959/60 til 1962/63.

Tabellen viser, at forholdet mellem kød- og spækarealet i karbonaden er forbedret betydeligt. Der har i det sidste forsøgsår været en nedgang i spækarealet på 2.0 cm²; men også kødarealet er blevet mindre. Som helhed er forholdet spækareal i pct. af kødareal dog forbedret fra 95 til 91 pct. Siden 1959/60 har der været en nedgang i spækarealet på 2.5 cm², medens kødarealet er forblevet uændret.

Tabel 5. Kødfylden i karbonaden.

	1959/60	1960/61	1961/62	1962/63
Areal af lange rygmuskel, cm ² ..	27.9	28.5	28.1	27.8
Kødareal, total, cm ²	34.2	34.9	34.7	34.2
Spækareal, cm ²	33.5	33.9	33.0	31.0
Spækareal i pct. af kødareal	98	97	95	91

Udvalget af avlsdyr efter karbonadens kødfylde har hidtil været baseret på points for kødfylde, overskåret samt på sidespækmålet, men da det, som resultaterne viser, ikke synes muligt at forøge kødarealet ved selektion på dette grundlag, er man fra 1. september 1963 gået over til at meddele avlscenterejerne arealet af den lange rygmuskel (m. longissimus dorsi) for også at muliggøre selektion direkte efter rygmusklens størrelse.

Figur 7 side 40–41 viser sammenhængen mellem karbonadens kød- og spækareal og points for kødfylde overskåret.

Tabel 6 viser svinenes klassificering siden 1926/27. Sammenligningen vanskeliggøres på grund af gentagne ændringer i klassificeringsreglerne. Den sidste ændring foretoges den 28/10-1962, da maksimum for sidespækmålet nedsattes med 2 mm for alle klasser. De nugældende maksimumsmål er følgende:

	Højest tilladte mål i cm			
	nakke	midte	lænd	sidespæk
A1	4.0	2.0	2.0	2.8
A	4.7	2.9	2.7	3.1
B	5.2	3.4	3.2	3.7
C	mere end B			

Overskrides grænserne for sidespækmålet klassificeres A1 som A medens A og B betegnes som kødfattige og må ikke eksporteres.

Tabel 6. Grisenets klassificering.

	Pct. grise i klasse			
	I		II	III
	A1	A	B	C
1926/27		50	28	22
1936/37	7	73	16	4
1946/47	9	82	8	1
1956/57	11	80	8	0.6
1958/59	22	66	11	1.0
1959/60	30	63	7	0.3
1960/61	38	56	6	0.4
1961/62	21	72	7	0.3
1962/63	41	56	3	0.1

Det må her fremhæves, at gruppen A1 i tabel 6 indtil 1960/61 fik betegnelsen tynde og omfattede alle grise, hvis spæklag var tyndere end 2.0 cm midt på ryggen, uden hensyn til tykkelse over bov og lænd. Fra 1961/62 svarer denne gruppe til klasse A1, som beskrevet ovenfor.

Da der ikke er sket nogen ændring i selve klassificeringen de sidste 2 år, kan disse tal direkte sammenlignes, og det ses, at 97 pct. af

svinene er klassificeret som A1 + A i 1962/63 mod 93 pct. i 1961/62.

Siden 1954 har man bedømt kødets farve og struktur på snitfladen af den lange rygmuskel (m. longissimus dorsi) efter overskæring ved det bageste ribben. Ved bedømmelsen anvendes en pointskala fra 0-5 således, at kød med helt tilfredsstillende farve og struktur får 2.5 points eller mere; denne skala er nærmere omtalt side 45.

Siden 1958 har bedømmelsen af kødets farve og struktur været suppleret med måling af pH 3/4 time efter slagtingen. Målingen foretages på samme sted, som overskæringen finder sted. Nedenstående oversigt viser de opnåede resultater.

	1955/56- 1957/58	1958/59	1959/60	1960/61	1961/62	1962/63
Points for kødfarve ..	2.38	2.35	2.26	2.27	2.34	2.28
pH	-	6.04	6.00	5.98	6.06	6.00

Der er gennem årene opnået noget varierende resultater for kødkvalitet (farve og struktur) samt for pH. Årsagerne hertil er ikke helt klarlagte, men selv om kødfarven er arveligt betinget, har de ydre kår en meget stor indflydelse på de opnåede resultater, og årsagen til variationerne er uden tvivl ændringer i de ydre kår, d. v. s. forhold under transport og slagting samt efter slagting. Disse forholds indflydelse er størst i varmt vejr med høj luftfugtighed. Dette bevirker, at man ofte i sommermånederne har en dårligere kødfarve end i vintermånederne. Beregning af den arvelige variation i kødfarven siden 1955/56 viste indtil 1958/59 en højt signifikant additiv genvirkning hos sogrisene, men ikke hos galtene. Dette var årsagen til, at man vedtog fra 1. september 1961 kun at offentliggøre resultaterne for sogrisene. Resultaterne fra 1959/60-1961/62 viste imidlertid, at den additive genvirkning nu var højt signifikant for begge køn, og fra 1. september 1963 offentliggøres igen resultaterne for alle 4 grise i holdene.

Gennemsnitsresultater for de vigtigste kvalitetsegenskaber i de enkelte år siden 1926/27 er opført i tabel 27 side 48-49.

SUMMARY.

Complete tests on a total of 5084 pigs have been carried out at the four testing stations »Sjælland«, »Fyn«, »Jylland« and »Vestjylland« during the period 1st September 1962 to 31st August 1963. Compared with the testing year 1961/62 this is a fall of 64 pigs or 16 groups. The decline is possibly a chance one but may be due to the fact that daily weight gain has been lower in 1962/63 than in 1961/62.

The total annual capacity of the four stations is 4.800 to 5.000 pigs when the pigs are to be fed individually during the whole of the period under test. Numbers of selected sows at the approved breeding centres have, however, now risen to 3.031 and, according

to the regulations, this would require 6.062 pigs to be tested each year. To meet this requirement, which is considerably above the normal capacity of the stations, the rule applied last year namely that the pigs *might* be kept together 2 and 2 for the first two weeks after having reached a weight of 20 kilogrammes has been extended so that the pigs in a group *must* run together 2 and 2 until the largest pig weighs 30 kilogrammes, i. e. for about three weeks. In spite of this measure, which has increased the capacity of the testing stations to about 5.600 pigs per annum, it will continue to prove impossible to test all selected sows as quickly as would be desirable.

As gilts produce much better carcasses than castrated boars, the groups sent in for test must comply with regulations, i. e. each group must consist of 2 gilts and 2 castrates. Exeptions from this rule are only granted when special circumstances speak in favour thereof. During the period under review permission for submission of irregular groups has been granted in 10 cases so that 99.2 per cent. of the groups have complied with regulations on arrival at the testing stations. During the period under test some of the groups become »irregular« because a pig is discarded due to illness or death. In order to compare the average results of such irregular groups with those of groups consisting of two pigs of each sex it is necessary to make a correction. Table 3, page 8 shows the correction of average results for irregularly composed groups.

Feeding at the Testing Stations.

At the testing stations the pigs are fed individually, however with the previously mentioned modifications. The period under test covers the weight limits 20 to 90 kilos live weight. Previously the feed consisted of ground barley and soured skim milk together with supplements of vitamins and minerals. The low protein content of barley during the past few years in connection with the increasing protein requirements as result of greater fleshiness have necessitated a revision of the feeding plan. The protein concentration has been increased by giving a supplement of 100 grammes of extracted soyabean meal per pig per day. Apart from these changes feeding is carried out as in previous years.

Barley is purchased in bulk and distributed to the four stations. A sample is taken from each consignment for complete analysis of the chemical composition of the barley. Besides this a sample of the ground barley is taken out each month for dry matter determination. The results of this analysis form the basis for the calculation of the feeding value, 1 kilo of barley at 85 per cent. dry matter being equal to 1 feed unit. In skim milk the content of dry matter, protein and fat is determined on the basis of random samples. 6.0 kilogrammes of skim milk equal 1 feed unit.

Generally speaking the dry matter content of barley has been normal, but the content of crude protein has been considerably

Table 1. Composition of the feed used.

	Barley			Skim milk	
	Dry matter per cent.	Crude protein per cent.	Kilos to 1 feed unit	Dry matter per cent.	Protein per cent.
»Sjælland	84.25	8.07	1.01	9.27	3.56
»Fyn«	83.85	8.34	1.01	9.33	3.70
»Jylland«	84.32	8.49	1.01	9.25	3.64
»Vestjylland«	83.95	8.54	1.01	9.44	3.48
Average 1962/63	84.09	8.36	1.01	9.32	3.60

below normal, which is about 10 per cent. As mentioned above compensation for the low protein content has been given in the form of soyabean meal.

The change in the feeding plan at the progeny testing stations should not be considered the final solution to this question. As the use of skim milk as a source of protein is both expensive and demanding on labour, and as extensive experiments with baconers have proved it feasible to make up a protein mixture which gives almost the same carcase quality as skim milk, it is being considered to replace skim milk with such a mixture. In order to investigate whether the same results are obtained with pigs from the breeding centres, 50 groups of four pigs at each station have been divided so that two pigs (one of each sex) receive the protein supplement in the form of skim milk and soyabean meal whilst their two litter mates are fed a mixture containing 18 per cent protein feed. The results for these 200 groups are expected to become available about 1st April 1964.

At the same time an experiment is carried out in which self feeding with the above feed mixture is compared with hand feeding according to the present plan. The experiment is carried out with double groups consisting of eight litter mates of which 4 pigs have free access to feed and the other 4 pigs are fed manually. Preliminary results indicate that gilts, with a few exceptions, can have free access to feed without getting too fat whilst the castrated boars on the whole become too fat.

Health, Growth Rate and Feed Conversion.

As can be seen from table 2 the health conditions at the testing stations have for several years been fully satisfactory. During the testing year the discard percentage was 1.3 which is the lowest ever recorded. This figure includes all dead pigs, all pigs excluded from test owing to illness, and pigs from dissolved groups.

In 1961/62 a fall in daily gain and an increase in feed consumption was recorded. This development continued for the year 1962/63. As will be seen from the table on page 17 it is especially the pigs at the testing stations »Fyn« and »Jylland« which have shown a lower daily weight gain and a higher feed consumption per kilo gain.

Table 2. Discard percentage, daily gain f. u. per kilogramme gain.

	Discard percentage	Daily weight gain	F. u. per kilogramme gain
1951/52.....	2.7	674	3.06
1957/58.....	2.0	685	2.95
1958/59.....	2.4	685	2.96
1959/60.....	2.5	684	2.95
1960/60.....	1.7	696	2.91
1961/62.....	1.5	686	2.95
1962/63.....	1.3	673	2.98

The cause of the lower gain and the higher feed conversion rate is unknown. At one stage it was thought that the cause must be the adverse harvest weather and the lower protein content of the barley. But as an increased protein supplement, in the form of soyabean meal, has no effect, the theory does not hold out.

Carcase Quality.

During the past few years dressing wastage has been increasing and in 1962/63 it reached a figure of 27.2 per cent – the largest wastage since 1936/37. This rise is to some extent the result of the change in pig type as long, meaty pigs have a greater dressing wastage than short, fat pigs.

As a result of the greater dressing wastage the quantity of exportable pigmeat has fallen from 60.8 per cent in 1961/62 to 60.6 per cent in 1962/63.

Table 3 gives results for body length, and thickness of backfat, sidefat and streak.

Table 3. Body length and thickness of backfat, sidefat and streak.

	Body length cm	Thickness in cm of		
		Backfat	Sidefat	Streak
1926/27.....	88.9	4.05		3.06
1936/37.....	92.8	3.49		3.26
1946/47.....	93.4	3.36		3.26
1956/57.....	94.4	3.12		3.32
1957/58.....	94.8	3.05	2.75	3.31
1958/59.....	95.1	2.97	2.66	3.31
1959/60.....	95.6	2.89	2.56	3.29
1960/61.....	95.7	2.85	2.47	3.30
1961/62.....	95.9	2.82	2.43	3.33
1962/63.....	96.2	2.66	2.26	3.30

The body length is now 96.2 cm and a further increase is not desirable. However a considerable variation – from 89.0 to 103.0 cm – still exists. Breeders should endeavour to limit this variation.

Backfat thickness continues to decline. The fall from 1961/62 to 1962/63 has been 0.16 cm or the greatest fall in one year since 1932/33. On the basis of the results over the past few years it was expected that the decline would diminish; this has, however, not been the case, but a lowering of the figure for the decrease in

backfat thickness must be expected in the future. The cause for the heavy fall this year is probably that boars with a reliable heredity for thin backfat have been used as sires to a very large extent.

The thickness of sidefat has also fallen considerably namely by 0.17 cm.

The streak thickness at about 3.3 cm is satisfactory. For this factor as for body length an effort must be made to reduce variations.

Figure 5, page 32, and table 27, page 48–49 show developments for body length, thickness of backfat, sidefat and streak since 1926/27. Figure 1, 2, 3 and 4, page 26–29 shows the variation in thickness of backfat and sidefat for castrates and gilts.

The following qualities of importance to bacon quality are judged visually on the basis of points from 0 to 15: firmness of fat, size of shoulder, distribution of backfat, quality of streak, shape and size of hams, fineness of head, legs and skin, fleshiness – judged both on the whole and on the cut side – and bacon type. Developments for some of the most important qualities are shown in table 4.

Assessment of these qualities has repeatedly been made more stringent in step with market requirements for quality pigmeat. Quality improvement cannot, therefore, be evaluated on the basis of numbers of points. But as a basis for selection – in which it is primarily a matter of being able to compare results for individual groups killed within a limited period of time – these figures are of major importance.

Table 4. Points for qualities judged visually.

	Shoulder	Distribution of back fat	Hams	Fleshiness		Bacon type
				whole side	cut side	
1926/27.....	12.2	—	12.3	12.4	—	12.2
1936/37.....	12.5	12.7	12.4	12.7	—	12.5
1946/47.....	12.7	12.8	12.4	12.9	—	12.6
1956/57.....	12.6	13.0	12.7	13.0	12.9	12.8
1958/59.....	12.7	12.8	12.9	12.9	12.8	12.8
1959/60.....	12.7	12.9	12.9	13.0	13.1	12.9
1960/61.....	12.7	12.9	12.7	13.0	13.2	12.9
1961/62.....	12.7	13.0	12.8	13.0	13.0	12.9
1962/63.....	12.8	13.2	13.0	13.3	13.2	13.1

As no change has taken place in judging since last year results for 1961/62 and 1962/63 can be compared directly. A major improvement has taken place. This is due to the previously mentioned fall in thickness of fat and the increase in fleshiness consequent. Judging of fleshiness on the cut side is made after the side has been cut at the last rib. The thickness of sidefat is also measured on this cross section.

Besides visual judging, fleshiness is assessed on photographs in which the total meat area is measured, i. e. both m. longissimus

dorsi and the so-called secondary muscles, (m. multifidies dorsi) the longissimus dorsi only, and the fat area in the rasher cross section. The method of this survey is illustrated in fig. 6, page 34.

Cutting was started in 1954/55 and measurements on tracings of the cross section were begun in 1957/58. As the results of these tracings however gave too large areas, a changeover to photographing the cross section was made in 1959/60 and measurements were made on natural size photographs. Results for the first two years cannot therefore be compared with results for later years and these figures have therefore been left out of table 5 which shows results from 1959/60 to 1962/63.

Table 5. Fleshiness of side.

	1959/60	190/61	1961/62	1962/63
Area of longissimus dorsi, sq. cm	27.9	28.5	28.1	27.8
Meat area, total, sq. cm	34.2	34.9	34.7	34.2
Fat area, sq. cm	33.5	33.9	33.0	31.0
Fat area in per cent. of meat area	98	97	95	91

The table shows that the relation between meat and fat area in the side has improved considerably. There has been a fall in the fat area of 2.0 square cm; but meat area has also become smaller. As a whole the ratio in per cent. of meat area has however improved from 95 to 91 per cent. Since 1959/60 the fat area has fallen by 2.5 sq. cm, whilst the meat area has remained unchanged.

The selection of breeding animals on the basis of fleshiness of the side has until now been based on points for fleshiness on the cut side and on the sidefat measurement but as the results show that it appears impossible to increase the meat area by selection on this basis, a changeover has been made from 1st September 1963 namely that the owners of breeding centres are informed of the area of longissimus dorsi to enable them to select on the basis of its size.

Figure 7, page 40-41 shows the relationship between the meat and fat area of the side and points for fleshiness on the cut side.

Table 6 shows the classification of the pigs since 1926/27. Comparisons are made difficult owing to repeated changes in classification rules. The latest change was made on 28th October 1962 when maximum for sidefat measurements was reduced by 2 mm for all grades. The maximum measurements are now as follows:

Grade	Maximum measurement permitted, cm			
	Shoulder	Mid-back	Loin	Side fat
A1	4.0	2.0	2.0	2.8
A	4.7	2.9	2.7	3.1
B	5.2	3.4	3.2	3.7
C	more than B			

If the limits for the sidefat measure are exceeded A 1 is classified A whilst A and B are classified as too fat (slight of lean) and cannot be exported.

Table 6. Classification of the Pigs.

	Per cent. of pigs in grade			
	I	II	III	
	A1	A	B	C
1961/62.....	21	72	7	0.3
1962/63.....	41	56	3	0.1

It should be pointed out that group A1 in table 6 was classified »very lean« until 1960/61 and included all pigs whose layer of fat was no more than 2.0 cm on mid-back, irrespective of the thickness across the shoulder and loin. As from 1961/62 this group is renamed A1 as described above.

As no change has taken place in actual classification during the past 2 years these figures may be compared direct and it will be seen that 97 per cent of the pigs were classified A1 plus A in 1962/63 as compared with 93 per cent. in 1961/62.

Since 1954 meat colour and structure on the cross section of longissimus dorsi have been assessed after cutting at the last rib. A scale of points from 0 to 5 is used for the assessment so that meat with a completely satisfactory colour and structure is awarded 2.5 points. The scale of points is described in detail on page 45.

Since 1958 the assessment of meat colour and structure has been supplemented with a determination of the pH figure 45 minutes after killing. The determination is made in the same place where cutting is made. The following table shows the results obtained.

	1954/55—					
	1954/55	1958/59	1959/60	1960/61	1961/62	1962/63
Points for colour and structure	2.38	2.35	2.26	2.27	2.34	2.28
pH	—	6.04	6.00	5.98	6.06	6.00

Over the years somewhat varying results have been obtained for meat quality (colour and structure) and for pH. The reason for these variations is not quite clear, but even though meat colour at itself is genetically determined, (additive gene effect) environment plays a great part in the results obtained and the cause for the variations is no doubt changes in environment i.e. conditions during transport and slaughter and after slaughter. The influence of these conditions is most marked in hot weather with high humidity. This means that meat colour is often poorer during the summer months than in winter. Calculations of the genetic variation in meat colour made since 1955/56 show a highly significant additive genetical effect in gilts but not in castrates until 1958/59. This was the reason for a decision made only to publish results for gilts as from 1st September 1961. Results from 1959/60–1961/62 however showed that the additive genetical effect was highly significant for both sexes and as from 1st September 1963 results are again published for all four pigs in a group.

The average results for the most important qualities are given in table 27, page 48–49, for each year since 1926/27.

De sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre

FORELØBIGE MEDDELELSER

FRA FORSØGSLABORATORIET 1962/63 NR. 1

1. SEPTEMBER 1962 TIL 30. NOVEMBER 1962

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise				Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede				
							galte	soer			
									galte		
Aalsbo Møllegaard	F 615	1- 4-62	Nr. 65 Pelle, 6-4-61	63, 11- 4-61	2	2	2	2	80	180	
do	F 622	20- 4-62	Nr. 50 Brams, 25-10-59	61, 4-11-60	2	2	2	2	81	189	
do	F 623	21- 4-62	do	62, 4-11-60	2	2	2	2	72	183	
Abildore	S 596	2- 6-62	Valde, 17-5-61	64, 7- 1-60	2	2	2	2	70	174	
Ans	J 597	3- 3-62	Meyer, 9-1-61	22, 20-10-60	2	2	2	2	86	187	
do	J 598	3- 3-62	Jan, 20-8-60	23, 20-10-60	2	2	2	2	83	186	
Anslet	V 603	7- 3-62	Kompas, 26-1-61	19, 5- 3-61	2	2	2	2	83	183	
Avnbøløsten	V 621	22- 3-62	Kjeld, 27-12-60	37, 6- 6-60	2	2	2	2	106	208	
do	V 622	21- 3-62	Edvard, (7601)	38, 3- 8-60	2	2	2	2	108	214	
Bajlum Overgaard	F 640	5- 5-62	Bajlum Palle, 28-2-61	105, 13- 6-61	2	2	2	2	82	190	
do	J 670	26- 5-62	Bajlum Malle, 11-9-60	99, 24-11-60	2	2	2	2	80	182	
Bellinge	F 600	11- 3-62	Nr. 70 Form, 3-8-60	64, 20-10-59	2	2	2	2	76	176	
do	F 660	1- 6-62	Nr. 75 Delta, 18-7-61	86, 18- 6-61	2	2	2	2	80	180	
Bindesbøl	V 586	13- 2-62	Haldur, 2-1-61	33, 17- 8-60	2	2	2	2	81	191	
Blinksbjerggaard	F 630	25- 4-62	Nr. 45 Firspring, 22-12-59	44, 6- 9-60	2	2	2	2	82	186	
Bramhale	V 610	25- 3-62	Hjalte, 21-3-61	23, 31- 3-61	2	2	2	2	73	179	
do	V 620	16- 4-62	Ernst Bramhale, 16-10-58	19, 11-10-60	2	2	2	2	72	174	
Brandborggaard	J 630	25- 4-62	Pas, 24-9-60	81, 21-11-60	2	2	2	2	68	177	
Broby	S 545	12- 4-62	Ping, 25-2-59	87, 21-10-60	2	2	2	2	68	167	
Brohøjgaard	S 579	12- 5-62	Brodex, 22-1-61	38, 3- 4-61	2	2	2	2	83	185	
do	F 596	21- 2-62	Kraus, 2-10-60	35, 11- 3-60	2	2	2	2	93	198	
Brørup	V 628	8- 4-62	Plus, 17-12-60	96, 11- 4-60	2	2	2	2	91	196	
Bødstrup	S 521	18- 2-62	Pingo, 22-8-59	22, 22- 1-60	2	2	2	2	97	198	
do	S 581	22- 5-62	do	19, 30-11-59	2	2	2	2	75	177	
Danhøjgaard	J 596	11- 3-62	Danbo, 6-2-61	20, 6- 3-61	2	2	2	2	80	181	
Dejbjerg	V 636	10- 5-62	Thing, 5-1-61	34 29- 4-61	2	2	2	2	74	185	
Diegaard	S 548	9- 4-62	Ingo, 25-12-60	71, 12-12-59	2	2	2	2	72	176	
Dybbøl	V 619	8- 4-62	Minister, 27-12-60	71, 15-10-60	2	2	2	2	65	165	
Dybdalgaard	F 611	6- 4-62	Nr. 95 Rossini, 6-1-61	84, 6-10-60	2	2	2	2	70	176	
do	F 621	21- 4-62	Nr. 90 Tjavs, 12-9-60	72, 8-10-59	2	2	2	2	73	174	
Ebbelnæs	S 537	13- 3-62	Nebel, 18-5-60	10, 27-10-60	2	2	2	2	89	193	
do	S 582	14- 5-62	do	11, 29- 3-61	2	2	2	2	80	185	
Egemosegaard	S 558	5- 4-62	Felix, 27-5-58	65, 12-10-60	2	2	2	2	90	191	
do	S 576	11- 5-62	do	45, 16- 4-59	2	2	2	2	75	180	

I gennemsnit																			Klasse				Hold-nr.	
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af										Kødfarve, 0-5 points	AI	A	B		C
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflæsk	sidespækmål	bug		flæskest fasthed	bov	rygflæskest fordeling	bugens tykkel- se og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type							
															hel	overskåret								
6.9	700	2.93	26.7	60.8	2.7	2.0	3.3	96.9	13.4	12.6	13.5	12.9	13.1	13.3	13.5	14.0	13.5	2.0	1	3	-	-	-	615
4.3	649	3.28	28.3	59.4	2.8	2.6	3.4	96.3	13.6	12.9	12.9	12.4	12.0	13.6	12.6	12.3	12.4	2.5	-	4	-	-	-	622
4.5	631	3.29	27.7	59.5	2.6	2.5	3.3	97.3	13.4	12.8	13.5	12.8	12.3	13.3	13.4	12.6	13.0	2.8	2	2	-	-	-	623
5.2	673	2.88	26.9	60.8	2.5	2.1	3.6	92.8	13.8	12.8	13.3	13.3	14.3	13.3	13.7	14.0	13.0	1.5	1	2	-	-	-	596
6.0	697	2.96	27.1	60.2	3.0	2.5	3.4	92.9	13.4	11.6	12.4	13.4	12.1	13.1	12.1	12.9	12.1	2.3	-	4	-	-	-	597
6.1	685	3.00	26.1	62.0	3.1	2.9	3.4	93.5	13.5	11.8	11.9	13.1	13.3	13.4	12.3	12.1	12.3	1.5	1	1	2	-	-	598
4.1	700	2.82	27.8	60.5	2.7	2.4	3.3	95.6	13.4	13.1	13.1	13.5	12.3	13.1	13.0	13.0	13.0	2.0	1	3	-	-	-	603
4.6	678	2.96	27.1	60.8	2.9	2.4	3.3	96.1	13.1	13.0	12.9	13.3	12.3	13.4	12.8	13.3	13.0	2.5	-	4	-	-	-	621
5.3	663	3.09	27.0	60.7	2.8	2.5	3.4	95.9	14.0	12.6	12.5	12.8	10.4	13.9	12.5	12.6	11.5	2.8	-	4	-	-	-	622
4.9	647	3.28	27.7	59.8	3.1	3.2	3.3	98.5	14.5	12.6	12.0	12.9	12.8	13.8	12.1	10.0	10.9	2.8	-	3	1	-	-	640
4.0	685	3.07	28.4	59.2	2.6	2.1	3.2	98.1	13.5	13.4	13.6	13.3	13.3	13.5	13.9	14.1	13.9	2.5	2	2	-	-	-	670
5.3	703	2.94	26.7	60.7	2.7	2.1	3.2	94.9	13.0	12.8	12.9	12.9	12.8	13.0	13.1	14.3	13.3	2.0	1	3	-	-	-	600
6.1	694	2.97	26.3	61.3	2.5	2.0	3.3	96.0	13.5	12.8	13.6	13.3	13.8	13.3	13.8	14.3	13.9	2.0	1	3	-	-	-	660
6.0	640	2.99	27.8	60.2	2.5	2.1	3.3	99.0	13.0	13.0	13.8	13.3	12.3	13.3	13.9	13.8	13.0	2.0	3	1	-	-	-	586
6.0	674	3.06	26.1	61.4	2.9	2.6	3.4	96.5	13.8	12.9	12.3	12.4	12.8	13.5	12.6	12.3	12.8	2.3	-	4	-	-	-	630
5.6	665	2.97	27.5	60.5	2.3	2.0	3.3	97.5	13.6	13.4	14.3	13.4	12.9	13.3	14.1	14.4	13.9	2.8	4	-	-	-	-	610
3.0	687	2.91	28.4	59.6	2.6	2.0	3.2	97.4	13.3	12.9	13.8	13.1	12.5	13.6	13.5	13.6	13.4	2.0	2	2	-	-	-	620
5.5	648	3.11	27.0	60.0	2.7	2.3	3.3	98.1	13.8	13.0	13.4	13.1	13.0	13.9	13.3	13.3	13.4	2.3	2	2	-	-	-	630
4.6	702	2.89	27.5	60.7	2.8	2.1	3.3	96.3	13.9	12.8	13.1	13.3	13.6	13.4	13.3	13.6	13.4	2.3	1	3	-	-	-	545
6.1	689	2.95	26.9	61.4	2.8	2.4	3.3	97.4	13.8	13.1	12.6	13.1	13.4	13.6	13.0	13.4	13.3	2.8	-	4	-	-	-	579
6.4	664	3.11	26.2	61.3	2.7	2.1	3.3	94.0	13.3	12.0	13.0	12.9	14.0	13.6	13.1	14.1	13.0	1.5	2	2	-	-	-	596
2.1	673	2.91	29.3	58.9	2.7	2.1	3.3	97.4	13.5	12.9	13.1	13.0	11.9	13.5	13.3	13.3	13.0	2.0	2	2	-	-	-	628
4.3	686	3.03	27.1	60.3	2.7	2.4	3.4	95.0	13.5	12.9	13.5	12.9	12.9	13.4	13.3	13.5	13.4	2.3	1	3	-	-	-	521
5.8	687	2.97	26.5	61.4	2.7	2.6	3.4	94.6	14.0	12.6	13.0	13.0	13.3	13.8	12.9	12.6	12.9	2.3	1	3	-	-	-	581
7.0	696	3.00	25.8	61.6	3.2	2.6	3.4	96.1	13.5	12.0	12.1	12.6	13.1	13.3	12.0	12.9	12.3	2.5	-	3	1	-	-	596
5.5	635	2.86	27.1	60.4	2.7	2.5	3.2	96.0	13.3	12.9	13.4	13.0	13.5	13.4	13.4	12.9	13.3	1.8	2	1	1	-	-	636
5.1	672	3.07	27.6	60.6	3.0	2.7	3.5	95.8	14.1	12.5	11.8	12.1	12.4	13.6	11.8	11.9	11.8	2.5	-	2	2	-	-	548
3.6	705	2.78	28.3	59.7	2.8	2.5	3.3	95.1	13.4	12.8	12.8	13.1	11.8	13.3	13.0	12.8	12.6	2.5	-	4	-	-	-	619
7.0	664	3.19	26.3	61.2	2.7	2.7	3.4	94.1	13.9	12.4	13.1	13.1	13.5	13.9	13.3	12.0	12.5	2.5	3	1	-	-	-	611
5.3	698	2.94	27.5	59.9	2.6	2.1	3.1	95.4	13.5	12.6	13.1	12.6	12.5	13.0	13.3	13.6	13.0	2.0	2	2	-	-	-	621
4.8	675	3.08	27.6	60.4	2.9	2.5	3.3	97.0	14.0	12.6	12.3	12.9	12.8	13.3	12.4	12.9	12.4	1.8	1	2	1	-	-	537
4.5	675	3.03	27.5	60.6	2.7	2.9	3.3	96.9	14.3	13.3	12.9	12.9	12.8	13.6	12.9	12.4	12.9	2.5	1	3	-	-	-	582
4.5	689	3.08	27.1	61.2	2.6	2.0	3.4	98.4	13.8	13.3	13.5	14.1	13.5	13.3	13.8	13.9	13.9	2.5	1	3	-	-	-	558
6.6	670	3.07	25.5	62.0	2.9	2.2	3.5	94.9	13.9	12.5	12.6	13.4	13.9	13.6	12.8	13.1	13.0	1.5	-	4	-	-	-	576

Sjælland: F.e. pr. kg tilvækst 2.98 J. Jylland: F.e. pr. kg tilvækst 2.98
 Fyn: F.e. pr. kg tilvækst 3.06 V. Vestjylland: F.e. pr. kg tilvækst 2.90

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise				Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede				
							galte søer	galte søer			
Eilkjær	S	541	20- 3-62	Ebbe, 29-3-61	84, 4- 3-61	2	2	2	2	84	18
do	S	543	23- 3-62	do	86, 4- 3-61	2	2	2	2	84	18
do	F	639	27- 4-62	do	88, 13- 4-61	2	2	2	2	86	18
Elkenøre	S	553	4- 4-62	Robin Elkenøre, 25-10-58	31, 18- 9-59	2	2	2	2	86	18
do	S	583	30- 5-62	do	34, 8- 5-60	2	2	2	2	72	17
do	S	574	11- 5-62	Hood Elkenøre, 6-1-61	36, 13- 2-60	2	2	2	2	80	18
Elkjærgaard	V	625	3- 4-62	Bingo, 13-2-61	48, 10- 4-61	2	2	2	2	94	18
Ellede Toftegaard	S	525	20- 2-62	Brilon, 7-6-59	63, 21- 3-61	2	2	2	2	83	18
do	S	529	16- 3-62	Toft Høj, 26-3-58	58, 9-10-60	2	2	2	2	74	17
do	S	544	27- 3-62	Hvid, 24-11-60	54, 28- 8-59	2	2	2	2	80	18
do	S	549	11- 4-62	do	56, 12-12-59	2	2	2	2	69	16
do	S	550	1- 4-62	Ole, 1-5-61	65, 1- 5-61	2	2	2	2	86	18
Ennebøllegaard	F	602	8- 3-62	Nr. 60 Kleemann, 21-11-58	59, 26- 3-60	2	2	2	2	83	18
do	F	604	9- 3-62	do	62, 26- 3-60	2	2	2	2	93	19
Erslev Kirkegaard	V	605	6- 3-62	Rex, 3-7-60	80, 15-12-59	2	2	1	2	70	17
Foulum	J	647	29- 4-62	Begant, 7-3-60	92, 20- 7-60	2	2	2	2	74	17
do	J	662	2- 5-62	do	93, 15- 8-60	2	2	2	2	91	19
Frisvad	V	608	13- 3-62	Dan, 8-11-57	98, 8- 2-60	2	2	2	2	78	18
Fulby	S	562	6- 5-62	Rud, 5-1-60	71, 9- 9-61	2	2	2	2	65	17
do	S	580	19- 5-62	do	72, 14-12-60	2	2	2	2	79	18
Fruebro	J	612	22- 3-62	Carlsberg, 25-1-61	44, 23- 4-61	1	3	1	3	77	18
do	J	626	24- 4-62	do	45, 25- 4-61	2	2	2	2	72	17
do	J	627	17- 4-62	do	42, 6- 5-60	1	3	1	3	78	18
Funder	V	647	3- 5-62	Bro, 19-12-57	48, 12- 5-61	2	2	2	2	96	19
do	V	648	4- 5-62	do	49, 12- 5-61	2	2	2	2	88	19
Galdbjerg	F	588	8- 3-62	Nr. 80 Val, 27-12-59	6, 14- 8-60	2	2	2	2	67	17
do	F	589	12- 3-62	do	9, 12-12-60	2	2	2	2	74	17
do	F	637	17- 5-62	do	8, 12-12-60	2	2	2	2	70	16
Grangaard	F	613	29- 3-62	Kup, 14-11-60	49, 1-12-60	2	2	2	2	77	17
do	F	656	30- 5-62	do	50, 31- 1-61	2	2	2	2	70	17
Granhøjgaard	J	666	5- 5-62	Højbo 99, 25-5-61	81, 23- 5-61	2	2	2	2	90	18
Gruegaard	V	593	22- 2-62	Naur, 9-2-61	52, 20- 1-61	2	2	2	2	88	18
Grøftbjerg	F	597	10- 3-62	Nr. 15 Kraft, 15-8-60	19, 15- 9-60	2	2	2	2	67	18
do	F	598	13- 3-62	Nr. 20 Knag, 15-10-60	21, 18-10-60	2	2	2	2	66	17
do	F	599	24- 3-62	do	22, 18-10-60	2	2	2	2	63	16
Grønsund Færgesgaard	F	592	2- 3-62	Sas, 11-8-60	95, 16- 3-60	2	2	2	2	85	18
Guldbjergvang	J	643	22- 4-62	Lamus, 14-3-61	31, 9- 5-61	2	2	2	2	83	18
do	J	672	15- 5-62	Dux, 28-12-59	23, 3-12-59	2	2	2	2	79	18

I gennemsnit																			Kødfarve, 0-5 points		Klasse				Hold-nr.
Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																	
		pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskest fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink. form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	hel	overskåret	type	AI	A			B	C			
.6	701	2.91	27.4	60.9	2.9	2.1	3.2	99.5	13.9	12.8	12.3	12.5	12.9	13.3	12.5	13.9	12.8	2.5	-	3	1	-	541		
.5	680	2.97	26.1	61.8	3.0	2.1	3.3	97.1	13.9	12.8	12.4	12.4	13.3	13.3	12.4	13.9	12.8	2.5	-	4	-	-	543		
.0	713	2.90	27.8	59.9	2.7	2.3	3.1	97.4	13.6	12.5	13.4	12.5	12.4	13.1	13.1	13.5	13.0	2.5	-	4	-	-	639		
.8	691	2.94	26.9	61.3	2.7	2.4	3.3	96.6	13.4	13.3	13.8	13.9	14.0	13.4	14.0	13.1	13.6	1.5	1	3	-	-	553		
.6	710	2.86	26.8	61.2	2.9	2.3	3.0	98.4	13.9	13.0	12.6	12.4	12.8	13.9	12.9	13.5	13.0	2.8	-	4	-	-	583		
.8	703	2.93	25.3	62.0	2.7	2.1	3.3	95.3	13.8	13.0	13.4	13.2	14.1	14.0	13.9	13.8	13.8	1.8	2	2	-	-	574		
.0	672	3.00	27.8	60.0	2.9	2.5	3.4	95.6	13.6	12.5	12.6	13.4	11.9	13.4	12.5	12.8	12.6	2.5	1	3	-	-	625		
.1	683	2.93	26.5	61.2	2.5	2.1	3.2	97.0	13.4	13.1	14.0	13.1	13.4	13.3	14.1	13.9	13.9	2.3	2	2	-	-	525		
.5	713	2.85	27.5	60.3	2.4	2.0	3.3	97.6	13.0	13.0	14.3	13.1	11.9	13.1	14.1	14.3	13.3	2.3	3	1	-	-	529		
.0	669	3.05	26.7	60.8	2.9	2.5	3.5	94.9	13.8	12.4	12.6	12.6	12.4	13.5	12.4	12.6	12.5	2.3	1	2	-	-	544		
.9	703	2.89	26.1	62.0	2.8	2.6	3.5	92.8	13.5	12.3	12.4	12.3	14.0	13.4	12.6	12.9	12.5	2.0	-	3	1	-	549		
.5	667	3.03	26.8	61.1	2.8	2.5	3.3	95.8	13.7	12.3	12.7	13.3	13.0	13.8	12.7	13.0	13.0	1.5	1	1	1	-	550		
.6	675	3.03	25.5	62.1	2.7	2.5	3.3	95.8	13.9	12.5	13.5	13.5	12.5	13.5	13.4	13.3	13.0	2.5	2	2	-	-	602		
.5	694	3.04	26.2	61.5	2.6	2.5	3.4	96.4	13.8	12.8	13.8	13.6	13.0	13.6	13.6	12.9	13.4	2.8	3	1	-	-	604		
.8	653	3.02	28.1	60.0	2.7	2.4	3.3	96.8	13.3	13.2	13.3	13.8	12.5	13.5	13.2	13.2	13.3	2.3	1	2	-	-	605		
.9	697	2.86	25.5	62.1	2.8	2.6	3.4	94.8	13.4	12.4	13.1	13.0	12.8	13.0	13.0	12.6	12.8	2.3	1	3	-	-	647		
.5	698	2.94	26.3	61.2	2.9	2.3	3.4	94.6	14.1	12.4	12.0	13.1	13.0	13.5	12.4	13.5	12.8	2.5	-	4	-	-	662		
.4	648	3.12	28.3	59.7	2.9	2.5	3.5	95.9	13.9	12.8	12.1	12.9	12.4	13.6	12.5	12.6	12.5	2.8	-	4	-	-	608		
.0	658	3.03	27.4	60.6	2.5	1.9	3.3	95.8	13.4	12.9	13.4	13.8	13.0	13.8	13.8	13.9	13.6	2.3	3	1	-	-	562		
.3	690	2.99	26.6	61.3	2.7	2.4	3.4	95.4	13.9	13.0	13.0	12.6	13.4	13.6	13.1	12.9	13.4	2.8	1	3	-	-	580		
.6	662	3.01	26.4	61.7	2.4	1.9	3.3	97.1	13.3	12.9	14.0	13.9	13.4	13.4	14.3	14.0	13.8	2.0	3	1	-	-	612		
.0	691	2.93	27.6	60.0	2.6	2.3	3.4	96.0	13.5	13.1	13.9	13.0	12.9	13.1	13.5	13.4	13.6	2.5	4	-	-	-	626		
.6	680	3.06	28.0	59.5	2.7	2.2	3.2	96.5	13.8	13.0	13.5	12.5	12.9	13.6	13.0	13.3	12.9	2.0	2	2	-	-	627		
.8	681	2.93	27.7	60.4	2.9	2.5	3.3	94.9	13.5	12.5	13.1	13.3	12.5	13.6	12.6	12.5	12.6	2.3	-	4	-	-	647		
.3	670	2.87	28.2	60.2	2.7	2.2	3.2	94.9	13.5	13.0	13.6	13.1	12.6	13.8	13.6	13.4	13.5	2.3	2	2	-	-	648		
.9	652	3.18	27.8	59.5	3.0	2.8	3.1	96.3	13.6	12.1	12.6	12.1	11.1	13.6	12.3	11.8	11.6	2.5	-	4	-	-	588		
.3	723	2.92	26.8	61.3	2.7	2.2	3.2	96.8	13.4	12.8	13.5	12.8	13.4	13.5	13.5	13.4	13.5	2.5	1	3	-	-	589		
.4	704	2.91	27.2	60.6	2.6	2.1	3.2	95.8	13.3	12.9	13.3	13.3	13.1	13.6	13.6	14.0	13.8	2.5	1	3	-	-	637		
.9	690	3.00	26.0	61.5	2.6	2.2	3.3	96.1	13.8	13.0	13.0	13.8	14.0	13.1	14.1	13.5	13.9	3.0	1	3	-	-	613		
.0	667	3.04	25.8	61.9	2.7	2.3	3.6	98.8	13.8	13.0	13.4	12.4	13.8	13.6	13.1	13.4	13.3	2.5	1	3	-	-	656		
.8	726	2.87	27.5	60.1	2.6	2.5	3.2	96.5	13.6	12.8	13.5	13.5	13.0	14.0	13.5	12.9	13.4	2.3	1	3	-	-	666		
.5	695	2.87	28.0	59.8	2.6	2.2	3.3	96.5	13.4	12.9	13.8	13.4	11.4	12.9	13.5	13.6	12.6	2.3	2	2	-	-	593		
.6	622	3.23	26.4	60.9	3.1	3.2	3.3	93.5	14.0	12.0	11.4	12.6	12.3	13.9	11.5	10.6	11.1	2.0	-	3	1	-	597		
.8	653	3.10	27.4	60.4	2.8	2.5	3.2	95.0	13.4	12.3	12.4	12.9	12.1	13.3	12.1	12.9	12.1	2.3	1	2	1	-	598		
.6	689	3.05	26.5	61.2	3.2	2.9	3.3	92.3	13.6	11.9	11.8	12.8	12.1	13.6	11.5	11.9	11.6	2.5	-	2	2	-	599		
.9	699	2.96	26.4	61.3	2.9	1.9	3.2	98.5	13.5	12.5	12.9	13.0	13.4	13.4	12.8	14.1	13.3	2.5	-	4	-	-	592		
.6	674	3.03	26.3	61.2	2.7	2.3	3.5	94.5	13.5	12.5	13.1	12.8	11.9	13.5	12.9	13.3	12.5	2.5	2	2	-	-	643		
.9	643	3.21	27.0	60.5	2.9	2.5	3.6	95.3	13.5	12.5	12.9	12.0	12.6	13.6	12.9	13.1	12.8	2.8	1	2	1	-	672		

Sjælland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
Fyn: F. e. pr. kg tilvækst 3.06

J. Jylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
V. Vestjylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.90

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved	
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget		slagtede			
						galte	søer	galte			søer
Gylling Overballe	F 603	11-	3-62	Øbo, 21-1-61	21, (28786)	2	2	2	2	87 18	
do	F 644	15-	5-62	do	25, 5- 7-60	2	2	2	2	80 18	
do	F 655	24-	5-62	do	27, 27-11-60	2	2	2	2	82 18	
Gyrstinge	S 533	21-	3-62	Mobuto, 21-1-61	87, 25-10-60	2	2	1	2	67 16	
Hagelbjerggaard	S 551	2-	4-62	Granberg, 22-2-61	98, 19-10-60	2	2	2	2	80 18	
Hagerup Højvang	S 578	27-	5-62	Adrian, 3-9-60	63, 18- 8-60	2	2	2	2	72 17	
do	F 626	29-	4-62	do	72, 13- 3-61	2	2	2	2	76 17	
Hammel	J 633	24-	4-62	Dubi, 14-5-61	90, 1- 1-61	2	2	2	2	79 17	
do	J 669	24-	5-62	Kongo, 5-6-58	93, 14- 5-61	2	2	2	2	77 18	
Hanstedgaard	S 546	13-	4-62	Julius, 26-7-60	132, 13- 8-60	2	2	2	2	70 17	
Hatting	F 612	11-	4-62	Boy, 26-12-58	36, 20-11-59	2	2	2	2	64 16	
Hejedegaard	S 565	11-	5-62	Pass, 2-1-61	70, 24- 7-60	2	2	2	2	69 17	
Helhøjgaard	S 542	19-	3-62	Hajbo, 14-11-60	25, 1- 4-60	2	2	2	2	101 20	
do	S 560	8-	4-62	do	27, 16- 8-60	2	2	2	2	96 20	
Herskind	F 641	2-	5-62	Panser, 7-6-60	44, 20-11-60	2	2	2	2	74 17	
Hinkbøl	V 599	8-	3-62	Heick, 5-8-60	60, 18- 1-60	2	2	2	2	63 17	
Hjortlund	V 630	15-	4-62	Vind, 27-4-61	48, 31- 3-61	2	2	2	2	85 19	
Hjortshøj Østergaard	J 624	25-	3-62	Hjortshøj Mustala, 21-8-60	271, 6- 3-61	2	2	2	2	91 19	
do	J 625	4-	4-62	Hjortshøj Mustafa, 11-7-60	274, 9- 3-61	2	2	2	2	82 18	
do	J 658	4-	5-62	do	270, 27- 2-61	2	2	2	2	91 19	
do	J 651	21-	4-62	Dik 29, (7281)	260, 25- 9-60	2	2	2	2	92 19	
do	J 652	26-	4-62	do	266, 18-11-60	2	2	2	2	86 18	
do	J 653	27-	4-62	Hjortshøj Sax, 21-3-60	256, 2- 7-60	2	2	2	2	94 20	
Holmdrup	F 580	22-	2-62	Nr. 35 Vang, 26-7-60	39, 23- 5-60	2	2	2	2	74 18	
do	F 609	6-	4-62	do	42, 2- 7-60	2	2	2	2	68 17	
do	F 654	5-	6-62	do	53, 8-11-60	1	3	1	3	72 17	
Honum	F 590	6-	3-62	Ceres, 8-11-60	41, 17- 7-60	2	2	2	2	74 17	
Houmarksgaard	J 617	29-	3-62	Prior, 1-8-60	64, 24- 7-59	2	2	2	2	80 17	
do	J 622	6-	4-62	do	74, 3- 3-60	2	2	2	2	79 18	
do	J 639	22-	4-62	do	75, 20- 8-60	2	2	2	2	80 18	
Hundslev	F 647	25-	5-62	Nr. 5 Stille, 28-8-59	88, 2-12-59	2	2	2	2	72 17	
Hækkebøllegaard	F 587	20-	2-62	Nr. 100 Lorentzen, 22-6-60	14, 26-12-60	2	2	2	2	82 18	
Højbogaard	F 614	14-	4-62	Nr. 75 Frode, 7-1-60	39, 10- 6-60	2	2	2	2	70 17	
do	F 632	5-	5-62	Nr. 90 Kaptejn, 14-7-60	33, 30-11-60	2	2	2	2	66 17	
do	F 633	2-	5-62	Nr. 95 Stoff, 23-5-61	41, 21- 5-61	2	2	2	2	71 17	
do	F 662	31-	5-62	do	42, 10- 5-61	2	2	2	2	69 17	

I gennemsnit																			Kødfarve, 0-5 points	Klasse				Hold-nr.
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af															
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type							
																			AI	A	B	C		
66.6	692	3.00	25.5	61.9	2.8	2.6	3.2	95.8	13.6	12.6	12.9	13.1	12.5	13.8	12.9	12.4	12.8	2.5	-	4	-	-	603	
64.5	682	2.99	27.4	60.2	2.4	2.4	3.2	96.8	13.6	12.8	14.0	12.9	12.9	13.3	13.9	13.1	13.1	3.0	2	2	-	-	644	
66.5	698	2.91	26.8	60.9	2.5	2.5	3.2	95.1	13.8	12.6	13.8	13.4	13.6	13.5	13.8	12.9	13.3	2.5	2	2 ¹	-	-	655	
66.7	688	3.04	26.3	61.5	2.8	2.2	3.3	97.0	13.7	12.8	13.2	13.8	13.3	13.2	13.2	13.3	13.3	2.3	-	3	-	-	533	
63.6	636	3.11	28.5	59.5	2.7	2.4	3.3	94.1	13.6	12.8	13.1	13.4	12.8	13.5	13.5	12.9	13.1	2.5	1	3	-	-	551	
65.5	713	2.87	27.3	60.6	2.4	2.2	3.3	96.9	14.0	13.4	14.4	13.0	13.8	13.4	14.3	13.1	13.6	2.8	4	-	-	-	578	
65.5	705	2.96	27.4	60.7	2.7	2.5	3.3	96.9	13.9	12.5	13.3	13.0	12.4	13.6	13.1	12.9	13.1	2.5	2	2 ¹	-	-	626	
66.0	697	2.96	26.5	61.3	2.8	2.2	3.5	97.0	13.8	13.0	13.1	12.9	13.6	13.4	13.4	13.4	13.4	2.8	-	4	-	-	633	
65.5	683	3.08	26.5	60.5	2.6	2.6	3.3	96.1	13.8	12.8	13.3	13.3	13.1	13.5	13.4	12.9	13.4	2.5	3	1	-	-	669	
65.4	702	2.93	27.4	60.6	2.7	1.9	3.2	97.9	13.6	13.0	13.9	13.3	12.8	13.6	13.6	14.4	13.5	1.8	-	4	-	-	546	
66.0	691	3.08	25.7	61.7	2.8	2.2	3.3	97.4	13.6	12.6	13.4	13.6	13.4	13.4	13.3	13.1	13.4	2.3	2	2	-	-	612	
66.6	686	3.07	26.4	61.4	2.6	2.4	3.3	98.1	14.0	12.6	13.3	13.1	12.5	13.5	13.4	13.0	13.0	2.8	1	3	-	-	565	
66.6	705	2.90	26.1	61.4	3.0	2.4	3.4	94.9	13.8	12.3	11.9	13.4	13.1	13.6	12.1	12.8	12.4	1.3	-	3	1	-	542	
66.3	661	3.15	25.8	61.7	2.7	2.6	3.5	97.0	14.0	12.3	12.9	12.1	12.3	13.4	13.0	12.3	12.5	2.3	-	4	-	-	560	
65.6	681	2.98	26.8	60.6	2.5	2.5	3.3	96.1	13.5	12.5	13.9	13.3	12.9	13.4	14.0	12.6	13.1	2.5	2	2	-	-	641	
65.8	654	2.89	28.5	60.2	2.8	2.7	3.3	95.6	13.8	12.3	12.6	12.8	12.3	13.5	12.4	12.5	12.5	2.0	-	4	-	-	599	
64.6	633	3.08	28.1	59.6	2.7	2.4	3.2	96.8	13.8	12.6	13.4	12.9	10.6	13.6	13.0	13.0	11.9	2.5	1	3 ¹	-	-	630	
64.8	671	2.95	27.8	59.8	2.5	2.0	3.3	98.0	13.4	13.4	13.8	13.3	13.5	13.1	14.3	14.1	14.0	2.5	2	2	-	-	624	
65.8	678	3.01	26.3	61.6	2.5	1.9	3.3	94.1	12.9	12.8	13.6	13.3	13.4	13.0	14.0	14.0	13.6	2.3	2	2	-	-	625	
67.5	696	2.84	26.1	61.3	2.5	1.7	3.2	97.4	13.5	13.1	14.1	13.6	13.8	13.9	14.4	14.8	14.1	3.0	3	1	-	-	658	
67.9	688	2.91	26.1	61.8	2.9	2.2	3.3	95.9	13.4	12.8	12.6	13.5	13.6	13.1	13.1	13.4	13.4	2.5	-	4	-	-	651	
65.9	681	2.98	26.8	61.3	2.8	2.2	3.4	95.0	13.9	12.5	12.9	13.5	13.4	13.4	13.0	13.5	13.5	2.5	1	3	-	-	652	
62.9	620	3.33	29.6	58.7	2.5	2.3	3.4	96.8	13.9	13.0	13.9	13.1	12.8	13.3	13.4	13.1	13.3	2.0	3	1	-	-	653	
66.1	612	3.30	27.3	60.5	2.8	2.1	3.2	96.6	13.3	12.4	13.0	12.3	12.4	13.1	12.5	13.8	12.9	2.5	1	3	-	-	580	
65.0	682	3.03	27.4	60.0	2.5	2.0	3.1	94.7	13.3	12.7	14.2	13.2	13.7	13.3	14.0	14.2	14.0	2.5	2	1	-	-	609	
65.4	694	2.93	28.2	59.3	2.6	1.9	3.2	97.5	13.5	12.9	13.8	13.5	13.0	13.1	13.6	14.4	13.8	2.3	2	2	-	-	654	
66.9	675	3.17	26.4	61.1	3.0	2.5	3.5	96.8	13.4	12.3	11.8	11.6	12.3	13.0	11.8	12.8	11.9	2.8	1	1	2	-	590	
66.8	708	2.90	26.2	61.3	2.6	2.4	3.2	99.8	13.4	12.6	13.5	12.5	12.6	13.9	13.4	12.8	13.1	3.0	2	2 ¹	-	-	617	
66.3	666	3.01	26.9	61.0	2.7	2.7	3.4	96.9	13.3	13.0	13.0	13.1	13.6	13.3	13.4	12.4	13.0	2.0	1	3 ¹	-	-	622	
65.4	682	3.03	27.2	60.2	2.8	2.6	3.3	98.4	13.4	13.0	13.1	12.9	12.3	13.0	12.9	12.4	12.5	2.0	2	2 ¹	-	-	639	
66.0	670	3.09	26.7	60.9	3.1	2.8	3.4	95.1	14.0	12.0	12.0	13.0	12.9	13.3	12.3	12.3	12.4	2.8	-	4	-	-	647	
67.0	672	3.02	26.4	61.5	2.8	2.3	3.3	94.2	13.3	12.2	12.7	12.3	12.3	13.5	12.2	13.3	12.5	2.0	-	3	-	-	587	
66.5	693	3.05	27.1	60.3	2.6	2.4	3.3	97.5	14.0	13.1	13.4	13.4	13.8	13.5	13.8	13.3	13.8	2.5	1	3	-	-	614	
65.1	654	3.09	26.6	61.0	2.7	2.3	3.4	92.8	13.8	12.6	13.0	13.0	13.8	13.4	13.3	13.1	13.0	1.5	-	4	-	-	632	
65.2	670	3.05	27.3	60.6	2.6	2.4	3.2	96.5	13.5	12.8	13.3	13.3	12.8	13.2	13.5	13.2	13.3	2.5	1	2	-	-	633	
65.3	645	3.13	27.5	60.4	2.9	2.5	3.3	96.9	13.8	12.6	12.9	12.9	12.4	13.5	12.6	12.6	12.8	2.8	1	2	1	-	662	

S. Sjælland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
F. Fyn: F. e. pr. kg tilvækst 3.06

J. Jylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
V. Vestjylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.90

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede			
							gatte søer	gatte søer		
Høve	S 527	28- 2-62	Loke, 27-3-60	11, 14- 7-58	2	2	2	85	183	
do	S 559	20- 4-62	do	21, 12- 2-59	2	2	2	79	181	
Høver	J 663	18- 5-62	Partner, 30-5-61	54, 26- 5-61	2	2	2	78	179	
Idestrup	S 524	8- 3-62	Mik, 26-1-61	83, 13-11-60	2	2	2	78	181	
do	S 540	21- 3-62	Fiks, 27-11-60	70, 10- 7-60	2	2	2	76	176	
do	S 557	17- 4-62	do	76, 1-10-60	2	2	2	79	178	
Impgaard	J 616	26- 3-62	Brillant, 20-11-60	35, 24- 2-61	2	2	2	85	185	
Jels	V 617	8- 4-62	Esvig, (7569)	31, 14- 9-60	2	2	2	74	175	
do	V 629	22- 4-62	Ikelang, 19-10-60	29, 7- 4-60	2	2	2	79	183	
Jestrup	V 632	23- 4-62	Jeff, 30-9-60	23, 17- 4-61	2	2	2	86	185	
Kalhøve	F 594	9- 3-62	Tasso, 11-10-59	46, 10- 2-61	2	2	2	86	192	
do	F 606	23- 3-52	Banco, 29-4-59	48, 4- 1-61	2	2	2	86	184	
Karby	V 609	16- 3-62	Karby Skipper, 10-7-60	32, 7- 9-60	2	2	2	82	179	
do	V 612	14- 3-62	do	31, 7- 9-60	2	2	2	90	191	
do	V 615	14- 3-62	Karby Nobel, 6-2-61	38, 25, 3-61	2	2	2	89	188	
Kastanielund	S 593	9- 6-62	Michael, 24-1-61	10, 13- 2-59	2	2	2	67	169	
Kellerup Vestergaard	J 660	19- 5-62	Hugo, 9-9-60	93, 7-12-60	2	2	2	75	179	
do	J 661	19- 5-62	do	94, 7-12-60	2	2	2	69	176	
Kirkerup	S 536	24- 3-62	John, 10-1-61	5, 7-11-60	2	2	2	79	184	
do	S 552	30- 3-62	do	7, 23- 6-61	2	2	2	86	185	
Kjelstrup	V 651	24- 5-62	Bus, 15-3-61	59, 5-10-60	2	2	2	72	180	
Kollund	V 601	1- 3-62	Krølle, (6923)	52, 18- 1-61	2	2	2	74	177	
do	V 607	10- 3-62	do	53, 3- 3-61	2	2	2	76	178	
do	V 606	11- 3-62	Mek, 31-5-60	54, 21- 3-61	2	2	2	79	179	
do	V 649	17- 5-62	Tyfon, 11-6-61	55, 10- 5-61	2	2	2	79	182	
Korskjærgaard	J 614	15- 3-62	Kold, 5-3-61	121, 10-12-60	2	2	2	88	195	
Kraghede	J 638	16- 4-62	Bardo, 27-1-61	55, 20- 2-61	2	2	2	87	191	
do	J 659	14- 5-62	do	54, 3-12-60	2	2	2	79	183	
Kristianshøj	J 590	24- 1-62	Fruehøj, 1-12-60	125, 18-11-60	2	2	2	105	216	
Kørup	F 627	26- 4-62	Nikita, 26-1-60	86, 26- 8-60	2	2	2	76	178	
do	F 645	27- 5-62	Pil, 23-9-60	84, 17- 9-60	2	2	2	67	168	
Lammegaard	S 539	25- 3-62	Eg, 28-6-60	87, 23- 8-60	2	2	2	73	173	
do	S 571	16- 5-62	Bøg, 12-3-61	89, 1-10-60	2	2	2	68	173	
do	S 572	24- 4-62	Mustafa, (7573)	92, 22- 2-61	2	2	2	93	193	
Langdel	V 600	24- 2-62	Anker, 7-10-60	139, 16-12-60	2	2	2	84	186	
do	V 611	23- 3-62	Baron, 24-1-61	140, 8- 8-60	2	2	2	72	180	
do	V 643	13- 5-62	Bo, 8-4-61	141, 22- 4-61	2	2	2	72	178	

I gennemsnit																		Klasse				Hold-nr.	
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af														
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flaskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type						
															hel	overskåret							
65.8	711	2.91	26.8	60.8	2.9	2.6	3.3	95.4	13.9	12.5	12.9	12.6	12.6	13.1	12.8	12.6	12.8	2.3	2	2	-	-	527
64.6	685	3.08	28.4	59.7	2.9	2.7	3.2	96.6	13.9	12.9	12.4	13.0	12.8	13.3	12.6	12.3	12.6	2.5	-	4 ¹	-	-	559
63.8	693	2.96	27.7	59.7	2.6	2.0	3.3	93.3	13.0	12.4	13.6	13.1	13.6	13.1	14.0	14.0	12.6	1.5	2	2	-	-	663
65.6	681	2.95	26.3	61.8	2.5	1.9	3.4	95.3	13.5	13.1	13.6	13.4	14.3	13.3	14.0	14.5	14.1	2.0	2	2	-	-	524
64.1	698	2.90	27.4	60.1	2.6	1.9	3.3	97.3	13.4	12.8	13.9	13.4	13.3	13.5	13.6	14.1	13.6	2.0	1	3	-	-	540
65.1	698	2.98	27.8	60.4	2.7	2.3	3.5	96.8	13.5	13.1	13.4	12.6	13.4	13.3	13.3	13.4	13.5	1.8	2	2	-	-	557
66.5	703	2.90	25.8	62.1	3.0	2.4	3.2	98.6	13.8	12.6	11.6	13.3	13.1	13.6	12.3	12.8	12.5	2.0	-	4	-	-	616
65.8	690	2.92	27.4	60.9	2.8	2.2	3.4	96.5	13.3	13.0	13.2	13.3	13.0	13.2	13.0	12.8	13.2	2.5	1	2	-	-	617
65.0	674	2.97	27.7	60.5	3.0	2.5	3.3	93.9	13.5	12.6	12.3	13.3	13.4	13.4	12.6	12.4	12.6	2.3	-	4	-	-	629
64.3	707	2.79	27.8	60.0	2.3	1.6	3.1	96.5	13.4	13.1	14.3	12.9	14.0	13.4	14.3	14.8	13.9	1.5	3	1	-	-	632
65.0	654	3.15	27.0	60.5	2.5	2.2	3.4	95.9	13.6	12.9	14.0	13.6	13.5	13.6	13.9	13.4	13.4	1.5	3	1	-	-	594
66.4	713	2.99	26.2	61.1	2.6	2.4	3.3	95.0	13.8	12.6	13.6	13.3	12.6	13.6	13.4	13.0	13.1	2.3	2	2	-	-	606
65.0	722	2.70	28.1	60.0	2.7	2.0	3.2	97.4	13.3	13.1	13.5	12.9	12.3	13.5	13.6	14.0	13.4	2.3	1	3	-	-	609
64.8	692	2.86	27.9	59.7	2.5	2.1	3.3	96.0	13.3	12.5	13.5	13.0	12.1	13.5	13.5	13.5	13.0	1.8	3	1	-	-	612
63.8	714	2.66	28.4	59.8	2.7	2.5	3.3	96.9	13.8	13.0	13.3	13.0	12.4	13.8	13.1	12.6	13.0	2.5	1	3	-	-	615
66.5	683	3.01	26.0	61.5	2.9	2.3	3.4	94.4	13.8	12.4	12.5	12.5	11.9	13.3	12.5	13.6	12.4	2.8	1	3	-	-	593
66.3	668	3.04	26.0	61.6	2.8	2.6	3.3	98.0	14.0	13.0	13.1	13.6	12.6	13.5	13.0	12.9	13.1	2.3	1	3	-	-	660
65.3	654	3.07	26.8	61.0	2.8	2.6	3.2	96.4	13.6	12.9	13.0	13.9	13.4	13.5	13.3	12.1	12.6	2.5	2	1	1 ¹	-	661
63.9	674	3.03	27.7	60.4	2.9	2.4	3.5	96.9	14.3	12.8	12.3	12.4	13.1	13.5	12.4	12.8	12.5	2.5	1	3	-	-	536
64.3	709	2.86	27.8	60.5	2.9	2.4	3.5	96.0	13.8	12.5	12.5	12.5	12.8	13.1	12.4	12.8	12.5	2.8	-	4	-	-	552
64.4	651	3.01	28.2	59.9	2.9	2.4	3.2	96.5	13.5	13.0	13.1	12.6	12.8	13.5	13.0	13.1	13.0	2.0	1	2	1	-	651
66.1	676	2.94	26.7	61.7	3.2	2.6	3.2	95.4	13.6	12.6	11.5	13.0	12.5	13.6	11.8	12.6	12.0	2.5	-	2	2	-	601
64.1	687	2.89	28.0	59.9	2.9	2.4	3.2	93.5	13.6	12.4	12.8	12.6	13.0	13.8	12.9	12.9	12.6	2.0	-	4	-	-	607
64.3	698	2.85	28.8	59.5	2.9	2.6	3.1	94.6	13.6	12.5	12.5	12.3	14.1	13.5	12.6	12.8	12.9	2.3	-	4	-	-	606
65.5	679	2.87	27.2	61.1	2.6	2.5	3.3	95.0	13.9	13.3	13.5	13.0	13.4	13.8	13.3	12.9	13.1	1.5	2	2	-	-	649
65.4	650	2.98	26.3	61.7	2.6	2.0	3.4	97.4	13.3	12.8	13.0	13.5	14.0	13.5	13.6	13.6	13.4	1.8	3	1	-	-	614
65.9	677	3.01	26.3	61.0	2.8	2.6	3.2	96.3	13.8	12.4	12.9	13.1	12.8	13.1	12.6	13.0	12.8	1.8	-	4	-	-	638
67.1	675	3.05	25.7	61.7	2.7	2.3	3.3	95.8	13.6	12.6	13.4	13.4	13.3	13.5	13.4	13.5	13.4	1.8	2	2	-	-	659
64.3	642	2.93	27.8	60.0	2.6	2.5	3.3	96.1	13.5	12.8	13.4	13.1	12.3	13.5	13.3	13.3	13.3	2.5	1	3	-	-	590
66.5	689	3.03	27.0	60.9	2.9	2.4	3.3	95.5	13.6	12.6	12.8	13.5	12.8	13.6	12.6	13.0	12.8	3.0	-	4	-	-	627
65.0	695	3.02	27.9	60.3	2.7	2.3	3.2	95.1	13.4	12.9	12.6	12.9	13.1	13.1	13.0	13.4	13.3	2.8	2	2	-	-	645
66.0	692	2.97	25.6	62.1	2.9	2.0	3.3	95.5	13.3	12.3	12.6	13.4	13.1	13.1	12.9	14.0	13.1	2.3	-	4	-	-	539
62.8	666	3.07	28.6	59.3	2.8	2.6	3.4	97.0	13.8	12.9	13.0	13.0	12.4	13.1	12.6	12.3	12.5	2.3	1	3	-	-	571
65.3	700	2.93	27.1	61.0	2.6	1.7	3.2	94.9	13.4	12.6	13.3	12.9	13.8	13.5	13.9	14.3	13.5	2.3	2	2	-	-	572
65.0	689	2.85	27.9	59.9	2.6	2.4	3.3	95.9	13.0	12.5	13.8	13.0	12.0	13.3	13.8	13.3	13.1	2.5	2	2	-	-	600
66.0	652	3.05	26.8	60.9	2.8	2.5	3.4	94.1	13.5	12.6	12.9	12.9	12.8	13.6	12.9	13.0	12.9	1.0	-	4	-	-	611
63.6	661	2.91	27.9	60.3	2.8	2.4	3.2	96.4	13.5	13.1	13.1	13.4	12.0	13.5	13.0	13.0	12.9	2.0	1	3	-	-	643

S. Sjælland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
 F. Fyn: F. e. pr. kg tilvækst 3.06

J. Jylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
 V. Vestjylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.90

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget		slagtede		
						galte	søer			
						galte	søer	galte	søer	
Langemark	S 566	4- 5-62	Vilho, 19-12-60	23, 28- 3-61	2 2 2 2	77	181			
Leeregaard	J 609	3- 3-62	Leere Finn, 30-11-60	147, 28- 1-61	2 2 2 2	97	199			
do	J 610	11- 3-62	do	148, 28- 1-61	2 2 2 2	91	190			
do	J 629	30- 3-62	do	136, 1- 6-58	2 2 2 2	86	190			
do	J 640	31- 3-62	do	134, 1- 6-58	2 2 2 2	88	195			
do	F 638	2- 5-62	Jesar, 19-12-60	149, 28- 2-61	2 2 2 2	79	179			
Lidemark	S 568	17- 5-62	Knøv, 17-1-60	56, 21-10-60	2 2 2 2	80	182			
Lillebrænde	S 573	19- 5-62	Dik II, 6-3-61	57, 19-11-60	2 2 2 2	69	166			
Lumsaas	S 575	20- 5-62	Hag, 17-1-58	9, 24-11-60	2 2 2 2	70	170			
do	F 636	4- 5-62	do	6, 12- 1-61	2 2 2 2	77	177			
Lunde	V 613	6- 4-62	Dux, 17-9-59	92, 8- 1-61	2 2 2 2	72	176			
Lykkesgaard	S 585	18- 5-62	Ole, 1-5-61	34, 17-11-60	2 2 2 2	76	180			
do	S 586	25- 5-62	Toft Høj, 26-3-58	29, 27-12-59	2 2 2 2	76	179			
do	S 587	20- 5-62	O. X., 12-12-59	30, 1- 3-60	2 2 2 2	75	174			
Lysager	V 637	2- 5-62	Abild, 17-2-59	90, 12-10-59	2 2 2 2	78	180			
do	V 640	4- 5-62	do	1, 10- 4-60	2 2 2 2	87	187			
Lysgaard	J 585	4- 3-62	Hans, 10-1-60	70, 20- 8-60	2 2 2 2	68	173			
do	J 619	22- 3-62	do	66, 16- 8-59	2 2 2 2	87	187			
do	J 635	26- 4-62	Draaby, 15-1-61	73, 6- 2-61	2 2 2 2	71	174			
do	J 645	3- 5-62	Bus, 8-4-61	74, 25- 3-61	2 2 2 2	67	173			
Mallinggaard	J 648	26- 4-62	Malling XV, 27-10-60	64, 13- 9-59	2 2 2 2	88	186			
do	J 657	10- 5-62	do	66, 21- 4-60	2 2 2 2	77	175			
Mariendal	F 649	16- 5-62	Tello, 5-2-61	82, 24-10-60	2 2 2 2	78	181			
do	F 650	20- 5-62	do	81, 24-10-60	2 2 2 2	70	179			
Melby	F 661	2- 6-62	Nr. 80 Skott, 1-7-61	29, 27-11-60	2 2 2 2	74	175			
Mosebæk	S 511	21- 2-62	Marius, 11-12-60	77, 3- 4-61	2 2 2 2	85	190			
do	F 595	14- 3-62	do	78, 3- 4-61	2 2 2 2	80	184			
Mygind	J 649	1- 5-62	Saaby, 6-2-60	30, 2- 4-60	2 2 2 2	88	188			
do	J 650	1- 5-62	do	31, 17-11-60	2 2 2 2	74	178			
Nordenkjær	V 604	19- 2-62	Sohl, 29-1-61	39, 2-12-60	2 2 2 2	90	191			
Nytoftegaard	F 605	25- 3-62	Nr. 90 Monark, 15-10-60	29, 14- 8-59	2 2 2 2	77	178			
do	F 635	3- 5-62	Nr. 100 Mufa, 9-4-61	31, 16- 5-60	2 2 2 2	76	182			
Nyvang	J 618	27- 3-62	Paladius, 3-12-60	58, 7- 9-60	2 2 2 2	83	190			
Oldrup	F 646	18- 5-62	Klaus, 22-1-61	29, 3-12-60	2 2 2 2	68	178			
Ollerup	S 577	7- 5-62	Ollerup Jarl, 20-7-58	52, 14-11-60	2 2 2 2	84	193			
Ottestrupgaard	S 556	14- 4-62	Remus IV, (7613)	63, 3- 9-60	2 2 2 2	82	180			
do	S 592	26- 5-62	Fup, 25-10-58	56, 2- 7-60	2 2 2 2	79	177			

I gennemsnit																				Klasse				
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagting		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af															
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfylde		type							
															hel	overskåret								
Kødfarve, 0-5 points	AI	A	B	C	Hold-nr.																			
67.6	673	3.02	25.8	62.1	2.7	2.3	3.4	96.1	13.5	12.9	12.8	13.4	13.9	13.5	13.4	12.8	13.4	2.5	-	4	-	-	566	
65.6	691	3.02	26.7	60.4	3.0	2.5	3.2	98.4	13.6	12.4	12.1	12.6	12.8	13.0	12.6	12.8	12.4	2.0	-	3	1	-	609	
66.4	710	2.93	25.8	61.2	2.7	2.1	3.3	97.9	13.4	12.8	13.0	13.5	12.9	13.0	12.8	13.8	13.3	2.8	2	2	-	-	610	
67.8	671	2.99	26.2	61.0	2.6	2.2	3.3	97.3	13.8	13.0	13.8	13.6	13.5	13.3	14.0	13.8	13.8	2.0	2	2	-	-	629	
65.3	653	3.07	26.8	60.0	2.6	2.3	3.3	97.5	13.4	12.9	13.4	13.5	13.0	13.5	13.6	13.5	13.5	2.5	2	2	-	-	640	
65.0	701	2.94	27.7	60.2	2.5	2.3	3.3	95.1	13.8	12.8	13.8	13.0	13.0	13.5	13.9	13.5	13.5	2.5	2	2	-	-	638	
63.6	690	3.01	28.2	59.4	2.7	2.4	3.2	97.0	13.6	13.0	13.4	13.3	13.0	13.5	13.4	13.3	13.6	2.8	1	3	-	-	568	
66.1	723	2.85	26.1	61.8	2.8	2.5	3.3	96.5	13.3	12.9	12.6	13.4	13.3	13.0	13.1	13.0	13.3	3.0	1	3	-	-	573	
66.0	701	2.92	26.9	61.5	2.8	2.7	3.2	95.9	14.0	12.6	13.3	12.8	14.1	13.8	13.5	12.5	13.1	2.8	-	4	-	-	575	
65.5	702	2.96	27.2	60.4	2.7	2.4	3.2	95.8	13.4	12.9	13.4	13.1	13.3	13.6	13.6	12.6	13.1	2.8	-	4	-	-	636	
66.4	670	2.93	26.6	61.2	2.7	2.5	3.4	97.3	13.9	13.0	13.4	13.1	12.8	13.6	13.3	12.8	13.4	2.5	1	3	-	-	613	
66.4	671	3.01	26.5	61.6	2.9	2.4	3.4	93.8	14.1	12.3	12.1	13.0	13.6	13.6	12.5	12.8	12.4	2.0	1	2	1	-	585	
65.4	681	3.01	27.6	60.4	2.6	2.4	3.4	93.8	13.4	12.8	13.1	12.8	13.0	13.5	13.6	13.4	13.0	2.5	2	2	-	-	586	
65.8	708	2.84	26.9	61.4	2.9	2.4	3.3	96.4	13.8	13.0	12.6	12.6	13.6	13.4	13.0	13.3	13.0	2.8	-	4	-	-	587	
65.0	687	2.86	27.6	60.7	2.9	2.3	3.3	95.8	13.5	12.4	12.9	12.9	12.4	13.5	12.9	12.9	12.8	2.5	1	2	1	-	637	
65.9	703	2.88	26.9	61.0	2.8	2.2	3.4	96.6	13.6	12.5	12.9	13.0	12.8	13.6	12.9	13.5	13.1	2.3	-	3	1	-	640	
65.2	667	3.09	27.0	60.6	2.7	2.3	3.4	94.0	13.3	12.5	13.2	13.2	13.7	13.7	13.3	13.5	13.5	2.5	1	3	-	-	585	
66.5	694	2.97	26.6	61.0	2.9	2.9	3.3	97.5	14.0	12.4	12.4	13.1	12.4	13.8	12.5	11.1	12.0	2.0	1	2	1	-	619	
64.6	678	2.93	27.6	60.2	2.7	2.3	3.3	96.4	13.4	13.4	13.0	13.8	13.3	13.1	13.1	13.1	13.5	2.3	1	3	-	-	635	
64.6	662	3.07	27.0	60.5	2.9	2.4	3.3	95.1	13.5	12.5	12.8	13.1	13.3	13.1	12.8	13.0	12.8	2.8	1	2	1	-	645	
65.4	714	2.84	27.0	60.7	2.8	2.4	3.3	95.8	13.8	12.5	13.0	13.4	13.3	13.5	13.0	13.3	13.4	2.3	1	3	-	-	648	
66.5	714	2.91	26.1	61.5	2.7	2.8	3.2	97.5	13.8	12.8	13.0	13.3	12.8	13.4	13.1	12.3	12.9	2.3	-	4	-	-	657	
65.5	681	3.03	26.9	60.4	2.9	3.0	3.3	95.8	14.0	12.8	12.5	12.6	12.9	13.6	12.8	11.5	12.1	2.5	-	4	-	-	645	
65.4	647	3.19	27.2	60.2	2.7	3.1	3.4	98.3	13.8	13.0	12.6	12.1	12.4	13.8	12.9	11.4	12.0	2.5	-	4	-	-	650	
66.6	694	2.96	26.4	61.5	2.8	2.2	3.3	95.1	13.9	12.6	13.1	13.0	12.9	13.6	12.9	13.6	13.0	2.5	1	3	-	-	661	
63.1	667	3.12	28.5	59.0	2.8	2.3	3.2	94.1	13.8	12.9	12.9	13.4	12.8	13.5	13.1	13.4	13.1	2.5	-	4	-	-	511	
63.5	670	3.07	27.9	59.7	2.7	2.1	3.3	93.6	13.5	12.6	13.0	13.9	13.0	13.5	13.1	13.8	13.4	2.8	1	2	1	-	591	
65.0	700	2.97	27.5	60.2	2.8	2.9	3.3	95.3	14.1	12.8	13.0	13.0	13.9	13.6	12.9	11.9	12.6	2.0	1	3	-	-	644	
66.3	668	2.99	26.6	61.0	2.7	2.7	3.3	95.0	13.8	12.4	12.9	13.3	13.3	13.1	13.3	12.1	12.8	2.5	2	2	-	-	656	
65.4	695	2.83	27.3	60.3	2.8	2.3	3.3	95.0	13.4	12.8	12.9	13.3	11.8	13.6	12.9	13.5	12.9	2.5	1	3	-	-	604	
65.4	687	3.03	27.3	60.4	2.8	2.2	3.2	97.1	13.3	12.9	13.3	13.3	13.3	13.3	13.0	13.4	13.4	1.8	1	3	-	-	601	
64.4	666	3.04	27.9	60.1	2.7	2.1	3.3	95.8	13.8	12.9	12.9	13.4	12.8	13.5	13.3	13.3	13.0	2.8	1	3	-	-	631	
66.9	658	3.02	25.8	61.5	2.7	2.3	3.3	99.1	13.4	13.1	13.1	13.4	12.9	13.4	13.4	13.0	13.4	2.5	2	2	-	-	611	
65.3	637	3.23	26.8	61.1	2.8	2.5	3.3	96.9	13.8	12.9	13.1	12.5	13.3	13.4	12.9	13.0	13.3	2.8	1	3	-	-	641	
66.9	640	3.04	25.9	62.3	3.0	2.6	3.4	93.1	14.1	12.6	12.1	13.5	14.1	13.9	12.5	12.5	12.8	1.3	1	2	1	-	57	
65.6	712	2.93	26.6	61.5	2.6	2.4	3.4	95.8	13.6	13.3	14.1	13.6	14.5	13.6	14.0	13.0	13.8	2.5	2	2	-	-	55	
66.5	720	2.84	25.8	62.1	2.8	2.1	3.2	96.8	13.5	12.8	12.5	12.9	14.1	13.4	13.1	13.5	13.3	2.8	2	1	1	-	59	

S. Sjælland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
F. Fyn: F. e. pr. kg tilvækst 3.06

J. Jylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
V. Vestjylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.90

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede			
							galte søer	galte søer		
Oustrup	J 615	28- 3-62	Samos, (7535)	30, 7- 4-61	2	2	2	2	78	180
Ravnholt	V 650	15- 5-62	Ravnholt Knægt, 19-5-61	16, 22- 5-61	2	2	2	2	78	186
Resen	J 603	8- 3-62	Rufos, 7-1-61	69, 20- 8-60	2	2	2	2	84	185
do	J 671	16- 5-62	Bajlum Thomas, 7-1-59	65, 11- 8-58	2	2	2	2	85	185
Ringtved	V 614	23- 3-62	Dolfus, 21-5-61	72, 22- 4-61	2	2	2	2	75	172
Ring Øbjerg	S 530	5- 3-62	Aladdin, 30-4-60	63, 9- 7-60	2	2	2	2	84	182
do	S 531	9- 3-62	Richs, 14-12-60	58, 23-11-59	2	2	2	2	87	186
Rolundgaard	F 591	15- 3-62	Nr. 25 Ørsbo, 7-12-59	31, 26- 9-59	2	2	2	2	81	187
do	F 608	24- 3-62	do	34, 12- 1-60	2	2	2	2	84	185
do	F 607	25- 3-62	Nr. 20 Sim, 31-3-61	43, 10- 9-60	2	2	2	2	80	177
Romdrup Aagaard	F 642	12- 5-62	Aagaard Øst, 6-3-61	97, 30-11-60	2	2	2	2	71	175
do	J 644	30- 4-62	do	96, 14- 8-60	2	2	2	2	82	182
Rostgaard	V 642	4- 5-62	Ekspert, 22-12-59	46, 31-12-60	2	2	2	2	86	188
Rykkerup	S 538	14- 3-62	Lotus, (7609)	87, 27- 3-60	2	2	2	2	85	180
Rønnehave	V 646	1- 5-62	Abel, 15-6-59	45, 9- 4-61	2	2	2	2	96	195
Saaby	F 619	16- 4-62	Triton, 9-4-61	49, 1- 8-58	2	2	2	2	69	175
do	F 624	21- 4-62	do	73, 20- 5-61	2	2	2	2	68	172
Sejbækgaard	J 605	14- 3-62	Grøn, (7355)	58, 20- 8-60	2	2	2	2	82	179
do	J 655	11- 5-62	Falster, 6-2-61	61, 17-11-60	2	2	2	2	79	182
Siverholm	J 591	5- 3-62	Sø, 10-2-59	179, 27- 9-60	2	2	2	2	68	175
do	J 606	13- 3-62	do	178, 27- 9-60	2	2	2	2	82	185
do	J 607	14- 3-62	do	167, 5- 4-60	2	2	2	2	83	183
do	J 623	13- 4-62	do	177, 27- 9-60	2	2	2	2	76	182
do	J 667	20- 5-62	do	180, 27- 9-60	2	2	2	2	70	179
Sivgaard	S 532	24- 3-62	Fip, 9-7-60	67, 22- 8-59	2	2	2	2	66	167
Sjørup Toftgaard	J 621	12- 4-62	Karby, 2-3-61	18, 29- 1-60	2	2	2	2	74	175
Skads	V 597	6- 3-62	Vestjyden, 8-2-61	75, 28- 2-61	2	2	2	2	82	187
do	V 623	17- 4-62	do	76, 21- 5-61	2	2	2	2	75	184
do	V 598	1- 3-62	Vestkraft, 17-9-60	63, 6-10-61	2	2	2	2	94	215
do	V 618	9- 4-62	Elkana, 8-8-60	64, 13-11-60	2	2	2	2	70	174
Skatterup	S 567	8- 5-62	Ask, 24-11-60	59, 11-11-59	2	2	2	2	71	173
Skærup	F 585	12- 2-62	Plus, 21-3-61	25, 28-12-59	2	2	2	2	84	191
do	F 628	19- 4-62	Busser, (7417)	30, 7- 9-60	2	2	2	2	73	183
do	F 629	24- 4-62	do	29, 7- 9-60	2	2	2	2	68	179
Stæuning	V 631	15- 4-62	Eksstrøm, 19-2-60	70, 18-10-60	2	2	2	2	93	200
Stenager	V 616	28- 3-62	Abjerg, 13-6-60	37, 8- 8-60	2	2	2	2	79	179
do	V 626	12- 4-62	Lomomba, 14-7-60	32, 13- 6-60	2	2	2	2	89	189

I gennemsnit																			Klasse				Hold-nr.	
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af															
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflæsk	sidespækmål	bug		flæskest fasthed	bov	rygflæskest fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	hel	overskåret	type							
66.0	691	2.95	25.8	61.4	2.4	2.3	3.3	96.1	13.6	13.0	13.1	13.3	13.4	14.4	13.6	12.9	13.4	2.5	3	1	-	-	-	615
63.8	647	2.92	28.1	59.9	2.7	2.5	3.3	96.6	13.8	13.0	13.9	12.6	11.5	13.8	13.3	12.5	12.4	2.3	2	2 ¹	-	-	-	650
64.4	694	2.98	27.4	60.0	2.6	2.5	3.2	97.6	13.3	12.6	13.5	12.9	12.1	13.3	13.5	13.1	13.0	2.5	1	3	-	-	-	603
65.5	697	3.00	25.7	61.9	2.8	2.7	3.4	96.4	13.8	12.9	13.1	13.1	13.4	13.5	13.0	12.5	12.9	2.5	1	3 ¹	-	-	-	671
66.1	728	2.68	27.6	60.2	2.4	2.4	3.3	95.4	13.4	13.1	13.8	13.3	13.3	13.6	13.9	13.4	13.9	2.5	3	1	-	-	-	614
65.6	710	2.87	26.1	61.7	3.4	3.0	3.3	95.6	14.1	12.1	10.8	13.1	12.0	13.5	10.5	10.9	10.6	2.5	-	2	1	1	-	530
65.0	703	2.99	27.7	59.9	2.9	2.4	3.3	97.9	13.8	12.8	12.3	13.0	12.8	13.4	12.5	13.0	12.5	2.8	1	2	1	-	-	531
67.4	663	3.19	26.0	61.3	2.8	2.4	3.3	95.9	14.1	12.3	13.4	12.9	12.5	13.5	12.8	12.8	12.8	2.5	1	3	-	-	-	591
66.1	698	3.07	26.3	61.3	2.5	2.2	3.1	96.6	13.8	12.8	13.9	13.3	13.3	13.5	13.9	13.6	13.9	2.8	3	1	-	-	-	608
67.6	725	2.95	25.7	61.8	2.4	2.4	3.2	98.6	13.6	12.9	13.8	13.1	13.0	13.3	14.3	13.6	13.8	2.5	3	1	-	-	-	607
65.3	678	2.93	26.9	61.2	2.5	2.1	3.3	94.4	13.9	12.8	13.5	13.4	13.8	13.1	14.0	13.6	13.9	2.0	1	3	-	-	-	642
65.0	698	3.01	27.3	60.1	2.8	2.7	3.4	95.1	13.5	12.5	13.0	12.5	11.9	13.4	12.6	12.3	12.4	3.0	-	4	-	-	-	644
64.4	688	2.83	28.5	59.8	2.7	2.3	3.3	96.0	13.9	13.0	13.5	12.8	12.5	13.5	13.3	13.5	13.1	2.8	2	2	-	-	-	642
65.3	735	2.83	27.0	60.7	2.9	2.7	3.4	94.9	13.8	12.5	12.8	12.1	12.5	13.3	12.6	12.4	12.4	2.5	1	3 ¹	-	-	-	538
65.9	709	2.86	27.1	61.0	2.6	2.1	3.3	97.5	13.5	13.3	13.1	13.0	12.5	13.6	13.5	13.8	13.4	2.3	2	2	-	-	-	646
65.4	657	3.19	27.6	59.8	2.7	2.3	3.2	96.1	13.5	12.6	13.0	12.9	12.5	13.1	13.3	13.3	13.0	2.5	2	2	-	-	-	619
66.0	674	3.04	26.9	60.7	2.7	2.4	3.2	96.6	13.8	12.6	12.9	12.6	12.1	13.6	12.9	12.9	12.8	2.5	1	3	-	-	-	624
66.4	721	2.88	26.8	60.8	2.8	2.6	3.4	96.1	13.9	12.6	12.6	13.3	13.0	13.3	12.8	12.5	12.9	2.0	-	4	-	-	-	605
64.9	677	2.99	27.1	60.5	2.6	2.7	3.3	97.1	13.9	13.0	13.1	13.1	12.0	13.3	13.3	12.3	12.5	2.0	2	2 ¹	-	-	-	655
64.9	654	3.15	27.7	59.7	2.9	2.9	3.2	96.0	13.8	12.5	12.5	13.0	13.1	13.4	12.8	12.3	12.6	2.0	-	4	-	-	-	591
65.1	681	3.05	27.3	59.8	2.9	2.8	3.3	93.3	14.0	12.0	12.5	12.1	13.4	13.8	12.5	12.0	12.3	2.5	-	3	1	-	-	606
64.9	703	2.94	27.4	60.1	2.7	2.8	3.1	93.1	13.3	12.3	13.4	12.6	13.3	13.6	13.4	12.1	12.5	1.8	1	3	-	-	-	607
65.0	661	3.07	26.6	60.7	2.9	2.6	3.3	90.9	13.8	11.9	12.3	13.4	13.4	13.4	12.5	12.5	11.9	1.8	1	3	-	-	-	623
64.8	640	3.09	27.0	60.0	2.9	2.4	3.3	95.6	14.0	12.5	12.9	13.3	13.3	13.9	12.9	13.1	12.9	2.5	1	2	1	-	-	667
64.4	695	2.96	27.8	60.1	2.6	2.0	3.2	95.8	13.0	12.5	13.6	13.0	12.4	13.3	13.4	14.4	13.1	2.3	3	1	-	-	-	532
66.6	698	2.83	26.5	61.2	2.6	2.0	3.3	96.8	13.1	13.1	13.8	13.9	14.8	13.3	14.3	13.8	13.9	2.3	2	2	-	-	-	621
65.0	669	3.01	27.5	60.5	2.8	2.3	3.3	93.1	13.5	12.5	13.1	13.4	12.5	13.5	13.4	13.4	12.9	2.0	-	4	-	-	-	597
65.5	643	3.07	26.7	61.4	2.9	2.5	4.4	93.3	13.6	12.3	12.5	13.1	12.8	13.6	12.8	12.8	12.6	2.3	2	1	1	-	-	623
64.8	574	3.14	27.3	60.3	2.5	2.0	3.3	93.9	13.3	12.5	13.6	13.3	13.1	13.5	13.8	13.8	13.4	1.5	2	2	-	-	-	598
66.9	676	2.88	27.1	60.9	2.5	2.2	3.3	95.1	13.5	13.3	14.0	14.0	13.4	13.5	13.9	13.9	14.0	2.3	3	1	-	-	-	618
66.5	688	2.99	25.2	62.5	2.6	2.3	3.4	94.5	14.0	12.8	13.4	13.3	14.0	13.9	13.8	13.0	13.8	2.0	1	3	-	-	-	567
66.3	654	3.18	26.3	61.1	3.1	2.5	3.3	95.0	14.0	12.4	11.9	12.6	12.5	13.4	11.9	13.0	12.1	2.5	1	1	2	-	-	585
64.8	637	3.26	28.1	59.7	2.9	2.4	3.3	96.5	13.9	12.6	13.0	13.1	12.9	13.3	12.6	12.8	12.9	2.5	-	4	-	-	-	628
65.6	631	3.20	27.3	60.0	2.7	2.3	3.3	96.6	13.6	12.9	13.1	13.0	13.0	13.4	13.1	13.1	13.4	2.5	-	4	-	-	-	629
66.3	658	2.96	27.0	61.0	2.8	2.6	3.3	94.5	13.8	12.9	13.1	13.3	13.1	13.3	13.1	12.3	12.9	2.8	1	3	-	-	-	631
64.5	697	2.83	27.6	59.9	2.5	2.0	3.2	96.0	13.1	12.9	13.3	13.0	12.5	13.5	13.6	13.8	13.3	2.5	3	1	-	-	-	616
66.0	695	2.88	27.9	60.5	2.6	1.8	3.3	97.8	13.2	12.7	13.3	13.2	14.0	13.2	13.8	14.3	13.7	1.3	-	3	-	-	-	626

S. Sjælland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
F. Fyn: F. e. pr. kg tilvækst 3.06

J. Jylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
V. Vestjylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.90

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise				Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede				
								galte søer	galte søer		
Stillinge Vestergaard	S 563	13- 4-62	Hjerter Knægt, 26-7-57	98, 20- 7-58	2	2	2	2	94	196	
Stinesminde	J 668	18- 5-62	Holst, (7689)	29, 22- 1-60	2	2	2	2	77	179	
Strandby	F 593	14- 3-62	Nr. 40 Puskas, 9-12-60	63, 21- 1-61	2	2	2	2	74	183	
Svinholt	F 652	8- 5-62	Spar Es, 29-4-60	26, 1-11-60	2	2	2	2	92	197	
Sønderlide	F 620	30- 3-62	Mols, 8-9-60	26, 18- 8-60	2	2	2	2	78	183	
Søndervang	V 639	12- 5-62	Bram, 24-12-60	19, 19-10-60	2	2	2	2	77	180	
Tandrup	V 656	14- 5-62	Lomomba, 14-7-60	57, 11-12-60	2	2	2	2	91	192	
Tarup Søndergaard	F 631	5- 5-62	Nr. 100 Hjorth, 2-7-60	41, 27- 6-60	2	2	2	2	70	176	
Tebstrup	J 634	23- 4-62	Partner, 30-5-61	61, 21- 3-61	2	2	2	2	71	170	
do	J 646	25- 4-62	do	62, 21- 3-61	2	2	2	2	75	174	
Ternelund	S 561	3- 5-62	Ideal, 20-4-59	89, 14- 6-58	2	2	2	2	73	173	
do	S 564	3- 5-62	do	96, 13- 7-59	2	2	2	2	83	184	
do	S 588	18-5-62	Sas, 10-4-61	11, 4- 5-61	2	2	2	2	91	190	
Thirup	J 637	16- 4-62	King, 1-5-61	16, 9- 5-61	2	2	2	2	91	193	
do	J 664	9- 5-62	Hjortholm Fix, 6-10-60	15, 16-11-60	2	2	2	2	85	186	
do	J 665	8- 5-62	do	14, 16-11-60	2	2	2	2	89	189	
Thoderup	F 616	13- 4-62	Nr. 80 Klaus, 3-8-60	93, 21-10-59	2	2	2	2	68	174	
Thorning Toftgaard	J 673	26- 5-62	Palle, 23-1-59	67, 26- 4-61	2	2	2	2	79	185	
Thorsø,	J 656	2- 5-62	Falster, 6-2-61	54, 18- 5-61	2	2	2	2	81	183	
do	J 674	27- 5-62	Birk, 6-2-61	49, 3-12-60	2	2	2	2	81	183	
Thorsø Nørgaard	J 608	6- 3-62	Jarl, 24-10-59	50, 9- 2-61	2	2	2	2	90	185	
Thorup Østergaard	J 601	14- 3-62	Broby 64, 10-2-61	4, 20- 8-60	2	2	2	2	77	183	
do	J 628	12- 4-62	do	6, 28- 9-60	2	2	2	2	78	182	
Tofte	F 586	9- 3-62	Nr. 80 Sten, 29-1-61	69, 18- 3-61	2	2	2	2	64	169	
do	F 625	22- 4-62	do	71, 7- 5-61	2	2	2	1	77	181	
Toftthøj	F 610	26- 3-62	Højbo, 25-4-58	75, 15- 9-60	2	2	2	2	80	181	
Tolstrup	S 535	10- 3-62	Hejding, 13-5-60	14, 23- 9-60	2	2	2	2	89	185	
Tornbygaard	S 554	6- 4-62	Arnol, 9-10-60	74, 31-10-60	2	2	2	2	79	191	
Trabjerg	V 645	2- 5-62	Trabjerg Malte, 28-12-60	10, 19-10-60	2	2	2	2	88	188	
Trediehave	V 634	2- 5-62	Mads, 1-10-58	53, 29-11-60	2	2	2	2	73	176	
Troelstrup	F 617	4- 4-62	Skipper, (7597)	96, 1- 8-60	2	2	2	2	75	177	
do	F 618	1- 4-62	Lundesten, (7679)	95, 12- 7-60	2	2	2	2	78	182	
Tved	V 624	9- 4-62	Viland, 18-3-61	35, 10- 5-61	2	2	1	2	76	180	
do	V 661	29- 5-62	Grand, 17- 4-59	32, 14-11-60	2	2	2	2	77	179	
Tøndagergaard	J 620	25- 3-62	Dario, 2-1-61	31, 6- 1-61	2	2	2	2	86	189	

I gennemsnit

Klasse

Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af										Kødfarve, 0-5 points	AI	A	B	C	Hold-nr.
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflask	sidespækmål	bug		flaskets fasthed	bov	rygflaskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink. form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type							
															hel	overskåret								
65.3	687	3.02	26.5	61.1	2.6	2.4	3.4	95.8	13.6	12.8	13.1	13.8	12.9	13.5	13.5	12.8	13.3	2.5	3	1 ¹	-	-	-	563
64.5	694	2.88	27.7	59.8	2.6	2.6	3.2	95.1	13.5	13.1	13.8	13.3	13.9	13.5	13.8	12.6	13.3	1.8	2	2	-	-	-	668
65.5	651	3.18	27.0	60.3	2.6	2.3	3.3	95.0	13.3	12.4	13.6	12.6	12.5	13.0	13.5	13.3	12.9	2.0	1	3	-	-	-	593
65.1	670	3.09	26.8	60.3	2.8	2.4	3.3	97.6	13.9	12.6	12.9	12.8	12.6	13.4	12.8	12.6	12.8	2.8	2	1	1	-	-	652
64.6	673	3.02	27.8	59.8	2.6	2.1	3.3	96.6	13.8	12.8	13.8	13.0	12.6	13.8	13.5	14.1	13.4	2.0	2	2	-	-	-	620
65.5	687	2.92	27.9	60.4	2.8	2.2	3.3	97.3	13.3	12.6	12.5	13.3	12.4	13.3	12.8	13.5	12.6	2.3	-	4	-	-	-	639
67.3	690	2.85	26.9	61.0	2.6	2.4	3.4	96.3	14.1	13.1	13.1	13.4	12.9	13.4	13.3	13.3	13.1	3.0	1	2	1	-	-	656
64.6	671	3.02	28.3	59.4	2.4	1.9	3.1	96.8	13.5	12.9	14.0	12.9	13.8	13.1	14.4	14.0	13.6	2.5	4	-	-	-	-	631
65.9	710	2.86	26.8	60.8	2.7	2.1	3.3	96.1	13.5	13.0	12.9	13.6	14.1	13.6	13.5	13.8	13.8	2.3	2	2	-	-	-	634
66.4	708	2.88	26.8	60.5	2.7	2.1	3.4	96.6	13.5	13.1	13.3	13.4	14.0	13.1	13.3	13.9	13.6	2.5	2	2	-	-	-	646
66.4	698	2.95	27.4	60.2	2.7	2.4	3.3	98.5	13.9	13.4	12.6	13.1	13.0	13.4	13.1	12.9	13.0	2.5	-	4	-	-	-	561
65.3	699	3.01	27.7	60.0	2.7	2.1	3.2	96.8	13.6	12.9	13.3	12.8	13.6	13.8	13.5	13.8	13.8	3.5	2	2	-	-	-	564
63.9	707	2.91	27.5	60.3	2.4	2.0	3.3	94.8	13.3	12.8	14.0	13.1	12.5	13.4	14.0	13.8	13.4	2.5	4	-	-	-	-	588
65.6	686	2.92	26.3	61.2	2.8	2.5	3.4	94.5	13.1	12.3	12.8	13.4	12.8	13.4	12.9	12.5	12.0	1.8	1	3 ¹	-	-	-	637
65.4	695	2.94	27.8	59.9	2.7	2.5	3.3	97.6	13.5	12.8	13.1	12.8	13.0	13.3	13.3	12.9	13.0	2.5	-	4 ¹	-	-	-	664
65.1	709	2.88	28.3	59.4	2.6	2.0	3.2	97.9	13.1	12.9	13.6	13.5	13.0	13.5	13.6	14.1	13.5	2.0	3	1	-	-	-	665
65.8	660	3.17	27.6	60.0	3.2	2.9	3.3	94.9	13.8	12.4	11.6	13.1	12.8	12.9	11.8	11.8	11.8	2.5	-	2	2	-	-	616
64.5	668	3.15	27.5	60.1	3.3	2.7	3.3	94.6	14.5	12.3	10.6	12.4	10.4	14.5	10.0	12.0	10.4	2.0	-	2	-	2	-	673
64.9	681	2.97	26.5	61.2	2.6	2.6	3.2	95.5	13.4	13.0	13.3	13.1	12.0	13.5	13.0	12.6	12.9	2.5	2	2	-	-	-	656
65.8	684	3.06	27.8	60.3	2.8	2.7	3.4	95.6	13.6	12.5	13.0	13.5	13.6	13.9	13.0	12.3	12.6	2.0	-	4	-	-	-	674
64.9	738	2.82	27.3	59.7	2.7	2.6	3.3	97.5	13.4	12.5	12.8	13.5	12.0	13.3	12.9	12.5	12.6	2.0	2	2	-	-	-	608
66.0	660	3.12	26.0	61.2	3.0	2.7	3.7	96.8	14.0	12.4	12.5	11.6	12.6	13.5	12.1	11.9	12.0	2.3	-	3	1	-	-	601
65.6	675	3.06	26.4	61.1	2.9	2.7	3.5	98.9	13.6	12.8	12.3	13.0	12.6	13.1	12.5	12.3	12.5	2.8	-	4	-	-	-	628
65.9	671	3.10	27.7	60.0	2.7	2.4	3.2	96.0	13.4	12.4	12.8	12.6	12.5	13.6	12.6	13.0	12.6	2.5	2	1	1	-	-	586
66.0	678	3.08	26.5	60.8	2.9	2.5	3.3	93.0	14.0	12.2	12.2	13.3	12.2	13.7	12.5	12.5	12.3	1.5	1	3	-	-	-	625
65.0	694	2.96	27.1	60.3	2.7	2.3	3.3	97.6	13.5	13.0	13.5	13.3	13.4	13.1	13.4	13.4	13.6	2.5	3	1	-	-	-	610
64.8	728	2.84	27.0	60.6	2.8	2.1	3.3	96.0	13.6	13.1	13.1	12.9	13.4	13.4	13.1	13.8	13.5	2.5	1	3	-	-	-	535
64.4	602	3.35	28.8	58.9	2.5	2.4	3.2	98.9	13.8	13.0	13.4	13.1	10.6	13.5	13.5	12.8	12.0	2.8	2	2	-	-	-	554
64.5	698	2.85	27.5	60.6	2.5	2.0	3.1	97.1	13.3	12.8	14.0	13.0	13.0	13.3	13.8	13.6	13.6	1.5	3	1	-	-	-	645
64.5	687	2.86	28.0	60.5	3.1	2.7	3.4	91.9	14.0	12.4	11.9	13.4	13.3	13.3	12.3	12.4	12.1	2.3	-	4	-	-	-	634
66.6	681	3.00	25.7	61.5	2.5	2.1	3.3	96.4	13.6	12.6	14.1	13.6	13.6	13.6	14.0	13.5	13.8	2.0	2	2	-	-	-	617
66.4	675	3.12	26.1	61.2	2.5	2.2	3.2	96.8	13.6	12.9	13.6	13.1	13.6	13.4	13.9	13.5	14.0	2.5	3	1	-	-	-	618
64.5	675	2.91	28.4	60.0	2.7	2.1	3.3	95.0	13.8	13.0	12.8	13.3	12.2	13.8	12.8	13.8	13.2	2.0	1	2	-	-	-	624
66.0	689	2.87	26.8	61.1	2.8	2.4	3.3	96.3	13.5	12.8	12.4	13.4	12.8	12.5	12.9	13.0	13.0	2.0	-	4	-	-	-	661
66.5	679	3.05	26.4	60.6	2.9	2.8	3.4	99.8	13.6	13.4	12.6	12.8	12.5	13.1	12.9	10.9	11.6	2.5	-	4 ¹	-	-	-	620

S. Sjælland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
 F. Fyn: F. e. pr. kg tilvækst 3.06

J. Jylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.98
 V. Vestjylland: F. e. pr. kg tilvækst 2.90

[illegible]

I gennemsnit																			Kødfarve, 0-5 points					Klasse					Hold-nr.
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																				
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink. form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type												
															hel	overskåret													
65.1	697	2.93	27.1	60.9	2.5	2.2	3.4	97.3	13.4	13.0	13.3	13.4	13.1	13.5	13.4	13.8	13.5	2.3	3	1	-	-	534						
65.6	657	2.96	27.8	59.6	2.8	2.4	3.2	99.1	13.0	12.4	13.0	12.5	12.1	13.1	12.9	13.1	12.6	1.8	-	4	-	-	599						
66.3	667	3.04	26.9	60.7	2.8	2.6	3.3	96.1	13.5	12.5	13.3	12.8	13.4	13.5	13.0	12.5	12.9	2.3	-	4	-	-	648						
67.0	685	3.04	26.0	61.0	3.1	2.6	3.4	97.1	14.1	12.4	11.9	12.6	12.5	13.5	12.1	12.3	12.1	2.5	-	3	1	-	653						
65.5	702	2.94	26.9	60.8	2.6	1.9	3.4	96.5	13.6	12.6	14.0	12.0	12.3	13.1	13.5	14.3	12.9	2.5	2	2	-	-	515						
64.9	692	2.98	26.5	61.2	2.6	1.8	3.3	98.3	13.3	12.8	14.0	13.4	13.5	13.3	13.5	14.4	13.6	2.5	2	2	-	-	547						
66.3	720	2.84	26.0	61.3	2.6	1.9	3.1	97.8	13.9	12.8	13.6	12.9	13.5	13.1	13.8	14.0	13.6	1.8	1	3	-	-	631						
67.0	660	3.13	25.9	61.7	2.8	2.3	3.3	95.0	13.5	12.6	13.1	13.8	13.3	13.3	12.9	13.1	13.1	2.0	2	2	-	-	636						
66.4	687	3.03	26.5	60.6	2.7	2.2	3.3	96.3	14.1	12.9	13.4	12.9	13.5	13.6	13.4	13.8	13.9	2.5	2	2	-	-	654						
63.5	664	3.19	28.2	59.5	2.8	2.3	3.2	98.5	13.3	12.8	13.0	12.5	12.2	13.2	12.8	12.8	12.7	2.5	1	2	-	-	569						
64.5	713	2.93	26.9	60.7	2.8	2.2	3.3	96.3	13.6	12.8	12.9	13.3	13.0	13.4	12.9	13.5	13.4	2.5	-	4	-	-	570						
64.6	683	2.98	26.8	61.0	3.0	2.5	3.3	96.0	14.3	12.5	11.6	13.0	12.9	13.6	12.3	12.8	12.4	2.5	-	3	1	-	595						
64.9	720	2.81	28.0	59.8	2.9	2.2	3.2	97.1	13.1	12.8	13.1	12.5	11.5	13.6	12.9	13.5	12.4	2.3	-	4	-	-	595						
62.0	667	2.97	29.3	58.9	3.0	2.9	3.2	96.5	14.1	12.6	12.4	12.9	11.6	13.5	12.1	11.0	11.5	2.5	1	2	1	-	633						
66.0	693	2.74	27.1	60.6	2.6	2.3	3.2	96.5	13.8	12.9	13.5	13.6	13.1	13.9	13.8	12.9	13.4	1.5	3	1	-	-	652						
64.8	659	3.07	27.4	60.2	2.7	2.4	3.2	96.0	13.6	12.9	13.1	12.8	12.5	13.1	13.0	13.3	13.1	2.5	1	3	-	-	643						
65.8	670	3.03	27.1	60.3	2.7	2.7	3.2	99.1	13.4	12.8	13.3	13.0	11.9	13.0	13.3	12.4	12.8	2.5	2	2	-	-	641						
65.6	702	2.91	26.9	61.1	2.8	2.4	3.4	95.8	13.5	12.6	12.8	12.9	12.6	13.3	12.9	13.4	12.8	2.0	-	4	-	-	642						
66.3	706	2.88	27.1	60.1	2.7	2.1	3.3	97.4	13.5	12.8	13.4	13.3	12.9	13.4	13.5	13.9	13.4	2.5	2	2	-	-	611						
65.9	710	2.86	26.5	60.6	2.6	2.2	3.3	97.9	13.3	13.1	13.8	13.5	13.6	13.3	13.8	14.3	13.6	1.5	2	2	-	-	632						
66.8	723	2.77	27.2	60.4	2.6	2.2	3.4	95.9	12.6	12.6	12.9	13.1	13.5	13.1	13.6	13.5	13.3	1.8	1	3	-	-	689						
63.3	666	2.95	28.9	59.4	2.6	1.9	3.2	96.0	13.0	12.6	13.5	12.8	12.1	13.4	13.5	14.1	13.1	2.5	3	1	-	-	644						
67.3	690	2.79	27.1	61.1	3.0	2.3	3.3	94.3	13.3	12.0	12.5	13.4	13.1	13.6	12.5	13.1	12.5	2.3	-	3	1	-	638						
67.9	680	3.10	26.1	61.1	2.9	2.8	3.3	95.8	13.9	12.3	12.6	12.5	12.5	13.6	12.5	11.6	12.3	2.3	1	3	-	-	601						
65.3	712	2.96	26.5	61.3	3.0	2.8	3.2	96.5	14.0	12.4	11.3	13.0	12.1	13.8	11.8	12.0	11.9	2.0	-	4	-	-	613						
65.5	673	3.02	26.9	60.5	2.8	2.5	3.3	96.0	13.8	12.5	12.9	12.8	12.6	12.9	13.0	12.6	12.6	2.8	-	4	-	-	634						
65.5	682	2.99	27.1	60.7	2.74	2.36	3.30	96.1	13.6	12.7	13.1	13.1	12.9	13.4	13.1	13.1	13.0	2.32	30	65	5	0.3	-						
65.3	689	2.98	27.0	60.9	2.75	2.31	3.33	96.2	13.7	12.8	13.0	13.0	13.1	13.5	13.1	13.2	13.1	2.36	28	67	5	0.4	-						
65.8	675	3.06	26.9	60.7	2.73	2.39	3.28	96.0	13.7	12.6	13.1	13.0	12.9	13.4	13.1	13.0	13.0	2.43	30	65	5	-	-						
65.7	684	2.98	26.8	60.7	2.75	2.42	3.31	96.4	13.6	12.7	13.0	13.1	13.0	13.4	13.1	13.0	13.0	2.26	32	64	3	0.6	-						
65.0	678	2.90	27.7	60.3	2.73	2.32	3.28	95.9	13.5	12.8	13.1	13.1	12.5	13.5	13.1	13.2	13.0	2.22	32	64	4	-	-						

Bemærkninger 1. kvartal 52. beretning.

Sjælland.

- 533 1 galtgris død af tarmbetændelse. Alder 153 dage, vægt 76.0 kg.
 541 2 galtgrise havde nysesygge.
 550 1 sogris, 526 g dgl.tilv. og 3.87 f.e. pr. kg tilv.,syg på forsøgsstat. af lungebetændelse
 Ikke medregnet i gennemsnittet.
 551 Alle 4 grise havde nysesygge.
 558 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
 560 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
 569 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. gulsot. Alder 184 dage, vægt 45.0 kg.
 572 1 galtgris havde nysesygge
 596 1 galtgris, 670 g dgl.tilv. og 2.86 f.e.pr.kg.tilv., udsat af holdet p.gr.a. kyfose.
 Ikke medregnet i gennemsnittet. Samme gris havde nysesygge.

Fyn.

- 587 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. nysesygge. Alder 197 dage, vægt 83.0 kg.
 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
 590 1 galtgris havde nysesygge.
 597 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
 598 2 galtgrise havde nysesygge.
 602 1 galtgris havde nysesygge.
 609 1 sogris, 555 g dgl.tilv. og 3.43 f.e.pr.kg.tilv., utrivelig på forsøgsstationen.
 Ikke medregnet i gennemsnittet.
 610 1 galtgris havde nysesygge.
 619 1 sogris havde nysesygge.
 622 1 sogris havde nysesygge.
 625 1 sogris død af bughindebetændelse. Alder 128 dage, vægt 33.0 kg.
 630 2 sogrise havde nysesygge.
 633 1 galtgris, 537 g dgl.tilv. og 3.68 f.e.pr.kg.tilv., udsat af holdet p.gr.a.
 lungebetændelse. Ikke medregnet i gennemsnittet.

Jylland.

- 585 1 sogris, 530 g dgl.tilv. og 3.53 f.e.pr.kg.tilv., utrivelig på forsøgsstationen.
 Ikke medregnet i gennemsnittet.
 614 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
 618 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
 623 1 sogris havde nysesygge.
 636 Alle 4 grise havde nysesygge.
 643 1 sogris havde nysesygge.
 666 1 sogris havde nysesygge.
 667 1 sogris havde nysesygge.

Vestjylland.

- 197 1 galtgris havde nysesygge samt tuberkulose i hoved og krøs.
- 198 1 galtgris og 2 sogrise havde nysesygge.
- 105 1 galtgris død af bughindebetændelse. Alder 146 dage, vægt 57.0 kg.
- 112 1 galtgris havde nysesygge.
- 117 1 galtgris, 509 g dgl.tilv. og 3.65 f.e.pr.kg.tilv. syg på forsøgsstationen af lungebylder.
Ikke medregnet i gennemsnittet.
- 118 1 sogris havde nysesygge
- 124 1 galtgris død af tarmslyng. Alder 129 dage, vægt 39,5 kg.
- 126 1 galtgris, 576 g dgl.tilv. og 3.53 f.e.pr.kg.tilv., syg på forsøgsstationen af bylder i
lyske og skinke. Ikke medregnet i gennemsnittet.
- 152 1 galtgris og 2 sogrise havde nysesygge.

Med virkning fra 1. september 1962 er kravene til sidespækmålet skærpet, således at den højeste tilladte tykkelse for klasse A er 3,1 cm og for klasse B 3,7 cm.

På grund af strejke på Randers Andels-Svineslagteri blev en del af svinene fra forsøgsstationen i Vestjylland leveret overvægtige. For disse svin er rygflæskets og bugens tykkelse, sidespækmål samt troplængde korrigeret til normal kold slagtevægt, 66.0 kg. F.e. pr. kg tilvækst samt daglig tilvækst gælder som normalt for perioden 20 - 90 kg.

De sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre

**FORELØBIGE MEDDELELSER
FRA FORSØGSLABORATORIET 1962/63 NR.2
1. DECEMBER 1962 TIL 28. FEBRUAR 1963**

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise				Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede				
							galte	søer			
									galte		
Aalsbogaard	F	672	27-5-62	Nr.45 Prika, 11-6-61	16, 15-5-61	2	2	2	2	93	193
Abildore	S	603	8-6-62	Tim, 26-7-60	89, 17-5-61	2	2	2	2	77	181
do	S	613	4-6-62	do	75, 1-12-60	2	2	2	2	81	191
do	S	660	22-7-62	do	85, 1-12-60	2	2	2	2	70	177
do	S	604	11-6-62	Ridder, 7-1-60	90, 17-5-61	2	2	2	2	77	176
do	S	676	16-8-62	do	93, 29-8-61	2	2	2	2	83	182
do	S	624	17-6-62	Valde, 17-5-61	91, 16-5-61	2	2	2	2	80	184
do	S	652	11-7-62	Wied, 16-8-61	82, 27-11-60	2	2	2	2	70	173
do	S	665	25-7-62	do	84, 22-12-60	2	2	2	2	85	188
Ans	J	742	12-8-62	Thorkild, 6-2-61	25, 30-8-61	2	2	2	2	78	181
Anslet	V	713	20-7-62	Pikant, 12-7-61	14, 15-1-61	2	2	2	2	74	180
do	V	717	30-7-62	do	16, 9-2-61	2	2	2	2	74	175
Avnbøløsten	V	690	7-6-62	Kjeld, 27-12-60	39, 22-6-61	2	2	2	2	101	205
Baarse Vesterskov	S	589	25-5-62	Pinoccio, 20-2-61	30, 20-10-60	2	2	2	2	87	190
do	S	590	21-5-62	do	29, 20-10-60	2	2	2	2	92	191
do	S	591	31-5-62	do	39, 1-6-61	2	2	2	2	83	186
do	S	623	5-6-62	Sjøberg, 2-8-60	26, 18-4-60	2	2	2	2	91	194
Bajlum Overgaard	J	728	28-7-62	Bajlum Palle, 28-2-61	102, 17-9-60	2	2	2	2	79	185
Baungaard	S	656	12-7-62	Dau, 30-7-61	74, 5-8-61	2	2	2	2	82	182
Betzyslyst	F	713	12-7-62	Nr.25 Parsifal, 3-5-60	77, 28-8-60	2	2	2	2	85	188
do	F	740	18-8-62	Nr.30 Admiral, 17-8-61	83, 26-7-61	2	2	2	2	79	182
do	F	743	8-9-62	do	84, 27-8-61	2	2	2	2	63	167
Billum	V	719	3-8-62	Tus, 8-8-61	86, 12-9-61	2	2	2	2	70	176
Bindesbøl	V	653	23-5-62	Held, 10-7-61	39, 24-6-61	2	2	2	2	90	194
do	V	705	26-7-62	do	34, 6-12-60	2	2	2	2	72	180
Bjørnsholm	J	706	11-7-62	Tryg, 6-3-61	17, 22-10-60	2	2	2	2	73	172
Blegind Søgaard	J	714	10-7-62	Visti, 16-5-61	20, 13-2-61	2	2	2	2	77	180
do	J	726	23-7-62	do	21, 13-2-61	2	2	2	2	86	189
do	J	752	27-8-62	do	17, 8-1-60	2	2	2	2	80	180
Blinksbjerggaard	F	658	8-6-62	Nr.50 Jonatan, 16-7-60	49, 22-12-60	2	2	2	2	71	177
do	F	683	25-6-62	Nr.60 Sofus, 28-7-61	48, 22-12-60	2	2	2	2	72	180
Bramhale	V	714	27-7-62	Togo, 29-7-61	25, 18-8-61	2	2	2	2	88	200
do	V	715	25-7-62	do	24, 18-8-61	2	2	2	2	83	201
do	V	729	5-8-62	Hjalte, 21-3-61	21, 31-1-61	2	2	2	2	85	193
Brandborggaard	J	713	20-7-62	Laust, 22-10-58	77, 11-9-60	2	2	2	2	75	177
Broby	S	671	12-8-62	Dario, 29-1-60	92, 6-8-60	2	2	2	2	73	173
Broby Søndergaard	S	611	19-6-62	Ping, 25-2-59	75, 6-1-61	2	2	2	2	76	180
Dame	F	717	28-7-62	Hamster, 28-7-59	50, 11-8-60	2	2	2	2	72	174

I gennemsnit																			Kødfarve, 0-5 points		Klasse				Hold-nr.
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflask	sidespækmaal	bug		flaskets fasthed	bov	rygflaskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	hel	overskåret	type								
66.3	697	2.90	26.6	60.8	2.7	2.3	3.3	91.4	13.6	12.0	13.1	13.3	13.9	13.5	13.4	13.1	12.0	1.8	1	3 ¹	-	-	-	672	
65.1	674	3.02	27.5	60.2	2.5	2.1	3.2	96.4	13.4	12.6	13.9	13.4	12.9	13.6	13.5	13.3	13.5	1.5	3	1	-	-	-	603	
64.4	640	3.13	27.9	59.7	2.4	2.1	3.4	97.4	14.1	13.1	13.6	13.5	13.5	13.4	14.1	13.5	13.8	2.3	3	1	-	-	-	613	
64.9	655	3.14	28.1	59.6	2.5	1.7	3.3	97.8	13.6	12.9	13.5	13.5	12.4	13.6	13.8	14.1	13.4	2.5	3	1	-	-	-	660	
63.6	711	2.87	28.1	59.8	2.3	1.8	3.3	96.8	13.9	13.3	14.4	13.8	14.5	13.1	14.6	14.4	14.5	2.3	4	-	-	-	-	604	
63.4	707	2.88	28.3	59.7	2.5	2.1	3.3	97.4	13.6	13.5	13.8	13.8	12.8	13.1	14.0	14.0	14.0	3.3	2	2	-	-	-	676	
66.6	673	2.97	26.4	61.6	2.4	1.9	3.3	94.0	13.5	12.5	13.8	13.3	14.5	13.6	14.0	14.4	13.6	1.5	2	2	-	-	-	624	
67.5	682	2.94	26.9	60.9	2.4	2.1	3.2	97.3	13.5	13.0	13.4	13.5	14.0	12.9	14.4	13.9	14.0	1.8	4	-	-	-	-	652	
64.7	674	3.12	27.9	59.5	2.8	2.4	3.4	99.0	14.3	13.0	12.3	13.5	13.3	13.7	12.8	12.3	12.3	2.0	-	2	1	-	-	665	
65.6	683	2.91	27.1	60.7	3.1	2.4	3.4	96.8	13.8	12.5	12.0	12.8	12.8	13.3	12.0	12.9	12.3	2.8	-	3	1	-	-	742	
65.0	665	2.96	27.8	60.3	2.2	2.0	3.2	97.4	13.1	13.5	14.8	13.6	13.6	13.0	14.6	14.4	14.1	2.3	4	-	-	-	-	713	
66.8	699	2.81	26.2	61.4	2.4	2.1	3.3	96.4	13.6	13.3	14.9	13.8	13.6	13.5	14.6	14.1	14.3	2.0	3	1	-	-	-	717	
63.1	675	2.94	28.2	59.6	2.7	2.2	3.2	96.1	13.9	13.0	13.5	13.0	13.0	13.5	13.3	13.5	13.4	2.5	1	3	-	-	-	690	
65.5	684	2.97	27.2	60.3	2.6	2.2	3.3	97.3	13.5	12.8	13.1	13.8	13.1	13.4	13.4	13.0	13.4	2.5	1	3	-	-	-	589	
64.6	702	2.91	27.3	60.9	2.7	2.1	3.4	94.5	13.5	13.0	13.3	13.3	14.3	13.8	13.3	14.0	13.6	2.5	-	4	-	-	-	590	
65.3	683	2.95	27.1	60.5	2.6	1.7	3.3	98.1	13.6	12.6	13.6	13.5	12.3	13.5	13.4	14.4	13.1	2.8	1	3	-	-	-	591	
65.8	686	2.96	26.0	61.3	2.7	2.3	3.4	94.8	13.6	12.6	13.3	13.5	13.5	14.0	13.5	13.1	13.1	2.5	1	3	-	-	-	623	
64.5	669	3.07	27.6	60.3	2.9	2.7	3.3	95.3	14.0	12.4	12.1	13.1	13.1	13.8	12.3	12.0	12.3	2.8	-	4	-	-	-	728	
67.1	698	3.01	25.4	62.8	2.8	2.9	3.4	94.5	13.9	12.8	12.6	13.5	13.9	13.9	13.0	11.9	12.5	1.5	-	4 ¹	-	-	-	656	
65.8	683	3.02	27.0	60.8	2.6	2.2	3.3	98.3	14.0	12.6	13.3	13.4	13.4	13.4	13.5	13.3	13.0	2.0	1	3	-	-	-	713	
65.9	678	2.98	26.0	61.5	2.5	2.3	3.4	95.0	13.5	12.5	13.9	13.5	13.1	13.4	13.8	13.3	13.4	1.8	3	1	-	-	-	740	
64.6	675	2.97	27.2	60.0	2.5	2.3	3.3	96.8	13.6	12.8	13.6	12.8	13.0	13.1	13.5	12.8	13.3	3.0	3	1	-	-	-	743	
64.8	661	3.06	27.2	60.3	2.6	2.3	3.4	95.4	13.8	12.9	13.3	13.4	12.3	13.6	13.4	12.9	13.0	2.3	1	3	-	-	-	719	
66.3	673	3.09	26.6	61.2	3.4	2.9	3.4	97.5	14.3	12.4	11.0	13.3	11.9	13.9	10.3	10.4	10.6	2.8	-	2	1	1	-	653	
65.5	644	3.18	26.7	61.1	3.1	3.2	3.3	97.1	14.1	12.4	12.1	12.8	11.8	13.9	11.9	9.8	10.8	2.5	-	4 ²	-	-	-	705	
63.6	709	2.93	28.3	59.2	2.7	2.3	3.2	96.1	13.4	12.6	13.1	12.4	12.5	13.3	13.1	13.5	12.9	2.5	1	3	-	-	-	706	
66.1	683	2.94	27.2	60.3	2.8	2.4	3.4	95.5	13.4	12.6	12.9	13.5	13.0	13.5	12.9	13.1	13.4	2.5	-	4	-	-	-	714	
65.8	680	3.01	26.8	60.7	2.8	2.3	3.4	95.6	13.8	12.9	12.5	13.0	13.5	13.5	13.0	13.4	13.1	1.8	1	3	-	-	-	726	
66.6	699	2.88	25.8	61.9	2.8	2.3	3.4	94.9	13.4	12.8	12.9	13.6	13.8	13.5	13.4	13.9	13.3	1.5	2	2	-	-	-	752	
64.4	659	3.18	28.1	59.3	2.8	2.6	3.3	96.1	13.9	12.6	13.1	13.0	12.6	13.3	13.0	12.5	13.0	3.0	1	3	-	-	-	658	
63.9	649	3.18	28.6	59.0	3.0	2.8	3.4	94.9	13.6	12.4	12.0	13.0	12.1	13.6	12.0	12.3	12.1	2.3	-	3	1	-	-	683	
65.4	632	3.04	27.1	60.5	2.7	2.4	3.2	96.9	13.4	12.4	13.1	13.1	11.9	13.5	13.0	13.0	12.5	2.8	1	3	-	-	-	714	
64.9	594	3.14	27.0	61.2	2.8	2.3	3.4	94.1	13.3	12.6	13.0	12.4	12.4	13.6	12.8	13.5	12.6	1.8	1	3	-	-	-	715	
63.9	648	2.91	27.9	59.8	2.5	2.1	3.2	96.8	13.4	13.4	13.8	13.1	12.5	13.0	13.9	13.9	13.4	2.5	3	1	-	-	-	729	
64.8	691	2.91	27.4	60.6	2.8	2.2	3.3	95.1	13.5	12.6	12.8	13.3	13.8	13.6	13.3	13.6	13.4	2.8	2	1	1	-	-	713	
64.5	701	2.91	27.5	60.4	2.2	1.8	3.3	95.6	13.4	13.3	14.5	13.8	14.3	13.8	14.8	14.4	14.4	1.5	4	-	-	-	-	671	
65.6	673	3.02	25.7	62.1	2.5	2.3	3.4	97.4	13.9	13.4	13.4	13.6	13.6	13.4	13.9	13.4	13.9	2.5	1	3	-	-	-	611	
65.6	693	3.03	26.9	60.8	3.1	2.6	3.3	95.9	13.9	12.3	11.9	13.0	12.5	13.9	12.3	12.5	12.3	2.5	2	2	-	-	-	717	

S Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.97
F Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.06

J Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.00
V Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levende vægt		
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede					
							gatte	soer			gatte	soer
Danhøjgaard	J 722	24-7-62	Danbo, 6-2-61	18, 27-8-60	2	2	2	77	183			
Dejbjerg	V 737	14-8-62	Benjamin, 1-8-61	36, 4-8-61	2	2	2	72	182			
do	V 738	11-8-62	do	35, 5-8-61	2	2	2	80	182			
do	V 739	1-9-62	Nobel, 26-8-59	30, 4-8-60	2	2	2	67	166			
Diegaard	S 606	15-6-62	Malte 80, 23-1-59	74, 3-2-60	2	2	2	69	171			
Duegaard	S 630	12-6-62	Strik, 23-12-60	75, 26-9-60	2	2	2	88	199			
do	S 672	26-7-62	do	73, 2-2-61	2	2	2	87	188			
Duemosgaard	J 732	22-7-62	Jan, 20-8-60	30, 19-1-61	2	2	2	84	187			
Dybbøl	V 676	15-6-62	Minister, 27-12-60	69, 15-10-60	2	2	2	67	179			
Dybdalgaard	F 681	1-7-62	Nr.85 Higgins, 16-7-60	86, 10-1-61	2	2	2	65	168			
do	F 729	22-8-62	Nr.5 Vivaldi, 13-9-61	94, 21-1-61	2	2	2	68	173			
Egemosegaard	S 622	11-6-62	Alling Egemose, 28-4-59	60, 22-12-60	2	2	2	83	184			
do	S 637	15-6-62	do	59, 22-12-60	2	2	2	84	189			
do	S 650	4-7-62	Felix, (7557)	55, 30-1-60	2	2	2	79	182			
do	S 679	3-8-62	Knøv, 17-1-60	62, 17-12-60	2	2	2	88	191			
Egevang	V 654	19-5-62	Oberst, 12-6-61	20, 28-12-60	2	2	2	84	190			
do	V 704	13-7-62	do	23, 3-12-60	2	2	2	76	181			
do	V 682	15-6-62	James, 18-7-59	21, 1-1-61	2	2	2	87	187			
do	V 683	14-6-62	do	22, 1-1-61	2	2	2	85	187			
Elkenøre	S 684	15-8-62	Hood Elkenøre, 6-1-61	42, 31-8-60	2	2	2	85	186			
Engholm	F 696	17-7-62	Nr.40 Pascha, 23-8-60	78, 24-1-61	2	2	2	72	179			
do	F 726	16-8-62	do	77, 24-1-61	2	2	2	67	171			
Eskjærsgaard	F 692	2-7-62	Ulrik, 29-3-61	8, 21-4-61	2	2	2	84	188			
do	F 710	25-7-62	do	10, 3-8-61	2	2	2	67	171			
do	F 735	6-8-62	do	11, 26-7-61	2	2	2	81	186			
do	F 711	21-7-62	Fætter, 18-7-61	9, 3-8-61	2	2	2	71	177			
do	F 739	18-8-62	do	13, 17-7-61	2	2	2	78	185			
Frisvad	V 720	28-7-62	Dan, 8-11-57	99, 14-7-61	2	2	2	77	176			
do	V 721	29-7-62	do	10, 14-7-61	2	2	2	80	186			
do	V 730	1-8-62	do	1, 5-8-61	2	2	2	81	185			
do	V 731	3-8-62	do	2, 5-8-61	2	2	2	79	188			
do	V 733	4-8-62	do	3, 5-8-61	2	2	2	86	194			
Frueholm	J 676	13-6-62	Major, 10-7-60	56, 8-4-60	2	2	2	77	177			
do	J 677	13-6-62	Bill, 25-3-60	57, 8-4-60	2	2	2	75	176			
do	J 679	11-6-62	do	61, 8-4-60	2	2	2	75	184			
do	J 678	14-6-62	Kjeld, 8-6-60	60, 30-9-60	2	2	2	75	173			
Fulby	S 635	7-7-62	Rud, 5-1-60	63, 7-7-59	2	2	2	76	180			
do	S 636	6-7-62	do	68, 27-1-60	2	2	2	72	177			
do	S 666	24-7-62	Darius, 29-4-61	70, 9-9-60	2	2	2	80	180			
Funder	V 716	17-7-62	Bro, 19-12-57	46, 8-2-61	2	2	2	82	186			

I gennemsnit																		Kødfarve, 0-5 points		Klasse				Hold-nr.
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af															
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflask	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	rygflæsks fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type							
															hel	overskåret								
AI	A	B	C																					
64.8	665	3.03	27.8	60.1	2.9	2.5	3.4	94.8	13.6	12.8	12.4	13.0	14.1	13.5	12.6	12.8	12.9	1.8	-	-	3	1	722	
64.8	635	2.97	27.2	60.8	2.5	1.8	3.3	98.3	13.5	13.3	14.0	13.1	13.5	13.4	13.6	14.4	13.6	2.0	2	-	-	-	737	
66.4	691	2.81	26.9	60.9	2.6	2.1	3.4	96.9	13.5	12.8	13.9	13.5	13.6	13.4	13.8	13.9	13.3	1.8	2	2	-	-	738	
64.5	704	2.75	27.6	60.8	2.7	2.4	3.2	94.4	13.5	12.6	13.5	13.0	13.0	13.4	13.6	13.0	13.0	1.3	1	3	-	-	739	
66.0	691	2.94	26.3	61.5	2.6	2.1	3.3	95.5	14.1	12.5	13.0	13.4	13.0	13.4	13.4	13.8	13.4	2.3	1	3	-	-	606	
66.6	635	3.17	26.0	62.1	2.8	2.8	3.4	95.3	14.5	13.0	12.8	12.9	13.8	13.8	12.8	11.9	12.3	2.3	1	3 ²	-	-	630	
64.5	696	3.00	26.7	61.5	2.7	2.1	3.3	94.3	13.5	12.8	13.0	13.5	13.9	13.6	13.5	13.4	13.4	2.3	1	3	-	-	672	
65.5	680	2.94	27.5	60.5	2.7	2.3	3.3	95.9	13.6	12.4	12.9	13.5	13.4	13.6	13.3	13.5	13.3	2.3	-	4	-	-	732	
64.6	628	3.10	27.7	59.9	3.0	2.7	3.3	96.6	14.1	12.5	12.1	12.6	11.3	13.9	12.0	11.3	11.6	2.5	2	1	1 ¹	-	676	
64.8	676	3.01	27.6	60.4	2.7	2.2	3.3	96.4	13.8	12.8	12.8	13.1	12.6	13.5	13.0	13.4	13.1	2.5	1	3	-	-	681	
65.7	672	3.04	27.1	60.1	2.5	1.9	3.2	96.8	13.3	12.6	14.3	13.0	12.6	13.1	13.9	14.0	13.3	2.8	2	2	-	-	729	
64.1	691	2.99	27.9	60.1	2.7	2.5	3.3	97.9	14.0	12.9	13.3	13.6	13.5	13.8	13.1	12.9	13.4	2.5	-	4	-	-	622	
66.3	666	3.06	27.3	60.9	2.8	2.2	3.2	96.3	13.8	12.9	12.5	13.3	14.1	13.9	13.0	13.5	13.4	2.3	1	3	-	-	637	
65.7	680	3.05	27.2	60.4	2.6	2.0	3.3	98.0	13.5	12.8	12.8	13.3	13.2	13.0	13.5	13.8	13.8	2.5	1	2	-	-	650	
65.8	677	2.94	27.2	60.5	2.5	2.0	3.3	97.3	13.6	13.4	13.5	13.5	13.9	13.3	14.1	14.0	14.1	2.0	3	1	-	-	679	
66.5	661	2.96	26.8	61.3	2.6	2.4	3.5	94.8	13.4	12.8	13.5	13.6	13.6	13.5	13.4	12.9	12.9	2.0	1	3 ¹	-	-	654	
66.1	667	2.96	26.9	60.8	2.6	2.3	3.3	96.6	13.3	12.8	13.3	13.6	12.1	13.9	13.4	13.4	12.9	1.8	3	1	-	-	704	
65.0	698	2.87	26.6	61.7	3.0	2.8	3.4	94.6	13.8	12.6	12.5	13.1	13.4	13.8	12.6	12.0	12.1	1.3	-	3	1	-	682	
65.3	685	2.88	26.9	60.9	2.9	2.6	3.1	94.9	13.5	12.9	12.8	12.8	12.8	13.6	12.9	12.9	12.9	1.5	-	4	-	-	683	
65.8	705	2.83	26.9	61.0	2.6	1.9	3.4	95.8	13.0	13.0	13.8	13.5	14.1	12.9	14.3	14.0	13.8	2.5	3	1	-	-	684	
64.4	659	3.09	27.6	59.9	2.5	1.7	3.2	95.5	13.3	13.0	14.0	13.1	13.5	13.0	14.0	14.4	13.6	2.8	2	2	-	-	696	
65.4	676	3.03	27.5	59.8	2.5	1.9	3.2	97.4	13.4	12.9	14.1	13.0	12.9	13.3	14.0	14.0	13.8	2.8	2	2	-	-	726	
64.9	672	3.09	26.6	61.0	3.0	2.4	3.3	97.0	14.1	12.5	12.3	13.0	12.8	13.5	12.1	13.0	12.3	2.3	-	3	1	-	692	
66.8	673	3.04	26.6	61.3	2.8	2.0	3.2	96.5	14.0	12.8	12.6	13.0	13.4	13.8	12.9	13.4	13.3	2.3	1	3	-	-	710	
65.9	667	3.05	26.5	60.9	2.8	2.5	3.3	97.3	13.9	12.9	13.1	13.3	13.8	13.9	13.1	12.9	13.1	2.3	2	2	-	-	735	
65.6	663	3.19	27.3	60.6	2.8	2.5	3.2	95.3	13.6	12.8	12.9	13.0	12.9	13.6	13.0	12.8	13.0	2.3	1	3	-	-	711	
65.1	657	3.16	27.2	60.1	2.9	2.6	3.2	96.3	13.9	12.5	12.1	13.6	12.6	13.5	12.3	12.8	12.5	2.3	1	2	1	-	739	
64.0	700	2.82	28.2	59.6	2.1	1.6	3.1	96.8	13.1	13.3	14.3	12.6	13.3	13.5	14.4	14.4	13.6	2.5	4	-	-	-	720	
64.1	660	3.08	27.7	59.9	2.7	2.4	3.3	96.9	13.8	12.8	12.9	13.0	12.9	13.9	13.3	12.8	12.8	2.5	1	3 ¹	-	-	721	
64.5	672	2.94	27.3	60.6	2.6	2.2	3.3	98.1	13.6	13.0	13.3	13.1	12.4	13.5	13.1	13.4	13.1	1.8	1	3	-	-	730	
63.9	653	2.96	27.9	59.5	2.6	2.2	3.1	97.1	13.5	12.8	13.5	13.0	13.3	13.8	13.6	13.0	13.1	2.3	2	2	-	-	731	
64.1	640	3.08	27.4	60.3	2.8	2.5	3.3	97.4	13.6	12.4	12.6	13.0	12.4	13.6	12.6	12.6	12.4	2.3	1	3	-	-	733	
66.8	700	2.90	27.9	59.8	2.6	2.3	3.3	96.4	13.4	12.9	13.5	13.8	13.5	13.3	13.5	13.1	13.4	2.0	2	2	-	-	676	
64.5	691	2.97	28.2	59.3	2.4	1.9	3.2	98.4	13.3	13.0	13.9	13.5	13.0	13.1	13.9	14.3	13.4	2.8	3	1	-	-	677	
63.4	645	3.17	28.1	59.3	2.6	2.3	3.2	97.0	13.0	13.0	13.6	13.3	12.5	13.0	13.5	13.0	13.3	3.0	2	2	-	-	679	
65.5	714	2.90	27.2	60.7	2.5	2.5	3.3	95.3	13.8	13.0	13.8	13.6	13.6	13.8	13.9	12.9	13.4	2.3	2	1 ¹	-	-	678	
66.4	676	3.02	26.2	61.6	2.8	2.1	3.5	94.3	13.3	12.5	12.5	13.1	13.5	13.5	12.8	14.1	13.0	3.0	1	3	-	-	635	
65.6	667	3.09	26.9	61.1	2.7	2.5	3.5	96.3	13.4	12.9	12.9	12.9	12.8	13.6	13.1	12.8	13.0	3.0	-	4	-	-	636	
64.8	698	2.87	28.3	59.4	2.5	1.8	3.3	96.5	13.8	12.9	13.6	12.8	12.4	13.6	13.4	13.8	13.4	2.5	4	-	-	-	666	
66.5	671	2.94	26.4	61.6	2.8	2.3	3.2	95.4	13.6	12.4	12.9	13.4	12.8	13.4	12.9	13.3	13.1	2.3	-	4	-	-	716	

S Sjælland:

F.e.pr.kg tilv. 2.97

J Jylland:

F.e.pr.kg tilv. 3.00

F Fyn:

F.e.pr.kg tilv. 3.06

V Vestjylland:

F.e.pr.kg tilv. 2.93

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise				Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levende vægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget		slagtede			
						galte	soer	galte	soer		
Galdbjerg	F 670	15-6-62	Nr.85 Malling, 15-12-60	11,	17-6-61	2	2	1	2	78	180
Gammelgaard	V 679	15-6-62	Ca-Wa, 8-11-60	36,	14-6-58	2	2	2	2	79	181
Gemmegaard	J 685	1-6-62	Brandt, 17-7-61	77,	12-3-61	2	2	2	2	81	182
do	J 709	2-7-62	do	70,	12-2-60	2	2	2	1	84	185
do	J 710	19-7-62	do	75,	14-7-60	2	2	2	2	73	174
do	J 736	19-8-62	do	74,	14-7-60	2	2	2	1	72	178
Gjelleruplund	V 680	8-6-62	Lange, (7397)	68,	20-1-61	2	2	2	2	80	184
Gram	V 693	15-6-62	Frode, 3-4-61	37,	5-12-59	2	2	2	2	94	196
do	V 741	5-8-62	Petring, 17-8-58	46,	31-7-61	2	2	2	2	95	194
Granhøjgaard	J 680	1-6-62	Delf, 18-11-60	84,	23-5-61	2	2	2	2	88	186
Grauballe Nygaard	J 724	11-8-62	Nydam, 24-9-61	117,	3-1-61	2	2	2	2	77	183
do	J 725	8-8-62	do	121,	30-5-61	2	2	2	2	74	180
Gruegaard	V 685	19-6-62	Naur, 9-2-61	50,	15-1-61	2	2	2	2	74	179
do	V 698	4-7-62	do	46,	18-7-60	2	2	2	2	75	180
Grøftbjerg	F 682	30-6-62	Nr.25 Kantor, 28-2-61	16,	15-8-60	2	2	2	2	60	168
do	F 702	1-8-62	do	14,	14-1-60	2	2	2	2	55	166
Grønhøj	F 747	25-8-62	Fenrik, 21-5-58	97,	29-9-60	2	2	2	2	74	181
Gustavesensminde	J 719	5-7-62	Grøn, (7355)	90,	21-1-61	2	2	2	2	101	201
Gylling Overballe	F 731	8-8-62	Øbo, 21-1-61	29,	23-12-60	2	2	2	2	78	183
Gylling Skov	F 651	18-5-62	Front, 9-2-61	84,	17-5-61	2	2	2	2	86	188
do	F 665	27-5-62	do	80,	27-11-59	2	2	2	2	89	193
Gyrstinge	S 653	16-7-62	Mobuto, 21-1-61	89,	13-12-60	2	2	2	2	76	176
Hagelbjerggaard	S 598	23-5-62	Bissen, 28-12-60	10,	10-1-61	2	2	2	2	85	192
do	S 640	29-6-62	Frede, 18-12-58	99,	20-8-60	2	2	2	2	77	179
do	S 644	19-7-62	Granberg , 22-2-61	1,	31-12-60	2	2	2	2	67	167
Hagerup Højvang	S 607	13-6-62	Adrian, 3-9-60	68,	30-1-61	2	2	2	1	76	176
do	F 715	13-7-62	Osman, 28-7-59	74,	12-7-61	2	2	2	2	84	187
Hammel	J 735	6-8-62	Dubi, 14-5-61	85,	13-9-60	2	2	2	2	91	194
Hanstedgaard	S 643	9-7-62	Julius, 26-7-60	125,	10-1-60	2	2	2	2	77	178
do	S 667	20-7-62	Tønnes, 15-7-61	134,	4-7-61	2	2	2	2	89	188
Hejedegaard	S 683	31-8-62	Gorm, 2-8-61	75,	15-9-61	2	2	2	2	63	169
Helhøjgaard	J 743	7-8-62	Hejbo, 14-11-60	30,	11-2-61	2	2	2	2	91	196
do	J 744	7-8-62	do	29,	12-1-61	2	2	2	2	94	197
Hennebjerg	V 697	6-7-62	Valter, 15-4-61	27,	16-1-61	2	2	2	2	69	168
do	V 712	1-8-62	do	29,	16-1-61	2	2	2	2	71	177
Herborg	V 675	13-6-62	Sam, 10-1-61	69,	13-6-61	2	2	2	2	82	190

I gennemsnit																			Klasse				Hold-nr.	
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af															
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflæsk	sidespækmaal	bug		flæskest fasthed	bov	rygflæskest fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	hel	overskåret	type							
66.2	688	3.04	26.8	61.2	3.0	2.6	3.4	95.3	14.2	12.2	12.5	12.7	12.8	13.7	12.3	12.2	12.3	2.8	-	3	-	-	-	670
63.9	685	2.84	28.0	60.0	2.7	2.1	3.1	96.1	13.5	13.0	13.3	12.8	12.5	13.1	13.4	13.6	13.1	2.8	1	3	-	-	-	679
66.4	693	2.99	27.2	60.5	3.1	3.1	3.4	96.1	14.3	12.6	12.3	12.8	13.1	13.8	11.9	10.9	11.6	2.8	-	3 ¹	1 ¹	-	-	685
64.5	698	2.94	28.5	59.1	2.6	2.2	3.2	97.2	13.2	12.7	13.5	12.8	12.8	13.0	13.3	13.8	13.3	2.5	1	2	-	-	-	709
63.6	694	2.95	28.8	58.8	2.8	2.3	3.2	96.6	13.6	13.0	13.0	13.3	12.0	13.6	12.8	13.4	12.9	2.5	1	3	-	-	-	710
65.3	660	3.12	27.8	59.5	2.7	2.4	3.4	96.5	14.0	12.8	13.3	13.7	12.2	13.3	13.2	13.0	12.8	2.5	1	2	-	-	-	736
64.0	681	2.78	27.6	60.5	2.6	2.2	3.2	95.5	13.5	13.3	13.6	13.1	14.0	13.4	13.6	13.6	13.4	1.0	1	3	-	-	-	680
65.4	687	2.87	27.5	60.3	2.6	2.4	3.3	93.5	13.9	12.5	13.5	12.9	12.9	13.9	13.4	12.8	12.8	1.8	2	2	-	-	-	693
65.8	706	2.78	27.7	60.0	2.5	1.7	3.2	100.6	13.0	13.3	13.9	13.0	12.5	13.1	14.0	14.5	13.3	2.3	3	1	-	-	-	741
65.5	714	2.96	27.6	60.1	2.9	2.6	3.4	96.5	13.6	12.9	12.8	13.9	13.0	13.6	12.9	12.8	13.0	2.5	-	4	-	-	-	680
62.8	661	3.04	28.7	59.1	2.4	2.0	3.3	96.5	13.1	13.0	14.1	13.4	12.6	13.1	14.0	13.9	13.5	2.3	3	1	-	-	-	724
64.8	666	3.05	27.8	59.9	2.8	2.4	3.4	98.9	13.9	12.6	13.0	12.9	13.1	13.6	12.9	13.4	13.1	2.8	2	2	-	-	-	725
65.6	668	2.88	27.4	60.3	2.3	1.9	3.1	97.8	13.3	13.3	14.3	13.0	13.1	12.8	14.3	14.3	13.6	1.5	4	-	-	-	-	685
64.0	664	3.02	28.3	59.7	2.4	2.1	3.2	97.1	13.4	13.1	13.8	12.9	11.5	13.6	13.9	13.9	12.6	2.5	3	1	-	-	-	698
64.6	654	3.04	27.7	60.1	2.7	2.2	3.4	94.3	13.5	12.6	12.9	12.9	12.9	13.8	13.0	13.4	12.6	2.5	-	4	-	-	-	682
64.3	626	3.18	27.9	59.5	2.5	2.2	3.3	96.1	13.9	13.3	13.9	12.9	12.5	13.8	13.8	13.5	13.3	2.8	3	1	-	-	-	702
64.5	659	3.06	27.3	60.3	2.8	2.6	3.1	95.5	13.8	12.6	12.5	12.8	12.4	13.6	12.4	12.5	12.5	2.8	-	3	1	-	-	747
65.9	704	2.93	27.0	60.5	2.9	2.1	3.3	95.3	13.5	12.8	12.9	12.6	13.5	13.5	12.9	13.3	13.0	2.8	-	4	-	-	-	719
64.5	668	3.07	27.6	59.8	2.4	2.0	3.3	96.1	13.5	12.9	14.1	12.9	13.1	13.3	14.0	14.0	13.5	2.3	3	1	-	-	-	731
66.8	686	3.03	26.6	60.7	3.0	2.6	3.4	96.4	14.0	12.3	12.0	12.4	13.3	13.6	12.3	12.8	12.4	2.8	1	-	3	-	-	651
66.1	672	3.05	27.5	60.3	2.6	2.2	3.2	97.3	13.1	12.6	13.4	13.0	12.8	13.1	13.5	13.3	13.0	2.3	1	3 ¹	-	-	-	665
65.3	701	3.00	27.9	60.1	2.5	1.9	3.4	96.4	13.5	12.8	13.8	13.1	13.0	13.5	13.6	14.0	13.6	3.0	2	2	-	-	-	653
65.1	661	3.08	27.4	60.2	3.3	2.6	3.3	96.1	14.0	12.1	11.1	13.1	12.5	13.9	10.8	11.6	11.0	2.8	-	2	2	-	-	598
65.6	686	2.96	26.9	61.3	2.9	3.0	3.4	95.1	13.6	12.3	12.8	13.3	13.0	13.5	12.6	11.6	12.3	2.3	-	4 ²	-	-	-	640
65.4	702	2.91	27.5	60.8	2.7	2.5	3.3	96.6	13.8	13.0	13.0	13.5	13.1	13.6	13.1	13.0	13.3	2.8	1	3	-	-	-	644
64.3	706	2.91	27.6	60.6	2.5	2.0	3.3	95.2	13.7	12.5	13.5	13.5	13.7	13.7	13.7	13.2	13.3	2.5	1	2	-	-	-	607
66.1	682	3.00	27.0	60.9	2.7	2.4	3.4	94.5	13.8	12.6	13.3	12.6	13.1	13.5	13.3	13.0	13.1	2.0	1	3	-	-	-	715
63.6	676	2.98	28.8	58.7	2.7	2.4	3.2	95.1	13.3	13.3	13.6	13.3	13.6	13.4	13.4	13.4	13.4	2.5	2	1 ¹	-	-	-	735
64.1	688	3.00	28.5	59.3	2.4	2.1	3.3	97.5	13.6	13.3	14.0	13.6	12.6	13.4	13.6	13.6	13.8	2.8	3	1	-	-	-	643
64.4	699	2.91	28.0	60.0	2.4	1.7	3.2	95.8	13.4	13.0	14.0	13.9	13.1	13.6	14.1	14.4	13.9	2.3	3	1	-	-	-	667
64.4	660	3.05	28.3	59.6	2.7	2.6	3.3	98.9	13.5	13.4	12.9	12.8	12.6	13.3	13.1	12.1	12.8	2.8	1	3	-	-	-	683
65.1	670	3.02	27.8	59.6	2.5	2.3	3.3	96.0	13.8	12.9	13.1	13.0	12.4	13.6	13.4	13.5	13.0	2.5	3	1	-	-	-	743
64.4	682	2.95	28.0	59.4	2.6	2.0	3.3	95.5	13.5	13.0	13.1	13.1	13.3	13.6	13.6	14.0	13.6	2.8	2	2	-	-	-	744
64.3	705	2.82	27.6	60.3	2.6	2.1	3.2	96.1	13.3	13.0	13.3	12.9	12.9	13.4	13.4	13.9	13.4	2.5	2	2	-	-	-	697
65.9	660	3.08	26.6	61.4	2.8	2.0	3.3	95.9	13.1	12.6	13.3	13.6	13.4	13.3	13.3	13.8	13.1	2.5	1	3	-	-	-	712
65.1	645	3.13	26.7	60.6	2.9	2.5	3.5	96.1	13.8	12.5	12.8	12.9	12.9	13.8	12.6	12.4	12.5	1.5	-	4	-	-	-	675

S Sjælland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.97

J Jylland:

F.e.pr.kg.tilv. 3.00

F Fyn:

F.e.pr.kg.tilv. 3.06

V Vestjylland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.93

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise		Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget			
						galte søer	slagtede søer		
Hjortshøj Østergaard do	V 668 J 705	26-5-62 2-7-62	Hjortshøj Mustafa, 11-7-60 Odd 61, 13-4-59	252, 26-3-60 244, 27-11-59	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	84 86	190 182	
Honum Vestergaard	F 737	8-8-62	Jørgen, 31-12-60	35, 1-2-61	2 2 2 2	2 2 2 2	83	188	
Houmarksgaard	J 723	26-7-62	Dram, 18-7-61	82, 7-8-61	2 2 2 2	2 2 2 2	85	185	
Hundslev do do	F 688 F 707 F 714	7-7-62 23-7-62 25-7-62	Nr.20 Primus, 8-6-61 do do	9, 29-6-61 11, 10-8-61 12, 10-8-61	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	73 65 74	179 173 182	
Hvidemosegaard	S 668	20-7-62	Sørensen, 22-1-61	55, 9-7-60	2 2 2 2	2 2 2 2	89	190	
Hækkebøllegaard do do	F 684 F 703 F 752	21-6-62 11-7-62 31-8-62	Nr.100 Lorentzen, 22-6-60 Nr.5 Tom, 15-1-61 Nr.85 Netto, 8-12-59	16, 25-4-61 13, 16-10-60 17, 19-8-61	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	65 80 68	174 182 182	
Høgstedgaard	J 720	23-7-62	Boy, 26-12-58	73, 17-1-60	2 2 2 2	2 2 2 2	84	189	
Højbogaard	F 673	19-6-62	Nr.90 Kaptejn, 14-7-60	38, 15-11-60	2 2 2 2	2 2 2 2	73	175	
Højvangslund do	J 712 J 730	14-7-62 21-7-62	Falster, 6-2-61 Wolle, 5-6-61	46, 10-9-60 49, 20-9-60	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	84 87	182 195	
Høve do	S 659 S 670	11-7-62 2-8-62	Loke, 27-3-60 do	26, 20-12-60 23, 7-2-61	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	80 75	181 181	
Idestrup	F 716	24-7-62	Jan, 19-8-61	82. 22-2-61	2 2 2 2	2 2 2 2	74	180	
Impgaard	J 745	12-8-62	Brillant, 20-11-60	34, 7-2-61	2 2 2 2	2 2 2 2	82	189	
Jels	V 659	21-5-62	Ikelang, 19-10-60	33, 23-6-61	2 2 2 2	2 2 2 2	88	191	
Jestrup do	V 707 V 735	5-7-62 26-7-62	Jeff, 30-9-60 do	25, 21-7-61 26, 5-8-61	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	92 95	195 203	
Kalhave	F 708	16-7-62	Vulcan, 20-7-61	45, 8-7-60	2 2 2 2	2 2 2 2	82	189	
Kalø	S 602	10-6-62	Tom, 24-3-61	91, 15-11-60	2 2 2 2	2 2 2 2	76	174	
Kammersgaard	V 663	28-5-62	Sten, 16-3-61	40. 30-9-60	2 2 2 2	2 2 2 2	88	190	
Karby	V 755	23-8-62	Karby Skipper, 10-7-60	37, 6-2-61	2 2 2 2	2 2 2 2	80	185	
Kastanielund do	S 594 S 629	9-6-62 29-6-62	Michael, 24-1-61 do	19, 7-2-61 16, 4-2-60	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	70 75	171 177	
Kauergaard do	J 686 J 687	19-6-62 14-6-62	Kauergaard Abild, 5-8-61 Kauergaard Bro, (7643)	127, 23-7-61 124, 26-1-61	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	75 78	181 178	
Kildegaard	S 663	28-7-62	Dario, 29-1-60	27, 8-11-59	2 2 2 2	2 2 2 2	72	172	
Kindvig do	S 625 S 626	19-6-62 17-6-62	Sørr, 14-2-60 do	51, 14-11-60 50, 14-11-60	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	88 82	183 178	
Kjelstrup do do do	V 657 V 671 V 673 V 672	3-6-62 8-6-62 8-6-62 13-6-62	Knægt, (7239) Bus, 15-3-61 do Alfa, 28-1-61	62, 14-1-61 66, 28-6-61 67, 28-6-61 68, 28-6-61	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	70 70 81 75	175 177 191 183	

I gennemsnit																			Kødfarve, 0-5 points				Klasse				Hold-nr.
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																		
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflask	sidespekmål	bug		flaskets fasthed	bov	rygflaskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde	type	AI	A					B	C			
64.8	663	2.96	27.6	60.7	2.4	2.4	3.3	95.9	13.1	12.9	13.8	12.9	12.8	13.3	13.8	13.0	13.0	3.0	3	1	-	-	-	-	668		
64.4	730	2.84	28.2	59.2	2.6	2.3	3.3	95.5	13.3	12.8	13.5	12.8	12.1	13.1	13.4	13.6	13.0	2.5	2	2	-	-	-	-	705		
65.3	670	3.09	27.1	60.1	2.4	2.2	3.2	97.0	14.0	12.8	14.3	13.1	14.0	13.9	14.1	13.6	14.0	2.5	3	1	-	-	-	-	737		
63.5	702	2.88	28.4	58.9	2.4	2.0	3.2	98.1	13.4	13.3	14.0	12.8	13.1	13.5	14.0	14.0	13.9	2.5	4	-	-	-	-	-	723		
64.4	664	3.08	27.8	60.0	2.6	2.1	3.2	96.3	13.3	12.9	13.1	13.1	13.0	13.5	13.3	14.0	13.5	2.8	1	3	-	-	-	-	688		
65.9	647	3.13	27.0	60.8	2.7	2.6	3.3	96.1	13.9	13.0	12.9	13.4	13.6	13.5	13.1	12.5	13.0	2.5	2	1	1	-	-	-	707		
64.3	649	3.17	27.0	60.7	2.8	2.3	3.2	95.6	14.0	12.5	12.9	12.6	13.3	13.5	13.0	13.3	12.9	2.3	-	4	-	-	-	-	714		
63.1	699	2.92	28.5	59.6	2.4	1.8	3.3	93.9	13.8	12.9	13.9	14.4	13.6	13.6	14.3	14.5	14.1	2.5	3	1	-	-	-	-	668		
64.6	646	3.03	28.0	59.8	2.4	2.3	3.3	96.4	13.6	13.1	13.3	13.3	13.0	13.6	14.0	13.4	13.5	2.5	2	2	-	-	-	-	684		
65.3	686	3.02	27.8	59.9	2.6	2.6	3.3	95.9	13.6	13.0	13.4	12.9	13.0	13.5	13.5	12.0	12.9	2.5	2	2	-	-	-	-	703		
64.9	615	3.14	26.8	60.5	2.8	2.6	3.4	96.6	14.0	12.6	12.5	12.4	12.9	13.6	12.6	12.3	12.5	2.5	1	3	-	-	-	-	752		
64.4	665	3.12	28.3	59.5	2.6	2.6	3.3	94.0	13.8	12.6	13.3	13.3	13.3	13.8	13.3	12.5	13.0	2.5	2	2	-	-	-	-	720		
65.4	685	2.97	28.1	59.7	2.5	2.2	3.3	96.5	13.6	12.9	13.6	13.6	13.8	13.5	13.8	13.3	13.8	2.5	1	3	-	-	-	-	673		
67.8	718	2.88	26.3	61.6	2.8	2.5	3.4	95.8	13.6	12.4	12.9	13.4	13.5	13.5	12.9	12.4	13.0	1.5	-	4 ¹	-	-	-	-	712		
64.3	644	3.18	27.9	60.2	2.8	2.5	3.3	95.9	13.5	13.0	13.3	13.0	13.4	12.9	13.1	12.8	13.3	2.8	2	2	-	-	-	-	730		
67.3	693	2.96	25.7	62.0	2.7	2.2	3.3	98.5	14.1	13.0	12.6	13.5	13.6	13.5	13.1	13.3	13.3	2.3	-	4	-	-	-	-	659		
64.9	656	3.13	27.6	60.7	2.7	2.6	3.4	94.1	13.9	12.8	13.0	13.1	13.9	14.0	13.3	12.6	13.1	2.0	2	2	-	-	-	-	670		
66.1	662	3.15	26.3	61.2	2.9	2.2	3.4	94.3	13.8	12.3	12.6	13.8	13.4	13.5	12.8	13.4	13.1	2.3	-	4	-	-	-	-	716		
64.5	662	3.02	27.9	59.8	2.6	2.3	3.1	96.4	13.6	12.6	13.5	13.0	12.8	13.4	13.6	13.5	13.3	2.3	2	2	-	-	-	-	745		
65.5	677	2.96	26.9	61.1	2.8	2.6	3.4	93.5	13.9	12.5	12.8	13.3	13.1	13.4	12.9	12.8	12.8	2.3	1	3	-	-	-	-	659		
64.4	681	2.96	27.2	60.5	2.6	2.1	3.3	96.8	13.9	13.4	13.6	13.4	12.3	13.3	13.3	13.4	13.1	2.3	2	2	-	-	-	-	707		
64.3	647	3.00	27.7	59.8	2.4	2.1	3.2	96.8	13.5	13.3	14.5	13.3	12.8	13.5	13.9	13.4	13.8	2.8	4	-	-	-	-	-	735		
64.6	657	3.03	27.8	59.6	2.4	2.2	3.2	95.8	13.9	12.8	13.9	13.1	12.8	13.3	13.9	12.9	13.4	1.8	3	1	-	-	-	-	708		
64.4	713	2.87	27.8	60.1	2.6	2.3	3.3	96.1	13.9	13.1	13.5	13.6	13.1	13.5	13.6	12.9	13.5	1.8	2	2	-	-	-	-	602		
65.9	682	3.00	27.2	60.8	2.7	2.4	3.4	93.5	13.6	12.4	13.3	13.9	13.4	13.3	13.4	12.6	12.9	2.0	-	4	-	-	-	-	663		
65.1	674	2.85	27.4	60.6	2.7	2.4	3.2	96.8	13.5	12.8	13.6	12.5	13.4	14.1	13.3	13.0	13.1	2.5	1	3	-	-	-	-	755		
64.6	695	3.00	28.2	59.6	2.3	2.0	3.3	96.1	13.8	13.0	14.1	12.8	12.3	13.4	13.5	13.6	13.1	2.5	4	-	-	-	-	-	594		
65.0	683	2.96	27.5	60.6	2.5	2.1	3.4	95.0	13.8	12.9	13.4	13.4	12.4	13.6	13.6	13.8	13.4	2.5	2	2	-	-	-	-	629		
65.8	664	2.98	26.7	61.0	2.4	2.4	3.2	97.1	13.8	12.9	13.5	13.9	13.4	13.4	14.1	13.3	13.4	2.0	3	1	-	-	-	-	686		
66.0	703	2.92	27.2	60.5	2.8	2.7	3.4	97.1	13.9	12.6	12.9	13.8	12.6	14.1	13.0	12.5	12.9	2.8	-	4	-	-	-	-	687		
65.4	698	2.86	26.6	61.3	2.7	2.1	3.4	94.9	13.5	12.9	13.1	13.4	13.8	13.5	13.1	13.4	13.6	2.3	1	3	-	-	-	-	663		
64.8	736	2.76	27.6	60.3	2.6	1.8	3.3	96.5	13.7	13.2	13.8	13.3	13.5	13.3	13.8	14.2	13.7	2.3	2	1	-	-	-	-	625		
65.6	731	2.82	26.2	61.7	2.7	2.1	3.3	94.6	13.8	12.8	13.1	13.1	13.0	13.5	13.3	13.8	13.3	2.5	1	3	-	-	-	-	626		
65.6	666	3.02	27.4	60.4	2.6	2.3	3.5	96.0	13.4	13.1	13.5	12.3	12.8	13.5	13.3	13.1	12.9	2.5	3	1	-	-	-	-	657		
66.4	658	2.97	27.1	60.8	2.7	2.1	3.3	95.9	13.5	12.6	13.8	12.8	13.0	13.6	13.3	13.5	13.3	2.5	2	2	-	-	-	-	671		
64.9	640	3.15	27.1	61.1	3.0	2.4	3.2	93.8	13.5	12.4	12.8	13.1	12.6	13.9	12.6	12.8	12.4	2.5	1	3	-	-	-	-	673		
66.3	654	2.98	25.9	61.8	2.7	2.6	3.4	94.5	13.4	13.0	13.0	12.6	12.3	13.8	13.1	12.4	12.5	2.0	2	2	-	-	-	-	672		

S Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.97

J Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.00

F Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.06

V Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels- dato	fader	moder	modtaget	slagtede			
							galte søer	galte søer		
Kobberfeldt	S	657	14-7-62	Toft, 29-7-58	74, 6-3-60	2	2	2	81	181
Kollund	V	711	19-7-62	Mek, 31-5-60	43, 11-5-60	2	2	2	76	181
do	V	728	1-8-62	Tyfon, 11-6-61	51, 10-11-60	2	2	2	78	177
Korskjærsgaard	J	740	15-8-62	Kold, 5-3-61	118, 10-12-60	2	2	1	88	191
Kraghede	J	701	27-6-62	Bak, 26-7-61	56, 23-7-61	2	2	2	90	196
Kristianshøj	F	678	17-6-62	Fruehøj, 1-12-60	123, 27-1-60	2	2	2	81	184
do	F	679	8-6-62	do	124, 21-10-60	2	2	2	82	182
do	J	700	27-6-62	do	121, 6-3-59	2	2	2	80	178
Kørup	F	720	22-7-62	Pil, 23-9-60	83, 16-8-60	2	2	2	70	179
Langballe	J	733	8-8-62	Frits, 5-10-58	76, 26-11-60	2	2	2	72	174
Langbjerg	V	694	3-7-62	Skalbbjerg, 26-1-61	12, 15-5-59	2	2	1	73	170
do	V	695	5-7-62	do	24, 6-12-60	2	2	2	75	176
do	V	708	20-7-62	Mac 80, 5-1-61	31, 6-8-61	2	2	2	80	189
Langdel	V	655	1-6-62	Bo, 8-4-61	144, 9-6-61	2	2	2	78	180
do	V	678	17-6-62	do	145, 9-6-61	2	2	2	79	185
do	V	686	26-6-62	Baron, 24-1-61	134, 27-10-60	2	2	2	79	176
do	V	726	5-8-62	Malling X, (7201)	137, 18-1-61	2	2	2	67	174
do	V	740	8-8-62	Eskild, 6-8-59	136, 14-1-61	2	2	2	87	195
Langemark	S	615	12-6-62	Vilho, 10-12-60	21, 14-10-60	2	2	2	80	177
do	S	616	20-6-62	do	17, 23-2-60	2	2	2	72	171
do	S	661	16-7-62	Sulfa, (6877)	24, 4-6-61	2	2	2	84	189
do	S	662	20-7-62	do	25, 4-6-61	2	2	2	85	185
Levringgaard	J	675	6-6-62	Dat, 11-6-61	1, 12-6-61	2	2	2	81	182
do	J	696	4-7-62	Dandy, 10-2-61	99, 28-12-60	2	2	2	75	187
Lidemark	S	618	24-6-62	Klaus Jørn, 4-3-60	60, 12-7-61	2	2	2	72	170
do	S	682	22-8-62	Knøv, 17-1-60	61, 1-9-61	2	2	1	77	180
Lundby Møllegaard	S	601	10-6-62	Dik Lundby, 6-3-61	47, 12-6-61	2	2	2	68	171
do	S	621	20-6-62	do	48, 12-6-61	2	2	2	76	176
do	S	649	13-7-62	do	49, 8-7-61	2	2	2	72	176
do	S	687	2-9-62	do	45, 17-7-60	2	2	2	74	175
Lunde	V	718	20-7-62	Dux, 17-9-59	90, 20-12-60	2	2	2	83	191
Lundesten	S	600	9-6-62	Toftlund, 29-7-61	91, 20-6-61	2	2	2	73	171
do	S	673	28-7-62	Orient, 18-7-61	96, 30-8-61	2	2	2	85	186
Lykkensgaard	S	634	3-7-62	O.X., 12-12-59	35, 7-2-61	2	2	2	67	174
do	S	680	25-8-62	Olfert, 30-6-61	36, 7-2-61	2	2	2	73	179
do	S	690	25-8-62	Dario, 29-1-60	42, 10-9-61	2	2	2	87	183
Lynghøjgaard	J	717	26-7-62	Sørup Retur, 8-4-61	74, 14-11-60	2	2	2	69	174
do	J	718	13-7-62	do	76, 28-5-61	2	2	2	86	185
Lysager	V	696	23-6-62	Abild, 17-2-59	3, 10-6-60	2	2	2	90	191

I gennemsnit

Klasse

I gennemsnit																			Kødfarve, 0-5 points	Klasse				Hold-nr.
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af															
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfylde		type							
															hel	overskåret								
65.8	703	2.86	27.0	61.2	2.6	1.8	3.3	94.4	13.3	12.8	13.1	13.6	13.5	13.8	13.6	13.9	13.6	2.5	1	3	-	-	657	
66.6	668	2.96	27.4	60.7	2.7	2.3	3.3	95.6	13.9	12.6	13.1	13.6	14.4	13.5	13.3	13.1	13.3	2.0	2	2	-	-	711	
66.4	701	2.80	27.4	60.7	2.8	2.3	3.3	93.5	13.4	12.8	12.8	13.1	14.1	13.5	13.0	13.0	12.9	1.5	1	3	-	-	728	
63.3	671	2.96	28.9	59.2	2.8	1.8	3.2	95.5	12.8	13.0	13.0	13.2	13.5	13.3	13.0	14.2	13.5	2.0	2	1	-	-	740	
66.1	665	3.12	27.3	60.4	3.1	2.8	3.3	93.9	14.1	12.0	12.0	13.4	12.9	13.9	11.8	11.8	11.8	2.0	-	3	1	-	-	701
65.4	685	2.94	28.5	59.6	2.6	2.3	3.2	96.3	13.5	12.6	13.3	12.8	12.9	13.1	13.3	13.4	13.0	2.0	2	2	-	-	-	678
65.5	699	2.85	27.0	60.6	2.8	2.3	3.3	93.9	13.5	12.4	13.1	13.1	13.3	13.4	13.4	13.1	13.3	1.8	-	4	-	-	-	679
64.1	714	2.88	28.5	59.5	2.7	2.3	3.2	96.3	13.6	12.8	13.4	13.0	13.4	13.5	13.4	13.4	13.4	2.8	2	2	-	-	-	700
64.5	644	3.10	28.5	59.5	2.5	2.1	3.3	95.9	13.5	13.3	13.6	13.1	12.9	13.1	14.0	13.6	13.6	2.5	3	1	-	-	-	720
63.3	687	2.93	28.8	59.2	3.1	2.5	3.2	96.3	14.3	12.5	12.1	13.0	13.3	13.6	11.9	12.8	12.4	2.5	-	3	1	-	-	733
63.7	721	2.73	27.5	60.5	2.4	2.0	3.2	93.2	13.2	12.8	13.5	13.5	12.5	13.3	13.8	13.8	12.7	2.0	1	2	-	-	-	694
64.3	696	2.87	27.2	60.6	2.5	2.1	3.4	93.8	13.6	12.9	13.4	12.9	12.9	13.3	13.6	13.8	13.4	2.5	3	1	-	-	-	695
66.1	648	3.11	26.7	61.3	3.0	2.7	3.3	95.1	13.8	12.5	12.4	13.6	12.8	14.0	12.4	12.1	12.4	2.0	-	3	1	-	-	708
66.3	685	2.83	27.7	60.6	2.4	2.1	3.3	98.5	13.1	12.9	13.9	14.0	13.4	12.8	13.9	13.8	13.6	2.0	2	2	-	-	-	655
64.3	659	3.00	27.8	60.4	2.9	2.4	3.2	96.5	13.5	13.1	13.1	12.9	12.4	13.9	12.9	13.3	12.9	1.8	1	3	-	-	-	678
64.8	722	2.76	27.8	60.1	2.5	1.9	3.3	95.4	13.1	13.3	13.8	13.4	13.0	12.9	13.9	14.0	13.6	1.5	3	1	-	-	-	686
66.3	654	2.91	26.7	61.3	2.6	2.5	3.3	98.0	13.8	12.9	13.3	13.9	13.1	13.4	13.6	12.8	13.3	2.3	-	4	-	-	-	726
66.1	645	3.11	26.9	60.9	2.6	2.3	3.3	97.4	13.3	12.9	13.6	13.6	12.8	12.6	13.6	13.0	13.3	2.0	3	1	-	-	-	740
65.6	721	2.79	26.7	60.9	2.8	2.1	3.4	95.3	13.5	12.4	12.4	13.6	13.1	13.8	12.8	13.4	12.9	2.5	-	4	-	-	-	615
65.8	712	2.88	27.0	60.8	2.5	2.1	3.4	96.0	13.4	12.6	13.4	13.5	13.8	13.8	14.1	13.5	13.6	2.0	2	2	-	-	-	616
64.1	662	3.08	28.2	59.8	2.7	2.4	3.3	96.8	13.9	12.9	13.3	12.9	12.9	13.4	13.1	12.9	13.1	2.5	1	3	-	-	-	661
64.5	694	2.96	27.4	60.2	2.6	2.2	3.4	96.0	14.0	13.3	13.6	13.5	13.8	13.5	13.6	13.5	13.9	2.8	2	2	-	-	-	662
66.8	692	3.04	26.6	61.3	3.1	2.9	3.5	94.8	13.8	12.4	12.4	13.3	12.6	13.5	12.1	11.5	12.0	2.3	1	2	1	-	-	675
64.6	626	3.32	28.0	59.5	3.0	2.4	3.4	96.3	13.9	12.5	12.3	12.6	12.3	13.6	12.1	12.8	12.4	2.5	-	3	1	-	-	696
65.4	711	2.87	27.2	60.4	2.5	1.9	3.3	95.1	13.5	12.5	13.8	13.6	13.3	13.4	13.9	14.1	13.6	2.5	3	1	-	-	-	618
63.5	677	2.91	28.4	59.8	2.4	1.9	3.2	96.2	13.0	13.5	13.8	13.7	13.8	13.3	14.3	14.3	14.2	2.3	3	-	-	-	-	682
63.4	682	2.98	29.2	58.8	2.6	2.4	3.0	96.1	13.4	12.9	12.8	12.4	12.5	13.4	13.0	12.6	12.8	2.3	-	4	1	-	-	601
63.3	702	2.88	28.2	59.7	2.5	1.9	3.2	95.4	13.3	13.4	13.5	13.3	13.4	13.6	14.0	13.8	13.9	2.3	2	2	-	-	-	621
66.8	678	2.99	26.3	61.7	2.7	2.2	3.4	96.3	13.6	12.9	13.1	13.5	12.9	13.4	13.4	13.3	13.1	1.5	-	4	-	-	-	649
64.4	686	2.93	28.2	59.5	2.6	2.4	3.2	97.3	13.8	13.0	13.6	12.8	12.4	13.6	13.3	12.8	12.9	2.5	2	2	-	-	-	687
65.5	649	3.01	26.8	60.7	2.4	2.2	3.4	96.8	13.8	13.3	14.0	12.5	13.6	13.6	13.6	13.1	13.5	3.0	3	1	-	-	-	718
66.0	712	2.84	26.4	61.6	2.8	2.6	3.4	94.5	14.3	12.8	12.1	13.4	13.0	13.6	12.6	12.1	12.4	2.0	1	3	-	-	-	600
65.9	699	2.92	26.5	61.4	2.9	2.5	3.3	94.5	13.9	12.6	12.4	13.6	13.6	13.5	12.9	12.9	12.9	2.5	-	4	1	-	-	673
66.5	656	3.09	26.6	62.0	2.5	2.1	3.4	96.5	13.6	13.1	13.5	13.1	13.4	13.1	14.0	13.9	13.9	3.0	1	3	-	-	-	634
64.3	669	2.98	27.1	61.1	2.9	2.5	3.6	94.3	13.6	13.0	12.4	12.0	14.1	13.6	12.4	12.5	12.3	2.3	-	3	1	-	-	680
65.6	724	2.79	27.1	61.1	2.4	1.9	3.4	96.1	12.8	13.0	13.8	13.1	13.8	13.5	14.4	14.0	13.8	2.3	3	1	-	-	-	690
65.3	668	3.01	26.9	60.8	2.7	2.3	3.5	93.0	13.6	12.5	13.0	13.1	14.4	13.5	13.4	13.3	13.1	1.5	-	4	-	-	-	717
64.5	702	2.92	27.8	60.0	2.7	2.3	3.2	95.5	13.4	12.9	13.0	13.3	12.8	13.5	13.3	13.3	13.1	2.0	1	3	-	-	-	718
62.8	693	2.93	28.5	59.5	2.8	2.3	3.3	97.1	13.3	12.6	13.0	12.5	12.6	13.4	12.9	13.3	12.9	3.0	1	3	-	-	-	696

S Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.97

J Jylland:

F.e.pr.kg.tilv. 3.00

F Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.06

V Vestjylland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.93

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise				Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levende vægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget		slagtede			
						galle søer	galle søer	galle søer	galle søer		
Lysgaard do	F 687 J 727	3-7-62 15-8-62	Hans, 10-1-60 Draaby, 15-1-61	69, 16-12-59 72, 6-1-61	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	66 73	178 179		
Margrethesminde	J 704	29-6-62	Skibsby Grøn, 29-7-59	57, 17-12-57	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	87	185		
Marslund do	V 701 V 702	3-7-62 29-6-62	Plus, 17-12-60 Bulder, (7339)	5, 9-2-59 23, 17-1-61	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	82 84	184 186		
Mausing do do	V 669 V 670 J 734	30-5-62 2-6-62 8-8-62	Rør, 25-10-59 Hans, 4-1-61 Alf, 12-5-61	67, 15-10-60 63, 31-5-60 72, 6-8-61	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	79 77 75	186 185 180		
Melby	F 705	23-7-62	Nr.80 Skott, 1-7-61	31, 27-11-60	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	72	175		
Mosebæk	S 655	14-7-62	Tørn, 8-6-61	80, 18-9-61	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	83	186		
Mygind do	J 693 J 694	26-6-62 27-6-62	Saaby, 6-2-60 do	34, 6-1-61 33, 6-1-60	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	76 77	183 180		
Naarup do	F 686 F 721	13-6-62 2-8-62	Nr.10 Everton, 18-6-61 do	94, 9-5-61 89, 21-11-60	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	99 75	197 174		
Naskegaard do	S 627 S 651	18-6-62 16-7-62	Nebel, 7-7-61 Mustafa II, 9-1-60	87, 25-6-61 84, 14-1-60	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	75 69	178 170		
Nordenkjær	V 689	8-6-62	Sohl, 29-1-61	41, 14-7-61	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	98	197		
Nytoftegaard do	F 685 F 704	27-6-62 14-7-62	Nr.100 Mufa, 9-4-61 do	36, 16-5-60 39, 31-12-60	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	72 77	175 175		
Nyvang	V 687	20-6-62	Palladius, 3-12-60	56, 27-5-60	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	72	179		
Oddersted do	F 689 F 695	27-6-62 4-7-62	Hou, 2-1-61 do	94, 24-3-61 95, 19-5-61	2 2 2 2 2 2 2 1	2 2 2 2 2 2 2 1	2 2 2 2 2 2 2 1	76 79	184 184		
Oddingen	J 690	21-6-62	Knag, 15-11-60	182, 28-9-60	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	77	186		
Oldrup	F 718	19-7-62	Oran, (7515)	30, 31-12-60	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	73	184		
Ollerup do	S 584 S 605	21-5-62 27-5-62	Ollerup Jarl, 20-7-58 do	57, 6-6-61 48, 30-8-59	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	85 84	192 188		
Paastrupgaard do	S 617 S 628	28-6-62 25-6-62	Bjørn, 10-2-61 Troid, 17-1-60	69, 10-7-60 68, 19-5-60	1 3 1 3 2 2 2 2	1 3 1 3 2 2 2 2	1 3 1 3 2 2 2 2	74 75	173 182		
Ravnholt do do do do	V 699 V 722 V 723 V 724 V 725	25-6-62 29-7-62 28-7-62 25-7-62 28-7-62	Ravnholt Knægt, 19-5-61 do Petring, 17-8-58 do do	18, 16-7-61 14, 11-2-61 13, 11-2-61 19, 23-7-61 15, 11-2-61	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	85 76 70 81 85	184 178 180 185 185		
Ringtved do	V 681 V 706	19-6-62 20-7-62	Tim, 13-11-60 Diamant, (7681)	64, 21-7-60 75, 3-2-61	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	71 74	172 175		
Rolundgaard do do	F 674 F 727 F 728	16-6-62 19-8-62 10-8-62	Jens Most (7247) Nr.30 Gorm, 21-6-61 Skær, 17-4-60	44, 28-11-60 46, 12-2-61 49, 30-7-61	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	71 66 74	178 167 181		

I gennemsnit																		Kødfarve, 0-5 points				Klasse				Hold-nr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflask	sidespekmål	bug		flaskets fasthed	bov	rygflaskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfylde		type																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

S Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.97 J Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.00
 F Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.06 V Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise		Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt	
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget				
						gatte søer	gatte søer			
Rostgaard	V 691	18-6-62	Ekspert, 22-12-59	50,	6-7-61	2	2	2	82	185
do	V 692	21-6-62	do	51,	6-7-61	2	2	2	85	188
Rykkerup	S 641	22-6-62	Lotus, (7609)	91,	23-6-60	2	2	2	89	193
Saabby	F 663	11-6-62	Triton, 9-4-61	62,	22-3-60	2	2	2	72	176
do	F 664	12-6-62	do	63,	22-3-60	2	2	2	66	170
do	F 730	13-8-62	do	72,	28-12-60	2	2	2	79	184
do	F 675	29-6-62	Højberg, 10-5-61	70,	16-12-60	2	2	2	66	175
do	F 709	19-7-62	do	75,	20-5-61	2	2	2	73	179
Sandkildegaard	S 599	21-6-62	Hassan, 29-7-61	47,	10-1-61	2	2	2	66	161
do	S 685	6-9-62	do	48,	18-3-61	2	2	2	69	173
Sejbækgaard	J 747	2-9-62	Falster, 6-2-61	62,	4-2-61	2	2	2	71	171
Siverholm	J 750	18-8-62	Baal, 8-5-61	185,	5-8-61	2	2	2	83	186
Sivgaard	S 614	12-6-62	Fip, 9-7-60	80,	6-4-61	2	2	2	79	186
do	S 620	2-6-62	do	82,	28-3-61	2	2	2	93	193
do	F 694	18-6-62	do	83,	28-3-61	2	2	2	91	193
do	S 639	25-6-62	Plys, 10-1-60	75,	14-4-60	2	2	2	77	179
Skads	V 641	16-5-62	Bonde, 2-5-61	70,	26-11-60	2	2	2	84	188
do	V 736	15-8-62	Høj (7365)	78,	11-8-61	2	2	2	76	179
Skafterup	S 642	28-6-62	Løn, 30-6-61	65,	11-5-61	2	2	2	78	190
Skodborg	V 745	5-8-62	Paars, 12-5-61	78,	30-7-61	2	2	2	94	200
Skærum	J 715	12-7-62	Paganini, 6-4-61	21,	28-2-60	2	2	2	90	187
do	J 716	17-7-62	Skærum Grøn, 19-8-60	16,	24-12-59	2	2	2	84	185
Solagergaard	S 638	26-6-62	Nap, 4-6-61	83,	14-4-61	2	2	2	81	184
do	S 669	4-8-62	Røsnæs, 12-12-59	82,	17-12-60	2	2	2	75	179
do	S 675	23-7-62	Malte 80, 23-1-59	79,	17-12-60	2	2	2	95	197
do	F 722	17-7-62	Nr. 80 Malte, 23-1-59	76,	17-12-60	2	2	2	83	192
Sparlund	V 747	12-8-62	Ritmester, 24-3-61	16,	31-5-61	2	2	2	87	193
Staagerup	F 667	8-6-62	Nr. 50 Math, 8-6-61	34,	5-12-60	2	2	2	79	184
Stauning	V 709	7-7-62	Eksstrøm, 19-2-60	71,	31-7-61	2	2	2	89	191
do	V 732	8-8-62	do	62,	20-7-60	2	2	2	84	188
Stenager	V 658	25-5-62	Tidel, 22-4-61	40,	24-6-61	2	2	2	86	190
do	V 727	30-7-62	do	34,	17-9-60	2	2	2	79	185
Stilbjerg	V 660	8-6-62	Buller, 29-10-60	14,	22-5-59	2	2	2	76	176
Stillinge Vestergaard	S 612	16-5-62	Klør Es, 27-9-60	90 (27566)		2	2	2	98	202
do	S 645	27-6-62	Ruder Es, 24-1-61	15,	1-6-61	2	2	2	93	200
do	F 691	20-6-62	do	14,	1-6-61	2	2	2	90	196
Stinesminde	J 684	7-6-62	Fund, 12-5-61	27,	19-9-59	2	2	2	71	176
do	J 707	1-7-62	Holst (7689)	28,	15-11-59	2	2	2	85	185
do	J 708	3-7-62	do	31,	10-8-60	2	2	2	88	183

S Sjælland:	F.e.pr.kg.tilv.	2.97	J Jylland:	F.e.pr.kg.tilv.	3.00
F Fyn:	F.e.pr.kg.tilv.	3.06	V Vestjylland:	F.e.pr.kg.tilv.	2.93

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise				Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levende vægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget		slagtede			
						gatte	søer	gatte	søer		
Strandby	F 657	4-6-62	Nr.25 Degnen, 31-10-58	61, 10-8-60	2	2	2	2	75	178	
do	F 701	10-7-62	do	62, 4-3-60	2	2	2	2	72	171	
Svanegaard	S 654	8-7-62	Kimp, 12-8-61	65, 14-7-61	2	2	2	2	88	188	
Svinholt	F 690	9-7-62	Spanja, 15-9-61	30, 29-4-61	2	2	2	2	74	175	
do	F 700	7-7-62	Spar Es, 29-4-60	24, 2-4-60	2	2	2	2	80	187	
Sønder Andrup	J 741	4-8-62	Ping, 24-8-59	42, 9-1-60	2	2	2	2	92	203	
Sønderlide	F 719	15-7-62	Rio, 7-7-58	31, 23-7-60	2	2	2	2	86	191	
Søndervang	V 677	15-6-62	Bram, 24-12-60	25, 6-6-61	2	2	2	2	84	192	
Søvind	F 668	1-6-62	Igo, 11-6-61	49, 22-5-61	2	2	2	2	86	192	
do	F 669	5-6-62	do	50, 22-5-61	2	2	2	2	83	186	
do	F 680	8-6-62	do	37, 11-4-58	2	2	2	1	79	184	
Tebstrup	J 731	27-7-62	Partner, 30-5-61	60, 5-3-61	2	2	2	2	77	178	
Tendrup Møllegaard	V 667	25-5-62	Jasper, 15-9-60	156 1-7-61	2	2	2	2	88	196	
do	V 688	16-6-62	do	149, 19-12-60	2	2	2	2	83	184	
do	J 697	11-7-62	do	152, 22-12-60	2	2	2	2	70	172	
do	J 698	8-7-62	do	151, 22-12-60	2	2	2	2	64	168	
do	J 699	7-7-62	do	150, 22-12-60	2	2	2	2	65	169	
Ternelund	S 609	3-6-62	Rislev, 25-1-60	9, 27-9-60	2	2	2	2	91	186	
do	S 664	15-7-62	Dikmann, 24-3-59	8, 27-9-60	2	2	2	2	98	200	
do	S 689	26-8-62	Ping, 25-2-59	2, 11-2-60	2	2	2	2	86	184	
Thoderup	F 697	17-7-62	Nr.10 Swing, 11-9-61	14, 28-7-61	2	2	2	2	68	172	
do	F 724	21-7-62	Nr.100 Felix, 21-3-61	16, 28-7-61	2	2	2	2	84	189	
Thorning Toftgaard	J 738	7-8-62	Flint, 1-9-61	66, 9-2-61	2	2	2	2	88	191	
Thorsø	J 683	4-6-62	Gran, 17-6-60	56, 25-6-61	2	2	2	2	82	184	
do	J 691	11-6-62	Birk, 6-2-61	58, 25-6-61	2	2	2	2	90	193	
do	J 692	11-6-62	Ask, 3-6-60	60, 25-6-61	2	2	2	2	90	194	
do	J 748	15-8-62	do	47, 22-9-60	2	2	2	2	85	189	
Thorup Østergaard	J 703	19-7-62	Eng, 12-8-61	11, 16-8-61	2	2	2	2	68	170	
do	J 721	20-7-62	do	12, 16-8-61	1	3	1	3	79	184	
Tilsted	V 635	18-5-62	Aske, 25-1-61	34, 28-10-60	2	2	2	2	87	191	
Tjørnehoved	S 646	10-7-62	Tang, 22-1-60	9, 20-8-60	2	2	2	2	76	178	
Tobøl	V 703	17-7-62	Petring, 17-8-58	19, 13-8-60	2	2	2	2	77	181	
Tofte	F 676	18-6-62	Nr.80 Sten, 29-1-61	72, 7-5-61	2	2	2	2	76	180	
do	F 677	18-6-62	do	68, 11-1-60	2	2	1	2	72	175	
do	F 744	31-8-62	Nr.65 Søgang, 27-10-58	74, 4-9-61	2	2	2	2	70	177	
Tofthøj	F 732	27-8-62	Atlas, 18-7-61	80, 19-8-61	2	2	2	2	69	174	
do	F 733	22-8-62	Højbo, 25-4-58	79, 15-9-61	2	2	2	2	76	177	
Tolstrup	S 610	11-6-62	Gress, 18-5-61	15, 27-6-61	2	2	2	2	72	172	

I gennemsnit																				Klasse				Hold-nr.
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af										Kødfarve, 0-5 points	AI	A	B	C	
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflask	sidespækmaal	bug		flaskets fasthed	bov	rygflaskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde	overskåret	type							
7.9	678	3.04	25.1	62.3	2.6	2.4	3.3	93.4	13.6	12.5	13.4	13.3	14.5	13.6	13.9	13.3	13.5	1.8	1	3	-	-	-	657
9.4	702	2.87	24.2	63.1	2.6	2.3	3.4	93.1	13.6	12.3	13.6	13.5	14.4	13.4	13.9	13.5	13.4	1.5	1	3	-	-	-	701
5.3	705	2.89	27.6	60.7	2.6	2.1	3.3	94.6	13.4	12.9	12.9	13.1	13.4	13.6	13.4	13.5	12.6	2.0	1	3	-	-	-	654
4.6	695	2.99	28.8	58.6	2.6	2.2	3.3	95.8	13.4	12.5	13.1	12.6	12.8	13.0	12.9	13.4	12.9	2.0	1	3	-	-	-	690
6.9	657	3.15	26.3	61.2	2.4	1.9	3.3	96.9	13.6	12.6	13.4	13.6	13.8	13.4	13.9	13.6	13.9	1.8	1	3	-	-	-	700
4.3	631	3.12	27.8	60.0	2.9	2.2	3.3	96.0	13.0	12.8	12.8	13.4	13.4	13.5	12.9	13.4	13.1	2.5	-	4	-	-	-	741
4.8	669	3.03	27.8	59.7	2.8	2.7	3.4	96.0	13.5	12.6	12.4	12.0	13.1	13.5	12.8	12.0	12.3	2.0	1	2 ¹	1	-	-	719
4.3	643	2.97	28.4	59.8	2.6	2.3	3.2	96.9	13.5	12.6	13.8	13.0	12.4	13.6	13.5	13.3	13.0	2.0	2	2	-	-	-	677
5.5	662	3.08	27.6	60.1	3.1	2.7	3.3	95.0	14.1	12.3	11.1	12.5	12.9	14.1	11.0	10.9	11.1	2.3	-	2	1	1	-	668
4.3	681	2.99	29.1	58.9	2.7	2.3	3.4	95.8	13.5	12.9	12.6	13.3	13.5	13.5	13.3	12.4	13.0	2.5	-	4	-	-	-	669
5.3	665	3.03	27.7	60.3	2.9	2.6	3.3	93.5	13.7	12.5	12.3	13.2	13.2	13.7	12.7	12.3	12.7	2.5	-	2	1	-	-	680
5.0	689	2.92	27.4	60.9	2.8	2.1	3.4	94.6	13.4	12.8	13.0	13.5	13.6	13.6	13.3	13.5	13.5	2.5	-	4	-	-	-	731
5.3	650	3.08	27.2	60.7	3.0	2.8	3.4	97.1	13.6	12.4	12.3	12.4	11.8	13.9	12.0	11.8	11.8	2.5	-	2	2	-	-	667
4.4	695	2.84	27.6	60.3	2.6	2.2	3.3	95.6	13.3	13.3	13.5	13.4	13.5	13.4	13.9	13.6	13.9	1.8	3	1	-	-	-	688
5.0	681	3.12	26.6	60.9	3.0	2.7	3.4	96.1	13.8	12.3	12.6	12.3	12.6	13.3	12.8	12.9	12.4	2.0	-	4	-	-	-	697
6.1	671	3.07	26.9	60.8	2.9	2.8	3.3	97.1	13.8	12.6	12.6	12.5	13.1	13.8	12.6	12.0	12.6	2.3	-	3	1	-	-	698
4.3	670	3.05	27.8	60.0	2.7	2.4	3.1	95.5	13.3	12.5	13.0	12.6	12.6	13.8	13.4	13.0	12.5	1.5	2	2 ¹	-	-	-	699
5.5	731	2.77	27.8	59.7	2.3	1.8	3.3	98.6	13.4	13.1	14.3	14.0	14.0	13.5	14.5	14.1	14.1	2.0	4	-	-	-	-	609
3.0	686	2.93	28.6	59.2	2.3	1.7	3.3	96.9	13.1	13.1	14.6	14.1	13.8	13.4	14.5	14.6	14.4	1.5	4	-	-	-	-	664
4.8	706	2.81	26.5	61.0	2.4	2.1	3.3	95.4	13.4	12.9	14.0	13.3	13.3	13.5	14.0	13.8	13.6	1.8	3	1	-	-	-	689
5.0	674	3.05	28.2	60.1	2.9	2.6	3.3	95.3	13.9	12.8	12.3	12.9	12.1	13.5	12.3	12.4	12.4	2.5	1	2	1	-	-	697
5.1	671	3.10	27.4	60.0	2.9	2.6	3.4	95.0	13.9	12.9	12.6	12.3	12.5	13.5	12.8	12.5	12.6	3.0	1	3	-	-	-	724
5.0	682	2.99	28.1	59.8	2.8	2.2	3.2	96.1	13.3	12.6	13.0	12.9	12.9	13.3	13.3	13.6	13.3	2.5	1	3	-	-	-	738
4.3	684	3.08	27.7	59.5	2.7	2.2	3.3	96.3	13.5	12.9	13.3	13.8	13.8	13.3	13.4	13.5	13.8	2.0	1	3	-	-	-	683
6.1	683	3.10	27.2	60.5	2.9	2.3	3.4	96.8	13.1	12.5	12.6	13.1	13.8	13.3	13.0	13.9	13.3	2.3	1	3	-	-	-	691
5.0	678	3.03	27.5	59.9	2.7	2.6	3.3	95.9	13.4	12.5	13.5	13.5	13.5	13.3	13.3	12.6	13.4	2.0	-	4	-	-	-	692
3.6	676	3.00	28.8	58.8	2.3	2.1	3.2	97.6	13.5	12.9	14.0	13.3	12.6	13.3	14.0	13.9	13.5	3.0	3	1	-	-	-	748
5.0	686	3.00	27.7	59.9	2.8	2.1	3.3	96.0	13.4	12.8	13.3	12.8	12.1	13.5	13.1	13.6	12.8	2.3	2	2	-	-	-	703
6.4	667	3.12	26.7	61.2	3.0	2.7	3.5	98.4	14.6	12.8	12.1	12.1	12.5	13.5	12.0	12.1	12.3	2.5	-	3	1	-	-	721
4.0	675	2.88	28.4	59.5	2.7	2.4	3.3	97.4	13.6	13.0	13.4	13.4	12.8	13.8	13.1	13.0	13.3	2.3	2	2	-	-	-	635
6.3	696	2.94	27.3	61.0	2.7	1.8	3.3	97.6	13.5	12.8	13.4	13.4	13.6	13.6	13.5	14.3	13.8	2.5	1	3	-	-	-	646
4.5	678	2.88	27.5	60.2	2.4	1.7	3.1	99.5	13.0	13.3	14.5	13.0	13.1	13.5	14.1	14.3	13.8	2.0	4	-	-	-	-	703
4.8	666	3.05	28.2	59.3	2.9	2.1	3.2	95.6	13.6	12.4	12.5	12.9	12.9	13.8	12.8	13.5	12.8	2.5	-	3	1	-	-	676
3.0	669	2.97	29.3	58.1	2.6	2.2	3.3	95.0	13.7	12.5	13.0	13.0	12.2	13.2	13.5	13.5	13.2	2.5	1	2	-	-	-	677
3.1	659	3.04	28.6	59.3	2.6	2.0	3.3	96.3	13.6	12.8	13.8	13.3	12.9	13.1	13.8	14.0	13.8	2.8	1	3	-	-	-	744
5.6	676	2.98	27.1	59.8	2.4	1.8	3.2	97.8	13.5	12.9	14.3	12.6	12.5	13.3	14.1	14.4	13.0	2.5	4	-	-	-	-	732
5.9	692	2.85	26.6	61.4	2.6	1.9	3.3	94.0	13.4	12.8	13.6	13.4	13.6	13.6	13.5	14.4	13.5	2.3	1	3	-	-	-	733
7.5	699	2.87	25.3	62.7	2.6	1.9	3.3	95.0	13.4	12.6	12.8	13.9	14.1	13.6	13.5	14.4	13.8	2.5	1	3	-	-	-	610

Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.97
Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.06

Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.00
Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise				Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede				
							galte	søer			
Torkilstrup	S 648	8-7-62	Lama, 23-8-60	89,	8-8-60	2	2	2	2	76	179
do	S 658	16-7-62	Topp, 18-11-60	93,	25-3-61	2	2	2	2	79	186
Tornby	J 681	9-6-62	Siv, 5-8-61	69,	29-3-61	2	2	2	2	72	174
do	J 688	16-6-62	do	68,	29-1-61	2	2	2	2	74	177
Tornbygaard	S 597	26-5-62	Egil, 12-7-60	70,	27-7-60	2	2	2	2	83	191
Trediehave	V 627	16-4-62	Kvist, 22-9-59	47,	18-2-60	2	2	2	2	107	219
do	V 674	12-6-62	Musta, 4-8-61	58,	4-5-61	2	2	2	2	80	183
do	V 684	16-6-62	Skjold 97, 9-12-60	54,	9-12-60	2	2	2	2	86	186
do	V 734	10-8-62	Mads, 1-10-58	57,	2-11-60	2	2	2	2	81	183
Troelstrup	F 741	23-8-62	Røs, 23-9-61	1,	23-1-61	2	2	2	2	74	176
do	F 742	18-8-62	do	4,	16-8-61	2	2	2	2	79	184
Tved	V 662	12-6-62	Let, 8-10-60	33,	15-12-60	2	2	2	2	70	175
Tøndagergaard	J 702	26-6-62	Dario, 2-1-61	33,	5-7-61	2	2	2	2	90	188
do	J 711	22-6-62	do	32,	5-7-61	2	2	2	2	95	199
Ullerslev	F 706	14-7-62	Nr.85 Despot, 23-11-58	86,	28-5-60	2	2	2	2	78	182
Ungstrup	V 666	30-5-62	Brask, 21-11-60	53,	18-11-61	2	2	2	2	80	183
Vattrup Nørgaard	J 756	25-8-62	Agi, 12-6-61	59,	15-1-61	2	2	2	2	81	180
Velling	V 700	8-7-62	Mourids, 17-6-60	26,	10-6-60	2	2	2	2	69	175
Vesterballegaard	F 671	13-6-62	Nr.20 Puskas, 21-3-61	29,	28-10-60	2	2	2	2	74	179
do	F 723	27-7-62	do	6,	22-5-59	2	2	2	2	73	175
do	F 725	1-8-62	Nr.30 Jan, 5-8-61	2,	1-2-59	2	2	2	2	79	189
do	F 734	17-8-62	Nr.25 Ørsbo, 7-12-59	23,	4-6-60	2	2	2	2	67	173
Vestergaard	S 619	5-6-62	Ib, 26-7-60	20,	3-7-61	2	2	2	2	94	194
Vester Kjeldgaard	J 682	7-6-62	Otto, 5-11-60	94,	12-1-61	2	2	2	2	75	179
Vestermarks Mølle	V 664	7-6-62	Balder, 23-5-59	33,	11-6-61	2	2	2	2	72	176
do	V 665	9-6-62	do	34,	11-6-61	2	2	2	2	71	179
Viirmandsgaard	S 647	4-7-62	Glenn, 2-9-61	58,	9-7-61	2	2	2	2	81	187
do	S 674	14-8-62	do	49,	14-2-61	2	2	2	2	75	177
do	F 693	9-7-62	Klar, 15-7-60	47,	29-6-60	2	2	2	2	67	172
Vilhelmshøj	S 631	30-6-62	Smut (7521)	47,	20-11-60	2	2	2	2	75	181
do	S 632	2-7-62	Brøgger, 21-4-61	46,	20-11-60	2	2	2	2	70	171
do	S 633	24-6-62	do	51,	22-4-61	2	2	2	2	76	178
Vinding	V 710	21-7-62	Abel, 15-6-59	90,	7-9-60	2	2	2	2	74	171
Vium	J 695	10-7-62	Kromann, 5-8-61	29,	28-11-60	2	2	2	2	67	170
do	J 729	10-8-62	Hjortshøj Reel, 23-11-59	25,	11-6-60	2	2	2	2	68	172
do	J 739	25-8-62	do	32,	28-11-60	2	2	2	2	74	185
Vrigsted	F 698	15-7-62	Bajads, 14-8-60	33,	30-10-59	2	2	2	2	75	180
do	F 699	13-7-62	do	32,	30-10-59	2	2	2	1	71	182

I gennemsnit																			Klasse																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm		Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af										Kødfarve, 0-5 points																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflæsk	sidespæk-mål		bug	flæskets fasthed	bov	rygflæs-kets fordeling	bugens tykkel-se og kvalitet	skink form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfylde	overskåret	type																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

S Sjælland
F Fyn

F.e.pr.kg.tilv. 2.97
F.e.pr.kg.tilv. 3.06

J Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.00
V Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93

I gennemsnit																			Kødfarve, 0-5 points	Klasse				Hold-nr.
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af															
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflæsk	sidespækmål	bug		flæskest fasthed	bov	rygflæskest fordeling	bugens tykkel- se og kvalitet	skink. form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type							
															hel	overskåret								
66.1	659	3.03	26.8	60.9	2.9	2.5	3.3	94.8	14.0	12.6	12.6	13.1	13.4	13.5	12.6	12.8	12.9	2.3	-	3	1	-	666	
67.0	647	3.23	26.3	61.1	3.0	2.9	3.5	96.4	14.1	12.5	12.0	13.1	13.4	13.6	12.3	11.4	12.0	2.5	-	3 ¹	1	-	712	
65.2	677	2.99	27.3	60.5	2.69	2.30	3.31	96.0	13.6	12.8	13.1	13.1	13.0	13.5	13.2	13.1	13.1	2.33	%	%	%	%		
65.3	686	2.97	27.2	60.8	2.63	2.21	3.33	96.0	13.7	12.9	13.2	13.3	13.3	13.5	13.4	13.3	13.3	2.34	38	60	2	-		
65.4	669	3.06	27.3	60.3	2.70	2.32	3.30	95.7	13.7	12.7	13.1	13.1	13.0	13.5	13.2	13.1	13.0	2.43	31	63	6	0.3		
64.9	682	3.00	27.7	60.0	2.76	2.39	3.31	96.0	13.6	12.7	13.0	13.1	13.1	13.5	13.0	13.1	13.0	2.36	31	63	6	-		
65.2	672	2.93	27.3	60.6	2.69	2.32	3.29	96.3	13.5	12.8	13.2	13.1	12.8	13.5	13.2	13.1	12.9	2.21	39	57	4	0.3		

Bemærkninger 2. kvartal 52. beretning

Sjælland.

- 603 1 galtgris havde nysesygge
 607 1 sogris død af hjertelammelse. Alder 163 dage, vægt 87.5 kg
 613 1 galtgris havde nysesygge
 620 1 galtgris havde nysesygge
 623 1 galtgris havde nysesygge
 624 1 galtgris havde nysesygge
 625 1 galtgris, 565 g dgl. tilv. og 3.16 f.e.pr.kg.tilv., syg på forsøgsstationen af lungebetændelse. Ikke medregnet i gennemsnittet
 639 1 sogris havde nysesygge
 650 1 sogris, 565 g dgl. tilv. og 3.37 f.e.pr.kg.tilv., syg på forsøgsstationen af bughindebetændelse. Ikke medregnet i gennemsnittet
 652 2 sogrise havde nysesygge
 665 1 sogris, 592 g dgl.tilv og 3.45 f.e.pr.kg tilv., utrivelig på forsøgsstationen. Ikke medregnet i gennemsnittet. 1 galtgris havde nysesygge
 670 1 galtgris havde nysesygge
 682 1 galtgris død af lungebetændelse. Alder 160 dage, vægt 42.0 kg
 689 1 sogris havde nysesygge

OPLØSTE HOLD

Hold nr.	Center	Bemærkninger
608	Lundesten	1 utrivelig galtgris udsat af holdet Alder 216 dage, vægt 88.0 kg 1 sogris død af tarmslyng. Alder 154 dage, vægt 59.0 kg

Fyn.

- 663 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge
 670 1 galtgris udsat af holdet p.gr.a. lungebetændelse. Alder 152 dage, vægt 53.0 kg
 677 1 galtgris udsat af holdet p.gr.a. lungebetændelse. Alder 177 dage, vægt 73.0 kg
 680 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. lammelse i bagkroppen. Alder 187 dage, vægt 78.0 kg
 688 1 galtgris og 2 sogrise havde nysesygge
 695 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. lungehindebetændelse. Alder 189 dage, vægt 71.0 kg
 699 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. lungehindebetændelse. Alder 152 dage, vægt 47.0 kg
 714 1 sogris havde nysesygge

Jylland.

- 709 1 sogris død af tarmbetændelse. Alder 113 dage, vægt 31.0 kg
 736 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. ledbetændelse. Alder 186 dage, vægt 77.0 kg
 740 1 galtgris udsat af holdet p.gr.a. bylder. Alder 162 dage, vægt 67.0 kg

Vestjylland.

641	1 galtgris og 1 sogris havde nysesysge
669	1 sogris havde nysesysge
694	1 utrivelig galtgris udsat af holdet . Alder 188 dage, vægt 64.0 kg
702	1 galtgris og 1 sogris havde nysesysge
724	1 sogris havde nysesysge
736	1 galtgris og 1 sogris havde nysesysge

De sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre

**FORELØBIGE MEDDELELSER
FRA FORSØGSLABORATORIET 1962/63 NR.3
1. MARTS 1963 TIL 31. MAJ 1963**

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede			
							galte	søer		
Aalsbogaard	F 805	12-11-62	Nr.55 Expres, 1-10-59	8, 15-1-61	2	2	2	2	79	190
Aalsbo Møllegaard	F 799	11-11-62	Nr.70 Maks, 19-12-61	66, 21-11-61	2	2	2	2	78	192
Aarlundgaard	V 750	14-8-62	Olsen, 9-4-61	51, 8-7-61	2	2	2	2	100	201
Abildore	S 804	10-10-62	X.69, 18-12-61	101, 30-10-61	2	2	2	2	81	186
do	S 805	15-10-62	do	95, 30-10-61	2	2	2	2	76	175
Anslet	V 749	18-8-62	Pikant, 12-7-61	4, 28-9-60	2	2	2	2	93	193
Baarse Vesterskov	S 704	15-9-62	Sjøberg, 2-8-60	24, 14-2-60	2	2	2	2	77	182
do	S 833	22-11-62	do	38, 1-6-61	2	2	2	2	74	176
Bajlum Overgaard	J 790	1-10-62	Bajlum Palle, 28-2-61	109, 16-9-61	2	2	2	2	75	183
Baunggaard	S 681	8-8-62	Wille, 6-11-58	62, 29-9-59	2	2	2	2	100	203
do	S 721	28-9-62	Brutto, (7435)	68, 20-10-60	2	2	2	2	87	190
Bellinge	F 750	30-8-62	Nr.80 Alfred, 24-10-61	91, 19-9-61	2	2	2	2	73	177
do	F 769	22-9-62	do	82, 5-4-61	2	2	2	2	72	180
Billum	V 778	28-9-62	Skjold, 5-9-60	89, 3-9-61	2	2	2	2	86	199
do	V 814	21-11-62	do	91, 18-7-61	2	2	2	2	70	180
Bjerregaard	S 724	11-10-62	Nicolej, 12-1-61	36, 17-10-61	2	2	2	2	82	185
do	S 725	10-10-62	do	35, 17-10-61	2	2	2	2	83	185
Bjørnsholm	J 810	16-11-62	Loke, 21-3-61	12, 13-3-60	2	2	2	2	71	176
Blegind Søgaard	J 757	28-8-62	Visti, 16-5-61	23, 13-8-61	2	2	2	2	87	194
do	J 788	29-9-62	do	22, 12-4-61	2	2	2	2	86	197
Blinksbjerggaard	F 796	10-11-62	Nr.70 Bolsen, 23-11-61	43, 28-6-60	2	2	2	2	72	184
Bramhale	V 787	26-10-62	Hjalte, 21-3-61	27, 3-10-61	2	2	2	2	81	191
do	V 788	21-10-62	do	26, 3-10-61	2	2	2	2	80	191
do	V 789	22-10-62	do	22, 31-3-61	2	2	2	2	85	190
Brandborggaard	J 764	7-9-62	Pas, 24-9-60	80, 10-2-61	2	2	2	2	87	191
do	J 797	15-10-62	Laust (7553)	82, 6-10-61	2	2	2	2	69	186
Brohøjgaard	S 827	1-11-62	Brodex, 22-1-61	36, 2-10-60	2	2	2	2	87	190
do	S 828	1-11-62	do	37, 2-10-60	2	2	2	2	92	198
Brørup	V 763	5-9-62	Junker, 12-6-61	6, 29-4-61	1	3	1	3	93	197
do	V 774	25-9-62	do	1, 29-4-61	2	2	2	2	89	195
do	V 773	20-9-62	Grand, 17-4-59	2, 29-4-61	2	2	2	2	91	195
do	V 809	15-11-62	Nobel, 26-8-59	98, 17-12-60	2	2	2	2	78	186
Bødstrup	S 703	18-9-62	Raklev, 29-8-61	22, 22-1-60	2	2	2	2	77	185
Daastruplund	S 813	3-11-62	Knøv, 17-1-60	75, 20-3-61	2	2	2	2	72	179
do	S 836	31-10-62	Ping, 25-2-59	68, 28-3-60	2	2	2	2	101	201
Danhøjgaard	J 806	4-11-62	Danbo, 6-2-61	15, 17-5-59	2	2	2	2	68	178
do	J 815	6-11-62	Dorn, 6-9-61	23, 5-11-61	2	2	2	2	91	190

I gennemsnit																		Klasse				Hold-nr.	
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af														
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfyldte		type						
																		Kødfarve, 0-5 points	AI	A	B	C	
64.3	634	3.02	27.8	59.9	2.4	1.9	3.2	96.3	13.5	13.0	14.1	13.3	13.8	13.3	13.9	14.0	14.1	2.5	4	-	-	-	805
64.6	624	3.17	27.5	60.0	2.6	1.9	3.1	96.0	13.8	13.0	13.3	12.8	13.3	13.4	13.5	13.9	13.8	2.5	3	1	-	-	799
66.6	695	2.84	27.1	60.7	2.8	2.3	3.3	97.4	13.4	13.0	13.4	12.9	12.5	13.4	12.9	13.3	13.0	2.5	-	4	-	-	750
64.0	671	2.99	28.2	59.8	2.6	2.1	3.4	95.5	13.9	12.9	13.5	13.1	12.4	13.4	13.4	13.1	13.0	2.5	2	2	-	-	804
63.5	707	2.78	28.8	59.0	2.5	2.0	3.2	96.8	13.6	13.0	13.6	13.5	12.3	13.5	13.6	13.3	13.3	2.8	2	2	-	-	805
65.3	706	2.75	27.3	60.4	2.5	2.2	3.2	96.8	13.4	12.9	13.9	12.8	12.4	13.5	13.8	13.4	13.3	2.5	2	2	-	-	749
64.1	673	2.96	27.5	60.2	2.6	2.3	3.5	96.8	14.1	12.8	13.0	12.4	12.4	13.8	13.0	12.8	12.6	2.5	1	3	-	-	704
64.0	689	2.92	28.0	60.2	2.3	1.9	3.5	95.5	13.6	13.0	13.9	12.9	13.1	13.1	13.9	13.6	13.5	2.3	4	-	-	-	833
64.3	648	3.06	27.7	59.6	2.9	2.5	3.3	96.5	13.1	12.4	12.4	13.0	12.3	13.4	12.4	13.1	12.5	2.5	-	3	1	-	790
64.8	680	2.95	27.4	60.4	2.8	2.8	3.2	95.8	14.0	12.9	12.4	13.4	12.8	13.0	12.9	11.9	12.4	2.5	-	4	-	-	681
64.6	682	2.88	26.7	61.2	2.5	2.2	3.2	95.5	13.4	12.8	13.3	13.3	13.0	13.4	13.5	13.6	13.6	3.0	1	3	-	-	721
65.8	674	2.96	27.3	60.4	2.7	2.2	3.2	95.9	13.3	12.6	12.9	12.6	13.4	13.6	13.3	13.4	13.1	2.3	-	4	-	-	750
63.5	649	3.00	28.6	59.3	2.6	1.9	3.2	97.6	13.1	12.9	13.1	13.4	13.5	13.4	13.8	13.5	13.4	2.8	1	3	-	-	769
64.4	625	3.15	28.1	60.2	2.9	2.9	3.3	96.9	13.9	12.8	12.1	12.9	11.8	13.8	12.5	11.9	12.0	2.5	-	3	1	-	778
67.1	636	2.96	25.8	61.7	2.7	2.4	3.4	95.6	13.6	12.6	13.4	13.1	13.6	13.4	13.4	13.0	13.5	1.8	2	2	-	-	814
63.5	680	2.92	28.4	59.3	2.4	2.2	3.3	95.3	13.3	13.1	14.3	13.5	13.6	13.6	14.3	13.3	13.8	1.5	3	1	-	-	724
64.5	683	2.88	27.7	60.0	2.1	2.1	3.4	97.6	13.4	13.1	14.3	13.5	13.0	13.3	14.3	13.9	13.8	2.8	4	-	-	-	725
65.3	668	3.02	27.3	60.3	2.5	2.1	3.2	99.5	13.8	13.0	13.3	13.3	12.4	13.0	13.8	13.9	13.3	2.5	3	1	-	-	810
66.3	655	3.14	27.0	60.1	2.7	2.4	3.3	98.4	13.6	12.8	13.4	13.3	12.8	13.4	13.4	12.9	13.1	2.8	2	2	-	-	757
66.0	630	3.14	27.1	60.4	2.4	1.9	3.3	97.6	13.1	12.9	14.0	13.5	14.1	13.5	14.1	14.0	13.9	1.8	3	1	-	-	788
64.5	626	3.17	28.3	59.2	2.7	2.9	3.3	96.8	13.8	12.6	13.3	13.0	12.9	13.0	13.1	11.1	12.1	2.5	1	3 ¹	-	-	796
66.8	635	2.93	26.8	61.0	2.7	2.2	3.3	96.4	13.5	12.9	12.9	13.1	12.5	13.4	13.1	13.3	13.0	2.5	1	3	-	-	787
65.1	635	2.87	27.4	60.5	2.4	1.8	3.2	98.0	13.5	13.3	13.3	13.1	13.1	13.1	13.5	14.1	13.4	1.5	2	2	-	-	788
65.5	670	2.81	27.1	60.5	2.3	1.9	3.2	97.0	13.5	13.1	14.3	13.5	12.4	13.8	14.0	13.8	13.4	2.5	4	-	-	-	789
65.8	672	2.95	27.3	60.2	2.8	2.2	3.3	95.1	13.6	12.5	12.5	12.8	13.0	13.3	12.8	13.3	13.1	2.0	-	4	-	-	764
64.5	598	3.22	27.1	60.1	2.6	2.4	3.3	97.4	13.8	12.9	13.3	13.0	12.3	13.3	13.3	13.1	12.8	2.5	1	3	-	-	797
63.0	682	2.92	29.2	58.9	2.6	2.2	3.2	96.3	13.9	12.8	13.0	13.1	12.8	13.5	13.4	13.5	13.3	2.5	1	3	-	-	827
65.9	658	3.02	27.4	60.8	2.7	2.0	3.3	95.5	13.4	12.5	12.9	13.8	13.5	13.5	13.1	13.9	13.3	2.8	1	3	-	-	828
65.0	675	2.97	27.2	61.0	2.7	2.3	3.4	96.1	14.1	12.6	13.4	13.3	13.1	13.8	13.3	13.1	13.3	2.2	2	2	-	-	763
64.8	666	2.99	27.5	60.6	2.6	2.4	3.3	97.3	13.5	12.8	13.1	13.3	12.4	13.5	13.4	13.0	13.1	2.0	1	3	-	-	774
65.3	668	2.93	27.1	60.8	2.8	2.4	3.3	96.3	13.6	12.8	12.5	13.0	11.9	13.5	12.6	12.6	12.3	2.0	-	4 ¹	-	-	773
66.5	655	2.97	26.3	61.9	2.8	2.8	3.5	95.5	13.9	12.4	13.0	12.9	12.6	13.5	12.9	12.1	12.6	2.5	1	3	-	-	809
64.5	653	3.09	27.6	60.3	2.6	2.4	3.5	94.6	13.8	12.8	13.1	13.6	13.1	14.0	13.4	13.0	13.4	2.0	2	2	-	-	703
63.8	654	3.04	28.4	59.1	2.4	1.8	3.2	98.4	13.3	13.3	13.5	13.1	14.0	13.4	14.1	13.6	13.8	1.8	3	1	-	-	813
66.8	696	2.93	26.5	61.1	2.6	2.3	3.3	96.8	13.6	12.9	13.4	13.3	13.5	13.5	13.4	13.4	13.6	2.0	1	3	-	-	836
63.5	638	3.10	28.8	58.9	2.5	1.8	3.3	96.6	13.1	13.1	13.5	13.3	13.3	13.3	13.6	14.1	13.6	2.3	2	2	-	-	806
65.6	708	2.76	26.5	61.3	2.5	2.3	3.3	97.6	13.1	12.8	13.6	13.9	12.8	13.1	13.9	13.8	13.6	2.3	3	1	-	-	815

S Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93
F Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.04

J Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.04
V Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.94

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget		slagtede		
						gatte	søer			
								gatte		
Diegaard	S 688	16-9-62	Flak, 20-9-61	80, 23-10-61	2	2	2	68	171	
Dybbøl do	V 764	9-9-62	Snild, 6-10-61	80, 12-10-61	2	2	2	87	200	
	V 784	8-10-62	do	81, 12-10-61	2	2	2	77	197	
Dybdalgaard	F 760	19-9-62	Nr.5 Vivaldi, 13-9-61	83, 12-10-60	2	2	2	63	173	
Dybe do	V 744	22-8-62	Raket, 31-10-61	78, 23-7-61	2	2	2	84	189	
	V 776	1-10-62	do	80, 23-7-61	2	2	2	80	186	
Duemosegaard do	J 760	6-9-62	Jan, 20-8-60	31, 19-1-61	2	2	2	74	183	
	J 779	15-9-62	do	29, 19-1-61	2	2	2	83	191	
Egemosegaard do	S 694	26-8-62	Felix (7557)	64, 28-3-61	2	2	2	87	188	
	S 815	18-10-62	Knøv, 17-1-60	70, 30-9-61	2	2	2	82	189	
Eilkjær	S 834	11-11-62	Ebbe, 29-3-61	87, 13-4-61	2	2	2	84	191	
Engholm	F 808	25-11-62	Nr.35 Primas, 7-12-59	83, 12-7-61	2	2	2	70	182	
Ennebøllegaard	F 777	2-10-62	Nr.60 Kleemann, 21-11-58	61, 26-3-60	2	2	2	78	192	
Eskjærgaard do	F 749	24-8-62	Fætter, 18-7-61	14, 17-7-61	2	2	2	76	184	
	F 802	20-11-62	do	16, 25-10-61	2	2	2	71	182	
Fabjerg do do	V 753	27-7-62	Bøg, 19-2-60	27, 24-8-61	2	2	2	105	212	
	V 754	4-8-62	Saab, 15-10-61	28, 31-8-61	2	2	1	96	197	
	V 792	19-10-62	Samos, (7535)	21, 12-11-60	2	2	2	85	203	
Frueholm	J 776	15-9-62	Kasper, 20-11-61	63, 30-5-61	2	2	2	77	189	
Fulby	S 841	12-11-62	Darius, 29-4-61	74, 5-3-61	2	2	2	80	185	
Funder	V 781	2-10-62	Tip, 30-3-61	47, 31-1-61	2	2	2	91	200	
Graasten do do	V 790	27-10-62	Preben, 11-7-60	84, 24-3-61	2	2	2	76	188	
	V 791	23-10-62	do	83, 30-12-60	2	2	2	82	189	
	V 805	11-11-62	Ting, 21-2-60	87, 25-10-61	2	2	2	78	186	
Gram do	V 759	3-9-62	Frode, 3-4-61	43, 19-1-61	2	2	2	86	197	
	V 779	6-10-62	do	32, 5-6-59	2	2	2	83	189	
Grangaard do do	F 762	15-9-62	Kup, 14-11-60	51, 3-8-61	2	2	2	65	177	
	F 774	4-10-62	do	52, 3-8-61	2	2	2	65	175	
	F 778	7-10-62	do	53, 3-8-61	2	2	2	69	179	
Gruegaard do do	V 777	13-10-62	Eg 65, 31-7-60	54, 19-11-61	2	2	2	79	184	
	V 783	18-10-62	do	57, 25-11-61	2	2	2	79	186	
	V 782	14-10-62	Bøg 95, 21-9-61	56, 23-10-61	2	2	2	83	191	
Grøftebjerg do do	F 771	3-10-62	Nr.30 Karlo, 3-8-61	31, 29-9-61	2	2	2	67	183	
	F 775	13-10-62	Nr.25 Kantor, 28-2-61	27, 12-2-61	2	2	2	64	178	
	F 776	10-10-62	Nr.75 Passer, 20-11-57	13, 10-2-60	2	2	2	75	187	
Grønhøj do	F 783	12-10-62	Fenrik, 21-5-58	98, 1-5-61	2	2	2	75	187	
	F 803	25-11-62	Kansler, 2-2-62	4, 5-11-61	2	2	2	61	172	

Num. slagtevegt	I gennemsnit																	Kødfarve, 0-5 points	Klasse				Hold-nr.	
	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af										AI	A	B	C		
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflask	sidespækmål	bug		flaskets fasthed	bov	rygflaskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfylde		type							
															hel	overskåret								
3.0	674	2.88	26.9	60.9	2.7	2.2	3.2	96.5	13.4	12.9	13.5	12.9	13.8	13.6	13.4	13.1	13.3	2.3	2	2	-	-	688	
4.0	620	3.27	28.4	59.3	2.9	2.5	3.2	98.8	13.3	12.6	12.3	12.6	10.1	13.9	12.0	12.3	11.4	2.8	-	2	2	-	764	
5.0	585	3.20	26.7	60.8	2.7	2.4	3.5	96.5	13.6	12.8	13.1	13.0	12.4	13.3	12.9	12.8	12.9	2.3	1	3	-	-	784	
4.9	638	3.08	28.1	59.0	2.4	1.8	3.2	96.9	13.1	12.9	13.9	12.8	13.6	13.3	13.9	14.0	13.6	2.8	3	1	-	-	760	
3.1	668	3.00	26.1	61.7	2.8	2.4	3.3	98.5	13.8	12.8	12.6	12.9	12.8	13.6	12.6	13.0	12.8	2.5	1	3	-	-	744	
5.3	663	2.87	27.2	60.8	2.5	1.8	3.2	97.1	13.3	13.0	13.9	13.1	12.8	13.6	13.6	14.0	13.6	1.0	3	1	-	-	776	
5.5	646	3.14	27.3	60.5	2.5	2.0	3.3	96.9	13.1	12.9	13.4	13.5	13.6	13.4	13.5	14.0	13.6	1.8	3	1	-	-	760	
6.3	647	3.06	26.2	61.4	2.7	2.3	3.3	96.9	13.6	12.4	12.8	13.0	12.9	13.1	13.0	13.5	13.1	2.5	-	4	-	-	779	
5.3	690	2.91	27.3	60.7	2.7	2.0	3.3	96.1	13.9	12.8	13.1	13.4	14.0	13.4	13.5	13.6	13.6	2.0	3	1	-	-	694	
3.6	656	2.94	28.8	59.3	2.3	1.8	3.3	99.3	13.3	13.4	13.6	13.6	13.8	13.4	14.3	13.9	13.9	2.5	4	-	-	-	815	
5.8	657	3.13	27.0	60.1	2.9	2.5	3.2	96.9	14.6	12.4	11.6	12.1	11.5	14.1	11.8	12.8	11.8	2.8	-	4	-	-	834	
7.5	626	3.12	25.9	61.2	2.6	1.8	3.2	96.9	13.4	12.9	13.6	13.0	13.4	13.5	13.6	14.3	13.6	1.5	1	3	-	-	808	
4.8	615	3.16	27.9	60.0	2.5	2.5	3.3	95.5	13.3	13.0	13.5	13.4	12.3	13.6	13.6	12.8	12.8	2.5	2	2	-	-	777	
4.4	643	3.07	28.0	59.7	2.6	2.4	3.2	96.0	13.6	12.8	13.5	12.5	13.3	13.5	13.6	12.9	13.1	2.5	2	2	-	-	749	
4.8	631	3.08	27.4	60.1	3.1	2.4	3.3	95.9	13.6	12.5	11.9	12.9	12.8	13.6	12.0	12.4	12.3	2.8	-	3	1	-	802	
5.6	656	2.95	26.9	61.1	2.8	2.8	3.3	97.5	13.8	12.6	12.9	13.3	11.8	14.0	12.8	12.3	12.4	2.5	-	4 ¹	-	-	753	
6.3	691	2.79	26.8	60.5	2.9	2.7	3.4	96.3	13.5	12.3	12.8	12.3	12.5	13.5	12.3	12.3	12.3	2.5	-	3	-	-	754	
5.5	596	3.19	27.1	60.4	2.7	2.8	3.3	96.8	13.9	13.4	13.5	13.0	12.8	13.9	13.1	11.9	12.8	2.5	2	2 ¹	-	-	792	
6.9	625	3.13	26.7	60.7	2.5	2.4	3.4	96.9	13.1	12.4	13.9	12.5	12.8	12.8	13.9	13.1	13.0	2.3	3	1	-	-	776	
3.4	669	3.02	28.0	59.8	2.6	2.1	3.4	94.9	14.0	12.8	12.8	12.8	12.9	13.9	13.1	12.9	12.8	2.3	2	2	-	-	841	
5.3	649	3.04	27.0	61.0	2.7	2.2	3.3	97.5	13.4	13.3	13.3	13.4	13.4	13.6	13.1	13.1	13.5	2.8	2	2	-	-	781	
5.8	620	3.15	27.6	60.9	2.8	2.4	3.3	97.0	14.0	13.0	13.1	13.1	12.6	14.0	12.9	12.4	12.8	2.3	1	3	-	-	790	
3.3	654	3.02	28.6	59.7	2.6	2.4	3.2	97.4	14.3	13.0	12.9	12.6	12.8	13.5	13.0	12.0	12.6	2.0	2	1	1	-	791	
4.6	652	2.94	27.7	60.5	2.5	2.3	3.3	95.9	14.0	13.3	13.6	13.0	12.3	13.3	13.5	12.9	13.0	2.5	3	1	-	-	805	
7.1	633	3.00	26.4	61.6	2.4	2.2	3.3	96.9	13.5	12.6	13.8	13.1	12.9	13.3	13.8	13.4	13.3	2.8	2	2	-	-	759	
6.0	659	2.92	27.3	61.0	2.7	2.2	3.3	96.3	13.3	12.9	13.1	13.4	12.9	12.9	13.1	13.4	13.3	2.0	2	1	1	-	779	
5.8	627	3.09	27.0	60.6	2.7	1.9	3.4	97.3	13.4	12.8	13.0	13.1	13.4	13.0	13.1	14.0	13.4	2.8	2	2	-	-	762	
5.0	633	3.12	26.9	61.0	2.6	2.1	3.3	97.0	13.6	13.3	13.0	13.1	13.3	13.5	13.4	13.9	13.6	2.5	1	3	-	-	774	
4.9	639	3.00	27.9	59.5	2.6	2.2	3.3	96.5	13.0	13.0	13.3	12.4	10.9	13.4	13.3	13.8	11.9	2.5	1	3	-	-	778	
5.0	663	2.96	26.9	61.2	2.7	2.5	3.4	92.9	13.8	12.8	13.4	12.8	12.9	13.4	13.1	12.3	12.8	2.3	2	2 ¹	-	-	777	
5.8	651	2.93	27.0	60.9	2.6	2.6	3.4	95.3	13.6	12.9	13.5	12.8	13.3	13.4	13.5	11.9	12.6	2.5	3	-	1	-	783	
6.0	644	3.01	27.0	60.9	2.8	2.3	3.1	97.4	14.1	12.6	12.6	13.0	13.0	13.9	12.9	13.1	12.8	2.0	2	1	1	-	782	
4.1	612	3.10	28.4	59.0	2.5	2.4	3.2	96.8	13.3	13.0	13.5	13.4	12.8	13.4	13.6	13.0	13.1	2.3	2	2	-	-	771	
4.9	613	3.22	26.9	60.6	2.6	2.2	3.4	93.5	13.4	12.4	13.1	13.1	12.6	13.5	13.0	13.5	12.8	2.3	2	2	-	-	775	
4.1	620	3.23	28.2	59.2	2.7	2.6	3.2	94.8	13.6	12.8	13.0	13.3	12.3	13.5	12.8	12.1	12.4	2.5	2	2 ¹	-	-	776	
6.1	624	3.08	26.9	60.8	2.5	2.0	3.3	94.8	13.5	12.6	13.3	13.9	13.6	13.5	13.9	13.6	13.5	1.5	2	2	-	-	783	
5.6	636	3.02	26.6	60.7	2.6	2.0	3.3	94.8	13.3	12.8	13.3	13.1	13.1	13.1	13.6	13.8	13.4	1.5	2	2	-	-	803	

Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93
Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.04

Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.04
Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.94

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede			
							galle søer	galle søer		
Grønsund Færgegaard	S 700	1-9-62	Sas, 11-8-60	94, 16-3-60	2	2	2	88	185	
Gustavesensminde	J 773	14-9-62	Thorkild, 6-2-61	95, 14-9-61	2	2	2	81	185	
do	J 774	15-9-62	do	96, 11-6-61	2	2	2	77	182	
do	J 800	8-10-62	do	85, 25-12-60	2	2	2	80	197	
Gylling Overballe	F 786	15-10-62	Øbo, 21-1-61	24, 11-5-60	2	2	2	83	198	
Gyrstinge	S 720	11-10-62	Mobuto, 21-1-61	83, 17-3-60	2	2	2	73	177	
do	S 808	4-11-62	do	92, 30-4-61	2	2	2	78	183	
Hagelbjerggaard	S 818	4-11-62	Uldahl, 8-1-62	13, 18-9-61	2	2	1	78	173	
do	S 823	11-11-62	Granberg, 22-2-61	92, 20-7-60	2	2	2	78	177	
Hagerup Højvang	S 803	16-10-62	Kalmas, 17-9-61	76, 9-12-61	2	2	2	71	174	
Hammel	J 819	25-11-62	Dubi, 14-5-61	89, 1-1-61	2	2	2	81	186	
Hanstedgaard	S 824	12-11-62	Tønnes, 15-7-61	36, 4-7-60	2	2	2	71	175	
Haugaard	F 785	21-10-62	Ven, 27-9-61	82, 28-7-61	2	2	2	68	180	
do	F 801	9-11-62	do	83, 22-8-61	2	2	2	77	188	
Havlykke	S 829	16-11-62	Findus, 30-10-61	55, 12-12-58	2	2	2	70	174	
Hejedegaard	S 810	30-10-62	Pass, 2-1-61	73, 30-8-60	2	2	2	70	168	
Helhøjgaard	S 726	20-9-62	Hejbo, 14-11-60	23, 23-2-60	2	2	2	105	208	
do	S 806	30-9-62	do	27, 16-8-60	2	2	2	92	193	
do	S 842	17-11-62	Hot, 30-5-61	37, 15-8-61	2	2	2	84	187	
Hennebjerg	V 769	19-9-62	Lux, 18-10-61	32, 8-10-61	2	2	2	80	185	
Herping	V 756	6-9-62	Herping Dik, 11-8-61	79, 14-8-61	2	2	2	74	174	
do	V 761	1-9-62	do	78, 14-8-61	2	2	2	83	187	
Hjortlund	V 794	21-10-62	Krat, 17-11-60	46, 31-3-61	2	2	2	84	192	
Hjortshøj Østergaard	J 781	22-9-62	Hjortshøj Monty III, 30-7-61	269, 27-2-61	2	2	2	85	193	
do	J 782	24-9-62	do	280, 24-8-61	2	2	2	79	195	
do	J 817	21-11-62	Hjortshøj Monty I, 30-7-61	275, 25-4-61	2	2	2	67	172	
Holmdrup	F 736	6-9-62	Nr.35 Vang, 26-7-60	41, 9-6-60	2	2	2	71	173	
do	F 766	16-9-62	do	43, 20-4-60	2	2	2	80	187	
do	F 792	17-11-62	do	47, 25-11-60	2	2	2	68	169	
do	F 815	11-2-62	do	51, 8-11-60	2	2	2	68	176	
Honum Vestergaard	F 753	8-8-62	Jørgen, 31-12-60	36, 22-7-61	2	2	2	102	208	
do	F 754	9-8-62	do	37, 7-8-61	2	2	2	104	211	
Houmarksgaard	J 753	6-9-62	Dram, 18-7-60	83, 13-9-61	2	2	2	72	178	
do	J 754	25-8-62	Holst (7689)	77, 11-8-60	2	2	2	83	184	
do	J 777	15-9-62	Sand, 1-2-60	68, 4-9-59	2	2	2	76	187	
Hundslev	F 810	20-11-62	Nr.20 Primus, 8-6-61	14, 28-1-61	2	2	2	73	183	

I gennemsnit																			Klasse					
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af															
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflask	sidespækmål	bug		flaskets fasthed	bov	rygflaskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink. form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfylde		type							
															hel	overskåret								
66.1	717	2.80	26.7	61.4	2.7	1.8	3.4	94.4	13.3	12.4	12.5	13.8	14.9	13.4	13.4	14.6	12.9	2.8	1	3	-	-	-	700
65.5	668	2.93	27.3	60.3	2.4	2.0	3.2	97.5	13.1	12.8	13.8	13.4	13.4	12.9	14.1	14.0	13.5	1.5	4	-	-	-	-	773
64.9	670	2.94	28.2	59.6	2.6	2.3	3.2	98.0	13.5	13.1	13.5	13.0	12.9	13.3	13.4	13.1	13.4	2.8	2	2	-	-	-	774
66.8	605	3.22	26.2	61.1	2.7	2.6	3.5	97.5	13.5	12.8	13.3	13.0	12.8	13.3	13.2	12.2	12.2	2.5	1	2 ¹	-	-	-	800
66.6	612	3.10	26.4	60.9	2.4	2.0	3.3	95.1	13.6	12.6	13.8	12.6	13.1	13.0	14.0	13.8	13.5	2.3	3	1	-	-	-	786
62.5	672	2.96	29.0	59.0	2.4	1.8	3.2	94.0	13.9	13.0	13.8	13.3	13.4	13.5	14.0	14.1	13.9	2.5	3	1	-	-	-	720
63.6	664	3.07	28.5	59.6	2.4	2.1	3.3	95.0	13.9	12.9	13.9	13.5	13.0	13.6	13.9	13.3	13.3	2.3	3	1	-	-	-	808
66.3	733	2.77	25.6	62.0	2.6	2.2	3.5	95.3	13.7	13.2	13.7	13.7	14.5	13.5	13.8	13.3	13.5	1.8	1	2	-	-	-	818
63.0	703	2.86	28.4	59.5	2.7	2.4	3.1	96.3	14.1	12.9	13.0	12.8	12.9	13.4	13.3	13.0	13.1	2.5	2	2	-	-	-	823
63.5	686	2.77	28.9	59.5	2.4	1.6	3.2	94.4	13.6	13.0	14.0	13.5	13.8	13.4	14.3	14.3	14.0	2.0	2	2	-	-	-	803
63.9	664	2.98	27.7	59.6	2.6	2.0	3.2	97.0	13.3	12.9	13.8	12.6	11.6	13.1	13.1	13.4	12.4	2.5	3	1	-	-	-	819
62.3	671	2.94	29.8	58.4	2.3	1.5	3.1	98.0	13.3	13.1	13.8	13.4	13.3	13.1	14.0	14.4	13.9	2.3	4	-	-	-	-	824
64.0	620	3.07	28.5	59.4	2.4	1.8	3.2	96.0	12.8	13.1	14.1	13.3	12.8	13.5	14.1	14.3	13.8	2.5	3	1	-	-	-	785
64.5	631	3.07	27.8	59.7	2.8	2.4	3.2	95.4	14.0	12.6	12.9	12.8	12.3	13.6	12.5	12.6	12.4	2.3	1	3	-	-	-	801
62.9	676	3.00	28.7	59.7	2.6	2.2	3.2	97.5	13.8	12.9	13.0	12.9	13.5	13.5	13.3	12.9	13.1	2.3	1	3	-	-	-	829
65.8	713	2.78	27.2	60.5	2.4	2.0	3.3	94.9	13.8	13.0	14.0	13.6	13.9	13.4	14.1	13.8	13.9	2.3	3	1	-	-	-	810
65.1	686	2.91	27.8	60.1	2.5	2.1	3.3	96.0	13.8	12.9	13.0	12.9	12.9	13.8	13.4	13.8	13.4	3.3	2	2	-	-	-	726
66.5	698	2.82	26.4	61.6	2.4	2.4	3.4	94.9	13.5	12.6	13.6	13.5	13.6	13.6	13.8	13.3	13.5	2.3	1	3	-	-	-	806
65.8	681	2.98	26.8	60.7	2.4	1.9	3.6	95.4	13.3	12.9	13.9	12.6	13.1	13.4	13.5	13.8	13.1	2.3	3	1	-	-	-	842
66.5	672	2.95	26.7	61.2	2.6	2.3	3.2	96.9	14.3	12.5	13.0	13.3	13.6	13.1	13.3	13.0	13.3	2.5	2	2	-	-	-	769
65.4	694	2.79	26.9	61.4	2.9	2.6	3.3	96.0	13.4	12.8	12.9	12.8	13.1	13.3	12.6	12.6	12.9	2.5	-	4	-	-	-	756
65.0	674	2.76	27.2	61.2	3.0	2.5	3.3	95.3	13.6	12.9	12.1	13.3	12.4	13.1	12.5	13.0	12.6	2.8	1	3	-	-	-	761
65.6	644	2.98	26.7	61.2	2.8	2.4	3.3	95.9	13.5	12.8	12.8	13.3	12.9	13.8	12.6	12.4	12.8	2.5	-	4	-	-	-	794
64.6	644	3.12	27.3	60.4	2.8	1.9	3.2	94.5	13.5	12.6	12.5	13.3	13.1	13.5	12.8	14.1	13.3	2.8	1	3	-	-	-	781
63.1	607	3.33	29.3	58.7	2.8	2.0	3.2	95.9	13.4	12.6	13.1	13.1	12.0	13.4	13.3	13.9	12.9	2.5	2	2	-	-	-	782
64.9	667	2.97	27.9	59.7	2.4	1.9	3.4	97.4	13.6	13.1	14.0	13.6	13.3	13.5	14.0	13.9	13.9	2.5	4	-	-	-	-	817
64.6	686	2.95	27.6	60.0	2.6	1.9	3.3	93.8	13.3	12.4	13.6	13.8	12.9	13.5	13.4	14.3	13.3	1.8	2	2	-	-	-	736
66.6	661	2.99	26.4	61.1	2.4	1.6	3.3	95.3	13.0	12.5	13.4	13.5	13.1	13.0	13.8	14.5	13.4	1.8	3	1	-	-	-	766
65.0	693	2.77	27.6	59.8	2.4	1.8	3.0	96.0	13.3	12.9	13.5	12.6	12.9	13.4	13.8	14.0	13.5	3.0	4	-	-	-	-	792
66.4	650	3.00	27.1	60.7	2.6	1.8	3.2	94.5	13.3	12.8	13.4	13.1	13.9	13.4	13.5	14.3	13.9	2.5	1	3	-	-	-	815
66.1	661	2.98	27.1	60.6	2.7	2.5	3.3	95.4	13.8	12.6	12.9	12.6	13.1	13.1	12.8	12.4	12.5	2.5	-	4	-	-	-	753
63.9	654	3.00	28.7	58.7	2.5	2.5	3.3	96.9	14.0	12.6	13.6	12.5	12.6	13.5	13.5	12.6	12.8	2.5	3	1	-	-	-	754
65.8	662	3.02	27.4	60.2	2.6	2.4	3.4	98.1	13.3	12.9	13.8	13.0	13.3	12.8	13.0	12.8	13.0	2.5	2	2 ¹	-	-	-	753
64.3	694	2.90	28.6	59.0	2.5	2.1	3.1	96.8	13.1	13.0	14.0	12.9	13.4	12.9	13.8	13.9	13.3	2.3	3	1	-	-	-	754
65.4	633	3.10	26.4	61.1	2.5	2.1	3.3	96.9	12.9	12.8	13.6	13.4	12.9	12.8	14.1	13.8	13.5	2.0	3	1	-	-	-	777
66.9	641	3.02	26.6	61.2	2.5	2.1	3.2	97.1	13.4	13.0	13.5	13.1	13.5	13.3	13.6	13.5	13.6	2.0	3	1	-	-	-	810

S Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93
F Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.04

J Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.04
V Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.94

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise		Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levende vægt	
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget				slagtede
						galte	søer			
Hvidemosegaard do	S 708	3-9-62	Sørensen, 22-1-61	63,	2-6-61	2	2	2	94	198
	S 835	5-11-62	Jern, 13-9-61	59,	4-6-61	2	2	2	94	198
Hviding do	V 766	10-9-62	Luff, 11-1-61	50,	15-7-61	2	2	2	93	196
	V 797	21-10-62	Knak, 9-1-60	46,	22-1-61	2	2	2	78	187
Hækkebøllegaard do	F 761	5-9-62	Nr.100 Lorentzen, 22-6-60	11,	31-8-60	2	2	2	68	179
	F 764	21-9-62	Nr.80 Riisøen, 12-9-59	14,	26-12-60	2	2	2	65	173
Højbogaard	F 738	17-8-62	Nr.90 Kaptejn, 14-7-60	31,	10-9-60	2	2	2	91	197
Høver	J 814	12-11-62	Jasper, 19-8-61	58,	7-11-61	2	2	2	83	191
Impgaard do	J 775	21-9-62	Brillant, 20-11-60	29,	7-8-60	2	2	2	77	193
	J 795	21-9-62	Stevns 26-10-61	37,	25-9-61	2	2	2	90	205
do	J 816	14-11-62	do	35,	24-2-61	2	2	2	79	182
Jels do	V 742	28-8-62	Ikelang, 19-10-60	27,	3-8-59	2	2	2	72	178
	V 775	8-10-62	do	35,	27-9-61	2	2	2	74	180
do	V 762	7-9-62	Esvig (7569)	34,	23-6-61	2	2	2	84	201
Jestrup do	V 743	7-8-62	Jørn, 26-5-60	27,	26-8-61	2	2	2	94	208
	V 780	6-10-62	Jeff, 30-9-60	30,	25-9-61	2	2	2	81	187
Kalø do	S 678	17-8-62	Balder, 19-8-61	95,	6-8-61	2	2	2	87	193
	S 832	25-10-62	do	96,	7-12-61	2	2	2	102	202
do	S 715	24-9-62	Tom, 24-3-61	89,	14-11-60	2	2	2	83	182
do	S 809	1-10-62	do	94,	12-2-61	2	2	2	102	200
Karby	V 807	7-11-62	Karby Skipper, 10-7-60	44,	16-9-61	2	2	2	88	193
Kastanielund	S 812	30-10-62	Michael, 24-1-61	21,	28-7-61	1	3	1	73	178
Kjellerup Vestergaard	J 755	30-8-62	Skjald, 17-8-61	95,	15-9-61	2	2	2	83	191
Kjelstrup do	V 786	19-10-62	Bus, 15-3-61	69,	3-11-61	2	2	2	75	194
	V 810	12-11-62	do	73,	28-6-61	2	2	2	82	189
Kobberfeldt	S 817	3-11-62	Esbern, 25-8-61	82,	7-9-60	2	2	2	72	171
Kollund	V 819	13-11-62	Tyfon, 11-6-61	58,	28-11-61	2	2	2	86	193
Korskjærgaard	J 802	4-10-62	Viby, 4-7-61	116,	13-8-60	2	2	2	92	199
Kraghede	J 759	4-9-62	Bardo, 27-1-61	58,	24-7-61	2	2	2	82	195
Kørup do	F 765	14-9-62	Pil, 23-9-60	92,	15-9-61	2	2	2	79	178
	F 793	7-11-62	Al, 5-10-61	93,	15-9-61	2	2	2	66	180
Lammegaard	S 696	5-9-62	Mustafa (7573)	91,	22-2-61	2	2	2	83	184
Langballe do	J 762	4-9-62	Frits, 5-10-58	69,	22-3-60	2	2	2	82	193
	J 763	4-9-62	do	79,	26-11-60	2	2	2	84	192
do	J 804	18-10-62	do	65,	19-10-59	2	2	2	73	182
do	J 809	3-11-62	do	80,	2-5-61	2	2	2	78	187
Langbjerg	V 748	17-8-62	Skalbjerger, 26-1-61	32,	6-8-61	2	2	2	91	195

I gennemsnit																		Klasse						
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af										Kødfarve, 0-5 points	AI	A	B	C	Hold-nr.
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflask	sidespækmål	bug		flasket fasthed	bov	rygflasket fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfylde		type							
															hel	overskåret								
35.0	674	2.98	27.3	60.7	2.4	2.0	3.3	95.9	13.5	12.9	13.6	13.1	13.4	14.0	13.9	13.5	13.5	2.5	3	1	-	-	-	708
35.4	673	3.04	26.7	61.1	2.7	2.2	3.4	97.1	13.4	12.6	13.1	12.9	12.5	13.4	13.0	13.0	13.0	2.5	2	2	-	-	-	835
36.0	681	2.81	26.9	60.8	2.4	2.1	3.4	97.6	13.3	13.3	13.6	13.0	13.4	12.9	14.1	13.4	13.4	2.5	4	-	-	-	-	766
34.8	642	2.93	27.7	60.4	2.6	2.3	3.3	93.6	13.4	12.6	13.1	13.5	12.8	13.6	13.3	13.0	13.1	1.5	2	2	-	-	-	797
34.6	632	3.07	28.0	59.6	2.5	1.9	3.2	95.8	13.6	12.6	13.9	13.1	13.5	13.1	14.0	14.0	13.6	2.8	3	1	-	-	-	761
36.6	646	2.96	25.9	61.3	2.3	2.0	3.3	95.0	13.1	12.9	14.1	13.4	13.3	13.1	14.0	13.8	13.8	2.0	4	-	-	-	-	764
34.4	663	3.01	27.8	60.1	2.4	2.0	3.4	95.1	13.5	13.0	13.5	13.1	13.5	13.1	13.9	14.1	13.8	2.0	4	-	-	-	-	738
34.6	649	2.94	27.7	59.6	2.5	1.9	3.3	95.9	13.1	12.8	13.8	13.5	13.6	13.3	13.9	14.0	13.8	1.8	2	2	-	-	-	814
35.0	605	3.29	27.6	60.3	2.9	2.6	3.3	96.8	13.4	12.5	12.9	12.8	12.5	13.4	12.5	12.5	12.6	2.8	-	4 ¹	-	-	-	775
35.8	611	3.27	26.4	61.0	2.7	2.1	3.3	94.8	13.1	12.3	12.8	13.8	14.3	13.4	13.8	13.8	13.3	1.8	1	3	-	-	-	795
35.6	678	2.89	27.5	60.4	2.6	1.9	3.3	97.4	13.0	12.8	13.0	13.8	14.1	13.0	13.4	14.1	13.5	1.5	1	3	-	-	-	816
34.4	661	2.94	27.0	61.4	2.8	2.5	3.4	95.4	13.4	12.9	13.0	13.0	13.1	13.5	13.3	12.6	13.0	2.0	-	4	-	-	-	742
36.0	661	3.00	26.8	61.6	2.7	2.6	3.5	94.5	13.8	12.8	13.0	13.3	13.4	13.6	13.0	12.1	12.8	2.5	1	3	-	-	-	775
36.0	605	3.19	26.9	60.9	2.5	2.0	3.4	95.4	13.8	12.8	13.5	12.9	13.3	13.5	13.6	13.3	13.4	2.0	2	2	-	-	-	762
35.1	614	3.25	27.1	60.7	3.1	2.8	3.3	97.1	14.3	12.3	11.9	12.8	11.6	14.3	11.3	11.6	11.5	2.0	-	2	2	-	-	743
36.6	662	2.81	26.8	61.1	2.4	2.0	3.3	96.4	13.0	13.0	13.4	13.3	13.8	13.0	14.1	13.9	13.6	1.3	2	2	-	-	-	780
34.5	661	3.07	28.5	59.6	2.7	2.2	3.3	98.1	13.4	12.9	13.3	12.8	13.3	13.4	13.3	13.3	13.4	2.3	1	3	-	-	-	678
37.3	702	2.91	25.8	61.9	2.8	2.3	3.6	97.1	13.5	12.9	12.5	12.6	13.8	13.0	13.1	13.4	13.0	2.0	1	3	-	-	-	832
33.5	701	2.80	28.5	59.4	2.7	2.1	3.2	97.1	13.3	13.0	12.9	12.9	13.0	13.4	13.3	13.4	13.4	2.3	3	1	-	-	-	715
33.5	716	2.76	28.7	58.8	2.4	2.2	3.2	98.1	13.6	13.5	14.1	13.1	12.5	13.5	14.0	13.5	13.5	2.5	4	-	-	-	-	809
37.3	666	2.78	26.2	61.6	2.5	1.9	3.3	96.3	13.5	12.8	13.5	12.9	12.8	13.6	13.6	14.0	13.5	2.0	3	1	-	-	-	807
33.8	669	2.98	28.3	59.5	2.8	1.8	3.5	93.5	13.6	12.5	13.1	12.9	11.9	13.3	12.8	13.5	12.3	2.5	-	4	-	-	-	812
36.2	650	3.21	26.9	60.6	2.7	2.6	3.3	98.2	14.0	12.7	12.5	13.2	13.2	13.5	12.8	12.5	12.8	2.0	1	2	-	-	-	755
34.4	589	3.18	27.8	60.0	2.5	2.4	3.4	95.0	13.8	12.9	13.4	13.1	12.4	13.5	13.4	13.0	13.1	2.8	3	1	-	-	-	786
36.1	654	2.90	26.2	61.5	3.0	2.4	3.3	94.3	13.5	12.5	12.8	13.0	12.5	13.8	12.6	12.8	12.6	2.3	1	1	2	-	-	810
33.9	704	2.85	27.4	60.1	2.3	1.8	3.2	97.0	13.5	13.0	14.1	13.8	14.5	13.8	14.6	14.0	14.1	2.5	3	1	-	-	-	817
36.6	654	2.98	26.4	61.5	2.7	2.6	3.4	95.9	13.1	12.9	13.0	13.3	12.8	12.9	13.0	12.4	12.9	2.8	2	2 ¹	-	-	-	819
35.9	657	3.00	27.2	60.3	2.8	2.5	3.3	98.5	13.6	12.6	12.6	13.4	13.4	13.6	12.9	12.5	12.5	2.3	1	3	-	-	-	802
34.8	619	3.17	26.5	61.4	2.6	2.3	3.2	97.4	13.5	12.8	12.9	13.0	13.1	13.4	13.4	13.4	13.1	2.0	2	2	-	-	-	759
34.4	705	2.77	27.5	60.2	2.4	1.7	3.2	96.4	13.5	13.3	13.6	13.4	14.0	13.0	14.1	14.5	13.9	2.3	3	1	-	-	-	765
32.6	615	3.06	29.2	58.4	2.3	1.7	3.0	94.8	13.3	13.0	13.3	12.3	13.3	12.9	13.8	14.4	13.4	2.0	3	1	-	-	-	793
35.4	691	2.94	27.7	60.6	2.5	2.0	3.2	97.3	13.4	12.9	13.4	13.1	13.6	12.9	14.0	14.1	13.9	2.3	2	2	-	-	-	696
35.1	637	3.14	27.6	60.2	2.8	2.2	3.4	96.1	13.5	12.8	13.1	13.5	13.1	13.1	13.0	13.6	13.1	2.3	2	2	-	-	-	762
34.0	648	3.07	28.0	59.9	2.8	2.0	3.2	96.0	13.8	12.6	12.6	13.3	13.0	13.0	12.6	13.9	13.0	2.8	-	4	-	-	-	763
34.6	646	3.02	27.9	59.3	2.5	2.1	3.3	95.9	13.5	13.0	13.5	13.4	13.1	13.1	13.9	13.5	13.4	2.0	2	2	-	-	-	804
33.6	650	2.91	28.0	59.5	2.6	2.1	3.2	94.4	13.6	12.3	13.0	12.8	12.6	13.1	13.1	13.4	13.0	2.0	2	2	-	-	-	809
35.8	669	2.99	27.1	61.6	3.0	2.3	3.4	94.9	13.3	12.4	12.5	12.4	12.8	13.6	12.4	13.5	12.8	2.3	-	4	-	-	-	748

S Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93
F Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.04

J Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.04
V Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.94

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede			
							galte søer	galte søer		
Langdel	V 757	1-9-62	Eskild, 6-8-59	147, 14-9-61	2	2	2	82	184	
do	V 758	24-9-62	Bruno, 3-8-61	149, 23-9-61	2	2	2	75	179	
do	V 802	6-11-62	do	154, 20-10-61	2	2	2	81	184	
do	V 803	5-11-62	do	153, 20-10-61	2	2	2	72	179	
do	V 804	7-11-62	do	155, 20-10-61	2	2	2	80	186	
do	V 801	3-11-62	Anker, 7-10-60	151, 30-11-61	2	2	2	75	181	
Leeregaard	J 768	20-9-62	Leere Moss, 14-6-61	152, 28-4-61	2	2	2	66	176	
do	J 769	22-9-62	do	153, 28-4-61	2	2	1	67	177	
Levringgaard	J 746	8-8-62	Dot, 11-6-61	3, 3-8-61	2	2	2	104	218	
Lidemark	S 709	1-10-62	Knøv, 17-1-60	59, 6-4-61	2	2	2	72	174	
Lillebrænde	S 702	6-9-62	Dik II, 6-3-61	59, 4-8-61	2	2	2	85	189	
Lumsaas	S 693	4-9-62	Toft, 3-9-61	10, 12-1-61	2	2	2	78	178	
do	S 811	24-10-62	do	8, 24-11-60	2	2	2	75	177	
do	S 699	6-9-62	Nr.20 Vest, 9-4-58	2, 3-8-60	2	2	2	76	176	
do	S 707	8-9-62	do	3, 4-1-61	2	2	2	88	187	
Lundby Møllegaard	S 820	1-11-62	Dik Lundby, 6-3-61	53, 18-9-61	2	2	2	86	189	
Lundesten	S 711	27-9-62	Orient, 18-7-61	97, 30-8-61	2	2	2	81	178	
do	S 719	28-9-62	Toftlund, 29-7-61	98, 7-12-61	2	2	2	87	191	
do	S 814	8-11-62	do	88, 16-3-61	2	2	2	100	203	
Lykkensgaard	S 713	13-9-62	Olfert, 30-6-61	44, 23-7-61	2	2	2	79	180	
Lynghøjgaard	J 758	18-8-62	Sørup Retur, 8-4-61	73, 23-11-60	2	2	2	97	205	
Mosebæk	S 802	8-10-62	Tørn, 8-6-61	78, 3-4-61	2	2	2	80	183	
do	S 807	23-10-62	Paw, 15-1-61	73, 18-3-60	2	2	2	86	194	
Naarup	F 768	2-9-62	Nr.5 Alsing, 26-11-60	98, 10-6-61	2	2	2	99	209	
Nygaard	J 780	23-9-62	Tommi, 31-1-61	69, 17-7-61	2	2	2	76	187	
do	J 801	16-10-62	Polle, 15-9-61	70, 17-7-61	2	2	2	66	176	
do	J 818	19-11-62	do	71, 28-11-61	2	2	2	76	181	
Nytoftegaard	F 751	20-8-62	Nr.100 Mufa, 9-4-61	46, 30-7-61	2	2	2	95	199	
do	F 790	23-10-62	do	54, 19-11-61	2	2	2	88	194	
Næsby	F 779	11-10-62	Nr.80 Alfred, 24-10-61	44, 22-9-61	2	2	2	69	175	
Oddersted	F 770	21-9-62	Odder, 1-9-61	75, 16-5-60	2	2	2	77	190	
Paastrupgaard	S 801	13-10-62	Bill, 17-5-61	74, 6-3-61	2	2	2	83	182	
Resen	J 770	22-8-62	Alsbo, 26-8-61	72, 16-8-61	2	2	2	97	208	
Ringtved	V 760	6-9-62	Tim, 13-11-60	71, 22-4-61	2	2	2	85	193	
do	V 799	19-10-62	Gert, 14-9-61	81, 24-10-61	2	2	2	90	199	
Ring Øbjerg	S 698	5-9-62	Smil, 30-7-61	63, 9-7-60	2	2	2	77	177	

I gennemsnit																				Klasse				Hold-nr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm		Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål		bug	flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink. form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfyldte		type																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																hel		overskåret																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

S Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93
F Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.04

J Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.04
V Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.94

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt				
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede							
											gatte	søer	gatte	søer
Rolundgaard	F 780	11-10-62	Granhøj, 28-7-61	54,	2-11-61	2	2	2	73	182				
do	F 781	17-10-62	Nr.30 Gorm, 21-6-61	47,	24-3-61	2	2	2	72	182				
do	F 782	20-10-62	Nr.25 Ørsbo, 7-12-59	48,	10-5-61	2	2	1	67	179				
Romdrup Aagaard	J 771	11-9-62	Aagaard Øst, 6-3-61	99,	6-8-61	2	2	2	77	189				
Rykkerup	S 706	11-9-62	Lotus (7609)	89,	4-7-60	2	2	2	87	189				
do	S 839	6-11-62	do	97,	17-9-61	2	2	2	92	191				
do	S 830	7-11-62	Fiber, 11-8-61	99,	17-9-61	2	2	2	85	184				
do	S 851	30-11-62	do	2,	20-9-61	2	2	2	78	178				
Saaby	F 748	26-8-62	Hegel, 25-5-61	76,	13-8-61	2	2	2	80	187				
do	F 755	31-8-62	Højberg, 10-5-61	77,	15-10-61	2	2	2	80	190				
do	F 798	19-11-62	do	74,	20-5-61	2	2	2	61	173				
Sandkildegaard	S 691	5-9-62	Hassan, 29-7-61	49,	18-3-61	2	2	2	77	178				
do	S 844	5-12-62	Julius, 26-7-60	51,	25-6-61	2	2	2	65	163				
Sejbækgaard	J 765	20-9-62	Granhøj, 28-7-61	64,	10-9-61	2	2	2	77	182				
do	J 796	12-10-62	do	65,	2-11-61	2	2	2	72	186				
Siverholm	J 749	27-8-62	Baal, 8-5-61	182,	10-2-61	2	2	2	83	194				
do	J 789	4-10-62	do	165,	19-10-59	2	2	2	81	199				
Sivgaard	S 837	16-11-62	Laos, 7-6-60	79,	5-3-61	2	2	2	77	177				
Sjørup Toftgaard	J 812	16-11-62	Karby, 2-3-61	22,	5-8-61	2	2	2	81	182				
Skads	V 812	15-11-62	Kusk, 4-12-61	82,	11-10-61	2	2	2	76	189				
Skodborg	V 770	21-9-62	Paars, 12-5-61	77,	23-11-60	2	2	2	82	189				
Skovlund	J 791	19-9-62	Hamlet, 25-5-60	70,	12-7-61	2	2	2	90	196				
Solagergaard	S 677	26-8-62	Nap, 4-6-61	84,	3-8-61	2	2	2	72	181				
do	S 701	18-9-62	do	86,	20-9-61	2	2	2	75	178				
do	S 717	27-9-62	Malte 80, 23-1-59	88,	19-9-61	2	2	2	81	187				
Sparlund	V 785	17-10-62	Ritmester, 24-3-61	17,	31-5-61	2	2	2	92	212				
do	V 798	9-11-62	Barsk, 3-3-61	18,	5-6-61	2	2	2	69	176				
do	V 816	16-11-62	do	22,	21-11-61	2	2	2	81	184				
Staagerup	F 788	17-10-62	Nr.50 Math, 8-6-61	41,	30-8-61	2	2	2	85	195				
Stauning	V 795	17-10-62	Eksstrøm, 19-2-60	65,	27-10-60	2	2	2	88	199				
Stenager	V 767	17-9-62	Thy Prik, 25-7-61	38,	26-2-61	2	2	2	86	187				
do	V 768	14-9-62	do	41,	12-10-61	2	2	2	83	191				
Stillinge Vestergaard	S 825	25-10-62	Ruder Es, 24-1-61	11,	20-3-61	2	2	2	97	193				
Stinesminde	J 793	3-10-62	Holst (7689)	32,	30-10-60	2	2	2	83	190				
do	J 794	20-9-62	Baun, 5-8-61	30,	30-10-60	2	2	2	87	194				
Strandby	F 763	17-9-62	Nr.25 Degnen, 31-10-58	63,	21-1-61	2	2	2	60	173				
do	F 772	5-10-62	Mac (7559)	57,	16-12-59	2	2	2	77	190				

I gennemsnit																			Klasse				Hold-nr.	
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af															
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink. form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfylde		type							
															hel	overskåret								
64.5	645	2.99	27.8	59.9	2.3	2.2	3.4	94.9	13.9	12.8	13.5	13.3	13.5	13.6	14.1	13.0	13.5	2.0	3	1	-	-	-	780
63.1	644	2.99	28.7	59.1	2.7	2.3	3.3	94.9	13.9	13.3	12.8	13.4	12.6	13.9	12.9	13.1	13.1	2.5	2	2	-	-	-	781
64.7	629	3.11	28.4	59.4	2.3	2.1	3.3	98.7	13.5	13.0	14.2	13.5	13.0	13.3	14.5	14.0	13.7	2.5	3	-	-	-	-	782
63.3	633	3.05	28.3	59.0	2.3	1.8	3.2	95.4	13.1	12.9	13.6	13.3	13.5	13.3	14.1	13.9	13.6	2.0	4	-	-	-	-	771
63.3	690	2.87	28.7	59.2	2.4	2.1	3.2	96.8	13.6	13.1	14.0	13.0	13.0	13.4	13.9	13.6	13.9	2.8	4	-	-	-	-	706
64.8	712	2.81	27.2	60.3	2.7	2.1	3.4	96.6	13.5	12.8	12.5	13.1	13.4	13.0	13.3	13.3	13.3	2.5	2	2	-	-	-	839
64.4	707	2.89	27.8	59.7	2.5	1.8	3.3	96.9	13.6	12.9	13.6	13.1	12.6	13.4	13.4	14.0	13.4	1.8	3	1	-	-	-	830
65.8	696	2.90	27.3	60.1	2.4	2.1	3.4	97.9	13.5	12.8	13.6	13.6	12.5	13.1	13.8	13.8	13.5	2.0	2	2	-	-	-	851
64.3	657	3.09	27.6	60.0	2.5	2.1	3.2	94.6	13.9	12.9	13.8	13.1	13.3	13.6	14.1	14.1	13.8	3.0	3	1	-	-	-	748
65.8	639	3.09	26.7	60.8	2.8	2.4	3.3	93.5	13.7	12.3	13.3	13.5	13.0	13.8	13.3	12.7	13.0	2.5	1	2	-	-	-	755
65.1	624	3.00	27.7	59.7	2.7	2.5	3.2	95.0	13.9	12.6	13.4	13.1	12.9	13.6	13.3	12.6	13.1	3.0	1	3	-	-	-	798
64.9	699	2.88	27.7	60.6	2.3	1.8	3.3	94.0	13.1	13.0	14.0	13.1	14.3	13.5	14.5	14.1	13.9	2.3	4	-	-	-	-	691
63.3	712	2.83	28.6	59.5	2.2	1.7	3.2	96.8	13.5	13.3	14.3	12.8	13.4	13.6	14.5	14.3	14.0	2.0	4	-	-	-	-	844
65.6	666	3.02	26.9	61.0	2.6	2.5	3.3	93.6	13.8	12.1	13.3	14.0	13.8	13.3	13.1	12.5	12.6	2.0	1	3	-	-	-	765
65.5	619	3.21	26.9	60.7	2.4	2.6	3.2	95.0	13.1	12.8	13.5	13.3	13.0	13.3	13.8	12.6	12.6	1.3	1	3 ¹	-	-	-	796
63.6	632	3.28	28.1	59.2	2.7	2.7	3.3	97.5	13.6	12.8	12.8	13.1	12.5	13.3	13.1	12.1	12.6	2.5	1	3	-	-	-	749
64.1	595	3.33	27.7	59.5	2.5	2.2	3.5	97.0	13.8	13.0	13.5	12.8	12.4	13.5	13.4	13.1	13.0	2.3	2	2	-	-	-	789
64.6	705	2.84	27.4	60.8	2.7	2.3	3.3	95.3	13.9	13.0	12.1	13.3	13.5	13.4	13.1	12.9	12.9	2.8	1	3	-	-	-	837
65.6	695	2.86	26.6	61.0	2.4	2.0	3.2	95.6	13.3	13.0	13.6	13.3	13.6	12.9	13.9	13.8	13.5	2.0	3	1	-	-	-	812
64.8	620	3.01	27.1	61.1	2.4	2.4	3.1	93.9	13.1	12.8	13.4	13.1	13.4	13.5	13.8	12.9	13.0	1.3	2	2	-	-	-	812
63.8	657	3.02	28.0	60.1	2.6	2.1	3.3	96.5	13.4	12.9	13.0	13.5	12.5	12.9	13.3	13.1	13.1	2.5	1	3	-	-	-	770
65.6	665	2.96	26.4	61.4	2.5	2.1	3.4	95.8	13.3	12.5	13.5	14.0	12.9	13.3	13.8	14.0	13.4	2.0	2	2	-	-	-	791
65.1	640	3.15	27.1	60.7	2.9	2.6	3.4	95.9	14.0	12.5	12.9	12.5	12.8	13.5	12.5	12.6	12.4	2.0	-	4	-	-	-	677
65.3	679	2.94	26.5	61.8	2.7	2.0	3.5	95.6	13.8	12.6	12.9	12.5	14.3	13.5	13.0	13.6	13.4	2.0	2	2	-	-	-	701
65.8	659	3.03	26.9	61.0	2.4	2.0	3.4	96.4	14.0	12.9	13.8	13.6	13.1	13.8	13.9	13.8	13.6	1.3	2	2	-	-	-	717
63.9	589	3.10	27.9	60.4	2.6	2.4	3.3	94.8	13.6	13.0	12.8	12.9	12.4	13.4	13.3	12.4	12.8	2.3	2	2	-	-	-	785
64.6	652	2.89	27.1	61.2	2.6	2.3	3.3	95.9	13.6	13.4	13.0	13.0	13.6	13.5	13.4	13.0	13.4	2.5	2	2	-	-	-	798
67.4	681	2.77	26.1	61.9	2.5	1.9	3.2	94.6	14.0	12.9	13.5	12.9	13.3	13.8	13.8	13.9	13.6	2.5	2	2	-	-	-	816
66.0	645	3.10	26.5	60.6	2.7	2.1	3.4	97.8	13.4	13.0	12.9	12.8	13.0	12.9	12.9	13.5	13.1	2.5	2	2	-	-	-	788
64.5	631	3.09	27.3	60.7	2.6	2.5	3.3	93.5	14.0	12.4	13.3	13.1	12.1	13.8	12.9	12.1	12.1	2.8	2	2	-	-	-	795
64.5	689	2.92	27.3	60.5	2.6	2.8	3.4	95.3	14.0	12.6	13.0	12.9	12.4	13.5	13.0	11.9	12.6	1.8	-	4	-	-	-	767
66.1	651	3.01	27.1	60.9	2.6	2.7	3.2	96.9	13.6	13.0	13.1	13.8	13.1	13.1	13.5	12.4	13.1	2.3	1	3	-	-	-	768
65.4	722	2.81	26.7	61.7	2.4	1.7	3.4	94.5	13.3	12.8	13.8	13.3	14.4	13.4	14.4	14.5	13.6	1.8	3	1	-	-	-	825
64.1	655	2.99	28.1	59.7	2.5	2.0	3.3	97.6	13.0	13.4	13.1	13.0	12.9	12.9	13.9	13.8	13.4	2.8	3	1	-	-	-	793
65.4	663	2.88	26.6	60.9	2.6	2.0	3.3	96.6	13.1	13.0	13.8	13.1	12.9	13.3	13.6	14.1	13.8	2.5	2	2	-	-	-	764
68.0	624	3.05	25.2	62.0	2.5	1.8	3.3	95.6	13.4	12.5	14.4	13.6	14.5	13.6	14.5	14.5	13.9	2.3	4	-	-	-	-	763
64.5	619	3.10	27.9	59.5	2.5	2.2	3.2	95.9	13.1	12.6	13.1	13.3	13.3	13.6	13.6	13.3	13.5	2.3	1	3	-	-	-	772

S Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93
F Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.04

J Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.04
V Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.94

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget		slagtede		
						galte	søer			
Svanegaard do	S 845 S 846	24-11-62 25-11-62	Kimp, 12-8-61 do	63, 27-11-60 62, 27-11-60	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	69 72	170 175	
Svinholt do do	F 773 F 797 F 804	4-10-62 17-11-62 18-11-62	Spanja, 15-9-61 do do	28, 27-2-61 25, 9-11-60 29, 29-4-61	2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2	72 74 83	182 179 190	
Sdr. Andrup	J 799	11-10-62	Ping, 24-8-59	44, 3-9-60	2 2	2 2	2 2	76	183	
Søndervang do	V 751 V 752	11-9-62 10-9-62	Bram, 24-12-60 do	21, 5-4-61 22, 5-4-61	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	79 81	184 190	
Tangegaard do do	S 697 S 705 S 831	18-9-62 19-9-62 16-11-62	Palle, 25-5-61 do do	34, 5-2-61 33, 5-2-61 23, 17-7-59	2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2	67 73 75	170 180 185	
Tebstrup do do	J 784 J 785 J 786	27-9-62 3-10-62 24-9-62	Partner, 30-5-61 do do	64, 8-9-61 65, 8-9-61 63, 8-9-61	2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2	77 77 87	181 174 194	
Ternelund	S 722	30-9-62	Dario, 29-1-60	7, 1-9-60	2 2	2 2	2 2	84	186	
Thoderup	F 795	5-11-62	Nr.80 Klaus, 3-8-60	99, 18-5-60	2 2	2 2	2 2	71	182	
Thorning Toftgaard	J 737	4-8-62	Draaby Karl (7585)	63, 7-8-60	2 2	2 2	2 2	94	200	
Thorsø	J 761	30-8-62	Lind, 10-8-61	62, 25-8-61	2 2	2 2	2 2	83	189	
Thorsø Nørgaard	J 803	6-10-62	Jarl, 24-10-59	38, 9-11-58	2 2	2 2	2 2	89	196	
Thorup Østergaard	J 807	18-10-62	Finn (7551)	6, 28-9-60	2 2	2 2	2 2	79	184	
Tjørnehoved	S 695	18-9-62	Tang, 22-1-60	11, 1-2-61	2 2	2 2	2 2	71	169	
Tofte	F 787	16-10-62	Nr.65 Søgang, 27-10-58	76, 18-11-61	2 2	2 2	2 2	84	196	
Tofthøj do	F 745 F 746	27-8-62 28-8-62	Atlas, 18-7-61 do	76, 15-9-60 81, 1-10-61	2 2 2 2	2 2 1 2	2 2 2 2	82 83	184 189	
Torkilstrup do	S 840 S 850	23-11-62 30-11-62	Topp, 18-11-60 do	81, 3-8-60 94, 6-2-61	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	72 77	177 181	
Tornby do do do	J 792 J 798 J 808 J 821	29-9-62 12-10-62 31-10-62 4-12-62	Højbo, 25-5-61 do Nordlys, 20-9-61 do	72, 17-8-61 73, 17-8-61 71, 18-7-61 69, 29-3-61	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	76 78 78 87	186 186 181 171	
Tornbygaard	S 686	2-9-62	Vimmer, 29-7-61	71, 4-10-60	2 2	2 2	2 2	74	183	
Trabjerg	V 818	20-11-62	Trabjerg Malte, 28-12-60	13, 11-2-61	2 2	2 2	2 2	69	184	
Troelstrup do	F 756 F 757	20-8-62 25-8-62	Røs, 23-9-61 do	6, 18-7-61 99, 9-1-61	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	88 86	197 191	
Ullerslev do	F 758 F 759	28-8-62 31-8-62	Nr.5 Elkau, 26-1-61 Nr.80 Demokrat (7637)	89, 28-5-60 97, 14-2-61	2 2 2 2	2 2 2 2	2 2 2 2	78 77	184 191	

I gennemsnit																				Kødfarve, 0-5 points					Klasse				Hold-nr.
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																				
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespekmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfylde		overskåret	type											
AI	A	B	C																										
66.6	696	2.86	27.1	60.7	2.4	2.0	3.4	96.6	13.3	12.8	13.9	13.1	12.6	13.3	13.6	14.0	13.4	2.8	4	-	-	-	-	845					
65.4	676	2.94	27.3	60.6	2.6	2.3	3.3	96.8	13.8	13.0	13.0	13.6	12.8	13.1	13.3	13.3	13.1	2.0	1	3	-	-	-	846					
63.8	638	3.02	28.6	59.1	2.7	2.2	3.2	94.0	12.9	12.9	12.9	13.0	13.1	13.0	12.9	13.0	13.1	2.5	1	3	-	-	-	773					
64.5	670	2.91	28.3	59.2	2.6	2.1	3.0	96.3	13.6	12.6	13.4	12.4	12.9	13.1	13.5	13.3	13.0	1.8	2	2	-	-	-	797					
64.9	651	3.05	27.7	59.6	2.8	2.1	3.0	95.0	13.4	12.6	12.5	12.4	13.0	13.1	12.9	13.4	12.8	1.8	-	4	-	-	-	804					
64.3	654	2.98	27.5	60.2	2.6	1.9	3.4	98.1	13.3	13.0	13.5	13.0	13.4	13.5	13.6	13.8	13.1	2.5	1	3	-	-	-	799					
64.3	668	2.78	27.7	60.1	2.6	2.0	3.2	97.6	13.3	13.0	13.6	12.6	12.8	13.1	13.3	13.3	13.0	2.0	2	2	-	-	-	751					
64.8	643	2.97	27.6	60.4	2.7	2.3	3.3	97.0	13.6	12.8	13.6	12.9	12.3	13.5	13.1	13.0	12.9	2.5	1	3 ¹	-	-	-	752					
63.1	682	2.88	28.4	59.4	2.6	2.5	3.3	96.9	13.5	13.1	13.3	12.6	12.9	13.5	13.4	12.4	12.8	2.8	1	3	-	-	-	697					
65.4	655	3.05	26.7	61.1	2.9	2.6	3.3	96.0	13.5	12.6	12.4	13.6	13.1	13.8	12.8	11.9	12.4	2.8	-	4	-	-	-	705					
64.3	641	3.17	27.6	60.1	2.7	2.3	3.5	96.0	13.5	12.5	13.0	12.8	12.8	13.8	13.0	13.0	12.9	2.0	2	2	-	-	-	831					
65.0	672	2.95	26.9	60.9	2.6	1.9	3.3	95.9	12.9	12.9	13.6	14.0	13.1	13.1	13.8	14.3	13.6	2.5	2	2	-	-	-	784					
65.8	722	2.75	27.0	60.6	2.6	1.8	3.2	95.3	13.4	12.3	13.9	13.3	13.6	13.3	13.9	14.8	13.5	2.5	2	2	-	-	-	785					
65.0	656	3.04	27.2	60.6	2.7	2.0	3.3	94.6	13.1	12.9	13.4	13.6	13.6	13.0	13.6	13.6	13.1	2.5	2	2	-	-	-	786					
65.8	688	2.80	27.3	60.6	2.3	2.0	3.3	99.9	13.4	13.1	14.0	14.0	13.6	13.5	14.3	13.6	13.6	1.5	3	1	-	-	-	722					
65.1	629	3.00	27.8	59.9	2.6	2.2	3.1	95.3	13.1	12.6	13.5	12.6	13.1	13.1	13.6	13.4	12.9	1.5	2	2	-	-	-	795					
63.3	662	3.10	28.9	58.7	2.9	2.7	3.3	96.4	13.5	12.9	11.9	12.3	11.9	13.6	12.4	12.1	12.1	1.8	-	3 ¹	1	-	-	737					
65.4	646	3.08	27.2	60.7	2.4	1.9	3.4	96.1	13.3	13.1	14.0	13.4	14.1	13.1	14.0	14.4	14.0	2.3	4	-	-	-	-	761					
64.5	653	3.09	27.9	59.7	2.7	2.4	3.4	96.5	14.1	12.6	13.0	13.3	13.3	13.5	13.3	12.5	13.0	2.0	-	4	-	-	-	803					
64.4	667	2.90	27.8	60.0	2.4	2.1	3.2	96.0	13.8	12.8	13.5	13.3	13.4	13.3	13.8	13.6	13.6	2.5	3	1	-	-	-	807					
65.3	713	2.84	27.0	61.1	2.6	2.1	3.2	96.4	13.5	13.0	13.5	12.9	13.8	13.4	13.9	13.8	13.8	2.5	3	1	-	-	-	695					
64.8	629	3.11	27.6	59.7	2.6	2.0	3.2	95.9	13.5	12.9	13.3	13.0	13.3	13.1	13.5	13.8	13.5	2.8	2	2	-	-	-	787					
64.9	683	2.97	27.6	59.6	2.7	2.1	3.3	97.5	13.4	12.8	13.3	12.9	12.8	13.6	13.4	13.9	13.5	2.5	2	2	-	-	-	745					
63.2	662	2.95	28.6	58.6	2.4	1.6	3.1	97.2	12.5	12.8	13.8	13.2	12.8	12.8	14.2	14.3	13.3	2.3	3	-	-	-	-	746					
63.0	665	3.08	28.9	59.1	2.5	2.5	3.4	94.8	13.6	12.5	13.9	13.5	13.1	13.8	13.6	12.3	12.8	2.5	2	2 ¹	-	-	-	840					
64.5	673	3.04	27.2	60.2	2.4	2.4	3.4	95.5	14.0	12.9	13.5	13.4	13.0	13.5	13.6	12.9	13.4	2.5	3	1	-	-	-	850					
64.4	643	3.02	28.1	59.6	2.4	2.1	3.4	96.1	13.0	12.6	13.9	13.3	13.3	13.0	13.9	14.1	13.3	2.5	3	1	-	-	-	792					
64.1	648	3.04	28.5	58.9	2.5	2.5	3.4	96.5	13.4	12.9	13.5	13.1	12.9	13.1	13.6	12.6	12.9	2.3	1	3	-	-	-	798					
65.5	676	2.95	27.4	60.0	2.4	2.0	3.4	96.4	13.6	12.5	13.9	13.0	12.6	13.4	13.6	14.0	13.3	1.8	3	1	-	-	-	808					
64.0	674	2.91	28.0	59.6	2.5	2.0	3.2	98.6	13.5	12.9	14.0	13.0	12.8	13.4	13.5	13.6	13.1	2.0	3	1	-	-	-	821					
64.4	643	3.15	27.8	60.4	2.5	2.2	3.3	96.1	13.8	12.8	13.6	13.1	13.4	13.6	13.4	13.0	13.4	2.5	2	2	-	-	-	686					
65.8	604	3.06	27.1	60.5	2.9	2.4	3.3	98.3	13.8	12.9	12.0	12.9	12.1	13.6	12.1	12.9	12.3	2.5	-	3	1	-	-	818					
65.5	643	3.02	27.0	60.0	2.6	2.1	3.2	96.6	14.0	12.5	13.6	12.9	13.1	13.4	13.3	13.5	13.4	2.3	2	2	-	-	-	756					
65.9	672	2.92	27.2	60.1	2.3	1.9	3.2	95.0	13.3	12.5	14.0	13.0	13.5	13.4	14.1	14.5	13.6	2.0	4	-	-	-	-	757					
65.3	662	2.87	28.0	59.7	2.3	2.0	3.2	94.8	13.4	13.1	13.8	12.9	13.6	13.1	14.3	14.1	13.8	2.5	4	-	-	-	-	758					
64.1	617	3.10	28.9	58.9	2.5	1.9	3.2	97.0	13.8	13.3	14.0	13.0	13.3	13.1	13.8	13.6	13.9	3.0	2	2	-	-	-	759					

S Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.93
F Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.04

J Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 3.04
V Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.94

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt	
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede				
							galle søer	galle søer			
Vattrup Nørgaard	J	766	22-8-62	Agi, 12-6-61	60, 15-1-61	2	2	2	104	206	
do	J	830	28-11-62	Brit, 30-5-59	61, 22-1-61	2	2	2	76	183	
Vemmelev Præstemark	S	716	2-10-62	Dario, 29-1-60	61, 6-11-61	2	2	2	69	170	
do	S	718	7-10-62	do	48, 10-3-59	2	2	2	61	167	
do	S	816	4-11-62	Getty, 6-12-61	55, 1-8-60	2	2	2	69	174	
Vesterballegaard	F	767	17-9-62	Nr.10 Hansemann, 3-2-60	16, 23-1-60	2	2	2	74	188	
do	F	789	23-10-62	Nr.30 Jan, 5-8-61	8, 22-6-59	2	2	2	79	184	
Vester Holmen	J	767	9-9-62	Hovi, 7-12-60	22, 28-5-61	2	2	2	81	183	
do	J	787	27-9-62	do	21, 20-10-61	2	2	2	79	187	
do	J	813	23-11-62	Bro, 9-12-61	23, 30-10-61	2	2	2	73	178	
Vester Kjeldgaard	J	811	7-11-62	Otto, 5-11-60	88, 10-3-60	2	2	2	79	182	
Vestermarks Mølle	J	772	15-9-62	Haab, 1-12-59	33, 21-9-60	2	2	2	69	175	
Viirmandsgaard	S	692	19-9-62	Glenn, 2-9-61	60, 12-6-61	2	2	2	63	166	
do	S	710	4-10-62	do	50, 31-3-61	2	2	2	68	175	
do	S	723	12-10-62	do	53, 16-4-61	2	2	2	72	173	
do	S	727	23-10-62	do	52, 16-4-61	2	2	2	68	168	
do	S	838	25-11-62	do	55, 6-6-61	2	2	2	71	175	
Vilhelmshøj	S	821	20-11-62	Brøgger, 21-4-61	49, 19-12-61	2	2	2	71	178	
Vils	V	771	15-9-62	Vils Mustafa, 4-8-61	69, 17-9-61	2	2	2	89	193	
do	V	772	17-9-62	do	70, 17-9-61	2	2	2	95	200	
do	V	820	11-11-62	do	71, 19-11-61	2	2	2	89	188	
Vinding	V	796	26-10-62	Abel, 15-6-59	89, 6-6-60	2	2	2	80	184	
do	V	813	16-11-62	Duxen, 18-10-61	92, 4-4-61	2	2	2	76	183	
Vinholtgaard	S	714	23-9-62	Labri, 5-9-61	46, 28-6-61	2	2	2	85	191	
do	S	843	22-11-62	Jubi, 26-7-60	42, 17-4-61	2	2	2	81	180	
Vinkel	J	783	6-10-62	Karlsen, 30-3-60	71, 19-11-60	2	2	2	71	185	
Vinstrupgaard	J	778	6-9-62	Trold, 17-8-61	67, 12-9-60	2	2	2	91	196	
Vium	J	805	29-10-62	Jarby, 12-11-61	34, 13-11-61	2	2	2	74	185	
Vorbasse	F	800	9-11-62	Taunus, 28-1-61	28, 27-11-61	2	2	2	76	188	
Vroue Toftgaard	J	751	31-8-62	Juvel, 29-7-61	65, 21-1-60	2	2	2	79	185	
Ølholm	F	784	1-10-62	Atlas, 18-7-61	12, 13-10-61	2	2	2	83	192	
do	F	791	17-10-62	Aspirant, 1-2-61	10, 3-4-61	2	2	2	88	202	
do	F	809	24-11-62	do	6, 29-6-60	2	2	2	72	179	
Ørslev Lykke	S	712	15-10-62	Rekord, 27-5-60	52, 24-2-60	2	2	2	61	164	
Gns. af 290 hold										80	186
Sjælland gns. af 87 hold										80	182
Fyn - - 64 -										76	185
Jylland - - 72 -										80	188
Vestjylland - - 67 -										83	191

I gennemsnit																			Klasse				Hold-nr.			
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm		Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																		
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflæsk	sidespækmål		bug	flæskest fasthed	bov	rygflæskest fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	hel	kødfylde	overskåret	type								
63.9	690	2.85	28.8	59.0	2.6	1.9	3.2	97.8	13.0	12.9	13.3	12.5	12.8	13.1	13.3	13.9	13.1	2.5	2	2	-	-	-	-	-	766
64.4	655	2.96	28.4	59.4	2.0	1.5	3.1	96.8	13.1	12.9	14.5	13.3	13.8	12.3	14.6	14.1	13.4	1.3	4	-	-	-	-	-	-	830
64.6	686	2.86	28.0	59.7	2.4	2.0	3.3	95.3	13.5	13.0	13.6	13.4	13.3	13.4	13.8	13.8	13.6	2.3	3	1	-	-	-	-	-	716
64.8	658	2.95	28.2	59.8	2.4	1.8	3.2	97.0	13.0	12.8	13.5	13.8	14.0	13.3	14.2	14.0	13.5	2.5	2	1	-	-	-	-	-	718
65.5	669	3.03	27.0	60.6	2.6	2.3	3.3	96.9	13.9	12.8	13.3	13.0	12.6	13.6	13.1	12.6	12.6	2.5	2	2	-	-	-	-	-	816
64.3	617	3.22	28.5	59.3	2.4	1.9	3.2	94.9	13.1	12.4	13.4	13.0	13.4	13.3	13.6	13.6	13.3	2.5	2	2	-	-	-	-	-	767
64.3	665	2.95	27.9	59.6	2.5	2.1	3.2	95.9	13.3	13.0	13.5	13.5	12.9	13.5	13.4	13.4	13.1	2.0	2	2	-	-	-	-	-	789
65.5	692	2.85	27.2	60.3	2.2	1.8	3.1	98.0	13.1	13.0	14.3	12.8	13.8	13.0	14.5	14.5	13.5	2.0	4	-	-	-	-	-	-	767
63.9	652	3.06	27.9	59.5	2.5	1.7	3.1	96.0	13.4	12.4	13.9	12.8	12.1	12.9	13.9	14.5	13.0	1.8	3	1	-	-	-	-	-	787
64.5	674	2.93	27.7	60.1	2.7	2.3	3.2	95.8	13.3	12.5	13.0	13.1	12.9	13.0	13.0	13.3	12.9	2.0	2	2	-	-	-	-	-	813
63.9	680	2.93	28.1	58.9	2.6	2.1	3.3	95.5	13.8	12.6	13.3	13.4	12.5	13.4	13.4	13.6	13.3	2.0	3	1	-	-	-	-	-	811
64.0	659	3.04	27.5	60.2	2.8	2.3	3.3	97.6	13.8	12.8	13.5	13.3	13.1	13.0	13.3	12.8	13.3	2.5	1	3	-	-	-	-	-	772
63.5	682	2.94	27.6	61.0	2.5	1.9	3.4	97.4	13.4	13.4	14.1	13.3	14.0	13.3	13.9	13.9	14.1	2.5	3	1	-	-	-	-	-	692
65.4	660	3.04	27.7	60.0	2.8	2.3	3.2	98.3	14.3	13.1	12.5	13.3	12.6	13.6	12.4	12.9	12.5	3.3	1	1	2	-	-	-	-	710
64.3	690	2.82	29.1	59.0	2.4	1.9	3.3	98.6	13.8	13.0	13.8	13.3	13.1	13.5	13.8	14.0	13.9	2.3	3	1	-	-	-	-	-	723
63.5	706	2.78	29.6	58.5	2.4	2.2	3.2	97.8	14.0	13.0	13.9	13.3	12.9	13.4	13.8	13.5	13.5	2.5	3	1	-	-	-	-	-	727
65.0	665	3.14	27.5	60.6	2.7	2.6	3.3	99.0	14.1	12.8	13.0	13.5	13.0	13.6	12.9	11.9	12.4	2.8	2	2	-	-	-	-	-	838
65.0	652	3.17	26.8	61.1	2.8	2.6	3.4	94.8	13.5	12.9	12.8	13.3	13.0	13.5	12.9	12.3	12.9	2.5	1	3	-	-	-	-	-	821
64.5	672	2.93	28.1	59.9	2.8	2.3	3.2	96.8	13.3	13.1	12.8	13.0	12.6	13.1	12.9	13.0	12.9	2.5	1	3	-	-	-	-	-	771
66.3	667	2.99	26.6	61.4	2.6	2.4	3.3	95.3	13.5	12.8	13.0	13.9	13.1	13.5	13.5	13.4	13.1	2.5	2	2	-	-	-	-	-	772
66.1	706	2.70	26.5	61.6	2.7	2.4	3.3	94.6	13.5	12.8	13.1	13.1	13.3	13.4	13.4	13.1	13.3	2.8	2	2	-	-	-	-	-	820
64.4	675	2.77	27.1	60.6	2.6	2.1	3.3	93.6	13.4	12.6	13.3	13.4	13.1	13.5	13.4	13.4	13.6	1.8	3	1	-	-	-	-	-	796
66.9	656	2.96	25.9	61.8	2.6	2.4	3.5	94.1	13.6	13.0	13.5	12.9	13.4	13.4	13.5	12.9	13.3	2.8	2	2	-	-	-	-	-	813
65.5	663	2.96	26.3	61.7	2.9	2.5	3.4	93.9	14.3	13.0	12.0	13.4	13.8	13.4	12.9	11.9	12.3	1.5	-	3	1	-	-	-	-	714
64.1	707	2.85	27.4	60.4	2.7	2.2	3.4	95.9	13.3	12.6	12.9	12.6	12.9	13.3	12.9	13.3	12.9	2.5	1	3	-	-	-	-	-	843
64.9	616	3.17	27.1	60.4	2.8	2.4	3.4	95.8	13.3	12.5	13.0	12.8	13.1	13.1	13.1	13.0	13.0	2.0	-	4	-	-	-	-	-	783
66.5	672	2.90	26.6	60.8	2.7	2.1	3.3	95.8	12.8	12.8	13.3	13.5	13.0	13.1	13.3	13.9	13.5	2.3	1	3	-	-	-	-	-	778
66.0	633	3.07	26.6	61.0	2.8	2.4	3.1	94.5	13.4	12.4	12.8	12.5	13.1	13.4	12.9	13.4	13.0	2.5	1	3	-	-	-	-	-	805
65.9	630	3.01	27.7	59.9	2.2	1.4	2.9	95.6	12.5	12.8	14.0	11.9	13.6	13.1	14.1	14.8	12.8	1.3	4	-	-	-	-	-	-	800
64.9	663	3.08	26.8	60.8	2.8	2.7	3.4	96.9	14.1	12.9	12.9	13.3	12.1	13.4	12.6	12.4	12.6	2.3	2	2 ¹	-	-	-	-	-	751
65.8	643	2.96	27.1	60.4	2.6	2.2	3.2	95.5	13.4	12.5	13.1	13.0	12.5	13.5	13.1	13.4	12.9	2.0	1	3	-	-	-	-	-	784
63.6	618	3.14	28.0	59.7	2.7	2.4	3.4	92.4	13.9	12.5	12.8	12.5	12.1	13.8	12.8	12.8	12.4	2.0	2	2	-	-	-	-	-	791
65.4	657	3.00	25.9	61.5	2.9	2.5	3.2	94.9	14.0	12.4	12.4	12.8	13.1	13.5	12.5	12.6	12.6	2.0	-	3	1	-	-	-	-	809
63.3	682	2.88	28.1	59.8	2.6	2.4	3.2	97.0	14.0	12.9	12.5	13.3	11.9	13.4	12.8	12.6	12.5	2.5	1	3	-	-	-	-	-	712
65.0	660	2.98	27.4	60.3	2.59	2.19	3.29	96.2	13.5	12.8	13.3	13.1	13.1	13.4	13.4	13.3	13.2	2.31	48	50	2	-	-	-	-	
64.7	684	2.93	27.6	60.3	2.56	2.15	3.31	96.3	13.7	12.9	13.3	13.2	13.2	13.5	13.5	13.4	13.3	2.36	50	49	1	-	-	-	-	
65.0	642	3.04	27.5	60.0	2.56	2.09	3.23	95.6	13.5	12.8	13.4	13.0	13.1	13.3	13.5	13.5	13.3	2.33	54	48	1	-	-	-	-	
64.9	652	3.04	27.5	60.1	2.60	2.18	3.26	96.5	13.4	12.8	13.3	13.2	13.0	13.2	13.4	13.5	13.1	2.23	47	52	1	-	-	-	-	
65.5	654	2.94	27.0	60.3	2.65	2.33	3.30	96.1	13.6	12.9	13.1	13.1	12.8	13.5	13.2	13.0	13.0	2.30	40	56	4	-	-	-	-	

Bemærkninger 3. kvartal 52. beretning**Sjælland.**

- 718 1 gris viste sig ved slagtingen at være halvorne. Ikke medregnet i gennemsnittet.
 804 1 galtgris havde nysesygge.
 815 1 galtgris og 2 sogrise havde nysesygge.
 818 1 galtgris udsat af holdet p.gr.a. brud på rygsøjlen. Alder 170 dage, vægt 60.0 kg.

OPLØSTE HOLD

Hold nr.	Center	Bemærkninger
822	Vilhelmshøj	1 sogris død af bughindebetændelse. Alder 131 dage, vægt 45.0 kg. 1 galtgris udsat af holdet p.gr.a. bylder. Alder 154 dage, vægt 53.0 kg

Fyn.

- 746 1 galtgris død af bughindebetændelse. Alder 126 dage, vægt 30.0 kg.
 755 1 sogris, 552 g dagl.tilv. og 3.44 f.e.pr.kg.tilv. syg på forsøgsstationen af ledbetændelse. Ikke medregnet i gennemsnittet.
 771 2 galtgrise og 1 sogris havde nysesygge.
 777 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
 782 1 galtgris død af tarmslyng. Alder 144 dage, vægt 57.0 kg.
 788 1 galtgris havde nysesygge.
 791 1 sogris havde nysesygge.
 795 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
 797 2 galtgrise havde nysesygge.
 805 1 galtgris havde nysesygge.

Jylland.

- 755 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. lungebetændelse. Alder 202 dage, vægt 74.0 kg.
 769 1 galtgris udsat af holdet p.gr.a. lungehindebetændelse. Alder 215 dage, vægt 84.0 kg.
 770 1 galtgris og 2 sogrise havde nysesygge.
 771 1 sogris havde nysesygge.
 800 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. leverbetændelse. Alder 183 dage, vægt 65.0 kg.
 814 1 galtgris og 2 sogrise havde nysesygge.
 817 1 sogris havde nysesygge.

Vestjylland.

752	2 galtgrise havde nysesygge.
753	1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
754	1 galtgris død af bughindebetændelse. Alder 169 dage, vægt 67.0 kg.
759	2 sogrise havde nysesygge.
762	1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
770	1 galtgris havde nysesygge.
773	1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
777	1 sogris havde nysesygge.
778	2 galtgrise og 1 sogris havde nysesygge.
780	1 sogris havde nysesygge.
786	1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
812	1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
814	Alle 4 grise havde nysesygge.

OPLØSTE HOLD

Hold nr.	Center	Bemærkninger
746	Billum	1 utrivelig galtgris udsat af holdet p.gr.a. nysesygge. Alder 218 dage, vægt 90.0 kg. 1 utrivelig sogris udsat af holdet p.gr.a. nysesygge. Alder 227 dage, vægt 88.0 kg.

De sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre

**FORELØBIGE MEDDELELSER
FRA FORSØGSLABORATORIET 1962/63 NR.4
1. JUNI 1963 TIL 31 AUGUST 1963**

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede			
							galte søer	galte søer		
Aalsbogaard	F	835	6-12-62	Nr.55 Expres, 1-10-59	14, 15-5-61	2	2	2	95	207
do	F	836	8-12-62	do	12, 15-1-61	2	2	2	92	193
Aalsbo Møllegaard	F	806	15-11-62	Nr.70 Maks, 19-12-61	67, 21-11-61	2	2	2	90	206
do	F	807	27-11-62	do	69, 21-11-61	2	2	2	78	185
do	F	886	14-2-63	Nr.65 Pelle, 6-4-61	71, 9-5-61	2	2	2	81	183
Aarlundgaard	V	831	2-12-62	Olsen, 9-4-61	50, 19-4-61	2	2	2	93	197
Abildore	S	855	10-12-60	Tim, 26-7-60	76, 14-4-60	2	2	2	89	191
do	S	928	14-2-63	do	94, 29-8-61	2	2	2	74	173
Anslet	V	823	18-11-62	Pikant, 12-7-61	22, 19-4-61	2	2	2	103	199
do	V	851	11-1-63	do	23, 3-2-62	2	2	2	83	187
do	V	855	18-1-63	Primus, 4-2-62	13, 15-1-61	2	2	2	80	181
Avnbøløsten	V	852	21-12-62	Kjeld, 27-12-60	42, 17-12-61	2	2	2	97	197
Baarse Møllevang	S	864	9-12-62	Sjøberg, 2-8-60	90, 21-4-61	2	2	2	84	183
do	S	889	31-12-62	Pinoccio, 20-2-61	94, 25-12-61	2	2	2	79	182
Baarse Vesterskov	S	847	23-11-62	Pinoccio, 20-2-61	40, 14-11-61	2	2	2	88	185
do	S	856	8-12-62	Sjøberg, 2-8-60	37, 15-4-61	2	2	2	78	175
Bajlum Overgaard	J	827	14-11-62	Bajlum Palle, 28-2-61	104, 13-6-61	2	2	2	93	207
do	J	858	31-12-62	Bajlum Thomas, 7-1-59	103, 9-12-60	2	2	2	70	183
do	J	890	28-1-63	Bajlum Jens, 5-11-61	108, 11-10-61	2	2	2	96	203
Baungard	S	866	23-12-62	Polle, 14-1-62	77, 25-1-62	2	2	2	83	187
do	S	885	25-12-62	do	78, 25-1-62	2	2	2	93	193
Bellinge	F	849	19-12-62	Nr.80 Alfred, 24-10-61	93, 10-12-61	2	2	2	77	188
do	F	858	26-12-62	do	88, 18-6-61	2	2	2	76	183
Billum	V	901	5-3-63	Tofte 59, 5-5-62	85, 12-9-61	2	2	2	74	169
Bindesbøl	V	876	8-2-63	Mogens, 14-4-62	42, 6-2-62	2	2	2	77	181
Blegind Søgaard	J	864	24-12-62	Bark, 2-2-62	26, 28-1-62	2	2	2	88	192
do	J	865	12-1-63	do	16, 8-1-60	2	2	2	70	182
Blinksbjerggaard	F	829	14-12-62	Nr.65 Kipper, 17-8-61	58, 28-12-61	2	2	2	76	185
do	F	863	4-1-63	do	59, 28-12-61	2	2	2	80	192
do	F	887	11-2-63	do	54, 4-7-61	2	2	2	85	192
do	F	862	4-1-63	Nr.70 Bolsen, 23-11-61	52, 11-6-61	2	2	2	80	191
Brandborggaard	J	873	5-1-63	Laust (7553)	83, 6-10-61	2	2	2	90	196
do	J	901	24-2-63	do	76, 11-9-60	2	2	2	66	173
Broby Søndergaard	S	848	5-12-62	Langberg, 14-9-61	79, 25-12-61	2	2	2	74	177
do	S	912	10-2-63	do	77, 10-8-61	2	2	2	68	180
Bryggergaarden	S	942	28-2-63	Eich, 11-10-61	17, 16-12-60	2	2	2	72	174
Daastruplund	S	941	22-2-63	Toften, 6-3-62	79, 16-3-62	2	2	2	79	177

I gennemsnit																				Kødfarve, 0-5 points				Klasse			
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagting		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af										AI					A	B	C	Hold-nr.
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflæsk	sidespækmaal	bug		flæskest fasthed	bov	rygflæskest fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type										
															hel	overskåret											
65.0	625	3.22	26.7	60.4	2.8	2.5	3.1	94.3	14.1	12.4	13.0	12.3	12.9	13.6	12.8	12.6	12.6	1.5	-	4	-	-	835				
66.5	690	2.84	26.1	61.5	2.2	1.8	3.2	95.8	13.4	13.0	14.3	13.8	14.8	13.0	14.5	14.3	14.1	1.8	4	-	-	-	836				
65.8	610	3.11	26.9	60.7	2.8	2.2	3.1	96.1	13.6	12.5	13.0	13.3	12.1	13.3	12.9	13.1	12.8	2.5	-	4	-	-	806				
66.5	651	3.07	26.0	61.3	2.7	2.2	3.2	95.3	13.3	12.8	13.0	12.9	13.0	13.4	13.1	13.0	13.1	1.5	2	2	-	-	807				
64.9	686	2.93	27.8	59.5	2.5	1.9	3.3	98.3	13.1	12.6	13.4	13.1	12.8	13.3	13.4	14.1	13.4	2.5	2	2	-	-	886				
66.4	675	2.87	26.8	61.6	2.8	2.5	3.3	96.3	13.9	12.6	12.4	13.5	13.3	13.6	12.8	12.8	12.8	2.5	-	4	-	-	831				
65.3	690	2.95	27.1	60.6	2.4	2.1	3.4	98.0	13.5	13.3	14.0	12.9	12.5	13.8	13.9	13.4	13.4	1.8	4	-	-	-	855				
63.8	707	2.87	28.1	59.4	2.4	1.8	3.2	97.9	13.4	12.8	14.0	13.5	12.9	13.5	14.0	13.4	13.5	1.8	4	-	-	-	928				
66.9	725	2.71	26.6	61.5	2.3	2.1	3.3	95.3	13.6	13.3	14.3	13.5	13.5	13.5	14.3	13.6	14.1	2.0	4	-	-	-	823				
64.6	676	2.89	28.0	59.8	2.4	1.8	3.2	95.6	13.4	13.1	14.1	12.9	12.5	13.6	13.8	13.8	13.5	2.0	3	1	-	-	851				
65.3	692	2.84	27.1	60.6	2.6	2.2	3.4	95.4	13.4	13.1	13.0	12.9	12.9	13.1	13.1	13.4	13.4	2.5	2	2	-	-	855				
64.5	704	2.73	27.5	60.4	2.5	1.9	3.2	96.8	13.3	13.1	13.5	13.0	13.4	13.4	14.0	14.3	13.5	2.0	3	1	-	-	852				
66.0	707	2.84	26.2	61.8	3.0	2.7	3.4	97.4	14.3	12.4	12.0	12.6	13.4	13.8	11.9	11.9	12.0	2.3	-	3	1	-	864				
65.1	686	2.89	27.4	60.4	2.7	2.1	3.3	98.5	13.5	13.0	12.8	13.1	12.6	13.3	12.9	13.4	13.1	2.8	2	2	-	-	889				
64.5	724	2.79	27.7	60.4	2.7	2.2	3.4	97.8	13.8	12.9	13.0	13.3	12.9	13.3	13.0	13.0	13.4	1.8	1	3	-	-	847				
65.6	723	2.77	28.0	59.8	2.6	2.4	3.3	98.0	13.3	13.0	13.0	13.5	13.0	13.4	13.5	13.0	13.1	2.0	2	2	-	-	856				
65.4	615	3.19	26.5	60.6	2.8	3.0	3.5	95.1	14.0	12.3	12.3	12.3	12.3	13.5	12.3	11.1	11.6	2.3	-	4 ²	-	-	827				
66.4	623	3.11	26.4	60.8	2.6	2.4	3.3	97.9	13.8	12.8	13.5	12.8	12.4	13.6	12.9	12.9	12.9	1.8	3	1	-	-	858				
65.5	650	3.01	26.8	60.2	2.7	2.6	3.5	97.6	14.5	12.5	12.6	11.8	12.4	13.8	12.4	12.4	12.3	2.5	1	3	-	-	890				
64.4	679	2.95	27.7	60.2	2.8	2.3	3.3	97.9	13.9	13.1	12.1	13.3	12.5	13.1	12.6	12.9	12.9	2.5	1	3	-	-	866				
66.0	695	2.95	26.0	61.8	2.7	2.0	3.4	95.4	13.5	12.4	13.3	13.9	14.1	13.5	13.6	13.6	13.6	1.3	1	3	-	-	885				
67.3	633	3.12	25.2	62.3	3.1	2.3	3.3	95.9	13.1	12.1	12.0	12.6	13.3	13.5	12.0	12.6	12.0	1.5	-	2	2	-	849				
66.5	653	2.96	25.7	62.0	2.6	1.7	3.3	96.3	13.0	12.6	13.1	13.0	13.5	13.1	13.6	13.9	13.1	1.3	2	2	-	-	858				
64.5	740	2.68	28.1	59.8	2.4	2.1	3.3	94.9	13.4	13.1	13.8	13.0	13.0	13.1	13.9	13.6	13.6	3.0	4	-	-	-	901				
66.1	675	2.90	26.9	61.1	2.4	1.8	3.3	97.5	13.8	13.1	14.1	13.6	13.3	13.4	14.1	14.0	14.0	2.5	4	-	-	-	876				
65.9	670	2.91	26.7	61.3	3.0	2.5	3.4	97.5	13.9	12.6	12.1	13.4	13.0	13.1	12.1	12.8	12.5	2.0	-	4	-	-	864				
65.9	630	3.10	26.8	61.2	3.0	2.7	3.3	98.6	13.8	12.5	12.0	13.3	13.3	13.9	12.1	12.0	12.1	2.5	1	2 ¹	1	-	865				
66.4	646	3.08	25.5	61.9	2.6	2.0	3.4	94.6	13.6	12.4	13.0	13.0	14.0	13.0	13.5	14.1	13.3	2.0	2	2	-	-	829				
66.0	628	3.21	26.8	60.3	2.6	2.4	3.4	95.6	13.5	12.3	13.0	12.1	11.8	13.5	12.8	13.0	12.4	2.8	2	2	-	-	863				
65.6	658	3.01	26.7	61.0	2.5	2.0	3.3	96.9	13.1	12.6	13.4	12.6	13.1	13.3	13.6	13.8	12.9	1.0	3	1	-	-	887				
64.0	637	3.16	27.9	59.4	2.9	2.8	3.4	94.1	13.8	12.4	12.4	12.6	12.3	13.6	12.1	11.5	11.8	1.5	-	4 ¹	-	-	862				
66.8	661	2.90	26.1	61.7	2.7	2.1	3.3	98.6	13.4	13.1	13.1	13.4	13.1	13.5	13.0	13.5	13.4	2.3	2	2	-	-	873				
66.4	656	2.86	26.4	60.7	2.9	2.5	3.4	96.9	13.9	12.4	12.5	13.0	13.1	13.8	12.4	12.6	12.5	2.5	1	3	-	-	901				
64.5	678	3.01	27.4	60.1	2.6	2.7	3.4	98.9	14.6	13.5	13.0	13.4	12.8	13.8	13.4	11.9	12.5	2.3	2	2 ¹	-	-	848				
65.3	625	3.22	26.8	61.3	2.8	2.6	3.4	98.9	13.8	12.9	12.6	12.8	13.4	13.3	12.9	12.1	12.4	2.3	2	1 ¹	1	-	912				
65.3	689	2.95	26.9	60.8	2.5	2.4	3.3	97.0	13.4	13.1	13.6	12.9	12.5	13.5	13.4	13.0	13.3	2.5	3	1	-	-	942				
66.0	714	2.84	26.7	61.4	2.9	2.4	3.5	93.0	13.5	12.4	12.3	12.5	12.1	13.6	11.9	12.9	12.3	2.3	1	3	-	-	941				

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved
		nr.	fødsels- dato	fader	moder	modtaget				
						galte	søer	slagtede		
Dame	S 883	13-1-63	Møns Finn, 16-11-61	57, 13-7-61	2	2	2	2	71	17
do	S 938	19-2-63	do	47, 12-9-59	2	2	2	2	81	18
do	S 906	31-1-63	Gento, 3-1-62	58, 13-7-61	2	2	1	2	72	17
do	S 939	24-2-63	do	59, 11-9-61	2	2	2	2	76	17
do	S 925	20-2-63	Hamster, 28-7-59	46, 12-9-59	2	2	2	2	66	16
Dejbjerg	V 890	7-2-63	Ellehammer, 3-2-62	38, 20-2-62	2	2	2	2	82	18
Draaby Bakkegaard	J 871	29-1-63	Palle (7735)	85, 28-7-61	2	2	2	2	62	16
do	J 872	15-1-63	do	83, 26-7-61	2	2	2	2	76	18
do	J 877	27-1-63	do	86, 10-8-61	2	2	2	2	70	17
Dybbøl	V 839	12-12-62	Snild, 6-10-61	83, 10-11-61	2	2	2	2	100	20
Dybdalgaard	F 813	14-12-62	Nr.5 Vivaldi, 13-9-61	87, 10-1-61	2	2	2	2	65	17
do	F 883	18-2-63	do	96, 21-1-61	2	2	2	2	70	17
Dybe	V 858	13-1-63	Raket, 31-10-61	84, 28-12-61	2	2	2	2	91	19
do	V 889	12-2-63	do	79, 23-7-61	2	2	2	2	84	18
Ebbelnæs	S 895	5-1-63	Marki, 24-11-61	14, 1-12-61	2	2	2	2	84	18
Egevang	V 860	12-1-63	Oberst, 12-6-61	24, 20-1-62	2	2	2	2	83	18
Elkenøre	S 917	30-1-63	Hood Elkenøre, 6-1-61	46, 25-11-61	2	2	2	2	75	17
Elkjærsgaard	V 827	1-12-62	Panser, 7-6-60	45, 30-9-60	2	2	2	2	84	18
do	V 885	14-2-63	do	49, 13-8-61	2	2	2	2	79	17
Ellede Toftegaard	S 936	2-2-63	Long, 23-3-62	68, 16-3-62	2	2	2	2	90	18
Engholm	F 872	29-1-63	Nr.40 Pascha, 23-8-60	82, 12-8-61	2	2	2	2	67	16
do	F 884	14-2-63	Nr.20 Arthur (7431)	76, 23-8-60	2	2	2	2	72	17
Ennebøllegaard	F 812	11-11-62	Nr.75 Kromann, 5-8-61	76, 26-9-61	2	2	2	2	91	20
do	F 885	9-2-63	do	66, 24-9-60	2	2	2	2	72	17
do	F 899	10-3-63	Nr.85 Normann, 14-1-62	73, 26-9-61	2	2	2	2	65	17
Erslev Kirkegaard	V 843	10-12-62	Karby Skipper, 10-7-60	93, 13-5-61	2	2	2	2	92	19
do	V 894	12-2-63	Vils Mustafa, 4-8-61	92, 26-6-61	2	2	2	2	89	18
Eskjærsgaard	F 855	1-1-63	Fætter, 18-7-61	7, 21-4-61	2	2	2	2	76	18
do	F 867	12-1-63	Herman, 17-2-62	18, 7-1-62	2	2	2	2	74	18
do	F 871	30-1-63	do	12, 17-7-61	2	2	2	2	67	17
Fabjerg	V 793	12-10-62	Saab, 15-10-61	30, 21-9-61	2	2	2	2	97	22
do	V 888	14-2-63	Fabjerg Hertug, 1-1-62	31, 4-2-62	2	2	2	2	88	18
Frisvad	V 826	29-11-62	Lundesten, 8-12-61	5, 27-11-61	2	2	2	2	90	19
Fruebro	J 879	30-1-63	Carlsberg, 25-1-61	46, 17-9-61	2	2	2	2	65	16
Frueholm	J 849	10-12-62	Jesper, 20-11-61	64, 1-12-61	2	2	2	2	100	20
do	J 850	18-12-62	do	67, 18-12-61	2	2	2	2	91	19
Fulby	S 862	8-12-62	Darius, 29-4-61	73, 2-7-61	2	2	2	2	84	18

I gennemsnit																			Kødfarve, 0-5 points				Klasse																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagting		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af														AI	A	B	C	Hold-nr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfylde		type																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

S. Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.92
F. Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.00

J. Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.92
V. Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.82

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise				Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved levendefødt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede				
							gatte	soer			
									gatte		
Funder	V 867	20-1-63	Tip, 30-3-61	43, 19-10-59	2	2	2	2	73	181	
Gammelgaard	V 887	13-2-63	Ruben, 9-12-61	39, 2-1-61	2	2	2	2	80	192	
Gl. Lundgaard	V 808	6-11-62	Lange (7397)	58, 8-4-61	2	2	2	2	90	198	
do	V 842	21-12-62	Hugin, 23-12-59	59, 30-3-61	2	2	2	2	89	191	
do	V 849	21-12-62	Carl, 21-3-61	63, 29-12-61	2	2	2	2	97	194	
Graasten	V 873	31-1-63	Brutto, 8-2-62	88, 6-2-62	2	2	2	2	82	188	
Grangaard	F 889	3-3-63	Ager, 22-11-61	54, 8-12-61	2	2	2	2	69	173	
Granhøjgaard	J 834	5-12-62	Østt, 10-2-59	78, 15-11-60	2	2	2	2	85	187	
Grauballe Nygaard	V 833	14-12-62	Nydam, 24-9-61	120, 11-3-61	2	2	2	2	69	185	
Grøftebjerg	F 868	22-1-63	Nr.40 Nato, 7-12-60	36, 6-1-62	2	2	2	2	71	178	
Grønhøj	F 823	7-12-62	Solhøj, 19-9-61	2, 6-11-61	2	2	2	2	69	180	
Guldbjergvang	J 870	13-1-63	Bo, 1-2-62	39, 7-2-62	2	2	2	2	70	175	
do	J 880	27-1-63	Fix, 10-7-61	34, 6-7-62	2	2	2	2	72	178	
Gylling Skov	F 844	3-1-63	Toke, 5-8-61	86, 15-10-62	2	2	2	2	71	179	
do	F 845	25-12-62	do	85, 15-1-62	2	2	2	2	77	183	
do	F 880	24-1-63	do	88, 27-1-62	2	2	2	2	90	197	
Hagelbjerggaard	S 896	5-1-63	Granberg, 22-2-61	91, 20-7-60	2	2	2	2	86	186	
do	S 903	26-1-63	do	2, 31-12-60	2	2	2	2	72	172	
Hanbjerg Vestergaard	V 866	2-1-63	Plus, 17-12-60	58, 10-3-61	2	2	2	2	104	215	
Hanstedgaard	S 908	14-2-63	Julius, 26-7-60	129, 13-8-60	2	2	2	2	70	169	
do	S 924	16-2-63	Tønnes, 15-7-61	135, 29-7-61	2	2	1	2	60	163	
Hatting	F 879	10-2-63	Ralf (7667)	35, 13-7-59	2	2	2	2	63	170	
Haugaard	F 882	28-1-63	Ven, 27-9-61	80, 10-6-61	2	2	2	2	73	184	
Havlykke	S 916	23-1-63	Findus, 30-10-61	60, 1-12-59	2	2	2	2	78	190	
Hejedegaard	S 877	25-12-62	Gorm, 2-8-61	74, 22-1-61	2	2	2	2	75	174	
do	S 926	30-1-63	Max, 8-12-61	77, 31-1-62	2	2	2	2	85	185	
do	S 947	27-2-63	do	78, 7-1-62	2	2	2	2	80	179	
Helhøjgaard	F 895	12-2-63	Hejbo, 14-11-60	33, 15-8-61	2	2	2	2	86	194	
Hennebjerg	V 817	15-11-62	Lux, 18-10-61	31, 29-4-61	2	2	2	2	92	198	
Herborg	V 853	5-1-63	Sam, 10-1-61	68, 25-11-60	2	2	2	2	89	189	
Herping	V 874	28-1-63	Strøm, 5-8-60	77, 8-12-60	2	2	2	2	89	186	
Hjortholm	J 861	20-12-62	Hjortholm Fix, 6-10-60	20, 11-7-61	2	2	2	2	91	193	
Hjortshøj Østergaard	J 866	30-12-62	Hjortshøj Plys, 28-11-61	282, 3-1-62	2	2	2	2	74	179	
do	J 896	2-2-63	Hjortshøj Sambo, 4-10-61	251, 24-5-60	2	2	2	2	80	180	
Holmdrup	F 811	1-12-62	Nr.35 Vang, 26-7-60	52, 8-11-60	2	2	2	2	66	178	

I gennemsnit																			Kødfarve, 0-5 points				Klasse				Hold-nr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespekmål	bug		flæskest fasthed	bov	ryglæskest fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink. form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type	AI	A	B	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

S. Sjælland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.92

J. Jylland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.92

F. Fyn:

F.e.pr.kg.tilv. 3.00

V. Vestjylland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.82

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved levende vægt g.kø
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede			
							galte	søer		
Holsted	V	845	21-12-62	Ben Bella, 1-12-61	59, 21-6-61	2	2	2	85	186
Honum	F	822	26-11-62	Høst, 27-9-61	40, 17-7-60	2	2	2	78	185
do	F	859	3-1-63	do	46, 15-4-61	2	2	2	79	186
do	F	900	6-3-63	do	45, 7-10-60	2	2	2	74	172
do	F	852	28-12-62	Rane, 9-12-61	41, 17-7-60	2	2	2	79	181
Honum Vestergaard	F	837	27-12-62	Jørgen, 31-12-60	23, 9-12-57	2	2	2	72	178
do	F	838	14-12-62	Jeppe, 25-10-61	42, 18-12-61	2	2	2	84	193
Houmarksgaard	J	836	8-12-62	Dram, 18-7-61	76, 20-8-60	2	2	2	77	186
do	J	863	3-1-63	do	84, 12-7-61	2	2	2	77	183
do	J	883	2-2-63	do	79, 17-3-61	2	2	2	69	168
do	J	884	28-1-63	do	78, 17-3-61	2	2	2	75	180
Hundslev	F	830	18-12-62	Nr.20 Primus, 8-6-61	16, 29-6-61	2	2	2	61	173
do	F	833	26-12-62	do	19, 18-12-61	2	2	2	70	177
do	F	856	9-1-63	do	3, 28-12-60	2	2	2	63	168
do	F	874	1-2-63	do	96, 30-7-60	2	2	2	69	173
do	F	832	24-12-62	Nr.30 Mark, 15-1-62	17, 18-12-61	2	2	2	71	183
do	F	847	27-12-62	do	21, 18-12-61	2	2	2	74	184
do	F	848	25-12-62	do	18, 18-12-61	2	2	2	82	189
Hvidemosegaard	F	897	17-2-63	Mao, (7835)	47, 16-3-60	2	2	2	78	192
Hviding	V	877	12-2-63	Gento, 1-12-61	49, 11-1-61	2	2	2	72	169
Hækkebøllegaard	F	857	4-1-63	Nr.100 Lorentzen, 22-6-60	26, 10-10-61	2	2	2	72	180
Høgstedgaard	J	820	2-12-62	Model, 3-2-62	81, 19-11-61	2	2	2	73	184
Højbogaard	F	794	3-11-62	Nr.90 Kaptejn, 14-7-60	47, 3-11-61	2	2	1	81	200
Højvangslund	J	888	23-1-63	Peder Most, 16-11-61	54, 28-5-61	2	2	2	87	193
do	J	891	3-2-63	Konsul, 4-12-61	56, 22-11-61	2	2	2	89	193
Høve,	V	898	2-2-63	Solager, 19-9-61	23, 7-2-61	2	2	2	86	183
do	S	927	23-1-63	do	31, 14-1-62	2	2	2	86	186
Høver	J	822	21-11-62	Jasper, 19-8-61	57, 31-8-61	2	2	1	84	193
do	J	832	11-12-62	do	60, 17-9-61	2	2	2	77	180
do	J	825	22-11-62	Partner, 30-5-61	52, 21-5-61	2	2	2	89	194
do	J	845	23-12-62	do	53, 26-5-61	2	2	2	81	188
Idestrup	S	876	29-12-62	Jan, 19-8-61	85, 16-11-61	2	2	2	66	170
Jestrup	V	830	11-12-62	Jeff, 30-9-60	24, 7-6-61	2	2	2	80	180
Kammersgaard	V	859	9-1-63	Karby Skipper, 10-7-60	43, 16-6-61	2	2	2	92	200
Karby	V	822	15-11-62	Karby Skipper, 10-7-60	33, 20-12-60	2	2	2	98	211
do	V	861	9-1-63	do	39, 16-6-61	2	2	2	76	182
do	V	875	10-2-63	do	41, 22-6-61	2	2	2	74	171
Kastanielund	S	819	10-12-62	Nr.75 Frode, 7-1-60	20, 7-2-61	2	2	2	75	177
do	S	875	28-12-62	do	24, 28-7-61	2	2	2	63	174

I gennemsnit																		Kødfarve, 0-5 points	Klasse				Hold-nr.			
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af										AI	A	B	C				
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflask	sidespækmål	bug		flaskets fasthed	bov	rygflaskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type									
															hel	overskåret										
66.9	691	2.67	26.6	61.6	2.8	2.3	3.4	96.0	13.6	12.6	12.8	12.6	13.1	13.6	12.6	12.6	12.8	1.3	1	2	1	-	-	-	-	845
65.8	652	2.94	27.2	60.6	2.2	1.6	3.0	97.4	12.9	13.0	13.6	12.6	13.3	12.0	14.3	14.6	13.4	1.8	4	-	-	-	-	-	-	822
66.6	658	3.01	26.4	60.9	2.5	2.2	3.4	96.6	13.8	12.6	13.0	12.5	13.3	13.4	13.0	13.3	13.1	2.3	1	3	-	-	-	-	-	859
67.3	721	2.72	26.2	61.0	2.1	1.7	3.3	95.9	13.1	13.0	14.0	13.6	12.6	12.8	14.1	15.0	13.6	1.5	4	-	-	-	-	-	-	900
64.8	681	2.89	27.3	60.2	2.5	2.4	3.3	97.4	13.8	13.5	13.8	13.1	13.3	13.4	13.8	13.0	13.6	2.3	3	1	-	-	-	-	-	852
65.1	661	2.92	27.3	60.3	2.8	2.1	3.2	97.6	14.3	12.5	13.1	12.6	13.4	13.5	13.1	13.3	13.1	2.3	1	3	-	-	-	-	-	837
64.8	645	3.06	27.8	59.6	2.8	2.2	3.2	95.6	13.6	12.5	13.1	12.8	12.0	13.5	12.8	12.9	12.8	2.0	-	4	-	-	-	-	-	838
65.8	641	3.04	26.4	61.0	2.9	2.5	3.4	96.9	13.4	12.5	11.8	13.3	12.8	13.4	12.4	12.3	12.5	2.0	-	4	-	-	-	-	-	836
65.0	666	2.82	27.5	60.4	2.5	2.2	3.2	98.3	13.0	13.1	13.6	13.1	13.9	12.9	13.6	13.3	13.5	1.8	2	2	-	-	-	-	-	863
65.0	709	2.76	27.6	60.2	2.7	2.6	3.3	97.8	13.5	13.0	12.9	13.3	13.0	13.0	13.0	12.5	13.0	2.5	1	3	-	-	-	-	-	883
63.9	674	2.90	29.3	58.4	2.8	2.4	3.3	98.0	13.6	12.9	12.6	12.3	12.3	13.4	12.4	12.9	12.6	2.0	1	2	1	-	-	-	-	884
64.1	624	3.08	28.3	59.2	2.4	2.2	3.1	97.0	13.3	13.1	13.8	13.0	13.1	13.1	14.1	13.5	13.3	2.3	4	-	-	-	-	-	-	830
63.9	653	2.98	28.7	59.1	2.3	2.0	3.1	95.6	13.4	13.4	14.0	13.0	13.6	13.3	14.1	13.9	13.9	2.0	4	-	-	-	-	-	-	833
66.3	670	2.87	26.5	61.0	2.8	2.6	3.2	95.4	13.5	12.6	12.6	12.6	13.5	13.1	12.5	12.3	12.5	1.8	-	4 ¹	-	-	-	-	-	856
64.6	668	2.93	28.0	59.5	2.5	2.1	3.3	97.9	13.0	13.0	13.6	13.1	12.5	13.3	13.8	13.5	13.1	2.3	3	1	-	-	-	-	-	874
63.9	622	3.09	28.4	59.1	2.7	2.5	3.3	97.0	13.8	12.8	12.5	12.4	12.4	13.5	12.8	12.1	12.5	2.0	2	2	-	-	-	-	-	832
64.0	637	2.99	28.3	59.7	2.5	2.3	3.2	96.9	13.1	12.9	13.6	12.5	13.0	12.9	13.6	12.8	12.9	2.5	2	2	-	-	-	-	-	847
65.0	657	3.02	27.4	60.0	2.5	2.4	3.2	97.0	13.8	13.0	13.8	12.8	12.8	13.3	13.8	12.9	13.1	2.8	3	1	-	-	-	-	-	848
64.4	618	3.04	27.5	60.0	2.6	2.0	3.3	94.9	13.3	12.8	12.8	13.5	12.9	13.6	13.0	13.6	13.3	2.0	1	3	-	-	-	-	-	897
65.8	725	2.68	27.1	60.9	2.4	2.0	3.3	97.9	13.3	13.1	14.0	12.8	12.9	13.1	13.5	13.9	13.4	2.5	2	2	-	-	-	-	-	877
65.9	648	3.04	26.6	61.0	2.7	2.1	3.3	96.4	13.4	12.6	13.5	13.0	12.4	13.3	13.4	13.4	13.0	2.8	2	2	-	-	-	-	-	857
66.1	632	3.11	26.7	61.0	2.3	2.0	3.4	97.8	13.8	13.3	13.6	13.9	13.5	13.4	14.1	14.0	13.9	2.8	3	1	-	-	-	-	-	820
64.2	588	3.19	28.5	59.2	2.5	2.0	3.2	94.2	13.3	12.8	14.0	12.7	13.0	13.5	13.5	13.7	13.2	1.0	2	1	-	-	-	-	-	794
65.0	667	2.88	27.5	59.6	2.4	2.4	3.3	96.6	13.6	12.8	13.5	13.3	12.9	13.6	13.8	12.5	13.1	2.8	3	1	-	-	-	-	-	888
64.5	679	2.86	27.2	60.2	2.6	2.3	3.3	96.1	13.6	12.9	13.3	13.4	13.3	13.5	13.4	12.8	13.4	2.3	3	1	-	-	-	-	-	891
67.1	727	2.71	26.7	61.0	2.6	2.5	3.3	94.0	13.5	12.6	12.5	12.9	13.3	13.8	13.1	12.5	12.8	2.3	1	3 ¹	-	-	-	-	-	898
66.1	698	2.85	26.5	61.3	2.7	2.4	3.4	95.4	13.8	12.8	12.4	13.5	13.0	13.9	13.0	12.6	12.9	2.8	-	4	-	-	-	-	-	927
65.0	649	3.02	27.2	60.6	2.7	2.4	3.3	95.2	13.5	12.3	13.0	13.7	12.8	13.2	13.0	13.2	13.0	2.0	1	2	-	-	-	-	-	822
66.1	681	2.91	26.9	60.6	2.3	1.7	3.3	97.1	13.3	13.4	14.1	13.9	14.1	13.0	14.5	14.1	14.4	3.0	4	-	-	-	-	-	-	832
64.8	668	2.94	26.9	60.7	2.5	1.7	3.3	96.6	13.4	13.4	13.9	13.8	13.3	13.0	13.8	14.0	13.5	1.5	2	2	-	-	-	-	-	825
65.5	658	2.97	27.4	60.1	2.6	2.2	3.3	95.9	13.6	12.9	13.3	13.5	13.1	13.4	13.4	13.0	13.1	2.5	1	3	-	-	-	-	-	845
65.6	671	3.01	27.5	60.2	2.6	2.2	3.4	98.1	13.6	13.3	13.4	13.3	13.4	13.6	13.5	12.9	13.5	2.0	2	2	-	-	-	-	-	876
68.1	694	2.66	26.3	61.5	2.5	1.9	3.4	95.9	13.5	12.9	13.5	12.9	13.8	13.3	13.8	13.9	13.9	1.5	3	1	-	-	-	-	-	830
65.3	646	2.61	28.0	59.7	2.5	1.6	3.2	98.1	13.3	12.9	13.3	12.9	13.0	13.1	13.5	14.0	13.4	2.5	2	2	-	-	-	-	-	859
67.8	622	2.97	26.2	61.7	2.7	2.3	3.2	97.8	13.5	12.8	13.4	12.9	12.8	13.5	13.1	13.0	13.1	2.0	1	3	-	-	-	-	-	822
65.6	667	2.61	27.3	60.8	2.5	2.1	3.2	96.6	13.5	13.5	13.9	12.9	13.1	14.0	13.6	13.5	13.6	2.5	2	2	-	-	-	-	-	861
65.4	725	2.69	27.7	60.2	2.4	1.9	3.2	98.1	13.5	12.8	13.9	12.8	12.4	13.5	13.6	13.5	13.3	2.3	4	-	-	-	-	-	-	875
65.9	684	3.01	27.3	60.4	2.5	2.4	3.2	98.0	14.0	12.5	12.9	13.4	11.8	13.6	13.1	12.6	12.6	2.5	3	1 ¹	-	-	-	-	-	819
63.1	630	3.13	28.2	59.8	2.8	2.6	3.4	96.4	13.9	12.5	12.1	13.4	11.4	13.8	12.4	11.9	12.0	2.5	1	2	1	-	-	-	-	878

S. Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.92
F. Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.00

J. Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.92
V. Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.82

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved 90 kg levendevægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede			
							galte	soer		
Kastanielund	S	900	19-1-63	Nr.75 Frode, 7-1-60	25, 28-7-61	2	2	2	74	180
do	S	931	30-1-63	do	26, 13-2-62	2	2	2	79	187
Kauergaard	J	823	19-11-62	Kauergaard Dulles,9-5-60	125, 6-7-61	2	2	2	82	192
do	J	846	20-12-62	do	123, 5-1-61	2	2	2	81	185
do	J	844	13-12-62	Søby Kalle, 29-3-60	129, 24-11-61	2	2	2	78	187
do	J	878	13-1-63	Kauergaard Elm, 6-3-62	131, 22-2-62	2	2	2	80	185
Kildegaard	S	861	12-12-62	Ross, 1-12-61	34, 13-2-62	2	2	2	81	181
do	F	896	17-2-63	do	35, 13-2-62	2	2	2	83	184
Kindvig	S	878	23-12-62	Rabbi, 13-2-62	53, 24-6-61	2	2	2	78	177
do	S	891	19-1-63	Smutti, 17-1-62	57, 24-6-61	2	2	2	69	175
do	S	892	18-1-63	do	54, 17-5-61	2	2	2	72	175
Kobberfeldt	S	852	4-12-62	Qvik, 5-11-59	77, 16-7-60	2	2	2	76	177
do	S	870	7-1-63	Absalon, 25-8-61	90, 30-10-61	2	2	2	70	172
do	S	872	6-1-63	do	91, 30-10-61	2	2	2	73	175
do	S	911	7-2-63	Esbern, 25-8-61	81, 7-9-60	2	2	2	67	165
do	S	915	1-2-63	do	85, 10-3-61	2	2	2	72	172
Kollund	V	872	6-2-63	Tyfon, 11-6-61	62, 12-1-62	2	2	2	73	175
Korskjærgaard	J	847	16-12-62	Kold, 5-3-61	120, 10-12-60	2	2	2	85	190
do	J	904	15-2-63	do	122, 4-1-62	2	2	2	84	184
Kørup	F	824	12-12-62	Ralf, (7667)	95, 5-12-61	2	2	2	79	182
do	F	841	20-12-62	Nr.45 Alfbo (7635)	86, 26-8-60	2	2	2	76	181
do	F	875	3-2-63	Al, 5-10-61	96, 22-1-62	2	2	2	70	178
Lammegaard	S	893	17-1-63	Pirat, 20-7-61	97, 29-7-61	2	2	2	69	174
do	S	913	19-1-63	do	96, 29-7-61	2	2	2	85	183
do	S	929	29-1-63	Mustafa (7573)	95, 22-2-61	2	2	2	89	190
Langballe	J	855	31-12-62	Frits (7869)	70, 22-3-60	2	2	2	73	179
do	J	856	26-12-62	Briks, 6-2-62	84, 2-1-62	2	2	2	72	184
do	J	892	18-2-63	Saga, 7-3-62	66, 19-10-59	2	2	2	71	175
Langbjerg	V	832	12-12-62	Skalbjerger, 26-1-61	29, 29-1-61	2	2	2	74	180
Langdel	V	837	15-12-62	Bøg, 6-1-62	158, 19-1-62	2	2	2	87	192
do	V	878	9-2-63	do	163, 14-3-62	2	2	2	75	179
do	V	847	25-12-62	Blom, 6-1-62	159, 19-1-62	2	2	2	89	192
do	V	848	4-1-63	Anker, 7-10-60	146, 9-6-61	2	2	2	82	188
do	V	879	8-2-63	Claus, 4-4-62	162, 14-3-62	2	2	2	87	188
do	V	880	7-2-63	Bukh, 1-2-62	161, 19-1-62	2	2	2	77	183
Langemark	S	905	19-1-63	Vilho, 19-12-60	27, 22-10-61	2	2	2	84	180
Lergrav	V	838	20-12-62	Bill, 12-2-62	89, 30-11-60	2	2	2	80	183
do	V	868	24-1-63	Snap, 30-1-62	87, 13-5-60	1	3	1	76	181
Levringgaard	J	894	5-2-63	Dandy, 10-2-61	5, 9-8-61	2	2	2	82	185
do	J	900	13-2-63	Trap, 4-4-62	9, 1-3-62	2	2	2	80	184

I gennemsnit																			Kødfarve, 0-5 points				Klasse				Hold-nr.
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																		
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglask	sidespækmål	bug		flaskets fasthed	bov	ryglaskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	hel	overskåret	type										
65.0	656	3.01	26.3	61.6	3.3	3.3	3.4	95.6	14.8	12.6	10.5	13.1	12.8	13.1	12.8	13.1	10.5	10.0	10.5	2.5	1	-	2	1	-	900	
65.6	651	3.12	27.0	60.8	2.7	2.8	3.5	97.8	14.5	12.6	12.6	11.8	11.1	13.8	12.0	11.4	11.3	2.8	1	2	1	-	-	-	-	931	
66.3	640	3.09	26.7	60.6	2.5	2.3	3.4	96.3	13.7	12.5	13.8	12.5	13.0	13.5	13.3	13.3	13.3	2.5	1	2	-	-	-	-	-	823	
65.4	675	2.84	28.1	59.3	2.6	2.0	3.1	97.3	13.6	13.0	13.1	12.8	13.1	13.4	13.5	13.8	13.6	2.3	2	2	-	-	-	-	-	846	
65.4	645	2.96	26.5	61.0	2.5	1.9	3.1	96.6	13.3	12.8	13.1	12.8	13.6	13.1	13.8	13.9	13.4	1.3	4	-	-	-	-	-	-	844	
68.0	668	2.88	25.1	62.7	2.7	2.2	3.6	95.5	13.8	12.3	12.6	11.8	12.9	13.6	12.8	13.5	12.6	2.3	1	3	-	-	-	-	-	878	
65.3	698	2.90	26.0	61.5	2.8	2.6	3.4	95.1	14.1	12.9	12.8	12.8	12.4	13.4	12.5	12.5	12.6	2.0	-	4	-	-	-	-	-	861	
66.8	693	2.77	26.2	61.2	2.6	1.9	3.4	97.6	13.5	12.6	13.4	13.0	13.3	13.4	13.4	14.4	13.4	2.0	2	2	-	-	-	-	-	896	
66.4	708	2.84	26.3	60.9	2.7	2.4	3.3	96.3	13.9	12.5	12.9	13.0	13.1	13.5	12.8	13.1	13.1	2.5	1	3	-	-	-	-	-	878	
64.6	664	2.98	27.8	59.9	2.6	2.5	3.4	97.8	14.3	13.0	13.3	12.9	13.0	13.4	13.3	12.6	13.1	1.8	3	1	-	-	-	-	-	891	
66.3	680	2.94	25.8	61.9	2.9	2.9	3.5	97.6	14.3	12.9	11.9	11.8	12.6	13.5	11.8	11.6	11.4	2.3	-	3	1	-	-	-	-	892	
65.1	695	2.90	27.4	60.7	2.5	2.0	3.3	96.5	13.6	12.9	13.5	13.4	13.0	13.9	13.6	13.8	13.6	2.3	2	2	-	-	-	-	-	852	
64.8	684	2.98	27.3	61.4	3.2	2.3	3.4	93.8	13.8	12.6	11.3	12.4	13.0	13.4	11.4	12.1	11.5	2.0	-	2	1	1	-	-	-	870	
65.5	682	2.97	26.8	61.1	2.8	2.6	3.2	95.3	13.8	12.7	11.8	13.0	12.7	13.5	12.5	12.3	12.3	2.0	1	2	-	-	-	-	-	872	
64.1	720	2.86	28.2	59.7	2.7	2.1	3.2	100.1	13.4	12.8	13.0	12.5	12.8	13.4	13.1	13.4	12.8	2.5	2	2	-	-	-	-	-	911	
63.6	702	2.88	28.2	59.2	2.3	2.4	3.2	99.5	13.6	13.3	14.0	13.1	13.1	13.1	14.0	12.3	13.0	2.0	3	1	-	-	-	-	-	915	
64.3	686	2.84	27.5	59.8	2.6	2.5	3.2	96.6	13.9	12.8	13.0	13.0	13.1	13.4	13.1	12.4	12.9	2.5	2	2	-	-	-	-	-	872	
66.3	666	2.90	26.0	61.1	2.6	2.1	3.3	98.1	13.5	12.9	13.1	13.0	14.0	13.4	13.3	13.8	13.4	2.8	3	1	-	-	-	-	-	847	
67.0	699	2.74	26.3	61.1	2.6	2.0	3.4	98.0	13.5	12.8	13.6	13.3	13.9	13.5	13.6	14.0	13.9	2.5	2	2	-	-	-	-	-	904	
68.1	679	2.95	25.6	62.1	2.7	2.1	3.3	95.4	13.4	12.3	13.1	13.1	13.8	13.3	13.5	13.4	13.3	1.3	2	2	-	-	-	-	-	824	
65.3	669	2.90	27.6	60.5	2.6	1.9	3.1	96.4	13.5	12.8	13.6	12.8	13.5	13.4	13.6	14.1	13.5	2.5	2	2	-	-	-	-	-	841	
64.9	648	3.08	27.5	60.1	2.5	2.0	3.1	96.4	13.3	13.0	13.9	12.6	13.0	13.4	13.6	14.1	13.6	1.5	3	1	-	-	-	-	-	875	
66.0	672	2.99	25.9	62.0	2.8	2.6	3.5	96.3	14.0	12.6	12.6	12.5	13.1	13.3	12.6	12.0	12.4	2.0	1	3	1	-	-	-	-	893	
66.5	713	2.80	26.2	61.3	2.5	2.3	3.3	97.5	13.5	12.6	13.3	12.9	12.9	13.0	13.6	13.3	13.3	2.0	2	2	-	-	-	-	-	913	
68.3	691	2.99	25.2	62.5	2.7	2.2	3.4	96.1	13.6	12.5	12.8	12.5	14.1	13.3	12.9	13.3	13.0	1.8	1	3	-	-	-	-	-	929	
66.6	667	2.90	25.7	61.9	2.8	2.2	3.3	95.8	13.8	12.5	12.5	13.4	13.1	13.1	13.0	13.3	13.0	2.3	1	3	-	-	-	-	-	855	
66.3	629	3.10	26.4	61.0	2.9	2.4	3.3	94.8	14.0	12.5	12.0	13.0	13.1	12.9	12.6	12.8	12.6	1.8	-	4	-	-	-	-	-	856	
65.4	668	2.89	27.0	60.9	2.5	2.0	3.3	94.1	13.9	12.6	13.4	13.8	13.6	13.3	13.6	13.5	13.4	2.3	2	2	-	-	-	-	-	892	
65.4	663	2.79	27.2	61.0	2.5	1.8	3.3	95.1	13.1	13.0	13.9	13.0	13.8	12.9	13.8	13.8	13.5	2.5	4	-	-	-	-	-	-	832	
64.5	664	2.99	27.5	60.3	2.4	2.0	3.2	95.8	13.6	13.5	14.0	13.6	13.8	13.4	14.0	13.6	14.1	2.0	4	-	-	-	-	-	-	837	
65.8	678	2.81	27.1	60.8	2.4	1.9	3.3	94.9	13.3	12.9	13.6	13.6	13.3	13.2	13.8	13.4	13.6	2.3	2	2	-	-	-	-	-	878	
65.3	679	2.80	27.1	61.0	2.5	2.4	3.3	96.5	14.1	13.3	13.9	13.6	13.1	13.5	13.8	12.5	13.0	2.5	2	2	-	-	-	-	-	847	
66.0	656	2.96	27.3	60.7	2.7	2.4	3.3	97.8	13.5	12.8	13.5	13.4	12.9	13.5	13.4	13.0	13.0	2.8	1	3	-	-	-	-	-	848	
64.3	693	2.75	28.0	60.2	2.5	2.2	3.2	96.8	13.4	13.0	13.5	13.3	12.6	13.0	13.5	13.3	13.3	3.0	2	2	-	-	-	-	-	879	
66.4	662	2.90	26.5	61.6	2.5	2.0	3.6	97.5	13.6	13.0	13.1	12.4	13.1	13.8	12.9	13.8	13.0	2.8	2	2	-	-	-	-	-	880	
66.3	727	2.78	26.6	61.5	2.7	2.1	3.2	96.0	13.5	12.8	12.9	13.1	13.5	13.4	13.3	13.4	13.4	2.3	2	2	-	-	-	-	-	905	
65.5	682	2.83	26.7	61.3	2.5	2.1	3.3	98.1	13.8	12.9	14.0	13.4	13.0	13.4	13.6	13.3	13.3	2.3	4	-	-	-	-	-	-	838	
67.0	667	2.81	27.1	61.4	2.9	2.5	3.3	95.0	14.1	12.4	11.9	13.9	12.8	13.5	12.4	12.6	12.8	1.8	1	2	1	-	-	-	-	868	
64.5	680	2.87	27.7	59.8	2.5	2.2	3.4	97.4	13.9	13.3	13.6	13.1	13.5	13.8	13.9	12.9	13.4	2.3	3	1	-	-	-	-	-	894	
66.8	677	2.84	26.6	60.9	2.6	2.2	3.4	96.3	13.1	12.4	13.1	12.9	12.6	13.5	13.4	13.3	13.4	2.5	2	2	-	-	-	-	-	900	

S. Sjælland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.92

J. Jylland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.92

F. Fyn:

F.e.pr.kg.tilv. 3.00

V. Vestjylland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.82

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved	
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modiaget	slagtede				
							galte søer	galte søer			
Lidemark	S	854	12-12-62	Klaus Jørn, 4-3-60	62,	6-1-62	2	2	2	73	17
do	S	869	27-12-62	do	63,	5-1-62	2	2	2	78	17
do	S	888	12-1-63	do	65,	6-1-62	2	2	2	75	17
Lillebrænde	S	937	4-2-63	Primus, 14-1-61	63,	28-1-62	2	2	2	89	18
do	S	946	1-3-63	Dikmann, 24-3-59.	58,	4-8-61	2	2	2	76	17
Lumsaas	S	881	7-1-63	Toft, 3-9-61	11,	17-7-61	2	2	2	67	16
do	S	886	8-1-63	do	12,	17-7-61	2	2	1	80	17
do	V	897	25-2-63	do	14,	20-7-61	2	2	2	64	16
Lundby Møllegaard	S	921	1-2-63	Dik Lundby, 6-3-61	50,	24-6-61	2	2	2	73	17
Lunde	V	806	17-11-62	Skjold, 5-9-60	94,	4-5-61	2	2	2	84	19
Lundesten	S	826	6-11-62	Rislev, 25-1-60	99,	29-7-61	2	2	2	93	19
do	S	871	2-1-63	do	90,	20-6-61	2	2	2	79	18
do	S	914	24-1-63	do	94,	30-8-61	2	2	2	76	17
do	S	918	5-2-63	do	87,	8-2-61	2	2	2	69	17
Lykkensgaard	S	882	23-12-62	O.X., 12-12-59	25,	14-8-59	2	2	2	77	17
Lynghøjgaard	J	853	28-12-62	Sørup Retur, 8-4-61	82,	16-9-61	2	2	2	76	18
Lysager	V	825	29-11-62	Lysager Staal, 6-1-62	9,	3-10-61	2	2	2	92	19
Lysgaard	J	898	14-2-63	Draaby, 15-1-61	71,	6-2-61	2	2	2	71	17
do	J	903	2-3-63	Toft, 19-1-62	78,	2-2-62	2	2	2	70	17
Mallinggaard	J	889	28-1-63	Baron, 24-1-61	70,	23-7-61	2	2	2	80	18
Mariendal	F	842	20-12-62	Sandal, 23-11-61	86,	20-2-61	2	2	2	76	18
do	F	843	20-12-62	do	88,	27-5-61	2	2	2	80	18
Marslund	V	828	25-11-62	Plus, 17-12-60	13,	31-7-59	2	2	2	94	20
do	V	883	8-2-63	Manfred, 2-1-61	26,	24-7-61	2	2	2	74	17
do	V	884	11-2-63	do	25,	24-7-61	2	2	2	80	18
Melby	F	873	1-2-63	Nr.80 Skott, 1-7-61	33,	10-1-62	2	2	2	66	17
Mosebæk	S	907	24-1-63	Tørn, 8-6-61	75,	20-12-60	2	2	2	81	18
Mygind	J	859	29-12-62	Hvid, 8-9-61	38,	5-11-61	2	2	2	77	18
do	J	860	28-12-62	do	37,	5-11-61	2	2	2	75	18
Naarup	F	888	26-2-63	Nr.15 Kramer, 25-11-61	99,	28-4-61	2	2	2	67	17
Naskegaard	S	940	21-2-63	Mustafa II, 9-1-60	86,	1-1-61	2	2	2	66	16
Nygaard	J	895	11-2-63	Tommi, 31-1-61	68,	17-7-61	2	2	2	65	17
Nyvang	J	897	17-2-63	Kajus, 8-10-61	65,	27-2-62	2	2	2	69	17
Næsby	F	890	20-2-63	Nr.65 Boll, 7-3-62	36,	2-10-60	2	2	2	78	18
do	F	891	20-2-63	Nr.60 Belser, 16-4-61	29,	30-3-60	2	2	2	82	18
Oddersted	F	817	25-11-62	Odder, 1-9-61	99,	1-12-61	2	2	1	80	19
do	F	869	18-1-63	Hou, 2-1-61	96,	13-7-61	2	2	2	85	18

I gennemsnit																			Klasse				Hold-nr.	
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af															
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfyldte		type							
																			Kødfarve, 0-5 points	A1	A	B	C	
50.0	718	2.81	27.7	60.1	2.5	1.8	3.4	94.8	13.6	12.8	13.9	13.9	13.8	13.1	14.0	14.1	14.1	1.8	3	1	-	-	-	854
50.0	701	2.87	26.8	61.0	2.6	2.0	3.4	96.0	13.9	13.0	13.1	13.4	13.3	13.4	13.6	13.9	13.6	2.5	2	2	-	-	-	869
50.1	718	2.78	27.6	60.4	2.4	2.0	3.4	96.1	13.9	12.8	13.9	13.0	13.0	13.5	13.9	13.8	13.6	2.5	3	1	-	-	-	888
50.3	716	2.79	26.2	61.5	2.5	2.0	3.4	97.1	13.3	13.0	13.3	13.5	13.8	13.1	13.6	13.8	13.4	2.3	1	3	-	-	-	937
50.3	706	2.82	27.1	60.5	2.7	2.1	3.3	96.0	13.4	12.9	13.5	12.9	12.9	13.3	13.3	13.4	13.4	2.3	1	3	-	-	-	946
50.5	710	2.77	26.0	61.7	2.2	2.1	3.3	98.0	13.4	13.3	14.3	13.3	13.5	13.4	14.6	13.8	13.5	2.3	4	-	-	-	-	881
50.5	725	2.79	27.0	60.9	2.5	2.3	3.3	96.5	14.2	12.8	13.2	13.2	12.7	13.2	13.2	12.7	13.2	1.5	2	1	-	-	-	886
50.5	709	2.77	27.2	60.7	2.5	2.0	3.3	97.3	13.4	13.0	13.6	13.3	12.6	13.3	13.8	13.8	13.5	2.8	2	2	-	-	-	897
50.0	678	2.92	27.6	60.3	2.4	2.3	3.2	99.9	13.6	13.1	13.6	13.0	12.1	13.6	13.8	12.9	12.9	2.3	3	1	-	-	-	921
50.9	627	3.14	26.8	61.0	2.7	2.4	3.5	95.8	13.5	12.5	13.3	12.5	13.1	13.6	12.9	12.4	12.6	1.8	1	3	-	-	-	806
50.6	679	3.00	26.0	61.8	2.6	1.9	3.3	97.0	13.6	12.9	13.5	13.5	14.0	13.5	13.6	13.9	13.5	2.0	1	3	-	-	-	826
50.4	675	2.99	26.0	62.1	2.6	2.0	3.2	95.4	13.6	13.0	13.4	13.3	14.8	13.3	14.1	13.8	13.8	1.3	2	2	-	-	-	871
50.8	681	2.91	26.4	61.1	2.6	2.2	3.3	96.6	13.4	12.8	12.9	13.3	13.5	13.3	13.6	13.5	13.4	2.0	2	2	-	-	-	914
50.6	644	3.09	26.3	60.9	2.4	2.1	3.4	97.5	13.6	12.6	13.5	13.1	13.4	13.3	13.4	13.3	13.1	1.0	3	1	-	-	-	918
50.9	698	2.88	26.6	61.7	2.7	2.3	3.3	93.4	13.3	12.5	12.6	13.5	12.9	13.5	13.0	13.3	13.0	1.8	-	4	-	-	-	882
50.8	676	2.88	25.8	62.1	2.7	2.4	3.3	94.8	13.9	12.8	12.6	13.1	13.6	13.4	12.8	12.9	13.0	1.5	1	3	-	-	-	853
50.6	661	2.98	27.1	61.2	2.5	2.3	3.4	97.1	13.5	12.9	13.4	12.8	13.0	13.4	13.5	12.6	13.0	2.5	3	1	-	-	-	825
50.5	652	2.93	26.1	61.4	2.6	2.2	3.4	96.3	13.8	12.8	12.8	13.0	12.9	14.1	13.1	13.0	13.1	2.3	2	2	-	-	-	898
50.4	696	2.78	27.8	59.9	2.3	1.9	3.4	100.1	13.5	12.9	13.9	13.1	12.9	13.0	13.8	13.8	13.4	3.0	4	-	-	-	-	903
50.3	662	2.92	27.9	60.1	2.6	1.8	3.4	96.1	13.5	12.6	13.4	12.6	13.5	13.5	13.5	14.1	13.4	2.5	4	-	-	-	-	889
50.4	640	3.06	27.0	60.7	2.5	2.5	3.2	95.6	13.5	13.0	13.9	13.0	13.5	13.4	13.9	12.5	13.3	3.0	2	2	-	-	-	842
50.8	657	3.05	25.9	61.3	2.8	2.5	3.3	95.8	13.4	12.5	12.9	12.6	12.3	13.4	12.9	12.4	12.5	2.3	1	3	-	-	-	843
50.4	655	2.87	27.9	60.1	2.5	2.1	3.3	96.9	13.5	12.8	13.4	12.9	13.1	13.8	13.5	13.3	13.3	1.8	2	2	-	-	-	828
50.1	690	2.80	26.9	61.0	3.0	2.5	3.4	96.9	13.8	12.9	12.3	13.4	13.1	13.8	12.5	12.3	12.5	2.8	-	4	-	-	-	883
50.1	686	2.81	27.0	60.6	2.6	2.2	3.3	96.6	13.5	13.0	12.8	12.9	13.1	13.4	12.9	13.6	13.3	2.5	1	3	-	-	-	884
50.8	662	2.99	26.6	61.0	2.8	1.9	3.4	95.6	13.3	12.1	13.3	12.8	12.5	13.4	12.6	13.5	12.9	1.8	2	2	-	-	-	873
50.1	685	2.93	26.2	61.5	2.5	2.2	3.4	95.4	13.6	12.9	13.1	13.5	13.5	12.9	13.6	13.3	13.5	2.3	3	1	-	-	-	907
50.4	639	3.02	27.7	59.9	2.9	2.6	3.4	96.5	14.3	12.8	11.8	12.6	13.1	13.5	12.3	12.4	12.3	2.5	-	4	-	-	-	859
50.1	670	2.92	27.2	59.8	2.4	2.2	3.4	97.0	13.9	12.8	13.1	12.6	12.4	13.5	13.4	12.8	12.9	2.8	3	1	-	-	-	860
50.4	643	3.03	27.9	60.0	2.5	1.8	3.4	98.3	13.3	13.1	13.4	12.9	13.6	13.5	13.6	14.0	13.6	2.0	3	1	-	-	-	888
50.4	710	2.81	27.9	60.0	2.9	2.0	3.3	97.1	13.5	12.4	12.9	12.9	13.3	13.4	13.0	13.5	13.3	2.5	2	2	-	-	-	940
50.6	635	3.03	28.7	58.8	2.7	2.4	3.2	97.5	14.1	12.6	12.8	12.5	12.1	14.0	12.6	12.6	12.6	2.8	2	2	-	-	-	895
50.4	663	2.91	28.0	59.9	2.5	1.7	3.2	97.0	13.3	12.8	13.8	13.0	13.4	13.3	13.5	14.0	13.5	2.0	1	3	-	-	-	897
50.0	672	2.87	27.8	60.0	2.2	1.9	3.4	95.5	13.4	12.8	13.8	13.8	13.6	13.0	14.5	14.1	14.0	2.0	4	-	-	-	-	890
50.5	692	2.82	28.6	59.2	2.3	1.7	3.3	96.1	13.0	12.8	13.8	13.3	13.5	13.3	14.0	14.1	13.8	2.5	3	1	-	-	-	891
50.3	639	3.10	25.7	61.8	2.7	2.3	3.3	95.7	13.8	12.8	13.3	13.2	13.7	13.2	13.3	12.8	13.3	1.5	1	2	-	-	-	817
50.4	680	2.95	28.0	59.3	2.4	1.8	3.2	97.0	12.9	12.6	13.9	13.4	12.9	12.9	13.8	14.5	13.3	2.8	2	2	-	-	-	869

S. Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.92 J. Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.92
 F. Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.00 V. Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.82

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved	
		nr.	fødsels- dato	fader	moder	modtaget					
						galte	søer	galte			
											søer
Oddingen	J	852	12-12-62	Lys, 20-9-61	194,	4-1-62	2	2	2	81	19
Oldrup	F	818	28-11-62	Klaus, 22-1-61	32,	3-6-61	2	2	2	75	19
Ollerup	S	868	14-12-62	Hejde 27 (7329)	58,	7-11-61	2	2	2	82	18
do	S	943	21-2-63	Ollerup Rex, 18-8-60	62,	1-2-62	2	2	2	81	18
Ottestrupgaard	S	890	8-1-63	Fup, 25-10-58	68,	3-1-62	2	2	2	83	18
Oustrup	J	881	20-1-63	Monark, 4-2-62	31,	25-6-61	2	2	2	72	17
do	J	886	26-1-63	do	32,	25-6-61	2	2	2	82	18
do	J	887	31-1-63	Bro, 11-10-61	25,	6-12-59	2	2	2	75	18
Paastrupgaard	S	858	9-12-62	Hans, 11-2-62	72,	21-12-60	2	2	2	83	18
do	S	859	8-12-62	From, 27-1-62	71,	21-12-60	2	2	2	84	18
do	S	860	10-12-62	Lammer, 17-9-61	70,	21-12-60	2	2	2	85	18
Ringtved	V	856	19-1-63	Tim, 13-11-60	70,	29-1-61	2	2	2	76	17
do	V	857	12-1-63	Dolfus, 21-5-61	78,	4-8-61	2	2	2	76	17
do	V	886	28-1-63	do	79,	4-8-61	2	2	2	95	19
Ring Øbjerg	S	930	10-2-63	Russ, 10-12-61	56,	16-2-59	2	2	2	75	17
Rolundgaard	F	881	5-2-63	Nr.35 Grate, 19-1-62	56,	29-1-62	2	2	2	75	17
do	F	898	9-3-63	Nr.30 Gorm, 21-6-61	51,	17-8-61	2	2	2	65	16
Rostgaard	V	846	28-12-62	Ekspert, 22-12-59	47,	31-12-60	2	2	2	85	19
Rydbjerg	V	836	17-12-62	Fibu, 6-8-61	21,	2-1-62	2	2	2	85	18
do	V	844	3-1-63	Hovi, 7-12-60	18,	30-7-61	2	2	2	71	17
do	V	863	16-1-63	do	6,	19-2-60	2	2	2	79	18
do	V	862	10-1-63	Stafet 27-1-62	22,	30-1-62	2	2	2	81	18
do	V	864	18-1-63	do	23,	30-1-62	2	2	2	80	18
do	V	891	17-2-63	Stump, 13-10-61	20,	6-8-61	2	2	2	77	17
Sandkildegaard	S	867	25-12-62	Hassan, 29-7-61	52,	11-12-61	2	2	2	76	17
do	S	935	18-2-63	do	53,	26-2-62	2	2	2	78	17
Sejbækgaard	J	824	7-12-62	Granhøj, 28-7-61	63,	18-5-61	2	2	2	77	18
do	J	885	17-2-63	Bjørn, 4-1-62	68,	4-2-62	2	2	2	60	16
Siverholm	J	841	8-12-62	Baal, 8-5-61	184,	27-9-60	2	2	2	81	19
do	J	862	4-1-63	do	188,	15-2-62	2	2	2	79	18
do	J	848	8-12-62	Bay, 8-12-61	183,	10-2-61	2	2	2	89	19
Skads	V	834	26-12-62	Dynamo, 1-2-62	89,	1-3-62	2	2	2	72	17
do	V	871	7-2-63	do	77,	8-9-61	2	2	2	70	17
do	V	881	14-2-63	do	91,	1-3-62	2	2	2	72	17
do	S	1	5-3-63	do	86,	23-9-61	2	2	2	63	16
do	V	893	24-2-63	Ceres, 7-11-61	75,	28-2-61	2	2	2	59	16
Skanderup	F	825	30-11-62	Malling XVI, 2-8-61	45,	6-12-61	2	2	2	87	19
do	F	839	28-12-62	Malling XV, 27-10-60	34,	8-6-60	2	2	2	75	17
do	F	840	30-12-62	do	35,	19-12-60	2	2	2	74	17
do	F	853	1-1-63	do	39,	25-6-61	2	2	2	80	18

I gennemsnit																		Kødfarve, 0-5 points				Klasse				Hold-nr.	
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																		
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type										
66.6	615	3.19	26.7	60.8	2.5	2.2	3.4	96.9	13.9	12.9	13.4	12.8	12.9	13.4	13.3	13.0	13.4	2.5	2	2	-	-	-	-	-	852	
66.9	607	3.22	25.9	61.5	2.6	2.2	3.4	96.5	13.9	12.8	13.3	13.1	12.5	12.9	13.1	13.6	13.3	2.5	3	-	1	-	-	-	-	818	
65.1	671	2.99	26.7	60.9	2.8	2.2	3.4	94.8	14.4	12.9	12.5	13.3	13.3	13.5	13.0	13.0	13.1	1.5	1	3	-	-	-	-	-	868	
66.6	711	2.84	26.1	61.2	2.4	2.1	3.3	97.4	13.5	13.3	14.1	13.3	13.5	13.1	14.0	13.5	13.8	2.3	2	2	-	-	-	-	-	943	
65.9	716	2.79	26.3	61.4	2.6	2.2	3.4	97.6	13.5	12.6	13.1	12.9	13.9	13.5	13.4	12.5	13.0	2.3	2	2	-	-	-	-	-	890	
65.3	702	2.67	27.8	59.9	2.5	1.8	3.2	98.6	13.5	13.0	14.0	13.0	13.1	13.3	13.9	13.8	13.6	2.5	3	1	-	-	-	-	-	881	
65.8	692	2.77	27.4	60.6	2.6	1.9	3.2	96.8	13.3	13.0	13.8	13.5	13.6	13.3	13.9	14.3	13.6	1.8	2	2	-	-	-	-	-	886	
65.8	644	3.05	27.0	60.9	2.7	2.2	3.4	96.4	13.5	12.6	13.1	13.1	13.0	13.0	13.0	13.5	13.1	2.3	2	2	-	-	-	-	-	887	
65.1	716	2.82	26.2	61.2	2.7	2.0	3.3	96.5	13.1	13.1	13.0	13.6	12.5	13.5	13.1	13.8	13.4	2.3	1	3	-	-	-	-	-	858	
66.4	701	2.91	25.7	61.8	2.6	2.2	3.3	95.6	14.0	12.6	13.3	13.4	13.3	13.8	13.5	12.8	13.3	1.5	3	1	-	-	-	-	-	859	
65.3	704	2.92	27.0	60.4	2.7	2.1	3.3	96.4	14.0	12.8	12.4	13.8	12.4	13.4	12.9	13.8	13.1	2.5	2	1	1	-	-	-	-	860	
66.1	706	2.77	26.9	61.2	2.5	2.2	3.3	97.1	13.6	13.0	13.3	12.9	13.0	13.6	13.3	13.0	13.3	2.8	3	1	-	-	-	-	-	856	
64.9	695	2.67	27.3	60.5	2.3	1.8	3.2	94.8	13.3	13.0	14.0	13.1	13.0	13.3	14.1	14.4	13.8	2.3	3	1	-	-	-	-	-	857	
65.5	729	2.54	27.7	59.8	2.4	2.2	3.3	93.1	13.6	12.8	13.8	13.5	13.5	13.6	14.0	13.4	13.4	2.0	3	1	-	-	-	-	-	886	
66.5	713	2.91	26.3	61.0	2.9	2.3	3.4	96.0	13.6	12.1	12.0	12.8	13.3	13.3	12.4	12.9	12.6	1.8	-	4	-	-	-	-	-	930	
65.6	679	2.91	27.0	60.6	2.5	2.1	3.4	97.0	13.6	12.8	13.5	13.0	12.9	13.3	13.5	13.4	13.4	2.3	2	2	-	-	-	-	-	881	
63.0	678	2.87	29.1	59.1	2.4	1.8	3.3	95.3	13.8	13.1	14.0	13.0	13.4	13.6	13.9	14.4	14.1	2.3	4	-	-	-	-	-	-	898	
65.5	643	2.88	27.3	61.1	2.9	2.9	3.4	94.6	14.1	12.8	12.0	12.9	12.5	13.4	12.5	11.4	12.1	2.0	1	2 ¹	1	-	-	-	-	846	
66.3	685	2.87	26.6	61.2	2.8	2.5	3.2	95.5	13.8	12.5	12.5	13.3	13.0	13.6	12.6	12.5	12.9	2.5	1	2	1	-	-	-	-	836	
63.8	693	2.74	27.6	60.2	2.4	2.0	3.1	96.4	13.0	13.1	13.8	13.0	13.4	13.4	13.9	13.5	13.3	1.3	2	2	-	-	-	-	-	844	
66.6	699	2.74	26.5	61.8	2.5	1.9	3.2	95.5	13.4	13.0	13.5	13.5	14.5	13.4	13.8	14.0	13.8	1.3	2	2	-	-	-	-	-	863	
64.8	710	2.70	27.2	60.7	2.9	2.0	3.4	94.6	13.6	12.9	12.5	13.5	13.1	13.6	12.8	13.4	12.9	2.8	2	1	1	-	-	-	-	862	
66.4	697	2.68	26.4	61.7	2.9	2.0	3.3	92.6	12.9	12.3	12.3	13.4	13.6	13.6	12.6	13.6	12.6	1.8	2	2	-	-	-	-	-	864	
64.3	706	2.72	28.0	59.8	2.5	2.2	3.3	96.1	13.8	13.0	13.8	13.8	12.8	13.5	13.9	13.0	13.5	2.0	4	-	-	-	-	-	-	891	
65.5	703	2.89	27.2	60.4	2.6	2.4	3.4	94.0	13.4	12.6	13.3	13.4	13.9	13.4	13.6	13.0	13.3	1.5	3	1	-	-	-	-	-	867	
64.9	702	2.90	26.9	61.0	2.5	1.8	3.3	97.1	13.4	13.1	13.6	13.8	14.1	13.8	14.3	14.1	14.0	2.0	2	2	-	-	-	-	-	935	
64.0	660	3.04	27.7	59.6	2.4	2.3	3.3	95.6	13.8	13.1	13.4	13.3	12.5	13.3	13.6	13.0	13.3	2.3	3	1	-	-	-	-	-	824	
65.6	677	2.86	26.7	60.7	2.6	2.0	3.5	97.6	13.4	12.8	13.3	12.5	13.1	13.1	13.1	13.6	13.3	2.8	2	2	-	-	-	-	-	885	
64.7	615	3.12	27.6	59.7	2.6	2.6	3.2	97.8	14.2	12.8	13.0	13.0	12.7	13.5	13.2	12.3	13.0	2.5	2	1	-	-	-	-	-	841	
64.8	637	3.07	27.6	59.4	2.6	2.3	3.2	98.5	13.6	12.4	13.1	13.0	12.5	13.8	13.0	13.0	13.0	2.5	2	2	-	-	-	-	-	862	
64.4	633	3.09	27.3	59.9	2.5	2.5	3.3	97.9	13.5	12.8	13.5	13.0	13.1	13.6	13.4	12.6	13.0	2.3	2	2	-	-	-	-	-	848	
65.5	685	2.81	26.8	61.2	2.4	2.2	3.3	98.9	13.9	13.3	13.6	13.8	12.9	13.5	13.6	13.0	13.6	1.5	4	-	-	-	-	-	-	834	
66.1	667	2.88	26.5	61.6	2.6	2.4	3.3	98.0	13.6	12.8	13.1	13.6	12.6	13.6	13.1	12.4	12.8	1.8	1	3	-	-	-	-	-	871	
65.0	680	2.82	27.1	61.6	2.6	2.4	3.3	96.8	14.1	12.6	13.0	13.4	13.3	13.9	13.4	12.9	13.3	1.8	1	3	-	-	-	-	-	881	
66.4	659	3.08	25.7	62.1	2.8	2.8	3.3	99.9	14.1	12.6	13.4	13.3	12.9	13.4	13.1	11.9	12.6	2.5	1	3 ¹	-	-	-	-	-	1	
65.6	671	2.76	27.3	60.7	2.5	2.3	3.3	95.9	13.3	13.0	13.6	13.1	13.1	13.1	13.5	13.3	13.5	2.0	3	1	-	-	-	-	-	893	
65.5	657	2.98	28.6	59.0	2.6	2.3	3.2	97.3	13.4	12.8	13.5	13.3	11.9	13.8	13.4	13.1	13.0	2.0	3	1	-	-	-	-	-	825	
65.6	675	2.90	27.9	60.0	2.5	2.3	3.1	96.5	13.4	12.9	13.4	12.8	12.6	13.4	13.4	13.0	13.0	2.3	2	2	-	-	-	-	-	839	
64.8	688	2.81	27.3	60.8	2.6	2.1	3.2	96.6	13.6	12.4	12.8	13.0	12.4	13.5	13.1	13.5	13.1	1.8	1	3	-	-	-	-	-	840	
67.1	684	2.91	26.3	61.3	2.5	2.5	3.5	95.1	13.8	12.9	13.4	12.8	14.0	13.8	13.5	12.9	13.4	1.8	3	1	-	-	-	-	-	853	

S. Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.92
F. Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.00

J. Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.92
V. Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.82

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise		Ald. i dg. v. 20 kg lev.vægt	Alder i dage ved
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede		
Skanderup	F 854	1-1-63	Malling XV, 27-10-60	41, 25-6-61	2	2	2	86	18
Skovlund	J 869	16-1-63	Ruben, 28-1-62	71, 25-8-61	2	2	2	78	18
do	J 899	17-2-63	do	68, 7-7-61	2	2	2	63	16
Solagergaard	S 853	26-11-62	Asnæs, 23-11-61	90, 22-11-61	2	2	2	85	19
Sparlund	V 815	15-11-62	Ritmester, 24-3-61	21, 17-12-61	2	2	2	95	20
Stauning	V 835	6-12-62	Ekstrøm, 19-2-60	55, 28-8-59	2	2	2	88	19
Staunsbjerg	V 882	17-2-63	Salut, 25-9-61	97, 16-7-61	2	2	2	83	18
Stenager	V 869	26-1-63	Tymus, 3-2-62	43, 12-2-62	2	2	2	79	18
do	V 870	26-1-63	do	46, 14-5-61	2	2	2	74	18
Strandby	F 821	4-12-62	Nr.50 Fix, 29-11-61	66, 5-12-61	2	2	2	77	18
do	F 861	8-1-63	do	67, 9-12-61	2	2	2	72	18
Svanegaard	S 879	17-12-62	Kimp, 12-8-61	59, 22-7-60	2	2	2	79	18
do	S 880	18-12-62	do	58, 22-7-60	2	2	2	78	18
Søndervang	V 800	2-11-62	Bram, 24-12-60	20, 5-4-61	2	2	2	83	20
do	V 824	2-12-62	do	26, 27-12-61	2	2	2	83	19
do	V 829	13-12-62	do	17, 11-7-60	2	2	2	89	19
do	V 854	27-12-62	do	23, 5-6-61	2	2	2	94	19
Tangegaard	S 874	26-12-62	Palle, 25-5-61	37, 26-7-61	2	2	2	74	17
Tarup Søndergaard	F 846	25-12-62	Bukh, 1-2-62	51, 22-1-62	2	2	2	69	18
do	F 850	28-12-62	Bøg, 6-1-62	52, 9-2-62	2	2	2	74	18
do	F 851	3-1-63	Blom, 6-1-62	53, 19-2-62	2	2	2	71	18
do	F 877	25-1-63	Skøt, 27-6-59	54, 7-3-62	2	2	2	78	18
do	F 878	3-2-63	Mac, (7559)	46, 24-10-61	2	2	2	71	17
do	F 903	8-3-63	Nr.25 Sjørup, 12-4-62	57, 18-1-62	2	2	2	64	16
Ternelund	S 898	22-1-63	Herning, 17-1-62	15, 9-8-61	2	2	2	78	17
do	S 920	25-1-63	do	14, 1-5-61	2	2	2	89	19
do	S 899	21-1-63	Toft A, 24-7-61	13, 4-5-61	2	2	2	77	17
do	S 919	27-1-63	do	12, 4-5-61	2	2	2	88	18
Thirup	J 833	23-11-62	Ping 88, 7-10-61	17, 24-11-61	2	2	2	97	20
Thoderup	F 834	26-12-62	Nr.10 Swing, 11-9-61	12, 28-7-61	2	2	2	69	17
do	F 860	16-1-63	do	11, 9-4-61	2	2	2	64	17
do	F 864	27-1-63	Nr.40 Torn (7441)	16, 28-7-61	2	2	2	58	15
do	F 870	26-1-63	Nr.40 Les, 22-8-61	6, 18-6-60	2	2	2	63	17
Thorning Vestergaard	J 831	15-12-62	Kalle, 29-3-60	307, 8-12-61	2	2	2	71	17
do	J 874	15-1-63	Kauergaard Major, 18-12-61	309, 8-1-62	2	2	2	81	18
do	J 893	5-2-63	do	305, 9-1-61	2	2	2	81	18
Thorsø	J 828	30-11-62	Birk, 6-2-61	61, 25-6-61	2	2	2	76	18
do	J 829	14-11-62	Rama, 4-8-60	57, 25-6-61	2	2	2	93	20
do	J 882	8-1-63	do	65 5-2-62	2	2	2	86	19

I gennemsnit																				Klasse				Hold-nr.	
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af																
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink. form og størrelse	finh. af hoved, ben og svar	kødfyldte		type								
																					Kødfarve, 0-5 points	AI	A	B	C
65.1	683	2.91	27.3	60.7	2.6	2.4	3.3	96.3	13.8	12.6	13.3	12.4	13.1	13.6	13.1	12.8	12.9	2.0	2	2	-	-	-	-	854
65.4	682	2.80	27.4	60.5	2.6	1.8	3.3	98.3	13.0	13.0	13.4	14.0	12.9	12.8	13.6	14.1	13.6	2.3	3	1	-	-	-	-	869
65.6	701	2.68	26.9	61.0	2.5	1.9	3.3	95.6	13.3	12.6	13.6	13.6	14.1	13.3	13.8	14.3	13.8	2.3	2	2	-	-	-	-	899
63.6	656	3.13	27.7	60.1	2.9	2.5	3.4	95.1	13.6	12.9	12.1	12.6	12.6	13.8	12.1	12.4	12.3	2.0	-	4	-	-	-	-	853
65.6	661	2.82	26.7	61.3	2.5	2.3	3.3	96.0	13.5	13.0	13.1	13.3	13.5	13.0	13.1	12.8	13.1	2.8	2	2	-	-	-	-	815
65.9	661	2.91	26.7	61.2	2.7	2.4	3.4	96.4	13.8	12.9	13.1	12.6	12.9	13.3	12.9	12.8	12.9	2.5	3	1	-	-	-	-	835
66.9	690	2.76	27.0	61.1	2.6	2.0	3.4	94.5	13.5	12.0	13.4	13.3	13.4	13.6	13.4	13.6	12.9	1.8	2	1	1	-	-	-	882
65.1	678	2.89	27.6	60.6	2.6	2.5	3.1	96.0	13.8	12.8	13.0	13.1	12.6	13.5	13.3	12.4	12.9	2.8	1	3	-	-	-	-	869
65.1	659	2.83	27.3	60.7	2.6	2.0	3.3	96.8	13.6	12.9	13.3	13.3	12.3	13.9	13.1	13.6	13.0	2.3	2	2	-	-	-	-	870
66.8	647	3.02	26.0	61.5	2.4	2.0	3.3	96.4	12.9	12.6	13.6	13.9	14.4	13.1	14.1	13.9	14.0	1.8	2	2	-	-	-	-	821
65.3	601	3.26	27.3	60.3	2.9	2.7	3.2	96.3	13.8	13.0	12.3	13.1	13.1	13.5	12.5	12.0	12.4	2.3	1	3	-	-	-	-	861
64.5	671	2.94	27.4	60.5	2.6	2.1	3.3	96.1	13.1	13.1	12.9	13.4	12.4	13.1	13.3	13.5	12.9	2.5	3	1	-	-	-	-	879
66.6	681	2.93	25.5	62.5	2.5	2.1	3.4	95.4	13.5	12.8	13.3	13.6	13.3	13.4	13.6	13.9	13.6	1.8	2	2	-	-	-	-	880
64.0	570	3.07	27.7	60.3	2.3	1.6	3.2	92.8	13.0	12.5	14.5	13.5	13.8	13.3	14.7	13.8	13.5	2.0	3	-	-	-	-	-	800
63.0	636	2.96	28.3	59.6	2.4	2.1	3.2	97.8	13.6	12.8	13.3	13.1	11.9	13.5	13.5	13.4	13.0	2.5	3	1	-	-	-	-	824
64.3	647	2.85	28.1	59.9	2.5	1.7	3.2	97.3	13.4	13.0	13.3	12.8	13.4	13.5	13.8	14.0	13.6	2.5	2	2	-	-	-	-	829
65.8	686	2.78	26.8	61.4	2.5	1.9	3.1	93.9	13.4	13.0	13.6	12.8	14.0	13.3	13.8	13.8	13.4	1.8	2	2	-	-	-	-	854
65.3	670	3.07	26.8	61.6	2.8	2.3	3.6	97.0	13.3	12.6	12.6	12.4	12.9	13.9	12.6	12.8	12.8	2.8	1	3	-	-	-	-	874
67.4	621	3.07	24.7	62.5	2.7	2.1	3.3	96.8	13.5	12.6	13.1	13.0	13.8	13.4	13.1	13.3	13.1	1.5	2	2	-	-	-	-	846
64.8	624	3.14	27.1	60.4	2.5	2.4	3.2	95.3	13.1	13.0	13.1	12.9	12.3	13.0	13.5	13.4	12.9	2.5	1	3	-	-	-	-	850
66.6	646	3.08	26.0	61.3	2.6	2.4	3.3	95.1	13.4	13.3	13.4	12.8	13.3	13.5	13.3	13.0	13.4	2.5	2	2	-	-	-	-	851
65.8	658	2.96	27.3	60.4	2.5	2.1	3.2	95.9	13.4	12.9	13.8	13.6	12.6	13.1	13.8	13.5	13.4	1.8	2	2	-	-	-	-	877
65.8	653	2.98	26.9	60.4	2.7	1.9	3.3	95.0	13.0	12.6	13.1	13.4	13.6	13.4	13.4	13.8	12.9	2.0	1	3	-	-	-	-	878
65.5	671	2.86	26.7	60.6	2.4	2.0	3.3	97.9	13.5	12.9	14.0	13.5	13.8	13.5	14.0	13.4	13.6	3.0	3	1	-	-	-	-	903
66.5	727	2.76	26.8	60.9	2.6	2.1	3.3	97.6	12.9	13.3	13.6	13.1	13.8	13.3	13.8	13.5	13.8	2.0	3	1	-	-	-	-	898
66.4	659	2.99	25.8	62.0	2.7	2.1	3.4	96.5	13.3	13.5	13.1	13.3	14.3	12.8	13.6	13.5	13.5	2.3	2	2	-	-	-	-	920
66.0	706	2.91	26.8	61.6	2.8	2.4	3.4	96.6	13.6	12.9	13.0	13.4	12.9	13.4	13.1	12.6	13.1	1.3	1	3	-	-	-	-	899
67.0	699	2.94	25.1	62.5	2.7	2.4	3.6	95.4	13.5	12.6	12.4	12.1	13.4	13.6	12.5	12.8	12.4	2.3	1	3	-	-	-	-	919
65.8	632	2.93	26.5	61.5	2.5	2.0	3.2	98.9	13.1	13.0	13.3	13.1	13.6	12.8	13.8	13.8	13.0	2.8	2	2	-	-	-	-	833
65.0	641	3.11	27.6	60.0	2.6	2.4	3.4	96.8	13.1	12.9	13.0	12.5	12.3	13.3	13.0	12.4	12.6	3.0	1	3	-	-	-	-	834
64.8	660	2.98	27.8	59.5	2.6	2.2	3.2	98.1	13.5	12.8	13.1	13.1	12.5	13.4	13.4	13.5	13.0	2.8	2	2	-	-	-	-	860
64.0	691	2.83	28.4	58.9	2.3	1.6	3.1	96.4	13.3	12.9	14.4	13.0	13.6	13.0	14.5	14.6	14.0	1.8	4	-	-	-	-	-	864
63.8	641	3.04	28.8	58.8	2.8	2.1	3.0	97.6	13.8	13.0	12.9	12.3	12.5	13.4	12.9	13.3	13.1	2.5	1	3	-	-	-	-	870
64.5	705	2.74	27.7	60.0	2.6	1.9	3.2	95.6	13.4	12.6	13.1	13.1	12.8	12.8	13.5	14.0	13.1	2.8	1	3	-	-	-	-	831
65.9	687	2.85	27.4	60.3	2.5	2.0	3.3	97.8	13.5	13.1	13.4	12.9	12.9	13.0	13.3	13.3	13.1	2.3	2	2	-	-	-	-	874
64.3	715	2.68	27.8	60.0	2.5	1.9	3.3	97.1	13.1	13.3	13.4	13.6	13.4	12.9	13.6	13.8	13.5	2.0	2	2	-	-	-	-	893
66.6	654	2.99	26.5	61.2	2.5	2.0	3.3	97.6	13.8	13.3	13.4	13.0	14.0	13.4	13.8	13.5	13.6	2.0	2	2	-	-	-	-	828
66.4	644	3.08	26.4	61.1	3.2	2.9	3.3	94.4	14.4	12.4	11.1	12.8	11.0	14.4	10.9	11.5	10.9	2.3	-	1	3	-	-	-	829
67.4	664	2.90	25.9	61.3	2.5	2.2	3.3	98.4	13.6	12.6	13.3	13.1	12.9	13.3	13.5	13.3	13.3	2.5	1	3	-	-	-	-	882

S. Sjælland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.92

J. Jylland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.92

F. Fyn:

F.e.pr.kg.tilv. 3.00

V. Vestjylland:

F.e.pr.kg.tilv. 2.82

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise			Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 00. lev. vægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede			
							galte søer	galte søer		
Thorsø	J	876	7-1-63	Knægt, 1-3-62	64, 5-2-62	2	2	2	84	191
do	J	905	27-2-63	Gran, 17-6-60	66, 22-11-61	2	2	2	73	178
do	J	906	26-2-63	do	53, 3-4-61	2	2	1	73	178
Thorup Østergaard	J	867	2-1-63	Hans, 19-1-59	2, 8-2-60	2	2	2	80	183
do	J	902	3-2-63	do	3, 31-3-60	2	2	2	94	198
do	J	868	5-1-63	Aagaard Øst, 6-3-61	16, 20-1-62	2	2	2	87	196
do	J	875	26-12-62	do	13, 18-11-61	1	3	1	101	205
Tilsted	V	811	11-11-62	Per, 12-1-62	36, 7-11-61	2	2	2	94	197
Tjørnehoved	S	887	9-1-63	Knop, 25-1-61	13, 3-8-61	2	2	2	74	174
do	S	934	11-2-63	do	15, 10-1-62	2	2	2	80	181
Tolstrup	S	865	29-12-62	Gress, 18-5-61	12, 7-2-60	2	2	2	67	171
do	V	896	7-2-63	Hejding, 13-5-60	13, 13-4-60	2	2	2	80	182
Torkilstrup	S	863	30-12-62	Laos, 7-6-60	92, 25-3-61	2	2	2	68	170
do	S	894	14-1-63	do	97, 26-1-62	2	2	2	75	177
do	S	901	25-1-63	do	95, 3-8-61	2	2	2	73	171
do	S	902	1-2-63	do	98, 5-2-62	2	2	1	66	168
Tornby	J	843	10-12-62	Nordlys, 20-9-61	70, 18-7-61	2	2	2	76	186
Tornbygaard	S	932	15-2-63	Vimmer, 29-7-61	79, 4-4-61	2	2	2	69	175
Ullerslev	F	816	8-12-62	Nr.15 Diplomat, 25-11-61	4, 8-1-62	2	2	2	74	186
do	F	827	12-12-62	do	6, 8-1-62	2	2	2	84	196
do	F	828	20-12-62	do	8, 3-11-61	2	2	2	75	183
do	F	831	17-12-62	do	7, 8-1-62	2	2	1	77	188
Ungstrup	J	857	20-12-62	Brask, 21-11-60	52, 1-6-61	2	2	2	84	189
Vebbestrup	J	838	2-12-62	Ball, 17-11-61	63, 11-3-61	2	2	2	85	193
do	J	839	5-12-62	do	61, 11-3-61	2	2	2	82	191
Velling	V	850	11-1-63	Perry, 27-8-61	29, 22-6-61	2	2	2	74	186
Vemmelev Præstemark	S	857	10-12-62	Getty, 6-12-61	56, 1-8-60	2	2	2	81	184
do	S	884	4-1-63	do	54, 16-3-60	2	2	2	78	182
Vesterballegaard	F	819	3-12-62	Nr.100 Storm, 28-8-59	34, 23-12-60	2	2	2	74	180
do	F	820	4-12-62	Nr.30 Jan, 5-8-61	33, 23-12-60	2	2	2	75	182
do	F	826	17-12-62	do	29, 28-10-60	2	2	2	75	180
do	F	865	17-1-63	do	39, 27-11-61	2	2	2	75	178
Vestergaard	S	849	25-11-62	Ib, 26-7-60	21, 3-7-61	2	2	2	89	185
Vester Holmen	J	835	8-12-62	Haab, 1-12-59	18, 23-7-61	2	2	2	85	192
Vester Kjeldgaard	J	840	9-12-62	Tøk, 6-2-62	95, 9-12-61	2	2	2	88	191
Vestermarks Mølle	J	837	29-11-62	Tot, 27-1-61	37, 6-12-61	2	2	2	94	205
Viirmandsgaard	S	873	27-12-62	Glen, 2-9-61	66, 8-10-61	2	2	2	70	172
do	S	933	7-2-63	do	49, 14-2-61	2	2	2	76	181

I gennemsnit																				Kødfarve, 0-5 points				Klasse			
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af										AI					A	B	C	Hold-nr.
			pct. svind	pct. eksportfl.	ryglæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	ryglæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink, form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	kødfylde		type										
															hel	overskåret											
67.0	656	2.92	25.3	62.3	2.6	2.2	3.4	97.8	13.4	12.8	13.3	13.0	13.0	13.0	13.3	13.4	13.3	2.3	2	2	-	-	876				
65.3	666	2.96	27.4	60.5	2.6	2.1	3.4	97.6	13.8	12.6	13.1	13.0	12.8	13.4	13.1	13.1	13.3	2.3	2	2	-	-	905				
65.5	672	2.89	26.3	60.6	2.7	2.2	3.4	96.3	13.3	12.5	12.8	13.7	13.0	13.2	12.8	13.5	13.2	2.5	1	2	-	-	906				
66.6	685	2.78	26.1	61.7	2.7	1.9	3.2	95.9	13.5	12.3	12.5	13.1	14.3	13.5	13.1	14.1	13.4	2.3	1	3	-	-	867				
65.0	680	2.89	27.8	60.0	2.8	2.2	3.3	97.5	13.7	13.0	12.5	13.3	13.5	13.7	12.7	13.5	13.2	2.5	-	3	-	-	902				
65.3	646	3.01	27.7	59.6	2.8	2.4	3.2	95.8	13.8	12.5	12.8	13.4	12.9	13.6	13.0	12.8	12.6	2.0	1	3	-	-	868				
65.0	674	2.87	27.4	60.2	2.7	2.1	3.3	95.9	13.6	12.6	13.1	13.0	12.9	13.1	13.1	13.0	13.0	2.5	2	2	-	-	875				
66.3	681	2.86	27.0	60.9	2.7	2.3	3.3	98.1	13.4	12.9	13.1	12.9	12.8	13.0	13.1	13.0	13.3	2.5	1	3	-	-	811				
65.1	698	2.85	27.2	60.8	2.7	2.1	3.3	99.1	13.6	12.9	12.9	13.1	13.1	13.1	13.1	13.4	13.1	2.5	1	3	-	-	887				
67.4	688	2.97	25.2	62.3	2.7	1.9	3.3	98.0	13.8	12.8	12.8	13.1	13.5	13.3	13.3	13.8	13.4	2.5	1	3	-	-	934				
64.8	673	3.02	26.8	61.2	2.5	2.0	3.4	95.9	13.8	12.6	13.4	13.6	13.8	13.5	14.0	13.6	13.9	2.0	2	2	-	-	865				
66.3	690	2.89	27.0	60.5	3.0	2.8	3.4	95.1	14.0	12.8	11.8	12.9	13.0	14.1	12.1	12.1	12.1	2.5	-	3	1	-	-	896			
65.3	684	2.93	26.4	61.2	2.6	2.0	3.4	94.4	13.8	12.8	13.0	12.9	13.6	13.4	13.4	13.8	13.4	2.0	2	2	-	-	863				
64.3	688	2.94	27.4	60.6	2.4	1.9	3.3	96.0	13.8	13.3	14.0	13.1	13.6	13.5	14.0	14.1	14.0	2.5	2	2	-	-	894				
64.5	707	2.83	27.3	60.3	2.6	2.2	3.3	96.6	13.8	13.3	13.1	13.3	13.8	13.4	13.6	13.3	13.6	2.5	3	1	-	-	901				
63.8	685	3.00	28.3	59.6	2.6	2.2	3.3	99.5	13.8	13.3	13.2	12.8	12.7	13.5	13.2	13.0	13.0	2.5	2	1	-	-	902				
66.5	635	3.07	26.6	61.4	2.7	2.3	3.3	98.0	14.1	12.6	12.3	13.1	13.3	13.9	13.0	12.9	12.9	1.5	1	2	1	-	-	843			
65.5	660	3.11	27.4	60.4	2.5	2.4	3.4	95.1	13.6	12.6	13.6	12.9	12.4	13.3	13.5	12.6	12.9	2.8	3	1	-	-	932				
64.5	626	3.14	28.3	59.8	2.7	2.2	3.3	94.8	14.3	12.9	12.6	13.4	12.9	13.8	13.1	13.1	13.1	2.5	1	2	1	-	-	816			
63.4	625	3.23	28.4	59.5	2.9	2.6	3.2	96.1	13.6	12.8	12.3	13.0	12.3	13.6	12.3	12.3	12.4	2.5	-	4	-	-	-	827			
65.9	648	3.12	27.6	59.8	2.4	2.1	3.2	96.8	13.4	13.4	13.5	13.4	13.5	13.0	13.8	13.3	13.6	2.5	2	2	-	-	828				
64.2	634	3.15	27.8	59.8	2.9	2.4	3.1	96.3	13.7	12.8	12.5	12.8	13.3	13.5	12.5	12.8	12.5	2.5	-	3	-	-	-	831			
65.0	666	2.80	26.7	60.6	2.2	2.0	3.2	98.1	13.3	13.0	14.5	13.1	13.0	13.4	14.4	13.6	13.6	2.5	4	-	-	-	-	857			
67.0	654	2.89	25.9	61.9	2.6	2.2	3.5	97.0	13.8	12.8	13.4	12.8	13.4	13.4	13.1	13.5	13.4	2.5	2	2	-	-	838				
67.5	647	2.92	25.6	62.3	2.7	2.3	3.5	96.0	13.6	12.5	13.1	12.6	13.9	13.5	13.1	12.9	13.0	2.3	2	2	-	-	839				
63.4	628	2.79	28.1	59.9	2.5	2.4	3.3	96.4	13.4	13.4	13.8	13.3	12.5	13.3	13.8	12.9	13.3	2.5	3	1	-	-	850				
68.3	684	3.05	25.2	62.4	2.4	2.3	3.5	97.3	14.0	12.8	13.3	13.3	13.8	13.3	13.7	12.8	13.2	2.3	2	1 ¹	-	-	857				
65.3	672	3.05	26.5	61.1	2.7	2.3	3.2	98.9	13.6	12.9	13.0	12.9	12.5	12.9	13.0	13.0	12.6	3.0	1	3	-	-	884				
66.3	653	2.94	26.7	60.6	2.6	1.9	3.4	95.6	12.9	12.8	13.4	12.6	13.4	12.9	13.5	13.9	13.1	2.3	3	1	-	-	819				
65.8	653	3.01	26.3	61.1	2.6	2.0	3.4	95.9	13.8	13.1	13.1	12.4	13.3	13.1	13.4	13.9	13.4	1.8	2	2	-	-	820				
66.3	670	2.98	25.6	61.6	2.3	1.9	3.4	95.3	12.9	12.4	13.8	13.4	13.5	13.3	14.3	14.0	13.8	1.8	4	-	-	-	826				
65.6	687	2.93	27.0	60.4	2.6	2.2	3.3	96.1	13.1	12.4	13.1	13.0	12.6	13.3	13.3	13.6	13.1	1.0	2	2	-	-	865				
65.3	722	2.83	26.6	61.2	2.5	1.9	3.3	96.8	13.5	12.6	13.3	13.0	13.0	13.5	13.5	13.9	13.5	1.8	3	1	-	-	849				
65.9	652	3.03	26.9	60.5	2.9	2.6	3.3	98.5	14.1	12.3	11.9	12.9	13.1	13.3	12.1	12.4	12.4	2.5	1	3	-	-	835				
66.1	679	2.84	26.9	61.1	2.5	1.8	3.1	96.5	13.5	13.1	13.8	13.4	13.9	13.6	14.0	14.3	14.1	2.5	3	1	-	-	840				
64.4	636	3.02	27.3	60.3	2.7	2.3	3.4	99.6	14.0	12.9	12.8	13.4	12.6	13.3	13.1	12.5	12.9	2.5	2	2 ¹	-	-	837				
65.3	689	2.93	27.3	60.3	2.7	2.2	3.3	95.3	13.5	12.6	12.9	13.3	12.1	13.4	12.9	13.3	12.8	2.5	-	4	-	-	873				
65.3	668	3.09	26.8	60.6	2.9	2.5	3.4	97.4	14.5	12.6	12.3	12.9	11.5	14.1	12.3	12.3	12.3	2.8	1	3	-	-	933				

S. Sjælland: F.e.pr.kg.tilv. 2.92
F. Fyn: F.e.pr.kg.tilv. 3.00

J. Jylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.92
V. Vestjylland: F.e.pr.kg.tilv. 2.82

Center	Forsøgsstation	Holdets				Antal grise				Ald. i dg. v. 20 kg lev. vægt	Alder i dage ved 90 kg lev. vægt
		nr.	fødsels-dato	fader	moder	modtaget	slagtede				
							galte	søer	galte		
Viirmandsgaard do	S 904	20-1-63	Neptun, 27-1-62	68, 2-1-62 70, 5-2-62	2	2	2	2	73	175	
	S 922	2-2-63	Mars, 1-3-62		2	2	2	2	76	180	
Vinding	V 821	5-11-62	Duxen, 18-10-61	95, 27-9-61	2	2	2	2	95	204	
Vinholtgaard do do	S 897	5-1-63	Labri, 5-9-61	43, 17-4-61	2	2	2	2	95	190	
	S 909	15-1-63	do	41, 8-1-61	2	2	2	1	86	188	
	S 923	12-1-63	do	38, 8-1-61	2	2	2	2	99	199	
Vinstrupgaard	J 854	16-12-62	Es, 19-1-62	74, 10-11-61	2	2	2	2	82	193	
Vorbasse do	F 814	30-11-62	Roar, 3-9-61	22, 19-12-60	2	2	2	1	69	180	
	V 865	12-1-63	do	31, 2-2-62	2	2	2	2	93	189	
Vroue Toftgaard do do	J 826	17-11-62	Juvel 29-7-61	67, 22-7-60	2	2	2	2	91	202	
	J 842	28-11-62	do	71, 26-12-61	2	2	2	1	99	211	
	J 851	11-12-62	do	63, 3-8-59	2	2	2	2	85	188	
Ølholm	F 876	23-1-63	Aspirant, 1-2-61	4, 29-6-60	2	2	2	2	76	189	
Øse	V 841	1-1-63	Santos, 15-11-61	44, 30-5-61	2	2	2	2	79	181	
Gns. af 355 hold										79	184
Sjælland gns. af 98 hold										78	179
Fyn - - 89 -										75	183
Jylland - - 85 -										80	186
Vestjylland - - 83 -										84	187

Bemærkninger 4. kvartal 52. beretning

Sjælland.

- 847 1 galtgris havde nysesyge
857 1 galtgris, 592 g dgl.tilv. og 3.28 f.e.pr.kg.tilv. syg på forsøgsstationen af lungebetændelse. Ikke medregnet i gennemsnittet.
868 1 galtgris havde nysesyge.
872 1 sogris, 627 g dgl.tilv. og 2.98 f.e.pr.kg.tilv. syg på forsøgsstationen af lungebetændelse. Ikke medregnet i gennemsnittet.
886 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. ledskred. Alder 182 dage, v. 74,0 kg.
890 1 galtgris og 1 sogris havde nysesyge.
896 1 galtgris havde nysesyge.
902 1 sogris død af tarmsprængning. Alder 142 dage, v. 54,0 kg.
906 1 galtgris død som følge af hjertefejl. Alder 157 dage, v. 47,0 kg.

I gennemsnit																		Kødfarve, 0-5 points		Klasse				Hold-nr.
Kold slagtevægt	Daglig tilvækst i g	F. e. pr. kg tilvækst	Ved slagtning		Tykkelse i cm			Længde af krop i cm	Points (0-15) ved bedømmelse af															
			pct. svind	pct. eksportfl.	rygflæsk	sidespækmål	bug		flæskets fasthed	bov	rygflæskets fordeling	bugens tykkelse og kvalitet	skink. form og størrelse	finh. af hoved, ben og svær	hæl	overskåret	type							
66.5	692	2.91	26.3	61.9	2.8	2.6	3.5	97.1	14.0	12.6	12.4	12.5	13.4	13.3	12.8	12.1	12.6	1.3	1	3	-	-	904	
66.1	670	3.06	26.2	61.4	2.6	2.1	3.3	98.4	13.6	12.8	13.0	13.3	12.9	13.1	13.3	12.9	13.0	2.5	1	3	-	-	922	
66.0	644	2.91	26.6	60.9	2.6	2.1	3.4	95.9	13.1	13.3	13.8	12.6	12.1	13.4	13.3	13.4	12.8	2.8	2	2	-	-	821	
65.6	737	2.74	27.5	60.5	2.8	2.6	3.3	97.4	14.4	12.4	11.9	13.3	13.6	13.5	12.5	12.5	12.5	2.0	1	3 ¹	-	-	897	
69.0	691	2.95	24.5	63.1	3.0	3.0	3.7	97.8	14.7	12.2	11.5	11.3	13.3	13.8	11.3	10.3	10.8	2.0	1	1	1	-	909	
66.8	700	2.87	26.0	61.5	3.0	2.9	3.5	96.1	14.8	12.6	11.1	12.3	12.9	13.6	11.6	11.3	11.3	1.8	-	3	1	-	923	
66.0	625	3.03	26.7	60.9	2.6	2.5	3.4	97.8	13.7	13.0	12.7	12.5	12.7	13.2	12.7	12.3	12.3	2.5	1	2	-	-	854	
65.5	634	3.13	27.7	59.6	2.3	1.8	3.1	98.0	13.3	13.2	14.0	13.0	12.8	13.2	14.2	14.0	13.7	1.5	3	-	-	-	814	
67.0	729	2.74	27.3	61.0	2.6	2.0	3.4	96.6	13.6	13.0	13.6	12.9	13.3	13.5	13.4	13.5	13.4	1.8	3	1	-	-	865	
67.3	637	3.08	26.0	61.1	2.9	2.9	3.4	96.9	14.1	12.6	12.5	12.9	12.5	13.6	12.6	11.4	12.0	2.5	1	2 ¹	1	-	826	
66.2	624	3.00	26.3	61.4	2.9	2.8	3.3	95.2	13.7	12.3	12.2	13.2	12.7	13.5	12.3	12.2	12.3	3.0	-	3 ¹	-	-	842	
64.4	681	2.83	27.2	60.5	2.7	2.4	3.3	97.1	13.8	12.8	12.8	13.6	12.8	13.6	12.9	12.9	12.9	2.0	1	3 ¹	-	-	851	
65.0	618	3.11	26.3	60.8	3.1	2.6	3.4	96.4	13.8	12.3	12.0	12.8	12.6	13.9	12.1	12.0	12.1	2.5	-	3	1	-	876	
63.5	682	2.73	27.8	60.4	2.5	2.2	3.3	93.8	13.4	13.0	13.8	13.3	13.8	13.4	13.6	12.9	13.4	1.5	2	2	-	-	841	
65.6	672	2.92	27.0	60.7	2.62	2.21	3.31	96.6	13.6	12.8	13.1	13.1	13.1	13.4	13.3	13.2	13.1	2.19	%	%	%	%		
																			48	49	3	0.1		
65.6	692	2.92	26.7	61.0	2.65	2.27	3.36	96.9	13.7	12.8	13.0	13.1	13.1	13.4	13.1	13.0	13.0	2.14	44	53	3	0.5		
65.5	653	3.00	27.0	60.5	2.60	2.14	3.26	96.2	13.4	12.7	13.3	13.0	13.1	13.3	13.4	13.4	13.1	2.08	51	46	3	-		
65.6	662	2.92	27.0	60.6	2.62	2.20	3.32	97.1	13.6	12.8	13.1	13.1	13.1	13.4	13.2	13.2	13.1	2.34	47	51	2	-		
65.6	677	2.82	27.1	60.8	2.60	2.19	3.30	96.1	13.6	12.9	13.3	13.1	13.1	13.5	13.3	13.2	13.1	2.23	51	46	3	-		

- 909 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. lungebetændelse. Alder 224 dage, v. 84.0 kg.
 924 1 galtgris død af tarmbetændelse. Alder 69 dage, v. 25.0 kg.
 928 1 sogris havde nysesyge.
 943 1 galtgris havde nysesyge.

OPLØSTE HOLD

Hold nr.	Center	Bemærkninger
910	Ellede Toftegaard	1 galtgris udsat af holdet p.gr.a. ledbetændelse. Alder 185 dage, v. 62.0 1 sogris, 537 g dgl.tilv. og 3,41 f.e.pr.kg.tilv. utrivelig på forsøgsstationen.

Fyn.

- 794 1 sogris død af bughindebetændelse. Alder 154 dage, v. 44.0 kg.
 812 1 sogris havde nysesyge.
 814 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. hjertelidelse. Alder 187 dage, v. 70.0 kg.
 1 galtgris havde nysesyge.
 817 1 sogris død af tarmbetændelse. Alder 132 dage, v. 43.0 kg.
 823 1 galtgris havde nysesyge.
 831 1 utrivelig sogris udsat af holdet. Alder 191 dage, v. 75,0 kg.
 1 sogris havde nysesyge.
 832 1 galtgris og 1 sogris havde nysesyge.
 833 2 galtgrise og 1 sogris havde nysesyge.
 844 1 sogris havde nysesyge.
 845 1 galtgris og 1 sogris havde nysesyge.
 848 1 galtgris og 1 sogris havde nysesyge.
 861 2 galtgrise og 2 sogris havde nysesyge.
 862 1 galtgris havde nysesyge.
 863 1 galtgris havde nysesyge.
 865 1 galtgris havde nysesyge.
 876 1 sogris havde nysesyge.
 877 1 galtgris havde nysesyge.
 885 1 sogris havde nysesyge.
 890 1 galtgris havde nysesyge.
 895 1 sogris havde nysesyge.
 896 1 sogris havde nysesyge.

OPLØSTE HOLD

Hold nr.	Center	Bemærkninger
866	Honum	1 galtgris død af tarmslyng. Alder 153 dage, v. 65.0 kg. 1 sogris død af hjertelammelse. Alder 125 dage, v. 45.0 kg.

Jylland.

- 822 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. benbrud. Alder 190 dage, v. 70.0 kg.
 823 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. hjertesækbetændelse. Alder 164 dage, v. 56.0 kg.
 833 1 galtgris havde nysesyge.
 837 2 sogris havde nysesyge.
 840 2 sogris havde nysesyge.
 841 1 galtgris, 505 g dgl.tilv. og 3.28 f.e.pr.kg.tilv. syg på forsøgsstationen af lungehindebetændelse. Ikke medregnet i gennemsnittet.
 842 1 sogris udsat af holdet p.gr.a. lungebetændelse. Alder 161 dage, v. 30.0 kg.
 854 1 sogris, 505 g dgl.tilv. og 3.39 f.e.pr.kg.tilv. syg på forsøgsstationen af kronisk ledbetændelse. Ikke medregnet i gennemsnittet.
 1 galtgris og 1 sogris havde nysesyge.
 861 1 sogris havde nysesyge.
 870 1 galtgris havde nysesyge.
 902 1 sogris død som følge af kronisk nyrebetændelse. Alder 119 dage, v. 20.0 kg.
 906 1 galtgris udsat af holdet p.gr.a. bughindebetændelse. Alder 128 dage, v. 32.0 kg.

Vestjylland.

- 800 1 galtgris, 497 g dgl.tilv. og 3.67 f.e.pr.kg.tilv. syg på forsøgsstationen af bylder i lunge og brysthinde. Ikke medregnet i gennemsnittet.
- 808 1 sogris, 527 g dgl.tilv. og 3.41 f.e.pr.kg.tilv. utrivelig på forsøgsstationen p.gr.a. lårbensbrud. Ikke medregnet i gennemsnittet.
- 821 1 sogris havde nysesygge.
- 823 1 sogris havde nysesygge.
- 825 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge
- 826 1 galtgris havde nysesygge.
- 828 1 galtgris havde nysesygge
- 831 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
- 833 1 galtgris havde nysesygge.
- 834 1 galtgris og 2 sogrise havde nysesygge.
- 841 1 sogris havde nysesygge.
- 842 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
- 846 1 galtgris og 2 sogrise havde nysesygge.
- 847 1 sogris havde nysesygge.
- 864 1 galtgris havde nysesygge.
- 866 1 galtgris og 2 sogrise havde nysesygge.
- 871 1 galtgris havde nysesygge.
- 876 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
- 877 1 galtgris og 1 sogris havde nysesygge.
- 878 1 galtgris havde nysesygge.
- 879 1 galtgris havde nysesygge,
- 881 2 galtgrise og 1 sogris havde nysesygge.
- 884 1 galtgris havde nysesygge.
- 896 1 galtgris og 2 sogrise havde nysesygge.

OPLØSTE HOLD

Hold nr.	Center	Bemærkninger
840	Øse	1 sogris udsat af holdet p.gr.a. lårbensbrud. Alder 234 dage, v.83.0 kg. 1 sogris død af lungebetændelse. Alder 123 dage, v. 26.0 kg.

Tidligere udsendte beretninger fra forsøgslaboratoriet om sammenlignende forsøg med svin af forskellig afstamning.

1908.	64.	ber.	Sammenlignende Forsøg med Svin af forsk. Afstamning (2 kr.)		
1909.	67.	- 1ste ber.	(1 kr.)	1939.	185. ber. 27nde ber. (1.50 kr.)
1911.	75.	- 2den	- (Udsolgt)	1940.	190. - 28nde - (1.50 kr.)
1912.	79.	- 3die	- (1.50 kr.)	1941.	194. - 29nde - (1.50 kr.)
1912.	80.	- 4de	- (50 øre)	1942.	201. - 30te - (Udsolgt)
1914.	85.	- 5te	- (50 øre)	1943.	205. - 31te - (1.50 kr.)
1914.	87.	- 6te	- (50 øre)	1944.	212. - 32te - (1.50 kr.)
1915.	90.	- 7ende	- (50 øre)	1945.	217. - 33te - (1.50 kr.)
1917.	93.	- 8nde	- (50 øre)	1946.	222. - 34te - (1.50 kr.)
1918.	98.	- 9ende	- (50 øre)	1947.	224. - 35te - (1.50 kr.)
1922.	109.	- 10ende	- (Udsolgt)	1948.	233. - 36te - (1.50 kr.)
1923.	110.	- 11te	- (Udsolgt)	1949.	242. - 37te - (1.50 kr.)
1923.	114.	- 12te	- (Udsolgt)	1950.	248. - 38te - (1.50 kr.)
1924.	117.	- 13de	- (Udsolgt)	1951.	256. - 39te - (1.50 kr.)
1926.	122.	- 14de	- (Udsolgt)	1953.	267. - 40nde og
1927.	124.	- 15de	- (Udsolgt)		41nde - (3.00 kr.)
1928.	127.	- 16de	- (Udsolgt)	1954.	273. - 42nde - (3.00 kr.)
1929.	130.	- 17de	- (Udsolgt)	1955.	277. - 43nde - (3.00 kr.)
1930.	133.	- 18de	- (Udsolgt)	1956.	288. - 44nde - (3.00 kr.)
1931.	139.	- 19de	- (1.50 kr.)	1957.	296. - 45nde - (3.00 kr.)
1932.	145.	- 20nde	- (1.50 kr.)	1958.	304. - 46nde - (3.00 kr.)
1933.	150.	- 21nde	- (1.50 kr.)	1959.	312. - 47nde - (3.00 kr.)
1934.	157.	- 22nde	- (1.50 kr.)	1960.	317. - 48nde - (3.00 kr.)
1935.	164.	- 23nde	- (1.50 kr.)	1961.	327. - 49nde - (3.00 kr.)
1936.	169.	- 24nde	- (1.50 kr.)	1962.	331. - 50nde - (3.00 kr.)
1937.	175.	- 25nde	- (1.50 kr.)	1963.	336. - 51nde - (3.00 kr.)
1938.	179.	- 26nde	- (1.50 kr.)	1964.	344. - 52nde - (3.00 kr.)

Endvidere udsendes kvartårlige "Foreløbige meddelelser fra svineforsøgsstationerne", hvori i tabellarisk form findes angivet de foreløbige resultater af de sammenlignende forsøg med svin fra de statsanerkendte avlscentre. Disse foreløbige meddelelser samt den hvert år udarbejdede udførlige beretning kan bestilles gennem postvæsenet under betegnelsen "Foreløbige meddelelser fra svineforsøgsstationerne" til en samlet pris af 4 kr. årlig.