361. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

Afkomsprøver med tyre

XXII

Ved

Ejner Nielsen, Axel Nielsen og Børge Vesth

With an English Summary

I kommission hos Landhusholdningsselskabets forlag,
Rolighedsvej 26, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1968

Bilag til beretning fra
Landøkonomisk Forsøgslaboratorium



Stamtræ over de i årene 1966–67 og 1967–68 afkomspr



vede tyre af Rød Dansk Malkerace (negativ skrift).

Bilag til beretning fra
Landøkonomisk Forsøgslaboratorium



Stamtræer over de i årene 1965–66 og 1966–67 afkoms



røvede tyre af Sortbroget Dansk Malkerace (negativ skrift).

Bilag til beretning fra
Landøkonomisk Forsøgslaboratorium



Stamtræer over de i årene 1965–66 og 1966–67 afkomsprøvede tyre af Jerseyrace (negativ skrift).

Forord.

Denne XXII. beretning i serien »Afkomsprøver med tyre« er udarbejdet efter samme retningslinier som XXI. beretning.

Omtalen af de enkelte hold er delt i to afsnit, hvoraf forsøgsleder Ejner Nielsen har skrevet det første, som vedrører ydelse, malkbarhed og andre brugsmæssige egenskaber. Det andet afsnit indeholder beskrivelse af holdenes eksteriør. Eksteriørbedømmelserne er foretaget af landsdelsudvalg med stambogsførerne som sekretærer. Beskrivelserne er indsendt af konsulenterne Herluf Bruun, Århus, Harald Rasmussen, Århus, Jørg. Philipsen, Roskilde, og A. Wulff Pedersen, Odense.

Trivelighedsundersøgelserne med tyrekalve gennemføres i samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde ved forsøgslederne T. Wichmann Jørgensen og Jørgen Mandrup Jensen, som har medvirket ved det her henhørende afsnit af denne beretning.

Udover de anførte forfattere har afdelingens videnskabelige assistenter, H. F. Andersen, Sv. Aa. Hulgaard, J. Jørgensen, B. Bech Andersen, E. Ovesen, L. P. Gjøl Christensen og H. Kofoed Dam samt assistent Cathrine Petersen udført et stort arbejde i forbindelse med de omfattende revisions- og beregningsarbejder, der danner grundlaget for beretningens resultater.

København, november 1967.

A. Neimann-Sørensen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I. Afkomsprøverne 1945–67 7

II. Afkomsprøverne 1966–67 40

A. Tyrenes alder ved prøvens begyndelse 41

B. Afgangsårsagerne 42

C. Kælvetiden 43

D. Kviernes vægt 48

E. Kalvenes vægt 49

F. Drægtighedsforholdene 50

G. Fodringen 50
1. Fodringen før kælvningen 50
2. Vinterperioden 51
3. Sommerperioden 59

H. Ydelsen 60
1. Ydelsen for de forskellige racer 60
2. Højtydende kvier 61
3. Udholdenheden i ydelsen 61
4. Ydelsen i 250 dage 72
5. Spredningen 72

I. Malkbarhedsundersøgelserne 73

J. Vejning og måling 79

K. Forskellige undersøgelser 79
1. Kælvningsforløbet for afkomsprøvekvierne i 1966–67 88
2. Kælvningsbesvær og krydsmål 89

L. De enkelte tyre og deres afkomsprøvehold 90

1. Rød Ransk Malkerace:
Uwe 90
Skærup Munk 91
Horsens Bitz 92
Ålborg Børge 93
Dybbøl Holm 93
Skærup Bus 94
Skov 95
Randers Sortemose 96

Samsø Frej 96
Nordfyns Aman 97
Skive Rajs 98
Ringkøbing Holm 99
Åbenrå Øbo 99
Haslev Odin 100
Hjørring Eli 101
Skærup Karlby 102
Rødding Ursus 103
Ribe Aks 103
Hjørring Iver 104
Give Ask 105
Ribe Frem 106
Århus Hof 107
Centrums Prik 107
Rødding Frem 108
Holbæk Allaks 109
Bjørn Sydvest 110
Bakager Wahl 111
Kolding Pall 23 111
Varde Grøn 112
Horsens Gert 113
Vald Nordvest 114
Thy Skov 114
Erslev 115
Djurs Wahl 116
Hadsten Gert 117
Århus Ask 117
Ribe Klint 118
Varde Kry 119
Kolding Munk 143 120
Bøg 120

2. Sortbroget Dansk Malkerace:

Varde Stefan 121
Kolding Gordon 39 122
Egholm Gran 123
Sdj. Aksel 123
Ry 124
Skive Hal 125
Hjørring Domino 126
Sdj. Ark 127
Egholm Drost 127
Varde Diamant 128
Bjerringbro Basta 129
Swea 130
Sdj. Viktor 130
Randers Dijk 131
Thy Ponto 132
Hjørring Simon 133
Varde Alfa 133
Randers Drost 134
Hjørring Drost 135
Sdj. Trin 136
Herning Drost 136

3. Jerseyrace:
Bornholms Brygger 137
Fyns Glen 138
Årup Vestfyns Flink 139
Årup Vestfyns Boy 139
Fyns Ib 140
Hjørring Georg 141
Lund 142
Horsens Bak 142
Primus Syd 143
Åbenrå Vix 144
Randers Knægt 145
Dybbøl Hans 145
Morsø Bæk 146
Århus Max 147
Sydvestfyns Car 147
Randers Just 148

III. Trivelighedsundersøgelser med tyrekalve 150

A. Fodringen 150

B. Tilvækst og foderudnyttelse 151

C. Kalvenes kropsmål 155

D. Slagtekvalitetsundersøgelser 157
1. Slagtebedømmelsen 157
2. Opskæring efter handelsværdi 158
3. Slagteprocent samt procent kød, talg og knogler i slagtekroppen 159

E. Kødkvalitetsundersøgelser 160

F. Hovedresultater 162

G. Forsøg med blandsæd kontra kraftfoderblanding 162

IV. Sammendrag 165

V. Summary 167

VI. Hovedtabeller 169

VII. Oversigt over afkomsprøverne 1967–68 248

Tidligere udsendte beretninger om afkomsprøver med tyre 356

I. Afkomsprøverne 1945-67.

Afkomsprøverne med tyre er i de forløbne 22 år udført på 51 afkomsprøvestationer, og der har været afprøvet 1435 hold i alt.

Oversigt over afkomsprøvestationer og antal hold 1945–67.

Stationens navn	1945 /57	1957 /58	1958 /59	1959 /60	1960 /61	1961 /62	1962 /63	1963 /64	1964 /65	1965 /66	1966 /67	Antal år	Antal hold
Lægård	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	44
Samsø	11	–	1	1	–	1	1	1	1	1	1	18	19
Gyldenagergård	19	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	15	26
Kannikegård	12	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	19	27
Kalø	66	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	18	151
Dybvad	26	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	18	84
Krarup Nygård	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	32
Morsø	11	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	14	37
Vardegård	8	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	14	44
Sydsjælland	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14
Lundgård	15	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	13	57
Skølvad	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	13	52
Torntofte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11	22
Skovgård	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	40
Østerhåb	–	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	10	38
Gelballegård	–	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	30
Veesbæk	–	–	3	3	2	3	3	3	3	3	3	9	26
Enemærket	–	–	1	3	3	3	3	3	3	3	3	9	25
Bellinge	–	–	4	4	3	3	3	3	3	3	–	8	26
Brøstrupgård	–	–	–	4	4	4	4	4	4	4	4	8	32
Ejstrupgård	–	–	–	3	3	3	3	3	3	3	3	8	24
Grønhøjgård	–	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2	8	16
Rosenfeldt	–	–	–	–	–	3	3	3	3	3	3	6	18
Elkjær	–	–	–	–	–	–	3	3	3	3	3	5	15
Moesgård	–	–	–	–	–	–	3	3	3	3	3	5	15
Kronborg	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	4	8
Nedlagte stationer	326	56	40	30	26	20	7	5	3	–	–	–	513
Antal stationer	–	33	34	34	31	30	28	28	27	26	25		
Antal hold	547	102	96	99	93	91	83	83	83	81	77		1435
kg smørfedt	–	214	223	223	208	217	214	216	224	227	229		
kg smør	–	240	251	251	235	244	241	243	252	255	258		

Lægård er den eneste station, som har været med i alle 22 år. Af de 1435 hold er de 513 afprøvet på stationer, som er nedlagt før prøveåret 1966–67. Bellinge var ikke i funktion i prøveåret 1966–67, men i efteråret


Mælk
kg
5000
4000
3000
2000
1000
0
RDM
SDM
Jersey
1945/46
1950/51
1955/56
1960/61
1965/66


Fedt %
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0
1945/46
1950/51
1955/56
1960/61
1965/66
Jersey
RDM
SDM


Smørfedt
kg
240
200
160
120
80
40
0
Jersey
RDM
SDM
1945/46
1950/51
1955/56
1960/61
1965/66

Protein %



Mælkeprotein kg



1967 blev der igen indsat hold på Bellinge. Der afprøvedes 77 hold i prøveåret 1966–67.

Nederst i oversigtstabellen findes den gennemsnitlige ydelse af smørfedt og smør for de sidste 10 år. I de første år var der en stigning i ydelsen, som kulminerede i 1958–60, men prøveårene 1958–59 og 1959–60 var også de to sidste år, hvor der blev malket 3 gange daglig i vinterperioden. I 1960–61 blev ydelsen lavere end de foregående år på grund af overgangen til 2 gange daglig malkning i hele prøveåret, men den steg noget i prøveåret 1961–62, og den var på samme niveau i de to følgende prøveår, selv om den ændrede gerbereringsmetode, som indførtes i efteråret 1962, virkede nedsættende på fedtprocenten. I prøveåret 1964–65 opnåedes en højere ydelse end i de foregående år, og i prøveåret 1965–66 blev ydelsen endnu højere, og i prøveåret 1966–67 sattes rekord med en gennemsnitlig ydelse på 229 kg smørfedt og 258 kg smør.

Fordelingen af holdene på de enkelte racer er følgende:

RDM	940 hold	65,5%
SDM	293 »	20,4%
Jerseyrace	196 »	13,7%
DRK	6 »	0,4%
I alt	1435 hold	100,0%

Der er vedlagt stamtræer for RDM, SDM og Jerseyracen. For RDM er de tyre, som blev afprøvet i 1966–67, og de, som afprøves i 1967–68, anført med negativ skrift, hvorimod de tyre, som er med til at føre linien tilbage til stammen og tillige er afkomsprøvet, er anført med kursiv. Stamfædrene er anført med fed type, medens der er anvendt almindelige typer til de øvrige tyrenavne. For SDM og Jerseyracen er anvendt samme fremgangsmåde, dog er den negative skrift benyttet til tyre, som afprøvedes i 1965–66 og 1966–67.

Inden for Rød Dansk Malkerace dominerer Højagerlinien, og det er sønnesønnerne Kærsholm Højager og Højvig, som er blevet stamfædre til næsten alle de afkomsprøvede tyre inden for Højagerlinien i årene 1966–67 og 1967–68. Inden for Esketyrene er der kun få afkomsprøvede tyre, og Eskelinien er i stærk tilbagegang i disse år. Den røde tyr Dybbøl Rhin er ikke medtaget, da den ikke i direkte fædrene linie kan føres tilbage til det anførte stamtræ.

Sortbroget Dansk Malkerace møder med 3 stamtræer, men det er stamtræet med den vestfrisiske tyr Athleet som stamfader, der omfatter langt den største part af de afkomsprøvede tyre. Tyrelinien efter Oldambtster Adema 1 er nordhollandsk, medens Astorlinien er østfrisisk.

Der er anført 6 stamtræer for Jerseyracen. De 4 kan føres tilbage til de

kendte tyrelinier efter Indslev Ellekær, Nybøllegård 39, Abild 6 og Lyngsie, medens Zinnia's Wonderful Advancer er en amerikansk tyrelinie og Dunlavin Excellency tilhører en tyrelinie i New Zealand.

Der er anført 5 figurer, som viser henholdsvis mælkeydelse, fedtprocent, smørfedtydelse, proteinprocent og ydelsen af mælkeprotein for såvel Rød Dansk Malkerace som Sortbroget Dansk Malkerace og Jerseyracen. Mælkeydelsen har været stigende gennem årene, og stigningen har været tydeligst for Rød Dansk Malkerace og Sortbroget Dansk Malkerace. Af figuren vedrørende fedtprocenten fremgår det tydeligt, at Jerseyracen har haft den største fremgang gennem årene. Der har været tydelig fremgang i smørfedtydelsen for alle 3 racers vedkommende.

Tabel 1 indeholder oplysninger om holdenes gennemsnitlige ydelse for afkomsprøveårene 1962–67. Der er tillige anført tyrens fader samt navnet på den afkomsprøvestation, hvor prøven er gennemført. Tyrene, som afprøvedes i 1966–67, er anført med fed type.

Tabel 2 giver en oversigt over de tyre, som har mindst 3 afkomsprøvede sønner, og hvoraf mindst en er afprøvet i 1966–67. Der er vedføjet en * ved de hold, som er afprøvet før 1960–61, og derfor er malket 3 gange daglig i vinterperioden. Der er vedføjet ° for holdene, som blev afprøvet før 1962–63, hvor der anvendtes 11 ml mælk ved gerbereringen.

Efter Sortemose er der afprøvet 30 sønner, og gennemsnitsydelsen for disse hold blev 261 kg smør. Mange af holdene opnåede høj mælkeydelse, og næsten alle holdene havde særdeles gode fedtprocenter. Holdene efter helbrødrene Kolding Top 69 og Rudme Ideal samt efter Stevns Ry, Elbo Sortemose, Hjørring Munkdrup og Kolding Sortemose 28 nåede alle over en gennemsnitsydelse på 250 kg smørfedt. Sønnerne efter Sortemose vil få stor betydning i de kommende år, da de er muskuløse og trivelige samt i besiddelse af særdeles gode ydelsesanlæg, men det kniber ofte med kvaliteten af lemmer og malkeorganer, og manglende evne til at lægge mælken ned forekommer lidt for hyppigt i denne gruppe.

Med holdet efter Uwe, som afprøvedes i det forløbne år, er der nu afprøvet 23 hold efter sønner af Sverre, og gennemsnitsydelsen for disse hold blev 255 kg smør. Der er meget stor variation i ydelsen inden for denne gruppe, hvor holdene efter Uwe og Thy Høj opnåede de højeste ydelsesresultater. Holdet efter Uwe nåede 339 kg smør i gennemsnit, og det er rekordydelse for alle afkomsprøveårene.

Efter Rudme Ideal er afprøvet 19 sønner, og der er opnået usædvanlig smukke ydelsesresultater for disse hold, hvor gennemsnitsydelsen nåede helt op på 272 kg smør, hvilket er en meget fin gennemsnitsydelse for 19 hold. De bedste ydelsesresultater blev opnået på holdene efter Holme Øst, Dybbøl Ideal, Hornshøj Ideal, Ribe Ulf og Drot Østlolland. Malkbarheden var

Tabel 1. Gennemsnitsydelsen

Table 1. Average yield of the

År *Year*	Tyrens navn *Name of bull*	Reg./stbg. *Reg. Herdbook*	Tyrens fader *Sire of bull*	Antal døtre *No. of daughters*
Rød Dansk Malkerace:				
a. 300–320 kg smørfedt:				
1966–67	**Uwe**	28146	Sverre	16
b. 280–300 kg smørfedt:				
1965–66	Haslev Lex	28114	Holbæk Frøy	18
c. 260–280 kg smørfedt:				
1965–66	Holme Øst	e.B4957	Rudme Ideal	20
1965–66	Kolding Top 69	e.A5044	Sortemose	20
1964–65	Thy Høj	e.B4973	Sverre	20
1962–63	Horsens Vang	e.A4944	Ejlekær	17
1965–66	Samsø Ulf	28302	Hjørring Munkdrup	17
1963–64	Kolding Holm 36	e.A4978	Rolf	18
1965–66	Dybbøl Ideal	28328	Rudme Ideal	19
1964–65	Stevns Ry	e.A5028	Sortemose	15
1963–64	Ingo Øst	e.A4960	Snap	19
1966–67	**Skærup Munk**	28389	Munk 26	20
1966–67	**Horsens Bitz**	28407	Ålborg Bitz	18
1965–66	Hornshøj Ideal	28057	Rudme Ideal	16
1965–66	Horsens Borg	28051	Hadsten Wahl	19
1965–66	Ribe Ulf	28083	Rudme Ideal	20
1965–66	Drot Østlolland	27694	Rudme Ideal	15
1964–65	Samsø Dux	e.B4969	Sverre	16
1963–64	Horsens Prins	e.B4965	Horsens Sortemose	18
d. 240–260 kg smørfedt:				
1965–66	Skærup Uffe	28038	Horsens Vang	18
1963–64	Kolding Sortemose 28	e.A4980	Sortemose	19
1965–66	Skive Ideal	28096	Rudme Ideal	19
1966–67	**Ålborg Børge**	28372	Rudme Ideal	17
1966–67	**Dybbøl Holm**	28377	Rudme Ideal	18
1964–65	Ringkøbing Laus	e.A5038	Kerteminde Laus	19
1965–66	Rudme Unik	e.A5018	Hadsten Wahl	19
1962–63	Ejbo	e.A5034	Rolf	15
1962–63	Hjørring Leif	e.B4911	Leif	18
1962–63	Nordfyns Hørlyk	e.A4912	Guldbjerg II	20
1962–63	Sydvestfyns Al	e.A4910	Rudme Fynbo	21
1965–66	Bonus	27960	Hadsten Wahl	19
1965–66	Nordfyns Nich	e.A5016	Morsø Ejlekær	20
1965–66	Ask Nøddekær	e.A5024	Randers 47	19
1964–65	Horsens Hau	e.B4967	Horsens Sortemose	16
1966–67	**Skærup Bus**	28388	Rudme Ideal	18
1964–65	Centrums Ask	e.A4952	Kær	18
1966–67	**Skov**	28333	Hadsten Wahl	19

for afkomsprøveholdene 1962–67.

progeny tested groups in 1962–67

Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	Protein % *Protein %*	Mælkeprot. kg *Protein kg*	Afkomsprøvestation *Testing station*
6427	4,69	301,32	339	3,82	246	Gyldenagergård
6148	4,80	294,80	332	3,70	228	Gyldenagergård
5955	4,62	275,25	310	3,59	214	Grønhøjgård
5976	4,60	274,84	309	3,66	219	Gelballegård
6259	4,34	271,88	305	3,70	232	Kronborg
5910	4,58	270,47	304	3,58	212	Østerhåb
5847	4,61	269,40	303	3,66	214	Samsø
5838	4,60	268,78	302	3,73	218	Gelballegård
6075	4,42	268,45	302	3,66	223	Veesbæk
5814	4,60	267,50	301	3,67	213	Gyldenagergård
5896	4,53	267,15	300	3,82	225	Gyldenagergård
5881	4,51	265,35	298	3,85	227	Skovgård
5412	4,85	262,41	296	3,98	215	Østerhåb
5553	4,73	262,38	295	3,95	220	Lægård
5805	4,52	262,32	295	3,54	205	Østerhåb
5626	4,64	261,19	294	3,55	200	Skølvad
5581	4,67	260,86	294	3,69	206	Bellinge
5335	4,89	260,78	294	3,88	207	Samsø
5579	4,66	260,04	293	3,58	200	Østerhåb
5824	4,45	259,30	291	3,78	220	Skovgård
5216	4,95	258,37	291	3,82	199	Gelballegård
5842	4,41	257,86	290	3,69	215	Krarup Nygård
5520	4,63	255,84	288	3,96	218	Lundgård
5373	4,73	254,22	286	3,80	204	Veesbæk
5232	4,82	251,95	284	3,87	203	Dybvad
5544	4,54	251,66	283	3,71	206	Enemærket
5583	4,49	250,89	282	3,71	207	Lundgård
5155	4,87	250,81	283	3,93	203	Dybvad
5164	4,83	249,38	281	3,97	205	Enemærket/Sundsgård
5512	4,52	249,07	280	3,73	205	Ejstrupgård
5628	4,42	248,67	279	3,64	205	Lundgård
5362	4,63	248,33	279	3,70	198	Enemærket
5532	4,48	247,86	279	3,78	209	Sydsjælland
5337	4,64	247,75	279	3,79	202	Østerhåb
5521	4,48	247,31	278	3,68	203	Morsø
5060	4,88	246,99	278	3,82	193	Enemærket
5397	4,55	245,69	276	3,90	211	Lundgård

År *Year*	Tyrens navn *Name of bull*	Reg./stbg. *Reg. Herdbook*	Tyrens fader *Sire of bull*	Antal døtre *No. of daughters*
1964–65	Kolding Sverre 38	27941	Sverre	19
1964–65	Holbæk Rumo	e.B4929	Sortemose	18
1966–67	**Randers Sortemose**	28318	Sortemose	19
1962–63	Hjørring Fynbo	26829	Rudme Fynbo	18
1965–66	Bornholms Titov	e.A5032	Randers 47	19
1963–64	Rik Vallensgård	4796	Rudme No	16
1966–67	**Samsø Frej**	28442	Sortemose	18
1966–67	**Nordfyns Aman**	28192	Hadsten Wahl	18
1965–66	Dybbøl Sverre	27871	Sverre	17
1962–63	Holbæk Trym	e.B4935	Dan	17
1962–63	El Sydfalster	e.A4928	Samsø El	19
1963–64	Han Herreds Thor	e.B4963	Thor	20
1964–65	Ribe Blik	27829	Morsø Vinkel	20
1966–67	**Skive Rajs**	28097	Morsø Ejlekær	19
1962–63	Skive Hind	26467	No Brethvig	18
1966–67	**Ringkøbing Holm**	28323	Kolding Holm 36	16
1963–64	Midtsjællands Bak	e.A4962	Thor	19
1962–63	Øbo	e.B4953	Morsø Wahl	17
e. 220–240 kg smørfedt:				
1966–67	**Åbenrå Øbo**	28100	Hadsten Wahl	21
1965–66	Sydfyns Allan	e.A5020	Hjørring Munkdrup	19
1964–65	Ålborg Høg	27292	Horsens Sortemose	17
1963–64	Holbæk Oddgeir	e.B4931	Holbæk Okke	17
1964–65	Falsters Vinkel	e.A5030	Morsø Vinkel	18
1964–65	Bjerringbro King	27881	Rudme Ideal	19
1964–65	Veto	27955	Sverre	19
1964–65	Dybbøl P.P.	27621	Horsens Sortemose	21
1965–66	Varde Rud	28086	Rudme Ideal	18
1965–66	Kolding Wahl 44	e.A5042	Hadsten Wahl	20
1964–65	Hjørring Elsø	27875	Morsø Vinkel	20
1964–65	Hornshøj Ørn	27560	Ørn Tåsinge	17
1966–67	**Haslev Odin**	28485	Stevns Højvig	18
1966–67	**Hjørring Eli**	27877	Randers 47	17
1966–67	**Skærup Karlby**	28039	Sortemose	16
1962–63	Herning Es	e.B4951	Høj	18
1966–67	**Rødding Ursus**	28417	Sydvestfyns Ursus	18
1963–64	Hjørring Od	27295	Morsø Ejlekær	20
1963–64	Skive Himmerbo	27182	Sverre	16
1965–66	Hjørring Sverre	27654	Sverre	18
1963–64	Dybbøl Vig	27297	Horsens Sortemose	17
1964–65	Kolding Frøy 86	27943	Holbæk Frøy	17
1966–67	**Ribe Aks**	28423	Hjørring Munkdrup	19
1962–63	Roskilde Tamp	e.B4915	Centrums Gavn	20
1962–63	Zakarias	26823	Birk	19
1965–66	Kær Vestlolland	e.B4961	Sverre	17
1962–63	Århus Høst	26940	Fåborg Elg	16
1963–64	Give Kejser	e.A4972	Morsø Vinkel	19
1963–64	Nordfyns Lind	e.A4948	Thor	20

Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	Protein % *Protein %*	Mælkeprot. kg *Protein kg*	Afkomsprøvestation *Testing station*
5170	4,75	245,61	277	3,85	199	Gelballegård
5530	4,43	245,21	275	3,68	204	Torntofte
5587	4,38	244,69	275	3,86	216	Lundgård
5402	4,52	244,42	275	3,86	209	Dybvad
5107	4,79	244,40	275	3,75	191	Kannikegård
4939	4,94	244,20	275	4,10	202	Samsø
5225	4,66	243,46	274	3,80	199	Samsø
5201	4,68	243,43	274	3,84	199	Enemærket
5457	4,46	243,40	274	3,70	202	Veesbæk
5348	4,55	243,38	274	3,64	195	Torntofte
4939	4,91	242,61	273	3,89	192	Bellinge
5285	4,59	242,45	273	3,89	206	Kronborg
5464	4,43	241,89	272	3,58	196	Skølvad
5199	4,64	241,28	271	3,81	198	Krarup Nygård
5158	4,67	241,02	271	3,65	188	Krarup Nygård
5429	4,43	240,71	270	3,79	206	Lægård
5017	4,79	240,46	271	3,73	187	Grønhøjgård
5120	4,70	240,40	271	4,01	205	Morsø
5497	4,36	239,93	269	3,84	211	Moesgård
5159	4,65	239,67	270	3,74	193	Enemærket
5362	4,47	239,62	269	3,94	211	Lundgård
5189	4,60	238,77	269	3,68	191	Torntofte
5624	4,24	238,65	268	3,75	211	Bellinge
5149	4,63	238,25	268	3,85	199	Rosenfeldt
5139	4,64	238,23	268	3,70	190	Kalø
5270	4,51	237,94	267	3,74	197	Veesbæk
5359	4,44	237,78	267	3,68	197	Vardegård
5571	4,26	237,20	266	3,62	202	Gelballegård
4935	4,80	236,81	267	3,90	193	Dybvad
5238	4,52	236,78	266	3,72	195	Lægård
5237	4,51	236,29	266	3,86	202	Sydsjælland
5164	4,55	235,22	265	3,75	194	Dybvad
5380	4,36	234,71	264	3,71	199	Lægård
5204	4,51	234,63	264	3,74	194	Moesgård
4885	4,80	234,56	264	3,82	186	Brøstrupgård
5383	4,34	233,81	262	3,82	205	Dybvad
5195	4,50	233,76	263	3,72	193	Krarup Nygård
5441	4,29	233,54	262	3,58	195	Dybvad
5303	4,39	232,77	261	3,78	201	Veesbæk
4963	4,69	232,64	262	3,74	186	Gelballegård
5515	4,21	232,06	260	3,72	205	Skølvad
4883	4,74	231,52	261	3,76	184	Sydsjælland
5007	4,62	231,33	260	3,73	187	Torntofte
5203	4,45	231,32	260	3,72	194	Bellinge
5172	4,47	231,02	260	3,55	184	Elkjær
5162	4,47	230,87	259	3,70	191	Skovgård
5018	4,60	230,82	260	3,84	193	Fyn

År *Year*	Tyrens navn *Name of bull*	Reg./stbg. *Reg. Herdbook*	Tyrens fader *Sire of bull*	Antal døtre *No. of daughters*
1964–65	Herning Borg	27643	Rudme Rolu	19
1966–67	**Hjørring Iver**	28352	Rudme Ideal	21
1964–65	Horsens Leif	e.A5010	Leif	20
1964–65	Hjørring Bakke	27447	Sortemose	19
1964–65	Give Uno	27884	Sortemose	19
1965–66	Oll Nordvest	27770	Morsø Ejlekær	19
1966–67	**Give Ask**	28612	Sortemose	19
1965–66	Holbæk Klak	28115	Sverre	18
1964–65	Gråsten Ørn	e.A5008	Ørn Tåsinge	19
1962–63	Hammel Ejlekær	e.A5036	Morsø Ejlekær	19
1965–66	Århus Niels	28020	Rudme Ideal	17
1964–65	Møns Eg	e.B4939	Sverre	19
1966–67	**Ribe Frem**	28422	Nordfyns Frem	20
1966–67	**Århus Hof**	28400	Stevns Klint	17
1963–64	Ringkøbing Ole	e.A5040	Kerteminde Ole	18
1964–65	Hornshøj Knold	e.A5012	Morsø Ejlekær	16
1964–65	Roy	27956	Holbæk Frøy	18
1965–66	Varde Ott	28085	Sortemose	18
1964–65	Midtsjællands No	27596	No Brethvig	20
1965–66	Horsens Frøy	28052	Holbæk Frøy	18
1965–66	Egholm Tyrsted	28351	Sverre	18
1966–67	**Centrums Prik**	28187	Rudme Ideal	19
1965–66	Akonto	e.A4998	Thor	17
1963–64	Reza	e.A4956	Randers 47	19
1963–64	Egholm Ejlekær	27210	Ejlekær	18
1965–66	Sydvestfyns Pol	28183	Hjørring Munkdrup	20
1962–63	Møns Ydan	e.A4964	Dan	20
1962–63	Bjerringbro Prim	26947	Ørn Tåsinge	19
1964–65	Rødding Claus	27839	Hadsten Wahl	19
1963–64	Årup Vestfyns Håb	e.A4950	Horsens Sortemose	19
1965–66	Tyrstrup Buster	28066	Rudme Ideal	17
1964–65	Næstved Kærvig	e.A4994	Morsø Ejlekær	20
1964–65	Ejler Østlolland	27502	Morsø Ejlekær	16
1962–63	Sydvestfyns Bos	26977	No Brethvig	19
1962–63	Bornholms Mars	e.B4901	Ejlekær	18
1964–65	Rør	27957	Hadsten Wahl	18
1964–65	Møns Cato	e.A4996	Holbæk Frøy	20
1962–63	Moses Tåsinge	e.A5014	Dan	18
1964–65	Varde Bol	27832	Sortemose	16
1963–64	Taurus Major	e.B4917	Ålborg Wahl	18
1965–66	Ribe Dan	28084	Sortemose	20
1966–67	**Rødding Frem**	28420	Nordfyns Frem	20
1965–66	Hjørring Gert	27639	Randers 47	19
1964–65	Randers Ideal	e.B4971	Rudme Ideal	20
1966–67	**Holbæk Allaks**	28117	Rudme Ideal	20
1963–64	No Vinkel	27585	No Brethvig	21
1963–64	Elo	27402	Morsø Ejlekær	19
1966–67	**Bjørn Sydvest**	28112	Sortemose	20
1963–64	Herning Ejlekær	27187	Ejlekær	15

Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	Protein % *Protein %*	Mælkeprot. kg *Protein kg*	Afkomsprøvestation *Testing station*
5067	4,55	230,69	259	4,03	204	Moesgård
4949	4,66	230,44	259	3,83	190	Dybvad
4834	4,77	230,38	259	3,73	180	Østerhåb
4837	4,75	229,69	259	3,98	193	Dybvad
5016	4,58	229,65	258	3,79	190	Skovgård
5223	4,39	229,45	258	3,61	189	Torntofte
4718	4,86	229,42	259	3,99	188	Skovgård
5119	4,48	229,26	258	3,60	184	Grønhøjgård
4926	4,65	229,15	258	3,78	186	Morsø
5100	4,49	228,93	257	3,81	194	Kalø
5345	4,28	228,76	257	3,41	182	Elkjær
5305	4,29	227,56	255	3,77	200	Bellinge
5221	4,35	227,34	255	3,82	199	Skølvad
5379	4,22	227,10	255	3,59	193	Elkjær
5250	4,32	226,90	255	3,86	202	Fjordvang
5036	4,50	226,64	255	3,77	190	Lægård
5068	4,47	226,61	255	3,75	190	Kalø
4929	4,60	226,52	255	3,68	182	Vardegård
4961	4,56	226,18	254	3,74	186	Grønhøjgård
5070	4,45	225,82	254	3,63	184	Østerhåb
4752	4,75	225,69	254	3,90	185	Skovgård
4946	4,56	225,46	254	3,96	196	Enemærket
4959	4,55	225,46	254	3,59	178	Kalø
5238	4,30	225,37	253	3,71	195	Sydsjælland
4820	4,66	224,68	253	3,85	186	Skovgård
4747	4,73	224,64	253	3,62	172	Ejstrupgård
4853	4,62	224,41	252	3,71	180	Bellinge
4822	4,64	223,95	252	3,97	191	Rosenfeldt
5274	4,25	223,93	251	3,49	184	Brøstr.gd./Gelballegd.
4638	4,83	223,88	252	3,76	174	Fyn
4950	4,52	223,58	251	3,79	187	Brøstrupgård
5421	4,12	223,33	250	3,76	204	Sydsjælland
5212	4,28	223,27	251	3,67	192	Bellinge
4842	4,61	223,18	251	3,90	189	Ejstrupgård
5148	4,33	222,87	250	3,76	193	Kannikegård
4862	4,58	222,86	251	3,72	181	Kalø
4880	4,56	222,34	250	3,89	190	Ejstrupgård
4559	4,87	222,08	250	3,94	179	Enemærket/Sundsgård
4901	4,53	221,94	250	3,69	181	Vardegård
5041	4,40	221,83	249	3,78	191	Bellinge
5046	4,39	221,56	249	3,56	180	Skølvad
4978	4,45	221,55	249	3,81	190	Østerhåb
4669	4,74	221,49	249	3,81	178	Dybvad
4827	4,59	221,41	249	3,78	183	Rosenfeldt
4804	4,61	221,38	249	3,89	187	Torntofte
4924	4,49	221,26	249	3,72	183	Torntofte
5032	4,39	221,10	248	3,75	188	Kalø
4868	4,54	221,05	249	4,01	195	Grønhøjgård
4945	4,47	221,00	248	3,91	193	Moesgård

År *Year*	Tyrens navn *Name of bull*	Reg./ stbg. Reg. *Herdbook*	Tyrens fader *Sire of bull*	Antal døtre *No. of daughters*
1962–63	Pan Øst	e.B4897	Rolf	16
1964–65	Herning Hav	28001	Randers 47	17
1966–67	**Bakager Wahl**	28062	Hadsten Wahl	20
1965–66	Kolding Ejlekær 83	28076	Sortemose	17
f. 200–220 kg smørfedt:				
1965–66	Rødding Dal	28418	Rudme Ideal	16
1962–63	Taurus Færch	27181	Rolf	17
1964–65	Sydvestfyns Vøge	27801	Morsø Vinkel	19
1965–66	Horsens Od	28053	Morsø Ejlekær	19
1964–65	Lemvig Ejlekær	27849	Morsø Ejlekær	20
1964–65	Åbenrå Bro	27837	Sverre	18
1965–66	Varde Sven	27865	Randers 47	17
1963–64	Give Od	27270	Thor	19
1965–66	Sverhøj	e.B4959	Sverre	19
1964–65	Rør Nordvest	e.A5026	Sortemose	18
1965–66	Støtt	27953	Morsø Ejlekær	18
1965–66	Herning Leif	28344	Randers 47	19
1963–64	Elbo Gavn	27273	Centrums Gavn	20
1962–63	Morsø Sverre	26393	Sverre	18
1963–64	Hjørring Arne	27192	Rolf	18
1962–63	Kerteminde Tell	26727	Rudme Fynbo	17
1962–63	X Sydvest	e.A4966	Rolf	19
1966–67	**Kolding Pall 23**	28081	Hadsten Wahl	16
1963–64	Bjerringbro Hejn	27146	Kolding Valdal 174	18
1964–65	Skive Mark	27183	Højmark	19
1963–64	Rødding Sverre	27411	Sverre	18
1965–66	Randers Frøy	27859	Holbæk Frøy	19
1966–67	**Varde Grøn**	28430	Stevns Klint	13
1963–64	Sortemose Sydvest	27586	Horsens Sortemose	20
1963–64	Hornshøj Rolf	27148	Rolf	16
1963–64	Fåborg Wano	e.A4982	Morsø Wahl	19
1962–63	Ringkøbing Vest	e.A4970	Rolf	16
1965–66	Ribe Gull	28090	Bornholms Gulldal	20
1963–64	Centrums Marsk	26979	Randers Lyn	19
1966–67	**Horsens Gert**	28410	Djurs Gert	16
1964–65	Fåborg Øvli	27781	Sverre	18
1963–64	Varde Nør	27124	Morsø Ejlekær	19
1966–67	**Vald Nordvest**	28126	Hadsten Wahl	18
1964–65	Skjern Tvind	27804	Rudme Ideal	19
1964–65	Od Sydvest	e.B4937	Morsø Vinkel	20
1962–63	Kolding Kær 3	27114	Kær	17
1966–67	**Thy Skov**	28440	Hadsten Wahl	17
1966–67	**Erslev**	28383	Sortemose	19
1962–63	Fåborg Quitus	e.A4984	Ørnsvig 136	17
1962–63	Hornshøj Vinkel	26755	Morsø Wahl	17
1965–66	Hadsten Jess	28061	Ålborg Jess	18
1962–63	Tyrstrup Et	e.A4974	Haslev Et	19
1962–63	Varde Roht	27044	Thor	16

Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	Protein % *Protein %*	Mælkeprot. kg *Protein kg*	Afkomsprøvestation *Testing station*
4374	5,04	220,49	249	4,15	182	Samsø
5101	4,32	220,44	247	3,81	194	Moesgård
5002	4,41	220,41	248	3,75	187	Kalø
4839	4,55	220,20	248	3,69	179	Gelballegård
4711	4,67	219,84	247	3,82	180	Bellinge
4653	4,72	219,74	247	3,89	181	Bellinge
4974	4,41	219,24	246	3,71	185	Ejstrupgård
4867	4,49	218,44	246	3,53	172	Østerhåb
5110	4,27	218,43	245	3,60	184	Morsø
4842	4,51	218,33	245	3,71	180	Brøstr.gd./Gelballegd.
4841	4,49	217,55	245	3,69	178	Vardegård
4589	4,73	217,24	245	3,92	180	Gelballegård
4874	4,45	217,00	244	3,67	179	Gyldenagergård
4927	4,40	216,93	244	3,68	181	Torntofte
4661	4,63	215,92	243	3,99	186	Rosenfeldt
5137	4,20	215,84	242	3,71	191	Moesgård
4890	4,41	215,74	242	3,65	178	Skovgård
5174	4,17	215,64	242	3,91	202	Morsø
4744	4,54	215,56	242	3,78	179	Dybvad
4749	4,53	215,17	242	3,81	181	Enemærket/Sundsgård
4621	4,66	215,17	242	3,69	171	Grønhøjgård
4915	4,37	214,90	241	3,64	179	Gelballegård
4763	4,50	214,22	241	3,66	175	Kalø
4839	4,42	214,10	241	3,75	182	Krarup Nygård
4593	4,66	214,10	241	3,82	176	Brøstrupgård
4797	4,45	213,70	240	3,72	178	Kalø
4795	4,45	213,61	240	3,74	179	Vardegård
4890	4,36	213,36	240	3,59	176	Grønhøjgård
4959	4,30	213,18	239	3,62	180	Lægård
4669	4,57	213,15	240	3,82	178	Fyn
4735	4,50	213,09	240	3,91	185	Fjordvang
4793	4,44	213,00	239	3,75	180	Skølvad
4732	4,49	212,62	239	3,71	176	Fyn
4584	4,63	212,43	239	3,94	181	Østerhåb
4586	4,62	212,06	239	3,85	177	Sundsgård
4826	4,39	212,01	238	3,73	180	Skølvad
4667	4,54	211,95	238	3,73	174	Torntofte
4270	4,96	211,95	239	3,90	167	Enemærket
4878	4,34	211,49	237	3,72	181	Grønhøjgård
4737	4,46	211,18	237	3,76	178	Gelballegård
4832	4,37	210,96	237	3,63	175	Kronborg
4465	4,71	210,38	237	3,78	169	Kalø
4571	4,59	209,86	236	3,92	179	Enemærket/Sundsgård
4679	4,47	209,05	235	3,76	176	Lægård
4832	4,32	208,68	234	3,54	171	Kalø
4634	4,50	208,61	234	3,84	178	Brøstrupgård
4662	4,47	208,48	234	3,81	177	Vardegård

År *Year*	Tyrens navn *Name of bull*	Reg./ stbg. *Reg. Herdbook*	Tyrens fader *Sire of bull*	Antal døtre *No. of daughters*
1964–65	Bornholms Ran	e.A5004	Hadsten Wahl	19
1966–67	**Djurs Wahl**	28311	Hadsten Wahl	20
1965–66	Skovly Toft	27995	Ejlekær	18
1965–66	Thy 47	28091	Randers 47	20
1963–64	Horsens No	27209	No Brethvig	19
1962–63	Bredsten Nørreby	27164	Nordfyns Plyds	18
1963–64	Ribe Svan	27408	Ejlekær	18
1965–66	Tyrstrup Bent	27842	Hadsten Wahl	17
1966–67	**Hadsten Gert**	28617	Djurs Gert	19
1964–65	Varde Ting	27833	Sverre	16
1963–64	Bornholms Nøk	e.B4921	Kær	21
1965–66	Rex	28102	Sverre	19
1966–67	**Århus Ask**	28404	Ålborg Bitz	19
1964–65	Rudme Elm	e.A4992	Thor	16
1963–64	Ødsted No	27617	No Brethvig	20
1962–63	Ringkøbing Dal	26788	Ejlekær	17
1964–65	Ribe Bjarke	27827	Randers 47	20
g. 180–200 kg smørfedt:				
1962–63	Nørherreds Rolf	26782	Rolf	19
1962–63	Horsens Skov	26857	Poul Langeland	13
1965–66	Herning Ørsted	28003	Randers 47	20
1962–63	Horsens Kær	26859	Ejlekær	18
1963–64	Møns Allan	27375	Haslev Et	16
1963–64	Dybbøl Bill	27151	Rudme Golf	19
1965–66	Årup Vestfyns Smed	28184	Sverre	19
1963–64	Ribe Klak	27409	Højmark	19
1962–63	Give Aktiv	27139	Ørnsvig 136	20
1962–63	Sydfyns Zetor	26967	Birk	19
1966–67	**Ribe Klint**	28421	Hjørring Munkdrup	19
1963–64	Anders Østlolland	27175	Centrums Nil	16
1964–65	Sydfyns Vik	27790	Sverre	20
1962–63	Hornshøj Bjerg	26752	Rudme Fynbo	16
1962–63	Århus Kær	27033	Kær	18
1962–63	Karl	26591	Carlsro Vidar	17
1966–67	**Varde Kry**	28427	Kerteminde Kry	18
1963–64	Carlsro X	26959	Høj	19
1963–64	Herning Dux	27189	Ejlekær	16
1963–64	Årup Vestfyns Mod	26971	Morsø Wahl	18
1962–63	Varde Gør	26689	Gørlev	18
1962–63	Åbenrå Wahl	26784	Morsø Wahl	20
1965–66	Århus Klint	28060	Stevns Klint	20
1962–63	Kolding 139	27115	No Brethvig	19
1964–65	Kaløvig Nør	28006	Centrums Nil	20
1963–64	Varde Bro	27405	Kær	16
1966–67	**Kolding Munk 143**	28382	Hjørring Munkdrup	19
1962–63	Århus Rollo	26942	Rolf	18
1966–67	**Bøg**	28444	Danhøj	18
1964–65	Give Paw	27883	Sverre	19

Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	Protein % *Protein %*	Mælkeprot. kg *Protein kg*	Afkomsprøvestation *Testing station*
4839	4,31	208,47	234	3,82	185	Kannikegård
4784	4,35	208,13	234	3,64	174	Kalø
4833	4,31	208,12	234	3,65	177	Morsø
4940	4,18	206,71	232	3,57	176	Kronborg
4362	4,72	205,88	232	3,60	157	Østerhåb
4525	4,53	205,16	231	3,78	171	Skovgård
4563	4,49	204,96	230	3,89	178	Skølvad
4533	4,51	204,42	230	3,81	173	Brøstrupgård
4660	4,38	204,10	229	3,68	172	Kalø
4514	4,48	202,33	227	3,84	173	Vardegård
4635	4,36	202,20	227	3,74	174	Kannikegård
4872	4,15	202,00	226	3,46	169	Torntofte
4594	4,39	201,89	227	3,73	171	Elkjær
4308	4,68	201,72	227	3,97	171	Sundsgård
4438	4,54	201,54	227	3,84	171	Skovgård
4669	4,31	201,16	226	3,73	174	Fjordvang
4799	4,17	200,26	224	3,53	169	Skølvad
4557	4,38	199,40	224	3,86	176	Veesbæk
4281	4,65	199,12	224	3,72	159	Østerhåb
4497	4,42	198,88	223	3,91	176	Moesgård
4589	4,33	198,73	223	3,73	171	Østerhåb
4283	4,64	198,67	224	3,74	160	Bellinge
4582	4,33	198,61	223	3,86	177	Veesbæk
4350	4,57	198,58	223	3,71	161	Ejstrupgård
4551	4,36	198,46	223	3,78	172	Skølvad
4260	4,64	197,46	222	3,81	162	Skovgård
4564	4,32	197,11	221	3,67	168	Sundsgård
4515	4,35	196,63	221	3,70	167	Skølvad
4517	4,35	196,38	220	3,69	167	Bellinge
4290	4,55	195,25	220	3,88	167	Sundsgård
4537	4,29	194,73	219	3,82	173	Lægård
4323	4,50	194,47	219	3,76	162	Elkjær
4344	4,46	193,84	218	3,80	165	Kalø
4431	4,37	193,57	217	3,68	163	Vardegård
4259	4,53	192,75	217	3,87	165	Fyn
4354	4,42	192,39	216	3,94	171	Moesgård
4226	4,55	192,19	216	3,93	166	Fyn
4250	4,50	191,37	215	3,76	160	Vardegård
3992	4,78	190,77	215	3,94	157	Brøstrupgård
4422	4,31	190,61	214	3,43	152	Elkjær
4466	4,27	190,55	214	3,76	168	Gelballegård
4253	4,48	190,54	214	3,72	158	Elkjær
4307	4,42	190,38	214	3,68	159	Vardegård
4201	4,47	187,66	211	3,75	157	Gelballegård
4599	4,06	186,65	209	3,45	159	Elkjær
3968	4,70	186,37	210	3,97	158	Kalø
4191	4,41	184,67	207	3,77	158	Skovgård

År *Year*	Tyrens navn *Name of bull*	Reg./ stbg. *Reg. Herdbook*	Tyrens fader *Sire of bull*	Antal døtre *No. of daughters*
h. 160–180 kg smørfedt:				
1962–63	Rødding Golf	27037	Rudme Golf	19
1962–63	Varde Gynn	27042	Højer Langeland	18
1963–64	Varde Mar	27125	No Brethvig	18
Sortbroget Dansk Malkerace:				
c. 260–280 kg smørfedt:				
1965–66	Ålborg Bos	e.A80	Friso Wouter	19
d. 240–260 kg smørfedt:				
1966–67	**Varde Stefan**	7296	Aros	20
1966–67	**Kolding Gordon 39**	7304	Gordon	20
1962–63	Hjørring Diamant	e.A28	Felsum Diamant Athleet	19
1963–64	Hjørring Foch	e.A52	Foch	21
1965–66	Skals President	7200	Adema 21 v. d. Woudhoeve	18
1966–67	**Egholm Gran**	7515	Thy Gran	20
1966–67	**Sdj. Aksel**	7402	Siferman	19
1965–66	Sdj. Regal	7249	Regale Rubin v. d. Buurt	16
1964–65	Dybbøl Holt	7098	Blitsaerd Kl. Adema V	18
1966–67	**Ry**	7066	Gordon	20
1966–67	**Skive Hal**	7464	Drost	20
e. 220–240 kg smørfedt:				
1964–65	Sdj. Frans	7102	Frans Ij. 195	19
1964–65	Hjørring Ernst	e.A76	Sdj. Ernst	20
1962–63	Skals Gordon	e.A30	Gordon	18
1963–64	Han Herreds Juvel	6866	Skive Juvel	20
1962–63	Randers Gordon	e.A58	Gordon	17
1964–65	Horsens Markus	7002	Blitsaerd Kl. Adema 4	20
1966–67	**Hjørring Domino**	7413	Blitsaerd Jakson	18
1965–66	Varde Eg	e.A82	Jelsumer Wouter Gerard	18
1964–65	Randers Adema	e.A68	Adema 220 v. d. Woudhoeve	18
1964–65	Skovly Smed	e.A74	Randers Godtfred	16
1966–67	**Sdj. Ark**	7404	Freark	20
1963–64	Skjern Foch	e.A50	Foch	17
1962–63	Ålborg Diamant	6708	Haskera Gouverneur	17
1963–64	Reuter	e.A72	Adema 21 v. d. Woudhoeve	20
1965–66	Lemvig Frans	7137	Adema 21 v. d. Woudhoeve	17
1964–65	Sdj. Blits	7107	Blitsaerd August	18
1963–64	Drost	e.A60	Sneeker Diamant	19
1966–67	**Egholm Drost**	7516	Drost	15
1964–65	Nego	e.B37	Gordon	20
1964–65	Herning Revella	e.B33	Wytsturt Annas Adema 38	19
1965–66	Han Herreds Krans	7233	Randers Krans	20
1966–67	**Varde Diamant**	7433	Haskera D. Gerard	18
1966–67	**Bjerringbro Basta**	7390	Bast	20
1966–67	**Swea**	7424	Riemer	20

Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	Protein % *Protein %*	Mælkeprot. kg *Protein kg*	Afkomsprøvestation *Testing station*
4025	4,43	178,29	200	3,78	152	Gelballegård
4030	4,33	174,39	196	3,88	156	Skølvad
3707	4,68	173,65	195	3,88	144	Vardegård
5802	4,66	270,12	304	3,78	219	Lundgård
5630	4,47	251,70	283	3,63	204	Skølvad
5897	4,27	251,63	282	3,61	213	Gelballegård
5418	4,63	250,88	282	3,79	206	Dybvad
5451	4,60	250,82	282	3,67	200	Dybvad
5763	4,33	249,82	280	3,76	217	Lundgård
5764	4,29	247,51	278	3,59	207	Skovgård
5149	4,80	247,21	278	3,64	187	Brøstrupgård
5924	4,17	246,96	277	3,34	198	Brøstrupgård
5579	4,37	244,00	274	3,57	199	Veesbæk
5643	4,32	243,61	273	3,52	199	Morsø
5843	4,15	242,54	272	3,61	211	Krarup Nygård
5504	4,35	239,53	269	3,65	201	Brøstrupgård
5530	4,32	239,16	268	3,64	201	Dybvad
5236	4,56	238,70	268	3,79	199	Lundgård
5220	4,57	238,65	268	3,93	205	Kronborg
5512	4,31	237,53	267	3,66	202	Rosenfeldt
5347	4,44	237,35	267	3,52	188	Østerhåb
5497	4,30	236,64	266	3,64	200	Dybvad
5350	4,42	236,59	266	3,59	192	Vardegård
5406	4,36	235,60	265	3,50	189	Kalø
5079	4,63	235,20	265	3,58	182	Elkjær
5485	4,29	235,16	264	3,60	198	Veesbæk
5633	4,16	234,34	263	3,70	209	Fjordvang
5195	4,51	234,30	263	3,65	190	Lundgård
5218	4,48	233,73	263	3,86	201	Rosenfeldt
5396	4,33	233,55	262	3,68	199	Lundgård
5413	4,31	233,38	262	3,65	198	Brøstrupgård
5465	4,25	232,49	261	3,49	191	Lundgård
5535	4,17	230,57	258	3,50	194	Skovgård
5204	4,42	230,01	258	3,61	188	Rosenfeldt
5222	4,40	229,91	258	3,71	194	Moesgård
5236	4,37	228,89	257	3,56	186	Kronborg
5056	4,52	228,61	257	3,61	182	Vardegård
5040	4,52	227,60	256	3,73	188	Rosenfeldt
5292	4,30	227,55	255	3,76	199	Lundgård

År *Year*	Tyrens navn *Name of bull*	Reg.I stbg. *Reg. Herdbook*	Tyrens fader *Sire of bull*	Antal døtre *No. of daughters*
1963–64	Morsø Rykind	6840	Bisp	17
1966–67	**Sdj. Viktor**	7403	Blitsaerd Botermijn	18
1964–65	Ålborg Bill	6982	Rutjes Adema	20
1963–64	Sdj. Blok	e.A64	Sneeker Diamant	21
1966–67	**Randers Dijk**	7488	Adema 201 v. d. Woudhoeve .	19
1965–66	Hjørring Dolfus	7297	Dolfus	21
1965–66	Sdj. Gordon	7108	Gordon	20
1966–67	**Thy Ponto**	7257	Emmas Diamant	17
1965–66	Skive Gor	7132	Skals Gordon	18
f. 200–220 kg smørfedt:				
1965–66	Randers Nico	7031	Strib	19
1964–65	Sdj. Jarl	e.A78	Adema 21 v. d. Woudhoeve .	18
1962–63	Skive Juvel	6655	Leif	19
1964–65	Morsø Sten	6935	Ålborg Sten	19
1963–64	Hjørring Matrose ..	6818	Meister	19
1962–63	Bjerringbro Friser ..	6747	Varde Friser	19
1964–65	Skive Sultan	7131	Varde Sultan	19
1962–63	Randers Torp	6673	153 Foch	20
1963–64	Århus Coba	e.A66	Adema 21 v. d. Woudhoeve .	21
1963–64	Bjerringbro Steffen	6952	Ruyter Adema 15	19
1962–63	Sivert	6658	Blitsaerd Kl. Adema 4	18
1962–63	Sdj. Max	6763	Mario	20
1963–64	Napoleon	e.B31	Freark	20
1965–66	Herning Bern	7309	Reuter	18
1966–67	**Hjørring Simon**	7415	Blitsaerd Jakson	20
1965–66	Hammel Hoorn	7095	Paul Johannes	17
1965–66	Hornshøj Odin	7252	Adema 21 v. d. Woudhoeve .	17
1965–66	Dybbøl Drost	7283	Drost	20
1965–66	Agi	7097	Adema 21 v. d. Woudhoeve .	17
1966–67	**Varde Alfa**	7435	Darius	18
1963–64	Århus Pietje	6860	Sneeker Diamant	19
1965–66	Horsens Top	7300	Drost	19
1962–63	Varde Strib	6889	Strib	20
1966–67	**Randers Drost**	7278	Drost	20
1964–65	Varde Kes	7122	Adema 42 v. d. Laurahoeve .	17
1963–64	Lemvig Halling	6973	Ponto	17
1964–65	Thy Tax	7115	Botermijn 2	20
1965–66	Foss	7126	Foch	17
1962–63	Varde Jetze	6780	Blitsaerd Junizoon	16
g. 180–200 kg smørfedt:				
1965–66	Hjørring Bast	7298	Reuter	18
1962–63	Edvard	6663	Adema 469	17
1965–66	Morsø Lyn	7312	Reuter	19
1962–63	Hammel Jarl	6761	Gordon	18
1963–64	Ålborg Træf	6813	Adema 433	19
1962–63	Dolfus	6758	Amarilla Keizer A. Adema ..	18
1963–64	Sdj. Hof	6963	Wytsturt Annas Adema 18 ..	19

Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	Protein % *Protein %*	Mælkeprot. kg *Protein kg*	Afkomsprøvestation *Testing station*
5308	4,28	227,19	255	3,51	186	Morsø
5557	4,08	226,75	254	3,38	188	Brøstrupgård
5217	4,33	225,78	253	3,75	196	Lundgård
5101	4,41	225,20	253	3,56	182	Brøstrupgd./Lundgd.
4842	4,63	224,06	252	3,92	190	Rosenfeldt
5196	4,31	223,95	251	3,44	179	Dybvad
5772	3,86	222,73	249	3,33	192	Brøstrupgård
5324	4,17	222,13	249	3,56	190	Kronborg
5137	4,31	221,22	248	3,59	184	Krarup Nygård
4952	4,41	218,16	245	3,64	180	Kalø
5100	4,26	217,20	244	3,71	189	Brøstrupgård
4785	4,50	215,51	242	3,67	175	Krarup Nygård
4851	4,42	214,57	241	3,58	173	Morsø
4561	4,70	214,32	241	3,89	177	Dybvad
4753	4,50	214,06	241	3,71	176	Kalø
4818	4,43	213,25	240	3,80	183	Krarup Nygård
5066	4,21	213,21	239	3,60	182	Kalø
4809	4,40	211,59	238	3,69	178	Elkjær
5026	4,21	211,58	237	3,56	179	Kalø
4902	4,32	211,53	237	3,66	179	Kalø
4998	4,22	210,94	237	3,56	178	Brøstrupgård
4886	4,31	210,45	236	3,64	178	Lundgård
4777	4,40	210,29	236	3,77	180	Moesgård
4904	4,26	208,99	234	3,70	182	Dybvad
4644	4,50	208,89	235	3,59	167	Kalø
4594	4,52	207,70	233	3,65	168	Lægård
4825	4,30	207,65	233	3,64	176	Veesbæk
4900	4,23	207,10	232	3,62	177	Rosenfeldt
4703	4,40	206,77	232	3,71	174	Vardegård
4564	4,49	205,03	230	3,61	165	Elkjær
4764	4,29	204,30	229	3,40	162	Østerhåb
4932	4,14	204,03	229	3,43	169	Skølvad
4829	4,22	203,87	229	3,74	180	Rosenfeldt
4701	4,33	203,53	228	3,84	180	Vardegård
4895	4,15	202,95	227	3,55	174	Lægård
4434	4,56	202,12	227	3,64	162	Kronborg
4994	4,02	200,84	225	3,48	174	Rosenfeldt
4602	4,35	200,17	225	3,64	168	Vardegård
4470	4,47	199,94	225	3,74	167	Dybvad
4608	4,32	199,27	224	3,67	169	Kalø
4738	4,20	198,92	223	3,53	167	Morsø
4822	4,12	198,64	223	3,59	173	Rosenfeldt
4315	4,60	198,32	223	3,75	162	Lundgård
4695	4,17	195,92	220	3,57	168	Lundgård
4615	4,24	195,82	220	3,55	164	Brøstrupgd./Lundgd.

År *Year*	Tyrens navn *Name of bull*	Reg./ stbg. *Reg. Herdbook*	Tyrens fader *Sire of bull*	Antal døtre *No. of daughters*
1963–64	Haskera	6903	Jelsumer Gerard Wouter	19
1966–67	**Hjørring Drost**	7502	Drost	17
1964–65	Bjarke	7087	Blitsaerd Jet Adema	18
1963–64	Varde Jens	7117	Ruyter Adema 24	17
1966–67	**Sdj. Trin**	7407	Trinton	20
1962–63	Dybbøl Vinding	6796	Strand	17
1962–63	Sdj. Dorn	6766	Domino	19
1962–63	Varde Sultan	6778	Sieger	20
1962–63	Varde Ruyter	6776	Wytsturt Annas Adema 2	20
1963–64	Sdj. Erko	6765	Eros	17
1963–64	Varde Kejser	6916	Roosjes Keizer Adema	18
1965–66	Give Dolfus	7082	Dolfus	19
1963–64	Berk	6904	Ruyter Adema 15	20
1963–64	Egholm Ponto	6851	Ponto	19
h. 160–180 kg smørfedt:				
1962–63	Thy Elm	6787	Gordon	17
1966–67	**Herning Drost**	7308	Drost	19
1963–64	Skive Holt	6811	Piet Eduard	20
1962–63	Give Bast	6791	Bast	17
1962–63	Herning Strib	6828	Striben Trumf	17
1965–66	Århus Adema	7255	Wytsturt Annas Adema 2	18
1963–64	Herning Samiel	6832	Haskera Gouverneur	16
1965–66	Randers Farsø	7276	Dolfus	20
1963–64	Varde Titus	6918	Jan 38	20
1962–63	Varde Mark	6779	Dieter	20
i. 140–160 kg smørfedt:				
1962–63	Thy Marloo	6680	Klaaskes Piet	17
1964–65	Randers Blok	7114	Amarilla Keizer A. Adema	19
1964–65	Randers Juul	7033	Piet Eduard	18
Jerseyrace:				
c. 260–280 kg smørfedt:				
1962–63	Milo	2582	Fåborg Blach	20
1965–66	Skærup Prins	3370	Brygger 36	20
1966–67	**Bornholms Brygger**	3009	Brygger 36	16
1963–64	Morsø Bremer	2661	Kattrup Ægir	19
1966–67	**Fyns Glen**	3224	Glenmore Royal Guide	19
d. 240–260 kg smørfedt:				
1966–67	**Årup Vestfyns Flink**	3390	Fyns Lynggård	21
1963–64	Hjørring Alf	2623	Millinge Munk	19
1962–63	Fåborg Gibs	e.137	Piet Nørremark	19
1962–63	Nordfyns Russ	e.138	Holm Vestfyn	19
1966–67	**Årup Vestfyns Boy**	3391	Coralads Dream Boy	19
1964–65	Ålborg Ægir	2979	Kattrup Ægir	14
1963–64	Hjørring Prins	2625	Prins Nørremark	19

Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	Protein % *Protein %*	Mælkeprot. kg *Protein kg*	Afkomsprøvestation *Testing station*
4507	4,33	195,25	219	3,82	172	Rosenfeldt
4489	4,30	192,91	216	3,83	172	Dybvad
4282	4,49	192,38	216	3,84	165	Lundgård
4556	4,20	191,27	214	3,33	152	Vardegård
4632	4,10	189,93	213	3,57	165	Brøstrupgård
4463	4,24	189,30	212	3,86	172	Veesbæk
4512	4,19	189,17	212	3,67	166	Brøstrupgård
4398	4,26	187,52	210	3,58	157	Vardegård
4336	4,29	185,86	209	3,66	159	Skølvad
4384	4,22	185,10	208	3,55	156	Brøstrupgård
4067	4,53	184,35	207	3,77	153	Vardegård
4269	4,30	183,71	206	3,56	152	Skovgård
4114	4,44	182,62	205	3,94	162	Rosenfeldt
4439	4,07	180,66	202	3,34	148	Kalø
4416	4,05	179,05	200	3,56	157	Thousgård
4223	4,14	174,67	196	3,71	157	Moesgård
4158	4,18	173,52	195	3,61	150	Krarup Nygård
3943	4,37	172,30	193	3,75	148	Skovgård
3970	4,27	169,47	190	3,66	145	Moesgård
4008	4,19	167,80	188	3,44	138	Elkjær
3868	4,33	167,49	188	3,81	148	Moesgård
3850	4,32	166,47	187	3,57	138	Kalø
3972	4,18	166,03	186	3,58	142	Skølvad
3789	4,35	164,85	185	3,72	141	Skølvad
3614	4,40	158,91	178	3,71	134	Thousgård
3564	4,41	157,29	177	3,77	134	Kalø
3600	4,17	150,17	168	3,69	133	Kalø
4227	6,54	276,56	314	4,26	180	Gyldenagergård
4115	6,44	264,87	301	4,08	168	Skovgård
4061	6,51	264,30	300	4,24	172	Kannikegård
3900	6,75	263,21	299	4,27	166	Morsø
3987	6,60	263,01	299	4,48	179	Enemærket
3838	6,77	259,73	295	4,26	164	Ejstrupgård
3804	6,73	256,08	291	4,38	167	Dybvad
3778	6,76	255,53	291	4,65	176	Morsø
3860	6,61	255,28	290	4,44	171	Enemærket
3802	6,67	253,60	288	4,38	166	Ejstrupgård
4143	6,01	249,15	282	4,20	174	Lundgård
3712	6,69	248,36	282	4,34	161	Dybvad

År *Year*	Tyrens navn *Name of bull*	Reg./stbg. *Reg. Herdbook*	Tyrens fader *Sire of bull*	Antal døtre *No. of daughters*
1966–67	**Fyns Ib**	3242	Sydfyns Ifa	20
1966–67	**Hjørring Georg**	3012	B.W.B.	19
1964–65	Hjørring Plet	2624	Plet Nørremark	18
1966–67	**Lund**	3382	Fyns Lynggård	18
1966–67	**Horsens Bak**	3180	Hjørring Bob	17
1962–63	Sydvestfyns Plet	2586	Fyns Vix	19
e. 220–240 kg smørfedt:				
1962–63	Egholm Dagnæs	2452	Kattrup Ægir	19
1964–65	Sydvestfyns Bull	3063	Fåborg Lyng	20
1965–66	Åbenrå Ægir	2715	Kattrup Ægir	20
1966–67	**Primus Syd**	3204	Primus	16
1964–65	Århus Heg	2959	Eg	18
1962–63	Midtsjællands Adam	2599	Wilmann	20
1963–64	Årup Vestfyns Stig	2719	Edelslund Knægt	20
1966–67	**Åbenrå Vix**	3089	Abildmads	18
1963–64	Primus	2841	Prins Nørremark	17
1964–65	Ask Nordvest	2988	Prins Nørremark	19
1963–64	Nordfyns B.W.	2801	B.W.B.	18
1964–65	Dybbøl Plet	2871	Plet Nørremark	19
1966–67	**Randers Knægt**	3056	Plet Nørremark	20
1964–65	Egholm Hans	3067	Hans	19
1966–67	**Dybbøl Hans**	3376	Hans	19
1963–64	Randers Masta	2620	Hans	18
1962–63	Hornshøj Vad	2597	Edelslund Knægt	15
1965–66	Askov Syd	3203	B.W.B.	20
1963–64	Morsø Blach	2660	Fåborg Blach	20
1965–66	Brage	3205	B.W.B.	19
1964–65	Brams	2958	Abildmads	19
1966–67	**Morsø Bæk**	3389	B.W.B.	20
1964–65	Klokker	2847	Plet Nørremark	18
1963–64	Bjerringbro Skov	2831	Kattrup Ægir	18
f. 200–220 kg smørfedt:				
1964–65	Skærup Rye	2975	Per	18
1962–63	Elkær	2600	Kattrup Ægir	19
1965–66	Plet Syd	3202	Lyngsie Nørremark	20
1963–64	Århus Lyng	2755	Prins Nørremark	19
1966–67	**Århus Max**	3381	B.W.B.	20
1965–66	Årup Vestfyns Dam	2827	Holm Vestfyn	20
1962–63	Randers Mo	2598	Kattrup Ægir	19
1964–65	Horn Syd	2891	Granat	19
1964–65	Horsens Pletto	2864	Plet Nørremark	18
1963–64	Langelands Seden	2589	Fyns Vix	20
1962–63	Ollerup	2443	Kattrup Ægir	18
1963–64	Hadsten Milling	2470	Millinge Munk	15
1964–65	Prins Syd	2892	Prins Nørremark	19
1964–65	Manna Syd	3043	Hans	14
1963–64	Dybbøl Munk	2812	Millinge Munk	18

Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	Protein % *Protein %*	Mælkeprot. kg *Protein kg*	Afkomsprøvestation *Testing station*
3787	6,46	244,59	278	4,38	166	Grønhøjgård
3574	6,84	244,54	278	4,47	160	Dybvad
3759	6,49	244,09	277	4,28	161	Dybvad
3726	6,50	242,29	275	4,23	158	Kalø
3723	6,51	242,21	275	4,28	159	Østerhåb
3626	6,67	241,68	275	4,60	167	Ejstrupgård
3652	6,56	239,57	272	4,21	154	Skovgård
3537	6,77	239,32	272	4,28	152	Ejstrupgård
3736	6,39	238,67	271	4,18	156	Dybvad
3751	6,30	236,20	268	4,14	155	Skølvad
3680	6,35	233,64	265	4,13	152	Elkjær
3490	6,69	233,45	265	4,25	148	Grønhøjgård
3712	6,29	233,44	265	4,30	160	Fyn
3470	6,72	233,26	265	4,58	159	Moesgård
3641	6,38	232,45	264	4,32	157	Kalø
3652	6,36	232,24	264	4,25	155	Gyldenagergård
3694	6,26	231,40	263	4,22	156	Fyn
3609	6,37	229,89	261	4,51	163	Veesbæk
3557	6,44	229,19	260	4,38	156	Kalø
3547	6,44	228,37	259	4,36	155	Skovgård
3683	6,19	227,93	259	4,19	154	Veesbæk
3628	6,28	227,84	259	4,14	150	Kalø
3705	6,10	226,19	257	4,08	151	Moesgård
3647	6,17	224,96	255	4,54	166	Lundgård
3305	6,78	224,12	255	4,23	140	Morsø
3361	6,65	223,47	254	4,19	141	Kalø
3363	6,64	223,36	254	4,39	148	Kalø
3311	6,73	222,88	253	4,28	142	Morsø
3463	6,41	222,12	252	4,54	157	Kalø
3418	6,46	220,65	251	4,33	148	Kalø
3332	6,56	218,63	248	4,38	146	Skovgård
3428	6,37	218,51	248	4,22	145	Østerhåb
3414	6,34	216,44	246	4,26	145	Skølvad
3350	6,46	216,42	246	4,43	148	Elkjær
3228	6,68	215,77	245	4,46	144	Elkjær
3235	6,64	214,83	244	4,27	138	Ejstrupgård
3458	6,21	214,82	244	4,35	151	Kalø
3726	5,73	213,54	242	4,18	156	Skølvad
3107	6,87	213,41	243	4,45	138	Østerhåb
3130	6,81	213,24	242	4,56	143	Fyn
3323	6,39	212,39	241	4,53	151	Dybvad
3325	6,38	212,07	241	4,36	145	Kalø
3567	5,88	209,89	238	4,13	147	Skølvad
3153	6,65	209,83	238	4,45	140	Vardegård
3229	6,49	209,51	238	4,59	148	Veesbæk

År / *Year*	Tyrens navn / *Name of bull*	Reg./ stbg. / *Reg. Herdbook*	Tyrens fader / *Sire of bull*	Antal døtre / *No. of daughters*
1962–63	Bjerringbro Blach ..	2706	Fåborg Blach	19
1965–66	Hjørring Løkke	3011	Årup Løkke	17
1966–67	**Sydvestfyns Car**	3396	Fyns Lynggård	19
1962–63	Hjørring Hylle	2621	Fåborg Blach	20
1963–64	Fåborg Lyng	2588	Millinge Munk	20
1965–66	Skive Plet	3065	Plet Nørremark	20
1964–65	Hjørring Erik	2626	Plet Nørremark	17
1966–67	**Randers Just**	3371	Brygger 36	19
g. 180–200 kg smørfedt:				
1964–65	Fyns Neka	2987	Sydfyns Neffo	20
1962–63	Dybbøl Prins	2712	Prins Nørremark	20
1965–66	Hadsten Algir	2545	Kattrup Ægir	17

Dansk Rødbroget Kvæg:

h. 160–180 kg smørfedt:

1963–64	Åbenrå Reform	3298	Salomo	20

Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	Protein % *Protein %*	Mælkeprot. kg *Protein kg*	Afkomsprøvestation *Testing station*
3121	6,69	208,93	237	4,46	139	Kalø
3132	6,66	208,69	237	4,17	131	Dybvad
3064	6,80	208,50	237	4,30	132	Ejstrupgård
3097	6,70	207,64	236	4,43	137	Dybvad
3140	6,57	206,33	234	4,09	128	Østerhåb
3105	6,53	202,80	230	4,30	134	Morsø
2936	6,88	202,05	230	4,41	129	Dybvad
3244	6,18	200,57	228	4,23	137	Kalø
3021	6,59	198,99	226	4,20	127	Enemærket
2909	6,30	183,26	208	4,46	130	Veesbæk
2831	6,45	182,71	208	4,34	123	Kalø
4278	4,07	173,98	195	3,52	151	Brøstrupgård

Tabel 2. Tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner.

Table 2. Bulls with 3 or more tested sons

Sønner / *Sons*	Stbg./ reg. nr. / *Herdbook or Reg. No.*	Døtrenes ydelse / *Yield of daughters* mælk kg / *Milk kg*	fedt % / *Fat %*	smørfedt kg / *Butterfat kg*	smør kg / *Butter kg*	Morfader / *Maternal grandsire*
RDM:						
Sortemose:						
Kolding Top 69 ..	e.A5044	5976	4,60	274,84	309	Ulvsager
° Rudme Ideal	e.A4864	5522	4,89	269,92	304	Ulvsager
Stevns Ry	e.A5028	5814	4,60	267,50	301	Buster
° Elbo Sortemose ..	e.A4902	5366	4,95	265,79	300	Valde
° Hjørring Munkdrup	e.A4906	5447	4,77	259,79	293	Randers Kronjyden
Kolding Sortem. 28	e.A4980	5216	4,95	258,37	291	Kolding Kærsholm
Holbæk Rumo ..	e.B4929	5530	4,43	245,21	275	Rudo
Randers Sortemose	28318	5587	4,38	244,69	275	Hadsten Wahl
Samsø Frej	28442	5225	4,66	243,46	274	Holbæk Frøy
Skærup Karlby ..	28039	5380	4,36	234,71	264	Hjørring Ejler
* ° Ørnmose	26200	5303	4,36	231,03	259	Ørnsvig 200
Hjørring Bakke ..	27447	4837	4,75	229,69	259	Buster
Give Uno	27884	5016	4,58	229,65	258	Tyrstr. Lombjerge
Give Ask	28612	4718	4,86	229,42	259	Morsø Wahl
Varde Ott	28085	4929	4,60	226,52	255	Ott
° Lokker	e.A4922	4995	4,50	224,71	253	Thor
* ° Moes	25739	5230	4,28	223,76	251	Brethvig
° Bornholms Gulldal	4841	4790	4,64	222,06	250	Kærsholm Højager
Varde Bol	27832	4901	4,53	221,94	250	Buster
Ribe Dan	28084	5046	4,39	221,56	249	Høj
° Thy Moes	26472	4872	4,54	221,19	249	Ulvsager
Bjørn Sydvest	28112	4868	4,54	221,05	249	Buster
Kolding Ejlekær 83	28076	4839	4,55	220,20	248	Nico
* ° Himmerbo	26588	5016	4,37	219,17	246	Lem Uffe
* ° Ribe Pors	26165	5015	4,33	217,31	244	Hammer
Rør Nordvest	e.A5026	4927	4,40	216,93	244	Buster
Erslev	28383	4465	4,71	210,38	237	Hadsten Wahl
° Tyrstrup Brethmose	e.B4947	4674	4,49	209,74	236	Brethvig
° Hjørring Sortemose	26486	4494	4,46	200,36	225	Højvig 136
° Gråsten Sortemose.	26780	4393	4,54	199,42	224	Hadsten Malm
30 sønner. Døtres gns.		5080	4,57	232,01	261	
Sverre:						
Uwe	28146	6427	4,69	301,32	339	Ålborg Wahl
Thy Høj	e.B4973	6259	4,34	271,88	305	Høj
Samsø Dux	e.B4969	5335	4,89	260,78	294	Kolding Valdal 174
Kolding Sverre 38 .	27941	5170	4,75	245,61	277	Rørby Øst
Dybbøl Sverre	27871	5457	4,46	243,40	274	Øjvind
Veto	27955	5139	4,64	238,23	268	Toke Sams
Skive Himmerbo ..	27182	5195	4,50	233,76	263	Ålborg Wahl

* 3 gange daglig malkning i vinterhalvåret.

° Fedtbestemmelsen foretaget med 11 ml mælk.

(fortsættes næste side)

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse mælk kg	fedt %	smørfedt kg	smør kg	Morfader
Sons	*Herdbook or Reg. No.*	*Yield of daughters Milk kg*	*Fat %*	*Butterfat kg*	*Butter kg*	*Maternal grandsire*
Hjørring Sverre ..	27654	5441	4,29	233,54	262	Højvig 47
Kær Vestlolland ..	e.B4961	5203	4,45	231,32	260	Kærsholm Højager
Holbæk Klak	28115	5119	4,48	229,26	258	Lem Uffe
Møns Eg	e.B4939	5305	4,29	227,56	255	Højvig 47
Egholm Tyrsted ..	28351	4752	4,75	225,69	254	Toke Sams
° Skjern Sverre	26471	4532	4,91	222,31	251	Loke
Åbenrå Bro	27837	4842	4,51	218,33	245	Nordfyns Vang
Sverhøj	e.B4959	4874	4,45	217,00	244	Ejlekær
Morsø Sverre	26393	5174	4,17	215,64	242	Højvig 136
Rødding Sverre ..	27411	4593	4,66	214,10	241	Rode
Fåborg Øvli	27781	4586	4,62	212,06	239	Ørnsager
Varde Ting	27833	4514	4,48	202,33	227	Højvig 47
Rex	28102	4872	4,15	202,00	226	Morsø Vinkel
Årup Vestfyns Smed	28184	4350	4,57	198,58	223	Ørnsvig 200
Sydfyns Vik	27790	4290	4,55	195,25	220	Sydfyns Hess
Give Paw	27883	4191	4,41	184,67	207	Birk
23 sønner. Døtres gns.		5027	4,52	227,16	255	
Rudme Ideal:						
Holme Øst	e.B4957	5955	4,62	275,25	310	Sverre
Dybbøl Ideal	28328	6075	4,42	268,45	302	Guldbjerg Ulvsager
Hornshøj Ideal ..	28057	5553	4,73	262,38	295	Valdal
Ribe Ulf	28083	5626	4,64	261,19	294	Fåborg Elg
Drot Østlolland ..	27694	5581	4,67	260,86	294	Rudme Flax
Skive Ideal	28096	5842	4,41	257,86	290	Anders II
Ålborg Børge	28372	5520	4,63	255,84	288	Buster
Dybbøl Holm	28377	5373	4,73	254,22	286	Ulvsager
Skærup Bus	28388	5521	4,48	247,31	278	Bus
Bjerringbro King ..	27881	5149	4,63	238,25	268	Rudme Flax
Varde Rud	28086	5359	4,44	237,78	267	Rudme Fynbo
Hjørring Iver	28352	4949	4,66	230,44	259	Toke Sams
Århus Niels	28020	5345	4,28	228,76	257	Morsø Wahl
Centrums Prik	28187	4946	4,56	225,46	254	Rudme Flax
Tyrstrup Buster ..	28066	4950	4,52	223,58	251	Buster
Randers Ideal	e.B4971	4827	4,59	221,41	249	Nordfyns Gjald
Holbæk Allaks ..	28117	4804	4,61	221,38	249	Rudme Flax
Rødding Dal	28418	4711	4,67	219,84	247	Ålborg Wahl
Skjern Tvind	27804	4270	4,96	211,95	239	Nordfyns Gjald
19 sønner. Døtres gns.		5282	4,59	242,22	272	
Hadsten Wahl:						
Horsens Borg	28051	5805	4,52	262,32	295	Buster
Rudme Unik	e.A5018	5544	4,54	251,66	283	Dan
Bonus	27960	5628	4,42	248,67	279	Guldbjerg Dan

° Fedtbestemmelsen foretaget med 11 ml mælk.

(fortsættes næste side)

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse mælk kg	fedt %	smørfedt kg	smør kg	Morfader
Sons	*Herdbook or Reg. No.*	*Yield of daughters Milk kg*	*Fat %*	*Butterfat kg*	*Butter kg*	*Maternal grandsire*
Skov	28333	5397	4,55	245,69	276	Sortemose
Nordfyns Aman	28192	5201	4,68	243,43	274	Rudme Ideal
Åbenrå Øbo	28100	5497	4,36	239,93	269	Sydøstfyns Brage
Kolding Wahl 44	e.A5042	5571	4,26	237,20	266	Rolf
Rødding Claus	27839	5274	4,25	223,93	251	Hadsten Juvel
Rør	27957	4862	4,58	222,86	251	Buster
Bakager Wahl	28062	5002	4,41	220,41	248	Ejlekær
Kolding Pall 23	28081	4915	4,37	214,90	241	Højvig 47
Vald Nordvest	28126	4667	4,54	211,95	238	Kolding Valdal 174
Thy Skov	28440	4832	4,37	210,96	237	Sortemose
Bornholms Ran	e.A5004	4839	4,31	208,47	234	Uffe Ørnsvig
Djurs Wahl	28311	4784	4,35	208,13	234	Loke
Tyrstrup Bent	27842	4533	4,51	204,42	230	Rudme No
16 sønner. Døtres gns.		5147	4,44	228,43	257	
Morsø Ejlekær:						
Nordfyns Nich	e.A5016	5362	4,63	248,33	279	Morsø Wahl
Skive Rajs	28097	5199	4,64	241,28	271	Rajs
Hjørring Od	27295	5383	4,34	233,81	262	Toke Sams
Oll Nordvest	27770	5223	4,39	229,45	258	Ørnsvig 136
Hammel Ejlekær	e.A5036	5100	4,49	228,93	257	Morsø Uffe
Hornshøj Knold	e.A5012	5036	4,50	226,64	255	Ørnsvig 136
Næstved Kærvig	e.A4994	5421	4,12	223,33	250	Flax Alsvig
Ejler Østlolland	27502	5212	4,28	223,27	251	Toke Sams
Elo	27402	5032	4,39	221,10	248	Loke
Horsens Od	28053	4867	4,49	218,44	246	Sortemose
Lemvig Ejlekær	27849	5110	4,27	218,43	245	Rajs
Støtt	27953	4661	4,63	215,92	243	Hadsten Malm
Varde Nør	27124	4826	4,39	212,01	238	Morsø Buster
13 sønner. Døtres gns.		5110	4,43	226,23	254	
Randers 47:						
Ask Nøddekær	e.A5024	5532	4,48	247,86	279	Randers Loke
Bornholms Titov	e.A5032	5107	4,79	244,40	275	Morsø Wahl
Hjørring Eli	27877	5164	4,55	235,22	265	Randers Dan
Reza	e.A4956	5238	4,30	225,37	253	Bryde
Hjørring Gert	27639	4669	4,74	221,49	249	Randers Lyn
Herning Hav	28001	5101	4,32	220,44	247	Morsø Wahl
Varde Sven	27865	4841	4,49	217,55	245	Randers Loke
Herning Leif	28344	5157	4,20	215,84	242	Leif
Thy 47	28091	4940	4,18	206,71	232	Morsø Wahl
Ribe Bjarke	27827	4799	4,17	200,26	224	Ørnsager
Herning Ørsted	28003	4497	4,42	198,88	223	Stenhøj
11 sønner. Døtres gns.		5004	4,42	221,27	249	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse mælk kg	fedt %	smørfedt kg	smør kg	Morfader
Sons	*Herdbook or Reg. No.*	*Yield of daughters Milk kg*	*Fat %*	*Butterfat kg*	*Butter kg*	*Maternal grandsire*
Hjørring Munkdrup:						
Samsø Ulf	28302	5847	4,61	269,40	303	Ørnsvig 136
Sydfyns Allan	e.A5020	5159	4,65	239,67	270	Ørnsvig 136
Ribe Aks	28423	5515	4,21	232,06	260	Randers Loke
Sydvestfyns Pol ..	28183	4747	4,73	224,64	253	Randers Lyn
Ribe Klint	28421	4515	4,35	196,63	221	Horsens Klint
Kolding Munk 143	28382	4201	4,47	187,66	211	No Brethvig
6 sønner. Døtres gns.		4997	4,50	225,01	253	
Stevns Klint:						
Århus Hof	28400	5379	4,22	227,10	255	Rud
Varde Grøn	28430	4795	4,45	213,61	240	Hermes
Århus Klint	28060	4422	4,31	190,61	214	Hermes
3 sønner. Døtres gns.		4865	4,33	210,44	236	
SDM:						
Gordon:						
Kolding Gordon 39	7304	5897	4,27	251,63	282	Ponto
Ry	7066	5643	4,32	243,61	273	Bernhard
° Bjerringbro Bert ..	6638	5426	4,46	242,13	272	Absalon
Skals Gordon	e.A30	5236	4,56	238,70	268	Leopold
Randers Gordon ..	e.A58	5512	4,31	237,53	267	Bernhard
Nego	e.B37	5204	4,42	230,01	258	Bulle
° Give Gordon	e.B19	5248	4,38	229,63	258	Bernhard
Sdj. Gordon	7108	5772	3,86	222,73	249	Bernhard
° Judon	e.B23	4909	4,25	208,78	234	Bernhard
° Bjerringbro Cim ..	6639	4643	4,30	199,51	224	Evert 87
Hammel Jarl	6761	4822	4,12	198,64	223	Rubin
Thy Elm	6787	4416	4,05	179,05	200	Butenmoark Juweel
12 sønner. Døtres gns.		5227	4,28	223,50	251	
Drost:						
Skive Hal	7464	5843	4,15	242,54	272	Eduard
Egholm Drost	7516	5535	4,17	230,57	258	Gordon
Dybbøl Drost	7283	4825	4,30	207,65	233	Gordon
Horsens Top	7300	4764	4,29	204,30	229	Ponto
Randers Drost	7278	4829	4,22	203,87	229	Theo
Hjørring Drost ..	7502	4489	4,30	192,91	216	Foch
Herning Drost	7308	4223	4,14	174,67	196	Ålborg Sten
7 sønner. Døtres gns.		4930	4,22	208,07	233	

° Fedtbestemmelsen foretaget med 11 ml mælk.

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse: mælk kg	fedt %	smørfedt kg	smør kg	Morfader
Sons	*Herdbook or Reg. No.*	*Yield of daughters: Milk kg*	*Fat %*	*Butterfat kg*	*Butter kg*	*Maternal grandsire*
Jerseyrace:						
Hans:						
° Hjørring Bob	2296	3663	6,55	239,97	273	Palle Billesbølle
° Lars	2359	3565	6,54	232,98	265	Max Oddenbo
Egholm Hans	3067	3547	6,44	228,37	259	Abildknægt
Dybbøl Hans	3376	3683	6,19	227,93	259	Munkgård
Randers Masta ..	2620	3628	6,28	227,84	259	Palle Billesbølle
* ° Mos	2222	3332	6,57	219,06	249	Abildknægt
° Kvik	2360	3319	6,55	217,25	247	Abildknægt
Manna Syd	3043	3153	6,65	209,83	238	Max Abildknægt
* ° Ålborg Kam	1685	3188	5,94	189,48	215	Abildknægt
° Fåborg Dukat	2260	2944	6,30	185,37	210	Abildknægt
10 sønner. Døtres gns.		3412	6,38	217,81	247	
Plet Nørremark:						
Fåborg Gibs	e.137	3778	6,76	255,53	291	Kattrup Ægir
Hjørring Plet	2624	3759	6,49	244,09	277	Edelslund Knægt
Dybbøl Plet	2871	3609	6,37	229,89	261	Fyns Vix
Randers Knægt ..	3056	3557	6,44	229,19	260	Edelslund Knægt
Klokker	2847	3463	6,41	222,12	252	Thise Indslev
Horsens Pletto	2864	3107	6,87	213,41	243	Max
Skive Plet	3065	3105	6,53	202,80	230	Abildknægt
Hjørring Erik	2626	2936	6,88	202,05	230	Max
8 sønner. Døtres gns.		3414	6,59	224,89	256	
B.W.B.:						
Hjørring Georg ..	3012	3574	6,84	244,54	278	Max
Nordfyns B.W. ..	2801	3694	6,26	231,40	263	Prins Garbo
Askov Syd	3203	3647	6,17	224,96	255	Nybølle Baun
Brage	3205	3361	6,65	223,47	254	Brygger 36
Morsø Bæk	3389	3311	6,73	222,88	253	Kattrup Ægir
Århus Max	3381	3228	6,68	215,77	245	Max
6 sønner. Døtres gns.		3469	6,55	227,17	258	
Brygger 36:						
Skærup Prins	3370	4115	6,44	264,87	301	Hjørring Esbern
Bornholms Brygger	3009	4061	6,51	264,30	300	Hans
Randers Just	3371	3244	6,18	200,57	228	Lasse 30
3 sønner. Døtres gns.		3807	6,39	243,25	276	
Fyns Lynggård:						
Årup Vestfyns Flink	3390	3838	6,77	259,73	295	Millinge Munk
Lund	3382	3726	6,50	242,29	275	Millinge Munk
Sydvestfyns Car ..	3396	3064	6,80	208,50	237	Fyns Vix
3 sønner. Døtres gns.		3543	6,68	236,84	269	

* 3 gange daglig malkning i vinterhalvåret.

° Fedtbestemmelsen foretaget med 11 ml mælk.

usædvanlig god for holdene efter Holme Øst, Drot Østlolland og Århus Niels, men det kneb til gengæld med malkbarheden hos flere af de øvrige hold, og på nogle af holdene har kvierne været lidt for malkeprægede. Rudme Ideal har været enestående til at producere sønner med fremragende anlæg til såvel høj mælkeydelse som høj fedtprocent.

De 16 sønner efter Hadsten Wahl nåede en gennemsnitsydelse på 257 kg smør. Den højeste smørydelse opnåedes på holdene efter Horsens Borg og Rudme Unik. Et par af holdene opnåede ikke en helt tilfredsstillende middelfedtprocent, men for gruppen som helhed opnåedes en pæn middelfedtprocent. Eksteriøret var meget fremragende på flere af de højestydende hold, og der er grund til at fremhæve holdene efter Horsens Borg, Bonus, Nordfyns Aman, Åbenrå Øbo og Kolding Wahl 44, da kvierne på disse hold var meget velbyggede.

Efter Morsø Ejlekær er afprøvet 13 sønner, og gennemsnitsydelsen for disse hold blev 254 kg smør. Der findes ingen udpræget højt- eller lavtydende hold i denne gruppe, idet holdenes ydelse placerer sig i nærheden af gruppens gennemsnit.

Der er afprøvet 11 sønner efter Randers 47, og det gennemsnitlige afkomsprøveresultat blev 249 kg smør. Holdene i denne gruppe opnåede som helhed ikke tilfredsstillende malkbarhedsresultater.

Det gennemsnitlige afkomsprøveresultat for de 6 sønner efter Hjørring Munkdrup blev 253 kg smør. Der er meget stor variation i ydelsen i denne gruppe, hvor holdet efter Samsø Ulf kan betegnes som højtydende, hvorimod de to lavestydende hold ikke nåede tilfredsstillende ydelsesresultater.

Gennemsnitsresultatet for de 3 afkomsprøvehold efter sønner af Stevns Klint blev kun 236 kg smør. Ingen af holdene opnåede høje ydelsesresultater. Kvierne på disse 3 hold var ikke så robuste, som man kunne ønske.

Inden for Sortbroget Dansk Malkerace er anført to grupper.

Der er afprøvet 12 sønner efter Gordon, og det gennemsnitlige afkomsprøveresultat for disse hold blev 251 kg smør. Flertallet af disse hold opnåede pæne ydelsesresultater, og de to højestydende hold var efter Kolding Gordon 39 og Ry, som begge blev afprøvet i det forløbne år.

Efter Drost er afprøvet 7 sønner, men holdenes gennemsnitsydelse blev kun 233 kg smør. De lavestydende hold opnåede ikke tilfredsstillende ydelsesresultater. Holdet efter Skive Hal opnåede gruppens højeste ydelsesresultat, og kvierne på dette hold var meget velbyggede og usædvanlig ensartede.

Inden for Jerseyracen findes 5 grupper.

Gruppen efter Hans omfatter 10 hold, og gennemsnitsydelsen blev 247 kg smør. De højeste ydelser opnåedes på holdene efter Hjørring Bob og Lars. De to lavestydende hold opnåede ikke tilfredsstillende ydelsesresultater.

Plet Nørremark har fået afprøvet 8 sønner, hvis gennemsnitlige afkomsprøveresultat blev 256 kg smør. Der er særdeles gode fedtprocenter i denne gruppe, hvor holdene efter Fåborg Gibs og Hjørring Plet opnåede de fineste ydelsesresultater.

Efter B.W.B. er afprøvet 6 sønner, og gennemsnitsydelsen for disse hold blev 258 kg smør. Der er stor ensartethed i holdenes gennemsnitlige smørydelse i denne gruppe. Holdet efter Hjørring Georg var det højestydende, og kvierne på dette hold var meget velbyggede og af tiltalende type.

De 3 afkomsprøvede sønner efter Brygger 36 fik et gennemsnitligt afkomsprøveresultat på 276 kg smør. Holdene efter Skærup Prins og Bornholms Brygger var meget højtydende, medens ydelsen ikke blev tilfredsstillende for det tredie hold.

Det gennemsnitlige afkomsprøveresultat for de 3 sønner efter Fyns Lynggård blev 269 kg smør. Det højestydende hold var efter Årup Vestfyns Flink, og dette hold udmærkede sig ved, at kvierne var meget ensartede, velbyggede og af god type.

II. Afkomsprøverne 1966-67.

Beretningen omfatter 77 tyre, hvis døtre blev afprøvet på 25 stationer.

Jylland:

Dybvadgård, Dybvad: Hjørring Eli, Hjørring Iver, Hjørring Domino, Hjørring Simon, Hjørring Drost og Hjørring Georg.

Kronborg, Thisted: Thy Skov og Thy Ponto.

Morsø, Nykøbing Mors: Skærup Bus, Ry og Morsø Bæk.

Lundgård, Overlade: Ålborg Børge, Skov, Randers Sortemose og Swea.

Krarup Nygård, Skive: Skive Rajs og Skive Hal.

Lægård, Holstebro: Ringkøbing Holm og Skærup Karlby.

Rosenfeldt, Ulstrup: Bjerringbro Basta, Randers Dijk og Randers Drost.

Kalø Hovedgård, Rønde: Bakager Wahl, Erslev, Djurs Wahl, Hadsten Gert, Bøg, Lund, Randers Knægt og Randers Just.

Elkjær, Hornslet: Århus Hof, Århus Ask og Århus Max.

Moesgård, Kibæk: Åbenrå Øbo, Herning Drost og Åbenrå Vix.

Østerhåb, Hatting: Horsens Bitz, Rødding Frem, Horsens Gert og Horsens Bak.

Skovgård, Ammitsbøl, Vejle: Skærup Munk, Give Ask, Egholm Gran og Egholm Drost.

Vardegård, Varde: Varde Grøn, Varde Kry, Varde Diamant og Varde Alfa.
Gelballegård, Lunderskov: Kolding Pall 23, Kolding Munk 143 og Kolding Gordon 39.
Skølvad, Gørding: Ribe Aks, Ribe Frem, Ribe Klint, Varde Stefan og Primus Syd.
Brøstrupgård, Rødding: Rødding Ursus, Sdj. Aksel, Sdj. Viktor og Sdj. Trin.
Veesbæk, Sønderborg: Dybbøl Holm, Sdj. Ark og Dybbøl Hans.

Samsø:

Tyregården, Brundby: Samsø Frej.

Fyn:

Ejstrupgård, Kavslunde: Årup Vestfyns Flink, Årup Vestfyns Boy og Sydvestfyns Car.
Enemærket, Lunde: Nordfyns Aman, Centrums Prik og Fyns Glen.

Sjælland:

Gyldenagergård, Høng: Uwe.
Torntofte, Høng: Holbæk Allaks og Vald Nordvest.
Grønhøjgård, Fårdrup, Slagelse: Bjørn Sydvest og Fyns Ib.
Sydsjælland, Lundby: Haslev Odin.

Bornholm:

Kannikegård, Åkirkeby: Bornholms Brygger.

Der blev afprøvet 64 hold i Jylland, 6 på Fyn, 6 på Sjælland og 1 på Bornholm.

Efter race var fordelingen følgende:

40 hold af RDM
21 hold af SDM
16 hold af Jerseyrace

A. Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

I nedenstående oversigt findes en gruppering efter tyrenes alder ved prøvens begyndelse for de sidste 3 år.

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1966—67		1965—66		1964—65	
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
under 4	1	1,3	3	3,7	1	1,2
4–5	46	59,7	44	54,4	54	65,1
5–6	27	35,1	26	32,1	26	31,3
6–7	3	3,9	6	7,4	1	1,2
7–8	–	–	1	1,2	1	1,2
over 8	–	–	1	1,2	–	–
I alt	77	100,0	81	100,0	83	100,0

47 af de 77 tyre, der afprøvedes i 1966–67, var under 5 år ved prøvens begyndelse. Kun 3 af de afprøvede tyre i det forløbne prøveår var over 6 år ved prøvens begyndelse, og tyrene var som helhed lidt yngre i 1966–67 end i 1965–66.

B. Afgangsårsagerne.

Sundhedstilstanden var som helhed tilfredsstillende, og der blev udsat færre kvier end i de nærmest foregående år.

Følgende oversigt giver oplysning om afgangsårsagerne for hovedparten af kvierne:

40	blev udsat på grund af yverlidelser	2,6%	mod	2,7%	sidste	år
13	» » » » » streng kælvn. og børbet. ..	0,9%	»	1,1%	»	»
10	» » » » » kælvning før tiden	0,7%	»	0,9%	»	»
4	» » » » » lungeinfektioner	0,3%	»	0,4%	»	»
2	» » » » » benlidelser	0,1%	»	0,4%	»	»
3	» » » » » hormonale forstyrrelser ..	0,2%	»	0,1%	»	»
2	» » » » » mave- og tarmlidelser	0,1%	»	0,3%	»	»
1	» » » » » leverlidelser	0,1%	»	0,1%	»	»
9	» » » » » andre årsager	0,6%	»	0,6%	»	»

Der udsattes i alt 84 kvier, hvilket svarer til 5,5 pct., og det er noget mindre end i de to foregående år, hvor udsætterprocenten blev 6,7. Det var som sædvanlig yverlidelserne, der gav anledning til den hyppigste afgangsårsag. Streng kælvning og børbetændelse kom på andenpladsen, men dette var også tilfældet i prøveåret 1965–66. Som den trediehyppigste afgangsårsag kom kælvning før tiden, men denne afgangsårsag kom også på tredie-pladsen i 1965–66. Enkelte af disse kvier kælvede et godt stykke tid, før den normale drægtighedstid var udløbet. For enkelte af kviernes vedkommende var der næppe tvivl om, at de kælvede efter at have været udsat for et kraftigt stød. Det er ikke altid heldigt med hornede og afhornede kvier i de samme folde efter ankomsten til stationerne. Kun to kvier blev udsat på

grund af benlidelser, og det er mindre end i de nærmest foregående år. Dette tyder ikke på, at der er blevet flere problemer med benlidelserne, end man tidligere har haft. Under hormonale forstyrrelser figurerer 1 kvie på holdet efter Horsens Gert, en på holdet efter Sdj. Aksel og en på holdet efter Randers Just. Disse kvier kunne eller ville ikke lægge mælken ned. Der blev således udsat en kvie af denne årsag inden for hver af racerne. Gruppen andre årsager omfatter 9 kvier. Ved beregning af udsætterprocenten er som sædvanlig ikke medregnet kvier, der er udsat før kælvning, hvilket finder sted for enkeltes vedkommende, men årsagen er næsten altid, at faderskabet ikke har kunnet bekræftes. Desuden kommer der i reglen et par kvier hvert år, som ikke har været drægtige, men sådanne kvier betragtes ikke som indgåede forsøgskvier.

Der var stor forskel på, hvor mange kvier som blev udsat på de forskellige hold, hvilket fremgår af følgende oversigt:

På	27	hold	er	ingen	afgået	under	prøven	
»	27	»	»	afgået	1	kvie	pr.	hold
»	14	»	»	»	2	kvier	»	»
»	8	»	»	»	3	»	»	»
»	1	»	»	»	5	»		

På holdet efter Varde Grøn blev udsat 5 kvier, men det var også det eneste hold, hvor der blev udsat mere end 3 kvier. De hold, hvor der blev udsat 3 kvier, var efter Ålborg Børge, Århus Hof, Kolding Pall 23, Horsens Gert, Thy Skov, Sdj. Aksel, Thy Ponto og Horsens Bak.

Udsætterprocenten for de forskellige racer blev følgende:

RDM	7,0%	mod	6,8%	sidste år
SDM	3,6%	»	7,7%	» »
Jerseyrace	4,5%	»	3,4%	» »

Udsætterprocenten for Rød Dansk Malkerace blev noget højere end for de to andre racer, men den lå på samme niveau som i de to foregående år. Sortbroget Dansk Malkerace havde den mindste udsætterprocent, medens den havde den højeste i 1965–66. Udsætterprocenten var ikke ret stor for Jerseyracen, men denne race har også tit haft den laveste udsætterprocent.

C. Kælvetiden.

Kvierne skal efter reglerne kælve fra 15. september til 31. oktober, men som det ses af følgende oversigt, er der en del, som har kælvet uden for de i reglerne fastsatte kælvningsdatoer.

Tabel 3. Kviernes vægt.

Table 3. Weight of the cows

Tyrens navn	Vægt i kg				
	ved ankomst	efter kælvning	ved udbinding	ved prøvens afslutning	ved hjemsendelse
	Weight in kg				
Name of bull	*at arrival*	*after calving*	*before pasture*	*at end of testing*	*before sending home*
RDM:					
Uwe	512	530	575	581	581
Skærup Munk	529	522	583	572	579
Horsens Bitz	527	522	560	573	573
Ålborg Børge	530	506	556	577	577
Dybbøl Holm	518	508	573	569	570
Skærup Bus	484	507	546	545	548
Skov	512	509	561	574	574
Randers Sortemose	543	532	592	592	592
Samsø Frej	458	461	518	519	520
Nordfyns Aman	508	501	574	533	537
Skive Rajs	501	503	536	548	549
Ringkøbing Holm	543	535	588	595	596
Åbenrå Øbo	505	509	557	583	584
Haslev Odin	491	506	574	573	574
Hjørring Eli	511	512	555	552	551
Skærup Karlby	472	498	537	546	546
Rødding Ursus	490	458	506	539	549
Ribe Aks	495	482	525	528	542
Hjørring Iver	506	502	529	543	543
Give Ask	478	491	561	554	554
Ribe Frem	488	487	545	551	556
Århus Hof	448	469	506	522	522
Centrums Prik	505	497	558	532	535
Rødding Frem	522	514	571	569	569
Holbæk Allaks	525	522	576	595	595
Bjørn Sydvest	507	491	556	576	576
Bakager Wahl	515	499	556	542	541
Kolding Pall 23	461	459	530	544	547
Varde Grøn	471	467	500	520	521
Horsens Gert	489	480	539	541	541
Vald Nordvest	509	504	563	582	582
Thy Skov	507	516	574	580	581
Erslev	491	494	549	549	549
Djurs Wahl	549	536	583	589	589
Hadsten Gert	492	496	551	558	558
Århus Ask	465	467	528	537	538
Ribe Klint	461	472	544	547	549
Varde Kry	484	502	518	534	530
Kolding Munk 143	512	497	557	576	578
Bøg	480	489	541	528	528
Gns. (Average)	500	499	551	557	558

Tyrens navn	Vægt i kg				
	ved ankomst	efter kælvning	ved udbinding	ved prøvens afslutning	ved hjem-sendelse
	Weight in kg				
Name of bull	*at arrival*	*after calving*	*before pasture*	*at end of testing*	*before sending home*
SDM:					
Varde Stefan	519	518	573	582	590
Kolding Gordon 39	542	507	539	583	583
Egholm Gran	489	504	551	567	568
Sdj. Aksel	524	503	541	610	612
Ry	548	526	575	591	592
Skive Hal	506	543	569	589	589
Hjørring Domino	513	493	534	539	536
Sdj. Ark	528	535	595	587	587
Egholm Drost	477	510	567	576	573
Varde Diamant	517	515	520	551	551
Bjerringbro Basta	535	513	565	580	580
Swea	504	501	557	583	583
Sdj. Viktor	515	497	518	579	579
Randers Dijk	518	517	571	594	594
Thy Ponto	553	537	578	583	591
Hjørring Simon	519	520	557	574	572
Varde Alfa	511	524	559	572	576
Randers Drost	528	517	577	591	591
Hjørring Drost	520	522	576	581	580
Sdj. Trin	531	496	551	616	622
Herning Drost	505	527	580	640	640
Gns. (Average)	519	515	560	584	585
Jerseyrace:					
Bornholms Brygger	327	358	376	374	374
Fyns Glen	329	351	397	377	377
Årup Vestfyns Flink	317	327	364	359	362
Årup Vestfyns Boy	337	350	398	407	408
Fyns Ib	289	319	334	351	353
Hjørring Georg	332	350	370	363	363
Lund	317	350	363	368	369
Horsens Bak	341	368	392	417	417
Primus Syd	314	335	368	361	361
Åbenrå Vix	312	342	374	393	393
Randers Knægt	320	338	360	360	360
Dybbøl Hans	331	355	395	397	397
Morsø Bæk	340	364	394	391	391
Århus Max	314	334	357	370	370
Sydvestfyns Car	322	331	379	386	387
Randers Just	319	340	363	379	379
Gns. (Average)	323	345	374	378	379

Tabel 4. Kalvenes vægt.

Table 4. Weight of the calves

Tyrens navn	Tyrekalve		Kviekalve		Alle kalve	
	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg
	Males		*Females*		*All calves*	
Name of bull	*No.*	*Weight in kg*	*No.*	*Weight in kg*	*No.*	*Weight in kg*
RDM:						
Uwe	6	43	9	38	15	40
Skærup Munk	6	41	10	37	16	38
Horsens Bitz	10	42	8	42	18	42
Ålborg Børge	8	44	9	39	17	41
Dybbøl Holm	10	40	8	39	18	40
Skærup Bus	7	41	10	40	17	40
Skov	13	41	6	40	19	40
Randers Sortemose	12	42	7	36	19	40
Samsø Frej	10	41	8	39	18	40
Nordfyns Aman	9	39	8	38	17	38
Skive Rajs	10	40	9	37	19	39
Ringkøbing Holm	6	43	10	39	16	40
Åbenrå Øbo	8	42	13	38	21	40
Haslev Odin	9	39	7	35	16	37
Hjørring Eli	6	35	11	37	17	36
Skærup Karlby	11	40	5	40	16	40
Rødding Ursus	8	38	10	36	18	37
Ribe Aks	9	40	9	38	18	39
Hjørring Iver	11	42	10	41	21	42
Give Ask	9	36	9	35	18	35
Ribe Frem	8	40	12	37	20	38
Århus Hof	6	38	11	35	17	36
Centrums Prik	11	37	8	34	19	36
Rødding Frem	10	41	10	39	20	40
Holbæk Allaks	8	39	12	38	20	38
Bjørn Sydvest	8	41	12	39	20	40
Bakager Wahl	11	42	9	36	20	40
Kolding Pall 23	7	41	6	34	13	37
Varde Grøn	6	40	6	37	12	39
Horsens Gert	8	41	8	39	16	40
Vald Nordvest	8	39	9	37	17	38
Thy Skov	11	39	6	38	17	39
Erslev	11	37	8	34	19	36
Djurs Wahl	12	40	6	37	18	39
Hadsten Gert	10	35	9	34	19	35
Århus Ask	11	39	8	38	19	38
Ribe Klint	11	39	8	34	19	37
Varde Kry	9	39	9	37	18	38
Kolding Munk 143	10	41	8	40	18	41
Bøg	11	37	7	36	18	36
Gns. (Average)	51%	40	49%	37	–	39

Tyrens navn	Tyrekalve		Kviekalve		Alle kalve	
	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg
	Males		*Females*		*All calves*	
Name of bull	*No.*	*Weight in kg*	*No.*	*Weight in kg*	*No.*	*Weight in kg*
SDM:						
Varde Stefan	13	41	7	38	20	40
Kolding Gordon 39	11	41	8	36	19	39
Egholm Gran	9	39	11	35	20	37
Sdj. Aksel	10	37	9	32	19	35
Ry	9	45	11	40	20	42
Skive Hal	13	42	7	40	20	41
Hjørring Domino	9	35	9	34	18	35
Sdj. Ark	9	38	11	35	20	36
Egholm Drost	6	37	9	33	15	35
Varde Diamant	11	37	7	30	18	35
Bjerringbro Basta	7	38	13	33	20	35
Swea	9	40	11	38	20	39
Sdj. Viktor	10	37	8	35	18	36
Randers Dijk	7	38	11	37	18	37
Thy Ponto	6	38	11	37	17	37
Hjørring Simon	13	38	7	35	20	37
Varde Alfa	10	37	8	36	18	37
Randers Drost	7	39	13	35	20	37
Hjørring Drost	6	42	11	37	17	39
Sdj. Trin	12	36	7	33	19	35
Herning Drost	11	42	8	41	19	41
Gns. (Average)	50%	39	50%	36	–	37
Jerseyrace:						
Bornholms Brygger	3	22	10	23	13	22
Fyns Glen	8	21	11	19	19	20
Årup Vestfyns Flink	11	24	8	22	19	23
Årup Vestfyns Boy	9	24	10	22	19	23
Fyns Ib	10	23	10	21	20	22
Hjørring Georg	8	24	11	25	19	24
Lund	5	22	13	21	18	21
Horsens Bak	14	22	3	22	17	22
Primus Syd	10	26	6	23	16	24
Åbenrå Vix	10	25	8	24	18	25
Randers Knægt	12	21	8	20	20	20
Dybbøl Hans	10	24	9	23	19	23
Morsø Bæk	10	27	10	25	20	26
Århus Max	13	24	7	20	20	23
Sydvestfyns Car	8	25	11	22	19	23
Randers Just	6	22	13	20	19	20
Gns. (Average)	50%	24	50%	22	–	23

	Før 15. september	Efter 31. oktober	I alt
Antal kvier i 1966–67	247	177	424
Procent » » 1966–67	17,3	12,4	29,7
» » » 1965–66	14,5	14,0	28,5
» » » 1964–65	11,6	15,6	27,2

29,7 pct. af kvierne kælvede uden for det i reglerne fastsatte kælvningsinterval, men det skulle være muligt at få reglerne bedre overholdt med hensyn til kælvningstidspunktet. Det ses af den sidste kolonne, at der er foregået en uheldig udvikling, idet en større procentdel har kælvet uden for det rigtige kælvningsinterval end i 1965–66, og procenttallet var højere i 1965–66 end i 1964–65. Der er i det sidste par år sket en nedgang i antallet af for sene kælvninger, men der er desværre kommet en kraftigere stigning i antallet af kælvninger før 15. september. Der var ikke ret stor forskel mellem racerne, men som helhed var der procentisk flest i det rigtige kælvningsinterval for Rød Dansk Malkerace, medens Jerseyholdene havde den største spredning i kælvetiden. Ingen af holdene havde i det forløbne år alle kvier til at kælve inden for det ønskede interval, men på holdene efter Horsens Bitz og Samsø Frej var der kun 1 kvie, som kælvede uden for det i reglerne fastsatte kælvningsinterval.

Følgende hold havde mindst 50 pct. af kvierne, som kælvede uden for det i reglerne fastsatte kælvningsinterval: Skærup Karlby, Give Ask, Bjerringbro Basta, Sdj. Trin, Bornholms Brygger og Primus Syd.

D. Kviernes vægt.

I *tabel 3* findes oplysning om kviernes gennemsnitsvægt på de forskellige hold. Gennemsnitsvægten er anført ved ankomst, efter kælvning, ved udbinding samt ved prøvens slutning og ved hjemsendelse, men på mange af holdene blev gennemsnitsvægten den samme i de to sidste kolonner.

De røde hold vejede i gennemsnit 500 kg ved modtagelse og 558 kg ved hjemsendelse, hvilket giver en tilvækst på 58 kg. Tilvæksten er hovedsagelig fremkommet i vinterperioden. Gennemsnitsvægten ved modtagelse var 5 kg lavere end i 1965–66, men til gengæld blev gennemsnitsvægten ved såvel prøvens slutning som ved hjemsendelse 5 kg højere end i 1965–66. Tilvæksten i 1965–66 var 48 kg, og i 1964–65 var den 51 kg, så tilvæksten må betegnes som særdeles tilfredsstillende for de røde hold i det forløbne prøveår.

Gennemsnitsvægten for de sortbrogede hold blev 519 kg ved modtagelse og 585 kg ved hjemsendelse, og den gennemsnitlige tilvækst blev derved 66 kg. I 1965–66 blev den gennemsnitlige tilvækst 54 kg, men da vejede

kvierne også 536 kg ved modtagelse. Det er i reglen lettere at få en god tilvækst, når kviernes gennemsnitsvægt er lav ved ankomsten til stationen.

Jerseyholdene vejede 323 kg i gennemsnit ved modtagelse og 379 kg ved hjemsendelse, hvilket giver en tilvækst på 56 kg. Gennemsnitstallene svarer fint til tallene fra 1965–66, hvor den gennemsnitlige tilvækst blev 52 kg.

E. Kalvenes vægt.

I *tabel 4* er anført den gennemsnitlige fødselsvægt for kalvene på de forskellige hold, og der er oplysning om antallet af tyre- og kviekalve samt deres gennemsnitsvægt. Tvillingkalvene er ikke medtaget i denne opgørelse, da de kan give misvisende resultater, idet de næsten altid er betydeligt mindre end enkeltfødte kalve.

Gennemsnitsvægten blev 39 kg for Rød Dansk Malkerace, 37 for Sortbroget Dansk Malkerace og 23 kg for Jerseyracen. I 1965–66 vejede de sortbrogede kalve 38 kg i gennemsnit, medens gennemsnitsvægten for kalve af Rød Dansk Malkerace og Jerseyrace har været uforandret i de to sidste prøveår. De røde kalve vejede således 2 kg mere i gennemsnit end de sortbrogede. Der var 51 pct. tyrekalve inden for Rød Dansk Malkerace og 50 pct. tyrekalve for de to andre racers vedkommende. Der var således en meget ligelig fordeling af tyre- og kviekalve.

Inden for Rød Dansk Malkerace blev de tungeste kalve født på holdene efter Horsens Bitz og Hjørring Iver, hvor gennemsnitsvægten blev 42 kg, men kalvene efter kvierne på holdene efter Ålborg Børge og Kolding Munk 143 var også forholdsvis tunge, idet den gennemsnitlige fødselsvægt blev 41 kg. De mindste kalve blev født på holdene efter Give Ask og Hadsten Gert, og kalvene på disse hold vejede kun 35 kg i gennemsnit. Den gennemsnitlige fødselsvægt blev kun 36 kg for de fødte kalve på holdene efter Hjørring Eli, Århus Hof, Centrums Prik, Erslev og Bøg.

Kalvene var forholdsvis små på en del af de sortbrogede hold, og den gennemsnitlige fødselsvægt blev kun 35 kg for de fødte kalve på holdene efter Sdj. Aksel, Hjørring Domino, Egholm Drost, Varde Diamant, Bjerringbro Basta og Sdj. Trin. De tungeste kalve blev født på holdet efter Ry, hvor gennemsnitsvægten blev 42 kg, men på holdene efter Skive Hal og Herning Drost vejede de fødte kalve 41 kg i gennemsnit, og på holdet efter Varde Stefan blev kalvenes gennemsnitlige fødselsvægt 40 kg.

Inden for Jerseyracen blev de tungste kalve født på holdene efter Morsø Bæk og Åbenrå Vix, hvor gennemsnitsvægten ved fødselen blev henholdsvis 26 og 25 kg. De mindste kalve blev født på holdene efter Fyns Glen, Randers Knægt og Randers Just, hvor gennemsnitsvægten kun blev 20 kg.

F. Drægtighedsforholdene.

94,3 pct. af kvierne var erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og dette svarede fint til drægtighedsforholdene i 1965–66, hvor det tilsvarende tal blev 94,1. 46,0 pct. blev erklæret drægtige efter 1. inseminering mod 45,8 i 1965–66. I gennemsnit medgik 2,0 insemineringer pr. drægtighed, og det var nøjagtig samme resultat, som blev opnået i foregående prøveår. De opnåede drægtighedsresultater var ret tilfredsstillende, men de var dog ikke så gode som i 1964–65, hvor der opnåedes særdeles gode resultater.

For de enkelte racer opnåedes følgende resultater:

RDM	94,0% drægtige	– 2,1 ins. pr. drægtighed
SDM	95,2% drægtige	– 1,9 ins. pr. drægtighed
Jerseyrace	93,7% drægtige	– 1,9 ins. pr. drægtighed

Procentisk var der flest drægtige inden for Sortbroget Dansk Malkerace, men der var kun ringe forskel mellem racerne. Med hensyn til insemineringer pr. drægtighed opnåede Rød Dansk Malkerace lidt ringere resultater end de to andre racer, men dette var også tilfældet i de 3 foregående år.

G. Fodringen.

Fodringen af kvierne er inddelt i fodringen før kælvningen, vinterperioden og sommerperioden.

1. Fodringen før kælvningen.

Kvierne var som helhed i god kondition og foderstand ved ankomsten til stationerne. Der var dog nogle kvier, som var unge og i for dårlig foderstand, samt nogle der havde haft for dårlige ernæringsforhold i den foregående sommer, men det gik dog forholdsvis let med at få dem præpareret før kælvningen. Foderstanden ved kælvningen samt sundhedstilstanden var tilfredsstillende.

Fra ankomsten og indtil kælvningen fodres kvierne efter følgende hovedprincipper:

a. Kvier, der skal kælve før 1. oktober, tages på stald om natten og fodres efter de i *tabel 5* angivne fodermængder, medens de i øvrigt går ude på græsmarkerne om dagen. I den første tid efter ankomsten fodres med bederoer med top i stedet for anvendelse af rod og top hver for sig. Ved kraftfoderets tildeling tages hensyn til kviernes huld og afstanden til kælvningen.

b. Kvier, der skal kælve efter 1. oktober, sættes på græs hele døgnet, hvis de er i godt huld ved ankomsten til stationen. Kvierne får dog tilskudsfoder, hvis de ikke kan klare sig med græs alene. Senere kommer kvierne på stald om natten og bliver fodret som anført i *tabel 5*, men de får dog adgang til græsmarken om dagen, hvis vejret i øvrigt er godt. Såvel med hensyn til kraftfodertilskuddets størrelse som indbindingsdatoen tages hensyn til kviernes huld og kælvningsdato, idet man bestræber sig på at få kvierne til at kælve i så ensartet foderstand, som det er muligt.

Tabel 5. Foderplan før kælvningen.

Table 5. Rations before calving

	f. e. *f. u.*	g ford. renprotein *g digest. true protein*
4 f.e. roer (f.u. beets)	4,0	152
1 f.e. roetop (f.u. beet tops)	1,0	120
2 kg kraftfoder (kg concentrates)	2,0	294
I alt (Total)	7,0	566

Kraftfoderet havde følgende sammensætning:

35% blanding I
48% byg
15% hvedeklid
2% dikalciumfosfat

Blandingen indeholdt 0,99 f.e. og 147 g ford. renprotein pr. kg.

Fodermængderne sættes gradvis op på de mængder, som er anført i *tabel 5*. I de sidste ca. 10 dage før kælvningen går kvierne lidt efter lidt over på vinterfoderplanen, og der anvendes 5–10 kg kålroer og 0,5 kg blanding I pr. kvie daglig plus bederoer, roetop eller ensilage, hø og halm samt blanding II. Herved vænnes kvierne til at æde de fodermidler, som anvendes i vinterperioden. I dagene lige før og efter kælvningen fodres kvierne ret svagt, så deres ædelyst hele tiden bliver den bedst mulige.

I den tid kvierne er på græs, har de lejlighed til at æde af en mineralstofblanding, som er sammensat af 2 dele dikalciumfosfat, 2 dele dinatriumfosfat og 1 del kogsalt.

2. *Vinterperioden.*

Fra kælvningen og indtil udbindingen fodres kvierne efter vinterfoderplanen, som er anført i *tabel 6*. Så snart kvierne er normale efter kælvningen, fodres de efter en ydelse, som er 2 kg 4% mælk højere end den

konstaterede. Dette ekstra tilskud gives kun i de første 6 uger efter kælvningen. Efter denne tid tildeles foderet efter ydelsen i den foregående uge, men blanding II må dog kun reduceres med 0,4 kg i dagligt foder hver uge. Roefoderet hævedes efter 1. februar med 0,5 f.e. og blanding I med 0,3 kg, samtidig med at blanding II reduceredes med 0,8 kg. På et par stationer fodredes efter planen i *tabel 6* i hele vinterperioden, idet roefoderet ikke blev hævet i vinterens sidste del. Der var også et par stationer, hvor roefoderet kun steg for røde og sortbrogede kvier efter 1. februar, medens Jerseykviernes roeration ikke blev ændret, da Jerseykvierne ofte har vanskeligheder med at æde et stort roefoder. Da kålroerne hen på foråret blev opfodret, blev de erstattet med bederoer. Kvierne fik den mængde halm, de kunne æde.

Tabel 6. Vinterfoderplan for afkomsprøvestationerne.

Table 6. Winter rations for progeny testing stations

Ydelse kg 4 % mælk *Yield in kg 4 % fat corrected milk*	kg kraftfoder *kg concentrates*		Foderenheder *Feed units*				I alt pr. dag *Total per day*	
	Bl. I *Mixture 1*	Bl. II *Mixture 2*	Kål-roer *Swedes*	Bede-roer *Beets*	Ensilage el. roetop *Silage or beet tops*	kg hø *kg hay*	f. e. *f. u.*	g ford. renprot. *g digest. true protein*
6,5— 7,4	1,40	—	1,5	2,25	1,0	2,5	7,3	823
7,5— 8,4	1,55	—	1,5	2,50	1,0	2,5	7,7	877
8,5— 9,4	1,70	—	1,5	2,75	1,0	2,5	8,1	933
9,5—10,4	1,85	—	1,5	3,00	1,0	2,5	8,6	987
10,5—11,4	2,00	—	1,5	3,25	1,0	2,5	9,0	1043
11,5—12,4	2,00	0,4	1,5	3,25	1,0	2,5	9,4	1105
12,5—13,4	2,00	0,8	1,5	3,25	1,0	2,5	9,8	1166
13,5—14,4	2,00	1,2	1,5	3,25	1,0	2,5	10,1	1228
14,5—15,4	2,00	1,6	1,5	3,25	1,0	2,5	10,5	1289
15,5—16,4	2,00	2,0	1,5	3,25	1,0	2,5	10,9	1351
16,5—17,4	2,00	2,4	1,5	3,25	1,0	2,5	11,3	1413
17,5—18,4	2,00	2,8	1,5	3,25	1,0	2,5	11,7	1474
18,5—19,4	2,00	3,2	1,5	3,25	1,0	2,5	12,1	1536
19,5—20,4	2,00	3,6	1,5	3,25	1,0	2,5	12,5	1597
20,5—21,4	2,00	4,0	1,5	3,25	1,0	2,5	12,9	1659
21,5—22,4	2,00	4,4	1,5	3,25	1,0	2,5	13,3	1721
22,5—23,4	2,00	4,8	1,5	3,25	1,0	2,5	13,7	1782
23,5—24,4	2,00	5,2	1,5	3,25	1,0	2,5	14,1	1844
24,5—25,4	2,00	5,6	1,5	3,25	1,0	2,5	14,5	1905
25,5—26,4	2,00	6,0	1,5	3,25	1,0	2,5	14,9	1967
26,5—27,4	2,00	6,4	1,5	3,25	1,0	2,5	15,2	2029
27,5—28,4	2,00	6,8	1,5	3,25	1,0	2,5	15,6	2090
28,5—29,4	2,00	7,2	1,5	3,25	1,0	2,5	16,0	2152

Jerseykvierne får dog kun 1,0 f.e. kålroer og 3,0 f.e. bederoer pr. kvie daglig.

Kraftfoderblandingerne havde følgende sammensætning:

Blanding I		*Blanding II*	
40%	bomuldsfrøkager	35%	blanding I
17%	sojaskrå	48%	byg
10%	solsikkekager	15%	hvedeklid
18%	kokoskager	2%	dikalciumfosfat
8%	hørfrøkager		
5%	fl. melasse		
2%	dikalciumfosfat		

I nedenstående oversigt findes oplysninger om fodermidlernes kemiske sammensætning og foderværdi:

Fodermiddel	Råprot. %	Renprot. %	Råfedt %	N-fri ekstr. st. %	Træstof %	f. e. pr. kg	g ford. renprot. pr. kg
Blanding I ..	35,07	33,21	6,65	30,88	9,89	1,11	291
Byg	9,27	8,65	1,70	67,66	3,96	1,00	63
Hvedeklid ..	13,10	11,68	4,05	53,45	9,29	0,78	100
Hø	10,43	8,44	1,56	36,31	28,70	0,46	44
Roetopensil.*).	17,39	10,29	3,84	43,41	15,06		
Græsensilage*).	16,97	10,02	5,81	35,98	30,10		

*) Analyseresultaterne refererer til tørstoffet.

Tallene er gennemsnit af analyserne fra de forskellige stationer, men for græsensilagens vedkommende er der dog kun analyser fra 19 stationer, da der ikke anvendes græsensilage på alle stationer i vinterperioden. Der var et lidt højere råfedtindhold i blanding I end i 1965–66, men til gengæld var der lidt mindre råfedt i byg og hvedeklid. Der var knap så højt et proteinindhold i blanding I som i 1965–66, men de fleste af tallene svarede godt til gennemsnitsresultaterne fra de nærmest foregående år.

Blanding II indeholdt 0,99 f.e. og 147 g fordøjeligt renprotein pr. kg, hvilket svarede fint til foderværdien af blandingen i 1965–66.

Mineralstofindholdet pr. kg blev udregnet til følgende i de to kraftfoderblandinger:

	g Ca	g P
Blanding I	7,7	12,2
Blanding II	8,1	11,4

I roeoptagningstiden anvendes i reglen 10 kg roetop som erstatning for ensilagen. Roetopensilagen undersøges hver 14. dag, og der regnes med 1,25 kg organisk stof til 1 f.e. Foderværdien udregnes ved vinterperiodens slutning på grundlag af den kemiske analyse fra det opsamlede tørstof fra de indsendte prøver. Beregningerne viste, at der medgik 1,63 kg tørstof eller 1,30 kg organisk stof til 1 f.e., og det er lidt mere end i 1965–66, hvor de tilsvarende tal var 1,60 og 1,26. Der medgik 10,57 kg roetopensilage til

Tabel 7. Ydelse, tilvækst o

Table 7. Yield, gain and fee

	Tyrens navn *Name of bull*	Antal døtre *Number of daughters*	Antal foder-dage *No. of feeding days*	Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	4% mælk kg *kg 4% F.C.M.*	Vægt i kg eft. kæl *Weight in k after calving*
RDM:									
1	Uwe	16	198	4485	4,64	208,26	234	4918	530
2	Skærup Munk	20	212	4352	4,35	189,38	213	4582	522
3	Horsens Bitz	18	203	3815	4,80	182,97	206	4271	522
4	Ålborg Børge	17	213	4076	4,58	186,73	210	4431	506
5	Dybbøl Holm	18	211	3977	4,76	189,44	213	4432	508
6	Skærup Bus	18	211	4037	4,40	177,76	200	4281	507
7	Skov	19	194	3735	4,47	166,95	188	3998	509
8	Randers Sortemose	19	214	4172	4,32	180,31	202	4373	532
9	Samsø Frej	18	183	3284	4,69	154,07	173	3625	461
10	Nordfyns Aman	18	212	3918	4,53	177,51	200	4230	501
11	Skive Rajs	19	208	3709	4,50	166,72	187	3984	503
12	Ringkøbing Holm	16	207	3913	4,36	170,63	192	4125	535
13	Åbenrå Øbo	21	213	4077	4,28	174,41	196	4247	509
14	Haslev Odin	18	209	3832	4,39	168,24	189	4056	506
15	Hjørring Eli	17	213	3790	4,53	171,63	193	4090	512
16	Skærup Karlby	16	194	3672	4,35	159,80	179	3866	498
17	Rødding Ursus	18	200	3451	4,74	163,64	184	3835	458
18	Ribe Aks	19	213	3969	4,13	164,01	184	4048	482
19	Hjørring Iver	21	204	3485	4,65	161,94	182	3823	502
20	Give Ask	19	203	3392	4,65	157,60	177	3721	491
21	Ribe Frem	20	207	3803	4,23	160,68	180	3931	487
22	Århus Hof	17	192	3629	4,17	151,37	170	3722	469
23	Centrums Prik	19	208	3622	4,51	163,38	184	3900	497
24	Rødding Frem	20	213	3625	4,37	158,36	178	3825	514
25	Holbæk Allaks	20	199	3297	4,62	152,16	171	3601	522
26	Bjørn Sydvest	20	218	3683	4,51	165,92	187	3962	491
27	Bakager Wahl	20	219	3763	4,30	161,94	182	3934	499
28	Kolding Pall 23	16	212	3638	4,28	155,70	175	3791	459
29	Varde Grøn	13	192	3198	4,45	142,21	160	3412	467
30	Horsens Gert	16	209	3406	4,50	153,35	172	3663	480
31	Vald Nordvest	18	194	3186	4,53	144,37	162	3440	504
32	Thy Skov	17	205	3445	4,33	149,03	167	3613	516
33	Erslev	19	218	3427	4,61	158,02	178	3741	494
34	Djurs Wahl	20	220	3702	4,28	158,53	178	3859	536
35	Hadsten Gert	19	211	3450	4,26	146,82	165	3582	496
36	Århus Ask	19	206	3245	4,35	141,22	159	3416	467
37	Ribe Klint	19	204	3194	4,28	136,86	154	3331	472
38	Varde Kry	18	202	3093	4,30	132,85	149	3230	502
39	Kolding Munk 143	19	205	3124	4,41	137,71	155	3315	497
40	Bøg	18	206	2852	4,59	130,99	147	3106	489
	Gns. (Average)	18	206	3638	4,45	161,84	182	3883	499

ɔderforbrug i vinterperioden.

onsumption in the winter-period

Vægt i kg ved ıdbind. / *Weight in kg at end of winter-period*	Tilvækst kg / *Gain kg*	Kraftfoder, f. e. Blanding I / *Concentrates f. u. Mix. I*	Kraftfoder, f. e. Blanding II / *Concentrates f. u. Mix. II*	Kålroer f. e. / *Swedes f. u.*	Bederoer f. e. / *Beets f. u.*	Roetop f. e. / *Beet tops f. u.*	Ensilage f. e. / *Silage f. u.*	Hø f. e. / *Hay f. u.*	Halm f. e. / *Straw f. u.*	I alt f. e. / *Total f. u.*	I alt fordr. renprot. kg / *Total kg dig. true prot.*	Udbind. dato / *Date on pasture*
575	45	474	1035	174	831	51	146	232	48	2991	352	13–4
583	61	473	1079	245	653	26	197	194	53	2920	350	26–4
560	38	470	793	267	697	28	188	243	51	2737	326	27–4
556	50	477	878	215	753	11	189	245	65	2833	335	26–4
573	65	500	802	210	789	37	201	212	67	2818	335	28–4
546	39	485	793	235	763	15	215	244	60	2810	318	5–5
561	52	434	776	189	690	6	182	223	63	2563	301	26–4
592	60	479	838	216	756	13	185	246	64	2797	330	26–4
518	57	418	625	202	685	21	161	202	24	2338	287	14–4
574	73	499	733	222	816	–	258	195	43	2766	326	26–4
536	33	470	667	273	670	26	254	159	82	2601	309	27–4
588	53	489	745	286	689	27	207	165	37	2645	313	26–4
557	48	502	767	211	831	25	265	169	45	2815	310	2–5
574	68	493	686	220	810	–	197	226	37	2669	309	5–5
555	43	503	713	236	704	30	309	98	65	2658	308	27–4
537	39	460	692	260	651	19	200	152	35	2469	292	26–4
506	48	450	695	270	664	34	242	142	60	2557	286	15–4
525	43	484	660	264	692	44	232	172	49	2597	293	27–4
529	27	481	657	222	674	23	305	87	64	2513	291	27–4
561	70	453	790	236	620	21	191	183	51	2545	299	26–4
545	58	472	643	264	690	49	221	165	49	2553	287	27–4
506	37	459	653	186	739	14	178	183	33	2445	276	27–4
558	61	488	614	213	797	–	253	191	46	2602	303	26–4
571	57	495	592	284	728	38	188	256	53	2634	307	27–4
576	54	473	571	147	807	38	185	171	63	2455	291	13–4
556	65	506	663	250	750	33	201	223	65	2691	307	26–4
556	57	522	650	293	756	39	191	219	70	2740	317	3–5
530	71	486	627	222	771	28	178	248	40	2600	289	26–4
500	33	444	516	134	784	16	183	216	47	2340	247	22–4
539	59	480	566	275	710	34	189	251	52	2557	297	27–4
563	59	460	539	138	790	34	193	165	62	2381	280	13–4
574	58	476	531	262	720	35	216	200	28	2468	278	27–4
549	55	514	604	293	741	35	190	217	72	2666	307	3–5
583	47	525	622	294	757	39	190	219	71	2717	314	3–5
551	55	505	551	280	732	32	191	209	70	2570	295	3–5
528	61	492	463	209	782	29	179	200	39	2393	262	27–4
544	72	465	442	258	679	37	233	162	49	2325	254	27–4
518	16	459	429	149	806	25	185	227	48	2328	243	22–4
557	60	465	495	212	744	21	177	239	40	2393	261	26–4
541	52	485	418	274	707	27	190	202	69	2372	267	3–5
551	52	479	665	232	736	27	206	199	53	2597	299	

	Tyrens navn *Name of bull*	Antal døtre *Number of daughters*	Antal foder-dage *No. of feeding days*	Mælk kg *Milk kg*	Fedt % *Fat %*	Smørfedt kg *Butterfat kg*	Smør kg *Butter kg*	4% mælk kg kg 4% *F.C.M.*	Vægt i kg eft. kælv *Weight in k after calving*
SDM:									
1	Varde Stefan	20	211	4116	4,44	182,55	205	4385	518
2	Kolding Gordon 39	20	209	4385	4,25	186,22	209	4547	507
3	Egholm Gran	20	201	4063	4,20	170,50	191	4183	504
4	Sdj. Aksel	19	195	3636	4,68	170,05	191	4005	503
5	Ry	20	222	4357	4,26	185,69	208	4528	526
6	Skive Hal	20	197	4057	4,01	162,62	182	4062	543
7	Hjørring Domino	18	221	4196	4,26	178,84	201	4361	493
8	Sdj. Ark	20	204	4002	4,21	168,31	189	4125	535
9	Egholm Drost	15	208	4045	4,04	163,42	183	4069	510
10	Varde Diamant	18	209	3712	4,44	164,89	185	3958	515
11	Bjerringbro Basta	20	226	3982	4,44	176,83	199	4245	513
12	Swea	20	205	3863	4,18	161,29	181	3965	501
13	Sdj. Viktor	18	193	3767	4,12	155,31	174	3836	497
14	Randers Dijk	19	218	3757	4,49	168,61	190	4032	517
15	Thy Ponto	17	210	3941	4,10	161,55	181	4000	537
16	Hjørring Simon	20	214	3640	4,18	152,33	171	3741	520
17	Varde Alfa	18	205	3340	4,30	143,60	161	3490	524
18	Randers Drost	20	223	3738	4,15	155,15	174	3822	517
19	Hjørring Drost	17	215	3345	4,27	142,91	160	3482	522
20	Sdj. Trin	20	202	3288	4,03	132,37	148	3301	496
21	Herning Drost	19	204	3058	4,06	124,14	139	3085	527
	Gns. (Average)	19	209	3823	4,24	162,25	182	3963	515
Jerseyrace:									
1	Bornholms Brygger	16	183	2726	6,17	168,10	191	3612	358
2	Fyns Glen	19	199	2875	6,41	184,34	209	3915	351
3	Årup Vestfyns Flink	21	206	2827	6,54	184,95	210	3905	327
4	Årup Vestfyns Boy	19	208	2842	6,54	185,98	211	3927	350
5	Fyns Ib	20	206	2754	6,32	174,12	198	3713	319
6	Hjørring Georg	19	208	2638	6,62	174,51	198	3673	350
7	Lund	18	202	2675	6,27	167,65	190	3585	350
8	Horsens Bak	17	193	2617	6,35	166,21	189	3540	368
9	Primus Syd	16	201	2641	6,14	162,18	184	3489	335
10	Åbenrå Vix	18	206	2595	6,54	169,63	193	3582	342
11	Randers Knægt	20	212	2706	6,28	169,94	193	3632	338
12	Dybbøl Hans	19	207	2755	6,01	165,51	188	3585	355
13	Morsø Bæk	20	203	2413	6,49	156,68	178	3315	364
14	Århus Max	20	203	2344	6,48	151,94	173	3217	334
15	Sydvestfyns Car	19	208	2269	6,59	149,49	170	3150	331
16	Randers Just	19	216	2529	5,92	149,74	170	3258	340
	Gns. (Average)	19	204	2638	6,35	167,56	190	3569	345
	Gns. af alle hold (Average of all groups)	19	207	3481	4,69	163,14	184	3840	471

Vægt i kg ved udbind. *Weight in kg at end of winter-period*	Tilvækst kg *Gain kg*	Kraftfoder, f. e. Blanding I *Concentrates f. u. Mix. I*	Blanding II *Mix. II*	Kålroer f. e. *Swedes f. u.*	Bederoer f. e. *Beets f. u.*	Roetop f. e. *Beet tops f. u.*	Ensilage f. e. *Silage f. u.*	Hø f. e. *Hay f. u.*	Halm f. e. *Straw f. u.*	I alt f. e. *Total f. u*	ford. renprot. kg *kg dig. true prot.*	Udbind. dato *Date on pasture*
573	55	480	787	270	706	45	233	169	58	2748	311	27–4
539	32	480	898	218	763	26	177	244	40	2846	326	26–4
551	47	449	948	231	627	19	193	181	50	2698	321	26–4
541	38	436	768	263	645	31	241	137	59	2580	291	15–4
575	49	510	823	248	793	19	221	257	62	2933	332	5–5
569	26	447	722	259	641	15	254	147	63	2548	306	27–4
534	41	523	791	244	723	37	310	108	65	2801	328	27–4
595	60	484	730	204	767	33	198	204	66	2686	317	28–4
567	57	463	889	244	653	22	196	188	52	2707	319	26–4
520	5	480	669	159	837	32	185	235	49	2646	284	22–4
565	52	501	693	342	803	28	305	165	49	2886	330	26–4
557	56	460	703	205	728	9	186	236	64	2591	301	26–4
518	21	437	688	262	649	29	242	135	59	2501	279	15–4
571	54	485	650	331	777	20	306	156	49	2774	316	26–4
578	41	485	671	269	735	39	216	206	28	2649	303	27–4
557	37	505	581	237	706	30	310	99	65	2533	290	27–4
559	35	469	509	152	823	28	185	230	48	2444	258	22–4
577	60	491	564	337	793	25	306	162	49	2727	307	26–4
576	54	507	483	241	714	32	310	102	65	2454	276	27–4
551	55	451	478	278	680	36	242	144	61	2370	257	15–4
580	53	474	408	198	787	17	263	159	45	2351	246	2–5
560	45	477	688	247	731	27	242	174	55	2641	300	
376	18	430	664	179	544	12	159	210	21	2219	267	27–4
397	46	471	664	135	670	–	199	228	3	2370	297	26–4
364	37	463	766	145	646	33	162	142	62	2419	307	27–4
398	48	496	699	147	706	36	163	145	68	2460	309	27–4
334	15	459	667	150	616	20	198	209	23	2342	282	26–4
370	20	492	619	141	588	20	248	92	33	2233	276	27–4
363	13	450	705	154	609	18	165	206	26	2333	287	3–5
392	24	448	588	175	608	17	190	232	48	2306	279	27–4
368	33	432	565	163	569	33	232	159	39	2192	254	27–4
374	32	481	559	135	706	19	260	160	45	2365	265	2–5
360	22	471	693	164	622	20	164	217	26	2377	293	3–5
395	40	484	524	137	686	30	176	234	5	2276	279	28–4
394	30	462	475	148	638	3	217	235	51	2229	253	5–5
357	23	456	489	128	621	21	178	196	28	2117	246	27–4
379	48	490	432	146	698	35	163	144	64	2172	263	27–4
363	23	482	564	166	626	25	170	223	28	2284	279	3–5
374	29	467	605	151	635	21	190	190	36	2295	277	
517	46	476	659	219	713	26	212	190	50	2545	295	

1 f.e. mod 10,02 i 1965–66. I det forløbne prøveår var den gennemsnitlige tørstofprocent kun 15,54, og dette bevirkede, at der skulle lidt mere til 1 f.e. end i de nærmest foregående år.

Den gennemsnitlige tørstofprocent i græsensilagen blev 19,67, og der medgik 1,40 kg tørstof til 1 f.e., medens de tilsvarende tal i 1965–66 var 20,05 og 1,41. Det ligger ret konstant fra det ene år til det andet med 1,4 kg tørstof i græsensilage til 1 f.e. Der medgik 7,22 kg til 1 f.e. mod 7,12 i 1965–66.

Såvel kålroer som bederoer undersøgtes for tørstofindholdet, og resultaterne dannede grundlag for roefoderets størrelse. Af kålroer og bederoer medgik henholdsvis 9,39 og 6,26 kg til 1 f.e., medens de tilsvarende tal for 1965–66 var 9,23 og 6,50. Den gennemsnitlige tørstofprocent i kålroer og bederoer blev henholdsvis 11,71 og 17,57. Tørstofprocenten i kålroerne har været høj i de to sidste prøveår. Der var en høj tørstofprocent i bederoerne i det forløbne prøveår.

Kraftfoder, kålroer, bederoer, roetop og ensilage vejes ud til de enkelte kvier ved hver fodring, medens høet vejes ud til nogle kvier eller et helt hold ad gangen. Forbruget af halm kontrolleres et par gange om ugen.

Tabel 7 giver oplysning om ydelse og tilvækst i vinterperioden samt om foderforbruget på de enkelte hold, men da der er forskel i vinterperiodens længde fra hold til hold, har dette givet sig udslag i nogen variation i foderforbruget. De højestydende hold har selvfølgelig haft det største kraftfoderforbrug, hvilket ses meget tydeligt af tallene. På nogle af stationerne blev noget af høfoderet erstattet med ensilage eller blanding II.

Vinterperioden blev 4 dage kortere end i 1965–66, men den gennemsnitlige smørydelse blev kun 2 kg mindre end i 1965–66. Der anvendtes 1410 f.e. grovfoder, medens der medgik 1411 f.e. i 1965–66. Der anvendtes 20 f.e. mere af bederoer end i 1965–66, men til gengæld anvendtes 26 f.e. mindre af hø. For de øvrige grovfodermidler lå forbruget på samme niveau som i 1965–66.

Udbindingen kom få dage tidligere end i 1965–66, og på de fleste stationer fandt den sted i april måned, men på enkelte stationer blev kvierne først bundet ud en af de første dage i maj måned.

Foderforbruget til produktion af 1 kg 4% mælk blev følgende:

Rød Dansk Malkerace	0,40	p.f.e.	og	59	g	ford.	renprotein
Sortbroget Dansk Malkerace	0,40	»	»	58	»	»	»
Jerseyrace	0,42	»	»	65	»	»	»

I gennemsnit af alle hold blev det 0,40 p.f.e. og 60 g ford. renprotein pr. kg 4% mælk, medens de tilsvarende tal i 1965–66 var 0,40 og 65. Når der forekom en stærk nedgang i g ford. renprotein pr. kg 4% mælk, skyldes

det en ændring af beregningsmetoden, idet der i de foregående år er regnet med 120 g ford. renprotein pr. f.e. i roetopensilage og 150 g ford. renprotein pr. f.e. i græsensilage, medens der i det forløbne prøveår er anvendt de udregnede værdier fra den kemiske analyse af ensilagen.

3. Sommerperioden.

Sommerperioden blev på 97 dage, og der var gennemgående god græsning på stationerne. Der var forholdsvis store beholdninger af bederoer ved udbindingen, og roer og ensilage udgjorde en stor part af sommerens tilskudsfoder.

Kraftfodertilskuddet blev givet efter planen i *tabel 8.*

Tabel 8. Kraftfodertilskuddets størrelse i forhold til græskvaliteten.

Table 8. Concentrates given according to quality of pasture

Ydelse i kg 4% mælk *Yield in kg 4% fat corrected milk*	ug *excellent*	mg *very good*	g *good*	tg *fair*	mdl. *poor*	slet *bad*
	kg kraftfoder *kg concentrates*					
0– 2,5	–	–	–	–	–	–
2,6– 5,0	–	–	–	–	–	0,5
5,1– 7,5	–	–	–	–	0,5	1,0
7,6–10,0	–	–	–	0,5	1,0	2,0
10,1–12,5	–	–	0,5	1,0	2,0	3,0
12,6–15,0	–	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
15,1–17,5	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17,6–20,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
20,1–22,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
22,6–25,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
25,1–27,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

Kraftfoderblandingen bestod af:

30% blanding I
60% byg
10% klidmelasse

Blandingen indeholdt 1,01 f.e. og 131 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

I gennemsnit af hele sommerperioden anvendtes 2,4 f.e. kraftfoder pr. kvie daglig, og dette var lidt mindre end i 1966, men mere end i 1965.

For samtlige hold har fodringen i de sidste 3 somre været følgende:

	Antal foder-dage	Kraft-foder f.e.	Roer og ensilage m.m. f.e.	Tilskuds-foder i alt f.e.	Beregnet græs f.e.	I alt f.e.
Sommeren 1967	97	234	280	514	531	1045
» 1966	93	270	192	462	528	990
» 1965	100	219	306	525	523	1048

Det beregnede græsfoderforbrug blev 531 f.e., hvilket svarer fint til tallene fra de to foregående år.

Gennem hele sommeren havde kvierne adgang til at æde en mineralstofblanding, der var sammensat af 2 dele dikalciumfosfat, 2 dele dinatriumfosfat og 1 del kogsalt.

H. Ydelsen.

Ydelsen er som sædvanlig udregnet i 304 dage i gennemsnit af holdene.

Mælken vejes hver uge i to på hinanden følgende døgn, og der foretages en fedtbestemmelse for de to dages mælkemængde. Proteinprocenten bestemmes ugentlig i de første 2 eller 3 uger efter kælvningen og derefter hver anden uge i den resterende del af prøvetiden. Proteinprocenten bestemmes på grundlag af det første døgns mælkemængde ved kontrolleringen. Hver anden uge indsendes mælkeprøver fra stationerne til efterkontrol for fedtprocent på den kemiske afdeling.

I hovedtabellerne, der findes bag i beretningen, er der oplysninger om de enkelte kviers ydelse på alle holdene, og opstillingen er foretaget efter holdenes gennemsnitlige ydelse af smørfedt inden for hver af racerne.

1. Ydelsen for de forskellige racer.

I nedenstående opstilling findes gennemsnitsydelsen for de forskellige racer samt for alle hold:

Gennemsnitsydelsen i 304 dage.

Race	Antal hold	Antal kvier	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprotein kg
RDM	40	732	5053	4,52	228,38	257	3,80	192
SDM	21	398	5206	4,32	224,78	252	3,65	190
Jerseyrace	16	300	3613	6,55	236,79	269	4,32	156
Alle hold	77	1430	4796	4,78	229,15	258	3,84	184

Jerseyholdene havde den højeste gennemsnitlige smørydelse. Det er bemærkelsesværdigt, at der kun var 5 kg smør forskel i holdenes gennemsnitsydelse mellem Rød Dansk Malkerace og Sortbroget Dansk Malkerace, idet de røde hold sædvanligvis har haft en noget højere ydelse end de sortbrogede. For de røde og sortbrogede hold lå fedtprocenterne på samme niveau som sidste år, medens Jerseyholdene havde lidt højere middelfedtprocent end i 1965–66. Middelproteinprocenterne blev for alle 3 racers vedkommende lidt højere end i 1965–66. Rød Dansk Malkerace opnåede den højeste ydelse af mælkeprotein, men dette var også tilfældet i de foregående år.

2. *Højtydende kvier.*

Der var i alt 7 kvier, som ydede over 350 kg smørfedt, og heraf var 5 af Rød Dansk Malkerace, en af Sortbroget Dansk Malkerace og en af Jerseyracen.

Nr.	Antal foder-dage	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Protein %	Mælke-protein kg	Fader
33	312	5326	6,75	359,40	409	4,53	241	Årup Vestfyns Boy
12	299	6884	5,22	359,07	406	3,95	272	Horsens Bitz
3	316	7377	4,84	356,76	402	3,98	294	Uwe
92	336	7800	4,57	356,45	401	3,92	306	Swea
36	347	7066	5,04	356,34	402	4,13	292	Give Ask
4	276	7705	4,62	356,14	401	3,75	289	Uwe
11	328	7427	4,76	353,78	398	3,40	253	Uwe

De anførte 7 kvier var meget ensartede med hensyn til smørfedtydelsen. Den højeste ydelse blev opnået af Jerseykvien nr. 33 på holdet efter Årup Vestfyns Boy. Der var 3 kvier efter Uwe, som ydede over 350 kg smørfedt i prøvetiden, og heraf ydede nr. 4 356 kg smørfedt på 276 dage.

3. *Udholdenheden i ydelsen.*

I *tabel 9* findes oplysning om udholdenheden i ydelsen for de forskellige afkomsprøvehold. Ydelsen i de første 100 dage er sat til 100, medens ydelsen i perioderne 101–200 og 201–304 dage er udtrykt i procent af ydelsen i de første 100 dage. Hvis der er udsat kvier, efter at 100 dages opgørelsen er foretaget, er der udregnet nye opgørelser, således at det er de samme kvier, som er med i alle opgørelser.

For alle 3 racers vedkommende var der som helhed fantastisk god udholdenhed i ydelsen, og laktationskurven blev lidt fladere end sædvanligt. Det var forøvrigt den gode udholdenhed i ydelsen, som blev den medvirkende årsag til det gode ydelsesresultat i prøvetiden for alle 3 racer.

Adskillige af holdene inden for Rød Dansk Malkerace havde meget fin udholdenhed i ydelsen, men der er især grund til at fremhæve holdene efter Skærup Munk, Nordfyns Aman, Skive Rajs, Åbenrå Øbo, Hjørring Eli, Ribe Aks, Give Ask, Århus Klint og Ribe Klint, da laktationskurven var meget flad for disse hold.

Mange af de sortbrogede hold havde en fin udholdenhed i ydelsen, og den var især god på holdene efter Egholm Gran, Skive Hal, Hjørring Domino, Egholm Drost og Hjørring Simon. Kun enkelte af holdene havde stærk nedgang i ydelsen gennem hele prøvetiden.

Flere af Jerseyholdene havde særdeles god udholdenhed i ydelsen, og laktationskurven var meget flad for holdene efter Fyns Glen, Hjørring

Tabel 9. Forholdstal for smørydelsen gennem laktationsperioden.
Table 9. Proportionals for the yield of butter during the lactation period

Tyrens navn *Name of bull*	Forholdstal *Proportionals*		
	Første 100 dage *First 100 days*	101—200 dage *101—200 days*	201—304 dage *201—304 days*
RDM:			
Uwe	100	93	83
Skærup Munk	100	103	98
Horsens Bitz	100	95	89
Ålborg Børge	100	90	87
Dybbøl Holm	100	99	81
Skærup Bus	100	92	89
Skov	100	96	83
Randers Sortemose	100	95	89
Samsø Frej	100	98	88
Nordfyns Aman	100	107	95
Skive Rajs	100	94	98
Ringkøbing Holm	100	94	88
Åbenrå Øbo	100	99	93
Haslev Odin	100	97	92
Hjørring Eli	100	100	91
Skærup Karlby	100	88	82
Rødding Ursus	100	96	85
Ribe Aks	100	98	101
Hjørring Iver	100	99	89
Give Ask	100	103	98
Ribe Frem	100	91	89
Århus Hof	100	95	86
Centrums Prik	100	100	89
Rødding Frem	100	94	95
Holbæk Allaks	100	93	87
Bjørn Sydvest	100	89	85
Bakager Wahl	100	94	94
Kolding Pall 23	100	96	90
Varde Grøn	100	88	85
Horsens Gert	100	84	81
Vald Nordvest	100	95	81
Thy Skov	100	90	86
Erslev	100	92	84
Djurs Wahl	100	86	80
Hadsten Gert	100	95	91
Århus Ask	100	103	96
Ribe Klint	100	103	96
Varde Kry	100	85	86
Kolding Munk 143	100	90	74
Bøg	100	91	89
Gns. (Average)	100	95	89

Tyrens navn *Name of bull*	Forholdstal *Proportionals*		
	Første 100 dage *First 100 days*	101—200 dage *101—200 days*	201—304 dage *201—304 days*
SDM:			
Varde Stefan	100	95	88
Kolding Gordon 39	100	86	75
Egholm Gran	100	100	93
Sdj. Aksel	100	90	80
Ry	100	88	82
Skive Hal	100	99	94
Hjørring Domino	100	100	92
Sdj. Ark	100	91	81
Egholm Drost	100	103	93
Varde Diamant	100	89	84
Bjerringbro Basta	100	88	79
Swea	100	96	88
Sdj. Viktor	100	89	78
Randers Dijk	100	84	78
Thy Ponto	100	86	82
Hjørring Simon	100	100	93
Varde Alfa	100	93	90
Randers Drost	100	83	80
Hjørring Drost	100	94	87
Sdj. Trin	100	91	86
Herning Drost	100	89	83
Gns. (Average)	100	92	85
Jerseyrace:			
Bornholms Brygger	100	93	87
Fyns Glen	100	108	88
Årup Vestfyns Flink	100	98	88
Årup Vestfyns Boy	100	97	83
Fyns Ib	100	96	88
Hjørring Georg	100	103	93
Lund	100	97	90
Horsens Bak	100	85	77
Primus Syd	100	101	93
Åbenrå Vix	100	98	81
Randers Knægt	100	90	78
Dybbøl Hans	100	90	80
Morsø Bæk	100	96	86
Århus Max	100	89	83
Sydvestfyns Car	100	96	89
Randers Just	100	89	82
Gns. (Average)	100	95	85

Tabel 10. Middeltal og middelfejl. (Afkortede laktationsperioder på 250 dage).

Table 10. Mean yields and the corresponding standard errors. (Truncated lactations of 250 days)

Nr. / *No.*	Tyrens navn / *Name of bull*	Antal døtre / *Number of daughters*	kg mælk / *kg milk*	% fedt / *Fat percentage*	kg smørfedt / *kg butterfat*	kg smør / *kg butter*	% protein / *Protein percentage*	kg mælkeprot. / *kg protein*
	RDM:							
1.	Uwe	16	5522 ± 206	4,68 ± 0,06	258,47 ± 9,1	291	3,82 ± 0,05	211,17 ± 7,1
2.	Skærup Munk	20	5022 ± 131	4,44 ± 0,05	222,75 ± 5,1	250	3,82 ± 0,04	191,91 ± 4,7
3.	Horsens Bitz	18	4600 ± 212	4,84 ± 0,05	222,64 ± 11,1	251	3,94 ± 0,02	181,37 ± 8,1
4.	Ålborg Børge	17	4705 ± 157	4,62 ± 0,05	217,26 ± 7,1	244	3,95 ± 0,04	185,66 ± 5,3
5.	Dybbøl Holm	18	4613 ± 177	4,75 ± 0,07	219,05 ± 7,0	247	3,79 ± 0,04	174,77 ± 5,5
6.	Skærup Bus	18	4712 ± 186	4,44 ± 0,07	209,44 ± 9,5	235	3,68 ± 0,04	173,25 ± 6,6
7.	Skov	19	4657 ± 134	4,52 ± 0,05	210,46 ± 6,1	237	3,87 ± 0,02	180,36 ± 5,3
8.	Randers Sortemose	19	4796 ± 156	4,36 ± 0,05	209,08 ± 6,9	235	3,85 ± 0,04	184,52 ± 5,5
9.	Samsø Frej	18	4456 ± 154	4,67 ± 0,05	208,05 ± 6,9	234	3,82 ± 0,03	170,36 ± 5,0
10.	Nordfyns Aman	18	4498 ± 184	4,62 ± 0,05	207,89 ± 7,4	234	3,82 ± 0,04	171,71 ± 6,1
11.	Skive Rajs	19	4395 ± 186	4,56 ± 0,05	200,40 ± 8,5	225	3,79 ± 0,03	166,48 ± 6,4
12.	Ringkøbing Holm	16	4647 ± 212	4,41 ± 0,06	205,08 ± 8,9	230	3,77 ± 0,04	175,40 ± 7,4
13.	Åbenrå Øbo	21	4698 ± 178	4,33 ± 0,05	203,23 ± 6,8	228	3,82 ± 0,04	179,23 ± 5,4
14.	Haslev Odin	18	4449 ± 145	4,46 ± 0,05	198,54 ± 6,2	223	3,83 ± 0,03	170,44 ± 4,9
15.	Hjørring Eli	17	4395 ± 150	4,56 ± 0,05	200,44 ± 6,4	225	3,73 ± 0,03	163,95 ± 5,3
16.	Skærup Karlby	16	4619 ± 148	4,36 ± 0,07	201,44 ± 5,2	226	3,67 ± 0,05	169,67 ± 5,1
17.	Rødding Ursus	18	4174 ± 159	4,77 ± 0,05	199,03 ± 8,4	224	3,78 ± 0,03	157,81 ± 5,7
18.	Ribe Aks	19	4609 ± 109	4,18 ± 0,05	192,51 ± 4,4	216	3,68 ± 0,03	169,77 ± 3,9

19. Hjørring Iver	21	4215 ± 203	4,67 ± 0,06	196,71 ± 9,2	221	3,83 ± 0,03	161,46 ± 7,3
20. Give Ask	19	4025 ± 156	4,77 ± 0,07	192,09 ± 7,6	216	3,95 ± 0,03	159,16 ± 6,4
21. Ribe Frem	20	4461 ± 146	4,30 ± 0,05	191,97 ± 5,7	215	3,80 ± 0,03	169,37 ± 5,0
22. Århus Hof	17	4635 ± 151	4,21 ± 0,05	194,98 ± 5,7	219	3,58 ± 0,04	165,77 ± 4,7
23. Centrums Prik	19	4261 ± 194	4,55 ± 0,06	193,70 ± 8,3	218	3,96 ± 0,04	168,57 ± 7,0
24. Rødding Frem	20	4183 ± 151	4,42 ± 0,04	184,71 ± 7,3	207	3,75 ± 0,02	156,98 ± 5,6
25. Holbæk Allaks	20	4053 ± 170	4,63 ± 0,06	187,54 ± 7,9	211	3,88 ± 0,02	157,28 ± 6,4
26. Bjørn Sydvest	20	4165 ± 143	4,53 ± 0,06	188,53 ± 6,1	212	3,98 ± 0,04	165,66 ± 5,1
27. Bakager Wahl	20	4259 ± 166	4,35 ± 0,06	185,41 ± 6,5	208	3,70 ± 0,03	157,64 ± 5,6
28. Kolding Pall 23	16	4169 ± 239	4,32 ± 0,06	180,01 ± 9,2	202	3,61 ± 0,04	150,40 ± 7,7
29. Varde Grøn	13	4059 ± 116	4,44 ± 0,08	180,23 ± 5,3	202	3,73 ± 0,03	151,37 ± 3,8
30. Horsens Gert	16	3947 ± 175	4,57 ± 0,04	180,53 ± 7,9	203	3,88 ± 0,03	153,31 ± 6,1
31. Vald Nordvest	18	4015 ± 173	4,55 ± 0,08	182,65 ± 6,9	205	3,71 ± 0,05	149,01 ± 5,6
32. Thy Skov	17	4088 ± 123	4,37 ± 0,07	178,70 ± 5,7	201	3,57 ± 0,03	146,13 ± 4,0
33. Erslev	19	3888 ± 211	4,65 ± 0,05	180,83 ± 10,1	203	3,74 ± 0,04	145,55 ± 7,6
34. Djurs Wahl	20	4139 ± 106	4,32 ± 0,04	178,79 ± 4,4	201	3,60 ± 0,03	148,83 ± 3,4
35. Hadsten Gert	19	4003 ± 154	4,33 ± 0,05	173,28 ± 6,2	195	3,64 ± 0,04	145,80 ± 4,9
36. Århus Ask	19	3924 ± 106	4,40 ± 0,04	172,66 ± 4,3	194	3,71 ± 0,02	145,69 ± 3,4
37. Ribe Klint	19	3844 ± 137	4,34 ± 0,04	166,80 ± 6,6	187	3,67 ± 0,02	141,25 ± 5,0
38. Varde Kry	18	3765 ± 169	4,34 ± 0,06	163,47 ± 5,8	184	3,66 ± 0,03	137,68 ± 5,5
39. Kolding Munk 143	19	3645 ± 179	4,44 ± 0,05	161,97 ± 7,4	182	3,72 ± 0,02	135,72 ± 6,5
40. Bøg	18	3402 ± 168	4,66 ± 0,07	158,66 ± 7,2	179	3,97 ± 0,04	135,08 ± 5,8
Gns. (Average)	18	4318	4,49	194,00	218	3,78	163,14

Nr. / *No.*	Tyrens navn / *Name of bull*	Antal døtre / *Number of daughters*	kg mælk / *kg milk*	% fedt / *Fat percentage*	kg smørfedt / *kg butterfat*	kg smør / *kg butter*	% protein / *Protein percentage*	kg mælkeprot. / *kg protein*
	SDM:							
1.	Varde Stefan	20	4804 ± 154	4,46 ± 0,07	214,31 ± 7,8	241	3,59 ± 0,04	172,28 ± 5,0
2.	Kolding Gordon 39	20	5029 ± 165	4,23 ± 0,07	212,89 ± 5,9	239	3,56 ± 0,04	178,89 ± 5,2
3.	Egholm Gran	20	4906 ± 138	4,25 ± 0,05	208,62 ± 5,3	234	3,57 ± 0,03	174,94 ± 4,2
4.	Sdj. Aksel	19	4465 ± 212	4,74 ± 0,06	211,59 ± 10,8	238	3,60 ± 0,03	160,78 ± 7,3
5.	Ry	20	4860 ± 187	4,28 ± 0,05	208,19 ± 7,7	234	3,50 ± 0,03	170,08 ± 5,7
6.	Skive Hal	20	5023 ± 198	4,10 ± 0,06	206,10 ± 8,0	231	3,59 ± 0,03	180,43 ± 6,8
7.	Hjørring Domino	18	4682 ± 143	4,28 ± 0,06	200,51 ± 6,4	225	3,62 ± 0,04	169,30 ± 4,6
8.	Sdj. Ark	20	4739 ± 179	4,24 ± 0,04	201,13 ± 7,1	226	3,58 ± 0,04	169,77 ± 5,6
9.	Egholm Drost	15	4739 ± 262	4,11 ± 0,07	194,80 ± 10,2	218	3,49 ± 0,04	165,22 ± 8,9
10.	Varde Diamant	18	4342 ± 218	4,48 ± 0,06	194,33 ± 9,9	218	3,56 ± 0,04	154,59 ± 6,9
11.	Bjerringbro Basta	20	4343 ± 143	4,47 ± 0,05	193,96 ± 6,8	218	3,69 ± 0,04	160,33 ± 4,4
12.	Swea	20	4545 ± 169	4,25 ± 0,04	193,04 ± 8,1	217	3,74 ± 0,03	170,01 ± 6,4
13.	Sdj. Viktor	18	4717 ± 184	4,08 ± 0,08	192,67 ± 7,8	216	3,36 ± 0,04	158,47 ± 5,5
14.	Randers Dijk	19	4202 ± 125	4,55 ± 0,05	191,22 ± 5,1	215	3,88 ± 0,03	162,98 ± 4,3
15.	Thy Ponto	17	4528 ± 213	4,13 ± 0,05	187,16 ± 9,0	210	3,51 ± 0,04	158,77 ± 6,9
16.	Hjørring Simon	20	4203 ± 150	4,22 ± 0,04	177,51 ± 6,3	199	3,70 ± 0,03	155,45 ± 5,0
17.	Varde Alfa	18	4000 ± 180	4,34 ± 0,07	173,58 ± 8,2	195	3,68 ± 0,03	147,19 ± 6,9
18.	Randers Drost	20	4112 ± 163	4,19 ± 0,06	172,14 ± 6,6	193	3,70 ± 0,04	152,27 ± 5,8
19.	Hjørring Drost	17	3834 ± 125	4,30 ± 0,04	164,69 ± 5,9	185	3,83 ± 0,02	146,70 ± 5,0
20.	Sdj. Trin	20	3968 ± 160	4,06 ± 0,07	161,07 ± 7,5	180	3,55 ± 0,03	140,73 ± 5,5
21.	Herning Drost	19	3627 ± 145	4,11 ± 0,03	148,97 ± 6,6	167	3,69 ± 0,02	133,89 ± 5,2
	Gns. (Average)	19	4460	4,28	190,88	214	3,61	161,10

Jerseyrace:							
1. Bornholms Brygger	16	3519 ± 118	6,39 ± 0,07	224,87 ± 8,1	255	4,19 ± 0,05	147,49 ± 4,3
2. Fyns Glen	19	3430 ± 107	6,53 ± 0,11	224,03 ± 4,9	255	4,47 ± 0,03	153,27 ± 4,6
3. Årup Vestfyns Flink	21	3294 ± 99	6,70 ± 0,07	220,76 ± 5,7	251	4,25 ± 0,03	140,03 ± 3,7
4. Årup Vestfyns Boy	19	3261 ± 107	6,64 ± 0,09	216,60 ± 7,2	246	4,38 ± 0,03	142,74 ± 4,8
5. Fyns Ib	20	3249 ± 97	6,42 ± 0,08	208,43 ± 5,3	237	4,37 ± 0,04	142,06 ± 3,7
6. Hjørring Georg	19	3089 ± 83	6,76 ± 0,07	208,70 ± 4,7	237	4,46 ± 0,03	137,80 ± 3,6
7. Lund	18	3203 ± 71	6,41 ± 0,09	205,21 ± 4,0	233	4,21 ± 0,04	134,72 ± 3,1
8. Horsens Bak	17	3176 ± 188	6,47 ± 0,10	205,52 ± 11,7	233	4,25 ± 0,04	135,00 ± 7,2
9. Primus Syd	16	3164 ± 153	6,23 ± 0,08	197,11 ± 9,8	224	4,09 ± 0,03	129,25 ± 5,9
10. Åbenrå Vix	18	3027 ± 111	6,65 ± 0,09	201,28 ± 6,6	229	4,55 ± 0,04	137,77 ± 4,5
11. Randers Knægt	20	3079 ± 134	6,37 ± 0,09	196,28 ± 7,8	223	4,35 ± 0,03	133,87 ± 5,7
12. Dybbøl Hans	19	3216 ± 126	6,11 ± 0,09	196,63 ± 8,0	223	4,18 ± 0,03	134,27 ± 5,0
13. Morsø Bæk	20	2876 ± 130	6,64 ± 0,08	191,04 ± 8,5	217	4,28 ± 0,03	123,02 ± 5,2
14. Århus Max	20	2790 ± 103	6,63 ± 0,05	184,93 ± 6,4	210	4,44 ± 0,03	123,79 ± 4,3
15. Sydvestfyns Car	19	2619 ± 127	6,74 ± 0,08	176,57 ± 8,5	201	4,30 ± 0,04	112,50 ± 5,0
16. Randers Just	19	2830 ± 85	6,05 ± 0,07	171,28 ± 4,2	194	4,20 ± 0,04	118,82 ± 3,3
Gns. (Average)	19	3114	6,48	201,83	229	4,31	134,15

Tabel 11. Spredning (standardafvigelse) af døtrenes ydelsestal.

Table 11. Standard deviation of the daughters' yield-figures

Tyrens navn *Name of bull*	kg mælk *kg milk*	% fedt *Fat percentage*	kg smørfedt *kg butterfat*	% protein *Prot. percentage*	kg mælkeprot. *kg protein*	Afkomsprøvestation *Testing station*
RDM:						
Århus Ask	464	0,18	18,8	0,10	14,9	Elkjær
Varde Grøn	418	0,30	19,1	0,11	13,8	Vardegård
Ribe Aks	476	0,22	19,3	0,14	17,1	Skølvad
Djurs Wahl	474	0,20	19,9	0,14	15,1	Kalø
Skærup Karlby	592	0,29	20,7	0,18	20,2	Lægård
Skærup Munk	585	0,20	23,0	0,18	20,8	Skovgård
Thy Skov	508	0,27	23,6	0,12	16,4	Kronborg
Århus Hof	621	0,20	23,6	0,15	19,2	Elkjær
Varde Kry	716	0,24	24,7	0,14	23,5	Vardegård
Ribe Frem	654	0,22	25,6	0,15	22,5	Skølvad
Haslev Odin	615	0,21	26,3	0,15	20,6	Sydsjælland
Hjørring Eli	619	0,23	26,6	0,14	21,7	Dybvad
Skov	583	0,21	26,7	0,09	23,2	Lundgård
Hadsten Gert	671	0,23	27,1	0,17	21,4	Kalø
Bjørn Sydvest	639	0,27	27,1	0,18	22,8	Grønhøjgård
Ribe Klint	596	0,19	28,7	0,10	21,9	Skølvad
Bakager Wahl	742	0,25	28,9	0,13	25,1	Kalø
Vald Nordvest	735	0,33	29,1	0,21	23,7	Torntofte
Ålborg Børge	646	0,20	29,4	0,18	21,7	Lundgård

Samsø Frej	653	0,20	29,5	0,14	21,0	Samsø
Dybbøl Holm	750	0,28	29,6	0,18	23,2	Veesbæk
Randers Sortemose	678	0,22	29,9	0,16	24,0	Lundgård
Bøg	714	0,30	30,6	0,15	24,6	Kalø
Åbenrå Øbo	815	0,22	31,1	0,20	24,8	Moesgård
Nordfyns Aman	783	0,23	31,4	0,15	25,9	Enemærket
Horsens Gert	700	0,15	31,6	0,13	24,3	Østerhåb
Kolding Munk 143	782	0,22	32,4	0,09	28,4	Gelballegård
Rødding Frem	677	0,19	32,8	0,11	25,2	Østerhåb
Give Ask	679	0,29	33,2	0,13	27,7	Skovgård
Holbæk Allaks	761	0,26	35,1	0,11	28,4	Torntofte
Ringkøbing Holm	847	0,23	35,5	0,16	29,7	Lægård
Rødding Ursus	675	0,22	35,5	0,11	24,2	Brøstrupgård
Centrums Prik	846	0,27	36,0	0,19	30,6	Enemærket
Uwe	826	0,22	36,6	0,19	28,4	Gyldenagergård
Kolding Pall 23	958	0,25	36,7	0,16	30,7	Gelballegård
Skive Rajs	813	0,21	37,1	0,15	27,7	Krarup Nygård
Skærup Bus	789	0,30	40,1	0,18	28,0	Morsø
Hjørring Iver	929	0,28	42,0	0,13	33,5	Dybvad
Erslev	921	0,22	43,9	0,16	33,1	Kalø
Horsens Bitz	901	0,22	47,0	0,09	34,4	Østerhåb
Gns. (Average)	696	0,24	30.1	0,15	24,1	

Tyrens navn *Name of bull*	kg mælk *kg milk*	% fedt *Fat percentage*	kg smørfedt *kg butterfat*	% protein *Prot. percentage*	kg mælkeprot. *kg protein*	Afkomsprøvestation *Testing station*
SDM:						
Randers Dijk	546	0,21	22,3	0,14	18,8	Rosenfeldt
Egholm Gran	619	0,21	23,8	0,14	18,9	Skovgård
Hjørring Drost	517	0,15	24,5	0,06	20,6	Dybvad
Kolding Gordon 39	737	0,31	26,5	0,16	23,4	Gelballegård
Hjørring Domino	605	0,24	27,1	0,17	19,5	Dybvad
Hjørring Simon	670	0,20	28,2	0,11	22,5	Dybvad
Herning Drost	631	0,15	28,7	0,10	22,6	Moesgård
Randers Drost	730	0,25	29,6	0,16	25,7	Rosenfeldt
Bjerringbro Basta	640	0,21	30,2	0,17	19,5	Rosenfeldt
Sdj. Ark	800	0,20	31,7	0,16	25,0	Veesbæk
Sdj. Viktor	779	0,34	33,1	0,19	23,5	Brøstrupgård
Sdj. Trin	715	0,31	33,7	0,13	24,5	Brøstrupgård
Ry	835	0,24	34,5	0,15	25,7	Morsø
Varde Alfa	764	0,28	34,7	0,14	29,4	Vardegård
Varde Stefan	689	0,31	35,0	0,17	22,2	Skølvad
Skive Hal	887	0,26	35,6	0,15	30,2	Krarup Nygård
Swea	756	0,17	36,2	0,13	28,7	Lundgård
Thy Ponto	876	0,22	37,2	0,18	28,3	Kronborg
Egholm Drost	1016	0,26	39,6	0,17	34,6	Skovgård
Varde Diamant	926	0,25	41,8	0,16	29,1	Vardegård
Sdj. Aksel	925	0,24	47,0	0,12	31,9	Brøstrupgård
Gns. (Average)	746	0,24	32,4	0,15	25,0	

Jerseyrace:						
Lund	300	0,37	17,1	0,16	13,1	Kalø
Randers Just	372	0,31	18,4	0,17	14,4	Kalø
Hjørring Georg	364	0,31	20,4	0,14	15,6	Dybvad
Fyns Glen	467	0,47	21,3	0,14	20,0	Enemærket
Fyns Ib	435	0,35	23,9	0,17	16,7	Grønhøjgård
Årup Vestfyns Flink	455	0,31	26,2	0,14	17,1	Ejstrupgård
Åbenrå Vix	470	0,37	28,2	0,16	19,3	Moesgård
Århus Max	461	0,22	28,8	0,13	19,2	Elkjær
Årup Vestfyns Boy	466	0,39	31,3	0,15	20,8	Ejstrupgård
Bornholms Brygger	472	0,28	32,3	0,19	17,4	Kannikegård
Randers Knægt	600	0,38	34,7	0,14	25,4	Kalø
Dybbøl Hans	547	0,41	34,7	0,14	21,7	Veesbæk
Sydvestfyns Car	553	0,33	36,9	0,17	21,9	Ejstrupgård
Morsø Bæk	580	0,36	37,9	0,13	23,4	Morsø
Primus Syd	612	0,32	39,0	0,13	23,6	Skølvad
Horsens Bak	773	0,42	48,2	0,16	29,6	Østerhåb
Gns. (Average)	495	0,35	30,0	0,15	20,0	

Georg og Primus Syd. Et par af holdene havde lidt for stærk nedgang i ydelsen gennem det meste af prøvetiden, og udholdenheden i ydelsen var kun nogenlunde tilfredsstillende for nogle af holdene i sommerperioden.

4. Ydelsen i 250 dage.

Til denne opgørelse er ydelsen udregnet i 250 dage for hver enkelt kvie. Holdene er rangeret i samme rækkefølge som ved 304 dages opgørelsen.

Holdenes gennemsnitlige ydelse er anført i *tabel 10,* og for mælk, fedtprocent, smørfedt, proteinprocent og mælkeprotein er desuden vedføjet middelfejlen på middeltallet.

5. Spredningen.

Spredningen i holdenes ydelse er anført i *tabel 11* og omfatter mælk, fedtprocent, smørfedt, proteinprocent og mælkeprotein. Holdene er rangeret efter spredningen i smørfedtydelsen, således at holdet med den mindste spredning er placeret øverst. Spredningen udregnes på grundlag af de enkelte kviers ydelse i 250 dage.

Gennemsnitsydelsen for holdet efter Århus Ask blev 172,66 kg smørfedt, og spredningen blev 18,8 kg smørfedt. Havde der været en kvie mere på holdet, ville der have været 68,3 pct. sandsynlighed for, at den ydede 172,66 $\pm$ 18,8 kg smørfedt, hvilket vil sige i intervallet fra 153,86 til 191,46 kg smørfedt. Sandsynligheden for, at ydelsen skulle blive 172,66 $\pm$ 37,6 kg smørfedt er 95,4 procent.

Den gennemsnitlige spredning i ydelsestallene for Rød Dansk Malkerace blev stort set af samme størrelsesorden som sidste år. Den gennemsnitlige spredning i mælkeproteinet blev en anelse højere end i 1965–66, medens spredningen for de øvrige 4 anførte ydelsestal blev en smule mindre, men der er dog ikke tale om reelle forskelle i den gennemsnitlige spredning for de røde hold i de to sidste prøveår. Inden for Rød Dansk Malkerace fandtes den mindste spredning i smørfedtydelsen på holdene efter Århus Ask, Varde Grøn, Ribe Aks og Djurs Wahl. Den største spredning i smørfedtydelsen forekom på holdet efter Horsens Bitz, men der var dog også stor spredning i smørfedtydelsen på holdene efter Erslev, Hjørring Iver og Skærup Bus.

Den gennemsnitlige spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein blev en smule højere for Sortbroget Dansk Malkerace, men der var dog ikke tale om reelle forskelle. Af de sortbrogede hold havde holdene efter Randers Dijk, Egholm Gran og Hjørring Drost den mindste spredning i smørfedtydelsen, medens den største forekom på holdene efter Sdj. Aksel og Varde Diamant.

Inden for Jerseyracen blev den gennemsnitlige spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein lidt større end i 1965–66, medens den

gennemsnitlige spredning i fedt- og proteinprocenterne har været af samme størrelsesorden i de to sidste prøveår. Holdene efter Lund og Randers Just havde den mindste spredning i smørfedtydelsen inden for Jerseyracen, medens den største forekom på holdet efter Horsens Bak.

Som i de foregående år havde Jerseyholdene den mindste spredning i mælkeydelsen og den største i fedtprocenten, medens den gennemsnitlige spredning for proteinprocenten blev 0,15 for alle 3 racer. Det er bemærkelsesværdigt, at selv om proteinprocenten er højere for Jerseyracen end for de to andre racer, udviser den samme variation inden for holdene for alle 3 racer.

I. Malkbarhedsundersøgelserne.

Malkearbejdet på afkomsprøvestationerne gennemførtes efter de sædvanlige retningslinier, som var følgende:

1. Yverne aftørredes med en klud vredet op i vand på ca. 30–40° C., ca. 1 minut før maskinen blev sat på.
2. Yverne fik massage, umiddelbart før maskinmalkningen ophørte.
3. Der blev eftermalket med hånd.
4. Der benyttedes 1 maskine pr. mand eller 3 maskiner til 2 mand.
5. Malkerne skulle sørge for, at maskinen ikke sad for længe på kvien.
6. Af hensyn til såvel maskinmalkningen som eftermalkningen med hånd skulle malkerne være dygtige til håndmalkning.
7. Det var vigtigt, at malkerne kendte de enkelte kviers malkbarhed.

Der blev foretaget en ekstra malkbarhedsundersøgelse i november og december måned, men resultaterne fra denne undersøgelse blev kun anvendt ved udpegningen af de tyre, som skulle have deres sønner afprøvet på Egtved.

De egentlige malkbarhedsundersøgelser begyndte den 3. januar og blev afsluttet den 21. marts. Der blev foretaget to målinger, som hver omfattede et døgn, hvorved kviernes malkbarhed blev undersøgt ved 4 malkninger. To assistenter foretog undersøgelserne af holdene. De hold, som undersøgtes først i januar måned, undersøgtes i slutningen i den sidste omgang, således at det ikke var de samme hold, som undersøgtes først i begge omgange.

Ved malkbarhedsundersøgelserne bestemmes kg mælk for hvert minut, mængden af den med maskinen udmalkede mælk, maskintidens længde og mængden af eftermælk.

Tabel 12. Malkbarhedsundersøgelser.

Table 12. Investigations on milking ability

Tyrens navn *Name of bull*	kg mælk, gns. pr. kvie *kg milk av. per cow*		Malk-barheds-tallet ± m *Corr. milking rate ± m*	% af mælken i de første 3 min. *% of milk in the first 3 min.*	Malke-tid i min. gns. pr. kvie *Milking time in min. av. per cow*	kg efter-mælk gns. pr. malkning *kg residual milk av. per milking*	Opstukket eller opblokket *treated teats*)*		Afkoms-prøvestation *Testing station*
RDM:	dgl. *daily*	pr. min. *per min*					antal kvier *No. of cows*	antal patter *No. of teats*	
Erslev	15,7	2,51	2,53 ± 0,13	86,4	3,1	0,4	0	0	Kalø
Bøg	13,8	2,30	2,47 ± 0,09	89,4	2,9	0,4	0	0	Kalø
Hadsten Gert	16,3	2,49	2,46 ± 0,11	87,4	3,2	0,4	0	0	Kalø
Djurs Wahl	17,0	2,34	2,25 ± 0,12	83,4	3,7	0,4	0	0	Kalø
Horsens Gert	14,9	2,16	2,25 ± 0,13	82,2	3,3	0,6	0	0	Østerhåb
Varde Kry	14,6	2,08	2,20 ± 0,09	84,4	3,4	0,4	0	0	Vardegård
Bakager Wahl	16,8	2,26	2,19 ± 0,11	79,6	3,7	0,4	0	0	Kalø
Randers Sortemose	18,9	2,39	2,15 ± 0,12	77,0	3,9	0,6	1	4	Lundgård
Ribe Frem	17,5	2,21	2,09 ± 0,16	73,2	3,9	0,8	0	0	Skølvad
Rødding Ursus	16,6	2,11	2,06 ± 0,14	75,3	4,1	0,4	0	0	Brøstrupgård
Samsø Frej	17,9	2,19	2,03 ± 0,08	78,6	3,9	0,6	0	0	Samsø
Århus Ask	15,9	2,01	2,02 ± 0,09	78,0	3,9	0,4	0	0	Elkjær
Skærup Munk	20,5	2,35	1,99 ± 0,09	74,4	4,2	0,7	0	0	Skovgård
Kolding Munk 143	14,7	1,87	1,98 ± 0,08	76,4	3,7	0,7	0	0	Gelballegård
Skive Rajs	17,4	2,09	1,98 ± 0,13	76,7	4,2	0,4	1	1	Krarup Nygård
Skærup Bus	19,0	2,22	1,97 ± 0,13	73,2	4,3	0,4	1	4	Morsø
Århus Hof	19,1	2,21	1,95 ± 0,09	75,4	4,2	0,6	0	0	Elkjær

Ribe Aks	18,9	2,18	1,95 ± 0,12	71,0	4,1	0,8	0	0	Skølvad
Thy Skov	16,1	1,92	1,92 ± 0,11	74,9	4,2	0,4	0	0	Kronborg
Ringkøbing Holm	18,3	2,11	1,92 ± 0,12	72,6	4,2	0,5	0	0	Lægård
Ålborg Børge	18,4	2,09	1,90 ± 0,13	71,2	4,3	0,6	1	4	Lundgård
Nordfyns Aman	17,9	2,03	1,88 ± 0,13	70,8	4,4	0,5	1	1	Enemærket
Horsens Bitz	18,2	2,03	1,85 ± 0,11	69,2	4,3	0,7	0	0	Østerhåb
Rødding Frem	16,6	1,89	1,84 ± 0,09	70,4	4,3	0,6	1	4	Østerhåb
Varde Grøn	16,3	1,82	1,80 ± 0,13	70,8	4,5	0,5	0	0	Vardegård
Bjørn Sydvest	16,5	1,85	1,80 ± 0,08	71,6	4,4	0,5	1	4	Grønhøjgård
Skærup Karlby	18,6	2,00	1,79 ± 0,12	69,8	4,6	0,6	1	1	Lægård
Vald Nordvest	15,5	1,75	1,78 ± 0,10	70,6	4,4	0,4	0	0	Torntofte
Give Ask	16,8	1,84	1,78 ± 0,09	69,7	4,4	0,6	0	0	Skovgård
Centrums Prik	17,3	1,85	1,74 ± 0,12	67,8	4,7	0,5	1	4	Enemærket
Skov	19,3	2,00	1,73 ± 0,10	67,1	4,8	0,6	1	1	Lundgård
Hjørring Eli	17,7	1,87	1,73 ± 0,11	67,4	4,7	0,4	1	4	Dybvad
Holbæk Allaks	15,3	1,66	1,72 ± 0,08	68,0	4,6	0,3	3	12	Torntofte
Hjørring Iver	17,3	1,81	1,70 ± 0,08	66,7	4,7	0,4	0	0	Dybvad
Kolding Pall 23	17,1	1,78	1,69 ± 0,11	66,0	4,6	0,6	0	0	Gelballegård
Uwe	21,4	2,10	1,66 ± 0,08	68,2	4,9	0,6	0	0	Gyldenagergård
Ribe Klint	16,0	1,66	1,65 ± 0,12	63,4	4,6	1,0	0	0	Skølvad
Haslev Odin	17,9	1,72	1,57 ± 0,07	60,4	4,9	0,7	0	0	Sydsjælland
Dybbøl Holm	18,2	1,62	1,44 ± 0,08	56,2	5,4	0,8	0	0	Veesbæk
Åbenrå Øbo	19,1	1,58	1,33 ± 0,09	50,7	5,8	0,7	0	0	Moesgård
Gns. (Average)	17,3	2,02	1,92	72,6	4,2	0,5			

Tyrens navn *Name of bull*	kg mælk, gns. pr. kvie *kg milk av. per cow*		Malkbarhedstallet ± m *Corr. milking rate ± m*	% af mælken i de første 3 min. *% of milk in the first 3 min.*	Malketid i min. gns. pr. kvie *Milking time in min. av. per cow*	kg eftermælk gns. pr. malkning *kg residual milk av. per milking*	Opstukket eller opblokket *treated teats*)*		Afkomsprøvestation *Testing station*
	dgl. *daily*	pr. min. *per min.*					antal kvier *No. of cows*	antal patter *No. of teats*	
SDM:									
Sdj. Aksel	17,7	3,16	3,02 ± 0,12	92,4	2,7	0,5	0	0	Brøstrupgård
Varde Stefan	18,7	2,85	2,63 ± 0,17	81,5	3,2	0,9	0	0	Skølvad
Egholm Drost	19,0	2,79	2,55 ± 0,19	84,8	3,4	0,5	0	0	Skovgård
Hjørring Domino	18,9	2,73	2,50 ± 0,12	86,6	3,4	0,4	0	0	Dybvad
Randers Dijk	15,7	2,36	2,38 ± 0,15	85,0	3,4	0,4	0	0	Rosenfeldt
Swea	18,4	2,57	2,38 ± 0,16	81,6	3,6	0,4	0	0	Lundgård
Hjørring Drost	15,0	2,27	2,35 ± 0,12	86,9	3,3	0,4	0	0	Dybvad
Skive Hal	20,2	2,66	2,32 ± 0,13	80,8	3,8	0,4	0	0	Krarup Nygård
Kolding Gordon 39	19,8	2,54	2,23 ± 0,11	76,8	3,8	0,7	0	0	Gelballegård
Ry	19,3	2,48	2,21 ± 0,10	80,1	3,8	0,6	0	0	Morsø
Herning Drost	15,1	2,12	2,20 ± 0,13	81,4	3,5	0,5	0	0	Moesgård
Sdj. Trin	15,2	2,12	2,18 ± 0,14	80,2	3,8	0,6	0	0	Brøstrupgård
Varde Alfa	16,1	2,14	2,13 ± 0,11	80,3	3,7	0,5	0	0	Vardegård
Thy Ponto	17,4	2,23	2,12 ± 0,20	75,6	4,1	0,5	0	0	Kronborg
Egholm Gran	19,6	2,38	2,08 ± 0,14	76,6	4,1	0,6	0	0	Skovgård
Sdj. Ark	18,6	2,27	2,06 ± 0,13	73,2	4,0	0,7	0	0	Veesbæk
Hjørring Simon	16,9	2,11	2,03 ± 0,09	78,1	4,0	0,4	0	0	Dybvad
Bjerringbro Basta	16,6	2,05	2,00 ± 0,13	74,2	4,2	0,4	0	0	Rosenfeldt
Varde Diamant	17,2	2,01	1,91 ± 0,10	72,0	4,1	0,6	0	0	Vardegård
Sdj. Viktor	18,7	2,08	1,86 ± 0,10	70,9	4,5	0,6	0	0	Brøstrupgård
Randers Drost	15,3	1,67	1,73 ± 0,12	67,4	4,7	0,4	0	0	Rosenfeldt
Gns. (Average)	17,6	2,36	2,23	79,4	3,8	0,5			

Jerseyrace:									
Dybbøl Hans	11,9	2,32	2,33 ± 0,10	90,0	2,4	0,4	0	0	Veesbæk
Hjørring Georg	12,2	2,33	2,32 ± 0,08	92,8	2,5	0,4	0	0	Dybvad
Randers Just	11,0	1,97	2,04 ± 0,10	90,3	2,7	0,3	0	0	Kalø
Fyns Glen	12,8	2,08	2,03 ± 0,06	90,0	2,9	0,4	0	0	Enemærket
Lund	13,2	2,04	1,96 ± 0,09	87,7	3,2	0,4	0	0	Kalø
Morsø Bæk	11,4	1,91	1,95 ± 0,09	87,4	2,8	0,4	0	0	Morsø
Århus Max	11,6	1,89	1,92 ± 0,09	87,4	2,9	0,5	0	0	Elkjær
Bornholms Brygger	15,2	2,10	1,88 ± 0,12	82,9	3,4	0,6	0	0	Kannikegård
Horsens Bak	12,5	1,89	1,86 ± 0,07	85,4	3,1	0,4	0	0	Østerhåb
Fyns Ib	12,5	1,87	1,84 ± 0,09	85,1	3,3	0,2	0	0	Grønhøjgård
Sydvestfyns Car	10,7	1,75	1,84 ± 0,08	85,0	2,8	0,5	0	0	Ejstrupgård
Årup Vestfyns Boy	13,0	1,90	1,83 ± 0,08	84,6	3,2	0,6	0	0	Ejstrupgård
Årup Vestfyns Flink	13,4	1,83	1,73 ± 0,11	79,3	3,6	0,6	0	0	Ejstrupgård
Randers Knægt	12,2	1,72	1,71 ± 0,06	82,8	3,3	0,4	0	0	Kalø
Primus Syd	12,6	1,72	1,68 ± 0,10	79,2	3,2	0,8	0	0	Skølvad
Åbenrå Vix	12,1	1,36	1,35 ± 0,08	70,2	4,3	0,4	0	0	Moesgård
Gns. (Average)	12,4	1,92	1,89	85,0	3,1	0,5			

*) *A dilator was used to widen the teat canal.*

Resultaterne findes anført i *tabel 12,* og opstillingen er foretaget efter malkbarhedstallet inden for hver af racerne.

Ved udregningerne af tallene er anvendt følgende fremgangsmåde:

$$\text{kg mælk pr. minut} = \frac{\text{kg mælk udmalket med maskinen}}{\text{malketiden i min.}}$$

$$\text{pct. af mælken i de første 3 min.} = \frac{\text{kg mælk i de første 3 min.} \times 100}{\text{kg mælk i alt (eftermælk medregnet)}}$$

$$\text{malketid i minutter} = \frac{\text{maskinmalkningstiden i min.}}{\text{antal malkninger}}$$

Malkbarhedstallet udregnedes efter følgende formler for de 3 racer:

RDM: kg mælk pr. min. ÷ 0,081 (kg mælk daglig ÷ 16,0)
SDM: kg mælk pr. min. ÷ 0,081 (kg mælk daglig ÷ 16,0)
Jerseyrace: kg mælk pr. min. ÷ 0,068 (kg mælk daglig ÷ 12,0)

Malkbarhedstallet er udregnet for de enkelte kvier, og tallene findes anført i hovedtabellerne, som findes sidst i beretningen. Gennemsnittet af de enkelte kviers malkbarhedstal angiver holdets malkbarhedstal i *tabel 12.*

Inden for Rød Dansk Malkerace fik holdene efter Erslev, Bøg og Hadsten Gert de fineste malkbarhedsresultater. Malkbarhedsresultaterne var også gode på flere af de følgende hold, og der var færre hold med dårlige malkbarhedsresultater end i de nærmest foregående år. De dårligste malkbarhedsresultater blev opnået på holdene efter Åbenrå Øbo, Dybbøl Holm og Haslev Odin. Det gennemsnitlige malkbarhedstal blev en smule bedre end i 1965–66. Der blev foretaget opstikninger eller opblokninger på 44 patter, og det svarer til 1,1 patter pr. hold, medens det var 1,2 i 1965–66 og 1,5 i 1964–65.

Holdet efter Sdj. Aksel fik det højeste malkbarhedstal inden for den sortbrogede race. Døtrene efter Sdj. Aksel var meget hurtige at malke, men der var vanskeligheder med nedlægningen af mælken hos to kvier på dette hold, men de blev udsat af prøven, inden malkbarhedsundersøgelsen gennemførtes. Af øvrige hold inden for Sortbroget Dansk Malkerace er der grund til at fremhæve holdene efter Varde Stefan, Egholm Drost og Hjørring Domino. De dårligste resultater blev opnået på holdene efter Randers Drost og Sdj. Viktor. Der opnåedes et lidt højere gennemsnitligt malkbarhedstal end i 1965–66, og der blev ikke foretaget behandlinger af patterne på nogen af kvierne.

Inden for Jerseyracen opnåedes de fineste malkbarhedstal på holdene efter Dybbøl Hans og Hjørring Georg, og det var egentlig kun holdet efter Åbenrå Vix, som ikke nåede et tilfredsstillende resultat. Det gennemsnitlige malkbarhedstal lå på samme niveau som i 1965–66. Der blev ikke foretaget nogen behandlinger af patterne, men dette var heller ikke tilfældet i de to foregående år.

J. Vejning og måling.

Kvierne vejes ved ankomsten til stationerne. Efter kælvningen og umiddelbart før udbindingen vejes kvierne i 3 på hinanden følgende dage, hvor forskellen mellem den højeste og den laveste vægt højest udgør 2 pct. Desuden vejes kvierne i januar og marts samt en gang månedlig i sommerperioden. Endelig vejes kvierne ved prøvens afslutning og før hjemsendelsen, men disse to vejninger kan falde sammen, da kvierne ofte hjemsendes ved prøvens slutning.

Målingerne af kvierne blev påbegyndt den 1. marts og afsluttet den 16. marts, og alle målene blev taget af videnskabelig assistent, agronom Børge Vesth. Holdenes gennemsnitsresultater fra målingen og vejningen i marts måned findes anført i *tabel 13,* hvor der foruden de sædvanlige mål er anført hoftehøjden.

Gennemsnitsresultaterne for Rød Dansk Malkerace viste god overensstemmelse med resultaterne fra 1965–66. De sortbrogede kvier var lidt yngre end i de nærmest foregående år, medens vægten i marts måned var ret normal. Det var derimod bemærkelsesværdigt, at der i gennemsnit kun var to cm i forskel mellem hofte- og omdrejerbredden for de sortbrogede kvier. De øvrige gennemsnitsmål for de sortbrogede kvier var meget normale. De opnåede gennemsnitsresultater for vægt og mål for Jerseyracen svarede godt til resultaterne fra prøveåret 1965–66.

K. Forskellige undersøgelser.

Der er foretaget nogle undersøgelser på grundlag af talmaterialet fra afkomsprøvestationerne. Der er således udarbejdet 357. beretning, som vedrører malkbarhed og ydelse, og der er foretaget enkelte genetiske undersøgelser, hvis resultater er angivet i forsøgslaboratoriets årbog for 1967.

Der er endvidere foretaget en undersøgelse over kælvningsforløbet for kvierne på afkomsprøveholdene i prøveåret 1966–67. Endelig er der foretaget nogle krydsmål på de røde afkomsprøvekvier i prøveåret 1966–67, og disse mål er sammenholdt med kælvningsforløbet.

Tabel 13. Holdenes gns. alder, vægt og mål i marts 1967.

Table 13. The average age, weight and measurements of the groups in March 1967

Tyrens navn *Name of bull*	Alder i dage *Age days*	Vægt kg *Weight kg*	Br. cm *Heart girth cm*	Højde cm *Height at withers cm*	Brd. cm *Depth of chest cm*	Hbr. cm *Width at hips cm*	Omdr. cm *Width at thurls cm*	Hofte-højde cm *Height at hips cm*	Afkomsprøvestation *Testing station*
RDM:									
1. Uwe	1113	568	191	132	73	55	52	133	Gyldenagergård
2. Skærup Munk	1057	565	194	132	73	55	51	132	Skovgård
3. Horsens Bitz	1034	548	188	129	71	54	51	131	Østerhåb
4. Ålborg Børge	1078	543	191	135	72	55	51	136	Lundgård
5. Dybbøl Holm	1138	552	190	130	72	55	51	133	Veesbæk
6. Skærup Bus	1137	525	189	130	72	55	52	132	Morsø
7. Skov	1076	549	191	130	72	55	51	131	Lundgård
8. Randers Sortemose	1093	583	194	131	72	56	53	134	Lundgård
9. Samsø Frej	935	507	184	129	69	50	49	131	Samsø
10. Nordfyns Aman	1046	555	192	130	71	54	51	132	Enemærket
11. Skive Rajs	1067	519	191	132	72	54	51	134	Krarup Nygård
12. Ringkøbing Holm	1058	579	194	131	73	56	51	133	Lægård
13. Åbenrå Øbo	1103	552	190	129	72	54	52	130	Moesgård
14. Haslev Odin	1026	555	189	130	71	54	51	133	Sydsjælland
15. Hjørring Eli	1103	544	192	129	71	57	51	130	Dybvad
16. Skærup Karlby	1082	525	187	130	71	53	49	131	Lægård
17. Rødding Ursus	1017	503	187	128	70	52	49	130	Brøstrupgård

18. Ribe Aks	991	506	185	129	70	53	49	130	Skølvad
19. Hjørring Iver	1053	516	191	134	72	54	51	135	Dybvad
20. Give Ask	1015	543	191	129	71	54	50	131	Skovgård
21. Ribe Frem	996	528	189	131	71	54	50	132	Skølvad
22. Århus Hof	983	502	185	129	70	52	50	130	Elkjær
23. Centrums Prik	1077	538	187	130	71	53	50	132	Enemærket
24. Rødding Frem	1069	556	191	130	72	54	51	133	Østerhåb
25. Holbæk Allaks	1074	568	194	131	72	55	52	133	Torntofte
26. Bjørn Sydvest	1084	543	191	130	71	54	51	131	Grønhøjgård
27. Bakager Wahl	1111	548	189	130	71	54	52	132	Kalø
28. Kolding Pall 23	1021	515	186	128	70	52	50	128	Gelballegård
29. Varde Grøn	984	496	184	130	70	53	50	132	Vardegård
30. Horsens Gert	1009	520	185	129	71	52	49	132	Østerhåb
31. Vald Nordvest	1138	558	194	132	73	55	52	133	Torntofte
32. Thy Skov	964	562	193	130	72	55	52	132	Kronborg
33. Erslev	1046	537	188	129	71	54	51	131	Kalø
34. Djurs Wahl	1067	573	192	133	73	55	52	133	Kalø
35. Hadsten Gert	1027	536	189	130	72	53	50	134	Kalø
36. Århus Ask	1038	520	189	126	70	54	50	129	Elkjær
37. Ribe Klint	975	530	190	129	71	53	49	130	Skølvad
38. Varde Kry	1035	514	187	130	71	54	50	131	Vardegård
39. Kolding Munk 143	997	544	190	131	72	55	51	133	Gelballegård
40. Bøg	1048	529	189	127	70	53	51	128	Kalø
Gns. (Average)	1049	539	190	130	71	54	51	132	

Tyrens navn *Name of bull*	Alder i dage *Age days*	Vægt kg *Weight kg*	Br. cm *Heart girth cm*	Højde cm *Height at withers cm*	Brd. cm *Depth of chest cm*	Hbr. cm *Width at hips cm*	Omdr. cm *Width at thurls cm*	Hofte-højde cm *Height at hips cm*	Afkomsprøvestation *Testing station*
SDM:									
1, Varde Stefan	1002	551	195	132	73	55	53	133	Skølvad
2. Kolding Gordon 39	1031	530	192	129	71	55	52	132	Gelballegård
3. Egholm Gran	1007	533	192	130	71	54	51	131	Skovgård
4. Sdj. Aksel	1063	535	193	129	71	54	52	130	Brøstrupgård
5. Ry	1118	548	194	131	73	57	54	131	Morsø
6. Skive Hal	1053	545	200	130	74	55	53	132	Krarup Nygård
7. Hjørring Domino	1080	518	193	130	72	55	53	130	Dybvad
8. Sdj. Ark	1102	576	194	128	72	54	52	129	Veesbæk
9. Egholm Drost	1000	551	198	129	73	55	52	132	Skovgård
10. Varde Diamant	1060	519	193	131	72	56	52	132	Vardegård
11. Bjerringbro Basta	1061	564	191	130	71	55	52	131	Rosenfeldt
12. Swea	1011	542	195	130	72	56	53	132	Lundgård
13. Sdj. Viktor	1097	517	192	129	72	54	51	130	Brøstrupgård
14. Randers Dijk	1043	556	194	130	71	56	53	131	Rosenfeldt
15. Thy Ponto	1131	561	197	130	72	58	54	131	Kronborg
16. Hjørring Simon	1059	541	195	129	71	56	53	131	Dybvad
17. Varde Alfa	1019	554	199	132	73	54	53	132	Vardegård
18. Randers Drost	1108	583	197	129	73	55	53	129	Rosenfeldt
19. Hjørring Drost	1128	558	197	132	73	56	53	131	Dybvad
20. Sdj. Trin	1057	544	194	131	73	55	52	132	Brøstrupgård
21. Herning Drost	1034	571	196	128	72	55	53	130	Moesgård
Gns. (Average)	1060	547	195	130	72	55	53	131	

Jerseyrace:

1. Bornholms Brygger	919	367	166	120	65	45	41	122	Kannikegård
2. Fyns Glen	871	375	168	117	65	47	43	120	Enemærket
3. Årup Vestfyns Flink	897	351	169	119	65	45	40	122	Ejstrupgård
4. Årup Vestfyns Boy	906	379	172	120	65	45	41	123	Ejstrupgård
5. Fyns Ib	934	327	163	118	63	43	39	120	Grønhøjgård
6. Hjørring Georg	953	361	167	120	64	45	41	122	Dybvad
7. Lund	898	358	165	118	64	45	41	121	Kalø
8. Horsens Bak	914	380	170	119	66	46	42	122	Østerhåb
9. Primus Syd	914	350	169	118	65	44	39	120	Skølvad
10. Åbenrå Vix	914	369	168	118	64	45	40	120	Moesgård
11. Randers Knægt	911	354	167	116	65	45	41	119	Kalø
12. Dybbøl Hans	925	378	168	118	65	45	41	122	Veesbæk
13. Morsø Bæk	919	378	168	122	66	45	42	121	Morsø
14. Århus Max	907	357	167	117	65	45	40	119	Elkjær
15. Sydvestfyns Car	900	365	169	120	64	45	42	121	Ejstrupgård
16. Randers Just	912	355	166	119	64	44	40	122	Kalø
Gns. (Average)	912	363	168	119	65	45	41	121	

Tabel 14. Oplysninger om kælvningsforløbet.

Table 14. Information about the calvingprocess

Tyrens navn	Antal døtre	Antal kalve: levende fødte	Antal kalve: dødfødte	Antal kalve: døde i 1. døgn	Antal kalve: døde i 2. døgn	Antal kalve: normale	Antal kalve: misdannede	Antal kalve: lå forkert	Antal kælvninger: normale	Antal kælvninger: lidt besværlige	Antal kælvninger: meget besværlige	Dyrlæge tilkaldt	Partering eller kejsersnit
		Number of calves							*Number of calvings*				
Name of bull	*Number of daughters*	*born alive*	*born dead*	*dead during 1st day*	*dead during 2nd day*	*normal*	*abnormal*	*misplaced*	*normal*	*slightly difficult*	*very difficult*	*Vet. assistance*	*Dissection or caesarean*
RDM:													
Uwe	17	14	3	–	–	17	–	–	15	1	1	2	–
Skærup Munk	20	16	4	–	1	19	1	2	13	5	2	5	3
Horsens Bitz	19	16	3	–	–	19	–	1	13	2	4	–	–
Ålborg Børge	20	15	5	–	–	20	–	2	17	2	1	3	–
Dybbøl Holm	20	19	1	–	–	20	–	–	20	–	–	1	–
Skærup Bus	18	17	1	1	–	18	–	2	15	3	–	–	–
Skov	20	17	3	–	–	20	–	1	18	–	2	2	–
Randers Sortemose	21	16	5	1	–	21	–	–	18	2	1	2	–
Samsø Frej	19	19	–	–	–	19	–	3	12	7	–	3	–
Nordfyns Aman	20	18	2	–	–	20	–	–	19	1	–	–	–
Skive Rajs	19	16	3	–	–	17	2	2	15	4	–	5	–
Ringkøbing Holm	17	13	4	–	–	17	–	4	12	4	1	1	–
Åbenrå Øbo	21	19	2	–	–	20	1	1	18	2	1	1	–
Haslev Odin	17	13	4	–	–	17	–	1	14	1	2	1	–
Hjørring Eli	19	18	1	–	–	18	1	–	19	–	–	–	–
Skærup Karlby	17	16	1	–	–	17	–	1	16	–	1	1	–
Rødding Ursus	20	19	1	–	–	20	–	2	15	4	1	2	–

Ribe Aks	20	20	–	–	–	20	–	3	14	3	3	–	–
Hjørring Iver	21	20	1	–	–	21	–	–	17	3	1	–	–
Give Ask	20	18	2	–	–	19	1	1	15	5	–	3	–
Ribe Frem	21	21	–	–	–	21	–	3	18	3	–	–	–
Århus Hof	20	16	4	–	–	20	–	3	16	3	1	4	1
Centrums Prik	21	18	3	–	–	21	–	1	16	2	3	–	–
Rødding Frem	20	17	3	–	–	20	–	4	14	4	2	1	–
Holbæk Allaks	21	19	2	–	–	21	–	–	14	5	2	3	–
Bjørn Sydvest	21	17	4	1	–	21	–	1	16	5	–	–	–
Bakager Wahl	20	17	3	–	–	20	–	1	10	5	5	5	2
Kolding Pall 23	19	14	5	1	–	19	–	–	9	5	5	6	3
Varde Grøn	17	13	4	1	–	17	–	3	10	1	6	5	2
Horsens Gert	18	16	2	–	–	18	–	–	15	2	1	–	–
Vald Nordvest	18	14	4	–	–	18	–	1	12	4	2	1	–
Thy Skov	20	16	4	–	1	20	–	4	9	8	3	6	2
Erslev	21	20	1	–	–	21	–	–	15	5	1	1	–
Djurs Wahl	19	16	3	–	–	19	–	2	15	2	2	2	1
Hadsten Gert	20	19	1	–	1	20	–	–	17	3	–	–	–
Århus Ask	19	19	–	–	–	19	–	–	19	–	–	–	–
Ribe Klint	20	19	1	1	–	20	–	1	18	2	–	1	–
Varde Kry	18	18	–	1	–	18	–	–	18	–	–	–	–
Kolding Munk 143	20	13	7	1	–	20	–	3	14	6	–	5	–
Bøg	20	20	–	–	–	20	–	1	19	1	–	–	–
I alt (Total)	778	681	97	8	3	772	6	54	609	115	54	72	14
Pct.	–	87,5	12,5	1,0	0,4	99,2	0,8	6,9	78,3	14,8	6,9	9,3	1,8

Tyrens navn	Antal døtre	Antal kalve: levende fødte	dødfødte	døde i 1. døgn	døde i 2. døgn	normale	misdannede	lå forkert	Antal kælvninger: normale	lidt besværlige	meget besværlige	Dyrlæge tilkaldt	Partering eller kejsersnit
		Number of calves							Number of calvings				
Name of bull	*Number of daughters*	*born alive*	*born dead*	*dead during 1st day*	*dead during 2nd day*	*normal*	*abnormal*	*misplaced*	*normal*	*slightly difficult*	*very difficult*	*Vet. assistance*	*Dissection or caesarean*
SDM:													
Varde Stefan	20	20	–	–	–	20	–	–	19	–	1	–	–
Kolding Gordon 39	20	18	2	–	–	20	–	7	17	1	2	4	1
Egholm Gran	18	18	–	–	–	18	–	1	16	2	–	2	–
Sdj. Aksel	22	22	–	–	1	21	1	1	21	1	–	1	–
Ry	20	19	1	2	–	20	–	1	15	4	1	4	–
Skive Hal	20	20	–	–	–	20	–	2	18	2	–	–	–
Hjørring Domino	20	18	2	–	–	20	–	1	17	2	1	–	–
Sdj. Ark	20	15	5	–	–	20	–	2	13	2	5	4	–
Egholm Drost	15	15	–	1	–	15	–	1	14	1	–	2	–
Varde Diamant	18	15	3	–	–	18	–	1	17	1	–	1	–
Bjerringbro Basta	21	21	–	–	–	21	–	–	21	–	–	–	–
Swea	20	19	1	–	–	20	–	1	19	1	–	–	–
Sdj. Viktor	20	20	–	1	–	20	–	–	18	1	1	–	–
Randers Dijk	20	18	2	–	–	20	–	1	12	5	3	6	–
Thy Ponto	20	20	–	–	–	20	–	1	18	1	1	1	–
Hjørring Simon	20	19	1	–	–	19	1	1	13	7	–	1	–
Varde Alfa	18	18	–	–	–	18	–	–	18	–	–	–	–
Randers Drost	20	20	–	–	1	20	–	3	18	1	1	3	–
Hjørring Drost	18	17	1	–	–	18	–	1	12	1	5	3	1
Sdj. Trin	20	15	5	1	–	19	1	2	16	2	2	4	–
Herning Drost	20	18	2	1	–	20	–	2	15	2	3	3	–
I alt (Total)	410	385	25	6	2	407	3	29	347	37	26	39	2
Pct.	–	93,9	6,1	1,5	0,5	99,3	0,7	7,1	84,6	9,0	6,4	9,5	0,5

Jerseyrace:

Bornholms Brygger ..	14	12	2	–	–	14	–	–	12	2	–	–	–
Fyns Glen	21	20	1	–	–	21	–	–	21	–	–	–	–
Årup Vestfyns Flink ..	20	20	–	2	2	20	–	–	19	1	–	–	–
Årup Vestfyns Boy ..	19	18	1	–	–	19	–	2	16	3	–	1	–
Fyns Ib	20	20	–	–	–	20	–	–	20	–	–	–	–
Hjørring Georg	18	18	–	–	–	18	–	2	17	1	–	–	–
Lund	19	17	2	–	–	18	1	–	19	–	–	–	–
Horsens Bak	20	19	1	–	–	20	–	1	19	1	–	–	–
Primus Syd	16	16	–	–	–	16	–	–	16	–	–	–	–
Åbenrå Vix	18	17	1	–	–	18	–	–	18	–	–	–	–
Randers Knægt	20	20	–	–	–	20	–	–	20	–	–	–	–
Dybbøl Hans	20	17	3	–	–	20	–	–	20	–	–	–	–
Morsø Bæk	20	19	1	–	–	20	–	1	17	3	–	1	–
Århus Max	21	21	–	–	–	21	–	–	21	–	–	–	–
Sydvestfyns Car	20	20	–	–	–	20	–	–	20	–	–	–	–
Randers Just	21	19	2	1	–	21	–	–	21	–	–	–	–
I alt (Total)	307	293	14	3	2	306	1	6	296	11	–	2	–
Pct.	–	95,4	4,6	1,0	0,6	99,7	0,3	1,9	96,4	3,6	–	0,6	–

1. Kælvningsforløbet for afkomsprøvekvierne i 1966–67.

I *tabel 14* findes oplysninger om antallet af levende fødte og dødfødte kalve samt om de kalve, som døde i 1. eller 2. døgn. Der er 3 kolonner, som giver oplysning om normale og misdannede kalve samt om antallet af kalve, som ikke lå i naturlig stilling i moderen før fødselen. Kælvningerne er af assistenterne opgivet som normale, lidt besværlige eller meget besværlige. Der er desuden oplysning om antal kælvninger, hvor dyrlægen er tilkaldt. Endelig er anført antallet af kælvninger, hvor det har været nødvendigt at partere kalven eller tage den ved kejsersnit.

Denne undersøgelse omfatter ikke det samme antal kvier, som prøverne er gennemført med, idet eventuelt udsatte kvier i årets løb er med i denne undersøgelse. Det ville give et forkert billede, hvis kvier, som blev udsat på grund af streng kælvning, ikke kom med i denne undersøgelse. Der er dog 19 kvier, som ikke kom med i denne undersøgelse, men det skyldes i reglen, at de har født tvillinger eller krydsningskalve.

Inden for Rød Dansk Malkerace blev en kvie ikke medtaget på holdene efter Skærup Munk, Skærup Bus, Ribe Aks, Varde Grøn, Vald Nordvest og Djurs Wahl på grund af tvillingfødsel, og af samme årsag udgik to kvier på holdet efter Haslev Odin. Desuden er ikke medtaget en kvie på holdet efter Horsens Gert, som kælvede for tidligt og døde under kælvningen. Der er således 9 røde kvier, som ikke blev medtaget i undersøgelsen. Der er kun 3 sortbrogede kvier, som ikke er med i undersøgelsen, og heraf fødte to kvier på holdet efter Egholm Gran krydsningskalve, medens en kvie på holdet efter Varde Alfa kælvede alt for tidligt, hvorfor vi ikke fik indberetning om kælvningsforløbet. 7 Jerseykvier blev udeladt af undersøgelsen, og heraf blev 3 på holdet efter Årup Vestfyns Flink udeladt, da de fødte tvillinger. På holdet efter Bornholms Brygger blev ikke medtaget 3 kvier, idet en fik tvillinger og to fødte krydsningskalve. Endelig blev udelukket en kvie på holdet efter Hjørring Georg, da den fødte en krydsningskalv.

Det fremgår klart af tabellen, at der procentisk blev født flest levende kalve inden for Jerseyracen, og at der procentisk var flest dødfødte kalve inden for Rød Dansk Malkerace. Inden for alle 3 racer var det kun få kalve, der var født levende, som døde i 1. eller 2. døgn. Der var kun 6 røde, 3 sortbrogede og 1 Jerseykalv, som var misdannet. Ca. 7 procent af røde og sortbrogede kalve havde en forkert placering før fødselen, hvorimod der kun var tale om 1,9 procent for Jerseyracens vedkommende.

Af kolonnerne vedrørende assistenternes oplysning om kælvningsforløbet ses det, at en lidt større procentdel af de sortbrogede kviers kælvninger er blevet betegnet som normale, end det var tilfældet for de røde, men for såvel Rød Dansk Malkerace som Sortbroget Dansk Malkerace er 6–7 pct. af kælvningerne blevet betegnet som meget besværlige. 96,4 pct. af Jersey-

kviernes kælvninger blev betegnet som normale og 3,6 pct. som lidt besværlige, medens ingen af Jerseykviernes kælvninger blev betegnet som meget besværlige.

Der har været dyrlægetilkaldelse til 9–10 pct. af kælvningerne inden for Rød Dansk Malkerace og Sortbroget Dansk Malkerace, medens der kun blev tilkaldt dyrlæge til fødselshjælp for 2 af de 307 Jerseykvier, som er med i undersøgelsen. Inden for Rød Dansk Malkerace blev der foretaget 6 parteringer af kalve samt udført 8 kejsersnit, medens der kun var 1 partering og 1 kejsersnit for Sortbroget Dansk Malkerace. Da der ikke var meget besværlige kælvninger inden for Jerseyracen, blev det ikke nødvendigt at foretage partering eller kejsersnit.

Hovedresultatet af undersøgelsen blev, at der var lidt flere kælvningsbesværligheder blandt afkomsprøvekvierne inden for Rød Dansk Malkerace end blandt kvierne inden for Sortbroget Dansk Malkerace, og at de røde kvier procentisk føder flere dødfødte kalve end de sortbrogede. Undersøgelsen har tillige vist, at der næsten ikke forekommer kælvningsbesværligheder inden for Jerseyracen, og at det kun er en lille procentdel af Jerseykvierne, som føder dødfødte kalve.

2. Kælvningsbesvær og krydsmål.

Der er gennemført målinger af de røde afkomsprøvekviers kryds for prøveåret 1966–67. Undersøgelsen omfattede 736 kvier, hvilket var samtlige røde afkomsprøvekvier, da målingerne blev foretaget i marts og april måned. Afkomsprøverne omfattede 732 røde kvier ved prøvens slutning, men der er udsat 4 kvier fra målingens gennemførelse til prøvens afslutning.

Der foretoges følgende 3 målinger af kviernes kryds:

SH = afstanden fra sædebenets bageste kant til yderste hoftehjørnes øverste punkt.
SO = afstanden fra sædebenets bageste kant til et punkt, som er vinkelret på omdrejerens midtpunkt.
ON = afstanden fra SH vinkelret ned til omdrejerens midtpunkt.

Dette vil i realiteten sige, at et langt kryds vil give store værdier for SH og i reglen også for SO, medens store tal for ON vil være ensbetydende med lave omdrejere.

Kvierne blev grupperet efter kælvningsforløbet, idet de inddeltes i 3 grupper efter som kælvningsforløbet var normalt, lidt besværligt eller meget besværligt. I følgende oversigt er anført gennemsnitsresultaterne fra krydsmålene for de 3 kategorier vedrørende kælvningsforløbet.

Kælvningsforløbet	Antal kvier pr. hold	SH cm	SO cm	ON cm
Normale kælvninger	14,7	45,6	17,7	11,4
Lidt besværlige kælvninger	3,2	45,7	17,9	11,4
Meget besværlige kælvninger	2,0	45,4	17,5	11,3

Der var en del af holdene, som ikke var repræsenteret i alle 3 grupper vedrørende kælvningsforløbet, men dette synes ikke at være årsagen til de meget ensartede gennemsnitstal for SH, SO og ON i alle 3 grupper. Kvier, som har haft normale kælvninger, har stort set haft samme gennemsnitsmål for de 3 steder på krydset, hvor målene er foretaget, som kvierne med besværlige kælvninger. Disse krydsmål blev foretaget på afkomsprøvekvierne inden for alle 3 racer i prøveåret 1965–66, og kvierne blev delt i to grupper, hvoraf den ene omfattede kvier, som fødte levende kalve, og den anden omfattede kvier, der fødte døde kalve. For alle 3 racer opnåedes praktisk taget samme gennemsnitlige værdier for krydsmålene i de to grupper.

Undersøgelsen vedrørende krydsmålene på afkomsprøvekvierne viser, at der ikke er fundet nogen reel sammenhæng mellem de 3 i undersøgelsen inddragede krydsmål og kælvningsbesværligheden.

L. De enkelte tyre og deres afkomsprøvehold.

1. RØD DANSK MALKERACE

Uwe, s. 28146, f. 20. marts 1961
hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1967 v. De s. sj. Ldf.
Ejer: Frederiksborg Amts Kvægavlsforening.
Fader: Sverre, s. 4759. Ff. Horsens Høg, s. 4334. Fm. Nr. 92, s. 22098.
Moder: Nr. 143, s. 25984. Mf. Ålborg Wahl, s. 4344. Mm. Nr. 118, s. 23863.
Gns. af 16 døtre på Gyldenagergård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
6427	4,69	301	3,82	246

De fleste af kvierne startede med høje dagsydelser efter kælvningen, og holdet opnåede fløjpladsen ved den første opgørelse, og det bevarede denne plads ved de følgende opgørelser. Det gennemsnitlige ydelsesresultat ved prøvens slutning blev 339 kg smør, og det er den højeste smørydelse, som er opnået for et afkomsprøvehold gennem alle årene. Mælkeydelsen var høj, fedtprocenterne særdeles gode og proteinprocenterne middelhøje. 2 kvier

ydede over 400 kg smør, og den lavestydende kvie nåede at producere 251 kg smør. Der var jævnt god udholdenhed i ydelsen. Der var knap middelstor spredning i fedtprocenterne og en godt middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Kvierne var ikke så hurtige at malke i den første del af prøvetiden, men malkbarheden forbedredes meget, og de blev gode at malke i den sidste del af prøvetiden. Selv om kvierne var meget højtydende, blev der opnået en særdeles god gennemsnitlig tilvækst på stationen. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament og var gode at arbejde med. Sundhedstilstanden må betegnes som særdeles god, selv om enkelte kvier havde lidt yverbetændelse. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Overvejende store, nogle dog middelhøje, velprægede og overvejende velbyggede, mellemrøde dyr. Pæne af hoved og hals, flere med en smule fremskudt bov, gennemgående fortrinlig dybde, overvejende velbåret, hos nogle dog en smule ujævn ryg, et par med lidt vigende lænd; krydset gennemgående regelmæssigt firsidet og hos de fleste velformet, velmarkeret og lige, hos nogle med lidt fremtrædende korsbenskam eller lidt høj halerod, et par en smule opsvejet af kryds og enkelte lidt afrundede bag over, gennemgående meget velformede lår, flere med tendens til lidt stærkt bøjede haser, iøvrigt velstillede lemmer. Gennemgående regelmæssigt og meget velansat yver med velformede og velstillede patter; forpatterne hos enkelte en smule vidtstillede.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Skærup Munk, s. 28389, f. 17. december 1961
hos H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård, Bogense.

Afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1967 v. F. a. j. Ldf.
Ejer: Vejle- og Fredericiaegnens Sædcentral.
Fader: Munk 26, s. 4625. Ff. Munk, s. 3749. Fm. Nr. 26, s. 18952.
Moder: Nr. 65, s. 24793. Mf. Højvig 47, s. 4221. Mm. Nr. 41, s. 21961.
Gns. af 20 døtre på Skovgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5881	4,51	265	3,85	227

Det var den enestående gode udholdenhed i ydelsen, som bragte holdet frem til den smukke placering ved prøvens slutning. Mælkeydelsen var høj, medens fedt- og proteinprocenterne var middelhøje. Der var en del variation i proteinprocenterne, medens der kun var knap middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Der opnåedes meget gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen; kvierne havde god ædelyst og var iøvrigt gode at arbejde med. Der var kælvningsbesvær hos flere af kvierne, og dette var muligvis årsagen til lidt vanskeligheder med at få kvierne drægtige. Kun 16 af de 20 kvier var erklæret drægtige ved prøvens slutning, men 8 blev dog drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, godt middelstore og middelstore, brede, dybe, overvejende muskuløse, velprægede, mellemrøde dyr, en del med usikre linier, men adskillige solid form. Pænt hoved, velansat hals, adskillige fremskudt bov, rummeligt midtstykke, en del vigende til blød, de øvrige velbåret ryg, på enkelte nær lige, bredt, ret velformet til regelmæssigt kryds af noget varierende overfladeform, ofte lidt højt og snævert sædebensparti, gode lår, enkelte ret has, ellers god benstilling. Overvejende velformet og velophængt yver, en del grove eller lidt lange patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Horsens Bitz, s. 28407, f. 3. oktober 1961
hos Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

Ejer: Horsensegnens Kvægavlsforening.

Fader: Ålborg Bitz, e.A 4892. Ff. Højvig 47, s. 4221. Fm. Nr. 18, s. 22540.

Moder: Nr. 213, e.s. 28171. Mf. Toke Sams, s. 4433. Mm. Nr. 135, s. 24527.

Gns. af 18 døtre på Østerhåb:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5412	4,85	262	3,98	215

Såvel fedt- som proteinprocenterne var høje, og da mælkeydelsen var god, opnåedes en særdeles god ydelse af smør og mælkeprotein. Flere af kvierne nåede en middelfedtprocent på over 5, og enkelte nåede en middelproteinprocent på over 4. Proteinprocenterne var meget ensartede, medens fedtprocenterne udviste normal variation. Der var stor variation i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var god, og holdet havde tredie pladsen ved de fleste korttidsopgørelser. Der opnåedes jævnt gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var særdeles god, og kvierne var gode at arbejde med. Flere af kvierne fødte ret store kalve, og en af kviekalvene vejede 51 kg. Kalvenes gennemsnitsvægt blev 42 kg for såvel tyre- som kviekalve. En af kvierne nåede ikke at blive erklæret drægtig inden hjemsendelsen, men de fleste af kvierne blev erklæret drægtige inden udbindingen om foråret. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, middelstore og godt middelstore, dybe, ret brede, pænt muskuløse, gennemgående ret velformede, velprægede, mellemrøde dyr. Typisk hoved og hals, på enkelte nær fast bov, rummeligt midtstykke, adskillige vigende ryg, jævnt bredt, enkelte noget opsvejet kryds, en del noget lave eller snævre omdrejere, enkelte højt sædebensparti og noget grov halerod, velformede lår, adskillige lidt tynd skank, gennemgående pæn benstilling. Pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Ålborg Børge, s. 28372, f. 14. december 1961
hos Børge Hansen, Bakkegård, Lumsås.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Ålborg Amt.

Fader: Rudme Ideal, e.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 73, s. 23529. Mf. Buster, s. 4294. Mm. Nr. 49, s. 20647.

Gns. af 17 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5520	4,63	256	3,96	218

Kvierne startede prøven med høje dagsydelser, men hen på vinteren var udholdenheden i ydelsen kun jævnt tilfredsstillende. I den sidste trediedel af prøvetiden var udholdenheden derimod god, hvorved holdet sluttede med en fin placering. Mælkeydelsen var høj, fedtprocenterne særdeles gode og proteinprocenterne høje, hvorfor der opnåedes en høj ydelse af mælkeprotein. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til variationen i ydelsestallene. I gennemsnit blev der opnået et knap middelhøjt malkbarhedstal, men der var en del variation i malkbarhedstallet, og der var enkelte, som ikke opnåede tilfredsstillende malkbarhedsresultater. Ædelysten var god, men da kvierne var noget malkeprægede, opnåedes der kun en knap middelstor tilvækst. Kvierne havde gennemgående et roligt temperament, og de var gode at arbejde med. Der blev udsat 3 kvier af forskellige årsager. Flere af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev 41 kg. Alle kvier var erklæret drægtige ved prøvens afslutning, men der var kun 4, som blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, passende store, af pæn dybde, enkelte flade, i øvrigt nær middelbrede, kun nogenlunde muskuløse, adskillige ret velformede og velprægede, mellemrøde dyr. Kønne af hoved og hals, ret velstillet, enkelte noget fremskudt bov, nogle blød, ellers ret velbåret ryg, lige, jævnt bredt kryds af varierende rammer og overfladeform, adskillige noget flade af lår og skank, en del stærktbøjet has, de øvrige pæn benstilling. Adskillige noget uregelmæssige malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Dybbøl Holm, s. 28377, f. 22. september 1961
hos H. P. Jacobsen, Holmelund, Boltinge, Ringe.

Ejer: Gråsten-Sønderborg Kvægavlsforening.

Fader: Rudme Ideal, e.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 2, Ulva, s. 23282. Mf. Ulvsager, s. 4268. Mm. Nr. 29, Mona, s. 19607.

Gns. af 18 døtre på Veesbæk:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5373	4,73	254	3,80	204

Mælkeydelsen var god, fedtprocenterne gennemgående høje og proteinprocenterne middelhøje. Der var en del variation i proteinprocenterne, medens spredningen var middelstor for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var enestående god gennem hele vinterperioden, men i den sidste del af prøvetiden faldt ydelsen lidt for stærkt, og holdet forringede derved sin placering lidt. Kvierne var langsomme og besværlige at malke i den første del af prøvetiden, og der opnåedes dårlige resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Det var ikke enkelte kvier, som var årsag til det lave gennemsnitstal for malkbarhedstallet, idet der ikke var ret stor variation i malkbarhedstallet. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde en god sundhedstilstand og var gode at arbejde med. En af kvierne blev ikke drægtig, da æggestokkene blev ødelagt, men de øvrige var erklæret drægtige inden hjemsendelsen. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, godt middelstore og middelstore, jævnt muskuløse, ret velformede og velprægede, mellemrøde dyr af ret god bredde og pæn dybde. Pænt hoved, velansat hals, overvejende velstillet bov, pæn ribbensrunding, flertallet noget vigende ryg, lige, omtrent middelbredt til bredt, adskillige lidt tagdannet kryds, enkelte lidt snævert sædebensparti, ret velformede lår, adskillige noget klejn skank, enkelte ret has, ellers pæn benstilling. Velformet og velophængt yver med pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Skærup Bus, s. 28388, f. 21. september 1961
hos Frede Madsen, Herringe, Rudme.

Afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1967 v. F. a. j. Ldf.

Ejer: Vejle- og Fredericiaegnens Sædcentral.

Fader: Rudme Ideal, e.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 20, e.s. 27683. Mf. Bus, s. 4849. Mm. Nr. 16, s. 25468.

Gns. af 18 døtre på Morsø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5521	4,48	247	3,68	203

Fedtprocenterne grupperede sig omkring racens gennemsnit, og da mælkeydelsen var høj opnåedes en særdeles god smørydelse. Der var ret stor variation i ydelsestallene. Udholdenheden i ydelsen svarede ret godt til et rødt gennemsnitshold. Der opnåedes gode resultater ved malkbarhedsunder-

søgelsen, men der var lidt variation i malkbarhedstallet. De brugsmæssige egenskaber var meget fremragende. Ædelysten var særdeles god, og det var meget behagelige kvier at omgås, hvorfor medhjælperne var glade for at malke kvierne på dette hold. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og de fleste blev drægtige på et tidligt tidspunkt i vinterperioden. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, knap middelstore til middelstore, jævnt brede og dybe, kun ret muskuløse og velformede, malkeprægede, mellemrøde dyr. Pæne af hoved og hals, gennemgående velstillet bov, pæn ribbensrunding, adskillige noget skarp og en del lidt vigende ryg, lige, nær middelbredt, ret finknoglet, enkelte noget tilspidset kryds, adskillige noget flade af lår og skank samt lidt tæt has, i øvrigt lidt klejne, men velstillede lemmer. Gode malkeorganer.

Holdet tilkendt g for eksterijør.

Skov, s. 28333, f. 17. januar 1961
hos Martin Hansen, Gudbjerg Skov, Gudbjerg Sydfyn.

Ejer: Vesthimmerlands Kvægavlsforening.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Ålborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 86, s. 26121. Mf. Sortemose, s. 4680. Mm. Nr. 69, s. 23264.

Gns. af 19 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5397	4,55	246	3,90	211

Proteinprocenterne var særdeles høje, selv om fedtprocenterne nærmest måtte betegnes som middelhøje. Mælkeydelsen var god, og der opnåedes en god ydelse af smør og mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var meget fin i hele vinterperioden, men enkelte af kvierne gik lidt for stærkt ned i dagsydelse i den sidste del af prøvetiden. Proteinprocenterne var meget ensartede, og der var kun knap middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Kviernes temperament var ikke tilfredsstillende, idet flere af dem var vanskelige at omgås, og der opnåedes kun jævnt gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Flere af kvierne var nervøse, og enkelte kunne betegnes som ondskabsfulde. Ædelysten var særdeles god, og kvierne udviklede sig godt på stationen. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, knap middelstore til passende store, brede, meget dybe, pænt muskuløse, overvejende velformede og velprægede, mellemrøde dyr. Almindeligt hoved, velformet hals, enkelte fremskudt, ellers velstillet bov, meget rummeligt midtstykke, enkelte vigende, de øvrige god overlinie, lige, bredt, gennemgående velformet kryds, enkelte noget brede hofter og lave omdrejere, velformede af

lår og skank, en del stærktbøjet has, i øvrigt pæn benstilling. Overvejende velformet og velbåret yver, almindeligt pattesæt, enkelte noget vidtstillede forpatter.
Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Randers Sortemose, s. 28318, f. 3. september 1961
hos Aksel Clausen, Bakkjærsminde, Laurbjerg.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1967 v. F. a. j. Ldf.
Ejer: Randersegnens Kvægavlsforening.
Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.
Moder: Nr. 71, e.s. 28768. Mf. Hadsten Wahl, e.A 4940. Mm. Nr. 51, s. 26649.
Gns. af 19 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5587	4,38	245	3,86	216

Selv om fedtprocenterne knap nåede racens gennemsnit, blev proteinprocenterne alligevel godt middelhøje. Mælkeydelsen var høj, og der opnåedes en god smørydelse og en høj ydelse af mælkeprotein. Der var en middelstor spredning i alle ydelsestallene, og udholdenheden i ydelsen var god. Kvierne var meget rolige og gode at arbejde med, og der opnåedes særdeles gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var særdeles god. Kvierne vejede 592 kg i gennemsnit ved hjemsendelsen. Der var lidt uheld på dette hold, idet en kvie døde inden kælvningen, og to blev udsat under prøven. To kvier fik tydeligt staldkrampe i vinterperioden, og der var en antydning af staldkrampe for enkelte af de øvrige, men kvierne gik ret godt på græsmarken i sommerperioden. Kun 6 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,4 ins. pr. drægtighed.

Ensartede, godt middelstore til store, kraftige, flere udtalt betydelige, meget brede og dybe, muskuløse, velformede og velprægede dyr. Pæne af hoved og hals, velstillet bov, rummeligt midtstykke, et par noget vigende, ellers god overlinie, lige, meget bredt, velformet kryds med gode rammer, enkelte lidt høj, men ikke grov korsbenskam og halerod, velformede af lår og skank, enkelte noget usikker hasestilling, ellers velstillede lemmer (en del lidt tykke haser). Enkelte noget uregelmæssigt eller lidt fremskudt yver, ellers gode malkeorganer.
Holdet tilkendt mg for eksteriør.

Samsø Frej, s. 28442, f. 18. august 1962
hos Jørgen Bangsgaard Hansen, Ellinge Mosegård, Højby Sjælland.

Ejer: Samsø Kvægavlsforening.
Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.
Moder: Nr. 34, e.s. 28533. Mf. Holbæk Frøy, s. 4832. Mm. Nr. 28, Kærsholm, s. 22871.

Gns. af 18 døtre på Samsø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5225	4,66	243	3,80	199

Takket være en fremragende udholdenhed i ydelsen gennem hele vinterperioden avancerede holdet til en god placering ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev godt middelhøj, fedtprocenterne særdeles gode og proteinprocenterne middelhøje. Der var knap middelstor spredning i alle ydelsestallene. Ved malkbarhedsundersøgelsen opnåedes meget gode resultater, og det var tillige et ensartet hold med hensyn til malkbarhed, idet der ikke var ret stor variation i malkbarhedstallet. Ædelysten var særdeles god, og der var ingen reaktioner ved ændringer af foderet. Kvierne var meget unge, men de udviklede sig godt i prøvetiden. Sundhedstilstanden var fremragende. Alle kvier var erklæret drægtige ved prøvens slutning, men der medgik 2,7 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, nær middelstore, ret brede og dybe, jævnt muskuløse, velprægede, mellemrøde dyr, overvejende med pæne linier og rammer. Kønne af hoved og hals, velstillet bov, enkelte noget lette af bryst, ellers ret rummeligt midtstykke, gennemgående velbåret ryg, lige, overvejende bredt, adskillige regelmæssig firsidet og finknoglet kryds, enkelte lave omdrejere og ret høj, men ikke grov halerod, velformede lår, lidt klejne, men velstillede lemmer. Pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Nordfyns Aman, s. 28192, f. 30. august 1961
hos R. F. Madsen og Aage Krog, Lombjerge, Ringe.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1967 v. De s.f. Ldf.

Ejer: Nordfyns Kvægavlsforening.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Ålborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 24, e.s. 27689. Mf. Rudme Ideal, e.A 4864. Mm. Nr. 7, s. 24761.

Gns. af 18 døtre på Enemærket:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5201	4,68	243	3,84	199

Ydelsen var ikke overvældende god i den første del af prøvetiden, men den gennemsnitlige dagsydelse steg til langt hen på vinteren, og udholdenheden i ydelsen var tillige meget fremragende i sommerperioden, og dette medvirkede til en god placering ved prøvens slutning. Fedtprocenterne var særdeles gode, og mælkeydelsen og proteinprocenterne lå på et godt middelhøjt niveau. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til variationen

i ydelsestallene. Der var en del variation i malkbarhedstallet, idet nogle var hurtige og lette at malke, medens enkelte var for længe om at blive malket, og det gennemsnitlige malkbarhedstal nåede lige knap racens gennemsnit. Ædelysten var særdeles god, og kvierne var rolige og gode at arbejde med. Drægtighedsforholdene var gode, idet 17 af de 18 kvier blev erklæret drægtige, og 11 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,6 ins. pr. drægtighed.

Middelhøje og over middelstore, særdeles dybe og rummelige, velbyggede og meget tiltalende, ensartede, mellemrøde og mørk mellemrøde dyr. Pænt hoved, fin hals, god brystdybde og -bredde, fortrinlig dybde af midtstykke, enkelte med lidt skarp kam, velbåret ryg; krydset velformet og velbåret, hos nogle lidt afrundet bagover, velformede lår, nogle stykker med lidt stærkt bøjede haser og enkelte med lidt usikker bagstilling. Overvejende velbåret og velformet yver samt velformede patter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Skive Rajs, s. 28097, f. 1. december 1960
hos N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

Ejer: Skiveegnens Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416. Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 29, Karla IX, s. 26686. Mf. Rajs, s. 4628. Mm. Nr. 171, Karla III, s. 23795.

Gns. af 19 døtre på Krarup Nygård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5199	4,64	241	3,81	198

Laktationskurven var meget flad, men holdet havde også en enestående fin udholdenhed i ydelsen i den sidste del af prøvetiden. Mælkeydelsen blev godt middelhøj, fedtprocenterne gode og proteinprocenterne middelhøje. Der var en godt middelstor spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein, medens der ikke var ret stor variation i fedtprocenterne og en middelstor spredning i proteinprocenterne. Der blev opnået et godt resultat ved malkbarhedsundersøgelsen, men der var en del variation inden for holdet. Ædelysten var god, og kvierne var gode at arbejde med. Drægtighedsresultaterne var tilfredsstillende, idet alle 19 nåede at blive erklæret drægtige på stationen, og 9 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, overvejende ret velvoksne, nogenlunde muskuløse, flertallet ret velformede og velprægede, mellemrøde dyr af pæn bredde og god dybde. Typisk hoved og hals, adskillige lidt fremskudt bov, rummeligt midtstykke, en del lidt vigende ryg, lige, gennemgående bredt kryds med jævnt gode rammer, adskillige

noget høj, men ikke grov halerod, velformede lår, pæn benstilling. Velformet og velophængt yver og på enkelte nær pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Ringkøbing Holm, s. 28323, f. 18. juni 1961
hos Hans Hundevad, Berntlund, Starup, Ågård.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1967 v. F. a. j. Ldf.

Ejer: Ringkøbingegnens Kvægavlsforening for RDM.

Fader: Kolding Holm 36, e.A 4978. Ff. Rolf, s. 4617. Fm. Nr. 36, Hedvig, s. 25161.

Moder: Nr. 46, e.s. 28123. Mf. Kolding Højvig 143, s. 4747. Mm. Nr. 26, e.s. 27411.

Gns. af 16 døtre på Lægård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5429	4,43	241	3,79	206

Mælkeydelsen var god og proteinprocenterne middelhøje, medens middelfedtprocenten lige knap nåede racens gennemsnit. Udholdenheden i ydelsen var god. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, medens der var godt middelstor spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Der opnåedes gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne havde særdeles god ædelyst, og de var usædvanlig rolige og gode at arbejde med. Gennemsnitsvægten ved hjemsendelsen blev 596 kg. Enkelte af kvierne havde lidt overanstrengte baglemmer i vinterperioden, men de gik godt på græsmarkerne i sommerperioden. Sundhedstilstanden må betegnes som god, selv om flere af kvierne havde yverbetændelse ved kælvningen. Drægtighedsforholdene var tilfredsstillende, idet 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Ensartede, velvoksne, kraftige, adskillige betydelige, meget brede og dybe, overvejende ret muskuløse, velformede og velprægede, mellemrøde dyr. Pæne af hoved og hals, på et par nær fast bov, meget rummeligt midtstykke, enkelte lidt vigende, ellers god overlinie, lige, bredt, gennemgående regelmæssig firsidet kryds med bredt, enkelte lidt højt sædebensparti, velformede af lår og skank, enkelte noget stærktbøjet eller lidt indaddrejet has, ellers pæn benstilling. Enkelte lidt kort yver og kraftige patter, i øvrigt gode malkeorganer.

Holdet tilkendt mg for eksteriør.

Åbenrå Øbo, s. 28100, f. 25. august 1960
hos H. J. Pedersen, Skovlygård, Øksendrup.

Ejer: Åbenrå- og Tønderegnens Kvægavlsforening.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Ålborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 60, e.s. 27754. Mf. Sydøstfyns Brage, r. 25244. Mm. Nr. 40, s. 26278.

Gns. af 21 døtre på Moesgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5497	4,36	240	3,84	211

Udholdenheden i ydelsen var særdeles god, hvorved holdet fik en fin laktationskurve. Selv om fedtprocenterne knap var middelhøje, blev proteinprocenterne fuldt ud middelhøje, og da mælkeydelsen var god, opnåedes en høj ydelse af mælkeprotein. Der var nogen variation i mælkeydelsen og i proteinprocenterne, medens der var ret normal variation i de øvrige ydelsestal. Hurtigt efter kælvningen blev det klart, at malkbarheden var for dårlig for dette hold, idet malketiden var for lang, og dette gav holdet den dårligste placering ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne var rolige under malkningen og villige til at lægge mælken ned, og der var egentlig ikke andet at kritisere, end at malketiden var for lang, men i den sidste del af prøvetiden forbedredes malkbarheden betydeligt. Ædelysten var særdeles god, og kvierne var usædvanlig rolige at arbejde med. Sundhedstilstanden var fremragende, og alle 21 kvier gennemførte prøven. Kvierne var meget velbyggede og havde en stor tilvækst på stationen. Der medgik 2,5 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, godt middelstore og middelstore, brede, dybe, muskuløse, overvejende velformede og velprægede, mellemrøde dyr. Typisk hoved og hals, enkelte lidt løs, men overvejende velstillet bov, meget rummeligt midtstykke, enkelte vigende, ellers velbåret ryg, lige, bredt, overvejende regelmæssig firsidet kryds med god overfladeform, enkelte høj halerod, fyldige, velformede lår, god skank, velstillede lemmer. Gode malkeorganer.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Haslev Odin, s. 28485, f. 21. november 1961
hos Thorkild Petersen, Rudbjerggård, Kongsted, Rønnede.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1967 v. De s. sj. Ldf.

Ejer: Præstø Amts Kvægavlsforening.

Fader: Stevns Højvig, s. 4599. Ff. Højvig 136, s. 3622. Fm. Nr. 9, Thora, s. 19185.

Moder: Nr. 27, e.s. 27978. Mf. Stevns Klint, s. 4659. Mm. Nr. 19, f. 23. februar 1956 hos Thorkild Petersen, Toftekær, Magleby, Klippinge.

Gns. af 18 døtre på Sydsjælland:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5237	4,51	236	3,86	202

Det var den gode udholdenhed i ydelsen, som sikrede holdet en god position ved prøvens slutning. Mælkeydelsen og middelproteinprocenten blev godt middelhøj, medens fedtprocenterne tangerede racens gennemsnit. Proteinprocenterne udviste normal variation, medens spredningen kun var knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Kvierne var som helhed langsomme og besværlige at malke, og dette resulterede i et dårligt resultat ved malkbarhedsundersøgelsen. Der var kun lille variation i malkbarhedstallet, idet de fleste af kvierne placerede sig i nærheden af holdets gennemsnit. Malkbarheden forbedredes dog noget i løbet af prøvetiden. Ædelysten var særdeles god, og de fleste af kvierne havde et roligt temperament og opnåede en god tilvækst på stationen. Mange af kvierne havde lidt yverbetændelse, men for de flestes vedkommende var yverbetændelsen til stede ved kælvningen. Alle 18 kvier blev drægtige, og der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Over middelstore og middelhøje, meget velprægede, ensartede og velbyggede mørkmellemrøde og mellemrøde dyr. Velformet hoved, pæn hals, velstillet bov, fortrinlig dybde både i bryst og side, stærk eller velbåret ryg, kun ganske enkelte med en smule ujævn ryg eller tendens til vigende lænd; krydset gennemgående regelmæssigt firsidet, velformet, lige og med god overfladeform, hos nogle dog med en smule fremtrædende korsbenskam eller halerod, velformede lår, velstillede lemmer, enkelte med tendens til en smule ret has. Velformet og gennemgående meget velansat yver; patterne meget velstillede og af god form, hos et par godt middellange og hos enkelte en smule tynde.

Holdet tilkendt mg for eksteriør.

Hjørring Eli, r. 27877, f. 2. juli 1960
hos Johan Laursen, Mosedal, Nebstrup, Havndal.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Randers 47, e.A 4890. Ff. Højvig 47, s. 4221. Fm. Nr. 111, s. 23861.

Moder: Nr. 25, s. 26726. Mf. Randers Dan, s. 4751. Mm. Nr. 12, f. 26. september 1950 hos Johan Laursen, Vestervang, Auning.

Gns. af 17 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5164	4,55	235	3,75	194

Den gennemsnitlige dagsydelse var ikke på et helt tilfredsstillende niveau i begyndelsen af prøveåret, men udholdenheden i ydelsen var enestående god, og dette bevirkede, at holdet fik en god gennemsnitsydelse ved prøvens afslutning. Mælkeydelsen blev godt middelhøj og fedtprocenterne tilfredsstillende, medens proteinprocenterne lige knap nåede racens gennemsnit. Der var knap middelstor spredning i alle ydelsestallene. Med hensyn til

malkbarhed avler Hjørring Eli i overensstemmelse med den fædrene afstamning, og der opnåedes kun jævnt gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var god, og kvierne var gennemgående rolige og gode at arbejde med. Adskillige af kvierne havde noget yverbetændelse ved kælvningen. Alle kvier var erklæret drægtige inden prøvens afslutning, og 7 af dem blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, passende store, brede, meget dybe og rummelige, muskuløse, men overvejende noget lange, løstbyggede og uregelmæssige, mellemrøde dyr. Almindelige af hoved og hals, gennemgående noget fremskudt bov og blød til meget lav ryg, bredt, en ret stor part noget opsvejet kryds med mindre tilfredsstillende rammer, en del brede hofter, højt sædebensparti og grov halerod, meget velformede af lår og skank, god benstilling. Velophængt, ret velformet yver, en del store og kraftige patter, pæn pattestilling.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Skærup Karlby, s. 28039, f. 12. april 1961
hos Arne Høgh, Karlby, Hornslet.

Ejer: Vejle- og Fredericiaegnens Sædcentral.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 54, s. 24481. Mf. Hjørring Ejler, r. 24466. Mm. Nr. 8, s. 19384.

Gns. af 16 døtre på Lægård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5380	4,36	235	3,71	199

Kvierne startede prøveåret med høje dagsydelser, men ydelsen faldt for stærkt gennem det meste af prøveåret, og derved forringedes holdets placering fra de første opgørelser til den endelige opgørelse ved prøveårets slutning. Mælkeydelsen var god, medens fedt- og proteinprocenterne knap nåede racens gennemsnit. Der var en del variation i fedt- og proteinprocenterne, medens der kun var lille spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Der opnåedes kun jævnt gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne havde en god ædelyst og var rolige at arbejde med. Drægtighedsforholdene må betegnes som tilfredsstillende, idet 15 af holdets 16 kvier blev erklæret drægtige på stationen, og heraf var de 8 drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, overvejende middelstore, adskillige noget løstbyggede og kun ret velprægede og muskuløse, mellemrøde dyr af pæn bredde og dybde. Pæne af hoved og hals, en del lidt fremskudt bov og lav ryg, lige, overvejende ret bredt kryds af noget varierende rammer og overfladeform, adskillige lidt fremtrædende korsbenskam eller grov halerod, pæn lårbygning, flere noget klejne af skank og lemmer, enkelte stærktbøjet has, ellers pæn benstilling. Veludviklet,

ret velformet til velformet yver, adskillige lange patter og noget uregelmæssigt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Rødding Ursus, s. 28417, f. 3. marts 1962
hos Aage Pedersen, Skellerup, Ullerslev.

Ejer: Rødding og Nørre Rangstrup Kvægavlsforeninger.

Fader: Sydvestfyns Ursus, s. 4701. Ff. Ulvsager, s. 4268. Fm. Nr. 78, s. 21172.

Moder: Nr. 93, Vestergård, e.s. 28432. Mf. Thor, s. 4697. Mm. Nr. 85, Vestergård, s. 26267.

Gns. af 18 døtre på Brøstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4885	4,80	235	3,82	186

Det var de særdeles gode fedtprocenter, som bevirkede, at der blev opnået en god smørydelse i prøvetiden. Proteinprocenterne var middelhøje, medens mælkeydelsen knap nåede racens gennemsnit. Udholdenheden i ydelsen var god i hele vinterperioden, men ydelsen faldt lidt for stærkt i den sidste trediedel af prøvetiden. Proteinprocenterne var ret ensartede, men der var ret stor spredning i smørfedtydelsen. Spredningen i de øvrige ydelsestal svarede godt til spredningen for et rødt gennemsnitshold. Der opnåedes meget gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen, men der var en del variation i malkbarhedstallet. For enkelte af kviernes vedkommende var ædelysten lidt for dårlig, når der forekom forandringer af foderet. To kvier, som havde haft børbetændelse, nåede ikke at blive erklæret drægtige på stationen. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, knap middelstore til ret velvoksne, ikke særlig brede, jævnt dybe og muskuløse, flertallet noget uregelmæssige, mellemrøde dyr. Kønt hoved, pæn hals, velstillet bov, adskillige noget lav og skarp ryg, lige, men kun få regelmæssigt, adskillige tagdannet og noget tilspidset kryds, jævnt gode lår, pæn benstilling. Gennemgående ret gode malkeorganer.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Ribe Aks, s. 28423, f. 2. april 1962
hos Aksel Gert Nielsen, Høgstrupgård, Bjerregrav, Randers.

Ejer: Kvægavlsforeningen Vestjyden.

Fader: Hjørring Munkdrup, e.A 4906. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 43, s. 24522.

Moder: Nr. 120, s. 26735. Mf. Randers Loke, r. 25770. Mm. Nr. 59, s. 26734.

Gns. af 19 døtre på Skølvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5515	4,21	232	3,72	205

Laktationskurven var usædvanlig flad for dette hold, og den gode udholdenhed i ydelsen bevirkede, at holdet forbedrede sin placering for hver opgørelse. Mælkeydelsen var høj, men en del af kvierne havde for lav fedtprocent, og middelproteinprocenten nåede ikke racens gennemsnit. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, hvorimod der kun var lille spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Kvierne var gode at malke. Det kneb lidt med ædelysten i den første del af prøvetiden, men en del af kvierne hostede og havde ikke så god sundhedstilstand, som man kunne ønske. Det er muligt, at ydelsen blev lidt mindre i den første tid efter kælvningen på grund af sundhedstilstanden, men kvierne havde let ved at holde en konstant ydelse, da de hen på vinteren blev i orden, og dette har medvirket til at fremskaffe den flade laktationskurve. Kvierne var rolige og gode at arbejde med. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, nær middelhøje, nogenlunde muskuløse, ret velformede og velprægede, mellemrøde og lysmellemrøde dyr af pæn dybde og ret god bredde. Pæne af hoved og hals, på få nær velstillet bov, enkelte noget flad gjord, adskillige velbåret, men en del lidt blød ryg, lige, ret bredt, en del lidt tagdannet kryds, flertallet med pæne rammer, ret gode lår, adskillige noget flad skank og stærktbøjet has. Gode malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Hjørring Iver, s. 28352, f. 13. marts 1961
hos Ejler Iversen, Stengårdsminde, Stensby, Skamby.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Rudme Ideal, e.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 96, s. 26143. Mf. Toke Sams, s. 4433. Mm. Nr. 87, s. 24013.

Gns. af 21 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4949	4,66	230	3,83	190

Fedtprocenterne var særdeles gode, og proteinprocenterne fuldt ud middelhøje, medens den gennemsnitlige mælkeydelse knap nåede racens gennemsnit. Der var knap middelstor spredning i proteinprocenten, medens der

var forholdsvis stor variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne holdt ydelsen særdeles fint i hele vinterperioden, og der var også en god udholdenhed i sommerperioden. Holdets position forbedredes også en del fra den første korttidsopgørelse til den endelige opgørelse ved prøvens afslutning. Det tog for lang tid at malke kvierne, hvorfor der ikke opnåedes helt tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til ædelyst eller temperament. Flertallet af kvierne fødte ret store kalve, og gennemsnitsvægten blev 42 kg. Der blev indsat 21 kvier på holdet, og alle gennemførte prøven. Alle kvier blev erklæret drægtige på stationen, og de 11 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, knap middelstore til meget velvoksne, overvejende kun jævnt brede og dybe, adskillige noget lette og uregelmæssige, mellemrøde dyr med manglende muskulatur og præg. Ret kønt hoved, pæn hals, adskillige lidt fremskudt bov og vigende ryg, overvejende jævnt bredt, enkelte noget opsvejet kryds, adskillige med pæne rammer, de øvrige lave eller snævre omdrejere, flade lår og tynd skank, adskillige tætstillede og usolide haser. Ret velformet og velbåret yver, overvejende lange patter, enkelte vidtstillede forpatter, enkelte hvide aftegn på yveret.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Give Ask, s. 28612, f. 29. januar 1962.
hos Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing Mors.

Ejer: Vejle Vesteregns Kvægavlsforening.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 98, e.s. 28195. Mf. Morsø Wahl, e.A 4930. Mm. Nr. 87, s. 19447.

Gns. af 19 døtre på Skovgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4718	4,86	229	3,99	188

Laktationskurven var usædvanlig flad for dette hold, og selv om dagsydelsen ikke var helt tilfredsstillende i den første tid efter kælvningen, bevirkede den gode udholdenhed i ydelsen, at der opnåedes ret gode ydelsesresultater ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev kun knap middelhøj, men til gengæld var såvel fedt- som proteinprocenterne udpræget høje. Der var en godt middelstor spredning i fedtprocenterne samt i ydelsestallene for smørfedt og mælkeprotein. Der var en udpræget lavtydende og en meget højtydende kvie på holdet med hensyn til smørydelse. Der opnåedes kun jævnt gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var særdeles

god, men i perioder kneb det for enkelte af kvierne at tåle maksimal fodring af grovfoder. Kvierne havde en god tilvækst og udviklede sig godt på stationen. Ingen af kvierne fødte udpræget store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 35 kg. 12 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, flertallet omtrent middelstore, enkelte lidt små og ubetydelige, dybe, ret brede og muskuløse, mellemrøde dyr af noget uregelmæssig form og varierende præg. Typisk hoved og hals, flertallet noget løs eller fremskudt bov og blød ryg, ofte noget uregelmæssigt, adskillige lidt opsvejet kryds samt lave omdrejere og høj halerod, enkelte lidt stærktbøjet has, ellers pæn lårbygning og benstilling. Varierende yverform, adskillige noget lange patter eller uregelmæssigt pattesæt.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Ribe Frem, s. 28422, f. 23. marts 1962
hos Ejler Iversen, Stengårdsminde, Stensby, Skamby.

Ejer: Kvægavlsforeningen Vestjyden.

Fader: Nordfyns Frem, e.A 4866. Ff. Morsø Wahl, e.A 4930. Fm. Nr. 65, s. 24793.

Moder: Nr. 5, s. 26141. Mf. Høj, s. 4600. Mm. Nr. 74, s. 22602.

Gns. af 20 døtre på Skølvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5221	4,35	227	3,82	199

Mælkeydelsen var god, proteinprocenterne middelhøje, hvorimod en del af kvierne havde for lave fedtprocenter, og det var især tilfældet i den første del af prøvetiden. Middelfedtprocenten blev dog 4,35 ved prøvens slutning. Der var normal variation i proteinprocenterne, medens spredningen kun var knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Der var en ret tilfredsstillende udholdenhed i ydelsen, og der opnåedes meget gode malkbarhedsresultater, men der var stor variation i malkbarhedstallet. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament og opnåede en god tilvækst på stationen. Alle 20 kvier var erklæret drægtige ved prøvens slutning, og 8 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, passende store, nogenlunde muskuløse, flertallet ret regelmæssige og velprægede, mellemrøde dyr af god dybde og ret god bredde. Ret velformet hoved, pæn hals, adskillige noget fremskudt bov og lav eller skarp kam, en del noget vigende ryg, lige, ret bredt, adskillige lidt tilspidset kryds, en ret stor part noget høj korsbenskam eller halerod, pæn lårbygning og benstilling. Adskillige noget kort yver, enkelte tilspidsede patter og vidtstillede forpatter, ellers pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Århus Hof, s. 28400, f. 4. december 1961
hos A. Tesdorpf, Gjedsergård, Gedser.

Ejer: Århusegnens Kvægavlsforening.

Fader: Stevns Klint, s. 4659. Ff. Højvig 47, s. 4221. Fm. Nr. 57, s. 18493.

Moder: Nr. 146, e.s. 27341. Mf. Rud, s. 4733. Mm. Nr. 138, f. 1. februar 1953 hos A. Tesdorpf, Gjedsergård, Gedser.

Gns. af 17 døtre på Elkjær:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5379	4,22	227	3,59	193

Det kneb med fedt- og proteinprocenterne, som var for lave, hvorimod mælkeydelsen var særdeles tilfredsstillende. Der var ikke ret stor variation i ydelsestallene, og spredningen var især lille for smørfedt og mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var ret normal, og kvierne var gode at malke. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament. Sundhedstilstanden var ikke tilfredsstillende, idet kvierne ikke var tilstrækkelig robuste, og en del af dem havde tillige yverbetændelse ved eller efter kælvningen. Det blev nødvendigt at udsætte 3 kvier på grund af yverlidelse. I en periode havde enkelte af kvierne dårlige haser på grund af trykninger. Kalvenes fødselsvægt blev i gennemsnit kun 36 kg. Drægtighedsforholdene var særdeles gode, idet alle 17 kvier blev erklæret drægtige på stationen, og 10 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, knap middelstore til godt middelstore, nogenlunde brede og dybe, jævnt muskuløse, en del velformede og velprægede, andre noget uregelmæssige, mellemrøde dyr. Pænt hoved, velansat hals, adskillige fremskudt bov, enkelte noget flad gjord, en del lidt vigende ryg, lige, ret bredt kryds, overvejende med ret pæne rammer, adskillige noget snævre omdrejere og høj halerod, pæn lårbygning, enkelte lidt usikker hasestilling, ellers ret velstillede lemmer. Flertallet knap middelstort, velophængt, ret velformet yver, ret velstillede, enkelte lange patter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Centrums Prik, s. 28187, f. 21. januar 1961
hos Mads Jørgensen, Tingstedgård, Svindinge Fyn.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1967 v. De s. f. Ldf.

Ejer: Centrum og Odense Omegns Kvægavlsforening.

Fader: Rudme Ideal, e.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 24, Molly, s. 24039. Mf. Rudme Flax, s. 3990. Mm. Nr. 2, Mona, s. 20382.

Gns. af 19 døtre på Enemærket:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4946	4,56	225	3,96	196

Selv om middelfedtprocenten kun blev lige godt middelhøj, opnåedes meget høje proteinprocenter. Den gennemsnitlige mælkeydelse nåede lige knap racens gennemsnit. Kvierne holdt ydelsen særdeles fint i hele vinterperioden, medens der var normal ydelsesnedgang i sommerperioden. Der var ret stor variation i alle ydelsestallene og specielt vedrørende mælkeproteinet. Malkbarhedsresultaterne blev kun jævnt gode, idet enkelte af kvierne ikke havde en tilfredsstillende malkbarhed. Ædelysten var særdeles god, og kvierne var gode at arbejde med. Ingen af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 36 kg. 7 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, enkelte store, særdeles retlinede, meget velprægede, tiltalende og velbyggede, mellemrøde og mørk mellemrøde dyr. Pænt hoved, fin hals, god brystdybde og -bredde, ganske enkelte lidt snævre bag boven, særdeles velrundet ribbensbygning, rummeligt midtstykke; ryggen gennemgående stærk, hos enkelte lidt ujævn, enkelte med lidt stram lænd; krydset aldeles overvejende særdeles velformet og næsten fladt, velformet, lidt klejn lårbygning, nogle stykker med lidt anstrengt hasebygning. Yveret gennemgående velformet og velbåret, hos enkelte lidt kort og lidt rundt, overvejende pæne velformede og velstillede patter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Rødding Frem, s. 28420, f. 7. marts 1962
hos Ejler Iversen, Stengårdsminde, Stensby, Skamby.

Ejer: Rødding og Nørre Rangstrup Kvægavlsforeninger.

Fader: Nordfyns Frem, e.A 4866. Ff. Morsø Wahl, e.A 4930. Fm. Nr. 65, s. 24793.

Moder: Nr. 2, e.s. 26925. Mf. Nordfyns Vang, s. 4774. Mm. Nr. 83, s. 24695.

Gns. af 20 døtre på Østerhåb:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4978	4,45	222	3,81	190

Selv om udholdenheden i ydelsen var god og specielt i den sidste del af prøvetiden, nåede den gennemsnitlige mælkeydelse og middelfedtprocenten lige knap racens gennemsnit for årets afkomsprøvehold. Hverken fedt- eller proteinprocenterne udviste ret stor variation, medens der ikke var noget særligt at bemærke med hensyn til spredningen i de øvrige ydelsestal. Malkbarhedsresultaterne blev knap middelgode, men sundhedstilstanden var god,

og alle 20 kvier gennemførte prøven. Alle kvierne havde særdeles god ædelyst, og det var et meget roligt hold at arbejde med. Kalvene vejede 40 kg i gennemsnit. Drægtighedsresultaterne var ikke tilfredsstillende, men der var dog kun 1 kvie, som ikke var erklæret drægtig ved hjemsendelsen. Kun 5 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,8 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, middelstore, overvejende af god bredde og dybde, triveligt prægede, men en ret stor part noget uregelmæssige, mellemrøde dyr. Almindeligt hoved, velformet hals, gennemgående velstillet bov, velrundet rib, overvejende vigende eller noget ujævn ryg, lige, jævnt bredt kryds af varierende rammer og overfladeform, en ret stor part fremtrædende korsbenskam, jævnt gode til velformede af lår og skank, pæn benstilling. Overvejende noget lille, et par lidt fremskudt, ellers pænt ophængt yver med almindeligt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Holbæk Allaks, s. 28117, f. 13. marts 1961
hos Kristian Eriksen, Kellerup, Ringe.

Afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1967 v. De s. sj. Ldf.

Ejer: Holbæk Amts Kvægavlsforening.

Fader: Rudme Ideal, e.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 61, e.s. 26873. Mf. Rudme Flax, s. 3990. Mm. Nr. 40, s. 18122.

Gns. af 20 døtre på Torntofte:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4804	4,61	221	3,89	187

Såvel fedt- som proteinprocenterne var gode, medens mælkeydelsen knap nåede racens gennemsnit. De gode proteinprocenter var ret ensartede, medens der var en del variation i ydelsestallene for smørfedt og mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var kun jævnt god, og der opnåedes ikke tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen, selv om 3 kvier fik alle patter stukket op. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til ædelyst eller temperament, men kvierne udviklede sig godt på stationen og opnåede en stor tilvækst. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier var erklæret drægtige ved prøvens afslutning. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Godt middelstore og middelhøje, dybe overvejende brede, ret triveligt prægede, mellemrøde og mørkmellemrøde dyr. Velformet hoved og hals, flere med lidt fremskudt bov, gennemgående fortrinlig dybde af midtstykke, flere med lidt vigende eller lidt ujævn ryg; krydset gennemgående af god bredde og hos en del ret velformet og stærktbygget, men hos mange med lidt brede eller fremtrædende

hofter og noget kraftigt korsbensparti, overvejende dybe, velformede lår, flere med en smule stærktbøjede haser. Overvejende velformet og velbåret, hos nogle dog en smule fremskudt yver med velformede og velstillede patter, enkelte med en smule lange patter og hos et par er forpatterne lidt vidtstillede.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Bjørn Sydvest, s. 28112, f. 26. januar 1961
hos Johannes Andersen, Enggård, Hønsinge, Nr. Asmindrup.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1967 v. De s. sj. Ldf.

Ejer: Sydvestsjællands Kvægavlsforening.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 23, s. 24862. Mf. Buster, s. 4294. Mm. Nr. 98, f. 26. januar 1950 hos Niels H. Andersen, Enggård, Hønsinge, Nr. Asmindrup.

Gns. af 20 døtre på Grønhøjgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4868	4,54	221	4,01	195

En del af kvierne startede prøvetiden med særdeles gode dagsydelser, men da det kneb med udholdenheden, forringedes holdets placering betydeligt fra den første korttidsopgørelse til opgørelsen ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev knap middelhøj, medens fedtprocenterne var middelhøje og middelproteinprocenten blev årets højeste inden for racen. Der var en del variation i fedt- og proteinprocenterne, medens spredningen kun blev knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Der opnåedes knap middelgode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen, men der var stor ensartethed i malkbarhedstallet. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament og opnåede en god tilvækst på stationen. Enkelte af kvierne fødte ret store kalve, og i gennemsnit vejede de 40 kg. Drægtighedsresultaterne var fine, idet alle kvier var erklæret drægtige på et forholdsvis tidligt tidspunkt, og 12 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed.

Overvejende middelhøje, enkelte godt middelstore, velbyggede triveligt prægede, mellemrøde kvier, ensartede i lød og type. Pænt hoved, fin hals, velstillet bov, god eller fortrinlig dybde, enkelte kun middeldybe af bryst, ryggen hos flertallet stærk eller velbåret, hos enkelte en smule ujævn eller lidt vigende, velformet og stærktbygget kryds, flere dog kun middelbrede bagtil, med en smule lave omdrejere, en kende fremtrædende korsbenskam eller lidt høj halerod, gennemgående brede og fyldige lår og velstillede lemmer. Velformet og velbåret yver med velformede og overvejende velstillede patter; hos nogle er foryveret lidt mindre udviklet end bagyveret, og enkelte har en smule strittende eller lidt vidt ansatte patter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Bakager Wahl, s. 28062, f. 27. september 1960
hos Alfred Bech, Bakagergård, Vitten, Hadsten.

Ejer: Hadstenegnens Kvægavlsforening.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Ålborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 16, e.s. 27378. Mf. Ejlekær, s. 4416. Mm. Nr. 136, s. 26632.

Gns. af 20 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5002	4,41	220	3,75	187

Mælkeydelsen blev middelhøj, medens fedt- og proteinprocenterne knap nåede racens gennemsnit. Udholdenheden i ydelsen var særdeles god og især i den sidste halvdel af prøvetiden. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til variationen i ydelsestallene. Kvierne var særdeles gode at malke, men en del af dem havde overtallige patter. Det var rolige kvier at arbejde med, og alle 20 gennemførte prøven. Det kneb lidt med ædelysten i begyndelsen af prøvetiden, men den bedredes forholdsvis hurtigt. Der forekom en del svære kælvninger, men kalvene vejede også 40 kg i gennemsnit. Drægtighedsforholdene var meget dårlige, men kvierne havde også svage brunstytringer. 6 kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige på stationen, selv om der blev udført et stort arbejde med ufrugtbarhedsbehandlinger. Kun 4 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Kun jævnt ensartede, middelstore til godt middelstore, på enkelte nær brede og dybe, adskillige ikke helt solide linier, pænt muskuløse, enkelte lysmellemrøde, i øvrigt mellemrøde dyr. Almindeligt hoved, pæn hals, en del fremskudt bov, pænt midtstykke, en ret stor part vigende til lav ryg, lige, overvejende jævnt bredt kryds med ret pæne rammer, adskillige fremtrædende korsbenskam eller halerod, jævnt gode lår og lemmer. Varierende malkeorganer, enkelte lille eller fremskudt yver, nogle lidt lange og grove patter.

Holdet tilkendt g for eksterior.

Kolding Pall 23, s. 28081, f. 29. maj 1961
hos Knud Palle, Gunslevmagle, Eskilstrup.

Ejer: Koldingkredsens Kvægavlsforening.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Ålborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 23, s. 24393. Mf. Højvig 47, s. 4221. Mm. Nr. 3, s. 22276.

Gns. af 16 døtre på Gelballegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4915	4,37	215	3,64	179

Udholdenheden i ydelsen var tilfredsstillende, men den gennemsnitlige mælkeydelse nåede alligevel knap nok racens gennemsnit for indeværende prøveår. Fedtprocenterne var kun knap middelhøje og proteinprocenterne udpræget lave. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, medens der var stor variation i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Der opnåedes ikke tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. 3 kvier blev udsat under prøven, og heraf to på grund af yverbetændelse. Den ene af disse havde fået 3 patter stukket op, medens den anden var så besværlig at malke, at den hurtigt fik udkrængede pattekanaler, hvorefter der kom yverbetændelse. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament og opnåede en stor tilvækst i prøvetiden. Kun 11 af de 16 kvier nåede at blive erklæret drægtige på stationen, men der havde også været kælvningsvanskeligheder, og kalven måtte parteres fra 3 af kvierne. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, knap middelstore til middelstore, jævnt brede og dybe, kun ret muskuløse, noget uregelmæssige, mellemrøde dyr af jævnt godt slag. Ret pænt hoved, velansat hals, adskillige lidt fremskudt bov, enkelte lidt flad gjord, ellers ret velrundet rib, en del lav ryg, omtrent middelbredt, enkelte noget opsvejet kryds, adskillige snævre omdrejere eller højt sædebensparti og ofte noget fremtrædende halerod, pæn lårbygning og benstilling. Adskillige kun ret veludviklet og velformet yver, pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Varde Grøn, s. 28430, f. 16. oktober 1961
hos A. Grønnegaard, Corselitze, Nykøbing Falster.

Ejer: Vardeegnens Kvægavlsforening.

Fader: Stevns Klint, s. 4659. Ff. Højvig 47, s. 4221. Fm. Nr. 57, s. 18493.

Moder: Nr. 251, s. 25823. Mf. Hermes, s. 4407. Mm. Nr. 18, s. 24373.

Gns. af 13 døtre på Vardegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4795	4,45	214	3,74	179

Det kneb meget med konstitutionen på dette hold, og det blev nødvendigt at udsætte 5 kvier af holdet, som kun kom til at slutte med 13 kvier. Mælkeydelsen blev knap middelhøj, og da middelprocenten for fedt og protein ikke nåede racens gennemsnit, opnåedes der ikke en tilfredsstillende ydelse for smør eller mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var kun nogenlunde tilfredsstillende. Fedtprocenterne udviste stor variation, medens de øvrige ydelsestal udviste meget lille variation, og der var især stor ensartethed i

ydelsestallene for mælk og mælkeprotein. Malkbarhedsresultaterne blev knap middelgode, medens der ikke var noget særligt at bemærke med hensyn til ædelyst eller temperament. Der var en del kælvningsbesværligheder, og det blev nødvendigt at partere en kalv samt at tage en anden ved kejsersnit. 2 kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige på stationen, og der var kun 3, som blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, knap middelstore til middelstore, kun nogenlunde brede og dybe, en del noget lette, mellemrøde dyr, adskillige noget usolide af form og præg. Kønne af hoved og hals, ret velstillet bov, adskillige blød, ellers ret velbåret ryg, lige, en del bredt, de øvrige noget smalt kryds af varierende rammer og overkadeform, en del høj halerod, flere noget flade lår, ret velstillede lemmer. Ikke middelstort, men velophængt yver, adskillige lidt lange eller tynde patter.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Horsens Gert, s. 28410, f. 8. maj 1962
hos Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

Ejer: Horsensegnens Kvægavlsforening.

Fader: Djurs Gert, s. 4858. Ff. Rolf, s. 4617. Fm. Nr. 30, s. 22323.

Moder: Nr. 246, e.s. 28181. Mf. No Brethvig, s. 4432. Mm. Nr. 198, s. 26749.

Gns. af 16 døtre på Østerhåb:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4584	4,63	212	3,94	181

Fedt- og proteinprocenterne var særdeles gode, men da mælkeydelsen var for lav, opnåedes ikke et tilfredsstillende afkomsprøveresultat. Dagsydelsen faldt lidt for stærkt gennem det meste af prøveåret. Fedtprocenterne var meget ensartede, hvorimod der var almindelig variation i de øvrige ydelsestal. Der blev opnået fremragende malkbarhedsresultater, men det blev nødvendigt at udsætte en kvie, som ikke kunne eller ville lægge mælken ned. Der blev desuden udsat 2 kvier, som kælvede for tidligt. En fjerde kvie indgik ikke i prøven, da den var vild ved afhentningen, og da den fortsat var urolig efter ankomsten til stationen, blev den hjemsendt. Der var lidt nervøst over flere af kvierne. Et par af kvierne fødte store kalve, hvis gennemsnitsvægt blev 40 kg. En kvie nåede ikke at blive erklæret drægtig på stationen, og der var kun 6, som blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, middelstore, nogenlunde brede, af pæn dybde, enkelte muskuløse og velformede, men adskillige noget skarpe og uregelmæssige, mellemrøde dyr. Ret kønne af hoved og hals, velstillet til ret fast bov, enkelte knap middeldybe, ellers ret rummeligt midtstykke, en del vigende, de øvrige velbåret, men oftest muskelfattig ryg, lige, men overvejende kun middelbredt og en del

ret smalt kryds, jævnt gode af rammer og overfladeform, adskillige høj, men ikke grov korsbenskam, jævnt gode lår, noget klejne lemmer, enkelte lidt stærktbøjet has og usikker hasestilling. Ret velophængt, kun nogenlunde velformet yver med varierende pattesæt, enkelte tykke patter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Vald Nordvest, s. 28126, f. 19. april 1961
hos N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

Ejer: Holbæk Amts Kvægavlsforening.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Ålborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 50, Vita VIII, e.s. 27423. Mf. Kolding Valdal 174, s. 4748. Mm. Nr. 14, Vita VII, s. 25919.

Gns. af 18 døtre på Torntofte:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4667	4,54	212	3,73	174

Fedtprocenterne var middelhøje, hvorimod den gennemsnitlige mælkeydelse og middelproteinprocenten ikke nåede racens gennemsnit, og der opnåedes derfor ikke tilfredsstillende resultater med hensyn til ydelse af smør og mælkeprotein. Ydelsen faldt for stærkt i den sidste trediedel af prøvetiden. Der var stor variation i fedt- og proteinprocenterne, medens spredningen var middelstor for de øvrige ydelsestal. Der opnåedes kun jævnt gode malkbarhedsresultater. Kvierne udviklede sig særdeles godt på stationen og fik en stor tilvækst. Alle 18 kvier blev erklæret drægtige på et forholdsvis tidligt tidspunkt, og 7 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Fra store til nærmest middelstore, overvejende velprægede, mellemrøde og lysmellemrøde kvier. Pæne af hoved og hals, enkelte med en smule fremskudt bov, overvejende god dybde af bryst og side, et par kun middeldybe, flertallet med velbåret ryg, en del med lidt lav lænd; krydset lidt uens, hos nogle ret velformet, hos andre med lidt høj korsbenskam, lidt fremtrædende sædebensparti eller en smule grov halerod, gennemgående velformede lår, enkelte med en kende stærktbøjede haser. Velformet og velbåret yver med velformede og velstillede patter, nogle dog med en smule vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Thy Skov, s. 28440, f. 13. februar 1962
hos Martin Hansen, Gudbjerg Skov, Gudbjerg Sydfyn.

Ejer: Thy Kvægavlsforening for RDM.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Ålborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 86, s. 26121. Mf. Sortemose, s. 4680. Mm. Nr. 69, s. 23264.
Gns. af 17 døtre på Kronborg:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4832	4,37	211	[illegible]	

Hverken den gennemsnitlige mælkeydelse eller middelprocenten [illegible] eller protein nåede racens gennemsnit, og derfor opnåedes ikke en tilfredsstillende ydelse af smør eller mælkeprotein. Der var kun lille variation i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen, idet dagsydelsen faldt for stærkt gennem en stor del af prøvetiden. Der opnåedes gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen, men enkelte af kvierne var noget nervøse og urolige at arbejde med. Ædelysten var god, og kvierne opnåede en stor tilvækst på stationen. To kvier døde og en tredie blev udsat under prøven. Der var en del kælvningsbesværligheder, og fra den ene kvie, som døde under prøven, var kalven blevet parteret, og en af kvierne, som gennemførte prøven, fik kalven taget ved kejsersnit. To kvier var ikke erklæret drægtige ved hjemsendelse, og der var kun 5, som blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, passende store, jævnt muskuløse, ret velprægede, men flertallet kun nogenlunde regelmæssige, mellemrøde dyr af god dybde og ret god bredde. Typisk hoved og hals, pænt bovleje, ret rummeligt midtstykke, adskillige noget vigende ryg, lige, overvejende bredt kryds med noget varierende rammer og overfladeform, adskillige højt sædebensparti, ret gode lår, en del tætstillede haser. Velbåret, ret velformet, ofte noget lille yver, overvejende regelmæssigt pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Erslev, s. 28383, f. 18. august 1961
hos Theodor Fihl, Ballegård, Erslev, Hadsten.

Ejer: Hobroegnens Kvægavlsforening.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 74, e.s. 28779. Mf. Hadsten Wahl, e.A 4940. Mm. Nr. 66, s. 26654.

Gns. af 19 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4465	4,71	210	3,78	169

Mælkeydelsen udviste stor variation og forårsagede stor spredning i ydelsestallene for smørfedt og mælkeprotein, medens der var normal variation i fedt- og proteinprocenterne. Den gennemsnitlige mælkeydelse blev for lav, hvorimod fedtprocenterne var høje og proteinprocenterne middelhøje. Der

var kun jævnt god udholdenhed i ydelsen; kvierne var usædvanlig lette og hurtige at malke, og det fine malkbarhedsresultat skaffede holdet fløjpladsen af de røde hold ved malkbarhedsundersøgelsen. Det kneb lidt med nedlægningen af mælken hos nogle af kvierne de første gange, de blev malket, men det var dog ikke alvorligt. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til ædelyst, temperament eller konstitution. Ingen af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 36 kg. Drægtighedsforholdene var gode, idet 18 af holdets 19 kvier var erklæret drægtige ved prøvens afslutning, og 11 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, omtrent middelstore, brede, dybe, pænt muskuløse, overvejende velformede og velprægede, mellemrøde dyr. Typisk hoved og hals, på et par nær velstillet bov, adskillige lidt vigende ryg, lige, bredt, adskillige regelmæssig firsidet kryds af god overfladeform, de øvrige pæne krydsrammer, enkelte lidt høj, men ikke grov korsbenskam, velformede lår, et par stærktbøjet has, ellers god benstilling. Gennemgående pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Djurs Wahl, s. 28311, f. 6. februar 1961
hos Nic. S. Nørgaard, Kjeldgård, Elsø, Nykøbing Mors.

Ejer: Djurslands Kvægavlsforening.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Ålborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 92, s. 24545. Mf. Loke, s. 4323. Mm. Nr. 43, s. 20197.

Gns. af 20 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4784	4,35	208	3,64	174

I den første del af prøvetiden var den daglige mælkeydelse god, men ydelsen faldt lidt for stærkt gennem det meste af prøveåret. Da såvel fedt- som proteinprocenterne lå noget under racens gennemsnit, opnåedes ikke helt tilfredsstillende resultater med hensyn til smørydelse eller ydelse af mælkeprotein. Der var meget stor ensartethed i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein, og der var heller ikke så stor variation i fedt- og proteinprocenterne, som man normalt finder hos et rødt hold. De brugsmæssige egenskaber var fremragende, idet holdet bestod af rolige og robuste kvier med god ædelyst og meget fremragende malkbarhedsegenskaber. Alle kvier var erklæret drægtige inden prøvens afslutning. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, godt middelstore, kraftige, enkelte betydelige, meget brede og dybe, muskuløse, mellemrøde dyr, overvejende pæne af form og præg. Typisk hoved og hals, adskillige fremskudt bov, meget velformet midtstykke, adskillige

ujævn eller blød ryg, lige, bredt kryds med ganske gode rammer og pænt sædebensparti, adskillige grov korsbenskam og halerod, meget velformede af lår og skank, en del indaddrejede haser, de øvrige pæn benstilling. Enkelte lidt fremskudt yver og en del vidtstillede forpatter, ellers pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Hadsten Gert, s. 28617, f. 8. december 1961
hos Johannes Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse, Ringsted.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1967 v. F. a. j. Ldf.

Ejer: Hadstenegnens Kvægavlsforening.

Fader: Djurs Gert, s. 4858. Ff. Rolf, s. 4617. Fm. Nr. 30, s. 22323.

Moder: Nr. 83, Gerda, s. 26491. Mf. Nico, s. 4836. Mm. Nr. 55, Gerda, s. 25019.

Gns. af 19 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4660	4,38	204	3,68	172

Mælkeydelsen nåede ikke op på et tilstrækkeligt højt niveau, og da det kneb lidt med såvel fedt- som proteinprocenterne, blev ydelsen af smør og mælkeprotein ikke tilfredsstillende. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til variationen i ydelsestallene eller udholdenheden i ydelsen. Kvierne var ualmindelig gode at malke, og holdet fik en meget fin placering ved malkbarhedsundersøgelsen. Der var som helhed en god ædelyst, men nogle af kvierne var lidt urolige. Selv om nogle af kvierne var lidt malkeprægede, opnåedes en god tilvækst på stationen. Ingen af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 35 kg. To kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige inden hjemsendelsen. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, middelstore til godt middelstore, jævnt muskuløse, ret velprægede, mellemrøde dyr af pæn bredde og dybde, men adskillige ikke helt tilfredsstillende linier. Almindeligt hoved, velansat hals, enkelte fremskudt, de øvrige velstillet bov, ret rummeligt midtstykke, en del vigende til lav ryg, lige, overvejende ret bredt, en del noget tagdannet kryds, flere lidt indstukken eller høj halerod, jævnt gode lår, enkelte stærktbøjet has, ellers god benstilling. Overvejende velophængt yver af pæn form, adskillige lidt store patter og enkelte vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Århus Ask, s. 28404, f. 29. november 1961
hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

Ejer: Århusegnens Kvægavlsforening.

Fader: Ålborg Bitz, e.A 4892. Ff. Højvig 47, s. 4221. Fm. Nr. 18, s. 22540.

Moder: Nr. 147, e.s. 27477. Mf. Toke Sams, s. 4433. Mm. Nr. 107, s. 23136.

Gns. af 19 døtre på Elkjær:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4594	4,39	202	3,73	171

Laktationskurven var usædvanlig flad for dette hold, men da dagsydelsen var for lille i den første del af prøvetiden, opnåedes ikke tilfredsstillende ydelsesresultater. Den gennemsnitlige mælkeydelse blev kun knap middelhøj, og såvel middelfedtprocenten som middelproteinprocenten kom under racens gennemsnit. Der var usædvanlig stor ensartethed i ydelsestallene, og kvierne på dette hold var tillige i besiddelse af fremragende brugsmæssige egenskaber, idet de havde særdeles god ædelyst og var robuste og rolige at arbejde med. Desuden var de trivelige og opnåede en god tilvækst samt gode malkbarhedsresultater. Alle 19 kvier gennemførte prøven og blev erklæret drægtige på et forholdsvis tidligt tidspunkt. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, passende store, triveligt prægede, enkelte uregelmæssige, men adskillige ret velformede, mellemrøde dyr af pæn bredde og dybde. Kønne af hoved og hals, velstillet til kun ret fast bov, pænt midtstykke, enkelte lidt vigende og et par blød, de øvrige velbåret ryg, lige, overvejende ret bredt kryds, adskillige noget lave eller snævre omdrejere, en del snævert eller fedt sædebensparti, ret velformede lår, sunde, velstillede lemmer. Gode malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Ribe Klint, s. 28421, f. 12. februar 1962
hos Peter Stærk, Lerholm, Breth, Barrit.

Ejer: Kvægavlsforeningen Vestjyden.

Fader: Hjørring Munkdrup, e.A 4906. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 43, s. 24522.

Moder: Nr. 25, e.s. 29504. Mf. Horsens Klint, s. 4857. Mm. Nr. 15, f. 19. maj 1956 hos Peter Stærk, Lerholm, Breth.

Gns. af 19 døtre på Skølvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4515	4,35	197	3,70	167

Meget tidligt på efteråret var det klart, at holdet ville blive lavtydende, og selv om laktationskurven blev meget flad, opnåedes ikke antagelige ydelsesresultater. Såvel mælkeydelsen som fedt- og proteinprocenterne lå under racens gennemsnit. Proteinprocenterne var meget ensartede, og der var kun

knap middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Det tog for lang tid at malke kvierne, hvorfor der ikke opnåedes tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var god, og kvierne var gennemgående rolige at arbejde med. Det var et meget uensartet hold ved ankomsten til stationen, men kvierne udviklede sig ret godt, og de opnåede en stor tilvækst i prøvetiden. Alle kvier blev erklæret drægtige på stationen, men der medgik 2,7 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, knap middelstore til middelstore, omtrent middelbrede, dybe, flertallet ret muskuløse, men noget uregelmæssige, mellemrøde dyr. Typisk hoved og hals, adskillige noget løs og fremskudt bov, velrundet rib, flertallet vigende eller lav ryg, kun ret bredt, en del lidt opsvejet kryds med varierende rammer og overfladeform, flere højt sædebensparti og grov halerod, enkelte stærktbøjet has, ellers pæn lårbygning og benstilling. Ikke særlig veludviklet, enkelte noget rundt og fremskudt yver, pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Varde Kry, s. 28427, f. 21. februar 1962
hos Holger Moritz Hansen, Toftegård, Tvinde, Rynkeby.

Ejer: Vardeegnens Kvægavlsforening.

Fader: Kerteminde Kry, e.A 4918. Ff. Høj, s. 4600. Fm. Nr. 91, s. 21928.

Moder: Nr. 76, e.s. 26897. Mf. Nordfyns Gjald, s. 4769, Mm. Nr. 36, f. 13. januar 1952 hos Holger Moritz Hansen, Thoderup, Guldbjerg.

Gns. af 18 døtre på Vardegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4431	4,37	194	3,68	163

Kvierne startede prøven med for lave dagsydelser, og da udholdenheden i ydelsen tillige var for ringe i hele vinterperioden, opnåedes ikke et antageligt ydelsesresultat ved prøvens slutning. Der var kun knap middelstor spredning i smørfedtydelsen, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne var særdeles gode at malke, og de havde god ædelyst og et roligt temperament. Sundhedstilstanden var særdeles god, og alle kvier gennemførte prøven og var erklæret drægtige inden hjemsendelsen. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Kun ret ensartede, knap middelstore til middelstore, adskillige ret velformede og velprægede, mellemrøde dyr, overvejende af pæn bredde og dybde. Almindelige af hoved og hals, adskillige løs eller fremskudt bov, velrundet rib, en del lav ryg, de øvrige ret god overlinie, lige, overvejende ret bredt kryds med kun ret tilfredsstillende rammer, en del højt sædebensparti, velformede lår, adskillige noget usikker hasestilling. Pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Kolding Munk 143, s. 28382, f. 17. januar 1962
hos Aksel Gert Nielsen, Høgstrupgård, Bjerregrav, Randers.

Ejer: Koldingkredsens Kvægavlsforening.

Fader: Hjørring Munkdrup, e.A 4906. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 43, s. 24522.

Moder: Nr. 143, e.s. 28163. Mf. No Brethvig, s. 4432. Mm. Nr. 23, s. 22596.

Gns. af 19 døtre på Gelballegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4201	4,47	188	3,75	157

Dagsydelsen lå ikke på et tilstrækkeligt højt niveau i begyndelsen af prøveåret, og da ydelsen faldt for stærkt gennem det meste af prøvetiden, blev holdets gennemsnitsydelse for ringe. Det var mælkeydelsen, som svigtede, medens fedt- og proteinprocenterne næsten nåede racens gennemsnit. Fedtprocenterne udviste normal variation, og proteinprocenterne var meget ensartede, medens spredningen var godt middelstor for de øvrige ydelsestal. Malkbarhedsresultaterne var gode, og der var stor ensartethed i malkbarhedstallet, men det kneb med nedlægningen af mælken hos en del af kvierne i den første tid efter kælvningen. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament og opnåede en god tilvækst. Flere af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev 41 kg. Det kneb med drægtighedsforholdene, idet to kvier ikke blev erklæret drægtige inden hjemsendelsen, og to andre kastede ved udbindingstiden. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, velvoksne, enkelte betydelige, brede, dybe, flertallet pænt muskuløse, mellemrøde og lysmellemrøde dyr, overvejende pæne af form og præg. Almindeligt hoved, pæn hals, velstillet bov, rummeligt midtstykke, enkelte noget vigende, ellers god overlinie, lige, bredt, gennemgående velformet kryds, adskillige noget fremtrædende korsbenskam, gode lår, pæn benstilling. Enkelte noget fremskudt eller lidt løst ophængt yver, almindeligt pattesæt, et par hvide aftegn på yveret.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Bøg, s. 28444, f. 30. august 1961
hos Folmer Pedersen, Bøgeskov, Odder.

Ejer: Odderegnens Kvægavlsforening.

Fader: Danhøj, s. 4560. Ff. Dan Skovgård, s. 3349. Fm. Nr. 128, Gerda, s. 16389.

Moder: Nr. 105, e.s. 27501. Mf. Toke Sams, s. 4433. Mm. Nr. 65, e.s. 26888.

Gns. af 18 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3968	4,70	186	3,97	158

Det var mælkeydelsen, som svigtede for dette hold, medens fedtprocenterne var særdeles gode og proteinprocenterne udpræget høje. Udholdenheden i ydelsen var knap tilfredsstillende i vinterperioden, medens laktationskurven havde en naturlig form i sommerperioden. Der var stor variation i fedtprocenterne, medens spredningen var middelstor for de øvrige ydelsestal. Kvierne var usædvanlig lette og hurtige at malke, og samtlige kvier opnåede en kort malketid ved malkbarhedsundersøgelsen. Enkelte af kvierne havde ikke særlig god ædelyst. Kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 36 kg. 3 kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige inden hjemsendelsen. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, omtrent middelstore, dybe, ret brede, jævnt muskuløse, ret velprægede, mellemrøde og mørkmellemrøde dyr med usolide linier og rammer. Kønne af hoved og hals, gennemgående noget fremskudt bov og lav ryg, på enkelte nær lige, ret bredt, men noget uregelmæssigt kryds, adskillige fremtrædende korsbenskam og halerod, jævnt gode lår og lemmer. Almindelige malkeorganer.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

2. SORTBROGET DANSK MALKERACE

Varde Stefan, s. 7296, f. 17. januar 1961
hos Th. Aarup, Kallestrup, Ålestrup.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1967 v. F. a. j. Ldf.
Ejer: Vardeegnens Kvægavlsforening og Kvægavlsforeningen Vestjyden.
Fader: Aros, s. 6905. Ff. Foch, e.s. 6197. Fm. Nr. 190, e.s. 4443.
Moder: Nr. 179, e.s. 5373. Mf. Alex, s. 6468. Mm. Nr. 58, e.s. 4606.
Gns. af 20 døtre på Skølvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5630	4,47	252	3,63	204

Næsten alle kvierne havde et lille yver ved kælvningen, men efter en periode kom de op på en høj dagsydelse, og da udholdenheden i ydelsen var god, sluttede holdet med den højeste gennemsnitsydelse for de sortbrogede hold. Mælkeydelsen var høj og fedtprocenterne særdeles gode, medens proteinprocenterne var middelhøje. Der var ret stor spredning i fedtprocenterne, medens variationen var ret normal i de øvrige ydelsestal. De brugsmæssige egenskaber var fremragende, idet kvierne var meget lette og hurtige

at malke, og de havde særdeles god ædelyst og var gode at arbejde med. Sundhedstilstanden var god, og alle kvier gennemførte prøven, under hvilken de udviklede sig godt og opnåede en god tilvækst. Kalvenes gennemsnitsvægt blev 40 kg. 3 kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige på stationen. Der medgik 2,9 ins. pr. drægtighed.

Ensartede, velvoksne, muskuløse, fastbyggede, meget velformede og velprægede dyr af udmærket bredde og dybde. Typisk hoved og hals, velstillet bov, et par lidt vigende, ellers udmærket overlinie, lige, bredt, flertallet velformet kryds, enkelte lidt lave omdrejere og noget høj halerod, jævnt bredt sædebensparti, gode lår, velformet skank, overvejende velstillede, sunde lemmer, dog enkelte lidt usikker hasestilling. En enkelt stort og løst yver og adskillige med bipatter, ellers fortrinlige malkeorganer.

Holdet tilkendt mg for eksteriør.

Kolding Gordon 39, s. 7304, f. 16. maj 1961
os brdr. Poulsen, Horslevgård, Vognsild, Års.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1967 v. F. a. j. Ldf.

Ejer: Koldingkredsens Kvægavlsforening.

Fader: Gordon, e.s. 6462. Ff. Adema 21 v.d. Woudhoeve, n.r.s. 26781. Fm. Pietje 32, n.r.s. 201334.

Moder: Nr. 39, e.s. 5338. Mf. Ponto, e.s. 6381. Mm. Nr. 11, e.s. 4933.

Gns. af 20 døtre på Gelballegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5897	4,27	252	3,61	213

Kvierne startede prøvetiden med meget høje dagsydelser, men det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen gennem det meste af prøveåret. Mælkeydelsen blev usædvanlig høj, medens fedt- og proteinprocenterne lige knap nåede racens gennemsnit. Der var normal variation i proteinprocenterne, samt i ydelsestallene for mælk og mælkeprotein, medens spredningen var stor i fedtprocenterne og knap middelstor i smørfedtydelsen. Kvierne var særdeles gode at malke, og de havde en god ædelyst, men nogle af dem var noget nervøse. Sundhedstilstanden var god. 6 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, overvejende velvoksne, enkelte store, brede, dybe til knap middeldybe, jævnt muskuløse, ret regelmæssige, velprægede, pænt sortbrogede og mørksortbrogede dyr. Velformet hoved og hals, enkelte fremskudt, ellers velstillet bov, adskillige rummeligt, men nogle trindt midtstykke, stærk ryg, lige, ret bredt, en del noget uregelmæssigt og et par hældende kryds, adskillige grov korsbenskam, en del noget flade lår og klejn skank, enkelte stærktbøjet has, ellers pæn benstilling. Enkelte kort yver og noget kraftige patter, i øvrigt gode malkeorganer.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Egholm Gran, s. 7515, f. 15. oktober 1961
hos Jens Lilholm, Uhre, Brande.

Ejer: Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening.

Fader: Thy Gran, e.s. 6566. Ff. Piet Eduard, e.s. 6330. Fm. Nr. 167, e.s. 4951.

Moder: Nr. 69, e.s. 5551. Mf. Nico, e.s. 6138. Mm. Nr. 66 (sen. Nr. 71), e.s. 5595.

Gns. af 20 døtre på Skovgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5764	4,29	248	3,59	207

Det var takket være en enestående god udholdenhed i ydelsen, at holdet avancerede til en fin placering ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev særdeles god og fedtprocenterne middelhøje, medens proteinprocenterne knap nåede racens gennemsnit. Der var forholdsvis lille variation i alle ydelsestallene. Der opnåedes et meget smukt resultat ved malkbarhedsundersøgelsen, idet kvierne var lette og hurtige at malke. Ædelysten var god, og kvierne var som helhed gode at arbejde med. Kvierne havde let ved at kælve og en god sundhedstilstand. Alle 20 kvier gennemførte prøven, og der opnåedes en god tilvækst på stationen. Alle kvier var erklæret drægtige ved prøvens afslutning, og 9 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, knap middelstore, kun nogenlunde brede, ret dybe og muskuløse, kun ret regelmæssige, men velprægede, pænt sortbrogede dyr. Kønt hoved, velansat hals, adskillige fremskudt bov, en del vigende ryg, lige, kun nogenlunde bredt kryds af varierende form, adskillige noget snævre omdrejere og lidt høj, men ikke grov korsbenskam, pæn lårform og benstilling, sunde lemmer. Velformet og velophængt yver, adskillige lidt lange eller fremadrettede patter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Sdj. Aksel, s. 7402, f. 5. august 1961
hos H. M. Heeg, Ytens, Friesland, Holland.

Ejer: Sønderjydsk Kvægavlsforening for SDM.

Fader: Siferman, f.r.s. 41005. Ff. Nykle, f.r.s. 38186. Fm. Folkertje 57, f.r.s. 183514.

Moder: Akke 51, f.r.s. 257011. Mf. Gijsbert 2, f.r.s. 38345. Mm. Akke 44, f.r.s. 215397.

Gns. af 19 døtre på Brøstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5149	4,80	247	3,64	187

Det er bemærkelsesværdigt, at selv om fedtprocenterne var meget høje, blev proteinprocenterne kun middelhøje. Mælkeydelsen var god, og der opnåedes en høj smørydelse og en middelhøj ydelse af mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var kun nogenlunde tilfredsstillende. Der var en middelstor spredning i fedtprocenterne og en knap middelstor spredning i proteinprocenterne, medens der var stor variation i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Kvierne var usædvanlig lette og hurtige at malke, og der opnåedes det højeste malkbarhedstal for årets afkomsprøvehold. Samtlige kvier havde en kort malketid, men der var dog vanskeligheder med to af de 3 udsatte kvier med hensyn til nedlægning af mælken. Den ene af dem fik senere yverbetændelse og blev udsat af denne årsag, medens den anden blev udsat på grund af hormonale forstyrrelser, idet den ikke kunne eller ville lægge mælken ned. Der var ingen vanskeligheder med nedlægning af mælken for kvierne, som gennemførte prøven. Ædelysten var særdeles god, og kvierne var meget rolige at arbejde med og opnåede en meget stor tilvækst på stationen. Flere af kvierne var lidt ømme i bagbenene i en del af vinterperioden. Kvierne fødte små kalve, hvis gennemsnitsvægt kun blev 35 kg. Alle 19 kvier var erklæret drægtige inden prøvens afslutning, og 13 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,4 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, middelstore til godt middelstore, brede, dybe, ret muskuløse og velformede, adskillige retliniede og triveligt prægede, pænt sortbrogede og mørksortbrogede dyr. Velformet hoved og hals, velstillet bov, rummeligt midtstykke, enkelte lidt ujævn overgang fra kam til lænd, ellers velbåret ryg, lige, bredt, oftest ret velformet kryds, enkelte lidt lave omdrejere og fremtrædende korsbenskam, velformede af lår og skank, overvejende pæn benstilling. På få nær velophængt yver af pæn form, enkelte vidtstillede forpatter, ellers tilfredsstillende pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Ry, s. 7066, f. 14. februar 1960
hos Martin Husum, Langagergård, Ålestrup.

Ejer: Morsø Kvægavlsforening.

Fader: Gordon, e.s. 6462. Ff. Adema 21 v.d. Woudhoeve, n.r.s. 26781. Fm. Pietje 32, n.r.s. 201334.

Moder: Nr. 62, e.s. 5159. Mf. Bernhard, e.s. 6010. Mm. Nr. 50, f. 8. oktober 1947 hos Martin Husum, Langagergård, Ålestrup.

Gns. af 20 døtre på Morsø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5643	4,32	244	3,52	199

Kvierne startede med høje dagsydelser, men da det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen, forringedes holdets placering lidt fra den første korttidsopgørelse til opgørelsen ved prøveårets afslutning. Mælkeydelsen blev særdeles god og fedtprocenterne middelhøje, medens middelproteinprocenten lå noget under racens gennemsnit. Der var en del variation i mælkeydelsen, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne var særdeles gode at malke, men enkelte af kvierne var dog ikke så lette at malke i de første dage efter kælvningen. Ædelysten var god, og kvierne var gennemgående rolige at arbejde med. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier gennemførte prøven. Flere af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev 42 kg. En kvie nåede ikke at blive erklæret drægtig på stationen, men 11 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, middelstore til godt middelstore, brede, dybe, ikke udtalt muskuløse, malkeprægede, ret velformede, pænt sortbrogede dyr. Almindeligt hoved, pæn hals, en del noget fremskudt bov, ret velrundet rib, adskillige ujævn ryg, fast, enkelte lidt høj og skarp kam, en del vigende lænd, lige, ret bredt kryds, overvejende med pæne rammer, bredt sædebensparti, adskillige fremtrædende korsbenskam og halerod, en del lidt flade af lår og skank, sunde, meget velstillede lemmer. Overvejende velformet og velophængt yver med godt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Skive Hal, s. 7464, f. 16. december 1961
hos H. J. Tranberg, Halling Nedergård, Randers.

Ejer: Skiveegnens Kvægavlsforening.

Fader: Drost, e.A 60. Ff. Sneeker Diamant, n.r.s. 33792. Fm. Laura 36, n.r.s. 257137.

Moder: Nr. 109, e.s. 5630. Mf. Eduard, s. 6471. Mm. Nr. 75, e.s. 5360.

Gns. af 20 døtre på Krarup Nygård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5843	4,15	243	3,61	211

Laktationskurven var usædvanlig flad for dette hold, og derved forbedredes holdets placering en del fra de første korttidsopgørelser til den endelige opgørelse ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev meget høj, medens fedtprocenterne kun blev knap middelhøje. Middelproteinprocenten nåede omtrent racens gennemsnit. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, medens der var ret stor spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. De brugsmæssige egenskaber var fremragende, idet kvierne havde særdeles god ædelyst, og de havde et roligt temperament og var lette og hurtige at malke. Kvierne var trivelige og opnåede en stor tilvækst på stationen. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier gennem-

førte prøven. Flere af kvierne fødte ret store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev 41 kg. En kvie nåede ikke at blive erklæret drægtig på stationen, men 10 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Ensartede, middelstore til godt middelstore, enkelte betydelige, brede, dybe, muskuløse, fastbyggede, velformede og triveligt prægede, pænt sortbrogede og mørksortbrogede dyr. Typisk hoved og hals, på et par nær fast, velstillet bov, meget velformet midtstykke, et par kun ret velbåret, de øvrige god overlinie, lige bredt, overvejende velformet kryds, enkelte lave omdrejere, adskillige lidt kraftig halerod, velformede af lår og skank, flere en smule ret has, men overvejende sunde lemmer. Gennemgående pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt mg for eksteriør.

Hjørring Domino, s. 7413, f. 13. september 1961
hos D. Brandsma-de Jong, Lekkum, Friesland, Holland.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Blitsaerd Jakson, f.r.s. 52252. Ff. Sivert, s. 6658. Fm. Blitsaerd Japke 27, f.r.s. 321711.

Moder: Blitsaerd Dora 38, f.r.s. 377958. Mf. Blitsaerd Konstant, f.r.s. 49887. Mm. Dora 26, f.r.s. 197736.

Gns. af 18 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5497	4,30	237	3,64	200

Udholdenheden i ydelsen var fantastisk god for dette hold, som forbedrede sin position betydeligt fra den første korttidsopgørelse til opgørelsen ved prøvens afslutning. Mælkeydelsen blev godt middelhøj, medens såvel fedt- som proteinprocenterne blev middelhøje. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, medens der kun var knap middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Der opnåedes særdeles fremragende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen, idet kvierne var lette og hurtige at malke. Ædelysten var god, og kvierne var rolige og gode at arbejde med, men det blev dog nødvendigt at udsætte en kvie, da den var så urolig, at det var vanskeligt at have den på holdet. Ingen af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 35 kg. Alle 18 kvier blev erklæret drægtige på stationen, og de 10 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, omtrent middelstore til godt middelstore, brede, jævnt dybe, overvejende muskuløse, ret velformede og velprægede, pænt sortbrogede dyr. Almindeligt hoved, pæn hals, adskillige lidt fremskudt bov, ret velrundet rib, enkelte noget vigende, ellers velbåret ryg, lige, bredt, adskillige regelmæssigt og velformet kryds, en del lave omdrejere og fremtrædende korsbenskam eller lidt høj halerod, velformede af lår og skank, enkelte noget stærktbøjet has, men ud-

mærket benkvalitet. Enkelte lidt skævt yver eller lille bagyver og lidt tætstillede patter, i øvrigt pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Sdj. Ark, s. 7404, f. 29. oktober 1961
hos H. A. Boersma, Stiens, Friesland, Holland.

Ejer: Sønderjydsk Kvægavlsforening for SDM.

Fader: Freark, f.r.s. 47905. Ff. Adema 433, f.r.s. 42154. Fm. Jeltje 67, f.r.s. 213345.

Moder: Joukje 81, f.r.s. 329382. Mf. Lutke Eduard, f.r.s. 42562. Mm. Joukje 66, f.r.s. 266952.

Gns. af 20 døtre på Veesbæk:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5485	4,29	235	3,60	198

Mælkeydelsen var særdeles god, medens fedt- og proteinprocenterne lige knap tangerede racens gennemsnit. Dagsydelsen faldt lidt for stærkt i den sidste halvdel af prøvetiden. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til variationen i ydelsestallene. Kvierne var gode at malke, men en af kvierne blev dog håndmalket i det meste af prøvetiden, da den ikke ville lægge mælken ned til malkemaskinen. Ædelysten var særdeles god, men kvierne blev lidt nervøse, når der kom fremmede mennesker i stalden. Kvierne var dog meget rolige, når de gik på græsmarken, og de havde en forbavsende god sundhedstilstand. Alle 20 kvier gennemførte prøven, og de opnåede en god tilvækst på stationen. Kalvene vejede kun 36 kg i gennemsnit. En af kvierne nåede ikke at blive erklæret drægtig på stationen, og der var kun 7, som blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,5 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, passende store, brede, meget dybe, overvejende muskuløse, velformede og velprægede, pænt sortbrogede dyr. Kønt hoved, velansat hals, velstillet bov, meget rummeligt midtstykke, på et par nær, velbåret, muskuløs ryg, lige, bredt, oftest regelmæssig firsidet kryds, enkelte fremtrædende halerod, kraftige lår og god skank, enkelte noget stærktbøjet has, ellers pæn benstilling. Enkelte noget fremskudt eller tungt yver, i øvrigt gode malkeorganer.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Egholm Drost, s. 7516, f. 25. april 1962
hos Søren Mikkelsen, Enggården, Farsø.

Ejer: Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening.

Fader: Drost, e.A 60. Ff. Sneeker Diamant, n.r.s. 33792. Fm. Laura 36, n.r.s. 257137.

Moder: Nr. 52, e.s. 5581. Mf. Gordon, e.s. 6462. Mm. Nr. 31, e.s. 5435.

Gns. af 15 døtre på Skovgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5535	4,17	231	3,50	194

Holdet startede prøveåret forholdsvis svagt, idet ydelsen ikke var helt tilfredsstillende i den første del af prøvetiden, men udholdenheden i ydelsen var enestående god, og holdet kom til at slutte med en god gennemsnitsydelse. Mælkeydelsen blev særdeles god, medens fedt- og proteinprocenterne knap nåede et tilfredsstillende niveau. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, medens der var ret stor spredning i ydelsestallene for smørfedt og mælkeprotein, og der var meget stor variation i mælkeydelsen. Kvierne var gode at malke, og de havde en enestående god ædelyst og var gennemgående gode at arbejde med. De udviklede sig særdeles godt og opnåede en meget stor tilvækst på stationen. Alle 15 kvier gennemførte prøven, og de havde let ved at kælve, men kalvene vejede heller ikke mere end 35 kg i gennemsnit. Enkelte af kvierne havde lidt børbetændelse, og dette var sandsynligvis medvirkende til de lidt dårlige drægtighedsresultater. Kun 4 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, overvejende middelstore, enkelte dog ret små, dybe, ret brede, pænt muskuløse, triveligt prægede, pænt sortbrogede dyr. Typisk hoved og hals, velstillet bov, meget rummeligt midtstykke, enkelte vigende ryg, overvejende nogenlunde bredt, adskillige noget hældende og uregelmæssigt kryds med lave omdrejere og grov korsbenskam, velformede lår, adskillige usolid benkvalitet og -stilling, enkelte ret has. Velophængt, ret velformet yver, enkelte kraftige patter, almindelig pattestilling.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Varde Diamant, s. 7433, f. 28. september 1961
hos A. N. Wassenaar og Th. R. Schuiling, Jelsum, Friesland, Holland.

Ejer: Vardeegnens Kvægavlsforening og Kvægavlsforeningen Vestjyden.

Fader: Haskera Diamant Gerard, f.r.s. 54184. Ff. Jelsumer Gerard Wouter, f.r.s. 47475. Fm. Haskera Anna 90, f.r.s. 225464.

Moder: Haskera Anna 131, f.r.s. 357494. Mf. Haskera Gouverneur, f.r.s. 44506. Mm. Haskera Anna 119, f.r.s. 318138.

Gns. af 18 døtre på Vardegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5056	4,52	229	3,61	182

Mælkeydelsen blev knap middelhøj, medens fedtprocenterne var gode, og proteinprocenterne nærmest blev middelhøje. Udholdenheden i ydelsen var ret tilfredsstillende. Der var normal variation i fedt- og proteinprocenterne, hvorimod der var stor spredning i ydelsestallene for mælk og smørfedt, og der var også en del variation i mælkeproteinet. Der opnåedes kun

ret gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen, men kvierne havde en god ædelyst og et forbavsende roligt temperament. Sundhedstilstanden var god, og alle 18 kvier gennemførte prøven. Ingen af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 35 kg. Alle kvier var erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og 7 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,4 ins. pr. drægtighed.

Noget uensartede, passende store, overvejende dybe, men kun jævnt brede, pænt sortbrogede dyr med ret pæne linier, men flertallet noget usolide rammer. Almindelige af hoved og hals, enkelte fremskudt bov, et par trindt midtstykke, overvejende pænt båret, adskillige noget ujævn ryg, kun enkelte velformet kryds, de øvrige snævre omdrejere og uregelmæssig overfladeform, adskillige noget klejn skank og ret eller tæt has. Enkelte fremskudt og ret dybt yver, varierende pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Bjerringbro Basta, s. 7390, f. 25. januar 1962
hos Juul Larsen, Tandrupgård, Års.

Ejer: Bjerringbroegnens Kvægavlsforening.

Fader: Bast, e.s. 6258. Ff. Willem, f.r.s. 34593. Fm. Tietje 15, f.r.s. 140992.

Moder: Nr. 123, e.s. 5295. Mf. Rubin, e.s. 6154. Mm. Nr. 99 (sen. Nr. 31), e.s. 5038.

Gns. af 20 døtre på Rosenfeldt:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5040	4,52	228	3,73	188

Kvierne malkede godt i den første tid efter kælvningen, men det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen, hvorved holdet fik lidt ringere placering ved prøvens slutning, end det tegnede til i begyndelsen af prøveåret. Den gennemsnitlige mælkeydelse blev knap middelhøj, hvorimod såvel fedt- som proteinprocenterne var særdeles gode. Der var ret normal variation i fedt- og proteinprocenterne samt i smørfedtydelsen, medens der kun var lille spredning i ydelsestallene for mælk og mælkeprotein. Kvierne havde særdeles god ædelyst, og de var rolige og lette at arbejde med, selv når arbejdet udførtes af andet mandskab end det sædvanlige. Sundhedstilstanden var særdeles god. Selv om 13 af kvierne fødte kviekalve, må en fødselsvægt for kalvene på 35 kg alligevel anses for en lille gennemsnitsvægt. En af kvierne nåede ikke at blive erklæret drægtig på stationen, men 11 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Kun ret ensartede, middelstore til godt middelstore, jævnt muskuløse, velprægede, gennemgående ret velformede, adskillige retliniede, pænt sortbrogede dyr af god bredde og dybde. Pænt hoved, velansat hals, velstillet bov, enkelte blød, i øvrigt fast ryg, lige, bredt, ret velformet til velformet kryds, enkelte lidt lave omdrejere og en smule fremtrædende korsbenskam, ret velformede, men adskil-

lige kun ret muskuløse lår og noget klejn skank, enkelte stærktbøjet has, ellers god benstilling. Overvejende gode malkeorganer, adskillige ret store patter og nogle få med små bipatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Swea, s. 7424, f. 1. august 1961
hos Thorsten Ingvarsson, Katrinetorp, Malmø, Sverige.

Ejer: Vesthimmerlands Kvægavlsforening.

Fader: Riemer, sv. s. 30065. Ff. Bertus Adema, f.r.s. 46350. Fm. Riemke 20, f.r.s. 203024.

Moder: Nr. 1146, Tjitske, sv. s. 156131. Mf. Trinton, sv. s. 29500. Mm. Nr. 647, Tjitske, sv. s. 140177.

Gns. af 20 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5292	4,30	228	3,76	199

Såvel mælkeydelsen som fedtprocenterne grupperede sig omkring racens gennemsnit. Proteinprocenterne var særdeles gode, og der opnåedes en høj ydelse af mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var god. Der var normal variation i mælkeydelsen, knap middelstor spredning i fedt- og proteinprocenterne, men godt middelstor spredning i ydelsestallene for smørfedt og mælkeprotein. Der opnåedes et meget fint resultat ved malkbarhedsundersøgelsen, men der var dog en del variation i malkbarhedstallet. Kvierne havde særdeles god ædelyst og opnåede en stor tilvækst på stationen, men nogle af kvierne var lidt nervøse. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier gennemførte prøven. 19 af kvierne var erklæret drægtige ved prøvens afslutning, og heraf blev de 12 drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, omtrent middelstore til godt middelstore, overvejende velformede, velprægede, jævnt muskuløse, oftest pænt, sortbrogede dyr af god bredde og dybde. Almindeligt hoved, velansat hals, adskillige noget fremskudt bov, godt midtstykke, enkelte vigende til lav, ellers velbåret ryg, lige, bredt, overvejende velformet kryds med pænt sædebensparti, enkelte noget lave omdrejere og et par lidt fremtrædende korsbenskam og halerod, velformede lår, men adskillige noget klejne af skank og lemmer, i øvrigt god benstilling. Ganske gode malkeorganer.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Sdj. Viktor, s. 7403, f. 6. april 1961
hos Evert E. de Boer, Ureterp, Friesland, Holland.

Ejer: Sønderjydsk Kvægavlsforening for SDM.

Fader: Blitsaerd Botermijn, f.r.s. 52571. Ff. Botermijn 2, f.r.s. 48927 Fm. Blitsaerd Bontje 5, f.r.s. 227771.

Moder: Victor Pel 30, f.r.s. 327522. Mf. Evert, f.r.s. 32585. Mm. Victor Pel 12, f.r.s. 157573.

Gns. af 18 døtre på Brøstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5557	4,08	227	3,38	188

Mælkeydelsen blev særdeles god, medens fedtprocenterne ikke nåede et antageligt niveau, og proteinprocenterne var udpræget lave. Både fedt- og proteinprocenterne udviste stor spredning, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Ydelsen faldt lidt for stærkt i den sidste del af prøvetiden. Malkbarhedsresultaterne blev ikke helt tilfredsstillende, idet nogle af kvierne havde for lang malketid. Enkelte af kvierne var lidt nervøse. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til ædelyst, men holdet havde en stor tilvækst i prøvetiden. Kun et par af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitlige fødselsvægt blev kun 36 kg. Alle 18 kvier var erklæret drægtige ved prøvens slutning, og 10 af dem blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, knap middelstore til passende store, dybe, nogenlunde, brede og muskuløse, pænt sortbrogede dyr med jævnt gode linier og rammer. Almindelige af hoved og hals, velstillet bov, flertallet lidt høj eller ujævn kam, enkelte noget vigende lænd, ret velbåret, oftest omkring middelbredt kryds med kun ret solide rammer, adskillige lave omdrejere og fremtrædende korsbenskam, jævnt fyldige af lår og skank, overvejende velstillede lemmer. Adskillige kun nogenlunde velophængt yver af kun ret tilfredsstillende kvalitet, passende store patter, men varierende pattestilling.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

•

Randers Dijk, s. 7488, f. 30. januar 1962
hos brdr. Koopman,Wervershoof, Noordholland, Holland.

Ejer: Randersegnens Kvægavlsforening.

Fader: Adema 201 v. d. Woudhoeve, n.r.s. 44516. Ff. Adema 21 v. d. Woudhoeve, n.r.s. 26781. Fm. Setske 24, n.r.s. 342596.

Moder: Tietje 39, n.r.s. 603933. Mf. Sneeker Diamant, n.r.s. 33792. Mm. Tietje 23, n.r.s. 273574.

Gns. af 19 døtre på Rosenfeldt:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4842	4,63	224	3,92	190

Mælkeydelsen blev kun knap middelhøj, men der var til gengæld særdeles gode fedtprocenter og meget høje proteinprocenter, hvorved såvel smørydelsen som ydelsen af mælkeprotein kom op på racens gennemsnit. Ydelsen faldt lidt for stærkt gennem det meste af prøveåret. Der var meget lille

spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein, medens der var ret normal variation i fedt- og proteinprocenterne. Kvierne var hurtige og lette at malke, og der opnåedes fremragende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne havde gennemgående en god ædelyst, og de var gode at arbejde med, men de var lidt nervøse over for fremmede mennesker. Kvierne udviklede sig godt på stationen, hvor de fik en stor tilvækst. To kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige inden hjemsendelsen, men 13 blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, middelstore til godt middelstore, overvejende brede og dybe, skære, ret velformede, pænt sortbrogede dyr med pæn muskulatur og nogle med udmærkede linier. Velformet hoved og hals, velstillet bov, enkelte kun jævnt dybe af midtstykke, overvejende fast ryg, lige, bredt, oftest velformet kryds, enkelte noget fremtrædende korsbenskam og halerod, gode lår, fyldig skank, noget varierende hasevinkel. På et par nær velophængt yver af varierende form, adskillige store patter og noget varierende pattestilling.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Thy Ponto, s. 7257, f. 25. januar 1961
hos H. J. Tranberg, Halling Nedergård, Randers.

Ejer: Thy Kvægavlsforening for SDM.

Fader: Emmas Diamant, s. 6970. Ff. Sneeker Diamant, n.r.s. 33792. Fm. Emma 26, n.r.s. 272855.

Moder: Nr. 102, e.s. 5483. Mf. Ponto, e.s. 6381. Mm. Nr. 79, e.s. 4868.

Gns. af 17 døtre på Kronborg:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5324	4,17	222	3,56	190

Flere af kvierne startede prøvetiden med særdeles gode dagsydelser, men det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen, og holdets placering forringedes noget i løbet af prøveåret. Mælkeydelsen blev god, men såvel fedt- som proteinprocenterne blev kun knap middelhøje. Der var normal variation i fedtprocenterne, medens spredningen var godt middelstor for de øvrige ydelsestal. Kvierne var meget gode at malke, men der var meget stor variation i malkbarhedstallet. Ædelysten var god, og kvierne var gennemgående gode og rolige at arbejde med. Flere af kvierne havde noget yverbetændelse ved kælvningen, og det blev nødvendigt at udsætte 3 kvier på grund af yverlidelse. Alle 17 kvier nåede at blive erklæret drægtige inden prøvens afslutning, og 7 af dem blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, middelstore og godt middelstore, brede, dybe, ret muskuløse, oftest mørksortbrogede dyr, noget varierende, men flertallet gode af

form og præg. Kønne af hoved og hals, velstillet bov, tiltalende midtstykke, enkelte noget ujævn, men i øvrigt velbåret ryg, lige, bredt, adskillige noget hoftet kryds, enkelte lidt fedt sædebensparti og en del fremtrædende halerod, gode lår, ret velformet skank, enkelte stærktbøjet has, ellers pæn benstilling. Pænt ophængt yver, men noget varierende yverform og pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Hjørring Simon, s. 7415, f. 2. marts 1962
hos D. Brandsma-de Jong, Lekkum, Friesland, Holland.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Blitsaerd Jakson, f.r.s. 52252. Ff. Sivert, s. 6658. Fm. Blitsaerd Japke, f.r.s. 321711.

Moder: Blitsaerd Setske 29, f.r.s. 222570. Mf. Leuwarder Nico, f.r.s. 34106. Mm. Setske 22, f.r.s. 175867.

Gns. af 20 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4904	4,26	209	3,70	182

Laktationskurven var meget flad for dette hold, men da ydelsen var lidt for lav i begyndelsen af prøveåret, opnåedes ikke et tilfredsstillende ydelsesresultat ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev kun knap middelhøj, og middelfedtprocenten nåede lige knap racens gennemsnit, medens proteinprocenterne fuldt ud var middelhøje. Der var en knap middelstor spredning i alle ydelsestallene. Kvierne var ret gode at malke, og der var ikke ret stor variation i malkbarhedstallet. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til ædelyst og temperament. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier gennemførte prøven. Drægtighedsresultaterne var gode, idet alle kvier var erklæret drægtige ved prøvens slutning, og de 11 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, middelstore, brede, dybe, triveligt prægede, men adskillige løstbyggede, pænt sortbrogede dyr. Kønt hoved, velformet hals, en del fremskudt bov, velformet midtstykke, en del vigende til lav, de øvrige pænt båret ryg, enkelte lidt hældende, ellers lige, bredt kryds, men overvejende kun jævnt gode af rammer og overfladeform, adskillige lave omdrejere og fremtrædende korsbenskam, enkelte høj halerod, fyldige lår og god skank, enkelte rette haser, ellers pæn benstilling. En del vidtstillede forpatter, ellers pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Varde Alfa, s. 7435, f. 9. december 1961
hos H. E. Weers, Bagband, Østfriesland, Vesttyskland.

Ejer: Vardeegnens Kvægavlsforening og Kvægavlsforeningen Vestjyden.

Fader: Darius, østfr. s. 83263. Ff. Daniel, østfr. s. 207874. Fm. Elsbeth, østfr. s. 410351.

Moder: Alpenrose, østfr. s. 436500. Mf. Matrose, østfr. s. 70600. Mm. Alfa, østfr. s. 387671.

Gns. af 18 døtre på Vardegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4703	4,40	207	3,71	174

Allerede tidligt i prøvetiden var det indlysende, at holdet havde for ringe gennemsnitlig dagsydelse til at nå et tilfredsstillende ydelsesresultat i prøvetiden. Udholdenheden i ydelsen var god, men laktationskurven lå på for lavt et ydelsesniveau. Det var mælkeydelsen, som svigtede, medens fedt- og proteinprocenterne var gode. Der var stor spredning i mælkeproteinet, medens der var ret normal variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne havde god ædelyst og var fantastisk rolige at arbejde med og gode at malke. En af kvierne nåede ikke at blive erklæret drægtig på stationen, men 10 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, overvejende middelstore, enkelte godt middelstore, gennemgående ret brede, meget dybe, fastbyggede, muskuløse, triveligt prægede, pænt sortbrogede dyr, oftest med noget usolide rammer. Typisk hoved og hals, velstillet bov, særdeles velrundet rib og rummeligt midtstykke, velbåret ryg, overvejende lige, en del lidt hældende og tagdannet kryds, fyldige lår, adskillige ret eller stærkt-bøjet has. En del noget lille eller fremskudt yver samt vidtstillede forpatter, i øvrigt velformede patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Randers Drost, s. 7278, f. 26. november 1960
hos Hans Nielsen, St. Tranget, Flauenskjold.

Ejer: Randersegnens Kvægavlsforening.

Fader: Drost, e.A 60. Ff. Sneeker Diamant, n.r.s. 33792. Fm. Laura 36, n.r.s. 257137.

Moder: Nr. 35, e.s. 5438. Mf. Theo, sv.s. 25603. Mm. Nr. 100, e.s. 5323.

Gns. af 20 døtre på Rosenfeldt:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4829	4,22	204	3,74	180

Enkelte af kvierne startede med særdeles gode dagsydelser, men da det kneb med udholdenheden i ydelsen, og da enkelte kvier tillige blev lavtydende, opnåedes kun en knap middelhøj mælkeydelse. Fedtprocenterne blev knap middelhøje, medens proteinprocenterne blev godt middelhøje. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til variationen i ydelsestallene. Malkbarheden var ikke tilfredsstillende, og holdet fik den dårligste placering af årets sortbrogede hold. Kvierne havde en god ædelyst og et roligt temperament, og da sundhedstilstanden tillige var god, gennemførte alle 20 kvier

prøven. Kvierne var meget trivelige, og de opnåede en god tilvækst på stationen. Drægtighedsresultaterne var gode, idet 19 af de 20 kvier blev erklæret drægtige på stationen, og 11 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,4 ins. pr. drægtighed.

Ikke udtalt ensartede, godt middelstore, enkelte betydelige, meget brede og dybe, overvejende muskuløse og med ret pæne linier, en del velformede og velprægede, overvejende pænt sortbrogede dyr. Almindelige af hoved og hals, et par noget fremskudt, ellers velstillet bov, meget rummeligt midtstykke, enkelte ujævn eller noget vigende, de øvrige fast ryg, et par noget hældende, ellers lige og bredt kryds med pæne rammer, adskillige fremtrædende korsbenskam og lidt kraftig halerod, fyldige lår, pæn benstilling, dog noget varierende hasevinkel. Malkeorganerne af noget varierende form, pænt yvervæv.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Hjørring Drost, s. 7502, f. 23. november 1961
hos Juul Larsen, Tandrupgård, Års.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Drost, e.A 60. Ff. Sneeker Diamant, n.r.s. 33792. Fm. Laura 36, n.r.s. 257137.

Moder: Nr. 132, e.s. 5424. Mf. Foch, e.s. 6197. Mm. Nr. 105 (sen. Nr. 93), f. 27. september 1954 hos Juul Larsen, Tandrupgård, Års.

Gns. af 17 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4489	4,30	193	3,83	172

Det var mælkeydelsen, som svigtede for dette hold, medens fedtprocenterne var middelhøje og proteinprocenterne høje. Proteinprocenterne var fantastisk ensartede, men der var også en lille spredning i de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var tilfredsstillende, men laktationskurven lå på et lavt niveau. Kvierne var hurtige og lette at malke, og de havde god ædelyst og et roligt temperament. Der forekom lidt yverbetændelse ved kælvningen, og der blev udsat en kvie af denne årsag, men sundhedstilstanden var ellers god, og de resterende 17 kvier gennemførte prøven. Kvierne havde en god tilvækst på stationen. To kvier blev ikke erklæret drægtige i prøvetiden, men 9 blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, middelstore til store, jævnt anselige til tunge, brede, adskillige meget dybe, overvejende muskuløse, nogenlunde velformede, ret velprægede, pænt sortbrogede dyr. Kønt hoved, velansat hals, adskillige noget fremskudt bov, meget rummeligt midtstykke, en del vigende ryg, lige, bredt kryds med noget varierende rammer, adskillige lidt højt sædebensparti eller noget fremtrædende korsbenskam og grov halerod, muskuløse af lår og skank, flere stærktbøjet has. Nogenlunde veludviklet og velformet yver med almindeligt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Sdj. Trin, s. 7407, f. 29. december 1961
hos Thorsten Ingvarsson, Katrinetorp, Malmø, Sverige.

Ejer: Sønderjydsk Kvægavlsforening for SDM.

Fader: Trinton, s. e.s. 29500. Ff. Annas Adema, f.r.s. 30587. Fm. Trijntje 32, f.r.s. 187663.

Moder: Nr. 225, Fokje, sv. e.s. 1024. Mf. Theo, sv. s. 25603. Mm. Nr. 145, Fokje, sv. e.s. 1042.

Gns. af 20 døtre på Brøstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4632	4,10	190	3,57	165

Kvierne startede prøvetiden med for lave dagsydelser, og da udholdenheden i ydelsen var ret almindelig, opnåedes for dårlige ydelsesresultater i prøvetiden. Mælkeydelsen nåede ikke et tilfredsstillende niveau, og fedtprocenterne var udpræget lave, medens proteinprocenterne blev knap middelhøje. Der var stor spredning i fedtprocenterne, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Malkbarhedsresultaterne var gode, men to kvier fik indsprøjtning for at fremme nedlægning af mælken. Enkelte af kvierne var lidt nervøse, men ædelysten var særdeles god, og der opnåedes en meget stor tilvækst i prøvetiden. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier gennemførte prøven. Flertallet af de fødte kalve var tyrekalve, men kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 35 kg. Selv om en kvie ikke nåede at blive erklæret drægtig på stationen, må drægtighedsresultaterne alligevel betegnes som fine, idet 14 blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,4 ins. pr. drægtighed.

Noget uensartede, knap middelstore til ret store, overvejende kun nogenlunde velformede og muskuløse, pænt sortbrogede dyr af lidt varierende bredde og dybde. Pænt hoved, velansat hals, enkelte noget fremskudt bov, adskillige velrundet rib, en del knap middeldybt og trindt midtstykke, flertallet ujævn og svagt vigende til blød ryg, lige, oftest ret bredt kryds med varierende, men flertallet noget usolide rammer, adskillige fremtrædende korsbenskam, en del korte lår, ret velstillede lemmer. Ret lille, pænt ophængt yver af varierende kvalitet, enkelte for lille afstand mellem for- og bagpatter.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Herning Drost, s. 7308, f. 26. januar 1961
hos Juul Larsen, Tandrupgård, Års.

Ejer: Hammerum Herreds Kvægavlsforening.

Fader: Drost, e.A 60. Ff. Sneeker Diamant, n.r.s. 33792. Fm. Laura 36, n.r.s. 257137.

Moder: Nr. 145, e.s. 5561. Mf. Ålborg Sten, s. 6424. Mm. Nr. 99 (sen. Nr. 31), e.s. 5038.

Gns. af 19 døtre på Moesgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4223	4,14	175	3,71	157

Da hovedparten af kvierne havde for ringe mælkeydelse og middelfedtprocenten lå noget under racens gennemsnit, blev den gennemsnitlige ydelse for ringe. Proteinprocenterne var derimod godt middelhøje. Fedt- og proteinprocenterne var ret ensartede, men der var heller ikke ret stor spredning i de øvrige ydelsestal. Der var kun jævnt god udholdenhed i ydelsen. Kvierne havde særdeles god ædelyst, og de var gennemgående rolige at arbejde med samt lette og hurtige at malke. Kvierne udviklede sig godt og havde en enestående stor tilvækst på stationen, idet de vejede 135 kg mere i gennemsnit ved hjemsendelse end ved ankomst. Nogle af kvierne fødte store kalve, hvis gennemsnitsvægt blev 41 kg. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Noget uensartede, middelstore til godt middelstore, brede, dybe, triveligt prægede, enkelte velformede, men adskillige løstbyggede, pænt sortbrogede dyr. Almindeligt hoved, pæn hals, adskillige fremskudt bov, flertallet rummeligt midtstykke, gennemgående blød eller ujævn ryg, lige, bredt kryds med varierende rammer og overfladeform, adskillige fremtrædende korsbenskam og halerod, velformede lår, en del lidt ret og klejn has og et par bløde bagkoder. Nogenlunde fyldigt, ret velophængt yver af ret ordinær kvalitet, enkelte noget lange eller grove patter og adskillige vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

3. JERSEYRACE

Bornholms Brygger, s. 3009, f. 4. januar 1960
hos Marinus Nørgaard, Bakkely, Ingstrup, Løkken.

Ejer: Østdansk Jerseytyrestation.

Fader: Brygger 36, s. 1858. Ff. Prins Garbo, e.s. 55. Fm. Nr. 36, Bryggergården, e.s. 1971.

Moder: Nr. 43, e.s. 8068. Mf. Hans, e.s. 100. Mm. Nr. 36, e.s. 5129.

Gns. af 16 døtre på Kannikegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4061	6,51	264	4,24	172

Det var den høje mælkeydelse, som frembragte den usædvanlig høje smørydelse, idet fedtprocenterne kun var middelhøje, og det var lige knap, at middelproteinprocenterne nåede racens gennemsnit. Der var normal variation i mælkeydelsen, knap middelstor spredning i fedtprocenterne og mælke-

proteinet og godt middelstor spredning i smørfedtydelsen og proteinprocenterne. Udholdenheden i ydelsen var ret normal. De brugsmæssige egenskaber var fremragende, idet kvierne havde særdeles god ædelyst, var rolige at arbejde med samt lette og hurtige at malke, men enkelte af kvierne fik dog hormonindsprøjtninger, da det kneb med nedlægningen af mælken ved malkningen. Flere af kvierne havde små overtallige patter. Alle 16 kvier var erklæret drægtige inden prøvens slutning, og 7 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

En samling middelstore, velprægede kvier, fra lysgule til gule, en enkelt mørkgul. Kønt velformet hoved, hals og bov, en enkelt dog en smule løs af bov, velbåret til ret velbåret ryg, passende dybe og velformede af midtstykke, middelbrede og velformede af kryds, dog et par enkelte med lidt fremtrædende korsbenskam, velformede lår, meget fine og velstillede lemmer, dog enkelte med noget rette haser. Særdeles velbårne og velformede yvere med fra knap middelstore til middelstore patter (enkelte med bipatter).

4 dyr tilkendt type Ia, 5 Iby og 7 type Ib.

Fyns Glen, s. 3224, f. 18. marts 1961
hos Hans Jensen, Hestehavegård, Gislev.

Ejer: Nordfyns Kvægavlsforening.

Fader: Glenmore Royal Guide, N.Z. H.B. 202348. Ff. Glenmore Royal Vagabond, H.B. 157911. Fm. Glenmore Lady Portia, H.B. 264338.

Moder: Nr. 148, e.s. 5432. Mf. Munk Hestehave, s. 1418. Mm. Nr. 124, e.s. 4737.

Gns. af 19 døtre på Enemærket:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3987	6,60	263	4,48	179

Laktationskurven fik en lidt mærkelig form for dette hold, idet den højeste ydelse indtraf i den midterste trediedel af prøvetiden, men udholdenheden i ydelsen må betegnes som særdeles god. Mælkeydelsen blev høj, fedtprocenterne fuldt ud middelhøje og proteinprocenterne særdeles gode. Der var normal variation i ydelsestallene for mælk og mælkeprotein samt i proteinprocenterne, medens spredningen var knap middelstor for smørfedtet og meget stor for fedtprocenterne. Kvierne havde særdeles god ædelyst og et forholdsvis roligt temperament, og de var lette og hurtige at malke, hvorfor holdet fik en fin placering ved malkbarhedsundersøgelsen. Der var meget stor ensartethed i malkbarhedstallet. Ingen af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 20 kg. 18 af holdets 19 kvier blev erklæret drægtige på stationen, og heraf blev de 13 drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Middelstore til godt middelstore, lyse til brungule, ædle, særdeles tiltalende og ensartede køer. Velformede af hoved og hals, god bov, dybt, men velformet midtstykke og god overlinie, velformet kryds, enkelte dog med lidt ujævnt korsbensparti, fine, velstillede lemmer, velformede, særdeles gode yvere med middelstore patter, der gennemgående er velplacerede, men hos flere noget vidtstillede og en enkelt med bipatter.

5 dyr tilkendt type Ia, 1 Iby, 6 Ib, 2 IIa, 2 IIby, 2 IIb og 1 type III.

Årup Vestfyns Flink, s. 3390, f. 6. januar 1962
hos Niels og Georg Nielsen, Seden Ågård, Seden.

Ejer: Årup Vestfyns Kvægavlsforening.

Fader: Fyns Lynggård, s. 2261. Ff. Kattrup Ægir, e.s. 85. Fm. Nr. 10, Lynggården, e.s. 3916.

Moder: Nr. 65, e.s. 6702. Mf. Millinge Munk, e.s. 87. Mm. Nr. 58, e.s. 5620.

Gns. af 21 døtre på Ejstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3838	6,77	260	4,26	164

Takket være en god udholdenhed i ydelsen fik holdet en fin placering ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev særdeles god og fedtprocenterne høje, medens proteinprocenterne kun blev knap middelhøje. Der var en knap middelstor spredning i alle ydelsestallene. Der opnåedes ret gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne havde et roligt temperament, og de havde god ædelyst, men det kneb i perioder lidt med at holde fordøjelsen i orden. Sundhedstilstanden var god, og kvierne udviklede sig godt på stationen, og det blev et meget ensartet hold såvel i udseende som på flere andre områder. Kalvenes gennemsnitsvægt blev 23 kg. Alle 21 kvier blev erklæret drægtige under prøven, og de 13 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,6 ins. pr. drægtighed.

Nær middelstore, særdeles fint prægede og tiltalende, meget ensartet hold, gule til gulbrune kvier. Fintprægede af hoved og hals, ret god bov, meget velformet midtstykke, ret velbåret, noget ujævn overlinie, gennemgående velformet kryds, men en del med noget fremtrædende korsbenskam, særdeles fine og velstillede lemmer, veludviklet og gennemgående ret regelmæssigt, men noget kløftet yver med vidtstillede forpatter, middelstore patter.

3 dyr tilkendt type Ia, 3 Iby og 15 Ib.

Årup Vestfyns Boy, s. 3391, f. 28. juli 1962
hos Hans og Karl Hansen, Kærbyholm, Nr. Åby.

Ejer: Årup Vestfyns Kvægavlsforening.

Fader: Coralads Dream Boy, U.S.A. s. 560800. Ff. Zinnia's Corald, U.S.A. s. 540908. Fm. Lad's Eagle Jenny, U.S.A. s. 1811928.

Moder: Nr. 89, e.s. 5079. Mf. Prins Garbo, e.s. 55. Mm. Nr. 77, e.s. 4530.

Gns. af 19 døtre på Ejstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3802	6,67	254	4,38	166

Mælkeydelsen blev god, og der var gode fedtprocenter og godt middelhøje proteinprocenter. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til udholdenheden i ydelsen. Der var en del variation i fedtprocenterne, medens der var middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. De brugsmæssige egenskaber var fremragende, idet kvierne var rolige og gode at arbejde med, og de havde en forbavsende god ædelyst og var gode at malke. Der var noget robust over dette hold, som havde en særdeles god sundhedstilstand, hvilket bevirkede, at alle 19 kvier gennemførte prøven, og de opnåede en stor tilvækst på stationen. Kalvene vejede 23 kg i gennemsnit. En af kvierne blev brummer, men de resterende nåede at blive erklæret drægtige på stationen, og heraf blev de 10 drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Ret store og kraftige, ellers tiltalende og meget ensartet hold gule køer. Velformet hoved og hals, gennemgående god bov, dybt og meget rummeligt midtstykke, ret velbåret, noget ujævn overlinie, bredt og kraftigt kryds, stærke, velstillede lemmer, stort, dybt og langt yver, middelstore, velstillede patter.

2 dyr tilkendt type Ia, 2 Iby, 7 Ib, 1 IIa, 2 IIby, 4 IIb og 1 III.

Fyns Ib, s. 3242, f. 1. marts 1962
hos Johs. Pedersen, Bremerskov, Langeskov.

Ejer: Nordfyns Kvægavlsforening.

Fader: Sydfyns Ifa, e.s. 118. Ff. Jesper Jason, e.s. 114. Fm. Nr. 40, Højbogård, e.s. 1289.

Moder: Nr. 26, e.s. 6522. Mf. Millinge Munk, e.s. 87. Mm. Nr. 5, Viby, e.s. 1720.

Gns. af 20 døtre på Grønhøjgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3787	6,46	245	4,38	166

Den gennemsnitlige mælkeydelse blev særdeles god, medens middelfedtprocenten lige knap nåede racens gennemsnit. Proteinprocenterne var til gengæld fuldt ud middelhøje, og der opnåedes derfor en god ydelse af mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var god, og holdet forbedrede sin placering noget fra 50 dages opgørelsen til opgørelsen ved prøvens slutning.

Der var normal variation i fedt- og proteinprocenterne, hvorimod spredningen kun var knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Det var rolige og gode kvier at arbejde med, og de var gode at malke, men det kneb i perioder lidt med ædelysten, og det var især tilfældet for de mindste af kvierne. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier gennemførte prøven og opnåede en god tilvækst. Alle kvier nåede at blive erklæret drægtige på stationen, og 10 af dem blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, ret ensartede og ret velbyggede brungule kvier af god type. Velformet hoved og hals, god bov og velformet midtstykke, velbåret overlinie, dog enkelte med vigende ryg, velformet kryds med lidt højt korsben og halerod, ret velstillede lemmer, en del med lidt stærkt bøjede haser, ret velbårne, men lidt uelastiske yvere med middelstore, ret velansatte patter.

2 dyr tilkendt type Ia, 3 Iby, 13 Ib, 1 IIb og 1 III.

Hjørring Georg, s. 3012, f. 27. april 1961
hos Niels og Georg Nielsen, Seden Ågård, Seden.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.
Fader: B.W.B., e.s. 125. Ff. Wilmann, e.s. 83. Fm. Nr. 3, Stina, e.s. 4328.
Moder: Nr. 61, e.s. 6346. Mf. Max, e.s. 75. Mm. Nr. 35, e.s. 4036.
Gns. af 19 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3574	6,84	245	4,47	160

Det var den usædvanlige gode udholdenhed i ydelsen, som sikrede holdet den gode placering ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev kun middelhøj, men det var de høje fedtprocenter, som medvirkede til den høje smørydelse. Proteinprocenterne var også høje, og der opnåedes en god ydelse af mælkeprotein. Der var knap middelstor spredning i alle ydelsestallene. De brugsmæssige egenskaber var fremragende, idet kvierne havde god ædelyst og var usædvanlig rolige at arbejde med, og de var lette og hurtige at malke, hvorfor der opnåedes særdeles smukke resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Sundhedstilstanden var god, og alle 19 kvier gennemførte prøven. Enkelte af kvierne fødte ret store kalve, og i gennemsnit vejede de 24 kg. Kun en af kvierne var ikke erklæret drægtig ved prøvens afslutning, men 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, ensartede og særdeles tiltalende hold lysegule køer. Velformet hoved, store horn, god bov, dybt, velformet midtstykke, god overlinie, enkelte vigende, middelbredt kryds, en del med fremtrædende korsbenskam, fine, særdeles velstillede lemmer, middelstort, meget velformet og velbåret yver, middelstore og velstillede patter.

6 dyr tilkendt type Ia, 4 Iby, 6 Ib, 1 IIby og 2 type IIb.

Lund, s. 3382, f. 23. april 1962
hos Hjalmar Lund, Lundsbo, Lamdrup.

Ejer: Odder-Skanderborgegnens Jersey-Kvægavlsforening.

Fader: Fyns Lynggård, s. 2261. Ff. Kattrup Ægir, e.s. 85. Fm. Nr. 10, Lynggården, e.s. 3916.

Moder: Nr. 5, e.s. 7599. Mf. Millinge Munk, e.s. 87. Mm. Nr. 50, e.s. 6693.

Gns. af 18 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3726	6,50	242	4,23	158

Mælkeydelsen var god, og middelprocenten for fedt og protein nåede omtrent racens gennemsnit, og der opnåedes gode ydelsesresultater for smør og mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var særdeles god gennem hele prøveåret. Der var normal variation i fedt- og proteinprocenterne, men der var meget lille spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein, og spredningen for disse ydelsestal blev mindre end for årets øvrige Jerseyhold. Malkbarhedsmæssigt set var det et godt hold, idet de allerede fra kælvningen var gode at malke, og der opnåedes gode malkbarhedsresultater. Det var et roligt og ret robust hold med ret god ædelyst og en god sundhedstilstand. Kvierne udviklede sig godt på stationen og opnåede en god tilvækst. Drægtighedsresultaterne var gode, idet alle 18 kvier blev erklæret drægtige på stationen, og de 12 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed.

Middelstore og ret tiltalende, ensartede, rødgule kvier. Velformet hoved og hals, god bov, særdeles dybe og rummelige af midtstykke, velbåret overlinie, enkelte med ujævn og vigende overlinie, middelbredt, lidt hoftet kryds, enkelte med høj halerod, gode lår, fine, ret velstillede lemmer, flere med lidt bløde koder, velformede og ret velbårne yvere med middelstore patter, en del med lidt vidtstillede forpatter.

3 dyr tilkendt type Ia, 1 Iby, 12 Ib, 1 IIa og 1 type III.

Horsens Bak, s. 3180, f. 4. december 1961
hos Marinus Nørgaard, Bakkely, Ingstrup, Løkken.

Ejer: Horsensegnens Kvægavlsforening.

Fader: Hjørring Bob, s. 2296. Ff. Hans, e.s. 100. Fm. Nr. 30, Stavad, e.s. 1810.

Moder: Nr. 36, e.s. 5129. Mf. Marchall, s. 1181. Mm. Nr. 31, e.s. 4097.

Gns. af 17 døtre på Østerhåb:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3723	6,51	242	4,28	159

Der var meget stor variation i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein samt i fedtprocenterne, medens spredningen var middelstor for proteinprocentens vedkommende. Mælkeydelsen blev god, medens fedt- og proteinprocenterne grupperede sig omkring racens gennemsnit. Det kneb med udholdenheden i ydelsen, og holdets placering forringedes en del fra de første korttidsopgørelser til den endelige opgørelse ved prøveårets slutning. Kvierne var lidt nervøse ved malkningen i den første tid efter kælvningen, men de blev senere rolige at arbejde med, og der opnåedes gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Der var jævnt god ædelyst, og kvierne opnåede en god tilvækst på stationen. Selv om sundhedstilstanden som helhed var god, måtte der udsættes 3 kvier under prøven. Alle 17 kvier blev erklæret drægtige, og 12 af dem blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,4 ins. pr. drægtighed.

Middelstore til godt middelstore, gulbrune, gennemgående tiltalende kvier. Velformet hoved og hals, god bov og velformet midtstykke, gennemgående velbåret overlinie, enkelte med vigende ryg, middelbredt kryds med noget fremtrædende korsben og halerod på en del, middelsvære, velstillede lemmer, gennemgående velformet og velbåret yver, men enkelte med stort og lidt løst ophængt yver, middelstore patter.

2 dyr tilkendt type Ia, 2 Iby, 8 Ib, 4 IIb og 1 type III.

Primus Syd, s. 3204, f. 10. august 1961
hos Frede Burup, Oldrup, Hundslund.

Ejer: Sydjysk Jersey-Kvægavlsforening.

Fader: Primus, s. 2841. Ff. Prins Nørremark, e.s. 120. Fm. Nr. 21, e.s. 6176.

Moder: Nr. 50, e.s. 6882. Mf. Kattrup Ægir, e.s. 85. Mm. Nr. 15, e.s. 2906.

Gns. af 16 døtre på Skølvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3751	6,30	236	4,14	155

Laktationskurven var usædvanlig flad, og den gode udholdenhed i ydelsen bevirkede, at der opnåedes gode ydelsesresultater ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev god, hvorimod det kneb lidt med såvel fedt- som proteinprocenterne. Der var kun middelstor spredning i fedt- og proteinprocenterne, medens der var en del variation i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Der opnåedes kun jævnt tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. En af kvierne blev håndmalket til midt i april måned, da den havde vorter på patterne. Der var ret god ædelyst, og kvierne havde et roligt temperament. Kun 16 kvier indgik på holdet, men alle gennemførte

prøven. Kvierne fødte ret store kalve, og kalvenes gennemsnitlige fødselsvægt blev 24 kg. Drægtighedsresultaterne blev ikke tilfredsstillende, idet der kun blev 3 kvier drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 3,5 ins. pr. drægtighed.

Nær middelstore til godt middelstore, noget uensartede, lysegule kvier, enkelte med aftegn. Velformet hoved og hals, god bov, passende dybt og velformet midtstykke, god overlinie, enkelte lidt vigende, middelbredt, en del med noget uregelmæssigt kryds, fine, velstillede lemmer, veludviklet yver, men knap helt regelmæssigt, middelstore, ret velstillede patter.

2 dyr tilkendt type Ia, 9 Ib, 2 IIby, 2 IIb og 1 type III.

Åbenrå Vix, s. 3089, f. 8. januar 1961
hos Niels og Georg Nielsen, Seden Ågård, Seden.

Ejer: Åbenrå- og Tønderegnens Kvægavlsforening.

Fader: Abildmads, e.s. 102. Ff. Abildknægt, e.s. 39. Fm. Nr. 24, Barkholt, e.s. 2070.

Moder: Nr. 67, e.s. 7243. Mf. Fyns Vix, e.s. 124. Mm. Nr. 56, e.s. 5618.

Gns. af 18 døtre på Moesgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3470	6,72	233	4,58	159

Proteinprocenterne var udpræget høje og fedtprocenterne særdeles gode, medens den gennemsnitlige mælkeydelse knap nåede gennemsnitsydelsen for årets Jerseyhold. Udholdenheden i ydelsen var særdeles god i vinterperioden, medens den kun var ret tilfredsstillende i den sidste trediedel af prøvetiden. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til variationen i ydelsestallene. Det tog for lang tid at malke flere af kvierne, og der opnåedes dårlige resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament. Sundhedstilstanden var god, og alle 18 kvier gennemførte prøven. Kvierne udviklede sig godt på stationen og opnåede en stor tilvækst. Ingen af kvierne fødte små kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev 25 kg. Det kneb med drægtighedsforholdene, idet 3 kvier ikke nåede at blive erklæret drægtige på stationen, men heraf var de to blevet brummere. En af de drægtige kvier kastede i april måned, men den nåede at blive drægtig igen. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, brungule, ret ensartede kvier. Velformet hoved og hals, god bov, gennemgående middeldybde, men flere meget dybe af midtstykke, en del med vigende overlinie, middelbredt kryds, en del med fremtrædende korsben og halerod, fine, velstillede lemmer, gennemgående veludviklet yver, men en del noget uregelmæssige, middelstore patter, enkelte med lidt lange forpatter og fremadrettede bagpatter.

1 dyr tilkendt type Ia, 2 Iby, 9 Ib, 1 IIby, 3 IIb og 2 type III.

Randers Knægt, s. 3056, f. 14. december 1960
hos Erik Bredholt, Edelslund, Løgten.

Ejer: Randersegnens Kvægavlsforening.

Fader: Plet Nørremark, e.s. 130. Ff. Lyngsie Nørremark, e.s. 112. Fm. Nr. 19, Nørremark, e.s. 2224.

Moder: Nr. 99, e.s. 7035. Mf. Edelslund Knægt, e.s. 95. Mm. Nr. 42, e.s. 4210.

Gns. af 20 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3557	6,44	229	4,38	156

Kvierne startede efter kælvningen med særdeles gode dagsydelser, men da det kneb med udholdenheden i ydelsen forringedes holdets placering betydeligt fra den første korttidsopgørelse til den endelige opgørelse ved prøvens afslutning. Mælkeydelsen blev middelhøj, fedtprocenterne knap middelhøje og proteinprocenterne fuldt ud middelhøje. Der var normal variation i fedt- og proteinprocenterne og godt middelstor spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Der opnåedes kun ret gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Med hensyn til ædelyst og temperament var det et lidt uensartet hold, og det kneb for enkelte af kvierne at tåle grovfoderet i den første del af prøvetiden. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier gennemførte prøven. Kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 20 kg, selv om 12 af kalvene var tyrekalve. To kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige på stationen, men 10 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, ensartede og velbyggede, lyse til gulbrune, tiltalende kvier. Fintprægede af hoved og hals, velstillet bov, dybt og rummeligt midtstykke, velbåret, hos en del lidt ujævn overlinie, middelbredt, velformet kryds med lidt høj korsbenskam og halerod, gode lår, enkelte med lidt lang skank, ellers fine og ret velstillede lemmer, ret velbårne og velformede yvere, middelstore, ret velstillede patter, enkelte dog med lidt lange forpatter.

4 dyr tilkendt type Ia, 2 Iby, 12 Ib og 2 type IIb.

Dybbøl Hans, s. 3376, f. 5. oktober 1961
hos Kaj Andersen, Hammelmose, Manna.

Ejer: Gråsten-Sønderborg Kvægavlsforening.

Fader: Hans, e.s. 100. Ff. Esbern, e.s. 44. Fm. Nr. 10, Rosa, e.s. 1724.

Moder: Nr. 36, e.s. 7931. Mf. Munkgård, e.s. 101. Mm. Nr. 30, e.s. 7032.

Gns. af 19 døtre på Veesbæk:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3683	6,19	228	4,19	154

Holdet fik en fin placering ved den første korttidsopgørelse, men dagsydelsen faldt lidt for stærkt gennem en stor del af prøvetiden, og derved forringedes holdets position ved den endelige opgørelse. Mælkeydelsen blev fuldt ud middelhøj, men flere af kvierne havde for lave fedtprocenter, og proteinprocenterne blev kun knap middelhøje. Der var normal variation i fedt- og proteinprocenterne og godt middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Kvierne var hurtige og lette at malke, og de fik den fineste placering af Jerseyholdene ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var god, og kvierne havde et roligt temperament og var gode at arbejde med. Kvierne udviklede sig godt på stationen og opnåede en stor tilvækst. Kalvene vejede 23 kg i gennemsnit. 3 kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige på stationen, men 9 blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,6 ins. pr. drægtighed.

Middelstore til godt middelstore, lysegule, en del med aftegn, typiske og tiltalende kvier. Velformet hoved og hals, rummeligt og velformet midtstykke, gennemgående god overlinie, enkelte lidt vigende, velformet kryds, dog enkelte med fremtrædende korsben og halerod, gode velstillede lemmer, gennemgående veludviklet og velformet yver med middelstore, velstillede patter, enkelte med lidt tætstillede bagpatter.

3 dyr tilkendt type Ia, 1 Iby, 9 Ib, 3 IIa og 3 type IIb.

Morsø Bæk, s. 3389, f. 21. december 1961
hos Lars P. Pedersen, Lambæksgård, Middelfart.

Ejer: Morsø Kvægavlsforening.

Fader: B.W.B., e.s. 125. Ff. Wilmann, e.s. 83. Fm. Nr. 3, Stina, e.s. 4328.

Moder: Nr. 28, e.s. 7254. Mf. Kattrup Ægir, e.s. 85. Mm. Nr. 97, e.s. 3349.

Gns. af 20 døtre på Morsø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3311	6,73	223	4,28	142

Det kneb lidt med mælkeydelsen for dette hold, medens fedtprocenterne var særdeles gode og proteinprocenterne nærmest middelhøje. Udholdenheden i ydelsen var god. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, medens der var godt middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Kvierne var meget gode at malke, men det kneb i en periode med nedlægning af mælken hos 4 af kvierne, og der var fortsat lidt problemer med nr. 62 gennem hele prøvetiden. Ædelysten var god, og kvierne rolige og lette at arbejde med. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier gennemførte prøven. Kvierne opnåede en god tilvækst på stationen. Ingen af kvierne fødte små kalve, og kalvenes gennemsnitlige fødselsvægt kom på 26 kg. 3 kvier

nåede ikke at blive erklæret drægtige på stationen, men af de resterende blev 11 drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed.

Middelstore til godt middelstore, brungule, tiltalende kvier. Velformede af hoved og hals, god bov, middeldybt, velformet midtstykke, ret velbåret overlinie, hos en del noget ujævn, middelbredt kryds, noget fremtrædende korsben og halerodsparti, middelsvære, velstillede lemmer, stort, veludviklet yver, hos en del lidt uregelmæssigt, middelstore, velstillede patter, hos en del noget vidtstillede.

3 dyr tilkendt type Ia, 1 Iby, 10 Ib, 1 IIa, 1 IIby og 4 type IIb.

Århus Max, s. 3381, f. 20. maj 1962
hos Niels og Georg Nielsen, Seden Ågård, Seden.

Ejer: Århusegnens Kvægavlsforening.

Fader: B.W.B., e.s. 125. Ff. Wilmann, e.s. 83. Fm. Nr. 3, Stina, e.s. 4328.

Moder: Nr. 61, e.s. 6346. Mf. Max, e.s. 75. Mm. Nr. 35, e.s. 4036.

Gns. af 20 døtre på Elkjær:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3228	6,68	216	4,46	144

Fedt- og proteinprocenterne blev særdeles gode, medens der ikke opnåedes tilfredsstillende resultater for mælkeydelsens vedkommende. Der var ikke nogen god udholdenhed i ydelsen. Fedtprocenterne var meget ensartede, medens der var ret normal variation i de øvrige ydelsestal. De brugsmæssige egenskaber var særdeles gode, idet kvierne var meget gode at malke, havde en god ædelyst samt et roligt temperament, og der var særdeles god sundhedstilstand. Kvierne udviklede sig godt på stationen og opnåede en god tilvækst. Kalvene vejede 23 kg i gennemsnit. 19 af de 20 kvier blev erklæret drægtige før prøvens afslutning, og 10 af dem blev drægtige efter 1. inseminering. Enkelte af kvierne blev forholdsvis sent drægtige, og der medgik 2,4 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, til godt middelstore, ensartede og ret tiltalende, lysgule kvier. Velformede af hoved og hals, god bov, middeldybt, velformet midtstykke, god overlinie, enkelte vigende og ujævn, middelbredt, velformet kryds, flere med lidt høj korsben, fine, gennemgående velstillede lemmer, en del med krogede haser, veludviklet og ret velformet yver, middelstore, velstillede patter, enkelte med lidt vidtstillede og lange patter.

3 dyr tilkendt type Ia, 3 Iby, 9 Ib, 2 IIa, 2 IIb og 1 type III.

Sydvestfyns Car, s. 3396, f. 20. november 1961
hos Niels og Georg Nielsen, Seden Ågård, Seden.

Ejer: Sydvestfyns Kvægavlsforening.

Fader: Fyns Lynggård, s. 2261. Ff. Kattrup Ægir, e.s. 85. Fm. Nr. 10, Lynggården, e.s. 3916.

Moder: Nr. 70, e.s. 7244. Mf. Fyns Vix, e.s. 124. Mm. Nr. 47, e.s. 5271.
Gns. af 19 døtre på Ejstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3064	6,80	209	4,30	132

På et meget tidligt tidspunkt af prøvetiden var det ret indlysende, at holdet ikke kunne opnå et tilfredsstillende ydelsesresultat, selv om udholdenheden i ydelsen blev god. Der opnåedes forøvrigt en særdeles god laktationskurve. Det var mælkeydelsen, som svigtede, medens fedtprocenterne var meget høje, og proteinprocenterne middelhøje. Spredningen blev godt middelstor for smørfedtydelsen, medens der var ret normal variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne var gode og rolige at arbejde med, idet de var lette at malke og i besiddelse af god ædelyst. Kvierne udviklede sig godt i prøvetiden, og de opnåede en stor tilvækst på stationen. Kalvene vejede 23 kg i gennemsnit. To af kvierne nåede ikke at blive erklæret drægtige på stationen, men 10 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed.

Middelstore til godt middelstore, lysgule til brungule kvier, enkelte med aftegn. Velformet hoved og hals, god bov, middeldybt, velformet midtstykke, noget vigende overlinie, middelbredt, hos en del noget opsvajet kryds med høj korsbenskam, ret fine og velstillede lemmer, gennemgående veludviklet, men knap regelmæssigt yver, middelstore, ret velstillede patter.

5 dyr tilkendt type Iby, 9 Ib og 5 type IIb.

Randers Just, s. 3371, f. 5. april 1962
hos Erik Justesen, Skjerne, V. Mellerup, Jerslev Jylland.

Ejer: Randersegnens Kvægavlsforening.

Fader: Brygger 36, s. 1858. Ff. Prins Garbo, e.s. 55. Fm. Nr. 36, e.s. 1971.

Moder: Nr. 30, e.s. 7395. Mf. Lasse 30, s. 1998. Mm. Nr. 20, Lisbeth, e.s. 6221.

Gns. af 19 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3244	6,18	201	4,23	137

Allerede ved den første korttidsopgørelse havde holdet en dårlig placering, og da det tillige kneb lidt med udholdenheden i ydelsen, opnåedes ikke tilfredsstillende resultater ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev kun knap middelhøj, og en del af kvierne havde lave fedtprocenter, medens proteinprocenterne blev knap middelhøje. Der var normal variation i fedt- og proteinprocenterne, hvorimod der kun var lille spredning i ydelsestallene for

mælk, smørfedt og mælkeprotein. Det kneb en del med nedlægning af mælken i begyndelsen af prøveåret, og det blev nødvendigt at udsætte en kvie på grund af hormonale forstyrrelser. Der opnåedes særdeles fine resultater ved malkbarhedsundersøgelsen, da kvierne var lette og hurtige at malke. Det var et lidt uensartet hold med hensyn til ædelyst og temperament. Der opnåedes særdeles god tilvækst på stationen. Kalvene vejede kun 20 kg i gennemsnit. Drægtighedsforholdene var fine, idet 18 af de 19 kvier blev erklæret drægtige på stationen, og 13 af dem blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,4 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, ret ensartede og af god type, lysbrungule, enkelte med aftegn. Fintprægede af hoved og hals, god bov, dybt og triveligt midtstykke, en del med velbåret overlinie, en del med vigende ryg, middelbredt, knap regelmæssigt kryds med fremtrædende korsben og halerod, gode lår, fine, ret velstillede lemmer, enkelte med lidt lang skank og lidt bøjede haser, flere med bløde koder, velbårne yvere med ret velstillede patter, flere med lidt lange forpatter og noget fremadrettede bagpatter.

2 dyr tilkendt type Ia, 15 Ib, 1 IIa og 1 type IIb.

III. Trivelighedsundersøgelser med tyrekalve.

Dette afsnit er udarbejdet i samarbejde med forsøgslederne *T. Wichmann Jørgensen* og *Jørgen Mandrup Jensen* fra Slagteriernes Forskningsinstitut.

I disse undersøgelser er afprøvet et hold kalve i sommeren 1966 og et andet i vinteren 1966–67 efter samme tyr. Undersøgelserne har især været koncentreret om tilvækst og foderudnyttelse samt slagte- og kødkvalitet.

Der er i det forløbne år afprøvet 5 hold, hvoraf de 4 er af Rød Dansk Malkerace og det femte af Sortbroget Dansk Malkerace. Efter reglerne skal kalvene være mindst 4, men ikke over 13 dage gamle ved ankomsten til stationen, og de skal have fået råmælk i de første dage, efter at de er født. Kalvene indgik i undersøgelsen den dag, de var 14 dage gamle.

A. Fodringen.

Kalvene fodredes efter samme plan på alle 3 stationer, og planen er anført i *tabel 15*.

Tabel 15. Foderplan for tyrekalve.

Table 15. Rations for bull calves

Alder dage / *Age days*	Sødm. kg / *Milk kg*	Sk.mælk kg / *Skim-milk kg*	Kraftf. kg / *Concen-trates kg*	Roer f.e. / *Beets f.u.*	Hø kg / *Hay kg*	I alt f.e. / *Total f.u.*	g fordøjeligt renprot. i alt / *g digest. true prot. total*	g fordøjeligt renprot. pr. f.e. / *g digest. true prot. per f.u.*
0– 4	råmælk	–	–	–	–	–	–	–
5– 10	4	–	–	–	–	–	–	–
11– 13	5	–	0,1	–	–	–	–	–
14– 20	5	–	0,1	–	–	–	–	–
21– 27	4	1	0,2	–	–	–	–	–
28– 34	3	2	0,2	0,1	0,3	1,7	205	121
35– 41	3	3	0,2	0,1	0,3	1,9	237	125
42– 48	2	4	0,3	0,2	0,3	2,0	258	129
49– 55	1	5	0,5	0,3	0,3	2,0	292	146
56– 69	–	6	0,6	0,3	0,3	2,0	308	154
70– 83	–	6	0,7	0,5	0,3	2,3	331	144
84– 97	–	6	0,9	0,7	0,3	2,8	370	132
98–125	–	6	1,0	0,9	0,3	3,1	392	126
126–153	–	6	1,2	1,1	0,3	3,5	430	123
154–181	–	6	1,5	1,5	0,3	4,2	491	117
182–209	–	6	1,8	1,8	0,3	4,8	548	114
210–237	–	6	2,0	2,0	0,3	5,2	586	113

Den anvendte kraftfoderblanding havde følgende sammensætning:

20% hørfrøkager
10% sojaskrå
10% hørfrø
30% valset byg
30% valset havre

Blandingen indeholdt 1,06 f.e. og 153 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

Fodringen gennemførtes efter planen, men da man ønskede at udnytte kalvenes vækstenergi, fik de kornblanding efter ædelyst ud over det kraftfoder, som var anført i planen. Den anvendte kornblanding bestod af 50 pct. valset byg og 50 pct. valset havre. Der anvendtes dog ikke mere end 0,8 kg valset blandsæd pr. kalv daglig, før de var 125 dage gamle, men efter dette alderstrin fik de valset blandsæd efter ædelyst. Foderrationen blev nedsat, hvis en kalv ikke kunne følge foderplanen. Foderet vejedes ud til hvert enkelt dyr daglig ved hver fodring. Høet vejedes dog ud til flere kalve ad gangen. Til sommerholdet anvendtes snitfoder som erstatning for roer.

Efter ankomsten til stationerne fik kalvene en vitaminindsprøjtning bestående af 500.000 int. enh. A- og 100.000 int. enh. D-vitamin pr. kalv. Indtil kalvene var 27 dage gamle, fik de et antibioticatilskud, og der anvendtes 100 g Aurofac pr. kalv daglig. Fra sødmælksfodringens ophør og til kalvene vejede 180 kg anvendtes 10 g levertran pr. kalv daglig. Den anvendte tran skulle indeholde 2000 int. enh. A- og 200 int. enh. D-vitamin pr. g. De store kalve fik 30 g dikalciumfosfat pr. kalv daglig, og dette tilskud blev givet på roefoderet.

B. Tilvækst og foderudnyttelse.

Kalvene vejedes om morgenen den dag, de var 14 dage gamle, hvorefter de indgik i prøven. Derefter vejedes kalvene hver 14. dag, samt umiddelbart inden de afgik til slagteriet. Efter at kalvene havde nået en vægt på 180 kg, vejedes de dog hver 7. dag.

Undersøgelsen omfattede perioden fra kalvene var 14 dage gamle og til den vejning, hvor de var nærmest ved en vægt på 200 kg, således at holdene fik en gennemsnitlig vægt på 200 kg. Foderforbruget udregnes i samme tidsrum, og foderudnyttelsen er udtrykt ved f.e. pr. kg tilvækst.

Holdenes gennemsnitlige resultater for tilvækst og foderudnyttelse findes anført i *tabel 16*.

Den gennemsnitlige daglige tilvækst blev 1019 g for de røde hold, og det sortbrogede hold efter Herning Esp kom på 1008 g. Holdet efter Sydfyns Allan havde en gennemsnitlig daglig tilvækst på 1053 g, medens de

3 øvrige røde og det sortbrogede hold alle havde en gennemsnitlig daglig tilvækst på godt 1000 g. Foderudnyttelsen var særdeles god, idet der kun medgik 2,99 f.e. pr. kg tilvækst i gennemsnit for de 4 røde hold. Inden for Rød Dansk Malkerace fremgik det meget tydeligt, at foderforbruget pr. kg

Tabel 16. Gennemsnitsresultaterne for tilvækst og foderudnyttelse.

Table 16. Average results of gain and feed conversion

Kalvenes fader *Sires of bull calves*	Antal kalve *No. of calves*	Alder ved slutningen dage *Final age days*	g dagl. tilvækst *Daily gain in g*	f. e. pr. kg tilvækst *f. u. per kg gain*	Afkomsprøvest. *Testing station*
RDM:					
Sydfyns Allan	15	158	1053	2,84	Enemærket
Max Sydvest	9	164	1017	2,98	Grønhøjgård
Nordfyns Aman	16	167	1004	3,02	Enemærket
Herning Munk	11	166	1002	3,13	Moesgård
Gns. (Average)		164	1019	2,99	
SDM:					
Herning Esp	11	168	1008	3,14	Moesgård

Tyrekalve efter Sydfyns Allan, s. 28178. Enemærket.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	Vægt i kg ved forsøgets slutning	Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
Sommerhold 1966.						
12	160	146	41	206	1130	2,57
16	154	140	51	207	1114	2,58
18	153	139	49	203	1108	2,58
11	147	133	50	193	1075	2,63
15	168	154	39	201	1052	2,91
17	160	146	49	202	1048	2,84
14	154	140	50	191	1007	2,86
13	166	152	47	200	1007	3,04
Gns.	158	144	47	200	1068	2,75
Vinterhold 1966–67.						
23	154	140	47	205	1129	2,63
21	154	140	49	197	1057	2,80
25	154	140	48	194	1043	2,84
19	154	140	54	198	1029	2,88
26	164	150	52	205	1020	3,05
24	159	145	55	201	1007	3,04
22	170	156	48	201	981	3,25
Gns.	158	144	50	200	1038	2,93
Gns. af S og V	158	144	48	200	1053	2,84

Tyrekalve efter Max Sydvest, s. 28792. Grønhøjgård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	Vægt i kg ved forsøgets slutning	Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
Sommerhold 1966.						
5	154	140	50	205	1107	2,57
1	163	149	55	211	1047	2,88
3	170	156	51	196	929	3,30
4	170	156	51	193	910	3,31
2	190	176	40	196	886	3,65
Gns.	169	155	49	200	976	3,14
Vinterhold 1966–67.						
10	142	128	51	202	1180	2,47
7	154	140	52	204	1086	2,64
9	168	154	46	198	987	3,07
8	168	154	42	193	981	3,10
Gns.	158	144	48	199	1058	2,82
Gns. af S og V	164	150	48	200	1017	2,98

Tyrekalve efter Nordfyns Aman, s. 28192. Enemærket.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	Vægt i kg ved forsøgets slutning	Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
Sommerhold 1966.						
3	154	140	48	194	1043	2,75
7	154	140	51	196	1036	2,77
5	164	150	54	208	1027	2,95
6	168	154	46	204	1026	3,01
8	154	140	53	195	1014	2,83
4	168	154	46	202	1013	3,04
1	168	154	45	200	1006	3,06
2	168	154	47	200	994	3,07
Gns.	162	148	49	200	1020	2,94
Vinterhold 1966–67.						
16	154	140	46	197	1079	2,69
12	175	161	39	202	1012	3,05
13	168	154	44	198	1000	3,00
11	168	154	43	195	987	3,04
10	178	164	45	205	976	3,21
9	178	164	47	205	963	3,30
14	181	167	42	200	946	3,24
15	177	163	48	200	933	3,31
Gns.	172	158	44	200	987	3,10
Gns. af S og V	167	153	46	200	1004	3,02

Tyrekalve efter Herning Munk, s. 28630. Moesgård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	Vægt i kg ved forsøgets slutning	Daglig tilvækst g	f.e. pr. kg tilvækst
Sommerhold 1966.						
5	168	154	48	200	987	3,09
2	154	140	55	193	986	2,91
4	179	165	45	204	964	3,31
3	178	164	49	204	945	3,38
6	182	168	42	198	929	3,48
1	175	161	55	203	919	3,43
Gns.	173	159	49	200	955	3,27
Vinterhold 1966–67.						
14	154	140	46	199	1093	2,80
12	154	140	43	196	1093	2,81
11	163	149	48	204	1047	3,06
13	161	147	46	196	1020	3,09
15	168	154	51	203	987	3,21
Gns.	160	146	47	200	1048	2,99
Gns. af S og V	166	152	48	200	1002	3,13

Tyrekalve efter Herning Esp, s. 7513. Moesgård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	Vægt i kg ved forsøgets slutning	Daglig tilvækst g	f.e. pr. kg tilvækst
Sommerhold 1966.						
25	161	147	45	196	1027	2,91
24	168	154	43	201	1026	2,91
23	168	154	41	193	987	3,04
21	176	162	54	206	938	3,38
22	184	170	45	202	924	3,48
Gns.	171	157	46	200	980	3,14
Vinterhold 1966–67.						
35	161	147	39	198	1082	2,90
34	161	147	41	200	1082	2,94
36	161	147	47	202	1054	3,06
33	168	154	42	199	1019	3,20
31	166	152	47	201	1013	3,21
32	175	161	47	203	969	3,46
Gns.	165	151	44	200	1036	3,13
Gns. af S og V	168	154	45	200	1008	3,14

tilvækst var stigende, når den daglige tilvækst faldt, men dette er forårsaget af den høje, negative korrelation mellem tilvækst og f.e. pr. kg tilvækst. For det sortbrogede hold medgik der 3,14 f.e. pr. kg tilvækst, og dette svarede fint til resultatet for det røde hold på samme station.

I *tabel 17* findes det gennemsnitlige foderforbrug pr. kalv for alle 5 hold. I gennemsnit medgik der 455 f.e. til de røde kalve. For det sortbrogede hold medgik der 487 f.e. pr. kalv, men dette tal svarede ret godt til det røde hold på samme station. Det er vigtigt, at kalvene er i besiddelse af stor vækstenergi, da en stor daglig tilvækst giver en god foderudnyttelse og medvirker til en forbedring af rentabiliteten ved fedningen.

Tabel 17. Holdenes gennemsnitlige foderforbrug.

Table 17. The groups average feed consumption

Kalvenes fader	f. e.					
	sød-mælk	skummet-mælk	kraftf.-bland.	bland-sæd	grov-foder	i alt
	f. u.					
Sires of bull calves	*milk*	*skim-milk*	*concen-trates*	*½ barley + ½ oats*	*rough-age*	*total*
RDM:						
Sydfyns Allan	42	104	114	68	102	430
Max Sydvest	42	112	126	58	112	450
Nordfyns Aman	42	114	129	69	110	464
Herning Munk	42	121	128	71	114	476
Gns. (Average)	42	113	124	66	110	455
SDM:						
Herning Esp	42	123	132	72	118	487

C. Kalvenes kropsmål.

Umiddelbart før slagtningen foretoges målinger af dyrenes kroppe, og efter afkøling af slagtekroppene foretoges enkelte målinger af slagtekroppene. De vigtigste gennemsnitsresultater fra disse målinger findes anført i *tabel 18*.

Den gennemsnitlige vægt for kalvene af Rød Dansk Malkerace blev 199,5 kg, medens gennemsnitsvægten for det sortbrogede hold blev 204,0 kg. De røde kalve vejede 3,0 kg mindre i gennemsnit end i 1965–66, og dette var vel medvirkende til, at næsten alle gennemsnitsmålene på de levende kalve blev lidt mindre end de anførte tal i den XXI. beretning om afkomsprøver med tyre. Brystdybden var dog uforandret og brystomfanget lidt

Tabel 18. Kalvenes kropsmål i cm.

Table 18. Body measurements of calves in cm

Kalvenes fader *Sires of bull calves*	Lev. vægt før slagtn. *Liveweight before slaught.*	Levende *Alive* Skulderhøjde *Height at withers*	Bryst-omf. *Heart girth*	Brystdybde *Depth of chest*	Omdrejerbredde *Width at thurls*	Kryds-længde *Length of pelvis*	Slagtet *Slaughtered* Bryst-omf. *Heart girth*	Krop-længde *Body length*	Brystdybde *Depth of chest*	Låromkreds 35 % *Circumference of rounds 35%*	Låromkreds 50 % *50%*
RDM:											
Sydfyns Allan	198,1	102,2	130,1	49,5	36,5	38,8	128,2	96,3	45,0	67,3	50,4
Max Sydvest	201,1	99,6	130,3	47,1	34,9	37,4	125,6	96,1	43,2	65,3	49,2
Nordfyns Aman ..	196,9	103,2	130,5	49,2	36,0	38,3	127,6	96,1	45,6	65,9	49,0
Herning Munk	201,9	102,6	129,7	49,1	36,1	37,9	128,0	97,2	45,5	67,5	49,6
Gns. (Average)	199,5	101,9	130,2	48,7	35,9	38,1	127,4	96,4	44,8	66,5	49,6
SDM:											
Herning Esp	204,0	100,9	129,4	48,5	37,6	37,6	128,0	92,6	42,6	70,3	51,8

større end i 1965–66, men de øvrige gennemsnitsmål på de levende kalve var mindre i det forløbne prøveår end i 1965–66.

Der foretoges nogle mål på slagtekroppene. Kroplængden måles fra skambenets forreste kant til den bageste rand midt på forreste ribben. Brystdybden måles fra underste og bageste kant af brystbenet til øverste bruskkant af 7. torntap. Lårlængden måles fra skambenets forreste kant til yderste rand på bagskanken. Dette mål anføres ikke, men det benyttes til bestemmelse af stederne for måling af låromkredsene. Der tages to mål for låromkredsen, som måles vinkelret på lårlængden i henholdsvis 35 og 50 pct. af denne, idet man benytter skambenets forreste kant som udgangspunkt for lårlængden. Desuden måles brystomfanget.

Gennemsnitsresultaterne for de foretagne mål på slagtekroppen viste god overensstemmelse med resultaterne i 1965–66 for Rød Dansk Malkerace, men der var dog en større brystdybde end i 1965–66. De sortbrogede kalve havde et mindre mål for kroplængde, end der normalt findes på sortbrogede kalve i vedkommende vægtklasse. De øvrige mål på slagtekroppen for de sortbrogede kalve var ret normale.

D. Slagtekvalitetsundersøgelser.

Der er foretaget en skønsmæssig bedømmelse af slagtekroppene, og på grundlag af kødfylden i for- og bagfjerding samt talgens farve og fordeling er foretaget en udregning af det samlede antal points for slagtekroppen. Den højre halvdel af slagtekroppen parteredes efter handelsværdi, hvorefter den blev afpillet i kød, talg og knogler.

1. Slagtebedømmelsen.

Resultaterne fra slagtebedømmelsen findes i *tabel 19*. Slagtekroppen af hver kalv er bedømt, og der er givet points for kødfylden af henholdsvis for- og bagpart samt for talgfordeling og talgfarve. Der er benyttet samme pointsskala som i de foregående år. Skalaen går fra 0 til 10, hvor 0 er slet, og 10 er meget fin.

Den sidste kolonne i *tabel 19* er i alt points, der udregnes ved at multiplicere points for kødfylde i forfjerdingen med 3, points for kødfylde i bagfjerdingen med 5, medens der benyttes faktoren 1 for såvel points for talgfordeling som talgfarve. Der er udregnet simpelt gennemsnit af points fra holdene i sommer- og vinterperioden.

Gennemsnitsresultaterne for Rød Dansk Malkerace svarede fint til de opnåede resultater i 1965–66, og der var ingen af holdene, som opnåede

særdeles høje points. Holdet efter Nordfyns Aman fik som helhed lidt lave points. Det sortbrogede hold efter Herning Esp opnåede et særdeles fint resultat ved bedømmelsen.

Tabel 19. Bedømmelse af slagtekroppen.

Table 19. Average scores of carcass evaluation

Kalvenes fader	Points for: kødfylde af forfjerd.	kødfylde af bagfjerd.	talg-fordeling	talg-farve	Total points
	Scores for meatiness of				
Sires of bull calves	*fore quarter*	*hind quarter*	*fat distribution*	*fat colour*	*Total points*
RDM:					
Sydfyns Allan	6,2	6,3	6,9	6,6	63,6
Max Sydvest	6,5	6,5	7,0	7,2	65,6
Nordfyns Aman	6,2	6,0	7,1	6,3	61,5
Herning Munk	6,2	6,4	7,5	6,8	64,7
Gns. (Average)	6,3	6,3	7,1	6,7	63,9
SDM:					
Herning Esp	7,9	8,2	7,6	6,5	78,6

2. Opskæring efter handelsværdi.

Efter afkøling af slagtekroppen parteredes den højre halvdel i 17 forskellige stykker: 1) bagskank, 2) lårben, 3) muskel, 4) klump, 5) inderlår,

Tabel 20. Opskæring efter handelsværdi.

Table 20. Primal cuts per cent

Kalvenes fader	Procent: pistol-udskæring	bov, hals og tykkam	bryst, slag og forskank
	Per cent		
Sires of bull calves	*»pistol cut«*	*neck + shoulder*	*breast + flank*
RDM:			
Sydfyns Allan	48,1	28,4	23,5
Max Sydvest	49,2	27,3	23,5
Nordfyns Aman	48,0	28,4	23,6
Herning Munk	48,2	27,7	24,1
Gns. (Average)	48,4	27,9	23,7
SDM:			
Herning Esp	48,8	27,9	23,3

6) yderlår, 7) lårtunge, 8) halestykke, 9) tyk- og tyndsteg, 10) højreb, 11) tykkam, 12) mellemskært, 13) kværk, 14) bov, 15) slag, 16) bryst og 17) forskank samt nyrer og nyretalg.

De forskellige udskæringer deles i 3 grupper efter handelsværdi. Således samles slag, bryst og forskank til én udskæring, bov, kværk, mellemskært og tykkam til en anden, medens resten udgør pistoludskæringen, som er den mest værdifulde.

Resultaterne fra opskæringen efter handelsværdi findes anført i *tabel 20*. I gennemsnit af de røde hold udgjorde pistoludskæringen 48,4 pct., og det var nøjagtigt det samme gennemsnitsresultat, som opnåedes i 1965–66. For holdet efter Max Sydvest opnåedes en særdeles god pistolprocent. Det sortbrogede hold efter Herning Esp havde en pistolprocent på 48,8, hvilket er lidt mindre, end der almindeligvis findes for et sortbroget hold.

3. Slagteprocent samt procent kød, talg og knogler i slagtekroppen.

I *tabel 21* findes holdenes gennemsnitstal for slagteprocenten, og der er endvidere anført gennemsnitsresultaterne fra afpilningen af den højre halvdel af slagtekroppen i kød, talg og knogler. Procenten af kød, talg og knogler giver ikke 100, idet nyrer og nyretalg hører med til den halve slagtekrop, men hverken nyrer eller nyretalg indgår i afpilningsresultaterne.

Den gennemsnitlige slagteprocent blev kun 53,7 for Rød Dansk Malkerace, men den var også udpræget lav for holdet efter Max Sydvest, og den var kun knap middelhøj for holdene efter Nordfyns Aman og Herning Munk. Slagteprocenten var derimod særdeles god for holdet efter Sydfyns Allan.

Tabel 21. Procent kød, talg og knogler i slagtekroppen.

Table 21. Per cent lean, fat and bone in carcass

Kalvenes fader	Slagtet vægt, kg	Slagte %	Opskæring i % af slagtet vægt		
			kød	talg	knogler
			Cutting in % of slaughtered weight		
Sires of bull calves	*Slaughter weight, kg*	*Dressing %*	*lean*	*fat*	*bone*
RDM:					
Sydfyns Allan	109,8	55,4	70,6	7,2	20,2
Max Sydvest	105,0	52,2	70,3	6,9	20,6
Nordfyns Aman	105,8	53,8	69,6	7,0	21,2
Herning Munk	108,0	53,5	69,3	7,8	20,9
Gns. (Average)	107,2	53,7	70,0	7,2	20,7
SDM:					
Herning Esp	110,6	54,2	70,9	6,7	20,4

Slagteprocenten blev kun knap middelhøj for det sortbrogede hold efter Herning Esp.

For Rød Dansk Malkerace blev den gennemsnitlige kødprocent 70,0, hvilket er særdeles fint. Den højeste kødprocent forekom på holdet efter Sydfyns Allan. Kødprocenten var særdeles høj for det sortbrogede hold efter Herning Esp. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til talgprocenten, idet der i reglen findes lidt højere talgprocent for røde end for sortbrogede kalve. Knogleprocenten var lidt lavere end i de foregående år, og den var nede på 20,2 for det røde hold efter Sydfyns Allan.

E. Kødkvalitetsundersøgelser.

Gennemsnitsresultaterne fra kødkvalitetsundersøgelserne findes anført i *tabel 22,* og der er medtaget farvetal, konsistens og tørstofprocent. Alle bestemmelser er foretaget på et stykke af den lange rygmuskel (m. long. dorsi). Den udtagne prøve omfatter stykket mellem 11. brysthvirvel og 2. lændehvirvel.

Kødfarven angives ved farvetallet, som stiger, når kødet bliver lysere, og høje tal er derfor ensbetydende med lyst kød, medens tallene bliver lave, når kødet er mørkt. Konsistensen er udtryk for kødets sejhed, og tallet for denne egenskab er stigende ved tiltagende sejhed. Den sidste kolonne angiver tørstofprocenten i kødet fra det udtagne stykke.

Kalvene på de røde hold opnåede omtrent samme gennemsnitlige farvetal. I de tidligere år har der ofte været en del variation i denne egenskab. Normalt har de sortbrogede hold lidt lavere farvetal end de røde, men farvetallet for holdet efter Herning Esp blev af omtrent samme størrelse, som der opnåedes for de røde hold.

Tabel 22. Sammensætning og egenskaber af højreb.

Table 22. Composition and properties of m. long. dorsi

Kalvenes fader *Sires of bull calves*	Farvetal *Colour index*	Konsistens *Toughness*	% tørstof *% dry matter*
RDM:			
Sydfyns Allan	16,3	15,9	23,8
Max Sydvest	16,2	27,5	23,7
Nordfyns Aman	16,1	19,0	23,5
Herning Munk	16,2	17,1	23,8
Gns. (Average)	16,2	19,9	23,7
SDM:			
Herning Esp	16,0	22,6	23,7

Tabel 23. Hovedresultater fra trivelighedsundersøgelsen.

		Gennemsnit, indeks og spredning											
	Daglig tilvækst	Slagteprocent			Kødprocent			Procent pistolkød			Kødets konsistens		
Kalvenes fader	g	gns.	indeks	s	gns.	indeks	s	gns.	indeks	s	gns.	indeks	s
RDM:													
Sydfyns Allan	1053	*55,4*	*103,2*	2,42	70,6	100,9	1,99	34,6	100,9	2,27	*15,9*	*79,9*	24,37
Max Sydvest	1017	52,2	97,2	2,25	70,3	100,4	1,43	34,9	101,7	3,32	27,5	138,2	34,92
Nordfyns Aman	1004	53,8	100,2	2,61	69,6	99,4	1,23	33,9	98,8	2,51	19,0	95,5	20,55
Herning Munk	1002	53,5	99,6	1,51	69,3	99,0	0,99	33,7	98,3	1,81	17,1	85,9	29,20
Gns.	1019	53,7	100,0		70,0	100,0		34,3	100,0		19,9	100,0	
SDM:													
Herning Esp . .	1008	54,2	100,0	2,14	70,9	100,0	1,71	35,0	100,0	2,20	22,6	100,0	23,81

På de 3 af de røde hold havde kalvene produceret mørt kød, hvorfor sejhedstallene blev forholdsvis lave, men på holdet efter Max Sydvest havde kalvene produceret sejt kød. Holdet efter Max Sydvest blev slagtet på et andet slagteri end kalvene på de øvrige hold, men resultaterne fra tidligere år peger ikke på, at dette skulle være ugunstigt for dette hold. Sejhedstallet for holdet efter Herning Esp svarede ret godt til de opnåede resultater for sortbrogede hold i tidligere år.

Tørstofprocenten var nærmest middelhøj, og den blev i gennemsnit 23,7 for de 4 røde hold, og den gennemsnitlige tørstofprocent for det sortbrogede hold blev ligeledes 23,7. Der var ingen udpræget høje eller lave tørstofprocenter for holdene inden for Rød Dansk Malkerace.

Der blev også foretaget en bestemmelse af kødets saftbindingsevne samt af kødets kvælstofprocent. Der var ikke ret stor variation i tallene mellem holdene for kødets saftbindingsevne, og kvælstofprocenten var næsten ens for alle holdene. Kvælstofprocenten var imidlertid lidt højere for vinterkalvene end for sommerkalvene.

F. Hovedresultater.

I *tabel 23* findes oplysninger om den gennemsnitlige daglige tilvækst for alle holdene samt de vigtigste slagtekvalitetsegenskaber, hvoraf der er medtaget slagteprocent, kødprocent, procent pistolkød og kødets konsistens. For slagtekvalitetsegenskaberne er foruden gennemsnitstallet anført indekstal og spredning. Indekstallet er et forholdstal, idet racens gennemsnit er sat til 100. Spredningen er anført efter indekstallet og er omregnet til denne talstørrelse.

Procent pistolkød er kødet i pistoludskæringen i forhold til vægten af slagtekroppen.

Nogle af gennemsnitstallene og indekstallene er *kursiveret,* og det er disse tal, som afviger så meget fra 100, at de er statistisk sikre ($P < 0,05$). Det er dog kun, når holdene er bedre end racens gennemsnit, at de er kursiveret. Det fremgår af *tabel 23,* at Sydfyns Allan har fået en fin placering med hensyn til slagteprocent og kødets konsistens. Kalvene efter Sydfyns Allan var trivelige og havde en god daglig tilvækst samt af en type, som var særdeles velegnet til produktion af skummetmælkskalve.

G. Forsøg med blandsæd kontra kraftfoderblanding.

Ved trivelighedsundersøgelserne fodres kalvene efter planen i *tabel 15,* og der anvendes desuden blandsæd efter ædelyst. I dette forsøg Af. 2 blev hold N fodret efter reglerne for trivelighedsundersøgelserne, medens kal-

vene på hold F fik kraftfoderblanding efter ædelyst. Kalvene på hold F fik dog ingen blandsæd.

Forsøget udførtes med indkøbte kalve på Krarup Nygård, men kalvenes sundhedstilstand var for dårlig ved forsøgets start, og det var især galt med enkelte af de røde kalve. Kalvene blev delt efter blokmetoden, og der indsattes 5 røde og 5 sortbrogede kalve på hvert hold. To sortbrogede kalve, der tilhørte samme blok, blev bundet i forkerte båse, efter at de havde været løse, og da der gik lidt tid, inden det blev opdaget, blev de udsat af forsøget, som gennemførtes med 5 røde og 4 sortbrogede kalve på hvert hold.

Foderforbruget var følgende:

	Hold N	Hold F
Sødmælkserstatning, f.e.	42	42
Skummetmælk, f.e.	150	157
Kraftfoderblanding, f.e.	190	366
Blandsæd, f.e.	130	–
Roer, f.e.	152	167
Hø, f.e.	23	24
I alt f.e.	687	756
g ford. renprotein pr. f.e.	107	120

Den væsentligste forskel på de to hold er, at hold F har fået ekstra kraftfoderblanding som erstatning for blandsæden. Når hold F har fortæret mest foder, skyldes det, at kalvene på hold F havde den mindste daglige tilvækst, hvorfor dette hold fik den længste forsøgstid.

Der opnåedes følgende hovedresultater for tilvækst og foderudnyttelse:

Hold	Race	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	Vægt i kg ved forsøgets slutning	Daglig tilvækst g	f.e. pr. kg tilvækst
N	RDM	189	47	244	1045	3,48
	SDM	187	48	247	1066	3,44
F	RDM	205	45	245	975	4,05
	SDM	184	46	246	1087	3,45

Vægten ved forsøgets slutning er vægten på slagteriet, og denne vægt benyttedes til udregning af den daglige tilvækst. I gennemsnit vejede kalvene knap 250 kg ved slagtning. De røde kalve på hold N havde større daglig tilvækst end de røde på hold F, hvorimod de sortbrogede på hold F trivedes fuldt så godt som deres makkere på hold N. Ved holddelingen kom der et et par dårlige røde kalve på hold F, og dette har sandsynligvis medvirket til at fremkalde en forskel mellem holdene med hensyn til den daglige tilvækst. Der er næppe grund til at antage, at forsøgsbehandlingen, som kalvene på hold F har fået, skulle have medført en nedgang i den daglige tilvækst for de røde kalve. Alt tyder på, at hold N har været det stærkeste

hold, hvilket også synes at fremgå af gennemsnitsvægten ved forsøgets begyndelse.

Med hensyn til slagtekvaliteten opnåedes følgende hovedresultater:

Hold	Race	Slagte %	Pistol-udskæring	Kød %	Talg %	Knogler %
N	RDM	53,3	48,1	70,8	7,4	20,0
	SDM	55,7	49,1	73,0	6,8	18,8
F	RDM	53,6	47,6	69,3	8,4	20,1
	SDM	55,6	48,8	71,7	7,5	18,9

Hverken med hensyn til slagteprocent eller pistoludskæring kunne der påvises reelle forskelle mellem holdene, medens der for begge racers vedkommende fandtes en højere kødprocent på hold N end på hold F.

Som ved trivelighedsundersøgelserne blev der udtaget et stykke af den lange rygmuskel til kødundersøgelser, som gav følgende resultat:

Hold	Race	Farve-tal	Kon-sistens	Fedt %	Tørstof %	N %
N	RDM	15,3	16,3	0,96	23,6	3,49
	SDM	14,5	21,8	0,86	23,8	3,52
F	RDM	14,6	23,3	1,08	23,9	3,52
	SDM	14,8	23,3	0,94	24,0	3,55

Der kunne ikke påvises statistisk sikre forskelle mellem holdene med hensyn til kødkvalitetsundersøgelserne, men derimod blev der ved smagsbedømmelserne opnået de bedste resultater for egensmag for hold N.

Racemæssigt blev der opnået de bedste resultater for Sortbroget Dansk Malkerace med hensyn til tilvækst, foderudnyttelse, slagteprocent og kødprocent, medens der for Rød Dansk Malkerace blev opnået de bedste karakterer ved smagsbedømmelse af helhedsindtryk, egensmag og mørhed.

Forsøgsholdet gav på ingen måde bedre resultater end normalholdet, og der opnåedes således intet ved at ombytte blandsæd med en mere proteinrig kraftfoderblanding. Det er sandsynligvis et par røde kalve på hold F, som ikke var i tilstrækkelig god kondition ved forsøgets start, der har været medvirkende til, at der som helhed knap opnåedes så gode resultater på hold F som på hold N. Det har ikke været nogen fordel at øge foderets proteinindhold ved at erstatte blandsæden med en kraftfoderblanding.

IV. Sammendrag.

I prøveåret 1966–67 afprøvedes 77 hold på 25 stationer. Kvierne blev i vinterperioden fodret efter den sædvanlige foderplan, som er anført i *tabel 6*. Fodringen i sommerperioden er ligeledes den samme som i de foregående år, og foderplanen er anført i *tabel 8*.

Gennemsnitsydelsen for de enkelte racer blev følgende:

Race	Antal hold	Antal kvier	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Prot. %	Mælkepr. kg
RDM	40	732	5053	4,52	228,38	257	3,80	192
SDM	21	398	5206	4,32	224,78	252	3,65	190
Jerseyrace	16	300	3613	6,55	236,79	269	4,32	156
Alle hold .	77	1430	4796	4,78	229,15	258	3,84	184

Den gennemsnitlige smørfedtydelse blev 229 kg, og det er en fremgang på 2 kg fra 1965–66. Jerseyracen opnåede den højeste gennemsnitlige smørfedtydelse, men hovedparten af Jerseyholdene opnåede også gode ydelsesresultater. Rød Dansk Malkerace opnåede den højeste gennemsnitlige ydelse af mælkeprotein.

Det højestydende hold inden for hver af racerne opnåede følgende ydelse:

Race	Tyrens navn	Antal kvier	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Prot. %	Mælkeprot. kg
RDM	Uwe	16	6427	4,69	301,32	339	3,82	246
SDM	Varde Stefan	20	5630	4,47	251,70	283	3,63	204
Jerseyrace	Bornholms Brygger ..	16	4061	6,51	264,30	300	4,24	172

Holdet efter Uwe nåede en gennemsnitsydelse på 301 kg smørfedt, hvilket er en meget høj gennemsnitsydelse for 1. kalvs kvier i 304 dage, men det er også rekordydelse for et afkomsprøvehold i de 22 år afkomsprøverne har virket.

De enkelte holds gennemsnitsresultater er anført i *tabel 1*, og i hovedtabellerne findes oplysning om ydelse, foderforbrug og malkbarhed for de enkelte kvier. Udholdenheden i ydelsen for de enkelte hold er anført i *tabel 9*, og i *tabel 11* er holdene anført efter spredningen i smørfedtydelsen inden for hver af racerne.

Malkbarhedsundersøgelserne er gennemført efter de sædvanlige retningslinier, og malkbarhedstallet er udregnet efter følgende formel:

RDM: kg mælk pr. minut ÷0,081 (kg mælk daglig ÷16,0)
SDM: kg mælk pr. minut ÷0,081 (kg mælk daglig ÷16,0)
Jerseyrace: kg mælk pr. minut ÷0,068 (kg mælk daglig ÷12,0)

Der opnåedes følgende gennemsnitsresultater for racerne:

Race	kg mælk pr. minut	Malkbarhedstal	% af mælken i de første 3 minutter	Malketid i min. gns. pr. kvie pr. malkning	kg eftermælk i gns. pr. malkning
RDM	2,02	1,92	72,6	4,2	0,5
SDM	2,36	2,23	79,4	3,8	0,5
Jerseyrace	1,92	1,89	85,0	3,1	0,5

Malkbarhedsresultaterne var som helhed bedst for holdene af Sortbroget Dansk Malkerace og Jerseyracen.

Afkomsprøverne med tyrekalve omfattede 5 hold. For hvert hold blev halvdelen af kalvene afprøvet om sommeren og halvdelen om vinteren. Prøvetiden omfattede perioden fra kalvene var 14 dage gamle, og til de nåede en vægt på ca. 200 kg. Holdenes gennemsnitsvægt blev 200 kg ved prøvens slutning, men de vejede i reglen godt 200 kg ved slagtningen. Der opnåedes følgende hovedresultater:

Race	Antal hold	Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst	Slagteprocent	Kødprocent	Procent pistolkød
RDM	4	1019	2,99	53,7	70,0	34,3
SDM	1	1008	3,14	54,2	70,9	35,0

Der var ingen væsentlig forskel i den daglige tilvækst mellem de sortbrogede og røde kalve, som i gennemsnit opnåede en daglig tilvækst på godt 1000 g. Som i de foregående år blev kalvene af Sortbroget Dansk Malkerace placeret bedre end kalvene af Rød Dansk Malkerace med hensyn til slagteprocent, kødprocent og procent pistolkød. I de kommende år vil afkomsprøverne med tyrekalve foregå på centralstationen ved Egtved i Jylland, hvor der er plads til 780 forsøgsdyr.

V. Summary.

77 sire progeny groups were tested at 25 stations during the year 1966–67. During the winter period, cows were rationed according to the feeding plan given in Table 6. During the summer period, the feeding plan given in Table 8, which was similar to that of the previous year, was used.

Average performance of the individual breeds was as follows:

Breed	No. of Groups	No. of Cows	Milk Yield kg	B. F. %	B. F. Yield kg	Protein %	Protein Yield kg
RDM	40	732	5053	4.52	228.38	3.80	192
SDM	21	398	5206	4.32	224.78	3.65	190
Jersey	16	300	3613	6.55	236.79	4.32	156
Total	77	1430	4796	4.78	229.15	3.84	184

At 229 kg, the average butterfat yield was 2 kg greater than in 1965–66. The Jerseys achieved the highest average butterfat yield, and most of the Jersey groups gave good yield results. Yield of milk protein was highest in the RDM breed.

The highest yielding groups of each breed gave the following yields:

Breed	Name of bull	No. of Cows	Milk Yield kg	B. F. %	B. F. Yield kg	Protein %	Protein Yield kg
RDM:	Uwe	16	6427	4.69	301.32	3.82	246
SDM:	Varde Stefan	20	5630	4.47	251.70	3.63	204
Jersey:	Bornholms Brygger	16	4061	6.51	264.30	4.24	172

The progeny group by Uwe averaged 301 kg of butterfat, which is an extremely high 304-day average for 1st-calf cows, and also the record yield for a group achieved in 22 years of progeny testing.

The average yields of individual groups are given in Table 1, and the yield, food consumption and corrected rate of milking of individual cows in the group tables. Yield persistency of individual groups is given in Table 9 and the standard deviation of daughter yields in each group in Table 11.

The analysis of milking rates was carried out in the usual manner, and corrected milking rates calculated as follows:

RDM: kg milk per min. –0.081 (kg daily milk yield –16.0)
SDM: kg milk per min. –0.081 (kg daily milk yield –16.0)
Jersey: kg milk per min. –0.068 (kg daily milk yield –12.0)

The following results were obtained for the three breeds:

Breed	kg milk per min.	Corrected milking rate	% milk in the first 3 min.	Milking time in min. (av. per cow per milking)	kg residual milk (av. per milking)
RDM	2.02	1.92	72.6	4.2	0.5
SDM	2.36	2.23	79.4	3.8	0.5
Jersey	1.92	1.89	85.0	3.1	0.5

On the whole, SDM and Jersey cattle were easiest to milk.

The progeny test of bull calves consisted of 5 groups. Half of each group were tested in summer, half in winter. The test began at 14 days of age and finished at a liveweight of about 200 kg. The average weight of each group on completion of the test was 200 kg, but was slightly greater than this by the time the animals were slaughtered. The following results were obtained:

Breed	No. of groups	Daily liveweight gain (gm)	Feed units per kg live-weight gain	Dressing %	Meat %	% lean in pistolcut
RDM	4	1019	2.99	53.7	70.0	34.3
SDM	1	1008	3.14	54.2	70.9	35.0

There was little difference between the SDM and RDM calves in daily gain, which averaged slightly more than 1000 gm per day. As in the previous year, SDM calves were slightly superior to the RDM in dressing percentage, percentage of meat in the carcass and percentage of lean meat in the pistolcut. In future, the testing of bull calves will be carried out at a central testing station at Egtved in Jutland, where testing facilities for 780 animals are available.

VI.
HOVEDTABELLER

Hovedtabel 1. **Afkomsprøve for tyren Uwe,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
3	8- 1-64	17- 9	983	600	**7377**	**4,84**	**356,76**	**402**	**3,98**	**294**	316	316	2346	4878
4	27-12-63	29-10	1037	534	**7705**	**4,62**	**356,14**	**401**	**3,75**	**289**	276	276	2467	4673
11[1]	30- 5-64	7- 9	830	528	**7427**	**4,76**	**353,78**	**398**	**3,40**	**253**	328	328	2313	4889
16	26- 3-64	23- 9	911	523	**6756**	**4,95**	**334,29**	**377**	**3,86**	**261**	312	312	2128	4695
6	18- 5-64	31- 8	835	562	**7294**	**4,55**	**331,75**	**373**	**3,61**	**263**	335	335	2126	4906
5	7- 3-64	14-10	951	556	**7034**	**4,64**	**326,20**	**367**	**3,70**	**260**	291	291	2115	4495
10	5- 1-64	21- 9	990	597	**7079**	**4,46**	**316,01**	**355**	**4,01**	**284**	312	312	2066	4711
15	27-12-63	1-11	1040	528	**6893**	**4,54**	**313,10**	**352**	**3,74**	**258**	273	273	2078	4165
2	10- 1-64	3- 9	967	572	**6437**	**4,59**	**295,24**	**332**	**3,91**	**252**	332	332	1819	4623
7	23- 2-64	6-10	956	590	**5831**	**4,92**	**287,14**	**324**	**3,88**	**226**	299	299	1706	4099
17	23- 1-64	6-11	1018	561	**5999**	**4,66**	**279,74**	**315**	**3,75**	**225**	268	268	1753	3870
12	12- 1-64	13- 9	975	592	**5661**	**4,84**	**274,11**	**309**	**4,00**	**226**	322	322	1614	4151
9	9- 4-64	19-10	923	609	**5682**	**4,78**	**271,42**	**306**	**3,87**	**220**	286	286	1619	3959
1[2]	6- 1-64	30- 9	998	601	**6107**	**4,31**	**262,92**	**295**	**3,92**	**240**	305	305	1614	4115
13	2- 4-64	24- 9	905	508	**5190**	**4,63**	**240,44**	**271**	**3,82**	**198**	311	311	1373	3860
14[3]	30- 5-64	2-10	855	626	**4358**	**5,10**	**222,09**	**251**	**4,14**	**180**	303	303	1091	3478
Gns. af 16 kvier			948	568	**6427**	**4,69**	**301,32**	**339**	**3,82**	**246**	304	304	1889	4348

[1] Venstre bagpatte stukket op efter pattetråd.
[2] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.
[3] Trepattet.

Hovedtabel 2. **Afkomsprøve for tyren Skærup Munk,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
10	4- 5-64	24- 9	873	554	**7206**	**4,52**	**325,91**	**366**	**3,82**	**275**	311	311	2479	4626
6	9- 4-64	8-10	912	550	**6747**	**4,34**	**292,78**	**329**	**3,94**	**266**	297	297	2254	4258
20	20- 7-64	15- 9	787	486	**6079**	**4,75**	**288,97**	**325**	**3,87**	**235**	320	320	2310	4274
16	25- 4-64	31-10	919	573	**6780**	**4,21**	**285,18**	**320**	**3,57**	**242**	274	274	2197	4104
17	5- 2-64	6- 9	944	531	**6465**	**4,38**	**283,10**	**318**	**3,61**	**234**	329	329	2207	4302
1[1]	24- 2-64	29- 9	948	632	**5504**	**5,04**	**277,15**	**313**	**4,25**	**234**	306	306	1941	4061
14	20- 3-64	22-10	946	560	**6514**	**4,25**	**276,54**	**310**	**3,81**	**248**	283	283	2115	3824
13	2- 8-64	18-10	807	535	**6103**	**4,49**	**274,10**	**308**	**3,86**	**235**	287	287	2063	3893
8	10- 4-64	25- 9	898	569	**5842**	**4,68**	**273,26**	**308**	**3,85**	**225**	310	310	2020	4027
21	20- 5-64	11- 9	844	547	**5966**	**4,56**	**272,09**	**306**	**3,71**	**221**	324	324	2003	4042
2	14- 3-64	18- 9	918	533	**5815**	**4,50**	**261,70**	**294**	**3,97**	**231**	317	317	1920	4118
3	25- 6-64	9- 9	806	586	**5552**	**4,69**	**260,49**	**293**	**3,95**	**219**	326	326	1821	4029
19	24- 1-64	4-10	984	543	**5651**	**4,61**	**260,31**	**293**	**3,82**	**216**	301	301	1890	3814
12	8- 5-64	19- 9	864	585	**5864**	**4,44**	**260,26**	**292**	**3,89**	**228**	316	316	1865	4029
4	23- 2-64	6- 9	926	635	**5341**	**4,81**	**257,09**	**290**	**4,22**	**226**	320	320	1802	4059
11	14- 3-64	21- 9	921	559	**5308**	**4,62**	**245,12**	**276**	**3,95**	**210**	314	314	1688	3806
7	9- 4-64	26-10	930	546	**5729**	**4,13**	**236,75**	**265**	**3,63**	**208**	279	279	1828	3653
15	24- 3-64	23- 9	913	589	**5203**	**4,55**	**236,62**	**266**	**3,83**	**199**	312	312	1598	3613
18[2]	3- 5-64	19-10	899	549	**5224**	**4,33**	**226,32**	**254**	**3,66**	**191**	286	286	1730	3622
9	28- 3-64	30-10	946	645	**4729**	**4,51**	**213,32**	**240**	**3,97**	**188**	275	275	1463	3289
Gns. af 20 kvier			899	565	**5881**	**4,51**	**265,35**	**298**	**3,85**	**227**	304	304	1960	3972

[1] Venstre forpatte stukket op efter pattetråd.
[2] Højre bagpatte stukket op efter pattetråd.

s. 28146, på Gyldenagergård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,6	1,87	3-12	72	Snaphanen, e.A 4958	Poul Rasmussen, Gørløse.
6,4	1,03	3- 6	42	Snaphanen, e.A 4958	Hans Nielsen, Stenløse.
5,4	1,46	25- 1	37	Dan, s. 4470	Erik Sylvest Olsen, Stavnsholt.
4,4	1,97	9-12	152	Roland, s. 4779	Aage Thomsen, Krogerup.
5,4	1,46	25- 2	21	Høj, s. 4600	Poul Beck, Melby.
4,7	1,79	18- 4	95	Flot, r. 25452	Jens Pedersen, Vejby.
4,9	1,74	5-12	29	Høj, s. 4600	Peter Jensen, Ørby.
6,6	1,14	9- 1	62	Bæk, r. 27592	Peter Jensen, Tollerup.
4,6	1,65	29-12	32	Høj, s. 4600	Poul Rasmussen, Gørløse.
4,0	1,95	—	76	Roland, s. 4779	Peter Larsen, Tikøb.
5,2	1,59	10- 4	20	Whist, r. 26145	Kaj Mølgaard, Viksø.
3,7	1,98	22-12	95	Engdal, e.B 4865	Børge Larsen, Høbjerg.
5,1	1,60	8- 3	13	Dan, s. 4470	J. Halgaard, Gørløse.
5,3	1,36	4- 1	22	Høj, s. 4600	Martin Larsen, Sundbylille.
3,8	2,04	11- 2	23	Høj, s. 4600	Hartvig Olsen, Ullerød.
3,8	1,92	6- 3	76	Reza, e.A 4956	Aage Sylvest Larsen, Gørløse.
4,9	1,66				

s. 28389, på Skovgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,0	1,62	22-12	95	Elbo Hoff, r. 26201	H. Dahl Andersen, Trelde.
3,8	2,20	20- 3	19	Nil 43, Eskærgård, f. 2-5-58	Viggo Christensen, Hornstrup.
3,6	2,22	3- 3[1]	82	Elbo Sortemose, e.A 4902	Hans Roed, Sdr. Vilstrup.
4,4	1,97	30- 1	50	Horsens Sortemose, e.A 4888	Gunner Bisgaard, Grejs.
3,6	2,16	13- 1	41	Max, r. 23593	Harald Nielsen, Klattrup.
3,5[2]	2,51[2]	—	70	Elbo Sortemose, e.A 4902	Vagn Favrholdt, Treldegård.
4,0	1,81	—	28	Højvig 16, s. 4618	Knud Sørensen, Tudvad.
4,4	1,90	29-12	91	Elbo Sortemose, e.A 4902	Vagn Favrholdt, Treldegård.
3,1	2,70	30- 1	36	Uffe Ørnsvig, s. 4368	Martin Nielsen, Ammitsbøl.
4,6	1,77	12- 4	38	Junior, s. 4854	Svend Iversen, Mejsling.
4,0	1,98	21- 1	35	Skive Olle, s. 4632	Vagn Favrholdt, Treldegård.
5,6	1,41	—	89	Elbo Sortemose, e.A 4902	Søren Munkholm, Høgsholt.
3,6	2,38	22-12	90	Horsens Sortemose, e.A 4888	Jens Erik Christensen, Småkær.
3,6	2,31	—	92	Elbo Sortemose, e.A 4902	Vagn Favrholdt, Treldegård.
4,4	1,75	28-11	105	Rudme Hygum, s. 4490	Thomas Nielsen, Pjedsted.
4,6	1,68	8-12	67	Elbo Sortemose, e.A 4902	Henry Madsen, Mørkholt.
3,6	2,48	25- 2	2	Vejle Birk, s. 4698	Hans Pallesen, Skærup.
3,6	2,21	30-12	27	Vejle Birk, s. 4698	Viggo Christensen, Hornstrup.
5,0	1,53	16- 1	5	Vejle No, r. 26516	Knud Gormsen, Grejs.
6,4	1,16	8- 6	41	Bredsten Nørreby, r. 27164	Arne Nielsen, Søgårde.
4,2	1,99				

[1] Kastet 1-3 efter ins. 15-12.
[2] Kun 2. måling.

Hovedtabel 3. **Afkomsprøve for tyren Horsens Bitz,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
12	22- 4-64	15-10	906	545	**6884**	**5,22**	**359,07**	**406**	**3,95**	**272**	299	299	2455	4606
11	26- 3-64	8-10	926	561	**6796**	**4,86**	**330,55**	**373**	**4,04**	**275**	306	306	2235	4322
13	11- 4-64	12-10	914	491	**6428**	**4,89**	**314,41**	**354**	**3,95**	**254**	302	302	2149	4389
9	28- 8-64	2-10	765	545	**6120**	**5,08**	**311,14**	**351**	**4,12**	**252**	308	308	2066	4060
18	4- 3-64	25-10	965	556	**6602**	**4,64**	**306,55**	**345**	**3,95**	**261**	289	289	2143	4358
8	10- 8-64	20-10	801	532	**6404**	**4,63**	**296,31**	**333**	**3,73**	**239**	294	294	2071	4352
4[1]	28- 3-64	30- 9	916	480	**5775**	**4,70**	**271,53**	**306**	**3,90**	**225**	314	314	1788	4157
5	19- 3-64	30- 9	925	606	**5080**	**5,16**	**261,94**	**296**	**3,99**	**203**	314	314	1642	4170
19	16- 5-64	10-11	908	495	**5382**	**4,85**	**260,77**	**294**	**3,92**	**211**	273	273	1736	3914
1	11- 2-64	19- 9	951	618	**5121**	**5,01**	**256,59**	**289**	**3,99**	**204**	325	325	1594	3974
3	7- 3-64	23- 9	930	560	**5089**	**5,04**	**256,56**	**289**	**4,08**	**208**	321	321	1583	4042
16	26- 4-64	22-10	909	534	**4921**	**5,10**	**250,81**	**283**	**3,97**	**195**	292	292	1572	3628
17	25- 8-64	10-10	776	576	**4580**	**4,81**	**220,24**	**248**	**4,07**	**187**	304	304	1288	3735
7	7- 5-64	30- 9	876	514	**4573**	**4,80**	**219,30**	**247**	**4,06**	**186**	314	314	1265	3579
15	20- 5-64	21-10	884	570	**4764**	**4,60**	**219,24**	**247**	**3,89**	**185**	293	293	1345	3527
10	5- 6-64	4-10	851	551	**4665**	**4,69**	**218,64**	**246**	**4,08**	**190**	310	310	1332	3737
14	1- 6-64	15-10	866	560	**4663**	**4,42**	**206,14**	**232**	**3,89**	**182**	299	299	1249	3438
2	5- 5-64	23- 9	871	570	**3563**	**4,59**	**163,66**	**184**	**4,05**	**144**	321	321	834	3207
Gns. af 18 kvier			886	548	**5412**	**4,85**	**262,41**	**296**	**3,98**	**215**	304	304	1686	3955

[1] Trepattet.

Hovedtabel 4. **Afkomsprøve for tyren Ålborg Børge,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
6	16-10-63	18-10	1098	521	**6786**	**4,64**	**314,97**	**354**	**3,87**	**263**	285	285	2080	4381
10	22- 3-64	7- 9	899	530	**6429**	**4,73**	**304,06**	**342**	**3,80**	**244**	326	326	1881	4475
8	14-12-63	26- 9	1017	545	**6481**	**4,61**	**299,05**	**336**	**3,80**	**246**	307	307	1906	4434
1	30- 1-64	1-10	975	552	**5877**	**4,85**	**285,22**	**321**	**4,18**	**246**	302	302	1710	4236
3	9- 3-64	13- 9	918	498	**5997**	**4,70**	**281,96**	**317**	**3,71**	**222**	320	320	1755	4256
2	4- 1-64	3-10	1003	554	**5916**	**4,41**	**261,10**	**293**	**3,95**	**234**	300	300	1614	4048
5	6- 2-64	15- 9	952	573	**5925**	**4,35**	**257,98**	**290**	**3,71**	**220**	318	318	1555	4093
9[1]	28- 3-64	16- 9	902	563	**5299**	**4,85**	**257,21**	**290**	**4,12**	**219**	317	317	1466	3893
20	19- 9-64	13-10	754	470	**5480**	**4,65**	**254,93**	**287**	**4,00**	**219**	290	290	1563	3888
15	12- 3-64	6-10	938	570	**5624**	**4,38**	**246,26**	**277**	**3,97**	**223**	297	297	1471	3878
12	21- 1-64	17-10	1000	633	**4988**	**4,92**	**245,65**	**277**	**4,21**	**210**	286	286	1367	3699
18	4- 9-64	9- 9	735	494	**5238**	**4,67**	**244,82**	**276**	**4,07**	**213**	324	324	1328	3964
19	30- 9-64	8-10	738	500	**5381**	**4,52**	**243,32**	**274**	**3,90**	**210**	295	295	1395	3714
16	10- 4-64	13-10	916	510	**5110**	**4,54**	**232,07**	**261**	**3,83**	**196**	290	290	1341	3685
11[2]	20- 2-64	26- 9	949	582	**5117**	**4,40**	**225,23**	**253**	**4,10**	**210**	307	307	1233	3653
14	25- 3-64	20- 9	909	550	**4324**	**4,58**	**198,11**	**223**	**4,05**	**175**	313	313	1012	3576
13	6- 5-64	16-10	893	587	**3876**	**5,09**	**197,30**	**223**	**4,20**	**163**	287	287	933	3229
Gns. af 17 kvier			917	543	**5520**	**4,63**	**255,84**	**288**	**3,96**	**218**	304	304	1506	3947

[1] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.
[2] Alle patter stukket op.

s. 28407, på Østerhåb.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,6	1,82	1- 4	62	Horsens Leif, e.A 5010	Ejnar Pedersen, Uth.
4,3	2,04	14- 4	40	Horsens Vang, e.A 4944	Viggo Pedersen, Bisholt.
4,5	1,73	14- 4	89	Horsens Vang, e.A 4944	Gudrun Fl. Andersen, Hornborg.
4,5	1,62	12-12	84	Horsens Sortemose, e.A 4888	Peder Hauge, Gribstrup.
4,0	2,03	9- 1	135	Horsens Syv, e.A 4898	R. P. Østergaard Hansen, Skulsballe.
5,5	1,43	2- 1	6	Horsens Vang, e.A 4944	Otto Christensen, Hørning.
4,0	2,19	16- 1	54	Horsens Vang, e.A 4944	Magnus Olesen, Ravnholt.
6,0	1,13	22- 2	39	Horsens Klint, s. 4857	Birgitte Christensen, Honum.
5,2	1,53	4- 2	70	Horsens Sortemose, e.A 4888	Erik Brogaard, Vrigsted.
3,9	1,98	6- 2	59	Horsens Sortemose, e.A 4888	Morten Pedersen, Haurum.
4,6	1,53	24-12	40	Horsens Sortemose, e.A 4888	Arne Møller, Løsning.
2,8	2,74	21- 1	36	ukendt	Herluf Holst Hansen, Åle.
3,3	2,11	25- 2	78	Horsens Loke, s. 4804	Henning Rasmussen, Hyllerød.
2,3	3,01	3- 3	55	Horsens Sortemose, e.A 4888	Jens Iversen, Barrit.
3,5	2,06	—[1]	83	Horsens Sortemose, e.A 4888	Knud Madsen, Asløkke.
5,4	1,32	1- 2	90	Horsens Klint, s. 4857	Kresten Sommer, Kalhave.
5,1	1,50	2- 6	53	Horsens Klint, s. 4857	M. Lyshøj Poulsen, Hornborg.
4,1	1,57	14- 2	66	Horsens Syv, e.A 4898	Arne Nicolajsen, Klovborg.
4,3	1,85				

[1] Børbetændelse.

s. 28372, på Lundgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,2	1,53	14- 4	9	Ålborg Bitz, e.A 4892	Christian Lauersen, Bælum.
4,7	1,68	1- 2	48	Ålborg Dyre, r. 24051	Chr. Larsen, Gudumholm.
3,5	2,54	6- 1	91	Nr. 55, f. 8-2-57	Knud Kjær, Nørholm.
3,0	2,77	8- 2	66	Nr. 28, f. 28-4-58	Hjalmar Christensen, Restrupenge.
3,0	2,66	28- 3	76	Sverre, s. 4759	Alfred Haase, Tyrrestrup.
4,0	2,02	23- 1	29	Ålborg Jess, e.A 4938	Søren P. Nielsen, Albæk.
4,4	1,79	18- 3	53	Ålborg Park, r. 27137	Svend Hald, Veddum.
3,5	2,20	24- 3	27	Ålborg Bitz, e.A 4892	Aage Simonsen, Vodskov.
6,5	1,10	10- 1	28	Ålborg Jess, e.A 4938	Herman Jensen, St. Brøndum.
4,5	1,87	17- 2	37	Ålborg Dyre, r. 24051	Niels Sudergaard, Grindsted.
5,4	1,37	20-12	47	ukendt	Chr. Andersen, Skræm.
5,2	1,34	19-12	3	ukendt	Svend Chr. Clausen, Krastrup.
5,8	1,26	19- 4	46	Ålborg Jess, e.A 4938	Niels Aage Jensen, Ulsted.
3,1	2,53	1- 2	6	Ålborg Jess, e.A 4938	Morten Christensen, Bonderup.
3,7	2,06	9- 2	40	ukendt	Peder Mark, Fandrup.
4,7	1,54	30-12	76	Ålborg Jess, e.A 4938	Chr. Selvejer, Biersted.
3,6	2,07	28- 2	31	Ålborg Bitz, e.A 4892	Peder Hansen, V. Hassing.
4,3	1,90				

Hovedtabel 5. **Afkomsprøve for tyren Dybbøl Holm,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
1	3- 3-64	22- 9	933	545	**6852**	**4,62**	**316,90**	**357**	**3,48**	**238**	315	315	1937	4330
17	3-12-63	20- 9	1022	537	**5907**	**5,30**	**313,30**	**354**	**3,86**	**228**	306	306	1896	4309
5	30- 1-64	14- 9	958	522	**5870**	**4,80**	**281,75**	**317**	**3,97**	**233**	323	323	1660	4076
13	17- 4-64	29- 9	895	505	**5715**	**4,90**	**279,88**	**315**	**3,90**	**223**	308	308	1680	4102
12	21-12-63	12-11	1057	510	**6527**	**4,26**	**277,95**	**312**	**3,60**	**235**	264	264	1861	4010
7	25-11-63	27- 9	1037	514	**6031**	**4,60**	**277,42**	**312**	**3,82**	**231**	310	310	1709	4152
16	3- 2-64	23- 9	963	500	**6344**	**4,26**	**270,32**	**303**	**3,56**	**226**	314	314	1708	4121
14	12-12-63	26- 9	1019	505	**5999**	**4,39**	**263,62**	**296**	**3,55**	**213**	311	311	1655	4046
6	3- 2-64	15- 9	955	587	**5540**	**4,68**	**259,11**	**292**	**3,92**	**217**	322	322	1509	4013
3	10-12-63	22-10	1047	541	**5484**	**4,65**	**255,17**	**287**	**3,73**	**205**	285	285	1542	3774
10	19- 3-64	24- 9	919	575	**4987**	**4,83**	**240,84**	**271**	**4,03**	**201**	302	302	1374	3639
2	20- 1-64	10- 9	964	670	**4877**	**4,93**	**240,53**	**271**	**3,81**	**186**	316	316	1313	3834
11	3- 4-64	27-10	937	555	**4605**	**4,94**	**227,66**	**257**	**3,95**	**182**	280	280	1241	3419
15[1]	15- 9-63	6-10	1117	580	**4393**	**5,17**	**227,14**	**256**	**3,87**	**170**	301	301	1277	3369
20	31- 1-64	18-10	991	517	**4885**	**4,62**	**225,70**	**254**	**3,76**	**184**	289	289	1276	3472
18	8- 3-64	4-10	940	546	**4369**	**5,04**	**220,36**	**249**	**3,96**	**173**	303	303	1155	3380
4	17-12-63	20- 9	1008	640	**4183**	**5,01**	**209,66**	**236**	**3,99**	**167**	317	317	1059	3537
8	16- 1-64	30- 9	988	583	**4151**	**4,54**	**188,64**	**212**	**3,93**	**163**	307	307	989	3043
Gns. af 18 kvier			986	552	**5373**	**4,73**	**254,22**	**286**	**3,80**	**204**	304	304	1491	3813

[1] Bagpatterne blokket op 15-3 efter intensitetsmålingen.

Hovedtabel 6. **Afkomsprøve for tyren Skærup Bus,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
4	7-12-63	28- 8	995	489	**7247**	**4,76**	**344,99**	**389**	**3,56**	**258**	329	329	2408	4894
13	26- 3-64	26- 9	914	505	**6025**	**4,97**	**299,47**	**338**	**3,90**	**235**	319	319	1885	4250
11	20- 1-64	8- 9	962	520	**6703**	**4,38**	**293,42**	**329**	**3,57**	**239**	337	337	1956	4466
7	5-12-63	29-11	1090	487	**6246**	**4,69**	**292,96**	**330**	**3,71**	**232**	255	255	2021	3932
8	22-12-63	24-10	1037	548	**5964**	**4,86**	**289,90**	**327**	**3,96**	**236**	291	291	1860	4093
10	7-12-63	24- 9	1022	507	**6692**	**4,21**	**281,95**	**316**	**3,55**	**237**	321	321	1938	4328
9	21-12-63	1- 9	985	535	**6123**	**4,40**	**269,48**	**303**	**3,64**	**223**	318	318	1784	4076
16	8- 1-64	13-11	1040	536	**5320**	**4,85**	**257,86**	**291**	**3,95**	**210**	271	271	1632	3726
5	11- 1-64	6-10	999	590	**5981**	**4,19**	**250,90**	**281**	**3,48**	**208**	309	309	1611	3910
2	22- 2-64	25- 9	946	515	**5939**	**4,02**	**238,53**	**267**	**3,47**	**206**	320	320	1613	3977
6[1]	28-10-63	29- 9	1067	546	**5284**	**4,44**	**234,50**	**263**	**3,65**	**193**	316	316	1373	3812
20	18- 6-64	2-10	836	404	**5137**	**4,43**	**227,53**	**256**	**3,49**	**179**	308	308	1423	3749
18	17- 5-64	27- 9	863	479	**4762**	**4,52**	**215,01**	**242**	**3,69**	**176**	318	318	1187	3670
17	21- 1-64	3-10	986	508	**5251**	**3,99**	**209,55**	**235**	**3,72**	**195**	312	312	1264	3625
3	18- 2-64	26-11	1012	595	**4764**	**4,38**	**208,78**	**234**	**3,67**	**175**	258	258	1285	3302
15	26- 3-64	27- 9	915	513	**4643**	**4,41**	**204,84**	**230**	**3,77**	**175**	318	318	1118	3475
12	3- 4-64	17-11	958	544	**4097**	**4,42**	**181,10**	**203**	**3,74**	**153**	267	267	1008	3032
1[2]	13-11-63	13-10	1065	623	**3193**	**4,72**	**150,80**	**170**	**4,01**	**128**	302	302	797	2985
Gns. af 18 kvier			983	525	**5521**	**4,48**	**247,31**	**278**	**3,68**	**203**	304	304	1565	3850

[1] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.
[2] Alle patter stukket op.

s. 28377, på Veesbæk.

Malketid i min.	Malkbar-hedstal	Drægtigden	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,4	1,99	22- 4	87	Olaf, s. 4809	Hans Staugaard, Vesterskov, Snogbæk.
4,6	1,72	29-11	12	Gråsten Sortemose, r. 26780	Arnfred Bjerg, Lavensby.
6,1	1,21	31- 1	20	Als Svend, r. 26493	Hansen og Poulsen, Rojgård.
7,2	0,85	23- 1	53	Lums, s. 4856	Jens Frede Jensen, Fiskebæk.
5,2	1,68	15- 2	21	Give, r. 25754	Kristine Hansen, Avnbølmark.
5,0	1,54	29-12	59	Gråsten Sortemose, r. 26780	Jacob Lang, Asserballe.
5,5	1,32	13-12	116	Rollo, s. 4679	Hans Staugaard, Vesterskov, Snogbæk.
4,9	1,64	—[1]	88	Nørherreds Birk, r. 26519	Chr. Jespersen, Egenmark.
4,0	1,94	16- 1	27	Dan, s. 4678	Chr. Hansen, Brunsnæs.
6,4	1,15	18- 4	55	Nr. 32, f. 13-12-58	Chr. Bonde, Stevning.
5,1	1,52	25-11	56	Bamse, r. 24878	Johan Philipsen, Lundtoftbjerg.
4,1	1,80	24-11	72	Djurs Gert, s. 4858	Frede Toft, Dynt.
5,3	1,43	5- 1	65	Vaks, r. 24403	Chr. Petersen, Egegård, Kær.
7,4	0,65	26- 1	141	Gråsten Sortemose, r. 26780	Erik Nissen, Hovedgården.
5,1	1,53	6- 2	80	Dybbøl Vig, r. 27297	Chr. Rudolph, Stevning.
5,4	1,27	7- 3	29	Als Svend, r. 26493	Heinrich Skovmand, Sebbelev Mark.
4,9	1,41	7-12	52	Gråsten Viking, r. 24877	Hans Festersen, Vilsbæk.
5,8	1,32	25- 3	12	Ike, r. 26213	Th. Jessen, Majbølgård.
5,4	1,44				

[1] Æggestokkene ødelagt.

s. 28388, på Morsø.

Malketid i min.	Malkbar-hedstal	Drægtigden	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,4	1,96	28-11	5	Vejle Dam, s. 4862	Thorkild Jørgensen, Bredal.
3,2	2,72	17- 5	33	Ødsted Vej, r. 26489	Niels Larsen, Tudvad.
5,4	1,46	3- 1	28	Nr. 3, Od, f. 18-5-57	Arne Winther, Kollerup.
7,7	0,80	23- 3	63	Højvig 16, s. 4618	Hans Knudsen, Ravning.
3,6	2,47	28- 1	66	Højvig 16, s. 4618	Hans Knudsen, Ravning.
3,0	2,86	—	156	Max, r. 23593	Svend Hansen, Henneberg Ladegård.
3,8	2,26	21-11	37	Vejle Birk, s. 4698	Viggo Christensen, Hornstrup.
4,9	1,73	28- 1	33	ukendt	Thomas Bjerre, Gaurslund.
5,8	1,32	9- 2	123	Bredsten No, r. 27165	Søstrene Bentzen, Styvelgård.
3,6	2,28	25- 2	76	Bredsten Nørreby, r. 27164	Hans Hansen, Ravning.
3,7	2,18	31- 3	60	Elbo Sortemose, e.A 4902	Henry Madsen, Mørkholt.
5,5	1,41	8-12	24	ukendt	Verner Hansen, Gårslev.
2,6	2,94	4- 1	34	Elbo Sortemose, e.A 4902	P. K. Christiansen, Kongsted.
3,8	1,96	19- 1	2	Elbo Val, r. 26508	Oscar Hansen, Andkær.
5,2	1,56	21- 2	70	ukendt	Svend Aage Jensen, Gårslev.
3,8	1,90	22- 1	45	Elbo Sortemose, e.A 4902	Poul Sørensen, Skærup.
4,3	1,83	7- 2	137	Nr. 57, f. 7-12-56	Anker Bohlbro, Højgård.
3,5	1,82	3- 1	96	ukendt	Cecil March, Erritsø.
4,3	1,97				

Hovedtabel 7. **Afkomsprøve for tyren Skov,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
33	14- 5-64	31-10	900	575	**6864**	**4,49**	**307,92**	**346**	**3,95**	**271**	293	293	1975	4323
44	16- 9-64	12-10	756	500	**6263**	**4,77**	**298,64**	**336**	**3,88**	**243**	312	312	1810	4300
40	21- 5-64	22- 9	854	523	**6239**	**4,78**	**298,43**	**336**	**3,95**	**246**	332	332	1769	4389
34	28- 3-64	23- 9	909	537	**6271**	**4,60**	**288,31**	**324**	**3,98**	**249**	331	331	1750	4395
49	27-12-63	10-10	1018	550	**5818**	**4,73**	**275,35**	**310**	**3,89**	**226**	314	314	1625	4114
42	14- 9-63	24-10	1136	539	**5742**	**4,67**	**268,41**	**302**	**3,90**	**224**	300	300	1565	3918
46	2- 7-64	17- 9	807	460	**5732**	**4,51**	**258,54**	**291**	**3,94**	**226**	337	337	1502	4023
38	11- 4-64	16- 9	888	583	**5808**	**4,27**	**247,79**	**278**	**3,72**	**216**	317	317	1470	3948
31	15-12-63	3-11	1054	621	**5310**	**4,62**	**245,26**	**276**	**3,96**	**210**	290	290	1400	3679
32	2-10-63	24-10	1118	565	**5736**	**4,14**	**237,30**	**266**	**4,02**	**231**	300	300	1395	3994
43	10- 9-64	24-10	774	465	**4885**	**4,79**	**233,94**	**264**	**3,92**	**191**	300	300	1221	3649
39	18- 1-64	11-11	1028	565	**5384**	**4,31**	**232,13**	**261**	**3,74**	**201**	282	282	1375	3666
45[1]	12- 2-64	27-10	988	564	**5100**	**4,50**	**229,39**	**258**	**4,02**	**205**	297	297	1277	3701
48	18- 4-64	4-11	930	590	**4762**	**4,77**	**226,96**	**256**	**3,91**	**186**	289	289	1158	3474
41	30- 9-63	28- 9	1094	596	**4631**	**4,70**	**217,44**	**245**	**3,93**	**182**	326	326	1097	3514
37	17- 4-64	27- 9	893	602	**4541**	**4,53**	**205,93**	**232**	**3,76**	**171**	320	320	1052	3448
36	12- 7-64	23-11	864	527	**4928**	**4,15**	**204,60**	**229**	**3,74**	**184**	270	270	1127	3407
50	12- 3-64	20-11	983	563	**4356**	**4,68**	**203,84**	**229**	**3,96**	**172**	273	273	1030	3242
47	5-10-64	29-10	754	508	**4169**	**4,51**	**187,85**	**211**	**3,98**	**166**	295	295	985	3377
Gns. af 19 kvier			934	549	**5397**	**4,55**	**245,69**	**276**	**3,90**	**211**	304	304	1399	3819

[1] Højre bagpatte stukket op.

Hovedtabel 8. **Afkomsprøve for tyren Randers Sortemose,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
61	24-11-63	6- 9	1017	590	**7547**	**4,35**	**327,96**	**368**	**3,78**	**285**	326	326	2175	4834
78	16- 7-64	27- 9	803	542	**6339**	**4,47**	**283,55**	**319**	**3,79**	**241**	305	305	1777	4088
62	8- 2-64	2- 9	937	620	**6411**	**4,41**	**282,72**	**318**	**4,01**	**257**	330	330	1801	4260
76	1-12-63	26- 9	1030	530	**6798**	**4,13**	**280,66**	**314**	**3,69**	**251**	306	306	1823	4167
74	19- 4-64	23- 9	887	578	**5872**	**4,75**	**278,98**	**314**	**3,98**	**234**	309	309	1665	4028
75	25- 2-64	20- 9	938	550	**6241**	**4,30**	**268,59**	**301**	**3,85**	**240**	312	312	1677	3990
72	14- 4-64	27-10	926	570	**6065**	**4,41**	**267,31**	**300**	**3,70**	**224**	275	275	1665	3853
64	20- 1-64	26- 9	980	608	**6039**	**4,26**	**257,35**	**289**	**3,82**	**231**	306	306	1617	4117
65	7- 1-64	26- 8	962	558	**5357**	**4,72**	**252,62**	**284**	**4,16**	**223**	337	337	1467	3973
69	2- 1-64	9- 9	981	600	**5540**	**4,51**	**249,60**	**281**	**3,92**	**217**	323	323	1413	3901
73	9- 2-64	16- 9	950	610	**5376**	**4,39**	**236,17**	**265**	**3,88**	**208**	316	316	1373	3751
67	10- 2-64	20- 9	953	572	**5541**	**4,18**	**231,67**	**260**	**3,73**	**207**	312	312	1301	3830
81	21- 7-64	10-11	842	537	**5099**	**4,53**	**230,88**	**260**	**4,09**	**209**	261	261	1353	3366
77	16- 2-64	1-10	958	566	**5133**	**4,10**	**210,34**	**236**	**3,59**	**184**	301	301	1178	3543
70	25- 1-64	14- 9	963	582	**4938**	**4,24**	**209,38**	**235**	**3,77**	**186**	318	318	1172	3510
66	7- 4-64	15- 9	891	670	**4745**	**4,36**	**206,76**	**232**	**3,91**	**186**	317	317	1195	3694
63	5- 7-64	4-11	852	650	**4293**	**4,82**	**206,71**	**233**	**4,02**	**172**	267	267	1106	3120
82[1]	29- 2-64	15-11	990	543	**4653**	**4,14**	**192,59**	**216**	**3,79**	**176**	256	256	1053	3197
80	11- 3-64	5-10	938	596	**4162**	**4,21**	**175,21**	**196**	**4,06**	**169**	297	297	896	3020
Gns. af 19 kvier			937	583	**5587**	**4,38**	**244,69**	**275**	**3,86**	**216**	304	304	1458	3802

[1] Alle patter stukket op.

s. 28333, på Lundgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,2	2,21	23- 6	73	Sverre, s. 4759	Henry Bisgaard, Klotrup.
4,2	1,99	24- 1	43	Ejbo, e.A 5034	Verner Nørhave, Haverslev.
3,2	2,33	5- 7	35	Ejbo, e.A 5034	Lundgaard Nielsen, Holme.
4,4	1,92	5- 1	86	Arvind, r. 26207	Frederik Haldrup, Sønderlade.
5,4	1,45	25- 1	166	Bilmann, r. 27127	Ejvind Lange, Ågård, Års.
5,4	1,41	2- 1	64	Rode, s. 4640	Ejnar Jacobsen, Overlade.
4,5	1,67	30- 6	36	Ejbo, e.A 5034	Ole Durup, Åle.
4,5	1,88	5-12	9	Rode, s. 4640	Arne Nørgaard, Bjørumslet.
4,9	1,64	25- 3	129	Sverre, s. 4759	Ingerslev Kristensen, Vesterbølle.
5,8	1,31	11- 1	23	Flak, s. 4366	Chr. Christensen, Fredbjerg.
6,5	1,13	23-12	44	Tom, r. 27958	Johannes Kristensen, Skivum.
6,8	1,10	18- 2	94	Bilmann, r. 27127	Chr. Mortensen, Svenstrup, Løgstør.
4,2	1,77	2- 1	6	Ejbo, e.A 5034	Jens Mogensen, Vesterbølle.
3,2	2,39	10- 3	90	Sverre, s. 4759	Kr. Sondrup, Tandrup.
4,0	1,81	—	39	Sverre, s. 4759	Lundgaard Nielsen, Holme.
4,6	1,69	14-12	11	Hauge, r. 26791	Egon Kjær Pedersen, Fjeldsø.
3,7	2,17	24- 5	34	ukendt	Søren Carlsen, Støttrup.
3,8	2,11	20- 1	75	Guldbjerg Ulvsager, s. 4703	Kjeld Aage Jørgensen, Nyrup.
8,2	0,92	30-12	46	Tom, r. 27958	Johannes Kristensen, Skivum.
4,8	1,73				

s. 28318, på Lundgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,0	2,98	28- 3	43	Midtsjællands Dan, s. 4605	Søren Støvring, Lem, Randers.
5,7	1,34	11- 4	19	Randers Ulvsager, e.A 4934	Karl Jørgensen, Dalbyneder.
3,7	2,20	12- 5[1]	74	Randers 47, e.A 4890	Egon Jensen, Fjelsted.
3,2	2,63	2- 3	33	Randers Flax, r. 26050	A. Sommer Thorsen, True.
4,1	1,95	24-12	65	Randers Lyn, s. 4801	Egon Jensen, Fjelsted.
4,2	1,88	2- 1	38	Randers 47, e.A 4890	Niels Nielsen, Lundby.
5,4	1,46	24- 1	39	Randers 47, e.A 4890	Hans Nielsen, Ålum.
2,9	3,14	2- 1	10	Randers Lyn, s. 4801	Schifter-Holm, Vilstrup.
3,7[2]	2,01[2]	17- 4	67	Randers Kjær, r. 26388	Peder Andersen, Tjærby.
4,4	1,71	3-12	34	Randers 47, e.A 4890	N. E. Lauridsen, Mørke.
3,4	2,28	11- 1	168	Eg, s. 4636	J. Roger Nielsen, Gimming.
3,2	2,48	26-12	72	Randers Kjær, r. 26388	N. J. Sørensen, Oustrup.
6,1	1,25	24- 3	19	Randers 47, e.A 4890	Marius Juncher, Dalbyover.
2,8	2,85	20- 2	57	Randers Flax, r. 26050	J. Levring Madsen, Værum.
3,8	1,94	—	26	Randers Ulvsager, e.A 4934	Niels Skjødt, Vestrup.
2,9	2,63	10-12	37	Randers Ulvsager, e.A 4934	V. Murmann & V. Henriksen, Bode Kro
3,6	2,21	3- 6	39	Kolding Rørby 45, e.A 4976	Niels Skjødt, Vestrup.
4,1	1,75	18- 1	41	Randers 47, e.A 4890	Niels Harbo, Havndal.
3,2	2,19	30- 1	67	Randers Flax, r. 26050	Tane Magnussen, Lindbjerg.
3,9	2,15				

[1] Kastet i maj efter ins. 17-1.
[2] Kun 1. måling.

Hovedtabel 9. **Afkomsprøve for tyren Samsø Frej,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
14	10- 8-64	19-10	800	508	**6025**	**4,85**	**292,33**	**329**	**3,87**	**233**	302	302	1859	4126
1	26- 8-64	23- 9	758	500	**6208**	**4,64**	**288,06**	**324**	**3,76**	**234**	328	328	1819	4128
17	10- 7-64	25-10	837	466	**5980**	**4,76**	**284,37**	**320**	**3,74**	**224**	296	296	1792	3905
10	17- 7-64	8-10	813	518	**5838**	**4,84**	**282,62**	**318**	**3,74**	**218**	313	313	1784	4040
15	8- 9-64	23-10	775	470	**5923**	**4,77**	**282,40**	**318**	**3,79**	**225**	298	298	1781	3980
13	19- 8-64	20-10	792	498	**6453**	**4,21**	**271,65**	**305**	**3,63**	**234**	301	301	1810	4047
16	25- 9-64	24-10	759	462	**5750**	**4,55**	**261,38**	**294**	**3,63**	**209**	297	297	1736	3801
6	9- 8-64	12-10	794	501	**5421**	**4,77**	**258,77**	**291**	**3,93**	**213**	309	309	1585	3807
18	26- 8-64	27-10	792	502	**5387**	**4,53**	**244,19**	**275**	**3,65**	**196**	294	294	1464	3623
3	2- 9-64	28- 9	756	480	**5525**	**4,38**	**242,12**	**272**	**3,63**	**201**	323	323	1449	3796
5	25- 7-64	6-10	803	530	**5268**	**4,54**	**239,02**	**269**	**3,79**	**200**	297	297	1484	3632
12	18- 9-64	19-10	761	478	**4830**	**4,85**	**234,43**	**264**	**3,93**	**190**	302	302	1300	3415
21	20- 9-64	13-10	753	482	**4507**	**4,75**	**213,95**	**241**	**3,84**	**173**	308	308	1164	3442
19	7- 8-64	2-11	817	564	**4559**	**4,65**	**212,14**	**239**	**3,87**	**177**	284	284	1212	3364
4	1- 9-64	10-10	769	578	**4581**	**4,57**	**209,53**	**236**	**3,90**	**179**	311	311	1138	3407
9	19- 7-64	18-10	821	536	**4355**	**4,64**	**202,07**	**227**	**4,04**	**176**	303	303	1092	3410
20	8-10-64	19-10	741	521	**3543**	**5,18**	**183,48**	**207**	**4,10**	**145**	298	298	856	3064
8	16- 9-64	9-10	753	532	**3902**	**4,61**	**179,73**	**202**	**3,90**	**152**	301	301	972	3190
Gns. af 18 kvier			783	507	**5225**	**4,66**	**243,46**	**274**	**3,80**	**199**	304	304	1461	3677

Hovedtabel 10. **Afkomsprøve for tyren Nordfyns Aman,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
14	3- 3-64	23-10	964	534	**6713**	**4,67**	**313,51**	**353**	**3,77**	**253**	281	281	2175	4040
6	25- 2-64	28- 8	915	604	**6798**	**4,61**	**313,33**	**352**	**3,75**	**255**	337	337	2043	4309
16	16- 9-64	17- 9	731	520	**7153**	**4,32**	**308,76**	**347**	**3,61**	**258**	317	317	2125	4253
7	28- 3-64	13- 9	899	564	**6283**	**4,58**	**288,06**	**324**	**3,74**	**235**	321	321	1885	4162
15	3- 8-64	22-10	810	528	**5456**	**4,60**	**250,92**	**282**	**3,85**	**210**	282	282	1596	3671
4	15- 5-64	14- 9	852	540	**5453**	**4,59**	**250,19**	**281**	**3,80**	**207**	320	320	1522	3742
11[1]	5- 5-64	4- 9	852	565	**5477**	**4,55**	**249,44**	**280**	**3,91**	**214**	329	329	1527	3836
12	1- 6-64	17- 9	838	564	**5562**	**4,45**	**247,35**	**278**	**3,78**	**210**	316	316	1562	3670
17[2]	7- 4-64	31-10	937	573	**4811**	**4,99**	**240,04**	**271**	**4,05**	**195**	273	273	1447	3222
2	2- 4-64	18- 9	899	585	**4694**	**5,10**	**239,58**	**270**	**4,11**	**193**	316	316	1325	3514
13	31- 3-64	16- 9	899	523	**4878**	**4,75**	**231,62**	**261**	**3,82**	**186**	318	318	1325	3634
10	14- 3-64	14-10	944	584	**4480**	**4,85**	**217,18**	**245**	**3,86**	**173**	290	290	1227	3210
5	29- 3-64	20-10	935	543	**4183**	**5,11**	**213,96**	**241**	**4,04**	**169**	284	284	1175	3160
19	25- 2-64	31- 8	918	500	**4632**	**4,58**	**212,30**	**239**	**3,74**	**173**	334	334	1265	3539
8	9- 4-64	25-10	929	570	**4452**	**4,71**	**209,80**	**236**	**3,94**	**175**	279	279	1269	3257
9	20- 3-64	8-11	963	562	**4489**	**4,67**	**209,43**	**236**	**3,63**	**163**	265	265	1256	3177
18	19- 6-64	20- 9	823	534	**4057**	**4,84**	**196,44**	**221**	**3,94**	**160**	314	314	976	3106
1	3- 5-64	14-10	894	603	**4040**	**4,70**	**189,88**	**214**	**3,95**	**159**	290	290	1019	3043
Gns. af 18 kvier			889	555	**5201**	**4,68**	**243,43**	**274**	**3,84**	**199**	304	304	1484	3586

[1] Højre forpatte stukket op efter pattetråd.
[2] Højre forpatte stukket op.

. 28442, på Samsø.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,4	1,99	21-12	68	Samsø Ørn, r. 26679	Bertel Jensen, Kolby.
3,5	2,32	23- 5[1]	13	Rik Vallensgård, s. 4796	Jens Kræmmer, Peterborgsgård.
4,0	2,03	29- 3	39	Samsø Rislev, s. 4860	Jakob M. Holm, Nordby.
4,4	1,85	2- 1	102	Samsø Karlhøj, r. 26680	Søren Bech Jensen, Dallykke.
4,2	1,94	27- 2	40	Samsø Pan, e.A 4968	Samuel Nielsen, Kolby Kås.
3,4	2,60	18- 3	35	Samsø Alfa, r. 26678	Martin Sørensen, Silleballe.
3,6	2,35	22- 2	53	Samsø Dux, e.B 4969	Tinna Ladefoged, Brundby Mark.
3,6	1,68	24- 3	35	Samsø Nova, r. 27852	Gunnar Olsen, Østerby.
4,2	1,98	30- 1	42	Samsø Rislev, s. 4860	Gunnar Johansen, Tanderup Mark.
4,2	1,88	11- 1	46	Rik Vallensgård, s. 4796	Johs. Søndergaard, Tranebjerg.
3,4	2,40	6-12	31	Samsø Bjørk, s. 4629	Ejner Petersen, Torupdal.
4,5	1,74	12- 6	71	Rik Vallensgård, s. 4796	Laurits Makne, Tanderup.
4,2	1,74	15- 3	95	Samsø Rislev, s. 4860	Vagn Møller, Besser.
4,0	2,01	19-12	21	Samsø Ørn, r. 26679	Rs. Foged Jensen, Mårup.
2,9	2,33	20- 2	43	Rik Vallensgård, s. 4796	Poul Weinreich, Nordby.
3,1	2,11	28-12	39	Samsø Karlhøj, r. 26680	Bent Snedker, Tranebjerg.
2,8	2,37	15-12	26	Samsø Rislev, s. 4860	Harry Vesth, Brundby.
5,7	1,29	10-12	62	Rik Vallensgård, s. 4796	Jens Thomsen, Tranebjerg.
3,9	2,03				

[1] Kastet i februar efter ins. 10-12.

. 28192, på Enemærket.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,4	1,53	10- 4	92	Nordfyns Vang, s. 4774	Jens Chr. Jensen, Rodstrup.
3,5	2,53	20- 1	27a	Nordfyns Vang, s. 4774	Johs. Andersen, Badstrup.
4,0	2,33	13- 1	86	Nordfyns Vang, s. 4774	Chr. Rasmussen, Skamby.
5,2	1,43	8- 5	58	Nordfyns Vang, s. 4774	P. Højvang Larsen, Lumby-Tårup.
5,5	1,39	3- 1	8	Nordfyns Stig, e.A 4988	N. Chr. Rasmussen, Nr. Nærå.
3,0	2,63	13-12	41	Nordfyns Lind, e.A 4948	N. P. Hansen, Stensby.
4,5	1,64	6-12	84	Skjern Tvind, r. 27804	Peder Christensen, Bladstrup.
5,0	1,50	1-12	86	Nordfyns Lind, e.A 4948	Peder Christensen, Bladstrup.
6,5	1,16	—	80	Nordfyns Lind, e.A 4948	Alf Burkall, Statsgården, Jullerup.
4,0	1,81	19-12	6	Nordfyns Vang, s. 4774	Karl Nielsen, Næsbyhoved-Broby.
3,4	2,18	9-12	14	Årup Ekstra, s. 4706	Kaj Jakobsen, Allesø Fredskov.
5,9	1,26	11- 2	88	Nordfyns Stig, e.A 4988	Peder Kaae, Bolmerod.
3,2	2,16	28-12	48	Nordfyns Vang, s. 4774	Sv. Aage Larsen, Allesø Nord.
2,7	2,82	3- 6	27b	Nordfyns Vang, s. 4774	Johs. Andersen, Badstrup.
3,3	2,52	9- 3	13	Nordfyns Stig, e.A 4988	Gunnar Jensen, Thorup.
5,1	1,52	6- 3	34	Nordfyns Vang, s. 4774	Herluf Pedersen, Bække.
3,1	2,20	14-12	11	Kerteminde Øst, r. 27454	Niels Aage Pedersen, Flødstrup.
6,7	1,16	10- 1	40	Kerteminde Ole, s. 4771	Kristian Nielsen, Degneløkken.
4,4	1,88				

Hovedtabel 11. **Afkomsprøve for tyren Skive Rajs**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
16	16- 3-64	15- 9	913	475	**7025**	**4,56**	**320,38**	**360**	**3,75**	**263**	323	323	2068	4584
10	4- 5-64	21- 9	870	501	**6456**	**4,88**	**314,80**	**355**	**3,83**	**247**	317	317	1889	4419
9	25- 3-64	13- 9	902	561	**6353**	**4,63**	**294,02**	**331**	**3,85**	**244**	325	325	1806	4344
13	7-12-63	24- 9	1022	539	**6287**	**4,42**	**278,03**	**312**	**3,72**	**234**	314	314	1666	4141
14	28- 3-64	10-10	926	572	**5408**	**5,01**	**270,72**	**305**	**3,90**	**211**	298	298	1546	3960
18	2- 3-64	15-10	957	515	**5430**	**4,86**	**263,80**	**297**	**3,93**	**214**	293	293	1498	3836
12	8- 5-64	5-11	911	488	**6151**	**4,23**	**260,25**	**292**	**3,53**	**217**	272	272	1598	3866
6	25- 3-64	23- 9	912	502	**5579**	**4,58**	**255,76**	**288**	**3,54**	**198**	315	315	1454	3918
15[1]	26- 8-64	27- 9	762	507	**5104**	**4,95**	**252,60**	**285**	**3,87**	**198**	311	311	1359	3921
3	14- 3-64	13-10	943	494	**5372**	**4,66**	**250,23**	**282**	**3,78**	**203**	295	295	1434	3570
8	24- 2-64	20- 9	939	515	**5032**	**4,64**	**233,52**	**263**	**3,99**	**201**	318	318	1220	3764
19	14- 5-64	9-10	878	539	**4899**	**4,76**	**233,28**	**263**	**3,93**	**193**	299	299	1258	3614
17	11- 5-64	1-10	873	489	**4689**	**4,74**	**222,15**	**250**	**3,80**	**178**	295	295	1155	3394
4[2]	8- 3-64	29- 9	935	543	**4688**	**4,61**	**216,24**	**243**	**3,87**	**181**	309	309	1105	3552
7	10- 3-64	1-10	935	575	**4656**	**4,59**	**213,84**	**241**	**4,07**	**190**	307	307	1065	3470
5	31- 3-64	29- 9	912	509	**4904**	**4,31**	**211,33**	**237**	**3,72**	**182**	309	309	1142	3598
11	23- 4-64	30-10	920	528	**3608**	**4,74**	**170,86**	**192**	**4,05**	**146**	278	278	740	2894
20	9- 5-64	2-11	907	477	**3634**	**4,49**	**163,03**	**183**	**3,73**	**136**	275	275	725	2872
1	26- 5-64	18- 9	845	528	**3509**	**4,54**	**159,43**	**179**	**3,76**	**132**	320	320	655	3225
Gns. af 19 kvier			909	519	**5199**	**4,64**	**241,28**	**271**	**3,81**	**198**	304	304	1336	3734

[1] Venstre bagpatte stukket op.
[2] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 12. **Afkomsprøve for tyren Ringkøbing Holm**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
9	7- 3-64	28- 9	935	564	**7155**	**4,39**	**313,95**	**353**	**3,71**	**265**	313	313	2203	4387
5	28- 3-64	22- 9	908	583	**6352**	**4,61**	**293,12**	**330**	**3,72**	**237**	319	319	1927	4226
1	18-11-63	7- 9	1024	551	**6259**	**4,56**	**285,46**	**321**	**3,97**	**248**	334	334	1868	4446
14	10- 1-64	30-10	1024	565	**6878**	**4,15**	**285,42**	**320**	**3,71**	**255**	281	281	2050	4148
15	8- 6-64	12- 9	826	580	**6663**	**4,25**	**282,93**	**317**	**3,65**	**243**	329	329	1918	4232
18	30- 8-64	8-11	800	573	**5761**	**4,39**	**253,11**	**284**	**3,85**	**222**	272	272	1703	3766
8	5- 3-64	25-10	964	563	**5644**	**4,46**	**251,96**	**283**	**3,68**	**208**	286	286	1677	3650
16	23- 4-64	16- 9	876	588	**5441**	**4,49**	**244,37**	**275**	**3,75**	**204**	317	317	1556	3908
3[1]	5-11-63	14-10	1074	583	**5621**	**4,27**	**240,26**	**270**	**3,87**	**217**	297	297	1561	3857
11	23- 2-64	10-11	991	543	**4818**	**4,95**	**238,67**	**269**	**4,04**	**195**	270	270	1504	3485
2	18- 5-64	20- 9	855	593	**4978**	**4,34**	**216,27**	**243**	**3,90**	**194**	321	321	1292	3587
7	3- 9-64	29-10	786	547	**4799**	**4,21**	**202,12**	**227**	**3,49**	**168**	282	282	1298	3395
10	30- 4-64	9- 9	862	628	**4756**	**4,21**	**200,29**	**225**	**3,82**	**182**	332	332	1178	3569
17	23- 5-64	14-10	874	586	**4069**	**4,61**	**187,50**	**211**	**3,83**	**156**	297	297	1035	3244
6	17- 6-64	3-10	838	619	**4200**	**4,44**	**186,27**	**209**	**3,83**	**161**	308	308	1106	3273
12[1]	7- 4-64	17- 9	893	593	**3474**	**4,88**	**169,60**	**191**	**4,09**	**142**	302	302	898	3021
Gns. af 16 kvier			908	579	**5429**	**4,43**	**240,71**	**270**	**3,79**	**206**	304	304	1548	3762

[1] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

. 28097, på Krarup Nygård.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,6	1,80	31-12	52	Skive Vink, e.A 4936	Chr. Pedersen, Nørby.
4,6	1,81	1- 2	28	ukendt	Gunnar Juul Jacobsen, Glynge.
3,7	2,25	10- 2	72	ukendt	Harald Jensen, Rødding.
5,4[1]	1,43[1]	19-12	44	Skive Vink, e.A 4936	Johs. Goul Møller, Hem.
2,5	3,34	25- 2	157	Elok, s. 4845	Chr. Østergaard, Tolstrupgård.
3,4	2,46	25- 1	33	Skive Vink, e.A 4936	Laurits Nejsum, Gamstrup.
4,4	1,94	16- 1	52	Toke, s. 4802	Søren Kr. Meldgaard, Kjeldbjerg.
2,9	2,81	15-12	34	Elsø, r. 25807	Elna Kristensen, Hem.
3,1	2,53	21-12	26	Skive Vink, e.A 4936	Søren Pedersen, Hestbæk.
3,3	2,50	4- 4	6	Thor, s. 4697	Vilhelm Kjærsgaard, Vejby.
3,7	1,95	16- 1	40	Thor, s. 4697	Otto Boel Nielsen, Intrup.
3,4	2,21	19- 1	47	Elok, s. 4845	Agner Nørgaard, Håsum.
5,9	1,23	25-11	36	Elsø, r. 25807	Karl Poulsen, Kisum.
5,2	1,46	23- 1	33	Thor, s. 4697	Frits Krejberg, Krejbjerg.
3,9	1,99	11- 1	8	Skive Mark, r. 27183	Vilhelm Kjærsgaard, Vejby.
5,0	1,50	18- 4	28	Toke, s. 4802	Kr. Pedersen, Hinnerup.
4,2	1,66	13- 3	43	Årup Kevo, s. 4516	Viggo Jessen Pedersen, Lihme.
5,6	1,34	28- 2	28	Kris, s. 4358	Henry Tang, Fly.
5,2	1,38	1- 3	96	Skive Vink, e.A 4936	Svenning Nielsen, Ramsing.
4,2	1,98				

[1] Kun 1. måling.

. 28323, på Lægård.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,8	1,31	22-12	69	No Brethvig, s. 4432	Kr. Hykkelbjerg, Lem.
4,0	2,03	20-12	78	No Brethvig, s. 4432	Oluf Østergaard, Ølstrup.
3,2	2,60	23-12	36	Ringkøbing Ørnsvig, e.A 4894	Axel Jørgensen, Holmsland.
4,6	1,86	—	35	Ringkøbing Vest, e.A 4970	Jens S. Bjerg, Holmsland.
3,6	2,34	4- 4	59	Nr. 24, f. 12-1-50	Tage Nielsen, Holmsland.
5,9	1,26	8- 2	99	No Brethvig, s. 4432	Oluf Østergaard, Ølstrup.
4,9	1,68	14- 2	20	No Brethvig, s. 4432	Jens Lauridsen, Hover.
3,0	2,66	5-12	96	Skjern Sverre, r. 26471	Oluf Østergaard, Ølstrup.
6,4	1,15	8- 2	118	Ringkøbing Vest, e.A 4970	Mads Lambæk, Lem.
5,4	1,42	29- 5	90	Bro, e.B 4877	Tage Nielsen, Holmsland.
3,6	2,02	20- 1	92	Ringkøbing Ørnsvig, e.A 4894	Marius Korsholm, Stadil.
4,2	1,92	27- 5	5	Ringkøbing Laus, e.A 5038	Tage Nielsen, Holmsland.
4,1	1,78	16-12	40	Kær, s. 4700	Jens J. Hindhede, Ølstrup.
2,6	2,65	23-12	27	Ringkøbing Vest, e.A 4970	Peder Provstgaard, No.
3,5	2,05	27-12	44	Hadsten Wahl, e.A 4940	Jens J. Hindhede, Ølstrup.
2,9	2,05	18-11	110	Ringkøbing Ørnsvig, e.A 4894	Mads Lambæk, Lem.
4,2	1,92				

Hovedtabel 13. Afkomsprøve for tyren Åbenrå Øbo

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
3	15- 1-64	29- 9	988	570	**7551**	**4,18**	**315,69**	**354**	**3,73**	**282**	311	311	2252	466
1	6-12-63	7- 9	1006	585	**6783**	**4,27**	**289,91**	**325**	**3,74**	**254**	333	333	1917	461
2	19-12-63	23-10	1039	587	**6597**	**4,35**	**286,84**	**322**	**3,54**	**233**	287	287	1951	427
10[1]	26- 4-64	29- 9	886	535	**5852**	**4,56**	**266,81**	**300**	**3,89**	**227**	311	311	1715	421
21	15- 3-64	30-10	959	569	**6384**	**4,14**	**264,01**	**296**	**3,61**	**231**	280	280	1821	402
11	1- 4-64	26- 9	908	520	**5495**	**4,76**	**261,31**	**294**	**4,08**	**224**	314	314	1610	397
14	31- 3-64	1-10	914	508	**6102**	**4,18**	**255,06**	**286**	**3,81**	**233**	309	309	1718	417
12	27- 2-64	22- 9	938	491	**5767**	**4,40**	**253,93**	**285**	**3,72**	**214**	318	318	1595	398
19	13- 4-64	11-10	911	515	**5733**	**4,35**	**249,16**	**280**	**3,71**	**212**	299	299	1635	400
8	3- 4-64	9-10	919	573	**5730**	**4,25**	**243,49**	**273**	**3,82**	**219**	301	301	1569	393
13	4- 4-64	25-10	934	492	**5163**	**4,62**	**238,45**	**268**	**4,01**	**207**	285	285	1506	382
9	19- 1-64	19-11	1035	538	**5526**	**4,22**	**233,28**	**262**	**3,76**	**208**	260	260	1565	362
18	21- 4-64	16- 9	878	498	**5559**	**4,17**	**231,64**	**260**	**3,94**	**219**	324	324	1387	403
7	26- 2-64	16-10	963	563	**5360**	**4,32**	**231,56**	**260**	**3,90**	**209**	294	294	1456	375
16	26- 3-64	20-10	938	556	**5604**	**4,02**	**225,21**	**252**	**3,61**	**202**	290	290	1457	380
20	27- 1-64	17- 9	964	535	**4960**	**4,49**	**222,66**	**250**	**3,78**	**187**	323	323	1322	385
5	20- 2-64	9- 9	932	605	**4588**	**4,54**	**208,35**	**234**	**4,26**	**195**	331	331	1174	383
4	27- 1-64	2-10	979	630	**4236**	**4,89**	**207,05**	**233**	**4,18**	**177**	308	308	1137	365
6	1- 1-64	4-10	1007	628	**4339**	**4,45**	**193,15**	**217**	**4,07**	**177**	306	306	1119	346
17	28- 2-64	6-10	951	548	**4240**	**4,34**	**183,86**	**206**	**4,00**	**170**	304	304	1029	343
15	19- 1-64	4-10	989	548	**3864**	**4,58**	**177,02**	**199**	**4,00**	**154**	306	306	976	331
Gns. af 21 kvier			954	552	**5497**	**4,36**	**239,93**	**269**	**3,84**	**211**	304	304	1520	392

[1] Venstre forpatte stukket op efter pattetråd.

Hovedtabel 14. Afkomsprøve for tyren Haslev Odin

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
6	31- 7-64	10-10	801	561	**6797**	**4,64**	**315,72**	**355**	**3,79**	**258**	306	306	1987	446
10	3- 2-64	10- 9	950	576	**5950**	**4,60**	**273,61**	**308**	**3,81**	**227**	316	316	1659	405
7	23- 2-64	23- 9	943	569	**6565**	**4,11**	**269,61**	**302**	**3,77**	**248**	323	323	1740	420
12	14- 4-64	20- 9	889	600	**5659**	**4,73**	**267,66**	**301**	**3,92**	**222**	326	326	1538	410
14	10- 6-64	23-10	865	568	**5759**	**4,40**	**253,66**	**285**	**3,75**	**216**	293	293	1555	385
20	4- 7-64	28- 9	816	567	**5769**	**4,38**	**252,74**	**284**	**3,84**	**221**	318	318	1514	382
8	5- 7-64	17- 9	804	516	**5502**	**4,46**	**245,33**	**276**	**3,82**	**210**	329	329	1407	393
17	11- 5-64	8- 9	850	536	**5049**	**4,78**	**241,40**	**272**	**3,97**	**200**	338	338	1307	375
9	13- 7-64	14- 9	793	566	**5510**	**4,36**	**240,40**	**270**	**3,89**	**214**	332	332	1368	388
4	1-10-64	6-11	766	534	**5403**	**4,44**	**239,76**	**269**	**3,79**	**205**	279	279	1433	356
13	9- 6-64	28-10	871	563	**5119**	**4,66**	**238,31**	**268**	**3,86**	**197**	288	288	1378	349
5	22- 2-64	13-11	995	525	**5141**	**4,57**	**234,74**	**264**	**3,92**	**202**	272	272	1468	357
15	22-10-64	8-10	716	500	**4753**	**4,36**	**207,38**	**233**	**3,65**	**173**	308	308	1391	342
11	30-11-63	25- 9	1030	582	**4424**	**4,69**	**207,35**	**233**	**3,96**	**175**	321	321	1042	350
18	16- 3-64	24-10	952	555	**4188**	**4,86**	**203,35**	**229**	**4,09**	**171**	279	279	1061	341
16	20- 8-64	4-11	806	580	**4368**	**4,63**	**202,04**	**227**	**3,80**	**166**	281	281	1078	328
3	25- 7-64	4-11	832	534	**4720**	**4,10**	**193,56**	**217**	**3,87**	**182**	281	281	1149	339
2	21- 1-64	2-11	1016	566	**3593**	**4,64**	**166,54**	**187**	**4,24**	**152**	283	283	787	298
Gns. af 18 kvier			872	555	**5237**	**4,51**	**236,29**	**266**	**3,86**	**202**	304	304	1381	370

s. 28100, på Moesgård.

Malketid i min.	Malkbarhedstal	Drægtigden	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,6	1,41	14- 3[1]	33	Åbenrå Lang, r. 27041	Holger Rasmussen, Søst.
5,3	1,46	18- 5	40	Åbenrå Al, r. 25433	Magnus Hansen, Abild.
9,8	0,39	28- 2	75	Åbenrå Ulv, s. 4738	Mads M. Callø, Genner.
8,3	0,74	3- 2	35	Rødding Leo, s. 4853	Otto Olesen, Skovby Mark.
6,1	1,25	14- 3	181	Åbenrå Vig, e.B 4887	Chr. Skøtt Steffensen, Smedager.
3,4	2,34	28- 4	64	Åbenrå Ulv, s. 4738	Mads M. Callø, Genner.
7,0	1,02	18- 2	64	Åbenrå Vig, e.B 4887	Marquard Thomsen, V. Terp.
5,1	1,51	16- 1	99	Åbenrå Al, r. 25433	Michael Hansen, Sdr. Vollum.
5,3	1,49	9- 2	87	Åbenrå Vig, e.B 4887	Martha Andersen, Bolderslev.
6,0	1,19	4- 3	56	Åbenrå Erik, s. 4739	Falle Lildholdt, Løjt-Kirkeby.
5,8	1,29	—	77	Åbenrå Rørby, r. 26783	Mathias Møller, V. Terp.
6,2	1,18	28- 1	50	Olaf, s. 4809	Jørgen Callesen, Sdr. Hostrup.
4,8	1,60	12- 1	80	Gran, s. 4691	Gunnar Andersen, Jejsing.
5,4	1,32	25- 3	50	Åbenrå No. r. 26586	Chr. Iversen, Horsbyg.
4,9	1,56	25- 3	8	Åbenrå Ager, r. 26585	Johan Clausen, Bjerndrup.
5,6	1,25	10-12	73	Åbenrå Ulv, s. 4738	Ebbe Hansen, Bolderslev.
6,0	1,20	28- 1	11	Åbenrå Høj, r. 26222	Tage Nissen, Horsbyg.
6,2	1,21	4- 2	23	Åbenrå Ulv, s. 4738	Hans J. Jørgensen, Søst.
3,6	2,11	17- 1	132	Åbenrå Ulv, s. 4738	Michael Hansen, Sdr. Vollum.
6,3	1,12	10-12	30	Åbenrå Holm, r. 26223	Hans Erichsen, Lunderup.
5,4	1,32	19-12	135	Åbenrå Ager, r. 26585	Th. Møller, Ø. Terp.
5,8	1,33				

[1] Kastet 1-6.

s. 28485, på Sydsjælland.

Malketid i min.	Malkbarhedstal	Drægtigden	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,9	1,74	28-12	92	Haslev Hers, s. 4610	Knud Christoffersen, Bråby.
4,6	1,60	25-11	19	Haslev Pau, r. 26810	Henry Rasmussen, Høsten.
4,2	1,93	23- 1	60	Sverre, s. 4759	Knud Christoffersen, Bråby.
5,0	1,46	30- 1	61	Haslev Birk, e.B 4891	Sophus Jørgensen, Teestrup.
6,3	1,17	14- 1	5	Kørbitz Næstved, s. 4172	Aage Larsen, Bråby.
5,7	1,23	30-12	91	Haslev Et, s. 4777	K. E. Møller, Konradsfeld.
4,3	1,72	23-12	33	Talent, r. 22245	Niels Nielsen, Førslev.
5,2	1,37	26- 1	14	Haslev Et, s. 4777	Peder O. Hansen, Kæderup.
4,4	1,71	13- 1	91	Haslev Pau, r. 26810	Otto Pedersen, Kallehavegd., Haslev.
4,0	2,07	1- 3[1]	97	Haslev Et, s. 4777	Frode Hansen, Høsten.
6,7	0,90	4- 3	73	Haslev Jarl, r. 27074	Ejgil Andersen, Terslev.
5,0	1,53	8- 1	69	Haslev Et, s. 4777	N. Tingleff, Gisselfeld.
4,7	1,61	22- 2	105	Midtsjællands Dan, s. 4605	Arne Lysholm, Nr. Dalby.
4,0	1,72	11- 4[2]	2	Haslev Golf, r. 26811	Peder O. Hansen, Kæderup.
4,2	1,79	5-12	22	Haslev Et, s. 4777	Ejnar Hansen, Tågerup.
5,2	1,39	13- 1	11	Haslev Et, s. 4777	Knud Christoffersen, Bråby.
5,3	1,56	13- 3	16	Haslev Et, s. 4777	Frede Nielsen, Aversi.
4,0	1,68	8- 3	68	Stevns Højvig, s. 4599	Kaj Jensen, Førslev.
4,9	1,57				

[1] Kastet i februar efter ins. 28-12.
[2] » » » » » 1-12.

Hovedtabel 15. **Afkomsprøve for tyren Hjørring Eli,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
16	20- 3-64	12- 9	906	583	**6052**	**4,66**	**281,95**	**317**	**3,77**	**228**	321	321	1824	4109
11	28- 4-64	23- 9	878	542	**6637**	**4,21**	**279,32**	**313**	**3,67**	**244**	310	310	1884	3995
7	10- 2-64	29- 9	962	511	**5499**	**4,82**	**265,22**	**299**	**3,96**	**218**	304	304	1685	3808
2	18- 3-64	14- 9	910	453	**5808**	**4,49**	**260,91**	**293**	**3,64**	**212**	319	319	1662	3921
9	17-12-63	9- 9	997	580	**5733**	**4,55**	**260,69**	**293**	**3,80**	**218**	324	324	1655	3997
13	8- 3-64	31-10	967	506	**5617**	**4,55**	**255,65**	**287**	**3,64**	**205**	272	272	1675	3731
1	8- 2-64	11- 9	946	502	**5323**	**4,61**	**245,58**	**276**	**3,56**	**189**	322	322	1528	3908
12	16-12-63	22-10	1041	614	**5401**	**4,44**	**240,03**	**270**	**3,84**	**207**	281	281	1559	3670
3	25- 2-64	22- 9	940	598	**5451**	**4,30**	**234,29**	**263**	**3,58**	**195**	311	311	1508	3747
18	2- 8-64	15-11	835	520	**4774**	**4,82**	**229,93**	**259**	**3,77**	**180**	257	257	1413	3297
21	21- 2-64	19- 9	941	582	**4769**	**4,78**	**228,10**	**257**	**3,82**	**182**	314	314	1314	3633
15	22- 5-64	6-10	867	516	**5037**	**4,53**	**227,98**	**256**	**3,66**	**184**	297	297	1356	3384
17	13- 4-64	18-10	918	528	**4341**	**4,90**	**212,57**	**240**	**4,00**	**174**	285	285	1225	3243
8	16- 5-64	10-10	877	528	**4238**	**4,81**	**203,86**	**230**	**3,93**	**166**	293	293	1132	3138
10	31-12-63	13- 9	987	533	**4724**	**4,29**	**202,89**	**228**	**3,79**	**179**	320	320	1184	3504
4	25- 2-64	21- 9	939	553	**4547**	**4,12**	**187,50**	**210**	**3,54**	**161**	312	312	1079	3323
20[1]	18- 9-63	13- 9	1091	595	**3843**	**4,74**	**182,35**	**205**	**3,84**	**148**	320	320	1047	3373
Gns. af 17 kvier			941	544	**5164**	**4,55**	**235,22**	**265**	**3,75**	**194**	304	304	1455	3634

[1] Alle patter blokket op.

Hovedtabel 16. **Afkomsprøve for tyren Skærup Karlby,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
35	15- 3-64	23-10	952	538	**5956**	**4,62**	**274,93**	**309**	**4,03**	**240**	301	301	1791	3917
38	17- 7-64	9-10	814	489	**6025**	**4,56**	**274,50**	**309**	**3,76**	**226**	315	315	1771	4051
36	4- 3-64	29- 9	939	523	**5611**	**4,66**	**261,25**	**294**	**3,89**	**218**	325	325	1639	3816
31	2- 5-64	6-11	918	530	**6325**	**4,01**	**253,34**	**284**	**3,57**	**226**	287	287	1781	3881
33	29-12-63	25- 9	1001	560	**6280**	**4,02**	**252,53**	**283**	**3,58**	**225**	329	329	1701	4106
39[1]	27- 3-64	20- 9	907	530	**5961**	**4,10**	**244,27**	**274**	**3,65**	**217**	320	320	1614	3896
46	3- 3-64	9-11	981	489	**5196**	**4,55**	**236,22**	**266**	**3,80**	**197**	284	284	1514	3532
34	25- 3-64	6- 9	895	515	**5067**	**4,62**	**234,18**	**263**	**3,53**	**179**	348	348	1364	3752
41[2]	30- 3-64	15-10	929	512	**5361**	**4,36**	**233,86**	**263**	**3,82**	**205**	309	309	1488	3699
32	1-10-63	5-11	1131	536	**5081**	**4,51**	**228,95**	**257**	**3,51**	**179**	288	288	1425	3644
45	14-11-63	9- 9	1030	522	**4925**	**4,64**	**228,30**	**257**	**3,73**	**184**	324	324	1423	3763
37	10- 4-64	30- 9	903	546	**5249**	**4,20**	**220,64**	**247**	**3,80**	**199**	324	324	1357	3715
44	30- 5-64	19-11	903	486	**5990**	**3,63**	**217,22**	**242**	**3,35**	**201**	274	274	1567	3468
42	18- 5-64	6-12	932	528	**4572**	**4,69**	**214,54**	**241**	**3,76**	**172**	257	257	1354	3256
47	24- 3-64	4-12	985	538	**4729**	**4,47**	**211,17**	**237**	**3,66**	**173**	259	259	1326	3157
40	13- 4-64	9-10	909	551	**3751**	**4,52**	**169,53**	**191**	**3,96**	**149**	315	315	938	3271
Gns. af 16 kvier			946	525	**5380**	**4,36**	**234,71**	**264**	**3,71**	**199**	304	304	1503	3683

[1] Højre bagpatte stukket op.
[2] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

r. 27877, på Dybvad.

Malketid i min.	Malkbarhedstal	Drægtigden	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,8	2,18	2- 3	53	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Gunnar Christensen, Ejersted.
4,2	2,13	29-12	58	Hjørring No, s. 4806	P. Juhl Olesen, L. Nibstrup, Brl.
5,8	1,33	5- 1	95	Hjørring Leif, e.B 4911	Jens Budolfsen, Tårs.
4,8	1,66	15- 2	36	Hjørring Gert, r. 27639	Søren Christensen, Harridslev.
2,8	2,92	12-12	59	Hjørring No, s. 4806	Ths. Nørgaard, Agersted.
7,0	1,01	6- 5	38	Mors, s. 4688	Peder Sloth, Thise, Manna.
5,0	1,53	24- 1	5	ukendt	Otto Thomsen, Mølskov.
5,3	1,52	28- 1	78	Hjørring Sortemose, r. 26486	Svend Moltsen, Serritslev.
5,0	1,57	26-12	122	Nr. 86, Malm, f. 25-11-50	Valdemar Andersen, Morild.
5,6	1,41	16- 2	41	Hjørring No, s. 4806	Tage Abrahamsen, S. Harridslev.
5,0	1,53	21-12	14	Hjørring Sortemose, r. 26486	Kr. Kibsgaard Nielsen, Dronninglund.
3,4	2,24	29- 4	19	ukendt	Søren Bundgaard, Ålstrup.
6,1	1,20	14- 3	6	Hjørring Sortemose, r. 26486	Martin Olesen, Ilbro.
3,6	2,10	15- 4	4	Saltum Uffe, r. 26880	Niels P. Kræmmergaard, Saltum.
4,3	1,72	10- 1	52	Munk 26, s. 4625	P. Juhl Olesen, L. Nibstrup, Brl.
3,8	1,95	6- 2	122	Nr. 86, Malm, f. 25-11-50	Valdemar Andersen, Morild.
4,8	1,44	19- 1	21	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Poul Mathiasen, Hørby.
4,7	1,73				

s. 28039, på Lægård.

Malketid i min.	Malkbarhedstal	Drægtigden	Moder nr.	Morfader	Ejer
6,8	1,00	4- 7	21	Årup Søby, r. 25245	Børge Deleuran, Egeskov.
3,6	2,37	27- 2	46	Lyshøj, f. 1959	Holger Riis, Børkop.
4,1	1,88	—	94	Elbo Sortemose, e.A 4902	P. L. Juul, Sdr. Vilstrup.
4,0	2,10	15- 4	86	Vejle Dam, s. 4862	Søstrene Bentzen, Styvelgård.
3,9	2,08	31-12	98	Vejle Birk, s. 4698	Søstrene Bentzen, Styvelgård.
5,4	1,46	13-12	34	Vejle Birk, s. 4698	Finn Klemmensen, Bredal.
4,9	1,63	31- 1	194	Nr. 76, f. 28-2-50	Arne Winther, Kollerup.
3,1	2,21	19- 1	88	Ødsted Vej, r. 26489	Gunnar Sørensen, Egtved.
4,9	1,60	18- 1	96	Vejle Ørn, r. 25760	Arne Sørensen, Ulkjær.
3,4	2,45	17- 1	17	Elbo Sortemose, e.A 4902	Svend Hansen, Henneberg Ladegård.
4,4	1,70	6-12	97	Elbo Hoff, r. 26201	Oscar Hansen, Andkær.
3,4	2,25	11- 3	84	Ødsted Loke, r. 26490	Gunnar Sørensen, Egtved.
6,0	1,25	8- 2	46	Højvig 16, s. 4618	Ebbe Mikkelsen, Hornstrup.
4,7	1,67	13- 3	84	Nr. 11, f. 1-12-52	Kr. Mogensen, Vindelev.
8,2	0,87	7- 3	39	Vejle Birk, s. 4698	Finn Klemmensen, Bredal.
3,0	2,18	27-12	90	Kerteminde Ulv, s. 4517	Troels Arentsen, Pjedsted.
4,6	1,79				

Hovedtabel 17. **Afkomsprøve for tyren Rødding Ursus,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
1	4- 3-64	12- 9	922	532	**6372**	**4,78**	**304,86**	**343**	**3,79**	**241**	321	321	1961	4505
8	25- 8-64	4-10	770	518	**5628**	**5,26**	**295,95**	**334**	**3,87**	**218**	299	299	1822	4021
9	9- 7-64	19- 9	802	506	**5629**	**5,04**	**283,67**	**320**	**3,72**	**209**	314	314	1692	4207
2	14- 5-64	16- 9	855	491	**5272**	**4,96**	**261,72**	**295**	**3,90**	**205**	317	317	1523	4081
19[1]	9- 6-64	29- 8	811	496	**5310**	**4,88**	**259,01**	**292**	**3,82**	**203**	335	335	1621	3940
5	28- 4-64	29- 9	884	479	**5315**	**4,84**	**257,20**	**290**	**3,82**	**203**	304	304	1516	3949
15	24- 8-64	31-10	798	489	**5624**	**4,50**	**252,88**	**284**	**3,58**	**201**	272	272	1579	3851
3	7- 3-64	28- 9	935	524	**5237**	**4,74**	**248,41**	**280**	**3,92**	**205**	305	305	1416	3882
7	13- 5-64	18- 9	858	484	**4851**	**5,02**	**243,52**	**275**	**3,96**	**192**	315	315	1390	3861
20	23- 5-64	30- 8	829	503	**5122**	**4,68**	**239,53**	**270**	**3,67**	**188**	334	334	1539	4227
10	4- 4-64	30- 9	909	515	**4960**	**4,72**	**234,33**	**264**	**3,89**	**193**	303	303	1347	3800
6	28- 3-64	12- 9	898	534	**4707**	**4,82**	**226,83**	**256**	**3,90**	**184**	321	321	1215	3854
4	26- 3-64	14- 9	902	480	**4799**	**4,69**	**224,84**	**253**	**3,77**	**181**	319	319	1259	3618
17	20- 8-64	26-10	797	500	**4737**	**4,50**	**213,27**	**240**	**3,76**	**178**	277	277	1259	3478
14	7- 4-64	22- 8	867	452	**4363**	**4,74**	**206,83**	**233**	**3,80**	**166**	328	328	1269	3643
16	8- 4-64	3-11	939	493	**3813**	**4,74**	**180,68**	**203**	**3,84**	**146**	269	269	922	3094
12	12- 7-64	1-11	842	528	**3352**	**4,83**	**161,80**	**182**	**3,99**	**134**	271	271	756	3081
13	4- 5-64	27-10	906	527	**2840**	**4,46**	**126,67**	**142**	**3,77**	**107**	276	276	659	2744
Gns. af 18 kvier			862	503	**4885**	**4,80**	**234,56**	**264**	**3,82**	**186**	304	304	1375	3769

[1] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 18. **Afkomsprøve for tyren Ribe Aks,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
49	25- 5-64	15- 9	843	512	**6335**	**4,61**	**292,31**	**329**	**3,75**	**238**	318	318	1927	4081
39	19- 7-64	16- 9	789	489	**6088**	**4,44**	**270,51**	**304**	**3,89**	**237**	317	317	1780	4010
33	12- 5-64	6- 9	847	519	**6191**	**4,25**	**263,34**	**295**	**3,61**	**224**	327	327	1716	3788
43	14- 8-64	26-10	803	508	**6146**	**3,99**	**245,24**	**274**	**3,65**	**224**	277	277	1711	3658
37	30- 5-64	30- 9	853	528	**5934**	**4,12**	**244,41**	**274**	**3,69**	**219**	303	303	1607	3714
34	6- 6-64	14- 9	830	529	**6092**	**3,98**	**242,27**	**271**	**3,63**	**221**	319	319	1601	3909
41	23- 5-64	15- 9	845	523	**5786**	**4,18**	**241,68**	**271**	**3,98**	**230**	318	318	1556	3800
42	24- 5-64	22- 9	851	518	**5414**	**4,43**	**239,63**	**269**	**3,91**	**212**	311	311	1496	3797
35	17- 5-64	22- 9	858	529	**6109**	**3,86**	**235,80**	**264**	**3,69**	**226**	311	311	1589	3956
31	5- 7-64	8-10	825	482	**5735**	**4,10**	**235,29**	**264**	**3,51**	**201**	295	295	1515	3596
45	6- 7-64	14- 9	800	499	**5256**	**4,31**	**226,35**	**254**	**3,83**	**201**	319	319	1394	3729
48	24- 5-64	10- 9	839	454	**5745**	**3,92**	**225,34**	**252**	**3,55**	**204**	323	323	1418	3574
38	10- 5-64	30- 8	842	541	**5633**	**3,94**	**222,00**	**248**	**3,60**	**203**	334	334	1435	3782
47	29- 5-64	7-10	861	454	**5470**	**4,05**	**221,74**	**248**	**3,64**	**199**	296	296	1428	3546
46	13- 5-64	28- 9	868	510	**4875**	**4,51**	**219,75**	**247**	**3,99**	**194**	305	305	1352	3488
44	30- 7-64	25-10	817	552	**4746**	**4,54**	**215,27**	**242**	**3,68**	**175**	278	278	1326	3298
51	15- 5-64	3-11	902	480	**4954**	**4,33**	**214,73**	**241**	**3,61**	**179**	269	269	1366	3370
50	17- 7-64	26-10	831	488	**4071**	**4,38**	**178,31**	**200**	**3,71**	**151**	277	277	1021	3070
40	13- 8-64	20-10	798	503	**4201**	**4,17**	**175,15**	**196**	**3,71**	**156**	283	283	1007	2951
Gns. af 19 kvier			837	506	**5515**	**4,21**	**232,06**	**260**	**3,72**	**205**	304	304	1487	3638

s. 28417, på Brøstrupgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,6	2,32	15- 2	38	Rødding Leo, s. 4853	Jens M. Petersen, Ørderup.
4,9	1,75	4- 4	4	Rødding Leo, s. 4853	Hans Termansen, Hjerting.
4,2	1,94	27-12	45	Rødding Leo, s. 4853	Niels P. Friis, Øster-Lindet.
3,9	2,06	10- 1	175	Johnson, r. 26239	H. P. Hansen, Københoved.
6,8	1,04	—[1]	76	Rødding Sverre, r. 27411	Søren Hansen, Harreby.
4,0	2,22	17-12	155	Rødding Brethvig, r. 26582	Hans Barsballe, Københoved.
3,7	2,39	12- 1	50	Rødding Sverre, r. 27411	Chr. Frederiksen, Jelsskov.
4,6	1,76	27- 2	68	Rødding Brethvig, r. 26582	Johan Jensen, Grønnebæk.
3,7	2,17	7-12	100	Rødding Leo, s. 4853	Chr. Lassen, Dover, Lintrup.
3,6	2,13	17-12	25	Rødding John, s. 4695	Chr. Bertelsen, Gestrup.
2,8	2,92	16- 1	74	Rudme Urban, r. 24737	Johan Junker, Kastrup.
2,0	3,52	20- 1	38	Rødding Brethvig, r. 26582	Harald Schmidt, Krogstrup.
5,4	1,38	17-12	73	ukendt	Martin Andersen, Harreby.
5,9	1,45	17- 1	24	Rødding Leo, s. 4853	Holger Sørensen, Roost.
3,4	2,28	21-11	63	Rødding Sverre, r. 27411	Laurits Lorentsen, Hygumskov.
5,6	1,35	7- 1	95	Rødding Zeus, r. 25755	Gunnar Bladt, Holtegård.
3,4	2,11	21- 1	62	Rødding Sverre, r. 27411	Jens P. Friis, Kamtrup.
2,7	2,36	—[1]	170	Rødding Leo, s. 4853	Emilie Madsen, Mejlby.
4,1	2,06				

[1] Børbetændelse.

s. 28423, på Skølvad.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,8	1,71	—[1]	40	Birk, s. 4500	Peder Chr. Schultz, Vester Vejrup.
3,1	2,69	16- 1	26	Lærk, s. 4803	Chr. Andersen, Roager.
5,0	1,52	10- 1[2]	19	Birk, s. 4500	Søren J. Boesen, Darum.
5,6	1,36	28- 3	30	Lærk, s. 4803	Aksel Ager, Jernkærvej, Ribe.
4,8	1,64	7- 1	45	Djurs Gert, s. 4858	Theodor Hansen, Bramminge.
5,4	1,40	2- 1	29	Gran, s. 4691	Niels Pedersen, Sejstrup.
4,8	1,49	24-12	62	Ribe Glug, r. 27128	Knud Nielsen, Hunderup.
2,2	3,57	4- 1	54	Ribe Njal, r. 27406	Thomas Knudsen, Fåborg.
4,0	1,89	30- 1	31	Gran, s. 4691	Aksel Pedersen, Varho.
4,3	1,91	25- 5	11	Ribe Glug, r. 27128	Arne Jørgensen, Vester Vedsted.
4,2	1,75	27-12	100	Lærk, s. 4803	Oskar Bennedsen, Høm.
3,4	2,40	8- 6	26	Gran, s. 4691	Johs. Jessen, Stårup.
2,9	2,11	19- 1	45	Gran, s. 4691	Peder L. Bendiksen, Darum.
5,3	1,50	31- 3	11	ukendt	Karsten Karstensen, Roager.
3,3	2,35	28- 4	84	Ribe Elk, r. 26458	Søren Moltesen Ravn, Høgsbro.
4,4	1,76	18- 1	54	Navr, s. 4430	Jens Larsen, Lourup.
3,7	2,00	8- 6	70	Gran, s. 4691	Alfred Thomsen, Jyllerup.
3,5	2,03	13- 1	94	Djurs Gert, s. 4858	Henning Jensen, Villebøl.
3,8	1,95	6- 5	85	Ribe Jarl, r. 26692	Aage Testrup Schmidt, Plougstrup.
4,1	1,95				

[1] Brummer.
[2] Kastet 29-6.

Hovedtabel 19. **Afkomsprøve for tyren Hjørring Iver,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
49	24- 3-64	29- 9	919	528	**6952**	**4,66**	**323,78**	**364**	**3,77**	**262**	313	313	2138	4465
45	17- 4-64	24-10	920	525	**6831**	**4,30**	**294,06**	**330**	**3,77**	**257**	288	288	1969	4209
38	22- 2-64	7-11	989	436	**5295**	**5,29**	**280,15**	**317**	**3,70**	**196**	274	274	1797	3758
50	13- 3-64	24- 9	925	473	**5633**	**4,93**	**277,43**	**313**	**3,74**	**211**	318	318	1730	4060
40	29-10-63	23- 9	1060	539	**6408**	**4,30**	**275,83**	**310**	**3,68**	**236**	319	319	1829	4167
48	25- 6-64	22- 9	819	467	**5773**	**4,64**	**267,70**	**301**	**3,98**	**230**	320	320	1697	4079
31	9- 4-64	11- 9	885	535	**5913**	**4,47**	**264,28**	**297**	**3,72**	**220**	331	331	1650	4159
35	27- 5-64	18-10	874	490	**5262**	**4,92**	**258,90**	**292**	**3,82**	**201**	294	294	1618	3731
42	25- 3-64	14- 9	903	524	**5637**	**4,33**	**244,06**	**274**	**3,66**	**206**	328	328	1529	3922
34	4- 2-64	21- 9	960	480	**4925**	**4,94**	**243,06**	**274**	**4,06**	**200**	321	321	1395	3681
37	29- 8-64	20-10	782	509	**5306**	**4,36**	**231,48**	**260**	**3,92**	**208**	292	292	1472	3691
41	29-10-63	18- 9	1055	504	**4667**	**4,85**	**226,35**	**255**	**3,80**	**177**	324	324	1278	3888
39	14- 9-64	8-11	785	458	**4468**	**4,92**	**219,62**	**248**	**3,90**	**174**	273	273	1432	3354
46	12- 8-64	12-10	791	535	**4334**	**4,81**	**208,66**	**235**	**3,77**	**163**	300	300	1161	3359
36	31- 1-64	15-10	988	560	**4218**	**4,66**	**196,57**	**221**	**3,94**	**166**	297	297	1070	3264
32[1]	6- 2-64	6- 9	943	543	**4340**	**4,42**	**192,04**	**216**	**3,82**	**166**	336	336	1036	3364
43	19- 4-64	24- 9	888	570	**4210**	**4,53**	**190,63**	**214**	**3,95**	**166**	318	318	1026	3426
44	17- 7-64	1-11	837	574	**4241**	**4,49**	**190,60**	**214**	**4,01**	**170**	280	280	1145	3114
51	18- 5-64	15-11	911	536	**3890**	**4,64**	**180,40**	**203**	**3,82**	**148**	266	266	1004	2973
47	12- 6-64	12-11	883	558	**3282**	**5,02**	**164,63**	**186**	**4,05**	**133**	269	269	836	2791
33	24- 7-64	23- 9	791	492	**2339**	**4,66**	**109,07**	**123**	**3,76**	**88**	319	319	623	2766
Gns. af 21 kvier			900	516	**4949**	**4,66**	**230,44**	**259**	**3,83**	**190**	304	304	1402	3630

[1] Trepattet fra kælvning.

Hovedtabel 20. **Afkomsprøve for tyren Give Ask,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
36	6- 5-64	28- 8	844	592	**7066**	**5,04**	**356,34**	**402**	**4,13**	**292**	347	347	2564	4940
32	15- 5-64	11- 9	849	474	**6020**	**4,56**	**274,26**	**308**	**3,82**	**230**	333	333	2098	4151
33	12- 5-64	4-10	875	536	**5977**	**4,53**	**270,80**	**304**	**3,82**	**228**	310	310	2019	4178
39	12- 5-64	6- 9	847	567	**5674**	**4,73**	**268,55**	**302**	**4,25**	**241**	327	327	2001	3979
49	24- 8-64	26- 9	763	464	**4965**	**5,28**	**262,04**	**296**	**4,11**	**204**	318	318	1818	3821
41	6- 5-64	13-10	890	567	**5007**	**5,22**	**261,35**	**295**	**4,01**	**201**	301	301	1803	3686
35	11- 5-64	6- 9	848	544	**4996**	**5,08**	**253,89**	**287**	**3,94**	**197**	338	338	1832	3830
40	22- 5-64	4-11	896	567	**4926**	**4,83**	**237,93**	**268**	**4,01**	**198**	279	279	1662	3481
42	30- 4-64	26-10	909	530	**4507**	**5,16**	**232,35**	**262**	**4,00**	**180**	288	288	1575	3481
34	18- 6-64	31- 8	804	594	**4665**	**4,95**	**231,00**	**260**	**3,99**	**186**	340	340	1495	3873
31	29- 5-64	25-10	879	551	**4338**	**5,30**	**229,74**	**260**	**4,17**	**181**	289	289	1499	3535
50	13- 6-64	22- 8	800	503	**4985**	**4,54**	**226,24**	**254**	**3,92**	**195**	353	353	1530	3787
48	2- 3-64	19-11	992	527	**4055**	**5,13**	**207,89**	**235**	**4,19**	**170**	264	264	1394	3045
45	1- 6-64	18-10	869	547	**4232**	**4,70**	**198,93**	**224**	**3,89**	**165**	296	296	1349	3254
47	17- 5-64	15- 9	851	495	**4007**	**4,75**	**190,30**	**214**	**3,87**	**155**	311	329	1312	3432
44	24- 8-64	24-11	822	536	**3735**	**4,90**	**182,84**	**206**	**3,98**	**149**	259	259	1230	2984
38[1]	6- 5-64	4-11	912	569	**4087**	**4,30**	**175,80**	**197**	**3,89**	**159**	279	279	1218	3221
46	28- 5-64	9-11	895	563	**3944**	**4,44**	**175,12**	**197**	**3,75**	**148**	274	274	1144	2968
43	24- 5-64	23-11	913	583	**2463**	**5,02**	**123,53**	**139**	**4,08**	**101**	260	260	706	2403
Gns. af 19 kvier			866	543	**4718**	**4,86**	**229,42**	**259**	**3,99**	**188**	303	304	1592	3582

[1] Venstre forpatte stukket op efter pattetråd.

s. 28352, på Dybvad.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
6,8	1,01	3- 3	59	Hjørring No, s. 4806	Hans P. Nielsen, Rakkeby.
4,9	1,81	22- 2	68	Munk 26, s. 4625	Jens Boelt Kristensen, Gunderup.
3,9	2,19	4- 5	81	Hjørring No, s. 4806	Vagn Bundgaard, Bjergby.
6,4	1,14	24-12	53	Loke 51, s. 4750	Carsten Madsen, Hørby.
5,6	1,32	3- 1	75	Samsø Bjørk, s. 4629	Knud Thomsen, Østervrå.
3,9	2,14	31-12	53	Hjørring Samson, s. 4749	Folmer Overby, Dybvad.
4,6	1,79	9- 3	42	Hjørring Bøg, r. 25787	Gunnar Moltsen, Sdr. Ørnbøl, Bjergb
4,8	1,61	28- 1	31	Uffe Højvang, s. 4429	Asger Simonsen, Hundelev.
4,4	1,88	5- 6[1]	59	Samsø Bjørk, s. 4629	Peder Sloth, Thise, Manna.
4,3	1,80	19- 4	65	Hjørring Leif, e.B 4911	Hans Munkholt, Allerup.
4,8	1,69	16- 1	67	Hjørring No, s. 4806	Gunnar Moltsen, Sdr. Ørnbøl, Bjergb
3,7	2,07	23- 1	87	Hjørring Leif, e.B 4911	Knud Thomsen, Østervrå.
3,7	2,26	15- 3[2]	78	Hjørring No, s. 4806	Søren Ø. Jepsen, Vidstrup.
3,8	1,94	7- 2	72	Hjørring No, s. 4806	H. Tegllund Jensen, Gærum.
3,7	2,01	13- 3	72	Ull, r. 25067	Gunnar Moltsen, Sdr. Ørnbøl, Bjergb
4,6	1,55	3- 2	73	Hjørring No, s. 4806	Gunnar Moltsen, Sdr. Ørnbøl, Bjergb
5,0	1,47	29-12	69	Øjvind 41, r. 25442	Svend Moltsen, Serritslev.
7,7	0,91	19- 1	14	Hjørring No, s. 4806	H. Tegllund Jensen, Gærum.
4,3	1,80	9- 2	57	Sterup Loke, r. 25114	Herluf Olesen, Hellum.
4,9	1,48	7- 2	22	ukendt	Vald. Andersen, Ndr. Klarup, Morild.
3,0	1,86	19- 1	59	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Edv. Jespersen, Ny Barkholt, Mygdal.
4,7	1,70				

[1] Kastet 3-4 efter ins. 24-1.
[2] Kastet.

s. 28612, på Skovgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,1	2,92	14-12	53	Give Elm 24, s. 4800	Niels Rahbech, Billund.
4,2	1,81	10- 1	36	ukendt	Marius Rasmussen, Ullerup.
4,8	1,60	1- 2	2	Give Kejser, e.A 4972	Chr. Nielsen, Lindeballe.
4,6	1,75	5-12	30	Give Kejser, e.A 4972	Hans Jørgensen, Hesselbjerge.
5,2	1,49	15- 4	57	Give Lau, s. 4799	Georg Jensen, Give.
3,8	2,00	24-12[1]	91	Junior, s. 4854	J. Chr. Aalbæk, Thyregod.
3,8	1,74	11- 2	65	Nr. 21	Peter Ullum, Thyregod.
4,2	1,87	20- 1	9	ukendt	Østergaard Kjeldsen, Skærlund.
4,4	1,81	24-12	62	Give Elm 24, s. 4800	Martinus Jensen, Stakroge.
4,2	1,71	10-12	87	Give Elm 24, s. 4800	Kr. Kristensen, Farre.
5,6	1,42	28-12	48	Give Dan 78, r. 25416	Eskild Klausen, Uhe.
3,0	2,34	16- 2	49	Vejle Birk, s. 4698	Chr. Nielsen, Lindeballe.
4,4	1,76	27- 1	78	Give Lau, s. 4799	Skov Pedersen, Hindskov.
4,0	1,87	—	80	Give Lau, s. 4799	Lars Søndergaard, Førstballe.
5,4	1,38	16-12	44	Give Lau, s. 4799	Laurits Lysholt, Givskud.
5,5	1,12	6- 6	80	Give Kejser, e.A 4972	Eskild Hansen, Bindeballe.
4,8	1,52	30- 1	179	ukendt	Kr. Søndergaard, Lønå.
5,1	1,45	30- 1	7	Give Elm 24, s. 4800	Sv. Aa. Pedersen, Sdr. Omme.
2,7	2,27	18- 2	56	Give Elm 24, s. 4800	M. Jakobsgaard, Skovsende.
4,4	1,78				

[1] Kastet 12-6.

Hovedtabel 21. **Afkomsprøve for tyren Ribe Frem,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
3	x- x- x	25- 9	—	516	**7028**	**4,04**	**283,72**	**318**	**3,68**	**258**	314	314	2012	4309
13	30- 8-64	28- 9	759	529	**6196**	**4,48**	**277,39**	**312**	**3,85**	**239**	311	311	1865	4138
7	26- 5-64	15- 9	842	503	**6296**	**4,33**	**272,42**	**306**	**3,88**	**244**	324	324	1802	4144
2	7- 5-64	14- 9	860	540	**6129**	**4,28**	**262,21**	**294**	**3,65**	**224**	325	325	1701	3972
4	17- 4-64	21- 9	887	561	**5790**	**4,45**	**257,85**	**290**	**3,86**	**223**	318	318	1637	3883
12	10- 6-64	19- 9	831	505	**5374**	**4,36**	**234,24**	**263**	**3,61**	**194**	320	320	1463	3614
11	5- 6-64	26- 9	843	525	**5649**	**4,13**	**233,42**	**262**	**3,92**	**222**	313	313	1517	3775
14	1- 7-64	31-10	852	508	**5137**	**4,49**	**230,67**	**259**	**3,81**	**196**	278	278	1470	3432
16	17- 5-64	16-10	882	542	**5046**	**4,54**	**229,17**	**258**	**3,96**	**200**	293	293	1450	3600
19	2- 9-64	25- 9	753	482	**5245**	**4,36**	**228,67**	**257**	**3,73**	**196**	314	314	1403	3568
6	21- 5-64	31-10	893	529	**5266**	**4,31**	**226,88**	**255**	**3,65**	**192**	278	278	1466	3483
22	2- 5-64	5-11	917	571	**5033**	**4,47**	**224,91**	**253**	**3,89**	**196**	273	273	1425	3512
5	1- 6-64	3-10	854	557	**4927**	**4,54**	**223,91**	**252**	**3,86**	**190**	306	306	1375	3634
9	7- 7-64	20- 9	805	542	**5013**	**4,41**	**221,09**	**248**	**3,85**	**193**	319	319	1325	3748
8	30- 5-64	17- 9	840	552	**5356**	**4,03**	**215,70**	**241**	**3,67**	**197**	322	322	1362	3714
20	20- 8-64	7-10	778	503	**4407**	**4,69**	**206,69**	**233**	**3,97**	**175**	302	302	1216	3316
24	29- 5-64	29-10	883	520	**4327**	**4,59**	**198,77**	**224**	**4,13**	**179**	280	280	1204	3211
17	2- 5-64	11- 9	862	500	**4965**	**4,00**	**198,56**	**222**	**3,76**	**187**	315	315	1182	3414
23	18- 5-64	28-10	893	565	**3651**	**4,40**	**160,62**	**180**	**3,96**	**145**	281	281	861	2773
18	22- 5-64	21-10	882	516	**3590**	**4,45**	**159,89**	**180**	**3,93**	**141**	288	288	837	2927
Gns. af 20 kvier			848	528	**5221**	**4,35**	**227,34**	**255**	**3,82**	**199**	304	304	1429	3608

Hovedtabel 22. **Afkomsprøve for tyren Århus Hof,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
48	25- 6-64	3-10	830	484	**6581**	**4,04**	**265,64**	**297**	**3,37**	**222**	323	323	1886	4128
36	24- 4-64	26-10	915	452	**6611**	**3,97**	**262,57**	**294**	**3,39**	**224**	300	300	1939	4054
38	16- 8-64	24-10	799	495	**6099**	**4,17**	**254,35**	**285**	**3,49**	**213**	302	302	1802	3991
41	20- 5-64	14-10	877	512	**6126**	**4,08**	**250,07**	**280**	**3,67**	**225**	312	312	1761	4049
45	20- 8-64	2-11	804	469	**5644**	**4,27**	**240,88**	**270**	**3,47**	**196**	293	293	1676	3821
40[1]	11- 6-64	21-10	862	500	**5583**	**4,29**	**239,71**	**269**	**3,78**	**211**	305	305	1644	3835
31	31- 7-64	25- 9	786	466	**5109**	**4,61**	**235,69**	**265**	**3,63**	**185**	301	301	1499	3728
46	17- 5-64	28-10	894	548	**5205**	**4,50**	**234,20**	**263**	**3,71**	**193**	298	298	1543	3614
42	10- 7-64	8-10	820	509	**5575**	**4,19**	**233,49**	**262**	**3,68**	**205**	316	316	1590	3845
33[2]	12- 5-64	5-11	907	494	**5323**	**4,19**	**222,77**	**250**	**3,58**	**190**	290	290	1627	3380
34	29- 7-64	15-10	808	544	**4994**	**4,42**	**220,55**	**248**	**3,76**	**188**	311	311	1378	3615
49	6- 8-64	3-11	819	500	**5527**	**3,94**	**217,53**	**243**	**3,42**	**189**	292	292	1505	3682
35[3]	22- 4-64	4-11	926	531	**4926**	**4,40**	**216,99**	**244**	**3,77**	**186**	291	291	1425	3602
47	3- 6-64	29-10	878	461	**4828**	**4,38**	**211,25**	**237**	**3,54**	**171**	297	297	1321	3496
43	7- 8-64	9-10	793	509	**5089**	**4,00**	**203,68**	**228**	**3,77**	**192**	317	317	1313	3559
37[4]	29- 7-64	20-10	813	537	**4272**	**4,49**	**191,74**	**216**	**3,74**	**160**	306	306	1131	3298
39	8- 7-64	16-10	830	523	**3953**	**4,04**	**159,58**	**179**	**3,49**	**138**	308	308	902	3057
Gns. af 17 kvier			845	502	**5379**	**4,22**	**227,10**	**255**	**3,59**	**193**	304	304	1526	3690

[1] Højre forpatte uden kanal.
[2] Venstre forpatte stukket op efter pattetråd.
[3] Begge forpatter stukket op efter pattetråd.
[4] Trepattet efter yverbetændelse.

s. 28422, på Skølvad.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,0	2,92	23- 1	15	ukendt	Magnus Andersen, Gredstedbro.
4,4	1,87	24-12	56	Gran, s. 4691	Jens Boysen, Hessellund.
4,6	1,71	28-12	94	Djurs Gert, s. 4858	Peter Hansen, Årre.
4,2	1,84	13- 2	8	Djurs Gert, s. 4858	Vagn Mortensen, Gredsted.
2,0	3,98	9- 1	85	Djurs Gert, s. 4858	Peter V. Nielsen, Særmark.
3,2	2,37	21- 3	64	Lærk, s. 4803	Morten Nielsen, Hygum.
3,6	2,24	8- 5	9	Ribe Gorm, e.B 4949	Niels A. Hansen, Skads.
7,4	0,80	13- 1	40	Gran, s. 4691	Villy Sørensen, Glejbjerg.
3,9	1,88	17- 2	25	Birk, s. 4500	Kr. N. Jørgensen, Vejrup.
3,5	2,05	10- 4	22	Lærk, s. 4803	Thorvald Elbæk, Tobøl.
6,2	1,12	8- 4	63	Djurs Gert, s. 4858	Alfred Jørgensen, Høm.
4,8	1,30	9- 3	90	Torn, r. 25390	Thomas P. Thomsen, Glejbjerg.
3,9	1,93	22-12	64	Lærk, s. 4803	E. Høier Christensen, Stens.
2,9	2,55	8-12	29	Gran, s. 4691	Svend Aage Thøgersen, Darum.
2,2	3,40	28- 1	41	Djurs Gert, s. 4858	P. Egebjerg Simonsen, Kalvslund.
3,3	2,26	17-12	51	Lærk, s. 4803	Karl Schøler, Jernvedlund.
3,0	2,14	29- 3	85	Birk, s. 4500	Lars Sørensen, Sdr. Farup.
3,7	1,88	29-11	52	Ribe Bjarke, r. 27827	Peder Chr. Schultz, Vester Vejrup.
3,4	2,04	28- 4	40	Birk, s. 4500	Alfred Noer, Åstrup.
4,7	1,48	19-12	45	Birk, s. 4500	Jens Carl Højberg, Vong.
3,9	2,09				

s. 28400, på Elkjær.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,9	2,20	8- 6	73	Århus Rollo, r. 26942	J. Bjørn Pedersen, Storring.
4,3	1,90	1- 4	32	Århus Rollo, r. 26942	Aksel Andersen, Højslet.
3,6	2,48	31-12	17	Ott 32, s. 4848	A. P. Rasmussen, Fastrup.
5,1	1,50	15- 6	9	Ott 32, s. 4848	Jens Høgh Dam, Vistoft.
5,7	1,35	14- 1	20	Århus Rolf, r. 26760	Poul Klinge, Eg.
4,3	1,70	1- 2	124	Odgård, e.B 4881	Ingv. Thomsen, Skjoldelev.
3,6	2,26	28-11	25	Århus Høst, r. 26940	Svend Poulsen, Kolind.
4,4	1,85	13- 2	19	Elg 88, r. 26175	Elis Christensen, Vistoft.
3,1	2,77	21-12	14	Århus Toke, r. 26521	Niels Hansen, Blåkær.
5,0	1,61	7- 2	123	Århus Rollo, r. 26942	Marius Jensen, Sivested.
4,0	1,92	13- 3	70	Raj, r. 26522	Johs. Pedersen, Vrinners.
3,6	2,26	6- 1	56	Ott 32, s. 4848	Ulrich Zacho, Kolind.
4,6	1,76	21- 1	17	Raj, r. 26522	Henning Rasmussen, Astrup.
4,0	2,12	28-12	14	Raj, r. 26522	N. Rask Nielsen, Trige.
4,7	1,47	13- 1	50	Århus Toke, r. 26521	Edv. Borgbjerg, Mårslet.
3,2	2,27	6- 4[1]	70	Raj, r. 26522	Johs. Pedersen, Vrinners.
4,0	1,78	27-12	27	Århus Toke, r. 26521	Harry Kjeldsen, Vrinners.
4,2	1,95				

[1] Kastet i juni.

Hovedtabel 23. **Afkomsprøve for tyren Centrums Prik,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
35	17- 3-64	8-10	935	555	**6568**	**4,54**	**298,19**	**335**	**3,83**	**252**	300	300	2025	4481
50	3- 4-64	27- 9	907	500	**6216**	**4,77**	**296,28**	**334**	**3,98**	**248**	311	311	1902	4285
34	26- 4-64	2-10	889	582	**6133**	**4,80**	**294,60**	**332**	**4,23**	**260**	306	306	1916	4309
47	18- 3-64	26- 9	922	495	**5607**	**4,67**	**261,90**	**295**	**3,85**	**216**	312	312	1577	3609
38	1-12-63	14-10	1048	521	**5709**	**4,41**	**251,82**	**283**	**3,70**	**211**	294	294	1605	3853
49	28- 3-64	26- 9	912	483	**5316**	**4,55**	**241,99**	**272**	**4,04**	**215**	312	312	1420	3776
44	5- 2-64	21- 9	959	516	**5099**	**4,47**	**228,18**	**256**	**4,01**	**205**	317	317	1330	3734
48	7- 7-64	25-10	840	490	**5063**	**4,26**	**215,93**	**242**	**3,67**	**186**	283	283	1335	3554
43	31-12-63	8-11	1043	509	**5475**	**3,90**	**213,57**	**239**	**3,69**	**202**	269	269	1396	3525
46[1]	18- 2-64	20-10	975	518	**4798**	**4,44**	**213,17**	**240**	**3,69**	**177**	288	288	1262	3455
42	17- 3-64	25- 9	922	542	**4333**	**4,88**	**211,59**	**238**	**4,17**	**181**	301	301	1165	3523
31	12- 3-64	24- 9	926	633	**4381**	**4,77**	**209,11**	**236**	**4,17**	**183**	314	314	1111	3543
33	18- 3-64	24- 9	920	618	**4036**	**5,02**	**202,61**	**229**	**4,31**	**174**	314	314	1044	3498
40	1- 7-64	14- 9	805	555	**4279**	**4,70**	**201,14**	**226**	**4,19**	**179**	324	324	1034	3574
51	7- 5-64	3-10	879	539	**4576**	**4,39**	**200,81**	**226**	**3,91**	**179**	305	305	1116	3390
41	24- 7-64	26-10	824	539	**4621**	**4,28**	**197,61**	**222**	**4,06**	**188**	282	282	1128	3324
45[2]	18-11-63	25- 9	1042	530	**4453**	**4,37**	**194,58**	**218**	**3,99**	**178**	313	313	1030	3408
39	16- 5-64	27- 9	864	572	**3970**	**4,60**	**182,76**	**206**	**3,92**	**156**	311	311	910	3280
37[3]	6- 3-64	25- 9	933	518	**3349**	**5,02**	**167,98**	**189**	**4,06**	**136**	313	313	774	3074
Gns. af 19 kvier			923	538	**4946**	**4,56**	**225,46**	**254**	**3,96**	**196**	304	304	1320	3642

[1] Alle patter stukket op.
[2] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.
[3] Højre bagpatte stukket op efter pattetråd.

Hovedtabel 24. **Afkomsprøve for tyren Rødding Frem,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
68	20- 2-64	4-10	957	508	**6702**	**4,69**	**314,19**	**354**	**3,85**	**258**	299	299	2181	4319
77	24- 3-64	20-10	940	604	**6280**	**4,36**	**273,56**	**307**	**3,83**	**241**	283	283	1897	3899
73	18- 2-64	19- 9	944	596	**5694**	**4,62**	**263,23**	**296**	**3,83**	**218**	314	314	1750	4143
67	6- 3-64	1-10	939	600	**5119**	**4,82**	**246,48**	**278**	**3,78**	**194**	302	302	1526	3679
69	25- 7-64	30- 9	797	581	**5393**	**4,53**	**244,38**	**275**	**3,96**	**214**	303	303	1617	3899
65	21- 2-64	4- 9	926	585	**5522**	**4,26**	**235,47**	**264**	**3,74**	**207**	329	329	1516	3917
61	22- 2-64	20- 9	941	536	**4764**	**4,85**	**230,94**	**260**	**4,04**	**193**	313	313	1384	3661
62	2- 3-64	14- 9	926	628	**5156**	**4,40**	**227,00**	**255**	**3,82**	**197**	319	319	1423	3719
66	10- 3-64	24- 9	928	500	**5101**	**4,44**	**226,37**	**254**	**3,73**	**190**	309	309	1447	3567
79	15- 2-64	14-10	972	530	**5140**	**4,38**	**225,03**	**253**	**3,70**	**190**	289	289	1440	3590
75	20- 6-64	5-10	837	561	**5017**	**4,32**	**216,80**	**243**	**3,72**	**186**	298	298	1357	3679
64	2- 3-64	15- 9	927	560	**5177**	**4,13**	**214,01**	**240**	**3,71**	**192**	318	318	1348	3683
76	26- 4-64	5-10	892	540	**4588**	**4,54**	**208,40**	**234**	**3,75**	**172**	298	298	1256	3600
80	14- 3-64	28-10	958	524	**4778**	**4,26**	**203,50**	**228**	**3,63**	**173**	275	275	1289	3308
78	14- 8-64	2-10	779	524	**4354**	**4,52**	**196,79**	**221**	**3,86**	**168**	301	301	1125	3386
71	2- 3-64	1-10	943	590	**4560**	**4,24**	**193,47**	**217**	**3,84**	**175**	302	302	1159	3413
70[1]	24- 2-64	26- 9	945	495	**4286**	**4,27**	**182,86**	**205**	**3,65**	**157**	307	307	1046	3298
74	31- 3-64	30- 9	913	576	**3865**	**4,61**	**178,03**	**200**	**4,04**	**156**	303	303	941	3119
63	21- 7-64	13- 9	784	510	**4035**	**4,36**	**176,07**	**198**	**3,95**	**159**	320	320	947	3122
72	27- 2-64	26- 9	942	574	**4034**	**4,33**	**174,49**	**196**	**3,81**	**154**	307	307	944	3199
Gns. af 20 kvier			910	556	**4978**	**4,45**	**221,55**	**249**	**3,81**	**190**	304	304	1379	3611

[1] Alle patter stukket op.

s. 28187, på Enemærket.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,4	2,86	19-12	36	Centrums Dau, s. 4650	Hans H. Henriksen, Morud.
4,0	2,10	10- 2	47	Centrums Hejls, r. 25330	Gunnar Jørgensen, Havndrup.
6,9	0,96	20-12	52	Centrums Gavn, s. 4764	P. Hansen, Strømgård, Ullerslev.
6,7	1,09	—	62	Centrums Marsk, r. 26979	Aksel Graff, Ellested.
3,6	2,38	20-12	51	ukendt	Niels A. Hansen, Thorup.
6,0	1,24	12- 1	50	Centrums Gavn, s. 4764	Gunnar Jørgensen, Havndrup.
5,4	1,50	8-12	92	Centrums Jeppe, s. 4485	Poul V. Andersen, Sdr. Nærå.
5,5	1,41	11- 3	78	Centrums Marsk, r. 26979	A. P. Højmark, Kristinebjerg.
5,1	1,59	26- 1	140	Centrums Rup, s. 4772	Claus Hansen, Broholmgård.
6,2	1,20	29- 3[1]	60	Centrums Marsk, r. 26979	Aksel Graff, Ellested.
4,7	1,60	30-11	8	Centrums Dau, s. 4650	Henrik Pedersen, Sanderum.
6,5	1,15	14-12	47	Centrums Ekspert, e.A 4990	Kildemosegård, Bellinge.
3,2	2,15	19-12	26	Centrums Jeppe, s. 4485	Peder Larsen, Sdr. Nærå.
3,2	2,25	1- 2	86	Ejlekær, s. 4416	Svend Jakobsen, Højme.
3,5	2,16	8- 5	67	Centrums Dau, s. 4650	Harald Nielsen, Ravnebjerg.
5,0	1,57	7- 3	54	Centrums Marsk, r. 26979	Jens Ove Christiansen, Måre.
4,3	1,67	2- 1	35	Centrums Karl, r. 26707	Aksel Pedersen, Birkum.
2,8	2,44	1- 2	96	Centrums Ekspert, e.A 4990	Johs. Chr. Larsen, Hudevad.
3,5	1,79	25- 1	41	ukendt	Anders Jensen, Skellerup.
4,7	1,74				

[1] Kastet 9-3 efter ins. 3-1.

s. 28420, på Østerhåb.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
7,0	1,03	15- 6	104	Rødding Toke, r. 26581	Peter Skov, Hygumskov.
3,7	2,42	20- 4	37	Rødding Brethvig, r. 26582	Andreas Lassen, Hyrup.
4,4	1,69	1- 4	86	Rødding John, s. 4695	Jørgen Mortensen, Mejlby.
4,2	1,81	24-12	52	Rødding Ørn, r. 27034	Vagn Vestergaard, Tved.
3,8	2,17	23- 1	106	Allerup, r. 25637	Jens Ravn, Holm.
4,2	1,83	9- 6	40	Rødding John, s. 4695	Laur. Tonnesen, Skodborgskov.
3,9	1,87	31- 5	87	Rødding Leo, s. 4853	Frede J. Dall, Rødding.
4,7	1,53	29- 3	30	Rødding Leo, s. 4853	Anders Villadsen, Langetved.
3,5	2,22	27- 5	98	Rødding Leo, s. 4853	Hans J. Backmann, Skodborgskov.
4,0	1,97	28- 1	24	Rødding Leo, s. 4853	Thorvald Christiansen, Lintrup.
6,5	1,14	17-12	8	Rødding Leo, s. 4853	Rødding Højskole.
4,5	1,66	23-12	86	Kolding 139, r. 27115	Chr. Lassen, Dover.
3,0	2,49	1- 2	32	Rødding Leo, s. 4853	Holger Jakobsen, Bæk.
4,2	1,83	6- 5	25	Rødding John, s. 4695	Ebbe Jensen, Hjerting.
4,7	1,57	14- 3	8	Rødding Sverre, r. 27411	Hans Termansen, Hjerting.
3,9	1,86	21- 1	110	Rødding Leo, s. 4853	Helga Hansen, Hjerting.
4,4	1,64	5- 1	79	Rødding Leo, s. 4853	Jørgen Nielsen, Hygumskov.
2,3	2,75	1- 4	47	Birk, s. 4500	Andreas Rasmussen, Sdr. Hygum.
4,0	1,82	—	74	Rødding Sverre, r. 27411	Hans Petersen, Brøstrup.
4,7	1,49	2- 5	44	Rødding Brethvig, r. 26582	Hans P. Hansen, Hjerting.
4,3	1,84				

Hovedtabel 25. **Afkomsprøve for tyren Holbæk Allaks,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
6	23- 7-64	11- 9	780	550	**6606**	**4,66**	**307,89**	**346**	**3,82**	**252**	322	322	1958	4553
7[1]	28- 2-64	21- 9	936	569	**5991**	**4,58**	**274,44**	**309**	**3,90**	**234**	312	312	1752	4168
16	20- 3-64	22- 9	916	519	**5954**	**4,60**	**273,92**	**308**	**3,93**	**234**	311	311	1735	4211
20	6- 4-64	28- 9	905	584	**5757**	**4,74**	**272,63**	**307**	**3,94**	**227**	305	305	1708	4076
15	4- 5-64	2-10	881	500	**6022**	**4,51**	**271,54**	**305**	**3,87**	**233**	301	301	1744	3968
17	20- 3-64	11- 9	905	478	**4752**	**5,27**	**250,41**	**283**	**3,86**	**184**	322	322	1382	3942
10	24- 5-64	19- 9	848	590	**4890**	**4,79**	**234,20**	**264**	**3,87**	**189**	314	314	1323	3675
2	1- 2-64	14-10	986	582	**5683**	**4,08**	**231,91**	**260**	**3,73**	**212**	289	289	1486	3736
21	14- 4-64	27- 9	896	503	**4467**	**5,17**	**230,80**	**261**	**3,90**	**174**	306	306	1261	3662
5	10- 6-64	7- 9	819	516	**4890**	**4,57**	**223,48**	**251**	**3,82**	**187**	326	326	1263	3721
18	13- 5-64	11-10	881	559	**4595**	**4,79**	**220,12**	**248**	**4,04**	**185**	292	292	1222	3433
9[1]	29-12-63	21- 9	997	637	**4519**	**4,62**	**208,89**	**235**	**4,05**	**183**	312	312	1206	3617
8	16- 2-64	28- 9	955	635	**4471**	**4,67**	**208,67**	**235**	**3,92**	**175**	305	305	1133	3546
11	2- 7-64	18-10	838	562	**4622**	**4,43**	**204,72**	**230**	**3,90**	**180**	285	285	1169	3396
3	7- 2-64	27-10	993	621	**4628**	**4,36**	**201,98**	**227**	**3,91**	**181**	276	276	1159	3317
13	1- 2-64	7- 9	949	569	**4218**	**4,32**	**182,02**	**204**	**3,89**	**164**	326	326	996	3510
19	9- 2-64	17-10	981	583	**3869**	**4,65**	**179,95**	**202**	**3,84**	**148**	286	286	918	3238
1[1]	7- 2-64	20- 9	956	680	**4128**	**4,26**	**175,78**	**197**	**3,74**	**154**	313	313	890	3457
14	7- 8-64	20-10	804	544	**3305**	**4,44**	**146,75**	**165**	**3,87**	**128**	283	283	701	2911
12	12- 3-64	7-10	939	580	**2715**	**4,69**	**127,46**	**143**	**4,17**	**113**	296	296	594	2757
Gns. af 20 kvier			908	568	**4804**	**4,61**	**221,38**	**249**	**3,89**	**187**	304	304	1280	3645

[1] Alle patter stukket op.

Hovedtabel 26. **Afkomsprøve for tyren Bjørn Sydvest,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
10	21-12-63	19- 9	1003	603	**6480**	**4,28**	**277,63**	**312**	**3,84**	**249**	311	311	1891	4184
2	26-12-63	7- 9	986	540	**6041**	**4,49**	**271,14**	**305**	**4,02**	**243**	319	319	1769	4251
1	14-12-63	23- 9	1014	574	**5589**	**4,71**	**263,13**	**296**	**3,95**	**221**	307	307	1670	4046
7	24- 3-64	1- 9	891	555	**5737**	**4,51**	**258,58**	**291**	**4,04**	**232**	318	318	1692	4150
15	27- 2-64	20- 9	936	550	**5390**	**4,73**	**254,75**	**287**	**4,22**	**227**	310	310	1589	3918
5	17-11-63	7- 9	1025	577	**4971**	**4,94**	**245,47**	**277**	**4,18**	**208**	323	323	1471	4011
11	3- 5-64	17-10	897	529	**5464**	**4,34**	**236,97**	**266**	**3,81**	**208**	283	283	1541	3611
14	21- 6-64	5-10	836	529	**5524**	**4,16**	**229,75**	**258**	**3,83**	**211**	295	295	1453	3763
20	29- 3-64	19-10	934	520	**4758**	**4,72**	**224,50**	**253**	**4,12**	**196**	281	281	1365	3404
12	11- 4-64	29- 8	870	585	**4420**	**5,04**	**222,70**	**251**	**4,26**	**188**	332	332	1222	3757
17[1]	23- 7-64	22-10	821	519	**5350**	**4,13**	**221,22**	**248**	**3,68**	**197**	278	278	1453	3652
16	29-11-63	12- 9	1018	567	**4682**	**4,59**	**214,98**	**242**	**4,06**	**190**	307	307	1257	3588
13	26- 7-64	19- 9	785	524	**4733**	**4,53**	**214,46**	**241**	**4,05**	**191**	311	311	1276	3693
19	20- 5-64	12- 9	845	500	**4177**	**4,86**	**202,96**	**229**	**4,20**	**175**	318	318	1117	3389
6[2]	4- 3-64	15- 9	925	524	**4133**	**4,76**	**196,84**	**222**	**4,34**	**179**	315	315	1134	3607
21	1- 5-64	26-10	908	501	**3957**	**4,93**	**195,12**	**220**	**3,76**	**149**	274	274	1082	3087
9	28- 3-64	7-10	923	529	**4127**	**4,61**	**190,06**	**214**	**4,22**	**174**	293	293	1029	3203
8	24- 2-64	19-10	968	563	**3626**	**4,67**	**169,33**	**191**	**4,21**	**153**	281	281	897	3109
18	7- 4-64	3- 9	879	520	**4113**	**4,12**	**169,33**	**190**	**3,79**	**156**	323	323	969	3446
3	18- 6-64	29- 9	833	554	**4089**	**3,97**	**162,17**	**181**	**3,87**	**158**	301	301	856	3247
Gns. af 20 kvier			915	543	**4868**	**4,54**	**221,05**	**249**	**4,01**	**195**	304	304	1337	3656

[1] Højre forpatte blokket op efter pattetråd.
[2] Alle patter stukket op.

. 28117, på Torntofte.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,8	2,16	5-12	32	Holbæk Ægil, s. 4787	Hartvig Knudsen, Holbæk.
3,9	2,06	28-12	92	Holbæk Frøy, s. 4832	Poul Hansen, Havnsø.
4,5	1,77	4- 1	50	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Knud Lundgaard, Hørve.
4,8	1,65	6- 2	2	ukendt	Ejnar Christiansen, Nyvænge.
4,4	1,91	22- 3	23	Ting, s. 4466	Viggo Mejnertsen, Snevre.
6,2	1,22	31-12	21	Zar, s. 4160	Johs. Langkær, Svinninge.
4,9	1,56	20-12	49	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Helge Fredslund, Skippinge.
7,1	1,07	17- 5	92	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Morten Sørensen, Tingerup.
3,2	2,38	25- 2	56	ukendt	Poul Christensen, Undløse.
3,8	1,89	26- 4	73	Zar, s. 4160	Ejnar Jensen, Osager.
4,5	1,74	9- 1	65	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Henry Nielsen, Marke.
3,4	2,05	29- 4	32	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Tage Larsen, Sandby.
5,2	1,35	28-12	54	Holbæk Frøy, s. 4832	Poul Christensen, Undløse.
6,0	1,26	13- 1	87	Holbæk Frøy, s. 4832	Bent Sandal, Udby.
5,6	1,40	23- 1	55	Holbæk Akvig, r. 25827	Poul Christensen, Undløse.
5,5	1,32	9- 1	27	Holbæk Frøy, s. 4832	Folmer Nielsen, Kisserup.
4,4	1,64	27- 1	49	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Poul Christensen, Undløse.
3,2	2,18	23-12	9	Holbæk Frøy, s. 4832	K. E. Christiansen, Nyvænge.
3,4	2,00	6- 1	50	Roskilde Vinkel, e.A 5000	Erik Schultz, Assenløse.
3,7	1,72	14- 6[1]	87	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Mejnert Jeppesen, Gudmandstrup.
4,6	1,72				

[1] Kastet i maj efter ins. 17-1.

. 28112, på Grønhøjgård.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,2	2,03	14- 1	52	Ulf, r. 25173	Sv. Aa. Rasmussen, Gerlev.
4,2	1,98	29-11	106	Gorm Sydvest, e.A 4878	Ole Rasmussen, Bildsø.
4,9	1,59	4- 1	54	Thor, s. 4665	Johs. Nielsen, Frisbjerggd., Gudum.
4,4	1,74	21-11	27	Ørn, s. 4730	Anders Thalund, Lundforlund.
3,6	2,28	13-12	58	Ras, s. 4402	Svend Johansen, Rye.
4,1	1,72	4- 1	47	Abel Sydvest, e.B 4913	Henrik Larsen, Gudum.
5,7	1,36	2- 2	79	Thor, s. 4665	Johs. Nielsen, Frisbjerggd., Gudum.
3,2	2,41	8- 2	233	Holbæk Frøy, s. 4832	Aage Lawaetz, Falkensteen.
7,1	1,03	22- 3	37	Rørby, s. 4535	Charles Olsen, Lynge.
2,9	2,46	5-12	33	Klint Sydvest, s. 4830	Aage Lawaetz, Falkensteen.
3,7	2,32	13- 1	51	Od Sydvest, e.B 4937	Vagn Hansen, Nordrup.
4,2	1,78	21-11	78	Gorm Sydvest, e.A 4878	Karl Mortensen, Venslev.
4,1	1,92	24-12	219	Pilot, s. 4464	Aage Lawaetz, Falkensteen.
4,2	1,79	14- 2	83	Gorm Sydvest, e.A 4878	Karl Mortensen, Venslev.
4,7	1,43	2-12	37	Gorm Sydvest, e.A 4878	Jacob Broholm, Rye.
5,0	1,46	31-12	38	Ras, s. 4402	Otto Hansen, Ørslev.
4,8	1,51	2- 1	37	Ris Næstved, s. 4598	Carsten Christensen, Venslev.
3,7	1,87	5- 1	82	Gorm Sydvest, e.A 4878	Kaj Sørensen, Hyllested.
4,7	1,52	30-11	19	Toke Sydvest, r. 26561	Hilmer Thers, Forlev.
3,6	1,87	21- 1	30	Pilot, s. 4464	G. Christensen, Rødkildegd., Slagelse.
4,4	1,80				

Hovedtabel 27. **Afkomsprøve for tyren Bakager Wahl**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
32	25- 2-64	25- 9	943	581	**6619**	**4,25**	**281,50**	**316**	**3,64**	**241**	309	309	1995	416
41	4- 1-64	12- 9	982	540	**6125**	**4,50**	**275,53**	**310**	**3,79**	**232**	322	322	1857	410
33	12- 3-64	22-10	954	526	**5917**	**4,34**	**256,93**	**288**	**3,63**	**215**	282	282	1807	390
47	21-12-63	23- 9	1007	513	**6041**	**4,17**	**251,71**	**282**	**3,45**	**208**	311	311	1747	398
31[1]	4- 4-64	6-10	915	565	**5146**	**4,78**	**246,19**	**277**	**3,99**	**205**	298	298	1580	368
48	14- 3-64	9- 9	909	517	**5283**	**4,45**	**235,32**	**264**	**3,77**	**199**	325	325	1513	398
35	12- 2-64	8-11	1000	560	**5750**	**4,04**	**232,57**	**260**	**3,62**	**208**	265	265	1687	346
39	16- 3-64	22-10	950	550	**5223**	**4,35**	**226,94**	**255**	**3,70**	**194**	282	282	1513	357
52	20-11-63	12- 9	1027	531	**4757**	**4,67**	**222,06**	**250**	**3,82**	**182**	322	322	1410	364
49	26- 5-64	24- 9	851	518	**4893**	**4,48**	**219,03**	**246**	**3,88**	**190**	310	310	1389	343
45	3- 2-64	21- 9	961	516	**4931**	**4,38**	**215,91**	**242**	**3,82**	**188**	313	313	1342	348
46	16- 7-64	1-10	807	541	**5120**	**4,20**	**215,03**	**241**	**3,75**	**192**	303	303	1391	354
50	2- 3-64	28- 9	940	502	**4967**	**4,32**	**214,34**	**241**	**3,91**	**194**	306	306	1366	363
42	18- 2-64	26- 9	951	594	**5013**	**4,19**	**209,83**	**235**	**3,53**	**177**	308	308	1376	362
40	14- 2-64	22- 9	951	550	**4347**	**4,69**	**203,94**	**230**	**3,81**	**166**	312	312	1191	340
34	3-11-63	24- 9	1056	586	**3872**	**5,10**	**197,65**	**223**	**3,82**	**148**	310	310	1093	329
38	11-12-63	14-10	1038	594	**4460**	**4,39**	**195,58**	**220**	**3,74**	**167**	290	290	1203	321
44	12- 4-64	21-10	922	550	**4097**	**4,38**	**179,31**	**201**	**3,79**	**155**	283	283	1061	319
51	14- 1-64	18- 9	978	594	**3845**	**4,62**	**177,77**	**200**	**3,93**	**151**	308	308	991	325
43	7- 4-64	19- 9	895	538	**3636**	**4,16**	**151,13**	**169**	**3,72**	**135**	315	315	939	304
Gns. af 20 kvier			952	548	**5002**	**4,41**	**220,41**	**248**	**3,75**	**187**	304	304	1423	358

[1] Trepattet, venstre forpatte uden kanal.

Hovedtabel 28. **Afkomsprøve for tyren Kolding Pall 23**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
48	18- 3-64	3-11	960	501	**6787**	**3,98**	**270,11**	**302**	**3,33**	**226**	271	271	1967	389
39	20- 3-64	25- 9	919	548	**6180**	**4,24**	**262,06**	**294**	**3,78**	**233**	310	310	1763	396
31	5- 4-64	13- 9	891	454	**5766**	**4,49**	**258,87**	**291**	**3,65**	**210**	322	322	1657	411
46	3- 3-64	9-10	950	501	**5876**	**4,32**	**253,67**	**285**	**3,64**	**214**	296	296	1682	386
37	8- 3-64	22- 9	928	483	**5460**	**4,59**	**250,46**	**282**	**3,65**	**199**	313	313	1604	375
33	17- 3-64	3- 9	900	491	**5542**	**4,41**	**244,33**	**274**	**3,61**	**200**	330	330	1571	397
44	13-11-64	18-10	704	482	**5453**	**4,16**	**226,89**	**254**	**3,48**	**190**	287	287	1561	373
38	24- 9-64	18- 9	724	482	**5282**	**4,13**	**218,17**	**244**	**3,62**	**191**	317	317	1406	360
35	23- 8-64	8- 9	746	508	**4553**	**4,75**	**216,26**	**244**	**3,87**	**176**	327	327	1458	396
41	14- 3-64	20- 9	920	552	**4309**	**5,01**	**215,83**	**243**	**3,88**	**167**	306	306	1239	349
40	8- 3-64	23- 9	929	560	**4941**	**4,10**	**202,69**	**227**	**3,63**	**179**	312	312	1243	349
47	9- 3-64	23-10	958	489	**4174**	**4,67**	**195,11**	**220**	**3,78**	**158**	282	282	1138	329
36	24- 3-64	28- 8	887	621	**3889**	**4,51**	**175,38**	**197**	**3,69**	**144**	329	329	1024	332
43	10- 8-64	9-10	790	490	**3937**	**4,20**	**165,27**	**185**	**3,58**	**141**	296	296	950	320
49	17- 9-64	15-10	758	481	**3852**	**4,26**	**164,27**	**184**	**3,48**	**134**	290	290	944	314
34	3- 4-64	28-10	938	601	**2643**	**4,50**	**119,03**	**134**	**3,86**	**102**	277	277	661	274
Gns. af 16 kvier			869	515	**4915**	**4,37**	**214,90**	**241**	**3,64**	**179**	304	304	1367	359

. 28062, på Kalø.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,7	1,81	—	165	Højmark, r. 26511	Aksel Rasmussen, Røved.
3,3	2,52	4- 4	9	Sortemose, s. 4680	Jens Johnsen, Grundfør.
3,4	2,66	2- 5	47	Hadsten Wahl, e.A 4940	C. P. Jensen, Bramstrup.
4,0	2,05	31- 5[1]	164	Hadsten Wahl, e.A 4940	Anton Pedersen, Lyngå.
4,0	1,92	—[2]	33	Stokholm, s. 4743	Laur. Møller, Selling.
3,5	2,22	16- 2	60	Tyrsted, r. 25072	Arnold Mogensen, Grundfør.
4,9	1,62	2- 3	140	Poul Ruholm, s. 4850	P. Bakkegaard, Ødum.
4,1	2,03	—	12	Sortemose, s. 4680	Alfred Bech, Vitten.
3,2	2,34	28-12[3]	60	Sortemose, s. 4680	Aksel Madsen, Spørring.
3,4	2,16	—	22	Højmark, r. 26511	Jens Laursen, Mejlby.
4,4	1,80	1- 4	46	Sortemose, s. 4680	Jens Rasmussen, Vissing.
2,9	2,74	25- 2	75	Højmark, r. 26511	Jens Hartvig Vester, Galten.
4,3	1,74	—	96	Højmark, r. 26511	Arnold Mogensen, Grundfør.
3,8	2,11	16- 3	31	Sortemose, s. 4680	Alfred Bech, Vitten.
2,8	2,55	19-12	79	Højmark, r. 26511	Arvid Anthonsen, Søften.
4,2	1,71	—	85	Højmark, r. 26511	Børge Pedersen, Hallendrup.
3,4	2,19	18- 5	97	Hadsten Wahl, e.A 4940	Arnold Mogensen, Grundfør.
2,2	3,52	12- 4	111	Poul Ruholm, s. 4850	P. Bakkegaard, Ødum.
2,6	2,61	30-11	151	Stenhøj, s. 4332	P. Bakkegaard, Ødum.
4,5	1,56	14- 3	7	Stenhøj, s. 4332	Tyregården, Hadsten.
3,7	2,19				

[1] Kastet 26-4 efter ins. 13-12.
[2] Brummer.
[3] Kastet.

. 28081, på Gelballegård.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,6	1,46	18- 1	32	Rødding John, s. 4695	Bendt H. Knudsen, Vamdrup.
5,4	1,36	—	66	Kolding Kærsholm, s. 4622	Cecilie Madsen, Vamdrup.
5,7	1,29	7- 1	5	Kolding Holm 36, e.A 4978	Mathias Christensen, Askov.
6,6	1,12	—	122	ukendt	Niels Bech, Nr. Bjært.
4,0	2,07	7-12	67	Kolding Hvirvelkær 159, s. 4811	Andreas Sørensen, Bække.
3,0	2,63	1-12	61	ukendt	Frede Melvang, Askov.
3,8	2,17	—	43	Kolding Sortemose 28, e.A 4980	Anders Jacobsen, Hejnsvig.
4,2	1,79	—	60	Kolding Rolf 73, e.A 4946	Aksel Jensen, Hjarup.
3,1	2,38	—	11	Kolding Rolf 73, e.A 4946	Lars Petersen, Holsted.
4,6	1,61	28-11	123	Kolding Rørby 45, e.A 4976	Arne Iversen, Brørup.
4,5	1,65	5- 5	43	ukendt	Ellen Brødsgaard, Jordrup.
5,9	1,22	4- 1	14	Bebe, s. 4621	Hans Thomsen, Ødis.
3,7	1,86	29-11	91	Max 71, f. 25-11-52	N. P. Gundtoft, Varmark.
4,4	1,64	23-12	77	ukendt	Mads P. Bonde, Bække.
5,4	1,30	27- 1	30	Kolding Rolf 73, e.A 4946	Verner Houlind, V. Gjerndrup.
4,8	1,52	4- 2	24	Kolding Hammer 108, r. 26154	Sofus Thyssen, V. Vamdrup.
4,6	1,69				

Hovedtabel 29. **Afkomsprøve for tyren Varde Grøn**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
18	18- 7-64	6-10	810	442	**5827**	**4,48**	**261,02**	**293**	**3,58**	**209**	312	312	1510	399
14	2- 6-64	12-10	862	529	**5196**	**4,62**	**240,09**	**270**	**3,84**	**199**	306	306	1297	374
7	12- 6-64	6-10	846	515	**5426**	**4,31**	**233,97**	**263**	**3,72**	**202**	312	312	1316	381
5	6- 5-64	24- 9	871	515	**5208**	**4,45**	**231,94**	**261**	**3,62**	**188**	324	324	1240	383
2	21- 8-64	4- 9	744	520	**4513**	**5,12**	**231,07**	**261**	**3,83**	**173**	329	329	1202	387
15	11- 5-64	21- 9	863	527	**5010**	**4,54**	**227,50**	**256**	**3,95**	**198**	327	327	1242	378
11	9- 9-64	7-10	758	459	**5043**	**4,51**	**227,39**	**256**	**3,76**	**190**	311	311	1235	383
6	4- 5-64	26-10	905	505	**4427**	**4,60**	**203,58**	**229**	**3,85**	**171**	292	292	997	331
8[1]	22- 6-64	18-10	848	467	**4801**	**4,24**	**203,55**	**228**	**3,69**	**177**	300	300	1076	355
1	14- 5-64	24-10	893	481	**4247**	**4,69**	**198,98**	**224**	**3,71**	**158**	294	294	939	325
4	14- 8-64	10-11	818	500	**4797**	**3,84**	**184,35**	**206**	**3,59**	**172**	277	277	962	324
12	21- 4-64	2-11	925	470	**4277**	**4,26**	**182,04**	**204**	**3,73**	**160**	285	285	897	314
16	6- 8-64	5-11	821	514	**3564**	**4,25**	**151,48**	**170**	**3,82**	**136**	282	282	654	284
Gns. af 13 kvier			843	496	**4795**	**4,45**	**213,61**	**240**	**3,74**	**179**	304	304	1121	355

[1] Højre bagpatte stukket op efter pattetråd.

Hovedtabel 30. **Afkomsprøve for tyren Horsens Gert**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
38	27- 4-64	30- 9	886	500	**6290**	**4,52**	**284,58**	**320**	**3,72**	**234**	307	307	1978	416
34	7- 6-64	25- 9	840	526	**5719**	**4,50**	**257,11**	**289**	**3,89**	**222**	312	312	1691	391
31	5- 5-64	29- 8	846	510	**5281**	**4,74**	**250,51**	**282**	**4,01**	**212**	339	339	1550	397
44	11- 6-64	14-10	855	506	**5167**	**4,62**	**238,51**	**268**	**3,87**	**200**	293	293	1541	371
33	18- 6-64	8- 9	812	495	**5239**	**4,49**	**235,42**	**265**	**4,02**	**211**	329	329	1450	391
40	15- 6-64	2-10	839	512	**4680**	**4,91**	**229,74**	**259**	**4,02**	**188**	305	305	1380	368
35	1- 5-64	18- 9	870	516	**4797**	**4,77**	**228,65**	**258**	**3,90**	**187**	326	326	1362	360
45	16- 5-64	25-10	892	521	**4705**	**4,74**	**223,24**	**251**	**3,85**	**181**	282	282	1404	356
42	9- 7-64	5-10	818	528	**4470**	**4,69**	**209,53**	**236**	**4,03**	**180**	302	302	1216	336
50	29- 6-64	4-11	858	528	**4515**	**4,62**	**208,37**	**234**	**3,89**	**176**	272	272	1282	312
39	25- 4-64	23- 9	881	520	**4223**	**4,85**	**204,69**	**231**	**4,30**	**181**	307	307	1182	355
36	7- 6-64	21- 9	836	538	**4182**	**4,59**	**192,12**	**216**	**3,86**	**162**	316	316	1075	351
47	23- 7-64	1-11	831	500	**3843**	**4,47**	**171,89**	**193**	**3,91**	**150**	275	275	987	309
51	23- 5-64	6-11	897	522	**3816**	**4,37**	**166,71**	**187**	**3,91**	**149**	270	270	948	304
43	18- 6-64	13-10	847	546	**3345**	**4,73**	**158,27**	**178**	**4,06**	**136**	294	294	785	278
32[1]	3- 5-64	1- 9	851	550	**3075**	**4,54**	**139,55**	**157**	**4,01**	**123**	336	336	773	309
Gns. af 16 kvier			854	520	**4584**	**4,63**	**212,43**	**239**	**3,94**	**181**	304	304	1288	350

[1] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

s. 28430, på Vardegård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,6	1,39	6- 2	15	Birk, s. 4500	Ricard Pedersen, Kjærsing.
4,6	1,68	23- 2	10	Varde Keld, r. 26162	Peder Dejgaard Nielsen, Ølgod.
3,6	2,26	17- 2	52	ukendt	Tage M. Lauritsen, Jerrig.
4,4	1,81	17-12	71	Lo, s. 4758	Hans Tang, Strellev.
4,0	1,87	1-12	13	Varde Sam, r. 26464	Harry Steffensen, Kvong.
4,8	1,62	30- 1	28	Varde Mar, r. 27125	Sv. Aage Hansen, Hoddeskov.
2,5	2,95	9- 1	58	Varde Roht, r. 27044	Johs. Christensen, Kokspang.
4,3	1,79	—	26	Varde Gynn, r. 27042	Kr. Pallesen, Galtho.
4,8	1,56	6- 3	60	Kær, s. 4700	Aage Andersen, Frøstrup.
5,6	1,41	—	33	Varde Gør, r. 26689	Eskild Andersen, V. Mark, Varde.
3,8	2,20	31- 1	32	Kær, s. 4700	Gunnar Drahnsfeldt, Guldager.
6,0	1,26	21- 1	49	Varde Nør, r. 27124	Jens S. Jensen, Tofterup.
4,7	1,53	1- 3	66	Varde Nør, r. 27124	Viggo Bloch, Jegsmark.
4,5	1,79				

s. 28410, på Østerhåb.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,7	2,32	19- 1	68	Horsens Sortemose, e.A 4888	Ejler Munk Nielsen, Nebel.
2,8	2,95	19- 5	22	Horsens Valdal, s. 4563	Magnus Andersen, Nebsager.
3,4	2,12	3- 4	63	Horsens Sortemose, e.A 4888	Ejnar Pedersen, Uth.
3,2	2,52	7- 2	43	Horsens Loke, s. 4804	Schønning Nielsen, Møgelkær.
3,6	1,96	7- 1	85	Horsens No, r. 27209	Max Jensen, Glud.
2,8	2,60	9- 1	76	Horsens Sortemose, e.A 4888	Hans Pedersen, Gram.
2,4	2,89	15- 5	20	Horsens Sortemose, e.A 4888	Johs. Fl. Andersen, Stourup.
2,6	2,98	7- 1	14	ukendt	Preben Winther, Uth.
5,8	1,22	29-12	66	Horsens Klint, s. 4857	Svend Balle, Rask Mølle.
3,8	2,02	17- 2	63	Horsens Sortemose, e.A 4888	Svend Balle, Rask Mølle.
3,4	1,98	23-12	48	Horsens Sortemose, e.A 4888	Jens Nielsen, Staksrode.
4,0	1,82	17-12	162	Horsens Klint, s. 4857	Knud Rasmussen, Hansted.
3,6	1,77	10- 6	30	Horsens Sortemose, e.A 4888	Oluf Knudsen, Træden.
2,3	2,79	10- 2	21	Horsens Prins, e.B 4965	Laurits Nissen, Sønderby.
4,1	1,61	—	78	Horsens Sortemose, e.A 4888	Folmer Larsen, Sattrup.
1,9	2,39	1- 2	53	Horsens Sortemose, e.A 4888	Arne Møller, Løsning.
3,3	2,25				

Hovedtabel 31. **Afkomsprøve for tyren Vald Nordvest,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
39	5-10-63	18- 9	1079	531	**5665**	**4,81**	**272,38**	**307**	**3,73**	**211**	321	321	1696	4289
31	4-10-63	14- 9	1076	570	**5461**	**4,72**	**257,81**	**290**	**3,88**	**212**	325	325	1507	4045
36	2- 1-64	24-10	1026	557	**5533**	**4,34**	**239,91**	**269**	**3,54**	**196**	285	285	1500	3643
33	26- 2-64	10-10	957	585	**4467**	**5,26**	**234,81**	**265**	**4,12**	**184**	299	299	1270	3604
41	15-10-63	6- 9	1057	484	**4927**	**4,72**	**232,60**	**262**	**3,72**	**183**	333	333	1594	3915
32	18- 1-64	19- 9	975	576	**5261**	**4,35**	**228,78**	**257**	**3,59**	**189**	320	320	1317	3771
37	20- 2-64	13- 9	936	555	**5230**	**4,37**	**228,46**	**257**	**3,61**	**189**	326	326	1314	3873
38	20- 2-64	23- 9	946	588	**5421**	**4,21**	**228,42**	**256**	**3,54**	**192**	316	316	1383	3913
45	5- 1-64	18-11	1048	544	**5540**	**3,93**	**217,86**	**244**	**3,49**	**194**	260	260	1408	3657
34	7- 1-64	18- 9	985	590	**4824**	**4,50**	**217,31**	**244**	**3,83**	**185**	321	321	1223	3583
35	15- 1-64	3-10	992	569	**4902**	**4,42**	**216,63**	**243**	**3,67**	**180**	306	306	1235	3852
46	5- 8-64	10-11	827	510	**4749**	**4,40**	**209,13**	**235**	**3,65**	**173**	268	268	1235	3309
42	24-11-63	15- 9	1026	594	**4334**	**4,55**	**197,40**	**222**	**3,64**	**158**	318	318	1073	3492
43	26- 2-64	8-11	986	568	**3965**	**4,93**	**195,58**	**221**	**4,00**	**159**	270	270	1030	3012
40	31- 5-64	23-10	875	585	**3960**	**4,63**	**183,34**	**206**	**3,91**	**155**	286	286	948	3192
44	22- 6-64	7-10	837	543	**3376**	**4,66**	**157,32**	**177**	**3,83**	**129**	302	302	759	3045
48[1]	21-12-63	9-10	1023	488	**3543**	**4,29**	**152,02**	**171**	**3,57**	**127**	300	300	768	3052
47	24- 2-64	17- 9	936	604	**2841**	**5,11**	**145,25**	**164**	**4,10**	**116**	322	322	706	3131
Gns. af 18 kvier			977	558	**4667**	**4,54**	**211,95**	**238**	**3,73**	**174**	304	304	1220	3577

[1] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 32. **Afkomsprøve for tyren Thy Skov,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
18	19- 5-64	1-10	865	626	**5033**	**5,04**	**253,58**	**286**	**3,71**	**187**	310	310	1360	3828
6	3- 6-64	30- 9	849	536	**5785**	**4,26**	**246,45**	**276**	**3,64**	**210**	311	311	1440	3826
13	11- 6-64	19-10	860	536	**5342**	**4,56**	**243,58**	**274**	**3,41**	**182**	292	292	1398	3581
5	4- 9-64	4-10	760	518	**4980**	**4,69**	**233,68**	**263**	**3,83**	**191**	307	307	1254	3639
12	23- 8-64	15-10	783	527	**5160**	**4,50**	**232,27**	**261**	**3,60**	**186**	296	296	1264	3638
2	18- 6-64	29- 9	833	514	**5132**	**4,28**	**219,49**	**246**	**3,68**	**189**	312	312	1166	3581
1	4- 8-64	13- 9	770	574	**5041**	**4,32**	**217,62**	**244**	**3,57**	**180**	320	320	1237	3764
7	18- 6-64	20- 9	824	614	**5077**	**4,27**	**216,65**	**243**	**3,62**	**184**	321	321	1153	3748
8	6- 8-64	1-10	786	558	**5176**	**4,17**	**215,86**	**242**	**3,60**	**186**	310	310	1185	3648
14	6- 7-64	20-10	836	544	**5119**	**4,20**	**214,97**	**241**	**3,50**	**179**	291	291	1202	3529
19	22- 5-64	25-10	886	547	**4949**	**4,24**	**209,60**	**235**	**3,63**	**180**	286	286	1137	3461
10	15- 9-64	5-10	750	560	**5029**	**4,00**	**201,11**	**225**	**3,55**	**178**	306	306	1094	3537
16	2- 8-64	28-10	817	611	**4300**	**4,63**	**199,28**	**224**	**3,86**	**166**	283	283	1034	3276
4	7- 6-64	26- 9	841	590	**4823**	**4,09**	**197,37**	**221**	**3,52**	**170**	315	315	1066	3491
9[1]	29- 8-64	1- 9	733	564	**4710**	**4,04**	**190,42**	**213**	**3,55**	**167**	340	340	960	3660
17	28- 8-64	26-10	789	560	**3220**	**4,66**	**149,98**	**169**	**3,82**	**123**	285	285	696	2791
15	14- 9-64	31-10	777	574	**3264**	**4,42**	**144,34**	**162**	**3,74**	**122**	280	280	678	2705
Gns. af 17 kvier			809	562	**4832**	**4,37**	**210,96**	**237**	**3,63**	**175**	304	304	1137	3512

[1] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

s. 28126, på Torntofte.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,5	2,28	11- 2	69	Ørkild, s. 4726	Johs. Madsen, Rørby.
3,7	2,15	22- 2	74	Abel, r. 25159	Helge Rasmussen, Røsnæs.
7,4	0,92	16- 3	87	Ibrahim, r. 26822	Knud Jensen, Ågerup.
4,1	1,78	27- 1	52	Volstrup, e.B 4899	Gunnar Jørgensen, Ubby.
4,0	1,81	21-12	68	Daurius, r. 25952	Anders Nielsen, Ll. Henriksholm.
7,5	0,94	6- 2	76	Tved, s. 4778	Jens Holm Jensen, Rørby.
5,8	1,23	28-12	10	ukendt	Ejner Jensen, Nygård Ellede.
4,2	1,97	14-12	10	ukendt	Ejner Jensen, Nygård Ellede.
3,8	2,37	23- 2	63	No Vinkel, r. 27585	Orla Hansen, Jorløse.
4,3	1,79	13- 2	93	Rolf Rørby, r. 27570	Søren Holm Jensen, Rørby.
4,9	1,60	14-12	48	Jonatan, s. 4660	Verner Christensen, Tømmerupholm.
4,8	1,63	6- 3	5	Sten, s. 4477	Erling Pedersen, Rye Mark.
3,5	2,14	5-12	96	Abel, r. 25159	Knud Jensen, Rørby.
5,0	1,47	9- 3	52	Volstrup, e.B 4899	Gunnar Jørgensen, Ubby.
2,8	2,44	18- 2	18	Gabs, r. 26143	Ove Sørensen, Kr. Helsinge.
3,4	1,90	23- 5	56	Holbæk Ægil, s. 4787	Dagny Holst, Gåsetofte.
3,9	1,80	28- 1	58	Jonatan, s. 4660	Knud Pedersen, Asminderup.
2,8	1,91	13-12	22	Theofilus, r. 27330	Jens Hansen, Gørlev.
4,4	1,78				

s. 28440, på Kronborg.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,1	2,50	17- 2	1	Thy Jens, r. 26473	Chr. Yde, Snedsted.
4,8	1,72	11- 4	43	Thy Øjvind, s. 4855	P. Chr. Østergaard, Beersted.
5,5	1,40	19- 6[1]	23	Thy Rolf, r. 25075	Nic. Bojer, Kjelstrup.
5,2	1,48	17- 5	38	Thy Øjvind, s. 4855	Ejner Vinter, Nors Havreland.
6,4	1,20	2- 2	163	ukendt	H. C. Toft, Hvidbjerg.
4,6	1,68	15- 6[2]	60	Thy Ørnsvig, r. 26180	Mads P. Nørgaard, Horsfeldt.
3,3	2,34	5-12	62	Thy Øjvind, s. 4855	Peder Nørgaard Bach, Rolighed.
3,9	1,92	15- 1	115	Peter, r. 25766	J. Møller Overgaard, Hillerslev.
3,6	2,22	23- 1	50	Thy Øjvind, s. 4855	Aage Kanstrup, Astrup Mark.
3,8	1,96	—	33	Thy Wahl, r. 26181	Frede Møller, Fårtoft.
3,8	2,07	11- 1	29	Thy Højvig, r. 25365	Svend Lauritsen, Ørum.
4,2	1,79	30-12	89	Thy Frøy, r. 27277	Niels E. Gravesen, Brund.
3,0	2,76	14- 3	75	Thy, r. 26182	Chr. Yde, Snedsted.
5,2	1,46	—	1	Thy Højvig, r. 25365	Kr. S. Kristoffersen, V. Vandet.
2,9	2,43	10- 1	54	Thy Frøy, r. 27277	Otto Jensen, Vandet.
4,2	1,60	28- 2	27	Thy Øjvind, s. 4855	Statens Forsøgsgård, Silstrup.
3,2	2,08	25- 3	28	Thy Poul, r. 27665	Statens Forsøgsgård, Silstrup.
4,2	1,92				

[1] Kastet 7-5 efter ins. 10-1.
[2] Kastet 8-5 efter ins. 30-12.

Hovedtabel 33. **Afkomsprøve for tyren Erslev,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
128	23- 2-64	1-10	951	538	**5649**	**5,26**	**297,38**	**336**	**4,06**	**229**	306	306	1986	4212
124	28- 5-64	29-10	884	626	**6343**	**4,66**	**295,70**	**333**	**3,70**	**235**	278	278	2108	4077
129	15- 4-64	17-10	915	541	**5611**	**4,78**	**268,14**	**302**	**3,87**	**217**	290	290	1792	3840
130	10- 4-64	15- 9	888	543	**5767**	**4,50**	**259,33**	**291**	**3,47**	**200**	318	318	1736	4105
123	19- 4-64	12- 9	876	514	**5443**	**4,66**	**253,38**	**285**	**3,77**	**205**	325	325	1641	3949
136	15- 7-64	29- 9	806	489	**5048**	**4,52**	**228,31**	**257**	**3,53**	**178**	308	308	1461	3673
137	24- 2-64	28-10	977	517	**4835**	**4,64**	**224,38**	**252**	**3,66**	**177**	279	279	1459	3421
122	24- 4-64	20-10	909	589	**4983**	**4,48**	**223,24**	**251**	**3,57**	**178**	287	287	1468	3546
133	1- 8-64	14- 9	774	500	**4861**	**4,57**	**222,31**	**250**	**3,83**	**186**	323	323	1382	3778
127	10- 3-64	23- 9	927	528	**4458**	**4,96**	**220,95**	**249**	**3,92**	**175**	314	314	1335	3653
131	10- 4-64	11- 9	884	489	**4137**	**4,96**	**205,32**	**232**	**3,83**	**159**	326	326	1252	3757
125	15- 1-64	20- 9	979	561	**4349**	**4,63**	**201,41**	**227**	**3,95**	**172**	306	306	1229	3418
138	10- 4-64	7-10	910	515	**3781**	**4,95**	**187,00**	**211**	**3,77**	**143**	300	300	1023	3159
140	18- 2-64	22- 9	947	560	**3427**	**4,91**	**168,15**	**190**	**4,00**	**137**	304	304	915	3183
134	13- 8-64	4-10	782	521	**3406**	**4,75**	**161,72**	**182**	**3,83**	**131**	303	303	892	3014
141	16- 5-64	28-10	895	523	**3791**	**4,26**	**161,35**	**181**	**3,76**	**142**	279	279	928	3069
139	18- 1-64	7- 9	963	579	**3041**	**4,81**	**146,20**	**165**	**3,90**	**119**	298	330	927	3062
135	15- 8-64	3-10	779	573	**3031**	**4,51**	**136,72**	**154**	**3,64**	**110**	304	304	788	2924
132	23- 6-64	4-10	833	503	**2869**	**4,75**	**136,31**	**153**	**3,94**	**113**	303	303	781	2857
Gns. af 19 kvier			888	537	**4465**	**4,71**	**210,38**	**237**	**3,78**	**169**	303	304	1320	3509

Hovedtabel 34. **Afkomsprøve for tyren Djurs Wahl,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
20	26- 2-64	6- 9	923	537	**5774**	**4,36**	**251,89**	**283**	**3,73**	**215**	328	328	1595	3882
1	10- 2-64	13- 9	946	569	**5567**	**4,48**	**249,56**	**280**	**3,55**	**198**	321	321	1618	4010
7	13-10-64	11-10	728	535	**5953**	**4,17**	**248,51**	**279**	**3,48**	**207**	293	293	1735	4007
9	27-12-63	25- 9	1003	547	**5011**	**4,45**	**222,95**	**251**	**3,82**	**191**	309	309	1407	3753
12	20-10-63	4-10	1080	626	**5177**	**4,28**	**221,64**	**249**	**3,54**	**183**	300	300	1455	3670
4	9- 5-64	9- 9	853	622	**5458**	**4,05**	**221,22**	**248**	**3,38**	**185**	325	325	1458	3831
10	4- 3-64	29- 9	939	593	**4959**	**4,45**	**220,71**	**248**	**3,69**	**183**	305	305	1426	3654
18	27- 2-64	5- 9	921	590	**5016**	**4,35**	**217,99**	**245**	**3,68**	**184**	329	329	1352	3725
11	1- 3-64	23- 9	936	584	**4805**	**4,45**	**213,65**	**240**	**3,79**	**182**	311	311	1327	3767
19	3- 1-64	15- 9	986	588	**4378**	**4,74**	**207,64**	**234**	**3,96**	**173**	318	318	1256	3664
14	7- 5-64	22- 9	868	560	**4407**	**4,62**	**203,61**	**229**	**3,63**	**160**	312	312	1281	3594
17	19- 9-64	2-11	774	522	**4463**	**4,55**	**203,20**	**229**	**3,56**	**159**	271	271	1289	3407
21	7- 3-64	1-10	938	505	**4537**	**4,35**	**197,34**	**222**	**3,60**	**163**	303	303	1307	3528
3	22- 7-64	6-11	837	590	**4705**	**4,17**	**196,16**	**220**	**3,63**	**171**	267	267	1308	3302
13	25- 1-64	12- 9	961	585	**4861**	**4,00**	**194,39**	**218**	**3,48**	**169**	322	322	1180	3560
22	5- 9-64	18-10	773	559	**4206**	**4,60**	**193,39**	**218**	**3,71**	**156**	286	286	1200	3270
8	3- 4-64	14- 9	894	571	**4683**	**4,09**	**191,34**	**214**	**3,71**	**174**	312	312	1165	3539
2	4- 1-64	21- 9	991	613	**4077**	**4,45**	**181,45**	**204**	**3,72**	**152**	313	313	1039	3079
5	21- 4-64	17-10	909	582	**4109**	**4,23**	**173,71**	**195**	**3,63**	**149**	287	287	1089	3381
6	7- 6-64	4-11	880	582	**3543**	**4,30**	**152,24**	**171**	**3,71**	**131**	269	269	901	2982
Gns. af 20 kvier			907	573	**4784**	**4,35**	**208,13**	**234**	**3,64**	**174**	304	304	1321	3580

s. 28383, på Kalø.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,6	2,38	16-12	37	Mo, r. 26590	Jens Andersen, Rørbæk.
5,2	1,34	8- 2	18	Karl, r. 26591	Kristian Pedersen, Houtved.
2,9	2,99	28- 1	48	ukendt	Hans Poulsen, Hørby.
2,6	3,25	1-12	30	ukendt	Hobroegnens Kvægavlsforening.
3,0	2,68	8-12	73	Rørbæk, r. 25718	Kjeld Byrialsen, Nørager.
2,6	3,23	26-12	83	Nr. 85, s. 4319	Kr. Krogh Jensen, Andrup.
3,2	2,60	11- 1	77	Mo, r. 26590	Peter Bertelsen, Skellerup.
5,0	1,60	—	17	Mo, r. 26590	Thorkild Højberg, Hersom.
2,9	2,47	26-12	13	Zeus Holt, s. 4744	Brdr. Rasmussen, Krogen.
3,5	2,06	13- 1	25	Mo, r. 26590	Jens Johansen, Ll. Rørbæk.
2,0	3,32	4- 1	62	Odd, s. 4745	Karl Boe Kristensen, Onsild.
4,0	1,82	28-11	58	Sloth, r. 27954	Rich. Jensen, Glenstrup.
2,2	3,03	17- 1	69	Randers Kjær, r. 26388	Niels Møller, Skellerup.
2,8	2,45	28-11	45	Frits, r. 27048	Anton Madsen, Kjemtrup.
2,3	2,70	22- 2	191	ukendt	Niels Holger Bisgaard, Mejlby.
2,7	2,55	3- 1	23	Rørbæk, r. 25718	Kresten Bagger, Båndrup.
3,6	1,79	14- 1	12	Tornbjerg, s. 4584	Karlo Pedersen, Rørbæk.
2,1	2,94	19-12	79	Samsø El, r. 25749	Kr. Krogh Jensen, Andrup.
2,1	2,88	18- 4	17	ukendt	Svend Aage Andersen, Alstrup.
3,1	2,53				

s. 28311, på Kalø.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,3	2,53	22- 2[1]	76	Djurs Buster, r. 25873	Aage Rasmussen, Thorsø.
2,7	3,18	10- 3	11	Arne, r. 25743	Jens Erik Jensen, Ramten Hede.
4,2	2,03	10- 1	82	Århus Rollo, r. 26942	Arne Thorup, Veggerslev.
3,8	2,09	5- 1	91	Djurs Frøy, r. 27972	Aage Rasmussen, Thorsø.
5,5	1,35	12-12	51	Kørbitz Mølholm, f. 16-3-48	Gerda Grønfeldt, Holme.
2,4	3,61	14-12	10	Djurs Arne, r. 26608	Erling Sørensen, Christiansminde.
3,5	2,35	16- 1	28	Djurs Gert, s. 4858	Harald Hansen, Lyngby.
3,0	2,50	23-12	52	Djurs Gert, s. 4858	Olaf Kaag, Skindbjerg.
3,5	2,23	23- 1	16	Djurs El, r. 26890	Niels Thorup, Karlby.
3,6	2,08	6-12	21	ukendt	Niels Thorup, Karlby.
3,6	2,05	20-12	32	Djurs Gert, s. 4858	Bent Juhl Nielsen, Robstrup.
4,4	1,84	6- 3	39	Djurs Gert, s. 4858	Rasmus Busk, Skærvad.
3,1	2,39	21- 2	25	Djurs Gert, s. 4858	Gustav Lassen, Gjerrild.
4,0	2,09	25- 2	100	Elg 88, r. 26175	Frede Johnsen, Ramten.
2,9	2,53	27-12	9	Djurs Gert, s. 4858	Niels Erik Pallesen, Enegårde.
5,8	1,31	25- 5	47	Djurs Horn, r. 27116	Chr. Helbo, Rosmus.
3,7	2,05	24-11	81	Djurs Falk, r. 25865	Niels Erik Pallesen, Enegårde.
3,7	2,02	22-12[2]	36	Djurs Gert, s. 4858	Skou Andersen, Allelev.
3,3	2,36	2- 1	82	Djurs Gert, s. 4858	Anders Eskildsen, Thorsø.
3,2	2,46	11- 2	15	Sortemose, s. 4680	Anders V. Rasmussen, Holme.
3,7	2,25				

[1] Kastet 2-2 efter ins. 19-12.
[2] Kastet 22-7.

Hovedtabel 35. **Afkomsprøve for tyren Hadsten Gert,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
62	24- 4-64	24-10	913	591	**5787**	**4,41**	**255,00**	**286**	**3,57**	**207**	288	288	1757	3831
63	13- 6-64	9- 9	818	567	**5735**	**4,35**	**249,63**	**280**	**3,64**	**209**	324	324	1666	4059
64	16- 2-64	28-10	985	596	**5177**	**4,61**	**238,55**	**268**	**3,77**	**195**	284	284	1627	3752
72	18- 3-64	25- 9	921	477	**5936**	**4,01**	**238,21**	**267**	**3,35**	**199**	317	317	1605	3771
80	23- 4-64	23- 9	883	515	**5290**	**4,47**	**236,58**	**266**	**3,63**	**192**	319	319	1554	3807
67	7- 6-64	20- 9	835	540	**5181**	**4,26**	**220,54**	**247**	**3,69**	**191**	320	320	1449	3803
75	11- 8-64	3-10	783	502	**5176**	**4,23**	**218,97**	**246**	**3,60**	**186**	309	309	1458	3649
69	2- 6-64	12-11	893	515	**5083**	**4,28**	**217,74**	**244**	**3,66**	**186**	269	269	1491	3434
70	24- 2-64	16- 9	935	529	**4810**	**4,22**	**202,81**	**227**	**3,76**	**181**	326	326	1244	3654
78	4- 8-64	13-10	800	506	**4493**	**4,42**	**198,63**	**223**	**3,57**	**160**	299	299	1247	3458
71	24- 5-64	16-10	875	576	**4302**	**4,57**	**196,45**	**221**	**3,84**	**165**	296	296	1199	3458
66	23-12-63	12-10	1024	541	**3908**	**4,91**	**191,86**	**216**	**3,99**	**156**	300	300	1120	3347
76	28- 7-64	10-10	804	555	**4683**	**4,05**	**189,76**	**212**	**3,46**	**162**	302	302	1229	3466
68	18- 1-64	11- 9	967	550	**4339**	**4,28**	**185,80**	**208**	**3,81**	**165**	331	331	1101	3625
65	10- 9-64	6-10	756	578	**4253**	**4,37**	**185,70**	**209**	**3,71**	**158**	306	306	1108	3397
73	11- 6-64	19-10	860	573	**3761**	**4,70**	**176,87**	**199**	**3,97**	**149**	293	293	991	3232
77	12- 1-64	15-10	1007	517	**3516**	**4,75**	**166,91**	**188**	**3,67**	**129**	297	297	959	3006
81	26- 6-64	8-10	834	457	**3658**	**4,22**	**154,49**	**173**	**3,74**	**137**	304	304	898	3090
74	8-10-64	22-10	744	506	**3455**	**4,44**	**153,46**	**172**	**3,85**	**133**	290	290	863	3085
Gns. af 19 kvier			876	536	**4660**	**4,38**	**204,10**	**229**	**3,68**	**172**	304	304	1292	3522

Hovedtabel 36. **Afkomsprøve for tyren Århus Ask,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
1	18- 1-64	6-10	992	520	**5852**	**4,15**	**243,04**	**272**	**3,45**	**202**	305	305	1703	3909
15	30- 8-64	30- 9	761	510	**5053**	**4,49**	**226,95**	**255**	**3,66**	**185**	311	311	1425	3611
3	19- 5-64	8-10	872	546	**4923**	**4,59**	**225,89**	**254**	**3,77**	**186**	303	303	1417	3599
19	7- 5-64	2-11	909	519	**5022**	**4,43**	**222,56**	**250**	**3,75**	**188**	278	278	1465	3600
18	11- 3-64	2-10	935	511	**4696**	**4,55**	**213,63**	**240**	**3,73**	**175**	309	309	1295	3457
4	15- 5-64	19- 9	857	537	**4981**	**4,23**	**210,72**	**236**	**3,73**	**186**	322	322	1313	3684
5	8- 1-64	6-10	1002	548	**4758**	**4,35**	**207,02**	**232**	**3,69**	**176**	305	305	1303	3427
2[1]	14- 5-64	15- 9	854	550	**4895**	**4,20**	**205,45**	**230**	**3,62**	**177**	326	326	1252	3439
13	28- 1-64	31-10	1007	450	**4630**	**4,41**	**204,32**	**230**	**3,73**	**173**	280	280	1311	3380
10	1- 3-64	28-10	971	550	**4489**	**4,54**	**203,63**	**229**	**3,70**	**166**	283	283	1263	3139
11	3- 2-64	21- 9	961	529	**4318**	**4,68**	**202,28**	**228**	**3,77**	**163**	320	320	1151	3351
16	14- 8-64	17- 9	764	515	**4771**	**4,23**	**201,74**	**226**	**3,75**	**179**	324	324	1204	3588
14	27- 6-64	26- 9	821	510	**4554**	**4,30**	**195,77**	**220**	**3,78**	**172**	315	315	1162	3563
9	1- 5-64	2- 9	854	478	**4226**	**4,61**	**194,89**	**219**	**3,79**	**160**	339	339	1064	3408
7	21- 8-64	25- 9	765	529	**4409**	**4,34**	**191,47**	**215**	**3,85**	**170**	315	315	1125	3333
6	11- 6-64	18-10	859	520	**4028**	**4,48**	**180,54**	**203**	**3,80**	**153**	293	293	1052	3211
8	27- 7-64	9-11	835	516	**4313**	**4,13**	**178,33**	**200**	**3,79**	**163**	271	271	1096	3157
12	12- 8-64	28- 9	777	536	**3571**	**4,77**	**170,34**	**192**	**3,94**	**141**	298	298	866	3067
17	12- 1-64	28-10	1020	509	**3790**	**4,15**	**157,27**	**176**	**3,77**	**143**	283	283	881	2905
Gns. af 19 kvier			885	520	**4594**	**4,39**	**201,89**	**227**	**3,73**	**171**	304	304	1229	3413

[1] Venstre forpatte stukket op efter pattetråd.

s. 28617, på Kalø.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,1	1,63	13- 6	93	Sortemose, s. 4680	Martinus Hansen, Hadbjerg.
2,8	3,13	3-12	25	Hadsten Wahl, e.A 4940	Peter Villadsen, Faurskov.
3,6	2,39	18- 2	14	Sortemose, s. 4680	Alfred Bech, Vitten.
2,9	2,77	—	80	Hadsten Wahl, e.A 4940	Jens L. Møller, Værum.
4,8	1,55	—	273	Sortemose, s. 4680	Knud Brendstrup, Hår.
3,0	2,76	7-12	31	Hadsten Wahl, e.A 4940	Tage Rasmussen, Grundfør.
3,2	2,50	19-12	36	Højmark, r. 26511	Tage Rasmussen, Grundfør.
2,6	3,62	12- 6	58	Hadsten Wahl, e.A 4940	Sv. H. Jensen, Risvang.
2,8	2,68	11- 3	10	Ejlekær, s. 4416	Jens Johnsen, Grundfør.
3,6	2,03	14-12	97	Hadsten Wahl, e.A 4940	Aage Nielsen, Grundfør.
3,3	2,24	27- 2	233	Uffe 129, r. 26529	Niels P. Pedersen, Ødum.
2,7	2,62	5- 2	61	Stokholm, s. 4743	Hartvig Nielsen, Hallendrup.
3,1	2,48	25- 3	168	Hadsten Wahl, e.A 4940	Aksel Rasmussen, Røved.
3,0	2,30	26-12	54	Hadsten Wahl, e.A 4940	Anker Jensen, Balle.
2,6	2,90	27- 2[1]	21	Hadsten Wahl, e.A 4940	Tyregården, Hadsten.
2,7	2,67	11- 1	183	Lervang, r. 26281	Aksel Rasmussen, Røved.
3,3	2,07	25- 5	52	Uffe 129, r. 26529	Bent Jensen, Væth.
3,0	2,15	16- 2	74	Ejlekær, s. 4416	Børge Pedersen, Hallendrup.
2,7	2,30	17- 1	94	Lervang, r. 26281	Hartvig Nielsen, Hallendrup.
3,2	2,46				

[1] Kastet 3-2 efter ins. 13-12.

s. 28404, på Elkjær.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,8	2,26	29-12	39	Arne, r. 25743	Henry Andersen, Vrinners.
3,9	2,06	9- 2	37	Ott 32, s. 4848	Eigil Sørensen, Skårup.
2,8	2,76	1- 2	87	Kjær, r. 24871	Svend Mikkelsen, Knebel.
4,0	2,02	24-12	28	ukendt	Søren Jensen, Fejrup.
3,5	2,25	27- 2	40	Junker, r. 24927	Peter Erik Jensen, Egens.
4,8[1]	1,62[1]	26-12	54	Århus Toke, r. 26521	Ev. Pigsborg Jensen, Brabrand.
3,6	2,14	20-12	54	Raj, r. 26522	Robert Rasmussen, Grønfeldt.
4,0	1,88	4- 3	14	Århus Rollo, r. 26942	Jens Winther, Trige.
4,6	1,62	12- 1	58	Rudolf, r. 25701	Holger Andersen, Sjelle.
5,2	1,51	26-12[2]	75	Rudolf, r. 25701	Erik Dam, Basballe.
2,4	2,80	1- 2	71	Ørnsvig 34, r. 26179	Viggo Svendgaard, Ask.
3,8	1,96	14-12	84	Århus Rollo, r. 26942	Ove Sørensen, Jegstrup.
3,5	2,12	30-12	19	Ott 32, s. 4848	Aksel Sørensen, Sjelle.
3,2	2,06	11- 2	47	Hadsten Rolf, r. 27202	Ev. Pigsborg Jensen, Brabrand.
3,7	2,02	12-12	58	Rudolf, r. 25701	Poul Anthonsen, Hog.
4,6	1,50	26-12	57	Nr. 117, s. 4320	Jens Hegelund, Lillering.
3,4	2,33	21- 1	87	Ørnsvig 34, r. 26179	Poul Holst, Borup.
3,2	2,11	29-11	51	Rudolf, r. 25701	Ejnar Munk Pedersen, Galten.
5,4	1,29	8- 2	88	Århus Rollo, r. 26942	Julius Pedersen, Vedø.
3,9	2,02				

[1] Kun første måling.
[2] Kastet 28-6.

Hovedtabel 37. **Afkomsprøve for tyren Ribe Klint,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
74	17- 6-64	24-10	859	499	**5794**	**4,57**	**265,04**	**298**	**3,73**	**216**	290	290	1774	3769
68	10- 6-64	7-10	849	526	**5554**	**4,50**	**249,67**	**281**	**3,77**	**209**	307	307	1617	3762
79	10- 6-64	19- 9	831	578	**5011**	**4,53**	**226,98**	**255**	**3,67**	**184**	307	307	1375	3645
70	5- 6-64	21-10	868	512	**5054**	**4,39**	**222,11**	**249**	**3,66**	**185**	293	293	1388	3456
61	13- 8-64	7-11	816	507	**4825**	**4,39**	**211,87**	**238**	**3,62**	**175**	276	276	1323	3157
67	2- 6-64	20-10	870	535	**4858**	**4,25**	**206,56**	**232**	**3,74**	**182**	294	294	1289	3314
78	21- 8-64	29- 9	769	543	**4916**	**4,16**	**204,75**	**230**	**3,73**	**184**	315	315	1260	3406
77	4- 7-64	8- 9	796	435	**4439**	**4,49**	**199,47**	**224**	**3,60**	**160**	336	336	1097	3499
65	6- 8-64	5-10	790	582	**4846**	**4,11**	**198,99**	**223**	**3,57**	**173**	309	309	1204	3397
66	29- 6-64	2- 9	795	569	**4683**	**4,15**	**194,19**	**218**	**3,69**	**173**	342	342	1121	3525
69	17- 6-64	1-11	867	611	**4294**	**4,49**	**192,98**	**217**	**3,84**	**165**	282	282	1116	3109
72	4- 6-64	22- 9	840	505	**4101**	**4,66**	**191,18**	**215**	**3,86**	**158**	322	322	1032	3307
80	23- 5-64	21- 9	851	646	**4609**	**3,98**	**183,25**	**205**	**3,67**	**169**	323	323	1072	3569
62	22- 7-64	24- 9	794	482	**4218**	**4,24**	**178,70**	**200**	**3,54**	**149**	320	320	1003	3260
73	1- 9-64	2-11	792	453	**3957**	**4,50**	**177,90**	**200**	**3,78**	**150**	281	281	989	3020
64	31- 7-64	5-11	827	494	**3976**	**4,26**	**169,24**	**190**	**3,55**	**141**	278	278	930	2995
76	14- 6-64	18-10	856	582	**3643**	**4,42**	**161,05**	**181**	**3,79**	**138**	296	296	899	3023
63	15- 6-64	22- 9	829	506	**3770**	**4,27**	**160,90**	**181**	**3,69**	**139**	297	297	846	2900
75	25- 5-64	2-10	860	496	**3241**	**4,35**	**141,10**	**158**	**3,75**	**122**	312	312	744	2993
Gns. af 19 kvier			829	530	**4515**	**4,35**	**196,63**	**221**	**3,70**	**167**	304	304	1162	3321

Hovedtabel 38. **Afkomsprøve for tyren Varde Kry,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
47	19- 8-64	28- 9	770	477	**5769**	**4,26**	**245,92**	**276**	**3,51**	**202**	311	311	1450	3955
38	10- 6-64	5-10	847	503	**5949**	**4,03**	**239,89**	**269**	**3,44**	**205**	304	304	1456	4015
43	6- 4-64	21- 9	898	504	**5761**	**4,05**	**233,18**	**261**	**3,63**	**209**	305	305	1410	3820
32	11- 3-64	18- 9	921	504	**5107**	**4,35**	**222,33**	**250**	**3,76**	**192**	321	321	1208	3789
34	15- 3-64	16-10	945	531	**5256**	**4,15**	**218,17**	**245**	**3,62**	**190**	293	293	1228	3551
35	1- 4-64	3-11	946	550	**4497**	**4,57**	**205,54**	**231**	**3,73**	**168**	275	275	1108	3388
37	26- 3-64	4-10	922	500	**4275**	**4,52**	**193,28**	**217**	**3,98**	**170**	305	305	916	3314
40	7- 3-64	5-11	973	550	**4612**	**4,09**	**188,63**	**211**	**3,49**	**161**	273	273	1030	3261
42	21- 3-64	17-10	940	495	**4146**	**4,53**	**187,68**	**211**	**3,83**	**159**	292	292	907	3159
46	26- 7-64	12-10	808	456	**3946**	**4,64**	**183,19**	**206**	**3,82**	**151**	297	297	877	3255
41	12- 5-64	18- 9	859	549	**3899**	**4,68**	**182,43**	**205**	**3,89**	**152**	321	321	882	3348
45	11- 3-64	14- 9	917	525	**4207**	**4,31**	**181,34**	**204**	**3,58**	**151**	325	325	886	3465
48	20- 7-64	28- 9	800	503	**4151**	**4,27**	**177,33**	**199**	**3,56**	**148**	311	311	881	3167
39	4- 2-64	27- 9	966	551	**3959**	**4,32**	**171,19**	**192**	**3,80**	**151**	312	312	829	3154
31	21- 3-64	5-10	928	537	**3609**	**4,73**	**170,62**	**192**	**3,81**	**138**	304	304	774	3158
44	16- 5-64	13- 9	850	456	**3475**	**4,79**	**166,40**	**187**	**3,63**	**126**	313	313	754	3105
33	10- 6-64	3-10	845	520	**3766**	**4,37**	**164,45**	**185**	**3,63**	**137**	306	306	741	3122
36	10- 8-64	4-10	785	534	**3374**	**4,53**	**152,70**	**172**	**3,72**	**125**	305	305	663	2974
Gns. af 18 kvier			884	514	**4431**	**4,37**	**193,57**	**217**	**3,68**	**163**	304	304	1000	3389

s. 28421, på Skølvad.

Malketid i min.	Malkbarhedstal	Drægtighed	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,6	1,81	1- 7	92	Djurs Gert, s. 4858	Kr. Thuesen, Gjesing.
3,8	2,00	18- 5[1]	85	Gran, s. 4691	Henning Jensen, Villebøl.
6,5	1,00	29-11	31	Gran, s. 4691	Laur. Schmidt, Birkelev.
4,3	1,79	27- 2	—	ukendt	Kaj Holm, V. Åstrup.
7,4	0,77	7- 2	58	Ribe Jarl, r. 26692	Olav Jensen, Øster Bjerndrup.
3,6	2,11	11- 5	14	Birk, s. 4500	Niels Tranberg, V. Nebel.
4,9	1,40	19- 1	42	Lærk, s. 4803	Karl Schøler, Jernvedlund.
2,2	3,12	16- 1	28	Birk, s. 4500	Erik Lauridsen, Debel.
3,8	1,95	18- 1	62	Lærk, s. 4803	Søren Termansen, Jernvedlund.
5,8	1,19	3- 2	66	Birk, s. 4500	Poul V. Jensen, Nr. Bøel.
4,2	1,79	18- 5	30	Lærk, s. 4803	Kaj Jensen, Lustrup.
5,1	1,37	25- 2	27	Birk, s. 4500	Aksel Hansen, Plougstrup.
3,9	1,81	14-12	80	Navr, s. 4430	Peder Vestergaard, Høm.
5,2	1,37	8- 7	72	Lærk, s. 4803	Morten Nielsen, Hygum.
5,2	1,34	21- 1	51	Ribe Jarl, r. 26692	Evald Knudsen, Rodebæk.
4,6	1,50	6- 1	42	Birk, s. 4500	Alfred Christensen, Terpling.
4,6	1,48	1- 7	135	Birk, s. 4500	N. S. Nielsen, Bjerndrup.
5,0	1,31	21-11	40	Lærk, s. 4803	Chr. Sørensen, Fåborg, Varde.
2,8	2,24	23- 1	23	Birk, s. 4500	Hans Jørgen Nielsen, V. Vedsted.
4,6	1,65				

[1] Kastet 8-8.

s. 28427, på Vardegård.

Malketid i min.	Malkbarhedstal	Drægtighed	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,5	2,37	11- 1	47	Varde Roht, r. 27044	Jens Th. Jensen, Gødsvang.
3,0	2,86	2- 1	76	Varde Dux, r. 26690	Hans Christiansen, Debel.
3,9	2,10	30-11	79	Jan, r. 25377	H. Chr. Pedersen, Kvong.
4,0	1,84	20- 2	27	Birk, s. 4500	Gunnar Christensen, Nr. Starup.
4,8	1,59	14- 1	91	Post, r. 25372	Søren P. Eskildsen, Bryndum.
3,6	2,17	5- 5	83	Varde Keld, r. 26162	Niels M. Andersen, Hauge.
3,9	1,83	6- 3	27	Lærk, s. 4803	Richard Pedersen, Kjærsing.
3,2	2,51	13- 2	9	ukendt	Verner Iversen, Sdr. Mark, Varde.
3,1	2,34	1- 6[1]	24	Post, r. 25372	Ejner Brink, Kokspang.
3,2	2,27	6- 1	33	Varde Roht, r. 27044	Bonde Tobiasen, Janderup.
3,3	2,08	10- 1	31	Kær, s. 4700	Marius Jensen, Skonagerlund.
4,2	1,69	29-12	62	ukendt	Gustav Jensen, Nr. Urup.
3,3	2,10	13- 2[2]	47	Varde Alex, r. 26687	E. Bertelsen & H. Stagelund, Frisvad
2,3	2,83	29-12	42	Varde Gynn, r. 27042	Johs. Jensen, Bryndumdam.
2,4	2,61	20- 2	53	Varde Stub, r. 26160	Johs. Mikkelsen, Nr. Starup.
2,6	2,38	26-11	67	Lo, s. 4758	Poul Sole Sørensen, Tistrup.
3,2	2,18	26- 1	51	Varde Knud, r. 26462	Arne Jensen, Nollund.
3,6	1,76	30- 1	59	Kær, s. 4700	Knud Jørgensen, Henneby.
3,4	2,20				

[1] Kastet 29-5 efter ins.18-2.
[2] Kastet 25-4.

Hovedtabel 39. **Afkomsprøve for tyren Kolding Munk 143,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
21	8- 3-64	18-10	954	548	**5833**	**4,30**	**251,01**	**282**	**3,72**	**217**	298	298	1721	3890
2	14- 7-64	20-10	828	511	**5810**	**4,25**	**246,87**	**277**	**3,71**	**216**	296	296	1764	3936
11	24- 4-64	29-10	918	531	**5297**	**4,49**	**237,90**	**267**	**3,75**	**199**	287	287	1585	3760
10	19- 5-64	14- 9	848	504	**5459**	**4,34**	**236,90**	**266**	**3,65**	**199**	319	319	1549	4008
6	7- 6-64	17- 9	832	532	**5125**	**4,61**	**236,45**	**266**	**3,84**	**197**	329	329	1462	3931
16	19- 5-64	18-10	882	502	**4350**	**4,60**	**200,02**	**225**	**3,63**	**158**	298	298	1170	3371
9	10- 5-64	17- 9	860	563	**4612**	**4,30**	**198,19**	**222**	**3,91**	**180**	323	323	1191	3602
18	18- 8-64	13- 9	756	545	**4238**	**4,64**	**196,69**	**221**	**3,68**	**156**	333	333	1158	3644
12	19-10-64	22-10	733	519	**4406**	**4,32**	**190,23**	**214**	**3,74**	**165**	294	294	1152	3214
13	14- 8-64	31-10	808	520	**3788**	**4,82**	**182,59**	**206**	**3,83**	**145**	285	285	1035	3244
7	27- 5-64	10- 9	836	540	**4016**	**4,38**	**176,01**	**198**	**3,64**	**146**	336	336	981	3216
4	1- 1-64	2-10	1005	577	**3792**	**4,43**	**168,02**	**189**	**3,75**	**142**	314	314	976	3163
3	4- 5-64	9- 9	858	571	**3739**	**4,35**	**162,80**	**183**	**3,72**	**139**	303	303	969	3182
8	20- 4-64	20-10	913	542	**3666**	**4,40**	**161,37**	**181**	**3,72**	**136**	296	296	898	3126
5	14- 6-64	18- 9	826	567	**3586**	**4,35**	**156,09**	**175**	**3,75**	**134**	294	294	933	3190
19	21- 6-64	17-10	848	531	**3006**	**5,04**	**151,50**	**171**	**3,91**	**117**	299	299	769	2860
1	5- 6-64	7-10	854	631	**3237**	**4,44**	**143,71**	**161**	**3,75**	**121**	296	309	837	3126
17	17- 9-64	22-10	765	534	**3082**	**4,55**	**140,23**	**158**	**3,73**	**115**	294	294	747	2860
20	20- 6-64	13-11	876	575	**2776**	**4,65**	**128,99**	**145**	**3,81**	**106**	272	272	696	2648
Gns. af 19 kvier			853	544	**4201**	**4,47**	**187,66**	**211**	**3,75**	**157**	303	304	1136	3367

Hovedtabel 40. **Afkomsprøve for tyren Bøg,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
107	4- 5-64	12-11	922	510	**5348**	**4,77**	**254,94**	**287**	**3,87**	**207**	274	274	1740	3668
108	31- 5-64	24- 9	846	486	**5147**	**4,57**	**235,26**	**265**	**4,04**	**208**	323	323	1492	3751
94	28- 8-64	14-11	808	565	**5132**	**4,36**	**223,90**	**251**	**3,62**	**186**	272	272	1528	3362
109	7- 5-64	5-10	881	450	**4676**	**4,71**	**220,25**	**248**	**4,02**	**188**	312	312	1345	3547
91	15- 3-64	24- 9	923	576	**4365**	**4,57**	**199,40**	**224**	**3,93**	**172**	323	323	1185	3429
105	2- 5-64	1-10	882	467	**4036**	**4,83**	**194,80**	**219**	**4,03**	**163**	316	316	1104	3427
100	3- 5-64	3-10	883	542	**4191**	**4,59**	**192,17**	**216**	**3,96**	**166**	314	314	1101	3384
110	10- 5-64	6-11	910	468	**3669**	**5,22**	**191,55**	**216**	**4,13**	**151**	280	280	1096	3065
97	14- 4-64	25- 9	894	530	**3734**	**4,82**	**180,16**	**203**	**4,02**	**150**	322	322	983	3325
103	30- 5-64	5-10	858	550	**3751**	**4,71**	**176,60**	**199**	**3,95**	**148**	312	312	998	3210
93	23- 5-64	29- 9	859	546	**3878**	**4,55**	**176,48**	**198**	**3,94**	**153**	318	318	1042	3209
99	2- 3-64	3-10	945	509	**3603**	**4,83**	**173,92**	**196**	**4,14**	**149**	314	314	933	3188
98	2- 3-64	19- 9	931	524	**3454**	**4,98**	**172,13**	**194**	**4,24**	**147**	328	328	958	3270
95	2- 4-64	17-10	928	581	**3715**	**4,53**	**168,38**	**189**	**3,93**	**146**	300	300	947	3201
104	17- 4-64	21-10	917	517	**3299**	**5,01**	**165,35**	**187**	**4,06**	**134**	296	296	892	2961
102	16- 5-64	1-11	899	538	**4057**	**3,98**	**161,63**	**181**	**3,72**	**151**	285	285	1035	2619
101	16- 1-64	21-10	1009	536	**3052**	**4,80**	**146,47**	**165**	**4,05**	**123**	296	296	812	2853
92	7- 4-64	2-11	939	624	**2316**	**5,24**	**121,31**	**137**	**4,19**	**97**	284	284	678	2731
Gns. af 18 kvier			902	529	**3968**	**4,70**	**186,37**	**210**	**3,97**	**158**	304	304	1104	3233

s. 28382, på Gelballegård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,0	2,29	24- 4	129	Poul Buster, r. 27201	Henning Knudsen, Hejnsvig.
3,8	2,42	21- 2	58	Kolding 139, r. 27115	Brdr. Lykke, Asbo.
5,2	1,52	22- 3	19	Kolding Loke 91, r. 25502	Julius Andreasen, Taps.
3,4	2,46	2-12	82	ukendt	Mads P. Bonde, Bække.
4,0	1,87	—[1]	87	Rødding Sverre, r. 27411	E. Grue-Sørensen, Vejen.
2,7	2,29	11- 1	114	Guldbjerg 12, s. 4496	Anders Ravn, Seest.
3,3	2,22	7-12	96	Kolding Rolf 73, e.A 4946	Hans Landmark, Ferup.
2,9	2,26	—	89	Rødding Brethvig, r. 26582	E. Grue-Sørensen, Vejen.
3,7	2,14	28- 2[2]	21	Ribe Jarl, r. 26692	Johs. Olsen, Holsted.
4,0[3]	1,55[3]	19-12	49	Kolding Sortemose 28, e.A 4980	Valdemar Andersen, Hejnsvig.
3,1	2,15	7- 4	57	Kolding Rolf 73, e.A 4946	Gunnar Thomsen, Bastrup.
3,5	1,76	25- 2[4]	54	Kolding Rørby 45, e.A 4976	Gunnar Jensen, Hejnsvig.
4,5	1,68	11-11	45	Kolding Rørby 45, e.A 4976	Magnus Kristensen, Hejnsvig.
4,6	1,53	31-12	67	Kolding Rolf 73, e.A 4946	Laurids Hansen, Nr. Lintrup.
3,9	1,83	11-11	10	ukendt	Orla Thorstensen, Hejnsvig.
4,3	1,35	27- 4	89	Kolding Dan 41, s. 4685	Aksel Larsen, Borlev.
3,5	1,92	13- 1	71	Loke 88, e.B 4925	Tage Rasmussen, Ferup.
2,8	2,31	29-12	161	Golf 2, f. 29-6-59	Henning Kruse, Hejnsvig.
3,2	2,01	31- 1	55	Kolding Høg 112, e.A 5006	Brdr. Lykke, Asbo.
3,7	1,98				

[1] Brummer.
[2] Kastet i maj.
[3] Kun 2. måling.
[4] Kastet i april.

s. 28444, på Kalø.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,3	2,72	—	5	Loke 88, e.B 4925	Jens Nielsen, Alrø.
3,0	2,50	26- 5	76	Elo, r. 27402	Georg Hansen, Spøttrup.
3,2	2,83	19- 4	95	Elo, r. 27402	Ebbe Piltoft Nielsen, Fensten.
3,0	2,49	21- 2[1]	48	Djurs Gert, s. 4858	S. Møller Sørensen, Saksild.
3,3	1,96	27-12[2]	133	Loke 88, e.B 4925	Niels Hansen, Fensten.
3,4	1,96	14- 3	35	Loke 88, e.B 4925	Holger Koch Jensen, Oldrup.
2,4	2,88	13- 3	88	Rom, r. 26778	Chr. Hansen, Alrø.
3,2	2,14	5- 2	49	Stevns Klint, s. 4659	S. Møller Sørensen, Saksild.
3,4	2,03	21-12	89	Øbo, e.B 4953	Peter Rasmussen, Gyllingskov.
2,3	2,72	10- 3	29	ukendt	Jens P. Therkelsen, Torrild.
2,8	2,36	21- 1	19	Loke 88, e.B 4925	Anker Hedegaard, Gylling.
1,9	3,17	12- 2	41	Jep, r. 25439	Svend Aa. Jønsson, Fløjstrup.
2,2	2,80	20- 3	41	Jep, r. 25439	Svend Aa. Jønsson, Fløjstrup.
2,9	2,35	2- 1	38	Roll, r. 25285	Johs. Fogh, Saksild.
3,8	1,80	14- 1	5	Stevns Klint, s. 4659	Johs. Andersen, Malskær.
2,7	2,76	—[3]	35	Loke 88, e.B 4925	N. G. Sørensen, Højby.
2,4	2,59	—	47	Stevns Klint, s. 4659	Knud Nielsen, Snærild.
2,2	2,47	11- 1	17	Holm, s. 4681	Harry Olsen, Højby.
2,9	2,47				

[1] Kastet 31-1 efter ins. 13-12.
[2] Kastet.
[3] Kronisk børbetændelse.

Hovedtabel 41. **Afkomsprøve for tyren Varde Stefan,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	Ialt f. e.
91	12- 4-64	4-11	936	548	**6528**	**4,89**	**319,35**	**360**	**3,45**	**225**	270	270	1987	3991
94	10- 7-64	25-10	837	591	**6434**	**4,57**	**293,88**	**330**	**3,49**	**224**	280	280	1992	4090
102	14- 5-64	20- 9	859	544	**6582**	**4,43**	**291,67**	**328**	**3,63**	**239**	315	315	1992	4152
98	29- 6-64	25- 9	818	569	**6097**	**4,65**	**283,73**	**319**	**3,80**	**232**	310	310	1862	4097
109	24- 4-64	15- 9	874	513	**6080**	**4,53**	**275,44**	**310**	**3,54**	**215**	320	320	1791	4073
95	20- 5-64	16-10	879	539	**5927**	**4,56**	**270,24**	**304**	**3,74**	**222**	289	289	1790	3866
99	10- 5-64	9- 9	852	556	**5311**	**5,00**	**265,79**	**300**	**4,12**	**219**	326	326	1662	3950
92	10- 4-64	12-10	915	559	**5910**	**4,47**	**264,20**	**297**	**3,65**	**216**	293	293	1728	3917
110	19- 5-64	26- 9	860	499	**6482**	**4,05**	**262,61**	**294**	**3,36**	**218**	309	309	1801	4023
96	7- 5-64	1-10	877	552	**6150**	**4,23**	**259,93**	**292**	**3,58**	**220**	304	304	1767	4030
100	21- 4-64	22- 9	884	531	**5549**	**4,63**	**257,01**	**289**	**3,72**	**207**	313	313	1630	3998
103	12- 4-64	6-10	907	580	**4941**	**4,86**	**239,93**	**270**	**3,86**	**191**	299	299	1472	3568
101	14- 6-64	16- 9	824	595	**5155**	**4,56**	**235,07**	**264**	**3,67**	**189**	319	319	1443	3941
107	5- 6-64	25- 9	842	564	**5086**	**4,53**	**230,34**	**259**	**3,67**	**187**	310	310	1416	3711
104	4- 8-64	30- 9	787	564	**5664**	**4,07**	**230,33**	**258**	**3,39**	**192**	305	305	1502	3783
93	28- 8-64	21- 9	754	535	**5307**	**4,31**	**228,88**	**257**	**3,60**	**191**	314	314	1420	3794
106	19- 4-64	17- 9	881	527	**5009**	**4,57**	**228,86**	**257**	**3,59**	**180**	318	318	1377	3756
97	7- 7-64	4-10	819	527	**5924**	**3,67**	**217,54**	**243**	**3,53**	**209**	301	301	1492	3715
105	4- 6-64	27-10	875	559	**4680**	**4,59**	**214,81**	**242**	**3,52**	**165**	278	278	1301	3257
108	1-10-64	25- 9	724	577	**3784**	**4,34**	**164,38**	**185**	**3,76**	**142**	310	310	886	3173
Gns. af 20 kvier			850	551	**5630**	**4,47**	**251,70**	**283**	**3,63**	**204**	304	304	1616	3844

Hovedtabel 42. **Afkomsprøve for tyren Kolding Gordon 39,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	Ialt f. e.
64	8- 3-64	25- 9	931	517	**7522**	**4,14**	**311,49**	**349**	**3,61**	**272**	316	316	2137	4592
66	3- 6-64	6-10	855	476	**7010**	**4,35**	**304,69**	**342**	**3,48**	**244**	305	305	2206	4561
79	9- 2-64	6-10	970	529	**7139**	**4,13**	**295,10**	**331**	**3,29**	**235**	305	305	2119	4565
75	6- 2-64	22- 9	959	500	**6988**	**4,07**	**284,47**	**319**	**3,67**	**256**	319	319	2026	4390
70	7- 5-64	9- 9	855	500	**6221**	**4,47**	**277,99**	**312**	**3,73**	**232**	332	332	1800	4447
62	6- 1-64	20- 9	988	558	**5983**	**4,50**	**269,50**	**303**	**3,59**	**215**	321	321	1750	4311
77	14- 2-64	2-10	961	476	**6313**	**4,24**	**267,48**	**300**	**3,72**	**235**	309	309	1819	4369
68	5- 3-64	13- 9	922	565	**5944**	**4,46**	**265,16**	**298**	**3,80**	**226**	327	327	1712	4168
69	26- 6-64	8- 9	804	503	**5992**	**4,39**	**263,19**	**296**	**3,67**	**220**	333	333	1799	4210
71	13- 2-64	6-11	997	478	**5818**	**4,27**	**248,25**	**279**	**3,68**	**214**	274	274	1703	3865
80	11- 8-64	10- 9	760	605	**5443**	**4,53**	**246,34**	**277**	**3,71**	**202**	253	253	1722	3499
67	30- 7-64	25-10	817	536	**5793**	**4,14**	**239,75**	**269**	**3,62**	**209**	286	286	1601	3922
76	22- 3-64	17- 9	909	514	**5524**	**4,30**	**237,80**	**267**	**3,70**	**204**	324	324	1563	4159
78	1-10-64	17-10	746	503	**5166**	**4,54**	**234,46**	**264**	**3,72**	**192**	294	294	1502	3839
65	8- 2-64	6-10	971	554	**6853**	**3,38**	**231,80**	**258**	**3,32**	**228**	305	305	1739	4150
63	23- 3-64	11-10	932	561	**5688**	**4,06**	**231,01**	**259**	**3,32**	**189**	300	300	1529	3960
72	12- 9-64	27- 9	745	585	**4826**	**4,70**	**226,79**	**255**	**3,75**	**181**	314	314	1363	3830
73	24- 7-64	12-10	810	481	**5417**	**4,07**	**220,37**	**247**	**3,55**	**192**	299	299	1488	3816
61	8- 4-64	28-10	933	598	**4411**	**4,70**	**207,50**	**234**	**3,76**	**166**	283	283	1205	3388
74	11- 9-64	1-11	781	555	**3886**	**4,36**	**169,51**	**190**	**3,66**	**142**	279	279	950	3172
Gns. af 20 kvier			882	530	**5897**	**4,27**	**251,63**	**282**	**3,61**	**213**	304	304	1687	4061

. 7296, på Skølvad.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,4	2,76	3- 4	2	ukendt	Hans Erik Hansen, Gadegård.
5,5	1,37	—[1]	44	Varde Strib, s. 6889	Jacob P. Lauridsen, V. Debel.
3,5	2,40	—	46	Varde Johan, e.s. 6537	Terkild Horsbøl, Yderik.
3,4	2,45	17-12	19	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Frits Johnsen, Lifstrup.
3,0	2,70	11- 1	35	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Jørgen Jørgensen, Lifstrup.
2,6	3,14	—[1]	13	Varde Sultan, s. 6778	Statens Marskforsøg, Ribe.
6,1	1,08	21- 6	45	Varde Juul, s. 6781	Chr. M. Jensen, Skonager.
3,1	2,76	5- 4	33	Varde Sultan, s. 6778	Kr. Linding Nielsen, Transbøl.
3,2	2,97	16- 2	95	Felsum Athleet, s. 6517	Sigurd Nielsen, Andrup.
4,7	1,50	7- 4	43	Varde Johan, e.s. 6537	Børge Andreasen, Rousthøje.
2,4	3,32	16- 1	57	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Thorø Pedersen, Kærbæk.
2,8	2,63	2- 5	31	ukendt	Peder Enggaard Poulsen, Nr. Bork.
2,8	2,52	20- 1	25	Varde Bob, e.A 54	Gunnar Bautrup, Gårde.
2,1	3,20	22- 3	169	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Chr. Madsen, Malle.
2,4	3,00	27-12	51	Varde Bob, e.A 54	Børge Andreasen, Rousthøje.
2,0	3,83	17-12	38	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Karl Houlberg Hansen, Hulvig.
1,7	4,20	9-12	64	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Laurids Pagaard, Bjallerup.
3,5	2,25	3- 2	158	Varde Zijlster, s. 6642	Henning Pedersen, Grindsted.
4,3	1,71	14- 3	12	Varde Ruyter, s. 6776	Jens Chr. Haahr, Gårde.
2,3	2,72	13- 1	43	Varde Jetze, s. 6780	Jørgen Kristiansen, Allerslev.
3,2	2,63				

[1] Brummer.

. 7304, på Gelballegård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,4	1,99	—	59	Sdj. Ernst, e.A 44	Frode Jepsen, Jordrup.
5,6	1,43	10- 4	24	Sdj. Tim, e.A 38	Viktor Petersen, Seest.
3,4	2,87	27- 2	127	Lysholt Henrik, s. 7044	P. Rostgaard Andersen, Jordrup.
3,1	2,94	24- 4	23	Ceres, e.s. 6137	Peter Schelde, Korsvang.
3,6	2,36	5- 1	73	ukendt	Jens F. Juhl, Uhre.
3,6	2,14	14- 3	179	ukendt	N. P. Gundtoft, Varmark.
4,1	1,87	18- 1	37	Sdj. Ursus, s. 6454	Erling Sejrup, Veerst.
3,9	1,99	7-12	41	Sdj. Ernst, e.A 44	Ejnar Hjortkjær, Vamdrup.
4,5	1,78	15- 4	51	Varde Bob, e.A 54	Hans Sørensen, Skibelund.
5,2	1,54	27- 3	63	Sdj. Wass, e.A 2	Søren Andersen, Estrup.
3,6	2,44	31-12	5	Sdj. Ernst, e.A 44	Martin Petersen, Gesten.
4,8	1,79	6- 1	81	Sdj. Ceres, s. 6453	Aa. Skovsgaard Nielsen, Ødis.
2,9	2,67	21- 1	22	ukendt	Erling Sejrup, Veerst.
3,0	2,75	4- 2	26	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Marinus Grosen, Lundtofte.
3,1	2,77	21-12	21	Sdj. Ernst, e.A 44	J. Boesen, Vamdrup.
2,8	2,85	25- 1	14	Lerte 98, s. 6842	Mathias Jessen, Nyskov.
3,3	2,30	20- 5	42	Sdj. Argus, s. 6764	Carlo Hansen, Bække.
3,1	2,58	10- 1	31	ukendt	Ejler Nielsen, Vamdrup.
4,9	1,47	—	15	Obel, e.s. 6096	Ejnar Nielsen, Gamst.
3,3	2,16	2- 1	58	Sdj. Ernst, e.A 44	E. Solgaard Nielsen, Lejrskov.
3,8	2,23				

Hovedtabel 43. **Afkomsprøve for tyren Egholm Gran**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
72	x- 7-64	8-10	815	470	**7124**	**4,32**	**307,56**	**345**	**3,54**	**252**	308	308	2367	438
70	4- 4-64	22- 9	901	587	**6743**	**4,29**	**289,15**	**324**	**3,56**	**240**	324	324	2172	435
64	25- 2-64	27- 9	945	474	**7226**	**3,99**	**288,14**	**322**	**3,38**	**245**	319	319	2283	450
66	25- 5-64	27- 9	855	544	**5634**	**4,93**	**277,57**	**313**	**3,84**	**216**	319	319	1963	431
63	21- 6-64	5- 9	806	563	**5898**	**4,46**	**262,76**	**295**	**3,69**	**218**	341	341	1959	429
67	1- 5-64	30- 8	851	573	**5733**	**4,56**	**261,67**	**294**	**3,88**	**222**	341	341	1828	427
65	x- 6-64	30-10	867	556	**6316**	**4,13**	**260,76**	**292**	**3,37**	**213**	286	286	2006	395
75	19- 8-64	2-10	774	522	**5948**	**4,36**	**259,44**	**291**	**3,51**	**209**	314	314	1903	403
80	14- 9-64	16-10	762	508	**5892**	**4,37**	**257,74**	**289**	**3,64**	**214**	300	300	1845	395
76	17- 6-64	28- 9	833	513	**6424**	**3,98**	**255,84**	**286**	**3,57**	**229**	318	318	1960	419
62	30- 3-64	3-11	948	543	**5926**	**4,24**	**251,06**	**282**	**3,58**	**212**	282	282	1848	390
68	1- 6-64	20-11	902	519	**6201**	**3,97**	**246,40**	**276**	**3,40**	**211**	265	265	1826	384
78	22- 4-64	15-11	937	510	**5293**	**4,47**	**236,43**	**266**	**3,74**	**198**	270	270	1676	360
69[1]	8- 6-64	27- 8	810	554	**5181**	**4,47**	**231,37**	**260**	**3,76**	**195**	337	337	1551	391
77	17- 8-64	25- 9	769	529	**5017**	**4,48**	**224,80**	**253**	**3,65**	**183**	308	308	1602	364
61	27- 2-64	23-10	969	577	**4940**	**4,46**	**220,11**	**247**	**3,66**	**181**	293	293	1513	355
79	20- 4-64	18-10	911	496	**5181**	**4,19**	**216,97**	**243**	**3,69**	**191**	298	298	1512	370
74	26- 8-64	3-10	768	539	**5112**	**4,19**	**214,21**	**240**	**3,52**	**180**	313	313	1512	364
73	3- 3-64	7-11	979	548	**4901**	**4,05**	**198,57**	**222**	**3,40**	**166**	278	278	1383	334
71	30- 9-64	23-11	784	535	**4595**	**4,13**	**189,66**	**213**	**3,54**	**163**	262	262	1322	320
Gns. af 20 kvier			859	533	**5764**	**4,29**	**247,51**	**278**	**3,59**	**207**	304	304	1802	393

[1] Højre bagpatte stukket op efter pattetråd.

Hovedtabel 44. **Afkomsprøve for tyren Sdj. Aksel**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
38	22- 2-64	10- 9	931	557	**6859**	**4,73**	**324,59**	**365**	**3,48**	**239**	328	328	2113	481
34	4- 5-64	24- 9	873	520	**6224**	**5,18**	**322,19**	**364**	**3,62**	**225**	314	314	2020	461
35	4- 3-64	5- 9	915	546	**6306**	**4,96**	**313,00**	**353**	**3,81**	**241**	333	333	1916	468
31	31- 3-64	25- 9	908	524	**6094**	**4,84**	**295,15**	**333**	**3,61**	**220**	313	313	1803	447
42	21- 4-64	1-10	893	448	**5950**	**4,84**	**288,05**	**325**	**3,62**	**216**	307	307	1770	436
51	12- 5-64	7-10	878	462	**5970**	**4,68**	**279,52**	**315**	**3,67**	**219**	301	301	1764	437
47	9- 3-64	23-10	958	533	**5401**	**5,07**	**273,97**	**309**	**3,72**	**201**	285	285	1665	404
44	24- 2-64	15-10	964	510	**5693**	**4,58**	**260,98**	**294**	**3,48**	**198**	293	293	1633	421
50	5- 2-64	29-11	1028	577	**5324**	**4,80**	**255,55**	**288**	**3,61**	**192**	248	248	1575	375
52	13- 5-64	20-10	890	536	**5395**	**4,65**	**251,00**	**282**	**3,52**	**190**	288	288	1510	414
43	28- 2-64	9-10	954	478	**5213**	**4,78**	**249,20**	**281**	**3,63**	**189**	299	299	1507	406
37	29- 4-64	24- 9	878	536	**4938**	**5,01**	**247,44**	**279**	**3,64**	**180**	314	314	1410	407
46	27- 3-64	17-10	934	532	**5156**	**4,75**	**244,94**	**276**	**3,64**	**188**	291	291	1454	396
36	28- 2-64	25- 9	940	553	**5290**	**4,39**	**232,01**	**261**	**3,59**	**190**	313	313	1359	390
48	14- 4-64	1-10	900	555	**4103**	**5,15**	**211,24**	**238**	**3,74**	**154**	307	307	1124	375
40[1]	16- 4-64	10- 9	877	605	**4241**	**4,94**	**209,35**	**236**	**3,82**	**162**	316	316	1066	360
49	16- 4-64	25-10	922	588	**3839**	**4,85**	**186,32**	**210**	**3,90**	**150**	283	283	971	355
41	8- 5-64	15- 9	860	528	**3871**	**4,36**	**168,72**	**189**	**3,51**	**136**	318	318	815	351
33	24- 4-64	16- 9	875	576	**1964**	**4,27**	**83,83**	**94**	**3,63**	**71**	254	322	579	294
Gns. af 19 kvier			915	535	**5149**	**4,80**	**247,21**	**278**	**3,64**	**187**	300	304	1477	404

[1] Trepattet fra kælvning.

s. 7515, på Skovgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,4	2,00	22- 6	3	ukendt	Jørgen Christensen, Vinding.
6,4	1,06	2- 2	92	Poll, e.A 8	John Østergaard, Vinding.
5,4	1,35	10- 1	56	Silkeborg Nor, e.A 56	Gotfred Herskind, Molgjer.
3,4	2,38	2- 2	85	ukendt	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
2,8	3,05	4- 1	17	ukendt	Svend Madsen, Føvling.
4,3	1,80	9-12	23	ukendt	Magnus Budde, Thorlund.
3,9	2,26	10- 2	—	ukendt	Linus Pedersen, Boest.
2,4	3,63	9- 1	36	Egholm Foch, s. 7012	Karl Frandsen, Hvolgårds Mark.
5,5	1,46	2- 3	96	Egholm Reclame, s. 6850	Aksel Frandsen, Føvling.
4,0	1,95	14- 1	17	Gordon, e.s. 6462	Jens Hansen, Skade.
3,6	2,44	27- 1	55	ukendt	Aage K. Pedersen, Vonge.
6,4	1,00	6- 2	—	ukendt	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
4,2	1,94	22- 2	37	ukendt	Gunner Laursen, Rodvigsballe.
3,5	2,09	5-12	54	Poll, e.A 8	Jørn Bank, Træden.
3,5	2,22	5-12	—	ukendt	Harald Jensen, Addit.
3,3	2,43	15- 4	43	Egholm Reclame, s. 6850	Herluf Laustsen, Nim.
4,4	1,80	19- 1	90	Poll, e.A 8	Thorkild Friis, Vestbirk.
3,4	2,32	18- 5	6	ukendt	Svend Madsen, Føvling.
3,5	2,18	21- 6	48	Dolfus, s. 6758	Tage Kristiansen, Hjortsvang.
3,4	2,33	8- 5	58	ukendt	Gunner Laursen, Rodvigsballe.
4,1	2,08				

s. 7402, på Brøstrupgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2,4	3,86	17-12	121	Sdj. Ernst, e.A 44	Hans K. Simonsen, Fæsted.
2,9	3,10	20-12	56	Sdj. Reklame, e.A 42	Hans Linnet, Skovbølling.
2,6	3,29	4- 2	23	Sdj. Reklame, e.A 42	Villads Matzen, Gelstoft.
2,7	3,24	20-12	51	Sdj. Nico, e.s. 6370	Jens Jørgensen, Toftlundgård.
3,4	2,44	28-12	71	Sdj. Ernst, e.A 44	Laurits Christensen, Kastbjerg.
2,6	3,57	12- 1	41	Sdj. Ernst, e.A 44	Andreas Hansen, Harreby.
3,5	2,53	31- 5	82	Sdj. Blok, e.A 64	Peter Jørgensen, Københoved.
2,9	3,34	5- 1	80	Sdj. Ernst, e.A 44	Jens Seeberg, Brændstrup.
3,0	3,20	13- 3	62	Sdj. Ernst, e.A 44	Kaj Hansen, Kolstrup.
2,8	3,12	6- 1	15	Sdj. Hof, s. 6963	Ejner Poulsen, Harreby.
2,6	2,84	31-12	39	Sdj. Diamant, s. 6456	Jørgen Juhl, Sønder-Vilstrup.
3,3	2,43	16-12	12	Sdj. Ernst, e.A 44	Laue Lund, Højrup.
2,6	3,30	6- 2	70	Sdj. Mars, e.s. 6367	Herløv Hansen, Rangstrup.
2,4	3,49	21- 1	29	Sdj. Lukas, s. 6625	Harald Skovrup, Højrup.
3,6	2,07	7- 1	74	Sdj. Jarl, e.A 78	Anders Fogh, Grøngård, Gabøl.
1,8	3,29	28-11	123	Sdj. Tim, e.A 38	Karl Kr. Juhl, Langetved.
2,2	3,41	3- 1	34	Sdj. Reklame, e.A 42	Thorvald Juhl, Fårkrog.
2,0	3,04	3-12	144	Sdj. Blok, e.A 64	Hans K. Simonsen, Fæsted.
2,8[1]	1,87[1]	10-12	172	Sdj. Adam, e.s. 6297	Steffen Nissen, Neder-Lerte.
2,7	3,02				

[1] Kun 1. måling.

Hovedtabel 45. **Afkomsprøve for tyren Ry**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
34	28-11-63	3-10	1040	558	**7943**	**3,90**	**309,80**	**346**	**3,37**	**268**	299	299	2390	4692
33	12- 1-64	13- 9	975	559	**6694**	**4,58**	**306,37**	**345**	**3,47**	**232**	319	319	2010	4519
31	11-11-63	23- 9	1047	579	**6375**	**4,39**	**279,84**	**314**	**3,47**	**221**	309	309	1814	4255
40	28- 9-64	6-10	738	551	**6097**	**4,58**	**279,16**	**314**	**3,54**	**216**	296	296	1906	4091
37	10- 4-64	2-11	936	552	**6434**	**4,24**	**273,09**	**306**	**3,34**	**215**	269	269	1814	3848
32	22-12-63	22- 9	1005	605	**6539**	**4,13**	**269,79**	**302**	**3,51**	**230**	310	310	1812	4228
43	23- 3-64	27- 9	918	521	**5584**	**4,82**	**268,94**	**303**	**3,69**	**206**	305	305	1650	4009
48	5- 4-64	7-10	915	486	**5872**	**4,43**	**260,23**	**292**	**3,47**	**204**	295	295	1784	4008
38	27- 1-64	18- 9	965	575	**5829**	**4,42**	**257,63**	**289**	**3,39**	**198**	314	314	1655	4017
39	11- 3-64	13- 9	916	574	**5868**	**4,26**	**250,06**	**281**	**3,53**	**207**	319	319	1585	4102
41	10- 3-64	14- 9	918	507	**6211**	**4,00**	**248,38**	**278**	**3,37**	**210**	318	318	1716	4163
44	13-10-63	12- 9	1065	506	**5887**	**4,15**	**244,40**	**274**	**3,46**	**204**	320	320	1564	3964
36[1]	7- 2-64	30-10	996	584	**5203**	**4,23**	**220,06**	**247**	**3,73**	**194**	272	272	1390	3534
50	3- 4-64	21- 9	901	496	**4374**	**4,88**	**213,33**	**240**	**3,86**	**169**	298	298	1206	3427
47	12- 1-64	2- 9	964	527	**4744**	**4,41**	**209,35**	**235**	**3,36**	**160**	330	330	1180	3688
45	31- 1-64	23- 9	966	543	**5108**	**4,06**	**207,55**	**232**	**3,54**	**181**	303	303	1271	3653
49	2- 2-64	9-11	1011	507	**4703**	**4,32**	**203,05**	**228**	**3,76**	**177**	262	262	1245	3328
35	1- 3-64	18- 9	931	552	**4469**	**4,43**	**198,01**	**222**	**3,67**	**164**	314	314	1134	3609
46	17- 2-64	16- 9	942	582	**4428**	**4,24**	**187,84**	**211**	**3,61**	**160**	316	316	1048	3468
42	28- 3-64	28- 9	914	602	**4498**	**4,12**	**185,28**	**208**	**3,66**	**165**	304	304	1132	3526
Gns. af 20 kvier			953	548	**5643**	**4,32**	**243,61**	**273**	**3,52**	**199**	304	304	1565	3906

[1] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 46. **Afkomsprøve for tyren Skive Hal**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
31	26- 6-64	23- 9	819	520	**7436**	**4,21**	**313,04**	**351**	**3,40**	**252**	328	328	1973	4540
36	5- 2-64	28- 9	966	626	**7637**	**4,05**	**309,24**	**346**	**3,67**	**280**	323	323	2018	4836
41	20- 6-64	24-10	856	520	**7432**	**3,99**	**296,51**	**332**	**3,46**	**257**	297	297	1961	4440
42	6- 2-64	26-10	993	524	**7114**	**4,17**	**296,30**	**332**	**3,64**	**259**	295	295	1906	4347
47	10- 3-64	22-10	956	479	**7001**	**4,08**	**285,83**	**320**	**3,46**	**242**	299	299	1833	4280
38	30- 1-64	29- 9	973	581	**6732**	**4,10**	**275,87**	**309**	**3,70**	**249**	311	311	1733	4270
45	17- 6-64	18-10	853	527	**6529**	**4,12**	**268,84**	**301**	**3,72**	**243**	303	303	1643	4051
37	21- 1-64	26- 9	979	583	**6090**	**4,19**	**255,13**	**286**	**3,71**	**226**	325	325	1474	3999
35	28- 1-64	6-11	1013	560	**5991**	**4,16**	**249,15**	**279**	**3,62**	**217**	284	284	1444	3823
49	3- 9-64	30-10	787	482	**5095**	**4,59**	**233,91**	**263**	**3,52**	**179**	291	291	1241	3571
39	16- 3-64	27-10	955	555	**5233**	**4,33**	**226,50**	**254**	**3,76**	**197**	294	294	1232	3595
48	19- 3-64	12-10	937	490	**5112**	**4,36**	**223,13**	**251**	**3,58**	**183**	298	298	1241	3564
34	14- 4-64	2-11	932	550	**5607**	**3,96**	**222,10**	**248**	**3,53**	**198**	288	288	1264	3582
32	8- 8-64	8-11	822	538	**4416**	**4,89**	**215,90**	**243**	**3,93**	**174**	282	282	1072	3426
44	30- 1-64	5-10	979	594	**4954**	**4,23**	**209,60**	**235**	**3,83**	**190**	316	316	1045	3497
33	4- 7-64	2-11	851	592	**5181**	**3,92**	**203,07**	**227**	**3,59**	**186**	288	288	1087	3440
43	21- 3-64	29- 9	922	571	**5279**	**3,79**	**199,93**	**223**	**3,31**	**175**	304	304	1150	3668
46	16- 3-64	24- 9	922	537	**4887**	**3,99**	**194,82**	**218**	**3,74**	**183**	327	327	999	3596
50	22- 9-64	18-10	756	510	**4711**	**4,05**	**190,56**	**213**	**3,59**	**169**	299	299	970	3393
40	22- 5-64	30- 9	861	562	**4423**	**4,10**	**181,43**	**203**	**3,60**	**159**	321	321	820	3300
Gns. af 20 kvier			907	545	**5843**	**4,15**	**242,54**	**272**	**3,61**	**211**	304	304	1405	3861

s. 7066, på Morsø.

Malketid i min.	Malkbarhedstal	Drægtigden	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,8	1,90	18- 2	71	Foch, e.s. 6197	Johs. Martinussen, Tødsø.
4,4	1,95	7-12	19	Morsing, e.B 13	H. Kr. Svenningsen, Erslev.
6,1	1,19	23- 1	50	Skals Hendrik, e.s. 6522	Chr. Møller, Vils.
3,8	2,42	27-12	40	Morsing, e.B 13	Niels Veje, Tøving.
4,4	1,96	21- 5	52	Hugin, e.s. 5946	Kresten Thomsen, Bjergby.
3,9	2,25	26-12	9	Morsø Rykind, s. 6840	Jens Kr. Jensen, Ø. Jølby.
3,8	2,12	16- 1	34	Hugin, e.s. 5946	Niels Hansen, Frøslev.
4,3	1,94	—[1]	67	Morsing, e.B 13	Knud Poulsen, Fredsø.
3,3	2,52	14- 1	74	Jason, s. 6198	Kr. Markussen, V. Hvidbjerg.
3,4	2,23	7-12	13	Hugin, e.s. 5946	Otto Heide, Solbjerg.
2,7	3,03	17- 1	9	Morsing, e.B 13	Jens Borg, Galtrup.
4,9	1,57	21- 2	113	Skals Hendrik, e.s. 6522	Poul Krogh, Skallerup.
4,5	1,86	18- 1	81	Morsing, e.B 13	Peter Pedersen, Tøving.
3,4	2,21	22-11	29	Bern, s. 6345	Asger Lynggaard, Erslev.
2,9	2,25	11- 2	88	Morsing, e.B 13	Poul Græsborg, Fjallerslev.
2,8	2,81	26-11	73	Foch, e.s. 6197	Ejnar Dissing, Frydsbrønd.
2,9	2,89	15- 2	119	Morsing, e.B 13	Kr. Bukhave Madsen, Tødsø.
2,4	2,80	11-12	37	Foch, e.s. 6197	Niels Hansen, Frøslev.
3,5	2,06	7- 2	52	Morsø Lume, s. 6498	E. H. Christensen, Vejerslev.
3,3	2,29	16-12	203	Hugin, e.s. 5946	Klaus Dalgaard, Galtrup.
3,8	2,21				

[1] Børbetændelse.

s. 7464, på Krarup Nygård.

Malketid i min.	Malkbarhedstal	Drægtigden	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,9	2,25	2- 5	89	Skive Juvel, s. 6655	Peder Refsgaard, Tastum.
5,5	1,47	28- 1	73	Hugin, e.s. 5946	Valdemar Hansen, Hald.
3,8	2,53	20- 2	36	Skive Pluto, e.A 26	Jens Brunsgaard, Harre.
5,0	1,68	10- 2	61	Skive Fut, s. 6565	Bertel Jeppesen, Krejbjerg.
6,2	1,23	20- 2	54	ukendt	Kr. Primdahl, Rønbjerg.
4,5	1,78	12-12	32	Skive Pluto, e.A 26	Asger Mikkelsen, Vejby.
4,2	2,15	—	12	ukendt	Martin Akselsen, Tøndering.
3,4	2,45	23-12	6	ukendt	Henning Sevelsted, Sdr. Lem.
3,4	2,57	8- 4	73	Skive Super, s. 6654	Bertel Jeppesen, Krejbjerg.
2,7	3,02	16- 1	82	Skive Super, s. 6654	Poul Vestergaard, Frammerslev.
4,6	1,73	16- 2	54	Skive Pluto, e.A 26	Hans Strøm Kristensen, Åsted.
3,6	2,33	12-12	44	Wolan, e.s. 6141	Niels Rørbæk, Batum.
3,0	2,90	7- 4	107	Skive Pluto, e.A 26	Valdemar Hansen, Hald.
2,5	3,25	9- 3	7	Skive Juvel, s. 6655	Niels Kristensen, Kloster Mark.
2,5	3,07	29-12[1]	32	Skive Pluto, e.A 26	Asger Mikkelsen, Vejby.
3,0	2,71	13- 3	66	Skive Pluto, e.A 26	Søren Foged, Ll. Thorum.
3,6	2,19	1-12	58	Nr. 23, f. 6-1-55	Theodor Nielsen, Lånum.
3,4	2,29	31-12	17	Wolan, e.s. 6141	Aage Bundgaard, Sepstrup.
4,2	1,88	15-12	84	Skive Blits, s. 6809	Poul Vestergaard, Frammerslev.
2,2	3,02	17- 3	31	Skive Pluto, e.A 26	Asger Mikkelsen, Vejby.
3,8	2,32				

[1] Kastet 23-6.

Hovedtabel 47. **Afkomsprøve for tyren Hjørring Domino,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
66	24- 2-64	5- 9	924	548	**6452**	**4,78**	**308,51**	**347**	**3,91**	**252**	320	320	2058	4260
63	31- 3-64	6- 9	889	542	**6798**	**4,14**	**281,51**	**315**	**3,39**	**230**	319	319	2005	4320
64	2- 4-64	16- 8	866	500	**6725**	**4,17**	**280,52**	**314**	**3,42**	**230**	340	340	1930	4418
74	6- 5-64	6-10	883	431	**5947**	**4,51**	**267,95**	**301**	**3,46**	**206**	289	289	1786	3940
67	12- 1-64	30- 8	961	538	**5841**	**4,47**	**260,88**	**293**	**3,70**	**216**	326	326	1697	3964
77	13- 3-64	8-10	939	538	**6199**	**4,19**	**259,58**	**291**	**3,71**	**230**	287	287	1782	3836
73	3- 3-64	30- 9	941	507	**5706**	**4,41**	**251,46**	**282**	**3,63**	**207**	295	295	1644	3829
65[1]	2- 2-64	2- 9	943	528	**5367**	**4,46**	**239,48**	**269**	**3,74**	**201**	323	323	1523	3835
69	23- 1-64	3-10	984	468	**5353**	**4,23**	**226,30**	**254**	**3,59**	**192**	292	292	1452	3599
75	1- 3-64	13-10	956	506	**5675**	**3,92**	**222,68**	**249**	**3,49**	**198**	282	282	1492	3472
68[1]	19- 2-64	22- 9	946	540	**5318**	**4,12**	**219,18**	**246**	**3,53**	**188**	303	303	1394	3555
70	23- 6-64	2-10	831	512	**4830**	**4,47**	**215,75**	**242**	**3,98**	**192**	293	293	1313	3377
81	1- 5-64	8- 9	860	530	**4934**	**4,34**	**214,09**	**240**	**3,73**	**184**	317	317	1287	3564
62	16- 4-64	5- 9	872	504	**4896**	**4,26**	**208,57**	**234**	**3,57**	**175**	320	320	1299	3660
61	5- 3-64	9- 9	918	507	**4482**	**4,65**	**208,34**	**234**	**3,95**	**177**	316	316	1215	3488
76	26- 2-64	15-10	961	534	**4622**	**4,48**	**207,03**	**233**	**3,54**	**163**	280	280	1239	3273
79	21- 8-64	24-10	794	576	**4741**	**4,11**	**194,64**	**218**	**3,67**	**174**	271	271	1223	3258
78	1- 4-64	23- 9	905	517	**5065**	**3,81**	**193,11**	**216**	**3,61**	**183**	302	302	1197	3351
Gns. af 18 kvier			910	518	**5497**	**4,30**	**236,64**	**266**	**3,64**	**200**	304	304	1530	3722

[1] Trepattet efter fluestik før kælvning.

Hovedtabel 48. **Afkomsprøve for tyren Sdj. Ark,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
46	12- 4-64	10-10	911	532	**7376**	**4,24**	**312,99**	**351**	**3,36**	**248**	303	303	2097	4210
36	5- 1-64	10-10	1009	572	**6633**	**4,20**	**278,64**	**312**	**3,59**	**238**	303	303	1824	4324
40	12- 1-64	1-10	993	616	**5764**	**4,58**	**264,08**	**297**	**3,94**	**227**	312	312	1585	3959
43	25-12-63	17- 9	997	591	**7026**	**3,75**	**263,75**	**294**	**3,46**	**243**	326	326	1742	4086
38	3- 2-64	28- 9	968	526	**6453**	**4,00**	**257,99**	**289**	**3,54**	**228**	312	312	1676	4021
33	10- 2-64	19- 9	952	617	**5858**	**4,40**	**257,54**	**289**	**3,54**	**208**	307	307	1615	4082
31	21- 3-64	18-10	941	586	**5571**	**4,59**	**255,60**	**287**	**3,69**	**206**	295	295	1512	3868
45	27- 7-64	3-10	798	551	**5976**	**4,21**	**251,50**	**282**	**3,47**	**208**	310	310	1567	3814
37	1- 2-64	28- 9	970	655	**5474**	**4,52**	**247,67**	**278**	**3,89**	**213**	315	315	1455	3869
49	3- 3-64	1-11	973	576	**5829**	**4,22**	**245,98**	**276**	**3,54**	**206**	281	281	1497	3725
44	25-12-63	10- 9	990	534	**5483**	**4,38**	**240,42**	**270**	**3,70**	**203**	333	333	1367	3785
39	31- 1-64	21- 9	964	567	**5390**	**4,38**	**236,29**	**265**	**3,65**	**196**	322	322	1325	3833
47	19- 3-64	27- 9	922	563	**5283**	**4,36**	**230,27**	**259**	**3,53**	**187**	299	299	1414	3817
34	11- 3-64	10-10	943	581	**4907**	**4,41**	**216,32**	**243**	**3,59**	**176**	303	303	1218	3495
48	18- 3-64	30-10	956	556	**5103**	**4,23**	**215,82**	**242**	**3,63**	**185**	283	283	1245	3425
50	29- 1-64	18-11	1024	558	**5009**	**4,27**	**213,66**	**240**	**3,41**	**171**	264	264	1249	3347
32	21- 1-64	18-10	1001	586	**4350**	**4,58**	**199,43**	**224**	**3,68**	**160**	295	295	1016	3362
41	9- 4-64	30-10	934	582	**4337**	**4,37**	**189,72**	**213**	**3,79**	**164**	283	283	983	3063
35	18- 3-64	4-10	930	570	**4541**	**4,07**	**184,86**	**207**	**3,44**	**156**	309	309	1079	3430
42	21- 2-64	26- 9	948	604	**3343**	**4,21**	**140,61**	**158**	**3,86**	**129**	317	317	599	2943
Gns. af 20 kvier			956	576	**5485**	**4,29**	**235,16**	**264**	**3,60**	**198**	304	304	1403	3723

7413, på Dybvad.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,3	2,70	13- 1	17	Cæsar, e.s. 6339	Carl E. Nielsen, Mygdal.
3,2	3,01	27- 3	85	Hjørring Theo, s. 6704	Poul Larsen, Mygdal.
3,3	2,67	20-12	63	Noormann, e.s. 6136	Kr. Hansen, Vidstrup.
3,8	2,30	13- 1	95	Sverre, e.s. 6026	Niels Larsen, V. Hjermitslev.
3,5	2,43	21- 1	62	Hero Langholt, s. 6785	Jens G. Krogh, Voerså.
2,7	3,70	15- 2	14	Cæsar, e.s. 6339	Karen Jensen, Kvorup.
5,2	1,47	25- 1	25	Opmand, e.s. 6427	Axel Hansen, Gærum.
3,6	2,23	20-12	43	Hjørring Gordon, s. 7051	Carl E. Nielsen, Mygdal.
4,3	1,84	25- 1	31	Opmand, e.s. 6427	Emanuel Nielsen, Birkelse.
3,6	2,46	28- 1	34	Lods, e.s. 6338	Henning Thomsen, Harken.
3,7	2,23	15-12	16	Hjørring Pilot, e.s. 6495	Kr. Vestergaard, Bindslev.
3,7	2,18	27- 3	8	Hoofdmann, e.s. 6152	Axel Kjær, Ø. Brønderslev.
2,7	2,85	9- 1	40	Dan, e.s. 6107	Harry Olesen, Mygdal.
3,4	2,20	12-12	9	Napoleon, f. 6-11-51	Poul Østergaard, Hæstrup.
2,3	3,09	5- 1	100	Hjørring Pilot, e.s. 6495	Folke Madsen, Asdal.
2,7	2,95	24- 1	89	Hjørring Rykind, e.B 17	Martin Andersen, Saltum.
4,0	2,01	13- 1	122	Hero Langholt, s. 6785	Erik Nielsen, Lemb, Agersted.
3,0	2,62	19- 1	41	Woldan, s. 6027	Knud Søndergaard, Ø. Brønderslev.
3,4	2,50				

. 7404, på Veesbæk.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,4	1,42	12- 5	53	Sdj. Lukas, s. 6625	Poul Svennesen, Barsmark.
3,6	2,36	21-12	39	Sdj. Nico, e.s. 6370	Bonde Møller, Gejlbjerg.
3,3	2,39	4- 1	64	Sdj. Karl, s. 6960	Holger Lund, Gånsager.
6,9	1,05	22- 2	64	Sdj. Frans, s. 7102	Anders Petersen, Borg.
4,3	1,99	13-12	36	Sdj. Wass, e.A 2	Holger Nissen, Fredsmark.
2,6	3,10	28-11	92	Mester, f. 15-4-55	Chr. Danielsen, Gærup.
2,6	3,29	13- 2[1]	89	Sdj. Ceres, s. 6453	Jacob S. Pedersen, Svejlund.
4,0	1,86	—	56	Sdj. Steffen, s. 6689	Johs. Petersen, Gærupvej, Abild.
3,1	2,52	19-12	13	Sdj. Wass, e.A 2	Andreas Sørensen, Emmerlev.
3,9	2,04	25- 3	88	Sdj. Nico, e.s. 6370	Chr. Michelsen, Hedager.
4,2	1,86	19- 6[2]	27	Sdj. Nico, e.s. 6370	Hans A. Hansen, Buntje.
4,2	1,87	1- 3	28	Sdj. Roland, e.s. 6528	Hans A. Hansen, Buntje.
3,2	2,43	29-11	60	Nr. 114, f. 13-12-49	Jens H. Friis, Enggård, Visby.
3,2	2,14	7- 6	35	Sdj. Wass, e.A 2	Hans Asmussen, Nr. Hostrup.
5,2	1,33	12- 4	14	Sdj. Mars, e.s. 6367	Peter Nielsen, Egvad.
5,4	1,38	18- 1	66	Gandi, s. 6911	Hans Asmussen, Nr. Hostrup.
3,3	2,03	21-12	34	Sdj. Roland, e.s. 6528	Rasmus E. Petersen, Kassø.
4,0	1,92	24- 5	58	Sdj. Lukas, s. 6625	Peter Lausten, Øster Terp.
3,2	2,25	20- 5	71	Nr. 29, II, f. 14-1-51	Jacob S. Pedersen, Svejlund.
—[3]	—[3]	28- 2	52	Jeppe, e.s. 6327	Math. Lausten, Gærup.
4,0	2,06				

[1] Kastet i maj.
[2] Kastet i maj efter ins. 28-2.
[3] Håndmalket.

Hovedtabel 49. **Afkomsprøve for tyren Egholm Dros**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I al f. e
102	16- 9-64	22- 9	736	504	**6991**	**4,44**	**310,16**	**348**	**3,48**	**243**	318	318	2333	448
91	26- 2-64	31- 8	917	612	**6983**	**4,16**	**290,18**	**325**	**3,51**	**245**	340	340	2202	451
92	24- 3-64	4-11	955	598	**7256**	**3,97**	**287,88**	**322**	**3,65**	**265**	275	275	2324	424
95	14- 3-64	20-10	950	590	**6553**	**4,13**	**270,73**	**303**	**3,45**	**226**	290	290	2062	423
100	15- 5-64	15-10	883	521	**6726**	**3,96**	**266,23**	**298**	**3,36**	**226**	295	295	2059	410
94	27- 3-64	26- 8	882	581	**5652**	**4,12**	**233,05**	**261**	**3,43**	**194**	331	331	1648	401
97	23- 5-64	17- 9	847	563	**5899**	**3,79**	**223,54**	**250**	**3,22**	**190**	323	323	1701	389
101	21- 8-64	4-11	805	565	**5241**	**4,22**	**221,03**	**248**	**3,56**	**187**	275	275	1609	358
105	6- 7-64	15-10	831	518	**5037**	**4,21**	**212,23**	**238**	**3,58**	**180**	295	295	1557	355
93	2- 5-64	20- 9	871	589	**4410**	**4,77**	**210,30**	**237**	**3,58**	**158**	306	306	1411	368
108	30- 9-64	26-10	756	485	**4855**	**4,28**	**207,63**	**233**	**3,57**	**173**	284	284	1481	341
96	13- 8-64	16- 9	764	579	**5269**	**3,78**	**198,95**	**222**	**3,23**	**170**	324	324	1406	363
104	x- 8-64	29-10	805	469	**4227**	**4,51**	**190,62**	**214**	**3,74**	**158**	281	281	1382	321
107	26- 5-64	3- 9	830	484	**4297**	**4,33**	**185,88**	**209**	**3,77**	**162**	337	337	1257	347
99	12- 6-64	27-10	867	610	**3633**	**4,13**	**150,15**	**168**	**3,66**	**133**	283	283	955	295
Gns. af 15 kvier			847	551	**5535**	**4,17**	**230,57**	**258**	**3,50**	**194**	304	304	1692	380

Hovedtabel 50. **Afkomsprøve for tyren Varde Diaman**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
65	4- 3-64	30- 9	940	511	**6957**	**4,59**	**319,29**	**359**	**3,64**	**253**	300	300	2153	458
67	29- 3-64	8-10	923	517	**7179**	**4,41**	**316,88**	**356**	**3,29**	**236**	292	292	2134	448
76	12- 4-64	5-10	906	471	**5437**	**4,97**	**270,04**	**305**	**3,63**	**197**	295	295	1565	405
62	15- 6-64	7-10	844	544	**5798**	**4,47**	**259,26**	**291**	**3,64**	**211**	293	293	1575	397
61	13- 4-64	14- 9	884	537	**5000**	**4,78**	**239,12**	**269**	**3,76**	**188**	316	316	1294	391
73	27- 5-64	2- 9	828	491	**5143**	**4,62**	**237,54**	**267**	**3,61**	**186**	328	328	1337	392
72	19- 5-64	2-10	866	521	**5401**	**4,36**	**235,65**	**265**	**3,44**	**186**	298	298	1399	379
63	2- 4-64	29- 9	910	566	**5385**	**4,34**	**233,72**	**262**	**3,50**	**189**	301	301	1369	373
74	7- 3-64	19-10	956	493	**5060**	**4,61**	**233,34**	**263**	**3,61**	**183**	281	281	1364	376
70	21- 4-64	30- 9	892	504	**5282**	**4,33**	**228,83**	**257**	**3,66**	**194**	300	300	1320	379
69	2- 2-64	23- 9	964	567	**4874**	**4,67**	**227,73**	**256**	**3,73**	**182**	307	307	1249	374
64	10- 5-64	20-10	893	527	**4920**	**4,24**	**208,70**	**234**	**3,57**	**176**	280	280	1193	361
77	1- 8-64	18-10	808	465	**4842**	**4,22**	**204,51**	**229**	**3,50**	**170**	282	282	1136	340
66	29- 1-64	5- 9	950	564	**4118**	**4,89**	**201,36**	**227**	**3,90**	**161**	325	325	989	351
68	19- 3-64	8- 9	903	531	**3853**	**5,03**	**193,79**	**219**	**3,83**	**147**	311	311	946	346
75	26- 2-64	13- 9	930	472	**4421**	**4,19**	**185,09**	**208**	**3,47**	**153**	317	317	937	360
71	10- 3-64	1- 9	905	530	**3820**	**4,36**	**166,38**	**187**	**3,75**	**143**	329	329	762	335
78	2- 3-64	21- 9	933	529	**3513**	**4,38**	**153,83**	**173**	**3,68**	**129**	309	309	734	296
Gns. af 18 kvier			902	519	**5056**	**4,52**	**228,61**	**257**	**3,61**	**182**	304	304	1303	376

s. 7516, på Skovgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2,7	3,58	14- 1	95	Egholm Foch, s. 7012	Aksel Frandsen, Føvling.
3,4	2,49	13- 6[1]	52	Strib, e.A 24	Ove Sørensen, Hornborg.
5,2	1,66	25- 5	57	Egholm Ponto, s. 6851	Gotfred Herskind, Molgjer.
2,7	3,31	2- 2	29	Nr. 40, Risager	Johanne Lundgaard, Nr. Snede.
4,6	1,83	9- 1	35	Egholm Reclame, s. 6850	Karl Frandsen, Hvolgårds Mark.
2,7	2,97	28-11[2]	55	Silkeborg Nor, e.A 56	Børge Jensen, Velling.
4,0	1,89	—	59	Amacone	Ingvard Winterberg, Træden.
3,2	2,52	8- 3	15	Silkeborg Bro, s. 6675	Ejner Krogh, Tønning.
3,8	2,15	29-12	68	ukendt	Henning Kamp Jensen, Addit.
1,8	3,81	29-11	99	Poll, e.A 8	Hans P. Bendtsen, Vesterhåb.
2,4	3,64	12- 1	130	Nr. 259, Striben	Holger Leth, Troelstrup.
3,9	1,96	18- 4	10	Egholm Ponto, s. 6851	Jens N. Jensen, Vrønding.
4,4	1,82	18- 5	—	Tandrup, s. 6852	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
2,8	2,44	16- 5	115	Egholm Ponto, s. 6851	N. P. Nielsen, Rådvedgård.
3,0	2,12	29- 3	16	Klaaskes Athleet, s. 6378	Jens Thomsen, Hammergård.
3,4	2,55				

[1] Kastet 21-4 efter ins.9-1.
[2] Kastet 27-7.

s. 7433, på Vardegård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,8	1,71	25- 3	25	Varde Hof, e.B 29	Niels E. Poulsen, Rottarp.
4,2	2,22	27-12	113	Varde Sultan, s. 6778	Chr. Strandbygaard, Agersnap.
3,2	2,50	23- 2	32	Varde Bob, e.A 54	Kr. Gejl Jensen, Hauge.
3,2	2,72	19- 1	1	Varde Johan, e.s. 6537	Sv. Østergaard Mikkelsen, Malle.
3,0	2,55	9- 2	24	Anton, e.s. 6149	Niels Gregersen, Skonager.
3,1	2,50	10- 1	73	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Ejner Kristensen, Orten.
5,0	1,55	14-12	48	Varde Friser, e.A 40	Verner S. Nielsen, Sdr. Malle.
4,4	1,61	17-12	17	ukendt	Kaj Jakobsen, Tange, Gørding
4,7	1,73	3- 2	77	Varde Zijlster, s. 6642	Kristian Hollænder, Nr. Farup.
5,0	1,52	13- 3	79	Varde Johan, e.s. 6537	Sigfred Vestkær, Ounbøl.
4,9	1,46	3- 2	67	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Jørgen Nissen, Hjortlund.
4,6	1,65	12- 1	84	Reintkje El, e.s. 6377	Jørgen Raunkjær, Strellev.
4,3	1,88	23- 1	83	Varde Yge, s. 6641	Julius Mostrup, Bjallerup.
4,2	1,67	6- 6	65	Varde Ruyter, e.s. 6776	Chr. O. Hansen, Lyhne.
4,0	1,75	22-11	136	Varde Ruyter, e.s. 6776	Sønke Hansen, Agersnap.
4,9	1,43	11- 1	73	Varde Strib, s. 6889	Albert Christensen, Yderik.
2,5	2,45	27-12	25	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Aage Johansen, Agersnap.
4,4	1,51	15- 3	18	Merkur Adema, e.s. 5997	Bent Christensen, Hjortlund.
4,1	1,91				

Hovedtabel 51. **Afkomsprøve for tyren Bjerringbro Basta,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
4	3- 4-64	5- 9	885	516	**6747**	**4,87**	**328,81**	**371**	**3,59**	**242**	315	315	2082	4464
11	2- 6-64	28- 8	817	607	**5910**	**4,57**	**270,29**	**304**	**3,79**	**224**	323	323	1646	4309
5	16- 5-64	1- 9	838	569	**6295**	**4,25**	**267,69**	**300**	**3,41**	**214**	319	319	1725	4236
1	25- 2-64	16-10	964	569	**5464**	**4,62**	**252,61**	**284**	**3,73**	**204**	274	274	1555	3820
16	24- 4-64	5- 9	864	530	**5228**	**4,75**	**248,47**	**280**	**3,63**	**190**	315	315	1480	3829
2	12- 5-64	29- 8	839	606	**5431**	**4,55**	**247,01**	**278**	**3,69**	**201**	322	322	1450	4012
18	14- 2-64	8- 9	937	562	**5257**	**4,46**	**234,28**	**263**	**3,61**	**190**	312	312	1425	3979
20	11- 4-64	30- 9	902	551	**5217**	**4,48**	**233,79**	**263**	**3,80**	**198**	290	290	1404	3909
9	9- 4-64	24- 8	867	564	**5065**	**4,58**	**231,92**	**261**	**3,71**	**188**	327	327	1253	3907
17	26- 7-64	23- 9	789	500	**5081**	**4,52**	**229,62**	**258**	**3,64**	**185**	297	297	1275	3703
21	2- 2-64	21- 9	962	600	**5584**	**4,07**	**227,43**	**255**	**3,74**	**209**	299	299	1426	3704
3	18- 4-64	10-10	905	613	**5017**	**4,29**	**215,13**	**241**	**3,52**	**176**	280	280	1255	3499
8	7- 2-64	2- 9	938	616	**4369**	**4,84**	**211,59**	**238**	**4,09**	**179**	318	318	1152	3672
15	26- 5-64	5-10	862	510	**4284**	**4,81**	**205,86**	**232**	**3,94**	**169**	285	285	1117	3463
7	5- 1-64	24- 8	962	607	**4243**	**4,85**	**205,62**	**232**	**3,94**	**167**	327	327	1119	3620
14	14- 4-64	8-11	938	533	**4776**	**4,30**	**205,15**	**230**	**3,74**	**179**	251	251	1218	3237
6	23- 3-64	24- 9	915	594	**4753**	**4,25**	**201,95**	**227**	**3,77**	**179**	296	296	1151	3524
19	15- 2-64	23- 9	951	526	**4359**	**4,47**	**194,81**	**219**	**3,67**	**160**	297	297	1064	3544
13	16- 6-64	31- 8	806	532	**4008**	**4,57**	**183,34**	**206**	**4,01**	**161**	320	320	892	3459
10	30- 6-64	14- 9	806	580	**3721**	**4,21**	**156,66**	**176**	**3,86**	**144**	306	306	807	3208
Gns. af 20 kvier			887	564	**5040**	**4,52**	**227,60**	**256**	**3,73**	**188**	304	304	1326	3756

Hovedtabel 52. **Afkomsprøve for tyren Swea,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
92	4- 3 64	5- 9	915	553	**7800**	**4,57**	**356,45**	**401**	**3,92**	**306**	336	336	2326	4900
93	24- 2-64	20- 9	939	600	**7266**	**4,51**	**328,03**	**369**	**3,83**	**279**	321	321	2088	4650
109	17- 2-64	20- 9	946	514	**6371**	**4,18**	**266,29**	**299**	**3,68**	**234**	321	321	1620	4377
95	31- 5-64	29- 9	851	579	**6104**	**4,36**	**266,23**	**299**	**3,64**	**222**	312	312	1602	3972
97	19- 5-64	6- 9	840	561	**6211**	**4,19**	**260,08**	**292**	**3,69**	**229**	335	335	1540	4136
104	9- 1-64	28-10	1023	500	**5707**	**4,40**	**250,99**	**282**	**3,72**	**212**	283	283	1542	3926
94	28- 1-64	19- 9	965	549	**5789**	**4,16**	**240,74**	**270**	**3,74**	**217**	322	322	1428	4040
110	9- 9-64	26- 9	747	570	**5416**	**4,43**	**240,13**	**270**	**3,83**	**208**	315	315	1366	3985
91	16- 3-64	1- 9	899	565	**5655**	**4,22**	**238,65**	**268**	**3,61**	**204**	340	340	1371	4106
100	24-10-64	15-10	721	556	**5148**	**4,25**	**218,83**	**245**	**3,74**	**193**	296	296	1220	3655
108	18-12-63	26- 9	1013	510	**5101**	**4,25**	**216,92**	**243**	**3,75**	**191**	315	315	1190	3787
105	14-10-64	20-10	736	495	**4521**	**4,51**	**204,06**	**229**	**4,08**	**185**	291	291	1043	3531
99	14- 8-64	8-11	816	550	**5181**	**3,91**	**202,48**	**226**	**3,58**	**186**	272	272	1180	3400
107	9- 9-64	18-10	769	502	**4733**	**4,23**	**200,14**	**224**	**3,71**	**176**	293	293	1061	3388
98[1]	15- 2-64	30- 9	958	596	**4892**	**4,09**	**200,00**	**224**	**3,72**	**182**	311	311	1053	3562
96	25- 3-64	2-11	952	543	**4610**	**4,29**	**197,58**	**222**	**3,68**	**170**	278	278	1047	3147
103	29- 7-64	30-10	823	505	**3853**	**4,32**	**166,26**	**187**	**3,86**	**149**	281	281	806	3135
101	13- 9-64	14-10	761	562	**3808**	**4,36**	**166,07**	**186**	**3,72**	**142**	297	297	757	3175
102[1]	12-11-64	3-11	721	512	**3919**	**4,23**	**165,60**	**186**	**3,61**	**142**	277	277	805	3063
106	30- 9-64	22-10	752	527	**3750**	**4,41**	**165,45**	**186**	**4,05**	**152**	289	289	797	3010
Gns. af 20 kvier			857	542	**5292**	**4,30**	**227,55**	**255**	**3,76**	**199**	304	304	1292	3747

[1] Trepattet efter fluestik før kælvning.

s. 7390, på Rosenfeldt.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,0	2,17	25- 4	85	Kastor, e.A 4	Poul Johansen, Mammen.
3,6	2,28	12- 1	70	Kastor, e.A 4	Johs. Sørensen, Mammen.
8,3	0,85	15-12	74	Bjerringbro Friser, s. 6747	Jens M. Andersen, Vejrumbro.
3,9	2,22	9- 1	9	Rup, s. 6322	Kresten Bach, Bjerring.
3,7	2,14	17- 5[1]	10	Kastor, e.A 4	Preben Nielsen, Brandstrup.
4,3	1,81	3- 2	85	Kastor, e.A 4	Niels Mølgaard Nielsen, Hjermind.
3,2	2,37	3- 1	117	Kastor, e.A 4	Jens Haugaard, Grønbæk.
4,7	1,73	21-12	48	Gordon, e.s. 6462	Peter Christensen, Bøstrup.
2,3	3,14	12-12	25	Drost, e.A 60	Niels Rasmussen, Sjørring.
5,0	1,59	26-12	35	Kastor, e.A 4	Edv. Nielsen, Torup.
3,8	2,13	—	88	Kastor, e.A 4	Jens Bøgh, Amstrup.
3,2	2,53	2- 1	16	Bjerringbro Bert, s. 6638	Søren Mikkelsen, Hjermind.
4,2	1,74	10-12	24	Bjerringbro Steffen, s. 6952	Niels Sørensen, Vinkel.
5,0	1,54	30-12	31	Bjerringbro Juvel, s. 7086	Holger Jensen, Torup.
2,7	2,49	15-12	55	Obel, e.s. 6096	Bernhardt Ushus, Sjørring.
6,5	1,16	9- 3	57	Bjerringbro Bert, s. 6638	Søren Sørensen, Sønderbæk.
4,8	1,61	13-12	78	Ahlm, s. 6321	E. Koue Christensen, Hjorthede.
2,7	2,83	2- 1	82	Bjerringbro Cim, s. 6639	Magnus Andersen, Astrup.
2,6	2,49	1-12	13	Bjerringbro Steffen, s. 6952	Magnus Andersen, Astrup.
6,0	1,24	6- 2	69	Kastor, e.A 4	Ejner Jensen, Midstrup.
4,2	2,00				

[1] Kastet 2-5 efter ins. 14-1.

s. 7424, på Lundgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2,5	3,90	17- 6	24	Hoofdmann, e.s. 6152	Martin Husum, Ålestrup.
4,2	2,01	31- 1	41	ukendt	Peder Mark, Fandrup.
4,4	1,85	10-12	167	Hjalmar, s. 6539	Jens Lund, Strandby.
5,5	1,40	24- 3	34	Drost, e.A 60	Egon Jacobsen, Gundestrup.
4,5	1,80	6- 5	20	Gordon 17, s. 7072	Niels J. Danielsen, Års.
3,9	2,12	29-12	50	Drost, e.A 60	Jens Chr. Jensen, Ø. Falde.
3,0	2,92	28-12	81	Dolfus, s. 6758	Niels Juul Jensen, Binderup.
4,0	2,06	10-12	16	ukendt	Svend Lapertis, Sjørup.
2,7	2,87	31-12	12	Ponto, e.s. 6381	Martin Husum, Ålestrup.
2,7	3,20	27-12	73	Dolfus, s. 6758	Per Simonsen, Lille Thorup.
2,9	2,92	11- 1	48	Dolfus, s. 6758	Chr. Hansen, Svenstrup, Års.
2,8	2,89	30- 1	73	Hugin, s. 6157	Marinus Poulsen, Vognsild.
3,5	2,43	30- 6	52	Drost, e.A 60	Chr. Svenningsen, Hornum.
5,2	1,31	2- 1	57	Drost, e.A 60	Søren Juul, Kyø, Sebbersund.
5,0	1,53	13-12	23	ukendt	E. Storm Nielsen, Ålestrup.
3,9	1,85	—	138	Napoleon, e.B 31	Poul Østergaard, Bygum.
2,2	3,50	17-12	16	Dolfus, s. 6758	Johs. Studstrup, Klotrup.
2,8	2,63	19-12	183	Napoleon, e.B 31	Juul Larsen, Tandrup.
3,8	2,01	7- 1	90	Bjarke, s. 7087	Karl Holme, Holme.
3,0	2,41	8- 5	12	Napoleon, e.B 31	Aksel Akselsen, Gatten.
3,6	2,38				

Hovedtabel 53. **Afkomsprøve for tyren Sdj. Viktor,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
93	31-12-63	11-10	1015	509	**7539**	**4,03**	**303,63**	**340**	**3,14**	**237**	298	298	2084	4507
110	6-12-63	3-10	1032	513	**6669**	**4,55**	**303,15**	**341**	**3,55**	**237**	306	306	1943	4471
96	11-12-63	21- 9	1015	522	**6272**	**4,25**	**266,87**	**299**	**3,53**	**222**	318	318	1694	4204
95	26- 1-64	21- 9	969	497	**6347**	**4,06**	**257,61**	**288**	**3,49**	**222**	318	318	1673	4329
100	2- 4-64	11-10	922	509	**5738**	**4,31**	**247,42**	**278**	**3,44**	**197**	298	298	1502	3966
99	18- 3-64	23- 9	919	474	**5491**	**4,49**	**246,33**	**277**	**3,38**	**186**	316	316	1475	4169
94	18- 3-64	16- 9	912	532	**6255**	**3,82**	**239,11**	**267**	**3,11**	**195**	323	323	1529	4155
106	2- 4-64	18-10	929	512	**5518**	**4,06**	**223,91**	**251**	**3,42**	**189**	291	291	1377	3814
98	22- 1-64	8-10	990	501	**5537**	**4,00**	**221,35**	**248**	**3,21**	**178**	301	301	1334	3830
105	29- 2-64	28-10	972	483	**5936**	**3,65**	**216,93**	**242**	**3,28**	**194**	281	281	1440	3689
92	30-12-63	2-10	1007	613	**5970**	**3,57**	**213,18**	**237**	**3,35**	**200**	307	307	1368	4161
91	5- 3-64	25- 9	934	563	**5611**	**3,72**	**208,70**	**233**	**3,05**	**171**	314	314	1274	4154
107	2- 2-64	24-10	995	498	**4878**	**4,12**	**201,01**	**225**	**3,47**	**169**	285	285	1159	3620
108	4- 8-64	4-11	822	499	**4576**	**4,35**	**199,27**	**224**	**3,55**	**162**	274	274	1102	3351
97	1- 3-64	15- 9	928	516	**4938**	**3,92**	**193,68**	**217**	**3,44**	**170**	324	324	1063	3825
102	13- 5-64	3-10	873	543	**4313**	**4,45**	**191,93**	**216**	**3,54**	**153**	306	306	1006	3647
109	20- 3-64	24-10	948	531	**3850**	**4,59**	**176,89**	**199**	**3,75**	**144**	285	285	928	3243
104[1]	1- 3-64	10- 9	923	493	**4587**	**3,72**	**170,53**	**190**	**3,32**	**152**	323	323	907	3642
Gns. af 18 kvier			950	517	**5557**	**4,08**	**226,75**	**254**	**3,38**	**188**	304	304	1381	3932

[1] Venstre forpatte stukket op efter pattetråd før kælvning.

Hovedtabel 54. **Afkomsprøve for tyren Randers Dijk,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
62	20- 2-64	29- 8	921	599	**5830**	**4,53**	**264,09**	**297**	**3,94**	**230**	330	330	1564	4354
75	8- 4-64	8-10	913	522	**5517**	**4,76**	**262,72**	**296**	**3,82**	**211**	290	290	1627	4037
79	27-12-63	4-10	1012	500	**5367**	**4,55**	**244,03**	**274**	**3,59**	**193**	294	294	1458	3800
72	5- 4-64	15- 9	893	520	**5620**	**4,28**	**240,41**	**270**	**3,81**	**214**	313	313	1434	3885
63	18- 6-64	22- 9	826	598	**5298**	**4,50**	**238,35**	**268**	**3,88**	**206**	306	306	1500	4026
61[1]	4- 6-64	12- 9	830	634	**4802**	**4,92**	**236,22**	**266**	**4,05**	**194**	316	316	1313	3982
69	26- 1-64	2-10	980	578	**4782**	**4,93**	**235,54**	**266**	**4,07**	**194**	296	296	1313	3721
68	29- 3-64	2-10	917	568	**5021**	**4,67**	**234,60**	**264**	**4,04**	**203**	296	296	1357	3744
80	28-12-63	21- 9	998	595	**5328**	**4,23**	**225,46**	**253**	**3,75**	**200**	307	307	1330	3683
67	2- 9-64	21- 9	749	510	**4480**	**4,98**	**223,24**	**252**	**4,15**	**186**	307	307	1242	3765
78	13- 7-64	16-10	825	500	**4985**	**4,45**	**221,75**	**249**	**3,71**	**185**	282	282	1337	3530
65[2]	27-12-63	2-11	1041	618	**4787**	**4,58**	**219,35**	**247**	**3,98**	**190**	265	265	1323	3370
77	23- 8-64	17- 9	755	533	**4773**	**4,49**	**214,14**	**241**	**3,87**	**185**	311	311	1174	3658
71	21- 4-64	11- 9	873	582	**4613**	**4,63**	**213,77**	**241**	**4,03**	**186**	317	317	1173	3705
74	11- 7-64	8-10	819	506	**4544**	**4,66**	**211,87**	**238**	**3,97**	**180**	290	290	1165	3584
64	1- 9-64	29- 9	758	581	**4430**	**4,56**	**201,98**	**227**	**3,93**	**174**	299	299	1132	3669
73	17- 7-64	9- 9	784	544	**4141**	**4,77**	**197,35**	**222**	**4,07**	**169**	319	319	1007	3660
70	13- 6-64	7- 9	816	544	**4011**	**4,73**	**189,81**	**214**	**3,99**	**160**	321	321	974	3428
76	24- 1-64	9- 9	959	532	**3667**	**4,97**	**182,41**	**206**	**3,96**	**145**	319	319	995	3578
Gns. af 19 kvier			877	556	**4842**	**4,63**	**224,06**	**252**	**3,92**	**190**	304	304	1285	3746

[1] Yverbetændelse ved kælvning.
[2] Venstre bagpatte stukket op efter pattetråd.

7403, på Brøstrupgård.

alke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,6	1,45	2- 1	92	Sdj. Nico, e.s. 6370	Knud Nissen, Sommersted.
4,1	2,14	3- 11	15	Sdj. Ursus, s. 6454	Mathias Carstensen, Skovbylund.
5,8	1,37	20- 3	93	Sdj. Ernst, e.A 44	Chr. Lassen, Dover, Lintrup.
4,2	1,90	27- 2	98	Nr. 28, f. 24-9-58	Johan Iversen, Store-Nustrup.
5,4	1,50	24- 1	14	Sdj. Wass, e.A 2	Villads Matzen, Gelstoft.
5,5	1,50	12-12	47	Sdj. Argus, s. 6764	N. Aa. Madsen, Ladegård.
3,8	2,11	20-12	57	Sdj. Wass, e.A 2	Klaus Jørgensen, Refsømark.
4,3	1,74	10- 1	29	Sdj. Henrik, e.s. 6219	Jens Thyssen, Ørderup.
4,0	2,17	14-12	69	Sdj. Adam, e.s. 6297	Anders Hørlück, Skodborg.
3,8	2,30	5- 5	69	Sdj. Adam, e.s. 6297	Herløv Hansen, Rangstrup.
3,3	2,71	19-12	99	Marius 103, f. 31-1-57	Walther Schmidt, Hoptrup.
4,7	1,63	26-12	52	Sdj. Diamant, s. 6456	Peter Østergaard, Kjelstrup.
5,6	1,58	22- 2	69	Sdj. Tim, e.A 38	Jørgen Brink, Stensbjerg.
5,6	1,31	20- 3	71	Sdj. Adam, e.s. 6297	Iver Nørgaard, Grønnebæk.
2,7	2,76	26-12	9	Sdj. Diamant, s. 6456	Alfred Hansen, Stepping.
4,0	1,89	19- 1	14	Sdj. Adam, e.s. 6297	Michael Michaelsen, Simmersted.
5,8	1,37	5- 6	82	Sdj. Reklame, e.A 42	Peter Aarup, København.
3,3	2,03	3-12	71	ukendt	J. Dalsgaard Petersen, Fole.
4,5	1,86				

[1] Kastet 21-6.

7488, på Rosenfeldt.

alke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,2	2,58	6-12	143	Randers Gordon, e.A 58	Johs. Schmidt, Bondeseje, Lime.
3,3	2,55	20- 1	37	Randers Gordon, e.A 58	Kr. L. Sørensen, Bigum.
3,8	1,98	—	35	Cajus, e.s. 6442	Johs. Søndberg, Jennum.
6,0	1,16	9-12	20	Randers Adler, s. 6512	Marie Kruse, Hammelev.
2,0	4,02	2- 1	3	Randers Gordon, e.A 58	Chr. Gert Nielsen, Lemmer.
2,8	2,74	6-12	67	Randers Gordon, e.A 58	Axel Pedersen, Sem.
3,3	2,36	12-12	65	Randers Nico, s. 7031	Klaus Moltesen, Hørning.
3,9	2,06	7-12	29	Randers Marskal, s. 6511	Egon Østergaard, Asferg.
3,6	2,00	29- 5	103	Randers Godtfred, e.A 48	Marius Andersen, Dalbyover.
2,3	3,14	12-12	157	Randers Adema, e.A 68	Johs. Schmidt, Bondeseje, Lime.
3,5	2,50	17- 4	14	Rex, e.s. 6203	Klaus Moltesen, Hørning.
4,0	2,10	—	102	Randers Godtfred, e.A 48	Marius Andersen, Dalbyover.
3,2	2,41	12-12	83	Randers Gordon, e.A 58	K. S. Høyer, Årslevholm, Randers.
3,3	2,16	2-12	37	Randers Gordon, e.A 58	Anders Koch, Dalbyneder.
2,8	2,69	5- 1	30	Randers Gordon, e.A 58	Jacob Bruun, Selkær.
2,8	2,45	16-12	75	Randers Adema, e.A 68	Viktor Pedersen, Voldby.
3,4	1,93	24-12	194	Randers Nico, s. 7031	Niels Sørensen, Gjerrild.
1,9	3,16	4- 2	25	Randers Godtfred, e.A 48	Arne Jørgensen, Råby Kær.
6,0	1,28	1-12	36	Randers Krans, e.s. 6351	Agner Gert Nielsen, Støvring.
3,4	2,38				

Hovedtabel 55. **Afkomsprøve for tyren Thy Pont**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I al f. e
40	11- 2-64	19- 9	951	493	**6477**	**4,33**	**280,72**	**315**	**3,49**	**226**	317	317	1810	437
34	27- 8-63	14- 9	1114	548	**6329**	**4,39**	**278,09**	**312**	**3,53**	**224**	322	322	1770	426
32	27- 9-63	2- 9	1071	556	**6522**	**4,23**	**275,70**	**309**	**3,43**	**224**	334	334	1735	442
31	22-11-63	19- 9	1032	549	**6241**	**4,38**	**273,15**	**307**	**3,53**	**221**	317	317	1708	408
41	21- 3-64	30- 9	923	525	**6502**	**4,20**	**272,78**	**306**	**3,60**	**234**	306	306	1778	404
45	9-11-63	17-10	1073	583	**5699**	**4,40**	**250,95**	**282**	**3,51**	**200**	289	289	1489	368
49	15- 2-64	2-11	991	516	**6071**	**4,00**	**242,77**	**272**	**3,52**	**214**	273	273	1636	380
36	8- 4-64	16- 9	891	546	**6269**	**3,79**	**237,35**	**265**	**3,43**	**215**	320	320	1450	400
35	23- 3-64	8- 9	899	662	**5522**	**4,23**	**233,66**	**262**	**3,70**	**204**	328	328	1313	399
42	8- 1-64	28- 9	994	582	**5742**	**3,90**	**223,79**	**250**	**3,36**	**193**	308	308	1328	357
48	15- 4-64	15-10	913	554	**4910**	**4,21**	**206,62**	**232**	**3,93**	**193**	291	291	1133	338
47	28-12-63	26-10	1033	625	**4275**	**4,39**	**187,67**	**211**	**3,93**	**168**	280	280	976	330
37	22- 2-64	28- 9	949	543	**4621**	**3,82**	**176,45**	**197**	**3,38**	**156**	308	308	941	343
43	17- 6-64	30- 9	835	516	**4279**	**4,11**	**175,81**	**197**	**3,51**	**150**	306	306	859	308
46[1]	8-12-63	9-10	1036	598	**4476**	**3,89**	**173,97**	**194**	**3,56**	**159**	297	297	884	323
44	11-12-63	4-10	1028	632	**3398**	**4,46**	**151,44**	**170**	**3,64**	**124**	299	299	707	286
50	4- 9-64	7-11	794	516	**3172**	**4,27**	**135,31**	**152**	**3,74**	**119**	268	268	652	268
Gns. af 17 kvier			972	561	**5324**	**4,17**	**222,13**	**249**	**3,56**	**190**	304	304	1304	366

[1] Trepattet efter yverbetændelse før kælvning.

Hovedtabel 56. **Afkomsprøve for tyren Hjørring Simon**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I al f. e
106	4- 8-64	23-10	810	503	**5431**	**4,62**	**250,95**	**282**	**3,61**	**196**	279	279	1586	368
109	30- 1-64	10- 9	954	512	**6005**	**4,07**	**244,58**	**274**	**3,65**	**219**	322	322	1589	397
101[1]	3- 5-64	13-10	893	553	**5465**	**4,38**	**239,56**	**269**	**3,70**	**202**	289	289	1525	375
97	3- 4-64	26- 9	906	537	**5379**	**4,45**	**239,35**	**269**	**3,83**	**206**	306	306	1445	390
107	22- 8-64	15-10	784	565	**5163**	**4,37**	**225,71**	**253**	**3,58**	**185**	287	287	1405	357
105	9-12-63	1-11	1058	515	**5788**	**3,80**	**220,03**	**246**	**3,62**	**209**	270	270	1493	366
102	6- 4-64	17-10	924	523	**5325**	**4,13**	**219,72**	**246**	**3,65**	**194**	285	285	1377	355
95	6- 4-64	12- 9	889	571	**4883**	**4,45**	**217,43**	**244**	**3,81**	**186**	320	320	1257	374
104	20- 9-64	7-10	747	503	**5096**	**4,22**	**215,29**	**241**	**3,52**	**179**	295	295	1340	325
96	1- 3-64	21- 9	934	593	**5190**	**4,12**	**213,69**	**239**	**3,69**	**192**	311	311	1315	369
92	10- 4-64	20- 8	862	582	**4779**	**4,27**	**204,04**	**229**	**3,88**	**185**	343	343	1193	384
100	11- 4-64	29- 9	901	527	**4446**	**4,44**	**197,34**	**222**	**3,74**	**166**	303	303	1116	331
103	25- 1-64	12-10	991	558	**4908**	**4,01**	**197,02**	**221**	**3,67**	**180**	290	290	1195	346
99	11- 8-64	28- 9	778	570	**4494**	**4,35**	**195,28**	**219**	**3,67**	**165**	304	304	1108	335
98	19- 4-64	4-10	898	555	**4640**	**4,21**	**195,20**	**219**	**3,74**	**174**	298	298	1122	337
94	5- 4-64	3- 9	881	543	**4268**	**4,56**	**194,59**	**219**	**3,97**	**169**	329	329	1041	339
108	7- 3-64	30-10	967	518	**4293**	**4,41**	**189,44**	**213**	**3,66**	**157**	272	272	1081	320
110	2- 1-64	12- 9	984	579	**4567**	**4,14**	**188,95**	**212**	**3,83**	**175**	320	320	1071	329
93	9- 3-64	7- 9	912	504	**4552**	**4,13**	**187,85**	**210**	**3,63**	**165**	325	325	1048	351
91	1- 5-64	31- 8	852	509	**3407**	**4,22**	**143,72**	**161**	**3,74**	**127**	332	332	749	310
Gns. af 20 kvier			896	541	**4904**	**4,26**	**208,99**	**234**	**3,70**	**182**	304	304	1253	353

[1] Trepattet efter pattetråd i maj.

. 7257, på Kronborg.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,0	1,60	22-12	24	Thy Røn, e.B 21	Chr. Tange, Brund.
3,0	2,96	19- 2	46	Thy Røn, e.B 21	H. Dahm, Sjørring.
2,9	3,04	7-12	44	Thy Elm, s. 6787	Peter Kjær, Jegindø, Hvidbjerg.
6,4	1,16	16- 1	31	Thy Røn, e.B 21	Chr. Tange, Brund.
3,2	2,72	15- 6	11	Egen tyr, f. 15-12-57	Niels Bøje Nielsen, Flarup.
3,3	2,61	1- 3	5	Fox, e.s. 6227	Chr. Blak Poulsen, Skårup.
4,6	1,85	26- 1	23	Thy Gran, e.s. 6566	Askov Christoffersen, Odby.
4,6	1,71	11- 1	55	Hoofdmann, e.s. 6152	Viggo Rotbøl, Nors.
1,9	4,03	3- 1	30	Sam, e.s. 6225	P. Bach, Kjelstrup.
7,6	0,91	5- 4	15	Thy Elm, s. 6787	Mads Pedersen, Ydby.
3,6	2,17	10- 4	85	Thy Elm, s. 6787	Laurits Handrup, Refsbøl.
4,8	1,44	17- 1	70	Piet Eduard, e.s. 6330	Evald Pedersen, Hillerslev.
4,2	1,63	19-12	53	ukendt	Chr. Graversen, Vandet.
4,7	1,49	2- 6[1]	71	Sam, e.s. 6225	Ejler Thomsen, Kløv.
2,3	3,00	25- 1	107	Thy Gran, e.s. 6566	Anders Vestergaard, Kjelstrup.
4,0	1,78	5-12	46	Thy Røn, e.B 21	Peter Kjær, Jegindø, Hvidbjerg.
3,6	1,90	11- 4	29	Leo, s. 6224	Henry Jensen, Sennels.
4,1	2,12				

[1] Kastet 27-4 efter ins. 12-12.

s. 7415, på Dybvad.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,5	2,46	7- 2	144	Woro, e.s. 6025	Poul Krøgholt, Mygdal.
4,0	2,09	3- 3	75	Dan, e.s. 6107	Folke Madsen, Asdal.
5,7	1,34	16- 3	80	Sverre, e.s. 6026	Jens Jørgensen, Hallund.
4,0	2,06	23-12	63	Hjørring Diamant, e.A 28	A. Andreasen, Tollestrup, Vrå.
3,8	2,24	20- 1	160	Cæsar, e.s. 6339	Poul Krøgholt, Mygdal.
4,2	2,18	26- 1	48	Bisp, e.s. 6168	Poul Olesen, Høgstedgård, Vrå.
4,7	1,65	25- 1	20	Ålborg Zar, e.A 70	Tage Pedersen, Agersted.
3,1	2,43	20- 1	121	Hjørring Pilot, e.s. 6495	Hans Nielsen, Flauenskjold.
3,6	2,35	2- 5	105	Hjørring Foch, e.A 52	Kaj Nielsen, Sæsing, Tårs.
3,6	2,03	30-12	39	Lods, e.s. 6338	Ejner Larsen, Vibsig, Brønderslev.
3,0	2,42	23-12	27	Hjørring Gordon, s. 7051	Th. Jensen, Præstholm, Løkken.
3,3	2,30	27-12	92	Opmand, e.s. 6427	Ejner Christensen, Ingstrup.
4,6	1,71	28- 1	12	Just, s. 6341	Kaj Nielsen, Sæsing, Tårs.
2,8	2,63	6- 2	79	Adema 14, s. 6985	A. Andreasen, Tollestrup, Vrå.
4,5	1,76	15- 2	10	Hjørring Pilot, e.s. 6495	Harry Jensen, Thise Kær.
3,8	1,92	27- 2	69	Åsen Mygind, s. 5075	Gunnar Sørensen, Åsen, Bindslev.
5,7	1,26	6- 2	88	Hjørring Adema, e.A 16	Aksel Kyed, Dybvad.
5,1	1,50	13- 1	88	Opmand, e.s. 6427	Folke Madsen, Asdal.
3,5	2,11	12- 1	65	Cæsar 3, f. 8-5-57	Poul Olesen, Høgstedgård, Vrå.
2,9	2,13	9-12	81	Cæsar, e.s. 6339	Peter Thomsen, Stenum.
4,0	2,03				

Hovedtabel 57. **Afkomsprøve for tyren Varde Alfa,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
92	17- 3-64	26- 9	923	584	**6487**	**4,25**	**275,53**	**309**	**3,71**	**240**	312	312	1756	4245
96	23- 6-64	27- 9	826	608	**5446**	**4,78**	**260,57**	**293**	**3,94**	**214**	311	311	1484	3747
94	10- 3-64	4- 9	908	580	**4947**	**5,24**	**259,15**	**293**	**4,01**	**198**	334	334	1360	4007
103	8- 6-64	25- 9	839	500	**5434**	**4,55**	**247,02**	**278**	**3,79**	**206**	313	313	1393	3862
102	4- 3-64	21- 9	931	526	**5608**	**4,40**	**246,96**	**277**	**3,65**	**205**	317	317	1453	4027
97	6- 3-64	8- 9	916	519	**5666**	**4,29**	**243,19**	**273**	**3,66**	**207**	318	318	1435	3964
93	30- 5-64	6-11	890	547	**6000**	**4,03**	**241,92**	**271**	**3,75**	**225**	271	271	1551	3747
105	13-10-64	5-10	722	522	**5024**	**4,49**	**225,71**	**254**	**3,56**	**179**	303	303	1240	3673
107	23- 7-64	6-10	805	545	**4683**	**4,48**	**209,87**	**236**	**3,75**	**176**	302	302	1079	3474
104	16- 7-64	25- 9	801	533	**4477**	**4,44**	**198,80**	**223**	**3,54**	**159**	301	301	1034	3328
99	30- 3-64	22- 9	906	590	**4385**	**4,34**	**190,32**	**214**	**3,82**	**167**	304	304	1000	3498
95	1- 4-64	8- 9	890	575	**4177**	**4,40**	**183,63**	**206**	**3,58**	**150**	318	318	924	3504
91	12- 4-64	8-10	909	550	**4138**	**4,23**	**175,00**	**196**	**3,63**	**150**	300	300	885	3328
108	9- 7-64	24-10	837	500	**4234**	**4,03**	**170,56**	**191**	**3,48**	**148**	284	284	832	3133
98	11- 6-64	23- 9	834	553	**3804**	**4,44**	**168,93**	**190**	**3,76**	**143**	303	303	781	3210
106	22- 6-64	26-10	856	582	**3439**	**4,30**	**147,98**	**166**	**3,74**	**129**	282	282	641	2751
101	11- 6-64	23-10	864	520	**3583**	**4,12**	**147,79**	**166**	**3,60**	**129**	285	285	695	2803
100	18- 3-64	17- 9	913	646	**3113**	**4,14**	**128,98**	**145**	**3,75**	**117**	302	321	684	3132
Gns. af 18 kvier			865	554	**4703**	**4,40**	**206,77**	**232**	**3,71**	**174**	303	304	1124	3524

Hovedtabel 58. **Afkomsprøve for tyren Randers Drost,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
44	4- 1-64	26- 8	965	571	**6509**	**4,32**	**281,19**	**316**	**3,90**	**254**	328	328	1801	4473
36	19- 1-64	15- 9	970	558	**6352**	**4,30**	**272,97**	**306**	**3,67**	**233**	308	308	1752	4322
35	1- 2-64	25- 9	967	604	**5535**	**4,15**	**229,81**	**258**	**3,46**	**191**	298	298	1409	3942
45	21-12-63	4- 9	988	579	**5234**	**4,27**	**223,71**	**251**	**3,82**	**200**	319	319	1309	3812
42	19- 1-64	20- 9	975	549	**4565**	**4,87**	**222,48**	**251**	**3,93**	**179**	303	303	1311	3728
41	21-11-63	20- 9	1034	614	**5329**	**4,13**	**220,35**	**247**	**3,57**	**190**	303	303	1347	3620
32	21-11-63	17- 9	1031	658	**5293**	**4,00**	**211,51**	**237**	**3,48**	**184**	306	306	1269	3698
31	31-12-63	28- 8	971	641	**5141**	**4,08**	**209,90**	**235**	**3,78**	**194**	326	326	1178	3681
49	2- 9-64	12-10	770	576	**4779**	**4,36**	**208,40**	**234**	**3,82**	**182**	281	281	1202	3482
50	6- 9-64	11-10	765	541	**5355**	**3,87**	**206,98**	**231**	**3,54**	**190**	282	282	1257	3505
33[1]	4- 1-64	1- 9	971	674	**4851**	**4,15**	**201,43**	**226**	**3,87**	**188**	322	322	1124	3728
46	17-12-63	13- 9	1001	506	**4770**	**4,21**	**200,65**	**225**	**3,83**	**183**	310	310	1135	3553
38	2- 3-64	25- 8	906	572	**5172**	**3,84**	**198,36**	**222**	**3,71**	**192**	329	329	1091	3655
37	13- 1-64	31-10	1022	646	**4803**	**4,12**	**197,67**	**221**	**3,80**	**183**	262	262	1201	3315
40	7- 1-64	23- 9	990	509	**4616**	**4,24**	**195,72**	**220**	**3,54**	**163**	300	300	1060	3696
47	30-12-63	3- 9	978	595	**4518**	**4,29**	**193,96**	**218**	**3,81**	**172**	320	320	1044	3490
34[2]	17-11-63	13- 9	1031	560	**4117**	**4,07**	**167,56**	**188**	**3,92**	**161**	310	310	970	3287
43	24- 3-64	17- 9	907	592	**3389**	**4,89**	**165,62**	**187**	**3,93**	**133**	306	306	811	3245
48	21- 9-64	9-10	748	535	**3603**	**4,30**	**154,91**	**174**	**3,89**	**140**	284	284	775	3121
39	27- 9-64	15-10	748	572	**2641**	**4,32**	**114,21**	**128**	**3,61**	**95**	278	278	570	2630
Gns. af 20 kvier			937	583	**4829**	**4,22**	**203,87**	**229**	**3,74**	**180**	304	304	1181	3600

[1] Venstre forpatte stukket op efter pattetråd.
[2] Trepattet efter yverbetændelse.

7435, på Vardegård.

alke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,2	1,85	6- 2	26	Varde Johan, e.s. 6537	Bernhard L. Pedersen, Asp.
3,4	2,47	—	182	Varde Wytt, s. 6615	Aksel Thude, Vilslev.
4,8	1,58	16- 1	51	Varde Bob, e.A 54	Arne Pedersen, Alslev.
3,4	2,28	22- 2	46	Varde Roelof, e.A 34	Ejner H. Madsen, Billum.
3,2	2,61	15-12	15	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Tage Davidsen, Næsbjerg.
3,8	2,03	30-11	50	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Møller Kristensen, Mejlvang.
4,3	2,12	2- 6[1]	44	ukendt	Jens Horsbøl, Bjerremose.
3,5	2,17	14- 1	161	Varde Bob, e.A 54	Henning Pedersen, Grindsted.
3,6	2,09	22- 2	11	Varde Ruyter, s. 6776	Niels Mølgaard, Lourup.
2,1	3,48	30-11	41	Varde Johan, e.s. 6537	Henry Nissen, Jedsted.
2,8	2,77	28-11	100	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Arne Gregersen, Toftnæs.
3,2	2,15	28-11	9	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	A. Horsbøl Jørgensen, Firhøje.
3,8	1,83	14- 3	64	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Georg Jensen, Høgsbro.
4,5	1,64	16- 1	57	Varde Bob, e.A 54	Verner Jensen, Hostrup.
3,8	1,91	28-11	44	Varde Johan, e.s. 6537	Hans Sørensen, Fåborg.
3,6	1,94	21- 1	22	Klaaskes Athleet, s. 6378	Bodil Haahr, Heager.
4,6	1,55	21- 3	35	Merkur Adema, e.s. 5997	Chr. Sørensen, Årre.
3,4	1,79	31-12	16	Varde Sultan, s. 6778	Chr. Jensen, Bork.
3,7	2,13				

[1] Kastet 11-3 efter ins. 24-1.

. 7278, på Rosenfeldt.

lalke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,6	1,40	7-12	92	Randers Gordon, e.A 58	Brdr. Jørgensen, Lemmer.
3,5	2,47	19-12	89	Randers Gordon, e.A 58	Brdr. Jørgensen, Lemmer.
6,3	1,22	4- 2	49	Randers Godtfred, e.A 48	Thorkild Thomsen, Krogsager.
4,4	1,81	12-12	55	ukendt	Erik Siddelmann, Hald.
4,1	1,87	26-12	34	Randers Hilmann, s. 6350	Aksel Nielsen, Hornslet.
4,3	1,82	—	53	Randers Torp, s. 6673	Niels Søndergaard, Stouby.
5,2	1,49	9- 1	52	Randers Foch, s. 6672	Thorkild Thomsen, Krogsager.
2,2	3,18	1-12[1]	80	Randers Krans, e.s. 6351	Marius Andersen, Dalbyover.
4,6	1,72	11- 1	39	Randers Krans, e.s. 6351	N. Bjerregaard Hansen, Bjerregrav.
5,9	1,31	21- 1	53	Randers Gordon, e.A 58	N. Bjerregaard Hansen, Bjerregrav.
8,0	0,95	31- 1	92	Randers Gordon, e.A 58	Brdr. Jørgensen, Lemmer.
3,3	2,40	29- 3	57	Randers Gordon, e.A 58	Niels Søndergaard, Stouby.
3,3	2,24	8- 2	45	Randers Eduard, s. 6441	Knud Cilleborg, Krogsager.
5,1	1,42	3- 2	71	Randers Krans, e.s. 6351	Niels Bach, Vilstrup.
6,0	1,22	14-12	75	Randers Adema, e.A 68	Knud Cilleborg, Krogsager.
3,5	2,00	6- 2	83	Randers Krans, e.s. 6351	Aksel Nielsen, Hornslet.
5,3	1,42	23- 1	77	Randers Adema, e.A 68	Frode Velling, Ilshøj.
4,5	1,53	21-12	2	Randers Adler, s. 6512	Karl Nygaard, Gerlev J.
4,4	1,63	7- 1	80	Randers Adema, e.A 68	Knud Cilleborg, Krogsager.
4,8	1,45	30- 1	38	Randers Krans, e.s. 6351	Kr. Kristensen, Ø. Tørslev.
4,7	1,73				

[1] Kastet 29-6.

Hovedtabel 59. **Afkomsprøve for tyren Hjørring Dros**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
127	25-12-63	21- 9	1001	583	**5553**	**4,37**	**242,66**	**272**	**3,89**	**216**	310	310	1491	383
133	15- 2-64	22- 9	950	519	**5725**	**4,21**	**240,97**	**270**	**3,80**	**218**	309	309	1568	378
123	6-11-63	31- 8	1029	547	**4931**	**4,56**	**224,64**	**253**	**3,86**	**190**	331	331	1390	383
124	22- 1-64	6- 9	958	527	**4884**	**4,35**	**212,27**	**238**	**3,91**	**191**	325	325	1289	366
125	15- 3-64	6- 9	905	664	**4594**	**4,52**	**207,81**	**234**	**3,95**	**181**	325	325	1189	352
128	16-12-63	5- 9	994	648	**4747**	**4,23**	**200,72**	**225**	**3,86**	**183**	326	326	1173	349
140	18- 2-64	4-11	990	572	**4643**	**4,29**	**199,04**	**223**	**3,89**	**180**	266	266	1228	325
137	27- 2-64	30-10	976	574	**4326**	**4,52**	**195,48**	**220**	**3,84**	**166**	271	271	1146	312
132[1]	23- 3-64	30- 9	921	488	**4511**	**4,33**	**195,30**	**219**	**3,82**	**172**	301	301	1129	332
122	6- 1-64	4- 9	972	532	**4341**	**4,43**	**192,19**	**216**	**3,65**	**159**	327	327	1079	334
136	22- 3-64	24-10	946	525	**4556**	**4,14**	**188,59**	**211**	**3,79**	**172**	277	277	1126	307
135	15- 2-64	12-10	970	496	**4363**	**4,27**	**186,40**	**209**	**3,83**	**167**	289	289	1082	328
130	22-12-63	25- 9	1008	566	**4015**	**4,29**	**172,30**	**193**	**3,77**	**151**	306	306	914	315
131	24- 2-64	27- 9	946	526	**4048**	**4,16**	**168,26**	**189**	**3,77**	**153**	304	304	926	317
129	28- 2-64	24- 9	938	576	**4016**	**3,97**	**159,46**	**178**	**3,83**	**154**	307	307	912	316
141	13- 2-64	13-10	973	560	**3597**	**4,18**	**150,28**	**168**	**3,88**	**140**	288	288	817	282
126	27- 3-64	17- 9	904	580	**3463**	**4,13**	**143,17**	**160**	**3,78**	**131**	314	314	735	295
Gns. af 17 kvier			964	558	**4489**	**4,30**	**192,91**	**216**	**3,83**	**172**	304	304	1129	334

[1] Trepattet efter fluestik før kælvning.

Hovedtabel 60. **Afkomsprøve for tyren Sdj. Trin**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
79	2- 4-64	30- 9	911	512	**6236**	**4,28**	**266,90**	**299**	**3,44**	**215**	300	300	1703	4327
69	7- 1-64	28- 8	964	528	**5514**	**4,72**	**260,10**	**293**	**3,65**	**201**	333	233	1520	4152
76	30- 4-64	7-11	921	525	**4939**	**4,56**	**225,07**	**253**	**3,71**	**183**	262	262	1371	3613
72	19- 5-64	23- 9	857	517	**4934**	**4,53**	**223,33**	**251**	**3,73**	**184**	307	307	1278	3836
78	3- 4-64	5-10	915	526	**4976**	**4,21**	**209,73**	**235**	**3,51**	**175**	295	295	1198	3877
77	21- 2-64	12-10	964	541	**5531**	**3,76**	**208,17**	**232**	**3,50**	**193**	288	288	1285	3722
61	25- 1-64	18- 9	967	531	**5055**	**4,10**	**207,38**	**232**	**3,76**	**190**	312	312	1167	3920
62	4- 3-64	20- 9	930	579	**5547**	**3,70**	**205,37**	**229**	**3,26**	**181**	310	310	1248	3875
65	29- 1-64	7- 9	952	545	**4906**	**4,04**	**197,96**	**222**	**3,61**	**177**	323	323	1160	3864
66	6- 2-64	7- 9	944	563	**4438**	**4,33**	**192,20**	**216**	**3,65**	**162**	323	323	1046	3862
74	4- 7-64	14-11	863	519	**4665**	**3,96**	**184,56**	**206**	**3,49**	**163**	255	255	1094	3386
67	31- 3-64	25- 8	877	581	**4797**	**3,82**	**183,15**	**205**	**3,62**	**174**	336	336	996	3735
71	2- 3-64	11- 9	923	478	**4753**	**3,81**	**181,17**	**202**	**3,42**	**163**	319	319	977	3581
70	17- 7-64	9- 9	784	493	**4362**	**4,11**	**179,29**	**201**	**3,62**	**158**	321	321	928	3636
75	21- 8-64	9-10	779	569	**4397**	**3,83**	**168,33**	**188**	**3,56**	**157**	291	291	899	3410
80	21- 6-64	27-10	858	627	**3721**	**4,41**	**164,25**	**184**	**3,64**	**136**	273	273	852	3233
64	26- 2-64	21- 9	938	565	**4452**	**3,59**	**159,68**	**178**	**3,52**	**157**	309	309	863	3394
68	8- 2-64	11- 9	946	540	**3728**	**3,96**	**147,61**	**165**	**3,45**	**129**	319	319	781	3280
73	28- 8-64	12-10	775	548	**3462**	**4,23**	**146,40**	**164**	**3,70**	**128**	288	288	717	3148
63	2- 2-64	5- 9	946	602	**2232**	**3,94**	**87,98**	**98**	**3,67**	**82**	216	325	756	3060
Gns. af 20 kvier			901	544	**4632**	**4,10**	**189,93**	**213**	**3,57**	**165**	299	304	1092	3646

. 7502, på Dybvad.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,2	1,91	26- 1	4	Hero Langholt, s. 6785	Øjvind Leen, Grønholt, Frederikshavn.
4,1	1,97	2- 1	32	Cæsar, e.s. 6339	Niels R. Jakobsen, Østervrå.
3,0	2,58	—[1]	64	Lods, e.s. 6338	Arne Melgaard, Hundelev.
3,3	2,32	12-12	60	Hjørring Diamant, e.A 28	Poul Østergaard, Hæstrup.
2,2	3,38	22-12	133	Sten, s. 6700	M. Brix Jensen, Asdal.
3,4	2,11	18-12	90	ukendt	P. Jørgensen, Understed.
3,6	2,38	18- 2	61	Bisp, e.s. 6168	Jens Vestergaard, Sdr. Stokholm.
4,0	1,99	27- 2	67	Hjørring Adema, e.A 16	Laurits Isaksen, Ø. Brønderslev.
3,2	2,23	20-12	93	Cæsar, e.s. 6339	Brdr. Nielsen, Ingstrup.
3,3	2,15	4- 3	3	Sverre, e.s. 6026	Lars Rødbro, Alstrup.
2,2	3,70	29- 5	7	Hjørring Ernst, e.A 76	Niels Jørgensen, Hallund.
2,7	2,79	13- 1	10	ukendt	Tage Poulsen, Høgsted, Vrå.
2,8	2,32	—	44	Hjørring Diamant, e.A 28	Ernst Madsen, Fjerritslevgård.
3,2	2,19	29-12	72	ukendt	Poul Olesen, Høgstedgård, Vrå.
3,7	1,90	8- 2	6	Bisp, e.s. 6168	Th. Hansen, Hollensted, Hallund.
3,7	1,89	1- 3	103	Opmand, e.s. 6427	Poul Eriksen, Bundgård, Brønderslev.
2,7	2,14	16-12	54	Hjørring Adema, e.A 16	H. Præstgaard Jensen, Bindslev.
3,3	2,35				

[1] Brummer.

. 7407, på Brøstrupgård.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2,7	3,54	20-12	3	Sdj. Ursus, s. 6454	Anders Carstensen, Grønnebæk.
2,4	3,26	13-12	92	Sdj. Reklame, e.A 42	Jes Friis, Hjerting.
5,5	1,42	13- 2	24	Sdj. Hof, s. 6963	Søstr. Bruun, Tornum.
2,9	2,52	12-12	43	Nr. 32, f. 26-11-46	Leonhard Brodersen, Kestrup.
2,8	2,78	22-12	97	Sdj. Rudolf, s. 6959	Niels Nielsen, Refsømark.
3,7	2,43	26-12	72	Sdj. Diamant, s. 6456	Niels L. Hansen, Bjerndrup.
3,8	2,01	19- 1	69	Sdj. Reklame, e.A 42	Hans Lund, Sønderbygård.
3,2	2,43	4- 2	134	Sdj. Markus, s. 6688	Iver Andersen, Farrisgård.
3,8	2,02	20-12	45	Sdj. Henrik, e.s. 6219	Peter Gejl, Krogstrup.
4,1	1,74	14-12	52	Sdj. Odin, s. 6455	Iver Thorøe, Langetved.
3,7	2,07	19- 1	119	Sdj. Ernst, e.A 44	M. Beck Jørgensen, Farris.
5,2	1,30	15-12	22	Sdj. Dorn, s. 6766	Theodor Carstensen, Vimtrup.
3,2	2,17	7-12	72	Sdj. Ernst, e.A 44	M. Grøndahl, Voldstedgård, Jels.
2,6	2,78	23-12	15	Sdj. Hof, s. 6963	Jeppe Hildebrandt, Grønnebæk.
3,6	2,08	—[1]	18	Sdj. Ursus, s. 6454	Viggo Petersen, Galsted.
8,9	0,97	26-12	106	Sdj. Klaus, e.s. 6218	Kresten Hansen, Højrup.
4,2	1,75	14-12	27	Sdj. Markus, s. 6688	Brdr. Dahl, Skrydstrup.
4,5	1,55	10-12	30	Sdj. Adam, e.s. 6297	Vagn Abildgaard, Store-Nustrup.
2,6	2,11	7-12	56	Sdj. Ernst, e.A 44	Herman Hynkemejer, Østermarken.
1,6	2,75	3-12	119	Sdj. Nico, e.s. 6370	Aje Wind, Hjerting.
3,8	2,18				

[1] Børbetændelse.

Hovedtabel 61. **Afkomsprøve for tyren Herning Dros**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I al f. e
32	19- 1-64	6-11	1022	567	**5486**	**4,44**	**243,50**	**274**	**3,74**	**205**	283	283	1541	383
39	30- 5-64	7-10	860	557	**5296**	**4,23**	**224,10**	**251**	**3,73**	**198**	313	313	1350	412
48	19- 3-64	21- 9	916	490	**5228**	**4,23**	**221,09**	**248**	**3,56**	**186**	326	326	1297	397
49	10- 5-64	14- 9	857	490	**4872**	**4,25**	**207,30**	**233**	**3,72**	**181**	336	336	1184	394
44	23-10-64	21- 9	698	560	**4550**	**4,24**	**192,89**	**216**	**4,04**	**184**	329	329	1054	382
31	10- 6-64	21- 9	833	580	**4592**	**4,01**	**184,33**	**206**	**3,65**	**168**	329	329	989	391
42	2-12-63	12- 9	1015	558	**4379**	**4,16**	**182,03**	**204**	**3,89**	**170**	328	328	1029	373
35	11-10-64	17-11	767	572	**4304**	**4,17**	**179,32**	**201**	**3,66**	**157**	272	272	995	327
40	20- 4-64	14-11	938	600	**4708**	**3,78**	**177,86**	**199**	**3,58**	**169**	275	275	1010	327
34	9- 5-64	16-10	890	620	**4251**	**4,17**	**177,36**	**199**	**3,65**	**155**	304	304	983	344
47	5-12-63	6-10	1036	570	**4484**	**3,94**	**176,72**	**198**	**3,58**	**160**	314	314	972	369
50	1-12-63	21-10	1055	563	**4193**	**4,13**	**173,02**	**194**	**3,64**	**153**	299	299	964	345
41	27- 4-64	23-10	909	608	**3882**	**4,35**	**169,05**	**190**	**3,86**	**150**	297	297	907	349
38[1]	4- 5-64	28- 9	877	600	**4094**	**4,08**	**166,86**	**187**	**3,66**	**150**	305	305	918	342
36	6- 3-64	2-11	971	574	**3570**	**4,16**	**148,48**	**166**	**3,73**	**133**	287	287	789	317
33	23- 3-64	3-11	955	595	**3489**	**4,13**	**143,98**	**161**	**3,75**	**131**	286	286	751	320
46	24- 8-64	1-11	799	573	**3339**	**3,89**	**129,94**	**145**	**3,63**	**121**	288	288	764	325
37	11- 8-64	1-10	781	618	**2900**	**3,93**	**114,01**	**128**	**3,77**	**109**	319	319	738	319
45	6- 8-64	10-11	826	560	**2616**	**4,08**	**106,86**	**120**	**3,82**	**100**	279	279	562	281
Gns. af 19 kvier			895	571	**4223**	**4,14**	**174,67**	**196**	**3,71**	**157**	304	304	989	352

[1] Trepattet efter yverbetændelse.

Hovedtabel 62. **Afkomsprøve for tyren Bornholms Brygge**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I al f. e
9	12-11-64	18-11	736	343	**4858**	**6,48**	**314,90**	**358**	**4,08**	**198**	286	286	2008	363
1	30-12-64	18-11	688	365	**4636**	**6,64**	**307,67**	**350**	**3,84**	**178**	286	286	1917	372
8	28-12-64	27-11	699	360	**4450**	**6,75**	**300,57**	**342**	**4,26**	**190**	277	277	1848	358
10	10- 4-64	30-10	933	359	**4674**	**6,40**	**299,05**	**340**	**4,14**	**193**	305	305	1823	376
2	5- 5-64	3-10	881	443	**4359**	**6,72**	**292,75**	**333**	**4,60**	**200**	332	332	1767	378
3	17- 8-64	5-11	810	380	**4172**	**6,64**	**277,12**	**315**	**4,38**	**183**	299	299	1679	348
11	7- 8-64	4-11	819	387	**4043**	**6,65**	**268,82**	**306**	**4,33**	**175**	300	300	1581	341
5	6-12-64	17-11	711	373	**4279**	**6,07**	**259,53**	**294**	**4,13**	**177**	287	287	1670	340
15	13-12-64	25-10	681	329	**3780**	**6,74**	**254,86**	**290**	**4,30**	**162**	310	310	1425	325
17	16- 5-64	27- 9	864	350	**4027**	**6,15**	**247,58**	**281**	**4,04**	**162**	338	338	1375	338
4	13- 4-64	22-10	922	406	**3784**	**6,53**	**247,27**	**281**	**4,34**	**164**	313	313	1451	334
12	27- 8-64	6-10	770	386	**3766**	**6,51**	**245,29**	**279**	**4,36**	**164**	318	318	1353	326
14	1-11-64	17-11	736	372	**3607**	**6,69**	**241,35**	**274**	**4,30**	**155**	297	297	1317	321
16	14- 7-64	12-10	820	323	**3463**	**6,73**	**233,08**	**265**	**4,29**	**149**	323	323	1232	313
13	24-11-64	6-11	712	333	**3863**	**5,91**	**228,25**	**259**	**4,24**	**164**	298	298	1326	316
7	20-10-64	22-10	732	356	**3221**	**6,54**	**210,66**	**239**	**4,40**	**142**	295	295	1136	296
Gns. af 16 kvier			782	367	**4061**	**6,51**	**264,30**	**300**	**4,24**	**172**	304	304	1557	340

s. 7308, på Moesgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,4	1,45	16- 1	91	Julian, e.s. 6485	Frode Christensen, Haunstrup.
2,4	3,52	18- 1	26	Herning Ponto, s. 6721	Gunnar Christensen, Arnborg.
4,1	1,81	17-12	43	Julian, e.s. 6485	Johs. Clausen, Vistorp.
3,4	2,19	10- 1	44	Herning Revella, e.B 33	V. Mouritsen, Hollingholt.
2,8	2,54	28- 1	25	ukendt	Sigfred Knudsen, Vorgod.
2,4	3,11	29-12	88	ukendt	Børge Jensen, Barde.
4,2	1,64	13-12	46	Herning Viktor, s. 6697	Børge Jakobsen, Kollund.
5,2	1,45	4- 3	90	ukendt	Hans Hansen, Vorgod.
3,5	2,37	5- 4	13	ukendt	Chr. Overgaard, Vrå.
3,3	2,23	—	51	Julian, e.s. 6485	Nørgaard Troelsen, Feldborg.
2,3	3,08	8- 6[1]	49	Herning Strib, s. 6828	L. Lauridsen, Feldborg.
3,0	2,56	13- 2	84	Herning Adam, s. 6699	Gunnar Skovbjerg, Arnborg.
3,6	1,94	11- 1	8	ukendt	N. Grønbæk, Timring.
3,5	1,99	1-12	2	ukendt	Kurt Schmidt, Brejning.
5,4	1,41	2- 1	19	Butenmoark Haro, e.s. 6182	Børge Jakobsen, Kollund.
3,2	2,04	1- 3	24	ukendt	Ove Sørensen, Hodsager.
3,1	2,18	3- 1	157	Julian, e.s. 6485	Laurids Jensen, Ø. Linå.
2,8	2,13	27-12	8	ukendt	Kurt Schmidt, Brejning.
3,0	2,07	4- 2	20	Julian, e.s. 6485	M. Fjordside, Feldborg.
3,5	2,20				

[1] Kastet 10-5 efter ins. 11-1.

s. 3009, på Kannikegård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2,5	3,08	18- 3	65	Kvik, s. 2462	B. Marcher, Klippedal, Østerlars.
3,7	2,04	16- 5	66	Bornholms Ras, e.s. 128	B. Marcher, Klippedal, Østerlars.
3,8	1,78	27- 3[1]	31	ukendt	V. Jensen, Simonsgård, Rutsker.
3,8	1,77	5- 1	43	Bornholms Kasper, s. 2887	H. Olsen, Holmstrup, Årsballe.
3,4	1,66	20- 3	22	Bornholms Knægt, s. 2465	K. Hansen, Lindeskoven, Rø.
3,0	2,14	10- 1	30	Bornholms Ras, e.s. 128	H. Dahl, Ny Elleskov, Østerlars.
3,1	2,10	9- 1	48	Abild Lynggård, s. 2020	Ch. Regnersen, Stensminde, Vesterma
4,8	1,27	27- 2	—	Bornholms Kasper, s. 2887	H. Andersen, Skovshøj, Rutsker.
2,8	2,18	29- 6	17	Bornholms Ras, e.s. 128	E. Kofoed, Fuglsang, Bodilsker.
2,6	2,24	27- 2	16	Bækkehøj, s. 1427	Andr. Nygaard, Skovfryd, Vestermari
2,9	2,10	5- 1	82	Bornholms Brygger, s. 3009	V. Olsen, Nybro, Østerlars.
5,2	0,99	27-12	13	Kvik, s. 2462	E. Pedersen, Marthasminde, Bod.
3,3	1,87	17- 2	22	Nimbus, s. 3226	E. Pedersen, Marthasminde, Bod.
2,9	1,71	25- 3	17	Bornholms Knægt, s. 2465	O. Tranberg, Rynsegård, Østermarie.
4,2	1,45	11- 3	20	Bornholms Kasper, s. 2887	J. Hansen, Bjælkesten, Østerlars.
3,1	1,74	20-12	15	Bornholms Kasper, s. 2887	C. Bech, Fredenshjem, Åker.
3,4	1,88				

[1] Kastet 25-3 efter ins. 11-2.

Hovedtabel 63. **Afkomsprøve for tyren Fyns Glen,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
81	27-10-64	1-10	704	473	**5416**	**6,06**	**328,42**	**372**	**4,52**	**245**	320	320	1999	3904
62	8- 9-64	30- 8	721	438	**4369**	**7,50**	**327,87**	**374**	**4,61**	**201**	341	341	1761	3895
61	12- 7-64	6- 9	786	393	**5345**	**6,10**	**326,23**	**370**	**4,32**	**231**	345	345	1896	4113
64	2- 9-64	21- 9	749	358	**4972**	**5,84**	**290,26**	**329**	**4,53**	**225**	319	319	1656	3731
66	13- 9-64	21- 9	738	402	**4310**	**6,28**	**270,72**	**307**	**4,65**	**201**	326	326	1438	3360
76	22-11-64	25-10	702	347	**3960**	**6,76**	**267,76**	**304**	**4,24**	**168**	296	296	1417	3307
80	6- 9-64	24-10	778	367	**3819**	**6,97**	**266,25**	**303**	**4,50**	**172**	297	297	1409	3343
65	14-11-64	20- 9	675	335	**3481**	**7,53**	**262,11**	**299**	**4,70**	**164**	313	313	1311	3315
79	18-11-64	29-10	710	347	**3717**	**6,91**	**256,80**	**292**	**4,32**	**160**	281	281	1381	3172
78	12-11-64	6-11	724	366	**3815**	**6,61**	**252,31**	**287**	**4,43**	**169**	284	284	1359	3122
68	10-10-64	10-10	730	368	**4157**	**6,05**	**251,30**	**285**	**4,31**	**179**	311	311	1329	3370
70	30-11-64	30-10	699	364	**3580**	**6,95**	**248,91**	**283**	**4,53**	**162**	287	287	1279	3082
72	11-11-64	7-11	726	372	**3837**	**6,45**	**247,35**	**281**	**4,53**	**174**	283	283	1324	2993
82	4-10-64	17-11	774	358	**3814**	**6,28**	**239,52**	**272**	**4,39**	**168**	273	273	1287	2975
71	9-11-64	27-10	717	310	**3565**	**6,70**	**238,69**	**271**	**4,40**	**157**	294	294	1215	2918
73	18-11-64	6-11	718	360	**3509**	**6,73**	**236,29**	**269**	**4,57**	**161**	284	284	1178	3013
67	20-10-64	30- 9	710	386	**3343**	**7,05**	**235,60**	**268**	**4,73**	**158**	321	321	1109	3094
69	18-11-64	16-11	728	361	**3618**	**6,30**	**227,80**	**259**	**4,33**	**157**	274	274	1220	2897
63	8- 9-64	4- 9	726	420	**3123**	**7,14**	**223,09**	**254**	**4,65**	**145**	329	329	1009	3001
Gns. af 19 kvier			727	375	**3987**	**6,60**	**263,01**	**299**	**4,48**	**179**	304	304	1399	3295

Hovedtabel 64. **Afkomsprøve for tyren Årup Vestfyns Flink,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
77	1-12-64	28-10	696	360	**4358**	**7,15**	**311,39**	**354**	**4,27**	**186**	288	288	1886	3648
66	30- 9-64	23- 9	723	347	**4660**	**6,60**	**307,69**	**350**	**4,24**	**197**	323	323	1816	3909
63	11- 7-64	3-10	814	367	**4635**	**6,52**	**302,25**	**343**	**4,33**	**200**	313	313	1767	3706
71	20- 7-64	9-10	811	317	**3977**	**7,25**	**288,31**	**328**	**4,26**	**170**	307	307	1606	3529
64	1- 9-64	16- 9	745	331	**4202**	**6,81**	**286,20**	**325**	**4,33**	**182**	324	324	1625	3444
73	26- 7-64	17- 9	783	331	**4175**	**6,69**	**279,41**	**318**	**4,21**	**176**	329	329	1549	3714
79	27-10-64	28-10	731	351	**4459**	**6,22**	**277,35**	**315**	**4,15**	**185**	288	288	1636	3400
69	20- 9-64	18- 9	728	360	**4324**	**6,38**	**275,97**	**313**	**4,25**	**184**	301	301	1643	3572
65	14-11-64	12- 9	667	349	**4167**	**6,57**	**273,90**	**311**	**4,12**	**171**	307	307	1579	3411
80	14-11-64	26-10	711	350	**4317**	**6,34**	**273,64**	**311**	**4,01**	**173**	290	290	1644	3457
68	29-11-64	6-10	676	346	**3938**	**6,92**	**272,44**	**310**	**4,14**	**163**	310	310	1506	3476
67	8- 9-64	3-10	755	328	**3805**	**6,94**	**264,17**	**301**	**4,21**	**160**	313	313	1440	3447
72	5-10-64	30- 9	725	358	**3775**	**6,80**	**256,58**	**292**	**4,33**	**164**	296	296	1459	3297
81	17- 9-64	3-11	777	349	**3688**	**6,75**	**248,91**	**283**	**4,34**	**160**	282	282	1362	3191
78	22- 9-64	24-10	762	375	**3135**	**7,34**	**230,06**	**262**	**4,42**	**139**	292	292	1196	2995
70	30- 4-64	24- 9	877	331	**3462**	**6,63**	**229,49**	**261**	**4,11**	**142**	322	322	1352	2964
83	2-11-64	28-10	725	343	**3431**	**6,56**	**225,09**	**256**	**4,28**	**147**	288	288	1179	3085
82	11-10-64	9-10	728	346	**3130**	**7,09**	**222,06**	**253**	**4,46**	**140**	307	307	1095	3015
62	28- 9-64	29- 9	731	369	**3056**	**7,11**	**217,32**	**247**	**4,52**	**138**	317	317	1055	3004
61	20- 7-64	20- 9	792	382	**3022**	**6,90**	**208,65**	**237**	**4,28**	**129**	292	292	1087	2830
74	2-11-64	17-10	714	380	**2874**	**7,08**	**203,55**	**232**	**4,46**	**128**	299	299	983	2847
Gns. af 21 kvier			746	351	**3838**	**6,77**	**259,73**	**295**	**4,26**	**164**	304	304	1451	3331

s. 3224, på Enemærket.

Malketid i min.	Malkbarhedstal	Drægtigden	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,2	2,45	31- 5	20	ukendt	Ejner Christensen, Ore.
2,9	1,82	8-12	22	Fyns Lynggård, s. 2261	Ejner Them, Kragelund.
3,0	2,08	31-12	15	ukendt	Børge Sørensen, Såderup.
3,2	2,04	9-12	1	ukendt	Bror L. Hansen, Jullerup.
3,4	1,65	17-12	154	Årup Løkke, e.s. 123	Johs. Hansen, Melby.
2,8	2,02	7- 1	12	St. Hedegård 32, s. 1438	Arne Pedersen, Sdr. Højrup.
3,2	1,81	3- 1	29	Fyns Vix, e.s. 124	Gunnar Markvardsen, Revninge.
2,7	1,99	3-12	2	Nordfyns B.W., s. 2801	Børge Sørensen, Egense.
2,7	2,25	12-12	58	Klokker, s. 2847	Jørgen Thomsen, Stensby Mark.
2,8	2,16	26- 3	42	Fyns Lynggård, s. 2261	Chr. Iversen, Nordmarken, Søndersø.
3,2	1,92	2- 1	37	Fyns Vix, e.s. 124	Kr. K. Kristensen, Kragelund.
2,8	2,00	20-12	38	Basse Nørremark, s. 1832	Arne Pedersen, Sdr. Højrup.
3,5	1,81	24- 4	37	ukendt	Marius Lunding, Vormark.
3,8	1,58	7- 1	27	Nr. 60, IV, f. 31-12-58	Peder Poulsen, Ullerslev.
2,2	2,55	19- 6	117	Lars, s. 2359	Axel Rasmussen, Nr. Højrup.
2,4	2,38	9- 1	14	ukendt	Knud Nicolajsen, Nr. Højrup.
2,2	2,09	—	28	ukendt	Ejner Christensen, Ore.
3,0	2,07	6- 3	12	Prins Kærby, e.s. 106	Mogens Mogensen, Egense.
2,2	1,87	5-12	22	Fyns Lynggård, s. 2261	Ejner Them, Kragelund.
2,9	2,03				

s. 3390, på Ejstrupgård.

Malketid i min.	Malkbarhedstal	Drægtigden	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,1	1,12	28-12	64	Bo Vestfyn, e.s. 122	Brdr. Hansen, Kærbyholm.
3,6	1,80	9- 3	8	Vestfyns Wils, s. 2255	Anders Pilegaard, Lillemark.
6,0	0,90	3- 3	34	Årup Løkke, e.s. 123	Bertel Pedersen, Bro Skov.
2,9	2,20	17- 2	5	Holm Vestfyn, e.s. 88	Peder Jensen, Englyst, Vejlby.
2,6	2,30	13-12[1]	18	Holm Vestfyn, e.s. 88	A. P. Brønserud, Skrillinge Mark.
3,9	1,50	27-12	65	Årup Vestfyns Stig, s. 2719	Jens Bang Jensen, Håre.
5,2	1,11	25- 2	32	Nr. 1, Glimt, f. 23-2-58	Ejner Münster, Hesle.
3,8	1,52	22-11	29	Årup Vestfyns Stig, s. 2719	A. P. Brønserud, Skrillinge Mark.
2,7	2,32	18-11	31	Kattrup 101, s. 2839	A. Juul Hansen, Udby.
3,1	2,28	20- 3	42	Vestfyns Kay, s. 2439	Søren Ringberg Sørensen, Balslev.
3,3	1,53	16-12	61	Årup Vestfyns Jaffa, s. 3005	Karl E. Larsen, Kærby Mark.
2,2	2,58	6- 2	1	Vestfyns David, s. 2256	Dagny Kristensen, Toppelund.
2,8	2,18	28-11	88	Årup Løkke, e.s. 123	Dagny Kristensen, Toppelund.
6,0	1,00	14- 2	32	Sydvestfyns Hother, s. 2110	Svend Bærendsen, Langemose.
3,0	1,87	22-12	77	Årup Løkke, e.s. 123	Hans Clausen, Stauerby Stensgård.
3,6	1,33	28- 2	4	Bo Vestfyn, e.s. 122	Jørgen Simonsen, Kødstrup.
4,4	1,37	12- 4	125	Årup Boel, s. 1661	Alfred Andersen, Kærby.
2,4	2,17	20- 1	66	Årup Løkke, e.s. 123	Georg Andersen, Udby.
3,0	1,74	9- 3	76	Årup Løkke, e.s. 123	Julius Jensen, Ingslevgård.
2,6	1,89	16-11	38	Vestfyns David, s. 2256	Johs. Larsen, Aulby.
2,9	1,71	20- 1	26	Årup Wisti, s. 2437	Johs. Larsen, Kræmmerkrogen.
3,6	1,73				

[1] Kastet 19-7.

Hovedtabel 65. **Afkomsprøve for tyren Årup Vestfyns Boy,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
33	2- 9-64	27- 9	755	407	**5326**	**6,75**	**359,40**	**409**	**4,53**	**241**	312	312	2180	4157
35	8- 9-64	26- 9	748	438	**4071**	**7,46**	**303,51**	**346**	**4,61**	**188**	313	313	1682	3761
44	12-11-64	25- 9	682	402	**4376**	**6,55**	**286,68**	**326**	**4,20**	**184**	314	314	1592	3746
43	13- 9-64	14- 9	731	331	**4188**	**6,65**	**278,58**	**317**	**4,34**	**182**	325	325	1532	3649
39	18-10-64	7-11	750	375	**4041**	**6,79**	**274,48**	**312**	**4,14**	**167**	271	271	1563	3564
47	3- 8-64	27- 9	785	345	**3828**	**7,06**	**270,24**	**308**	**4,47**	**171**	312	312	1451	3441
31	27- 8-64	14-10	778	371	**3959**	**6,73**	**266,60**	**303**	**4,46**	**177**	295	295	1459	3426
48	12- 9-64	22- 9	740	345	**4178**	**6,34**	**265,09**	**301**	**4,38**	**183**	317	317	1482	3530
42	13- 8-64	4- 9	752	353	**4147**	**6,38**	**264,50**	**300**	**4,46**	**185**	335	335	1415	3628
34	11- 9-64	29- 9	748	382	**3438**	**7,37**	**253,33**	**289**	**4,35**	**150**	310	310	1293	3341
45	19- 9-64	21-10	762	377	**3750**	**6,67**	**250,19**	**284**	**4,34**	**163**	288	288	1371	3136
36	15- 8-64	2- 9	748	400	**3559**	**6,87**	**244,51**	**278**	**4,42**	**157**	324	324	1251	3334
38	1- 9-64	17-10	776	400	**4141**	**5,73**	**237,21**	**269**	**4,14**	**171**	292	292	1355	3385
32	16- 9-64	13- 9	727	396	**3617**	**6,48**	**234,34**	**266**	**4,37**	**158**	326	326	1248	3434
40	21-10-64	28- 9	707	398	**3642**	**6,24**	**227,32**	**258**	**4,29**	**156**	311	311	1201	3246
41	20- 9-64	10-10	750	377	**3131**	**6,91**	**216,46**	**246**	**4,67**	**146**	299	299	1074	3116
37	12- 7-64	1-11	842	403	**3198**	**6,54**	**209,23**	**238**	**4,35**	**139**	277	277	1074	2902
49	28- 7-64	29-10	823	323	**2933**	**6,56**	**192,31**	**219**	**4,34**	**127**	280	280	994	2840
46	18-11-64	26-10	707	369	**2724**	**6,77**	**184,47**	**210**	**4,33**	**118**	283	283	867	2711
Gns. af 19 kvier			753	379	**3802**	**6,67**	**253,60**	**288**	**4,38**	**166**	304	304	1373	3387

Hovedtabel 66. **Afkomsprøve for tyren Fyns Ib,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
31	29- 6-64	14- 9	807	290	**4640**	**6,62**	**307,07**	**349**	**4,33**	**201**	327	327	1724	3845
43	13- 7-64	5-11	845	288	**4670**	**6,00**	**279,97**	**317**	**4,06**	**190**	275	275	1691	3508
47	3- 4-64	29-10	939	324	**4304**	**6,34**	**272,81**	**310**	**4,40**	**189**	282	282	1586	3420
46	13-11-64	15-10	701	347	**4149**	**6,50**	**269,89**	**307**	**4,31**	**179**	296	296	1485	3523
49	2- 9-64	12-10	770	397	**4186**	**6,26**	**261,87**	**297**	**4,42**	**185**	299	299	1436	3435
32	10- 7-64	18- 9	800	296	**3696**	**6,99**	**258,31**	**294**	**4,64**	**172**	323	323	1352	3488
36	4-10-64	23- 9	719	321	**3873**	**6,47**	**250,67**	**285**	**4,51**	**175**	318	318	1315	3509
48[1]	21- 8-64	11- 9	751	350	**4067**	**6,14**	**249,65**	**283**	**4,24**	**172**	322	322	1359	3482
39	6- 7-64	4- 9	790	330	**3631**	**6,85**	**248,79**	**283**	**4,45**	**162**	337	337	1207	3408
50	12- 9-64	28-10	776	328	**3858**	**6,37**	**245,78**	**279**	**4,62**	**178**	283	283	1335	3199
45	21-11-64	27-10	705	311	**3656**	**6,70**	**244,86**	**278**	**4,33**	**158**	284	284	1295	3194
33	27-10-64	20-10	723	285	**3894**	**6,22**	**242,15**	**275**	**4,15**	**162**	291	291	1301	3339
41[1]	19- 4-64	12- 9	876	356	**3599**	**6,51**	**234,14**	**266**	**4,54**	**163**	328	328	1171	3271
37	1-11-64	27- 9	695	330	**3287**	**6,92**	**227,59**	**259**	**4,63**	**152**	314	314	1117	3241
38	5-11-64	8-10	702	330	**3296**	**6,84**	**225,52**	**256**	**4,33**	**143**	303	303	1102	3154
34	18-10-64	28- 9	710	342	**3308**	**6,69**	**221,38**	**252**	**4,46**	**148**	313	313	1124	3157
44	5- 9-64	30-10	785	360	**3126**	**7,03**	**219,70**	**250**	**4,58**	**143**	281	281	1095	3015
40	27- 2-64	5-10	951	340	**3493**	**6,21**	**216,94**	**246**	**4,32**	**151**	306	306	1077	3052
42	9-10-64	30-10	751	321	**3555**	**5,86**	**208,36**	**236**	**4,29**	**153**	281	281	1081	2878
35	19- 9-64	23- 9	734	302	**3451**	**5,98**	**206,25**	**234**	**4,17**	**144**	318	318	1119	3225
Gns. af 20 kvier			777	327	**3787**	**6,46**	**244,59**	**278**	**4,38**	**166**	304	304	1299	3317

[1] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

s. 3391, på Ejstrupgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,4	1,84	—[1]	72	Vestfyns Malm, s. 2257	Gudmund Kaag, Klinteløkke.
3,2	1,68	6- 2	26	Årup Løkke, e.s. 123	N. P. Lund Pedersen, Svendstrup M
2,8	2,30	10- 1	3	Holm Vestfyn, e.s. 88	Frede Madsen, Skovløkken.
2,6	2,25	29- 4	55	Årup Vestfyns Stig, s. 2719	Søren Ringberg Sørensen, Balslev.
4,5	1,52	2- 1	72	Nr. 50, f. 17-12-58	Ejner Østergaard, Røjle Skov.
3,0	1,91	4- 2	15	Vestfyns Als, s. 2438	Magnus Hansen, Kavslunde.
2,9	2,13	23- 2	54	Bo Vestfyn, e.s. 122	Emil Storm, Blankegård.
3,6	1,45	13-12	10	Jesper Jason, e.s. 114	K. Melby Larsen, Strandholm.
3,4	1,70	15-12	24	Årup Løkke, e.s. 123	Morten Rasmussen, Eskør.
2,7	2,02	3- 2	3	Vestfyns Kay, s. 2439	Keld Jensen, Skovløkken.
3,4	1,79	20- 1	54	Vestfyns David, s. 2256	Claus Bang, Husby.
2,6	2,08	29-11	64	Årup Løkke, e.s. 123	Kristian Andersen, Viby.
4,4	1,45	13-12	81	Bøg, s. 2206	V. Andersen, Vædelegård.
2,8[2]	2,02[2]	15-12	34	Årup Løkke, e.s. 123	Gunnar Madsen, Indslev.
2,4	2,43	9- 1	85	B. W. B., e.s. 125	V. Andersen, Vædelegård.
2,3	2,02	16-12	99	Årup Løkke, e.s. 123	Svend E. Pedersen, Blanke.
3,7	1,42	22- 5	95	Årup Løkke, e.s. 123	Johs. Pedersen, Eskør.
4,3	1,39	10- 1	84	Jesper Jason, e.s. 114	Carl Christensen, Båring.
3,5	1,42	28- 2	58	Eisbjerg, s. 2237	Johs. Henriksen, Dybkær, Røjle.
3,2	1,83				

[1] Brummer.
[2] Kun 1. måling.

s. 3242, på Grønhøjgård.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,2	1,92	18- 2	57	Hadsten Algir, s. 2545	Jørgen Thomsen, Stensby Mark.
5,2	1,35	6- 3	75	Basse Nørremark, s. 1832	Ejner Nielsen, Røjrup.
4,4	1,48	23- 2	15	Nordfyns B.W., s. 2801	Aage Larsen, Nørreby.
3,4	1,73	12- 1	43	Fyns Lynggård, s. 2261	Aage Rasmussen, Tårup.
3,3	1,89	20- 1	82	Nordfyns Man, s. 2001	Aage Larsen, Nørreby.
2,9	1,73	21- 1	18	Basse Nørremark, s. 1832	Svend B. Hansen, Søllinge.
2,7	2,01	25- 1	71	Prins Kærby, e.s. 106	Chr. Sørensen, Skovsbo Mølle.
3,1	1,81	1-12	31	Nordfyns Man, s. 2001	Svend Pedersen, Nislev.
4,6	1,20	20-12	40	Prins, s. 3212	Erling H. Hansen, Barrit.
3,3	1,90	8- 3	67	Årup Løkke, e.s. 123	Ove Øxenberg, Nørreby.
3,1	1,96	17- 1	34	Nordfyns Russ, e.s. 138	Verner Jensen, Uggerslev.
2,1	3,07	11- 1	35	Nr. 45, f. 1-2-51	Niels Hansen, Kikkenborg.
3,4	1,60	13-12	18	Fyns Vix, e.s. 124	Aksel Andersen, Egensø.
2,8	1,87	14-12	26	Nordfyns Russ, e.s. 138	Bent Jacobsen, Kosterslev.
3,3	1,74	20-12	17	Fyns Keri, s. 2113	Emil Pedersen, Ellinge.
2,1	2,47	13- 1	72	Bornholms Ras, e.s. 128	Frits Hansen, Bregnør.
3,1	1,81	20- 2	47	Prins Kærby, e.s. 106	Gunnar Markvardsen, Revninge.
2,9	1,87	22- 4	14	Max, e.s. 75	Aage Rasmussen, Tårup.
4,8	1,23	31-12	114	Nordfyns B.W., s. 2801	Axel Rasmussen, Nr. Højrup.
2,4	2,10	14-12	54	Esau, f. 20-11-53	Hans Knudsen, Martofte.
3,3	1,84				

Hovedtabel 67. **Afkomsprøve for tyren Hjørring Georg,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
169	19- 2-64	1-10	955	373	**4493**	**6,42**	**288,34**	**327**	**4,25**	**191**	307	307	1666	3477
158	12- 5-64	28- 9	869	359	**4184**	**6,70**	**280,46**	**319**	**4,76**	**199**	310	310	1565	3457
157	7- 8-64	26- 9	780	359	**3804**	**7,27**	**276,63**	**315**	**4,76**	**181**	312	312	1502	3414
168	16- 7-64	17-10	823	404	**3707**	**7,00**	**259,37**	**295**	**4,32**	**160**	291	291	1436	3094
161	18-10-64	8-10	720	364	**3724**	**6,90**	**256,80**	**292**	**4,47**	**167**	300	300	1377	3216
163	5-10 64	30-10	755	336	**3874**	**6,60**	**255,75**	**291**	**4,45**	**173**	278	278	1430	3054
153	10- 9-64	2- 9	722	357	**3650**	**6,88**	**251,20**	**286**	**4,54**	**166**	336	336	1346	3257
160	17- 3-64	2-10	929	407	**3530**	**7,04**	**248,38**	**283**	**4,52**	**160**	306	306	1334	3124
151	27- 3-64	11- 9	898	342	**3502**	**6,94**	**243,17**	**277**	**4,35**	**153**	327	327	1254	3164
154	18- 8-64	12- 9	755	371	**3516**	**6,89**	**242,27**	**276**	**4,44**	**156**	326	326	1235	3168
156	5- 6-64	16- 9	833	380	**3478**	**6,92**	**240,51**	**274**	**4,47**	**156**	322	322	1269	3202
155	10-10-64	19- 9	709	357	**3304**	**7,20**	**237,86**	**271**	**4,56**	**151**	319	319	1238	3130
162	25-10-64	18-10	723	380	**3627**	**6,53**	**236,82**	**269**	**4,30**	**156**	290	290	1278	2993
166	12- 9-64	3-11	782	368	**3517**	**6,66**	**234,39**	**266**	**4,47**	**157**	274	274	1271	2873
165	12- 9-64	27-10	775	314	**3807**	**6,09**	**232,01**	**263**	**4,29**	**163**	281	281	1301	2897
170	18-11-64	21-10	702	321	**3327**	**6,95**	**231,28**	**263**	**4,42**	**147**	287	287	1186	2834
164	31-10-64	24-10	723	367	**3081**	**7,14**	**219,95**	**250**	**4,60**	**142**	284	284	1127	2838
159	28- 3-64	13-10	929	377	**2950**	**7,43**	**219,18**	**250**	**4,56**	**135**	295	295	1068	2822
152	3- 9-64	16- 9	743	319	**2837**	**6,76**	**191,89**	**218**	**4,45**	**126**	322	322	910	2755
Gns. af 19 kvier			796	361	**3574**	**6,84**	**244,54**	**278**	**4,47**	**160**	304	304	1305	3093

Hovedtabel 68. **Afkomsprøve for tyren Lund,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
229	9-11-64	30-10	720	347	**4308**	**6,36**	**274,00**	**311**	**4,29**	**185**	295	295	1746	3563
220	28- 9-64	15- 9	717	366	**3977**	**6,72**	**267,37**	**304**	**4,24**	**169**	325	325	1549	3527
212	22- 8-64	17- 9	756	373	**4349**	**6,06**	**263,69**	**299**	**4,08**	**178**	338	338	1667	3681
211	16- 7-64	15-11	852	394	**4099**	**6,40**	**262,24**	**298**	**4,18**	**171**	279	279	1690	3432
217	22- 9-64	25- 9	733	385	**3600**	**7,21**	**259,50**	**295**	**4,48**	**161**	330	330	1516	3422
219	29- 8-64	20- 9	752	370	**4323**	**5,97**	**258,15**	**293**	**4,37**	**189**	335	335	1597	3700
218	13-10-64	16-10	733	358	**3928**	**6,52**	**256,01**	**291**	**4,11**	**161**	309	309	1490	3403
221	3- 9-64	15- 9	742	332	**3831**	**6,61**	**253,38**	**288**	**4,44**	**170**	325	325	1437	3396
227	2-10-64	30-10	758	360	**3570**	**6,97**	**248,94**	**283**	**4,27**	**153**	295	295	1454	3288
228	16-10-64	5-11	750	356	**3472**	**7,08**	**245,75**	**280**	**4,35**	**151**	289	289	1433	3150
215	17-11-64	21-10	703	368	**3534**	**6,92**	**244,41**	**278**	**4,35**	**154**	304	304	1426	3306
224	15-10-64	17-10	732	347	**3575**	**6,59**	**235,56**	**268**	**4,21**	**151**	308	308	1378	3227
222	14- 7-64	6- 9	784	345	**3308**	**6,73**	**222,74**	**253**	**4,37**	**145**	313	313	1281	3175
223	11- 8-64	13-11	824	370	**3655**	**6,03**	**220,35**	**250**	**4,14**	**151**	281	281	1349	3085
216	21-11-64	21-11	730	373	**3530**	**6,23**	**220,04**	**250**	**4,07**	**144**	273	273	1349	3074
226	20- 9-64	30-10	770	312	**3301**	**6,52**	**215,25**	**245**	**4,00**	**132**	295	295	1337	3158
214	4- 9-64	21-11	808	367	**3326**	**6,32**	**210,13**	**239**	**4,23**	**141**	273	273	1262	2975
225	24- 9-64	20-10	756	314	**3384**	**6,02**	**203,77**	**231**	**3,94**	**133**	305	305	1149	2965
Gns. af 18 kvier			757	358	**3726**	**6,50**	**242,29**	**275**	**4,23**	**158**	304	304	1450	3308

s. 3012, på Dybvad.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2,3	2,89	24- 2	44	Hjørring Hylle, s. 2621	Kr. Jensen, Laden, V. Linderup.
2,9	2,11	2- 1	43	Max Knægt, s. 1360	Ejner Houbak, Bjergby.
2,3	2,37	17- 2	39	Hjørring Frank, e.s. 135	Arnold Andersen, Mygdal.
2,8	2,32	—	75	Hans, e.s. 100	Frode Arentsen, V. Kærvej, Brl.
2,9	2,06	25- 1	22	Hjørring Alf, s. 2623	Henry Thomsen, Østervrå.
3,5	1,78	28- 1	30	Hans, e.s. 100	Jens Jørg. Arensbach, Sønderskov.
2,0	2,64	2- 1	40	Lasse 30, s. 1998	Niels Sørensen, Åsen, Bindslev.
3,0	2,02	28- 6	33	ukendt	Chr. Nielsen, Over Ugilt, Lørslev.
2,6	1,97	22-12	42	Hjørring Frank, e.s. 135	Kr. Larsen, Astrup.
2,6	2,00	26-12	32	Hjørring Wilmann, s. 2295	Gunnar Larsen, Ås Mark, Tårs.
2,3	2,44	17- 2	35	Hjørring Lynggård, s. 2446	Jens Nielsen, Borrisholt.
2,5	2,02	17- 1	56	Hjørring Plet, s. 2624	Johs. Thomsen, Voerså.
2,7	2,17	23- 1	46	Lasse 30, s. 1998	Poul Ottesen, Tolstrup.
2,6	2,30	20- 3	84	Lasse 30, s. 1998	Otto Larsen, Vidstrup.
3,1	2,10	15- 2	30	Hjørring Wilmann, s. 2295	Frede Houbak, Bjergby.
2,0	2,78	21- 6	64	Hans, e.s. 100	Ing. Sørensen, Holtet, Bindslev.
2,3	2,50	22- 2	34	Hjørring Alf, s. 2623	Henning Thomsen, Tolne.
1,7	3,00	6- 2	24	Brygger 36, s. 1858	Jens Sørensen, Bakken, Jerslev J.
1,8	2,57	27-12	38	Hjørring Hylle, s. 2621	Adolf Andersen, Sønderlev.
2,5	2,32				

s. 3382, på Kalø.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,2	1,54	23- 1	22	Lars, s. 2359	Erik Rasmussen, Tyrrestrup.
3,4	1,78	13-12	36	Lars, s. 2359	Marius Schneider, Gylling.
3,0	2,01	12- 4[1]	58	ukendt	Johs. Rasmussen, Smederup.
3,2	2,30	17- 3	52	Habil, s. 1688	Bent Nielsen, Svorbæk.
3,4	1,57	8-12[2]	91	Primus, s. 2841	Chr. Hansen, Snærild.
2,4	2,62	28-12	62	Lars, s. 2359	Johs. Rasmussen, Smederup.
2,6	2,37	28-12	81	Habil, s. 1688	Tage Andersen, Alrø.
2,8	2,05	10-12	36	Mos, s. 2222	Verner Sørensen, Mjesing.
2,5	2,34	10- 2	36	Habil, s. 1688	Martin Christoffersen, Højby.
3,9	1,53	4- 4	9	Ravn Balder, s. 1449	Frede Albrechtsen, Gylling.
3,0	1,90	4- 1	52	Mos, s. 2222	Villiam Jensen, Thorup.
3,2	1,83	31-12	14	Lars, s. 2359	Niels Jensen, Torrild.
2,4	2,24	23-11	19	Pan, s. 1489	Karl Møller, Hvilsted.
4,4	1,24	19- 1	58	Habil, s. 1688	Karl Møller, Hvilsted.
3,5	1,82	10- 2	5	Lars, s. 2359	Niels Jensen, Torrild.
2,9	2,07	13- 2	120	Kattrup Ægir, e.s. 85	Malling Landbrugsskole.
3,7	1,62	18- 1	20	Habil s. 1688	Fr. Christoffersen, Boulstrup.
2,4	2,47	28- 4	109	Manna, s. 1566	Malling Landbrugsskole.
3,2	1,96				

[1] Kastet 6-3 efter ins. 21-12.
[2] Kastet 16-3.

Hovedtabel 69. **Afkomsprøve for tyren Horsens Bak,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
104	5- 5-64	27-10	905	460	**5583**	**6,07**	**339,12**	**385**	**4,08**	**228**	296	296	2177	4106
91	15- 3-64	20- 9	919	390	**5451**	**6,22**	**339,03**	**385**	**4,17**	**227**	333	333	2083	4366
106	2- 9-64	30-10	788	370	**4178**	**7,38**	**308,32**	**351**	**4,38**	**183**	293	293	1860	3830
94	29-11-64	28- 9	668	370	**4709**	**6,31**	**297,00**	**337**	**4,15**	**195**	325	325	1782	4023
98	11-11-64	17-10	705	370	**4273**	**6,41**	**273,98**	**311**	**4,18**	**179**	306	306	1569	3731
103	23- 9-64	5-11	773	345	**4128**	**6,62**	**273,22**	**310**	**4,37**	**180**	287	287	1645	3702
97	30-10-64	15-10	715	344	**3709**	**7,07**	**262,06**	**298**	**4,46**	**165**	308	308	1422	3442
100	x-12-64	16-10	670	366	**3798**	**6,43**	**244,19**	**277**	**4,07**	**155**	307	307	1331	3407
99	10- 7-64	16-10	828	394	**4023**	**5,97**	**240,28**	**272**	**4,16**	**167**	307	307	1357	3376
95	x-10-64	30- 9	715	370	**3228**	**6,75**	**217,74**	**248**	**4,21**	**136**	317	317	1117	3372
93	20- 8-64	19- 9	760	400	**3185**	**6,77**	**215,71**	**245**	**4,47**	**142**	334	334	1076	3408
107	21- 9-64	3-11	773	380	**2865**	**7,37**	**211,24**	**241**	**4,59**	**131**	289	289	1053	3011
108	29- 8-64	2-11	795	362	**3045**	**6,40**	**194,86**	**221**	**4,33**	**132**	290	290	969	2903
105	2-10-64	6-11	765	400	**3252**	**5,94**	**193,03**	**219**	**4,30**	**140**	286	286	976	3071
96	20- 8-64	13-10	784	424	**3096**	**6,17**	**190,89**	**217**	**4,43**	**137**	310	310	970	3073
101	x- 8-64	31-10	807	352	**2838**	**6,66**	**188,89**	**215**	**4,39**	**125**	292	292	925	2842
92	30- 8-64	2-11	794	356	**1935**	**6,61**	**127,95**	**145**	**4,37**	**85**	290	290	609	2526
Gns. af 17 kvier			774	380	**3723**	**6,51**	**242,21**	**275**	**4,28**	**159**	304	304	1348	3423

Hovedtabel 70. **Afkomsprøve for tyren Primus Syd,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
139	23- 1-64	25- 9	976	393	**4413**	**6,91**	**305,02**	**347**	**4,01**	**177**	320	320	1690	3698
130	7- 3-64	8-11	976	421	**4553**	**6,30**	**286,80**	**326**	**4,16**	**189**	276	276	1728	3492
137	14-10-64	31- 8	686	396	**4669**	**6,14**	**286,45**	**325**	**4,11**	**192**	345	345	1660	3534
124	18- 8-64	3-10	776	335	**4354**	**6,45**	**280,86**	**319**	**4,21**	**183**	312	312	1608	3489
129	7- 3-64	24- 8	900	381	**4316**	**6,50**	**280,35**	**318**	**4,15**	**179**	352	352	1529	3613
136	13-10-64	21- 9	708	355	**4535**	**6,01**	**272,62**	**309**	**4,07**	**185**	324	324	1567	3498
128	31-12-64	18-10	656	318	**4186**	**6,13**	**256,44**	**291**	**4,04**	**169**	297	297	1500	3321
133	26- 2-64	29- 8	915	387	**4240**	**5,86**	**248,47**	**282**	**4,07**	**172**	347	347	1373	3453
123	10-10-64	28-10	748	325	**3651**	**6,59**	**240,46**	**273**	**4,26**	**156**	287	287	1304	3025
125	4- 3-65	8-11	614	295	**3560**	**6,33**	**225,41**	**256**	**4,23**	**151**	276	276	1251	2823
121	30- 9-64	29- 8	698	361	**3249**	**6,34**	**205,89**	**234**	**4,45**	**145**	347	347	1030	3088
127	23-10-64	2-11	740	278	**3527**	**5,66**	**199,79**	**226**	**4,00**	**141**	282	282	1062	2688
134	4- 5-64	13-10	892	331	**3097**	**6,42**	**198,69**	**226**	**4,21**	**131**	302	302	977	2880
138	5-11-64	26-11	751	382	**3187**	**6,22**	**198,30**	**225**	**4,01**	**128**	258	258	1063	2718
126	30- 1-65	2-11	641	304	**2883**	**6,61**	**190,69**	**217**	**4,17**	**120**	282	282	969	2601
132	24- 1-65	24-11	669	339	**1596**	**6,45**	**102,96**	**117**	**4,28**	**68**	260	260	483	1989
Gns. af 16 kvier			772	350	**3751**	**6,30**	**236,20**	**268**	**4,14**	**155**	304	304	1300	3119

s. 3180, på Østerhåb.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,0	1,90	25- 1	35	Råstgårds Esbern, s. 1729	Søren Bregendahl, Egebjerg.
4,2	1,66	7- 2	6	Prins Holm, e.s. 127	Anton Bech, Skævlund.
2,6	2,59	2- 1	49	Prins Holm, e.s. 127	Arne Daugaard, Eriknauer.
3,2	2,13	14- 1	28	Elkær, s. 2600	Niels Otto Munch, Nebel.
2,8	1,75	20- 1	76	Prins Holm, e.s. 127	Anders Østergaard, Gram.
3,8	1,69	18- 1	35	Prins Holm, e.s. 127	Vagn Stisen, Hesselballe.
3,5	1,69	15- 2	13	Egholm Knægt, s. 2068	Laurits Wendelbo, Ølsted.
3,0	2,05	2- 1	9	Oll, s. 2037	Henning Hougaard, Skjold.
3,8	1,62	21- 3	51	ukendt	Harald Balling, Lund.
2,2	2,04	17-12	5	Elkær, s. 2600	Holger Winther, Vesterby.
2,7	1,65	14- 1	95	King, s. 2083	Leo Munch, Serridslev.
3,9	1,36	30-12	50	Prins Holm, e.s. 127	Arne Daugaard, Eriknauer.
3,0	1,81	29-12	35	Prins Holm, e.s. 127	Niels Pedersen, Skovby.
2,5	2,05	28- 1	72	Horsens Pletto, s. 2864	Folmer Mortensen, Riis.
2,8	1,74	1- 4[1]	95	King, s. 2083	Leo Munch, Serridslev.
2,6	1,97	29-12	68	Horsens Milo, s. 2590	Egon Nielsen, Klakring.
1,8	1,95	20- 3	21	Horsens Pletto, s. 2864	Harald Sørensen, Spettrup.
3,1	1,86				

[1] Kastet efter ins. 17-12.

s. 3204, på Skølvad.

Malke-tid i min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,7	1,18	23-12	36	B.W.B., e.s. 125	Gunnar Elbæk, Brørup.
4,4	1,38	23- 2	44	B.W.B., e.s. 125	Ernst Lunderskov, Vamdrup.
2,8	2,13	—[1]	22	Granat, e.s. 126	Finn Andersen, Barsbøl.
2,6	2,41	4- 2	25	Bøg, s. 2206	Lars Vedstedsen, Roust.
2,8	1,77	6- 2	34	ukendt	Nikolaj Laugesen, Jels.
4,3	1,32	8- 6	62	Jul Garbo, e.s. 136	Johan Olsen, Maltbæk.
3,0	2,12	17- 5	85	Nr. 88	J. Elsted Hansen, Gredstedbro.
2,6	1,98	10- 1	21	ukendt	Ove Kristoffersen, Nr. Bjært.
3,9	1,48	6- 7	54	B.W.B., e.s. 125	Kr. Thomsen, Skonager.
3,8	1,53	25- 5	25	Jul Garbo, e.s. 136	Hans Johansen, Vrenderup.
3,0	1,65	28- 2	47	B.W.B., e.s. 125	Godtfred Kristiansen, Hjedding.
2,8	2,01	26- 1[2]	88	Bøg, s. 2206	Ejner Anthonius, Tanderup.
3,6	1,24	19-12	36	Bøg, s. 2206	Thomas Høst Vrå.
—[3]	—[3]	28- 1	70	B.W.B., e.s. 125	Holger Sørensen, Tirslund.
3,4	1,52	15- 4	29	Askov Syd, s. 3203	Hans Johansen, Vrenderup.
1,9	1,45	9- 3	22	Jul Garbo, e.s. 136	Jens E. Hansen, Eltang.
3,2	1,68				

[1] Brummer.
[2] Kastet 7-8.
[3] Håndmalket på grund af vorter.

Hovedtabel 71. **Afkomsprøve for tyren Åbenrå Vix,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e.
75	17-12-64	16-10	668	365	**4961**	**6,09**	**302,27**	**343**	**4,51**	**224**	301	301	1810	3870
61	27- 5-64	9- 9	835	380	**4078**	**7,13**	**290,95**	**331**	**4,64**	**189**	338	338	1517	3795
68	1- 9-64	18-10	777	354	**3727**	**7,16**	**267,02**	**304**	**4,46**	**166**	299	299	1373	3459
62	31- 3-64	4- 9	887	418	**3574**	**7,27**	**259,96**	**296**	**4,64**	**166**	343	343	1304	3680
69	19-11-64	16-10	696	332	**4166**	**6,19**	**257,81**	**293**	**4,28**	**178**	301	301	1402	3506
67	17- 4-64	1-11	928	377	**3892**	**6,56**	**255,47**	**290**	**4,50**	**175**	285	285	1376	3405
72	7-11-64	1-10	693	383	**3575**	**7,10**	**253,95**	**289**	**4,68**	**167**	316	316	1295	3542
79	25-10-64	8-10	713	336	**3661**	**6,70**	**245,41**	**279**	**4,46**	**163**	309	309	1255	3478
76	18- 7-64	9-10	813	365	**3412**	**7,02**	**239,40**	**272**	**4,81**	**164**	308	308	1153	3318
65	2- 8-64	2-10	791	342	**3572**	**6,54**	**233,58**	**265**	**4,55**	**163**	315	315	1190	3410
63	28- 4-64	18- 9	873	357	**3461**	**6,68**	**231,08**	**263**	**4,69**	**162**	280	329	1348	3518
70	15-10-64	5-11	751	326	**3208**	**7,06**	**226,43**	**258**	**4,49**	**144**	281	281	1091	3022
64	9-11-64	13-11	734	387	**3325**	**6,40**	**212,92**	**242**	**4,65**	**155**	273	273	1029	2942
71	8-12-64	19-11	711	312	**3201**	**6,35**	**203,16**	**231**	**4,44**	**142**	267	267	978	2791
77	31- 3-64	8- 9	891	429	**2767**	**7,17**	**198,44**	**226**	**4,89**	**135**	318	339	967	3252
78	16- 9-64	6-10	750	422	**2700**	**7,04**	**189,98**	**216**	**4,75**	**128**	311	311	890	2973
74	2-12-64	30-10	697	383	**2866**	**6,31**	**180,84**	**205**	**4,53**	**130**	287	287	899	2845
66	14-12-64	23-11	709	370	**2321**	**6,46**	**149,95**	**170**	**4,63**	**107**	263	263	662	2497
Gns.	af 18 kvier		773	369	**3470**	**6,72**	**233,26**	**265**	**4,58**	**159**	300	304	1196	3294

Hovedtabel 72. **Afkomsprøve for tyren Randers Knægt,**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I alt f. e
161	31- 8-64	26- 9	756	350	**4730**	**6,28**	**297,18**	**337**	**4,35**	**206**	318	318	1868	3736
168	14- 8-64	20- 9	767	345	**4255**	**6,57**	**279,35**	**317**	**4,55**	**194**	324	324	1717	3655
153	29- 8-64	7-10	769	361	**4322**	**6,36**	**274,91**	**312**	**4,25**	**184**	307	307	1731	3590
158	16- 3-64	9-10	937	347	**3981**	**6,57**	**261,47**	**297**	**4,46**	**178**	305	305	1555	3420
162	7-10-64	20- 9	713	312	**4005**	**6,19**	**247,92**	**281**	**4,16**	**167**	324	324	1454	3334
163	18- 9-64	10-10	752	348	**3896**	**6,32**	**246,25**	**280**	**4,20**	**164**	304	304	1518	3209
151	25- 9-64	15-10	750	353	**3770**	**6,52**	**245,74**	**279**	**4,15**	**156**	299	299	1415	3251
152	1- 9-64	16- 9	745	370	**3881**	**6,33**	**245,61**	**279**	**4,42**	**171**	317	317	1466	3333
159	31-12-64	27-10	665	345	**3858**	**6,32**	**243,78**	**277**	**4,48**	**173**	287	287	1511	3257
156	2- 9-64	22- 9	750	365	**3244**	**7,31**	**237,12**	**270**	**4,46**	**145**	322	322	1220	3062
169	10-10-64	24- 9	714	331	**3429**	**6,79**	**232,96**	**265**	**4,65**	**159**	320	320	1330	3307
155	23- 6-64	12- 9	811	385	**3474**	**6,61**	**229,67**	**261**	**4,38**	**152**	307	307	1315	3278
165	5-11-64	9-10	703	346	**3395**	**6,69**	**227,14**	**258**	**4,54**	**154**	305	305	1298	3139
164	26-12-64	7-11	681	338	**3436**	**6,57**	**225,76**	**257**	**4,25**	**146**	276	276	1321	2938
166	1- 8-64	17- 9	777	352	**3703**	**5,97**	**221,10**	**251**	**4,43**	**164**	327	327	1328	3235
154	27- 7-64	28-10	823	383	**3741**	**5,84**	**218,34**	**247**	**4,27**	**160**	286	286	1300	3158
160	9-11-64	2-11	723	334	**3376**	**6,23**	**210,42**	**239**	**4,32**	**146**	281	281	1201	2902
157	28- 4-64	29- 9	884	357	**3240**	**6,33**	**205,25**	**233**	**4,51**	**146**	315	315	1187	3063
170	1-11-64	22-11	751	368	**1967**	**6,50**	**127,81**	**145**	**4,40**	**87**	261	261	726	2263
167	11-10-64	1-10	720	399	**1429**	**7,42**	**106,05**	**121**	**4,42**	**63**	274	295	695	2279
Gns.	af 20 kvier		760	354	**3557**	**6,44**	**229,19**	**260**	**4,38**	**156**	303	304	1358	3170

. 3089, på Moesgård.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,1	2,31	—[1]	34	Åbenrå Løkke, s. 2407	L. P. Morthorst, Rødekro.
3,6	1,65	—	13	Plus, s. 1825	Jørgen Skou, Ø. Terp.
5,2	1,03	—[1]	9	Sydvestfyns Hother, s. 2110	Arne Hansen, Tyrstrup.
4,2	1,26	27-12	42	Åbenrå Prins, s. 2714	Hans Mikkelsen, Rise.
3,8	1,56	5- 6[2]	61	Åbenrå Løkke, s. 2407	Kaj Andersen, Egeløkke.
4,2	1,51	1- 5	3	Sydbo, s. 1211	Peter Asmussen, Aller.
4,8	1,10	27-12	29	Åbenrå Ægir, s. 2715	Arne Andersen, Travsted.
5,6	0,96	19-12	32	Åbenrå Ægir, s. 2715	Aage Christiansen, Sofiedal.
3,7	1,43	10- 1	19	Knold, s. 2212	Aksel Lind, Havremark.
3,3	1,63	27- 2	20	ukendt	Verner Jensen, Øbening.
3,6	1,53	5- 1	43	Åbenrå Løkke, s. 2407	Hans Mikkelsen, Rise.
4,3	1,35	22- 2	18	Åbenrå Løkke, s. 2407	Egon Hansen, Sæd.
6,3	0,79	15- 4	26	Åbenrå Løkke, s. 2407	Arne Andersen, Travsted.
4,6	1,34	6- 1	9	ukendt	Peter Jensen, Marstrup.
3,7	1,28	21-12	94	Åbenrå Løkke, s. 2407	Chr. Larsen, Kabdrup.
3,8	1,34	3- 2	35	Åbenrå Løkke, s. 2407	Frode Sørensen, Vojens Mark.
5,5	0,96	25- 3	43	ukendt	Ths. Prehn, Lunding.
3,7	1,34	26- 1	18	Åbenrå Løkke, s. 2407	H. P. Danielsen, Halk.
4,3	1,35				

[1] Brummer.
[2] Kastet 1-4 efter ins. 11-1.

. 3056, på Kalø.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,7	1,67	—	15	Sønck, s. 2898	Knud Grøndal, Valsgård, Mk.
4,4	1,43	29-12	41	Randers Baun, e.s. 131	Viggo Jacobsen, Lindbjerg.
3,1	1,99	31-12	5	ukendt	Ellen Ødum, Romalt.
3,0	1,85	22-12	29	ukendt	Sigurd Sørensen, Kåtrup.
3,7	1,61	29- 3	32	Randers Mo, s. 2598	Oskar Jacobsen, Ramten.
3,1	1,99	8- 3	56	Randers Mo, s. 2598	Anders Thomassen, Råsted Mk.
3,2	1,74	29- 3	88	Randers Garbo, s. 1839	Søren Møller, Ålsø.
3,6	1,54	3-12	103	Randers Baun, e.s. 131	Søren Møller, Ålsø.
3,8	1,76	7- 3	78	ukendt	Søren Nygaard, Stanghede.
2,9	1,73	26-12	69	Randers Masta, s. 2620	Svend Andersen, Stenvad.
2,7	2,10	14-12	34	Storm, s. 2704	Kr. Mikkelsen, Ølsvej, Hobro.
2,6	2,09	19-11	18	Randers Masta, s. 2620	Valdemar Jensen, Trustrup.
3,2	1,64	—	92	Lasse, e.s. 70	Kr. Nielsen, Lindholt, Randers.
3,8	1,56	6- 1	31	Randers Mo, s. 2598	Olav Svenningsen, Gjandrup.
3,9	1,35	23-12	36	Randers Baun, e.s. 131	Niels Borup, Bjerregrav.
2,8	2,21	31-12	10	Randers Baun, e.s. 131	Brdr. Laursen, Asferg.
3,4	1,68	9- 1	63	Bjerringbro Skov, s. 2831	Kristian J. Mougaard, Rogenstrup.
3,3	1,61	21- 1	157	Randers Garbo, s. 1839	Niels Borup, Bjerregrav.
3,9	1,27	5- 2	63	Randers Garbo, s. 1839	P. Mols Jensen, Lyngby Mk.
2,4	1,29	24-11	67	Randers Masta, s. 2620	Svend Jensen, Råsted.
3,3	1,71				

Hovedtabel 73. **Afkomsprøve for tyren Dybbøl Han**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I al f. e
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
66	8- 9-64	24- 9	746	382	**4785**	**6,30**	**301,22**	**342**	**4,12**	**197**	317	317	1655	372
67	9- 6-64	21- 9	834	404	**4397**	**6,33**	**278,31**	**316**	**4,38**	**193**	320	320	1417	355
70	13- 9-64	5- 9	722	377	**4358**	**6,22**	**270,89**	**307**	**4,23**	**184**	336	336	1343	364
68	14- 6-64	10-10	848	386	**3579**	**7,23**	**258,61**	**294**	**4,36**	**156**	301	301	1256	340
69	1-10-64	17-10	746	415	**3679**	**6,88**	**253,22**	**288**	**4,40**	**162**	293	293	1239	328
62	1-11-64	15-10	713	379	**3817**	**6,62**	**252,56**	**287**	**4,32**	**165**	296	296	1241	327
64	7- 2-64	16- 9	952	394	**4240**	**5,89**	**249,87**	**283**	**4,19**	**177**	325	325	1224	338
74	21- 9-64	14-10	753	361	**4137**	**5,86**	**242,29**	**275**	**4,20**	**174**	297	297	1199	323
65	24- 8-64	30- 9	767	384	**3862**	**6,25**	**241,41**	**274**	**4,13**	**159**	311	311	1160	315
76	27- 7-64	9-11	835	356	**4156**	**5,76**	**239,24**	**271**	**3,82**	**159**	271	271	1257	315
75	27-10-64	26-10	729	375	**3680**	**6,27**	**230,78**	**262**	**4,18**	**154**	285	285	1097	305
77	10- 3-64	23- 9	927	332	**3827**	**5,97**	**228,40**	**259**	**4,08**	**156**	296	296	1181	313
73	12- 9-64	18- 9	736	357	**3772**	**5,91**	**222,84**	**253**	**4,02**	**152**	323	323	1155	322
61	16- 9-64	26- 8	709	385	**3816**	**5,74**	**218,90**	**248**	**4,11**	**157**	324	345	1144	340
78	23-10-64	12-11	750	349	**3484**	**6,05**	**210,67**	**239**	**4,22**	**147**	268	268	991	278
63	8-10-64	14-10	736	405	**3111**	**5,54**	**172,39**	**195**	**4,15**	**129**	297	297	819	268
79	6-12-64	21-10	684	355	**2669**	**6,45**	**172,10**	**195**	**4,19**	**112**	290	290	708	254
80	3-10-64	14- 9	711	352	**2545**	**6,29**	**160,01**	**182**	**4,35**	**111**	319	319	712	268
72[1]	1- 6-64	27-10	878	435	**2056**	**6,18**	**127,00**	**144**	**4,29**	**88**	284	284	546	227
Gns. af 19 kvier			778	378	**3683**	**6,19**	**227,93**	**259**	**4,19**	**154**	303	304	1123	313

[1] Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 74. **Afkomsprøve for tyren Morsø Bæl**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I al f. e
					Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden									
64	8-10-64	26-10	748	376	**4363**	**6,70**	**292,44**	**332**	**4,40**	**192**	295	295	1726	375
63	14- 7-64	11-10	819	384	**4392**	**6,34**	**278,64**	**316**	**4,29**	**189**	310	310	1511	348
68	14- 7-64	5-10	813	365	**3973**	**6,77**	**268,83**	**306**	**4,15**	**165**	316	316	1492	357
77	29- 6-64	10-10	833	369	**3507**	**7,42**	**260,17**	**296**	**4,44**	**156**	311	311	1291	328
71	24-10-64	8-10	714	383	**3957**	**6,46**	**255,58**	**290**	**4,26**	**169**	309	309	1357	339
70	7-10-64	26-10	749	364	**3902**	**6,50**	**253,57**	**288**	**4,22**	**165**	295	295	1346	331
80	24-11-64	30-10	705	316	**3718**	**6,78**	**252,06**	**287**	**4,06**	**151**	291	291	1363	328
79	4-11-64	13-11	739	335	**3471**	**7,06**	**245,13**	**279**	**4,15**	**144**	277	277	1224	312
74	21- 9-64	4-10	743	388	**3602**	**6,64**	**239,04**	**272**	**4,27**	**154**	313	313	1182	332
75	18-11-64	3-11	715	356	**3622**	**6,48**	**234,60**	**266**	**4,08**	**148**	287	287	1239	325
67	24- 5-64	13-10	872	419	**3211**	**7,26**	**233,14**	**265**	**4,25**	**136**	308	308	1070	312
76	25- 9-64	9-10	744	354	**3068**	**7,37**	**226,15**	**258**	**4,45**	**136**	312	312	1012	296
65	11-10-64	30-10	749	380	**3112**	**6,82**	**212,36**	**242**	**4,32**	**134**	291	291	995	295
78	10- 9-64	19-10	769	340	**3344**	**6,21**	**207,53**	**235**	**4,32**	**144**	298	298	959	302
61	2-10-64	26- 9	724	387	**3108**	**6,26**	**194,49**	**221**	**4,28**	**133**	321	321	874	295
73	23- 7-64	28- 9	797	385	**2807**	**6,85**	**192,38**	**219**	**4,33**	**122**	323	323	887	297
62	1- 9-64	2-11	792	395	**2382**	**6,88**	**163,85**	**186**	**4,42**	**105**	288	288	668	248
66[1]	29- 7-64	21-10	814	435	**2437**	**6,45**	**157,11**	**178**	**4,36**	**106**	300	300	659	255
69	10-10-64	28- 9	718	419	**2180**	**7,00**	**152,60**	**174**	**4,34**	**95**	323	323	676	267
72	22- 4-64	10-10	901	408	**2065**	**6,68**	**137,99**	**157**	**4,53**	**93**	311	311	548	251
Gns. af 20 kvier			773	378	**3311**	**6,73**	**222,88**	**253**	**4,28**	**142**	304	304	1104	310

[1] Trepattet efter yverbetændelse.

3376, på Veesbæk.

alke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2,0	3,16	—[1]	29	Als Ægir, e.s. 133	Evald Hansen, Broballemark.
2,6	2,21	2- 1	3	Kærbyholm 42, e.s. 97	Hans Chr. Brink, Hestehave.
2,4	2,22	16-12	50	Dybbøl Munk, s. 2812	Chr. Hansen, Sarupskov.
3,2	1,67	12- 1	9	Dybbøl Prins, s. 2712	Peter Mathiesen, Brandsbøl.
2,4	2,25	10-12	51	Als Ægir, e.s. 133	Andr. Petersen, Gejlå.
2,0	2,73	—[1]	13	Als Ægir, e.s. 133	Heinrich Grethe, Tovrup.
2,1	2,69	1- 2	31	William, s. 1826	P. Laue Petersen, Tovrup.
3,4	1,86	12- 1	17	Jersey Dreamer, s. 1054	Andreas Skovmand, Mommark.
2,0	2,64	30- 1	34	William, s. 1826	Andr. Petersen, Gejlå.
2,8	2,39	19- 1	14	ukendt	Jørgen Thordsen, Pindesholm.
3,0	1,85	7- 1	23	Als Ægir, e.s. 133	Thøger Krogh, Holmskov.
2,7	2,10	23-11	6	ukendt	Erik Lehmann, Svenstrup.
2,0	2,61	—	26	Åbenrå Abilddreng, s. 1500	Hans Clausen, Begyndt.
1,9	2,84	7-12	72	William, s. 1826	Johs. Volf, Svenstrup.
2,8	2,18	7- 1	65	Dybbøl Plet, s. 2871	Hans Møller, Mommark.
1,9	2,79	19-12	52	Dybbøl Plet, s. 2871	Andr. Petersen, Gejlå.
2,3	2,09	16- 3	40	Dybbøl Munk, s. 2812	Holger Sørensen, Hokkerup.
1,7	2,29	5-12	29	Dybbøl Prins, s. 2712	Nicolaj Thomhave, Thomhavegård.
2,3	1,68	30- 1	18	Dybbøl Prins, s. 2712	Poul Cordes, Tvingholm.
2,4	2,33				

[1] Brummer.

3389, på Morsø.

Malke-tid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,6	1,81	5- 2	8	Prins Nørremark, e.s. 120	Gunnar Boll, Bjergby.
4,4	1,47	—	61	Taj, s. 2557	Niels Ramsgaard, Tingstrup.
2,4	2,45	22- 2	64	Morsø Blach, s. 2660	Henry Jensen, Solbjerg.
3,1	1,84	—	29	Prins Nørremark, e.s. 120	Knud Poulsen, Tøving.
3,6	1,62	17-12	60	Morsø Lasse, s. 1854	Arne Jensen, Outrup.
2,9	2,09	20- 6	94	Morsø Blach, s. 2660	Josef Larsen, Erslev.
2,2	2,51	29- 4	32	Morsø Bremer, s. 2661	Sv. Thøgersen, Bjergby.
2,6	2,52	31- 1	82	Prins Nørremark, e.s. 120	Karl S. Jensen, Tødsø.
2,5	2,33	20-12	23	Morsø Blach, s. 2660	Michal Poulsen, Solbjerg.
4,5	1,32	5- 1	66	Morsø Blach, s. 2660	Henry Jensen, Solbjerg.
2,2	2,46	2- 1	55	Prins Nørremark, e.s. 120	Kr. Bundgaard, Tøving.
2,6	1,98	—	32	Morsø Bremer, s. 2661	Karl Pedersen, Ø. Jølby.
3,2	1,69	6- 1	65	Morsø Blach, s. 2660	Henry Jensen, Solbjerg.
2,8	1,88	20-12	26	Taj, s. 2557	Kr. Skammelsen, Skyum.
2,1	2,20	20-12	20	Prins Nørremark, e.s. 120	Sv. Thøgersen, Bjergby.
2,4	1,97	18- 1	36	Morsø Blach, s. 2660	Kr. K. Pedersen, Outrup.
2,1	2,16	8- 3	47	Prins Nørremark, e.s. 120	Kr. Østergaard Olsen, Erslev.
2,6	1,40	24-12	21	Morsø Lasse, s. 1854	Poul Bundgaard, Flade.
2,8	1,58	22-12	52	ukendt	Hans Mortensen, Fur.
2,1	1,70	28- 1	85	Morsø Blach, s. 2660	Arne Jensen, Outrup.
2,8	1,95				

Hovedtabel 75. **Afkomsprøve for tyren Århus Ma**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I a f.
73	12- 7-64	30-10	840	381	**4267**	**6,33**	**270,09**	**307**	**4,22**	**180**	284	284	1674	34
75	9- 9-64	11- 9	732	362	**3854**	**6,70**	**258,19**	**294**	**4,56**	**176**	333	333	1425	33
79	9-12-64	13-10	673	339	**3796**	**6,62**	**251,35**	**286**	**4,53**	**172**	301	301	1457	32
78	16-10-64	30- 9	714	342	**3474**	**7,03**	**244,37**	**278**	**4,45**	**155**	314	314	1335	32
62	18- 9-64	17-11	790	377	**3533**	**6,88**	**243,07**	**276**	**4,52**	**160**	266	266	1453	31
76	8- 6-64	21- 9	835	357	**3513**	**6,81**	**239,24**	**272**	**4,43**	**156**	323	323	1316	32
67	7- 8-64	18- 9	772	364	**3540**	**6,61**	**234,15**	**266**	**4,33**	**153**	326	326	1280	32
72	21- 9-64	11- 9	720	396	**3309**	**7,00**	**231,51**	**263**	**4,42**	**146**	333	333	1239	32
61	25- 8-64	21-10	787	438	**3426**	**6,64**	**227,52**	**259**	**4,56**	**156**	293	293	1310	30
69	19- 9-64	6-10	747	341	**3534**	**6,43**	**227,11**	**258**	**4,41**	**156**	308	308	1254	31
80	20-11-64	1-10	680	327	**3224**	**6,78**	**218,52**	**248**	**4,42**	**143**	313	313	1149	29
64	17- 9-64	12-10	755	372	**3247**	**6,73**	**218,49**	**248**	**4,62**	**150**	298	298	1190	30
77	19- 9-64	28- 9	739	337	**3304**	**6,40**	**211,33**	**240**	**4,34**	**143**	316	316	1129	30
70	7- 9-64	7- 9	730	321	**3143**	**6,55**	**205,72**	**234**	**4,44**	**140**	326	326	1047	30
65	22-10-64	22-10	730	351	**2806**	**6,80**	**190,69**	**217**	**4,60**	**129**	292	292	954	28
71	23- 9-64	28-10	765	325	**2906**	**6,33**	**183,98**	**209**	**4,27**	**124**	286	286	976	27
66	17- 9-64	20-10	763	340	**2618**	**6,60**	**172,75**	**196**	**4,42**	**116**	294	294	873	27
81	6-10-64	28-10	752	310	**2446**	**6,87**	**167,94**	**191**	**4,55**	**111**	286	286	796	25
74	23- 9-64	19-10	756	402	**2408**	**6,84**	**164,81**	**187**	**4,60**	**111**	295	295	788	26
68	10- 6-64	21-10	863	354	**2211**	**6,99**	**154,48**	**176**	**4,69**	**104**	293	293	696	24
Gns. af 20 kvier			757	357	**3228**	**6,68**	**215,77**	**245**	**4,46**	**144**	304	304	1167	302

Hovedtabel 76. **Afkomsprøve for tyren Sydvestfyns Ca**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1966	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I al f. e
11	6- 9-64	12-10	766	296	**4293**	**6,76**	**290,37**	**330**	**4,10**	**176**	297	297	1655	373
3	9- 9-64	8- 9	729	368	**3804**	**7,01**	**266,73**	**304**	**4,38**	**167**	331	331	1402	360
17	25-10-64	11-10	716	368	**3401**	**7,64**	**259,77**	**296**	**4,29**	**146**	298	298	1335	322
15	20- 3-64	15- 9	909	418	**3830**	**6,68**	**255,82**	**291**	**4,38**	**168**	324	324	1339	345
18	19-11-64	9-10	689	352	**3771**	**6,56**	**247,20**	**281**	**4,11**	**155**	294	294	1333	325
8	25- 3-64	25- 9	914	364	**3401**	**7,03**	**239,26**	**272**	**4,61**	**157**	314	314	1204	326
2	19- 8-64	10- 9	752	405	**3576**	**6,69**	**239,21**	**272**	**4,32**	**155**	329	329	1167	326
13	8-10-64	30- 9	722	336	**3284**	**6,78**	**222,73**	**253**	**4,17**	**137**	309	309	1091	310
19	3- 8-64	10- 9	768	325	**3362**	**6,47**	**217,58**	**247**	**4,21**	**142**	329	329	1051	322
4	13-11-64	3-10	689	359	**3082**	**6,59**	**203,08**	**231**	**4,21**	**130**	306	306	988	307
12	10-12-64	18-10	677	376	**2935**	**6,83**	**200,60**	**228**	**4,32**	**127**	291	291	967	276
1	3- 1-64	20- 9	991	444	**3073**	**6,53**	**200,57**	**228**	**4,09**	**126**	319	319	999	308
5	8- 9-64	21-10	773	400	**2995**	**6,35**	**190,14**	**216**	**4,13**	**124**	288	288	943	287
10	9- 9-64	9- 9	730	348	**2706**	**6,97**	**188,70**	**215**	**4,44**	**120**	330	330	868	289
14	7-12-64	6-11	699	385	**2637**	**6,85**	**180,71**	**206**	**4,37**	**115**	272	272	857	253
9	10-11-64	25- 9	684	358	**2610**	**6,50**	**169,72**	**193**	**4,52**	**118**	314	314	772	279
7	12-12-64	6-11	694	341	**2167**	**7,32**	**158,63**	**181**	**4,54**	**98**	272	272	722	250
6	13-12-64	2-11	689	352	**1926**	**6,95**	**133,85**	**152**	**4,52**	**87**	276	276	614	240
20	20- 2-65	20-10	607	335	**1371**	**7,06**	**96,85**	**110**	**4,33**	**59**	289	289	515	211
Gns. af 19 kvier			747	365	**3064**	**6,80**	**208,50**	**237**	**4,30**	**132**	304	304	1043	300

3381, på Elkjær.

lke-id in.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
,8	2,64	18- 1	5	ukendt	R. J. Sørensen, Framlev.
,2	2,75	29- 4	103	Århus Baun, s. 1873	T. Skeel, Femmøller.
,5	1,83	26- 4	42	Århus Baun, s. 1873	G. Holme Villadsen, Elev.
,1	1,34	16- 6	43	Skjern Ægir, s. 2592	Jakob Jensen, Todbjerg.
,8	1,70	15- 3	38	ukendt	Marinus Bonde, Tirstrup.
,1	1,13	—[1]	30	Århus Baun, s. 1873	Frank Jacobsen, Klank.
,6	2,04	31-12	33	ukendt	Ejlif Thomsen, Frelling.
,4	2,16	11- 1	2	ukendt	Aage Jensen, Thorup Mark.
,2	1,76	22-12	11	Max Vestfyn, s. 1542	N. Lykke Sørensen, Dejret.
,0	1,93	16- 1	46	Århus Heg, s. 2959	Kr. Andersen, Mårslet.
,0	1,71	31- 3	42	Århus Baun, s. 1873	Aage Føns, Storring.
,3	2,32	10-12	39	Århus Drot, s. 2239	Svend Møller, Egå.
,2	1,49	15- 4	38	Århus Lyng, s. 2755	Frank Jacobsen, Klank.
,8	1,82	3-12	74	Århus Baun, s. 1873	William Lemming, Svejstrup.
,6	1,46	22-12	30	Århus Drot, s. 2239	N. Lykke Sørensen, Dejret.
,5	2,24	13- 2	27	Århus Baun, s. 1873	Frank Jacobsen, Klank.
,4	2,00	27-12	18	Århus Baun, s. 1873	Eigil Kusk, Stjær.
,0	2,48	25- 2	90	Pan II, f. 11-2-53	Laur. Sørensen, Smouen.
,6	1,71	22-12	71	Århus Drot, s. 2239	G. Holme Villadsen, Elev.
,0	1,98	9- 3	31	Århus Baun, s. 1873	Jochum Jochumsen, Hvilsted.
,9	1,92				

[1] Børbetændelse.

3396, på Ejstrupgård.

lke-id in.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
,4	1,46	31-12	8	Sydvestfyns Hother, s. 2110	Knud Svanholm, Sandager.
,6	2,19	5- 1	37	Sydvestfyns Plet, s. 2586	Poul Rasmussen, Nr. Broby.
,9	1,85	—[1]	29	Årup Løkke, e.s. 123	B. Vestergaard Hansen, Verninge.
,9	1,96	23- 2	89	Sydvestfyns Gry, s. 2109	Aksel Knudsen, Ørsted Damgård.
,9	2,28	6-12	5	Sydvestfyns Plet, s. 2586	J. H. Ingerslev, Voldbakke.
,7	1,11	13- 3	97	Sydvestfyns Hother, s. 2110	Karl Andersen, Mullerødgård.
,1	2,37	11- 3	49	Abildmads, e.s. 102	Svend Andersen, Skallebjerg.
,2	1,61	3- 3	18	ukendt	Axel Andersen, Frøbjerg, Rørmosehus.
,4	2,21	24-12	28	Sydvestfyns Plet, s. 2586	Svend Madsen, Vittinge, Nr. Broby.
,8	1,73	21- 1	16	Sydvestfyns Sand, s. 2254	Axel Andersen, Frøbjerg, Rørmosehus.
,8	1,77	13- 5	17	Sydvestfyns Plet, s. 2586	Peder Lauritsen, Sønderby, Ebberup.
,7	1,55	21- 1	47	Årup Løkke, e.s. 123	Kaj Rasmussen, Nårup.
,7	1,48	31-12	15	Sydvestfyns Hother, s. 2110	Anders K. Jørgensen, Knarreborg.
,5	1,71	14-12	4	Nr. 18, Vix, f. 20-12-56	Kristian Hansen, Verninge Sydmark.
,4	2,00	13- 3	57	Abild 15, e.s. 105	Johs. Hansen, Allested.
,7	1,65	1- 3	38	Sydvestfyns Plet, s. 2586	Carl Hansen, Skovkrogen.
,4	1,89	—	20	Sydvestfyns Plet, s. 2586	Harald Christensen, Nørremarken.
,6	2,37	4- 2	50	Abild 15, e.s. 105	Anker Christensen, Brylle.
,7	1,77	14-12	6	ukendt	Laurits Hansen, Brunsmose.
,8	1,84				

[1] Brummer.

Hovedtabel 77. **Afkomsprøve for tyren Randers Ju**

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1965	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden: Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Malkedage	Foderdage	Kraftfoder f. e.	I a f.
186	17- 7-64	3- 9	778	351	**4296**	**5,97**	**256,35**	**291**	**4,03**	**173**	323	323	1445	35
198	2-10-64	27- 9	725	319	**3874**	**6,30**	**243,89**	**277**	**4,45**	**172**	314	314	1486	33
184	7- 6-64	30- 9	845	340	**3961**	**5,78**	**228,78**	**259**	**4,13**	**164**	311	311	1402	33
188	11- 7-64	12- 9	793	349	**3751**	**5,93**	**222,51**	**252**	**4,22**	**158**	314	314	1313	32
200	12- 9-64	17- 9	735	322	**3385**	**6,27**	**212,26**	**241**	**4,21**	**143**	316	316	1215	31
195	8- 9-64	28- 9	750	352	**3222**	**6,53**	**210,35**	**239**	**4,36**	**141**	312	312	1200	31
189	14- 5-64	13-10	882	358	**3404**	**6,16**	**209,71**	**238**	**3,95**	**135**	298	298	1259	30
192[1]	26-10-64	17-10	721	360	**3377**	**6,18**	**208,73**	**237**	**4,35**	**147**	294	294	1232	30
191	2- 6-64	11- 9	831	385	**3403**	**6,13**	**208,68**	**237**	**4,36**	**148**	330	330	1388	33
183	3- 9-64	28- 9	755	353	**3186**	**6,18**	**196,99**	**224**	**4,39**	**140**	313	313	1099	30
187	26-10-64	2-11	737	360	**3093**	**6,35**	**196,42**	**223**	**4,22**	**131**	278	278	1121	29
181	16- 9-64	14- 9	728	360	**3080**	**6,31**	**194,41**	**221**	**4,11**	**127**	326	326	1288	31
190	17-10-64	9- 9	692	355	**3233**	**5,99**	**193,78**	**220**	**4,13**	**134**	317	317	1138	31
196	8-11-64	7-10	698	326	**3182**	**5,98**	**190,44**	**216**	**4,04**	**128**	304	304	1097	28
201	25- 9-64	14-11	780	404	**2759**	**6,44**	**177,71**	**202**	**4,32**	**119**	266	266	969	26
182	3- 9-64	26- 9	753	362	**2780**	**6,29**	**174,73**	**198**	**4,33**	**120**	300	300	967	28
199	25- 9-64	3-11	769	339	**2921**	**5,94**	**173,44**	**197**	**4,21**	**123**	277	277	982	27
193	26-12-64	23-10	666	400	**2225**	**7,17**	**159,44**	**182**	**4,62**	**103**	288	288	848	26
185	14-10-64	19-10	735	350	**2496**	**6,10**	**152,25**	**173**	**4,16**	**104**	292	292	837	25
Gns. af 19 kvier			756	355	**3244**	**6,18**	**200,57**	**228**	**4,23**	**137**	304	304	1173	30

[1] Venstre forpatte uden kanal.

3371, på Kalø.

ike-tid nin.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
,8	3,31	30-11	59	Randers Baun, e.s. 131	Jacob Tegen, Harridslev.
,4	1,29	26-12	55	Randers Masta, s. 2620	Anders Thomassen, Råsted Mk.
,4	2,43	21-12	7	Randers Mo, s. 2598	Frede K. Jensen, Halling.
,8	1,92	28-11	23	Randers Baun, e.s. 131	Karl Friis, Kastbjerg Mk.
,4	2,11	6-12	30	Randers Masta, s. 2620	Knud Overvad, Kærby.
,5	2,12	9-12	52	Randers Mo, s. 2598	Ejner Jensen, Ørum.
,3	2,61	25- 2	50	Randers Ægir, s. 2429	Svend Andersen, Stenvad.
,0	1,50	16-12	83	Randers Baun, e.s. 131	Olaf Kaag, Skindbjerg.
,7	1,89	23-12	35	Randers Baun, e.s. 131	Niels Borup, Bjerregrav.
,4	2,15	19-12	24	Randers Baun, e.s. 131	Ejner Molbo, Grensten.
,8	2,06	19- 1	84	Randers Mo, s. 2598	Hans Winther, Tånum.
,7	1,81	9-12	79	Randers Masta, s. 2620	Ib Asmark Jensen, Gerlev J.
,7	1,77	26-11	71	Randers Masta, s. 2620	Svend Jensen, Råsted.
,8	1,94	17- 3	30	ukendt	Jes Hansen, Hammelev Mk.
,3	1,65	—	32	Bjerringbro Toft, s. 2487	Peter Mougaard, Batum.
,8	1,82	30-11	24	Randers Baun, e.s. 131	Ejner Molbo, Grensten.
,3	2,46	31-12	26	Randers Masta, s. 2620	Ejner Molbo, Grensten.
,4	1,97	26-12	67	Prins Nørremark, e.s. 120	Søren Nygaard, Stanghede.
,6	1,87	15- 2	49	Randers Masta, s. 2620	Thorvald Molbo, Grensten.
,7	2,04				

Oversigt over

1. Rød Dansk Malkerace.

	Reg./stbg.	Født	Alder 15/8-67 år	mdr.
Dybvadgård, Dybvad:				
Hjørring Vagn	28356	14-10-61	5	10
Hjørring Nørreby	28615	23- 2-62	5	6
Morsø, Nykøbing M.:				
Morsø Munk	28806	10-10-62	4	10
Lundgård, Overlade:				
Ålborg Nor	28374	4- 4-62	5	4
Krarup Nygård, Skive:				
Skive Sten	28376	4- 5-62	5	3
Lægård, Holstebro:				
Fåborg Moss	28761	18- 2-63	4	6
Rosenfeldt, Ulstrup:				
Bjerringbro Munk	28585	24- 9-62	4	11
Kalø Hovedgård, Rønde:				
Sortkær	28824	7-11-62	4	9
Djurs Bitz	28748	27-12-62	4	8
Hammel Ideal	28321	25-11-60	6	9
Elkjær, Hornslet:				
Århus Gorm	28441	28- 5-62	5	3
Moesgård, Kibæk:				
Herning Munk	28630	25-10-62	4	10
Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:				
Skærup Ørnkær	28818	15-10-62	4	10
Vardegård, Varde:				
Varde Wano	28649	20-11-62	4	9
Varde Bram	28713	3- 6-63	4	2
Gelballegård, Lunderskov:				
Kolding Eg	28812	24- 2-63	4	6
Skølvad, Gørding:				
Ribe Ås	28650	6- 1-63	4	7
Brøstrupgård, Rødding:				
Åbenrå Sortemose	28743	12- 2-63	4	6
Veesbæk, Sønderborg:				
Dybbøl Od	28740	18- 2-63	4	6
Dybbøl Rhin		17- 1-63	4	7

afkomsprøverne 1967–68.

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Vagn Bundgaard, Bjergby	Hjørring No	Kvf. for Hjørring Amt
Ejler Iversen, Skamby	Nordfyns Frem	Kvf. for Hjørring Amt
Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Munk 26	Morsø Kvf.
Thomas Sørensen, Hinnerup	Hadsten Wahl	Kvf. for Ålborg Amt
Lars Bruun, Gudme	Horsens Leif	Skiveegnens Kvf.
Kr. Odgaard, Lødderup	Morsø Ejlekær	Fåborg-Midtfyns Kvf.
N. Kr. Kristiansen, Højvang	Hjørring Munkdrup	Bjerringbroegnens Kvf.
Rob. Bak Nielsen, Frøslev, M.	Sortemose	Hadstenegnens Kvf.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård	Ålborg Bitz	Kvf. Østjyden
Bent H. Nielsen, Nørremosegård	Rudme Ideal	Kvf. Midtjyden
Hans Hundevad, Starup	Hadsten Wahl	Kvf. Østjyden
Oskar Nielsen, Præstbro	Hjørring Munkdrup	Hammerum Herreds Kvf.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Morsø Ejlekær	Vejle- og Fredericiaegnens Sædcentral
J. Folke Nielsen, Brangstrup	Fåborg Wano	Vardeegnens Kvf.
J. Riis Rasmussen, Bramminge	Morsø Ejlekær	Vardeegnens Kvf.
Dortheasminde, Gelballe	Hjørring Munkdrup	Koldingkredsens Kvf.
Karl Aagaard, Espe	Rudme Ideal	Kvf. Vestjyden
C. Tornbjerg Pedersen, Årslev	Sortemose	Åbenrå- og Tønderegnens Kvf.
Kr. Odgaard, Lødderup	Morsø Ejlekær	Gråsten-Sønderborg Kvf.
Otto Hauter, Herchweiler-Pettersheim, Rhinland-Pfalz	Normer	Gråsten-Sønderborg Kvf.

	Reg./stbg.	Født	Alder 15/8-67 år	mdr.
Ejstrupgård, Kavslunde:				
Årup Vestfyns Prins	28691	11-12-62	4	8
Sydvestfyns Fast	28181	15- 2-61	6	6
Enemærket, Lunde F.:				
Rudme Søe	28687	4-12-62	4	8
Centrums Værn	28690	4-12-62	4	8
Nordfyns Urban	28579	30- 1-63	4	7
Torntofte, Høng:				
Holbæk Morskær	28672	9- 3-63	4	5
Grønhøjgård, Fårdrup, Slagelse:				
Ejlekær Sydvest	28791	4-11-62	4	9
Haslev Ideal	28484	7- 9-61	5	11
Sydsjælland, Lundby:				
Hau Nøddekær	28469	21- 6-62	5	2
Bellinge, Nykøbing Falster:				
M. A. Cæsar	28850	13- 6-63	4	2
Langelands Gut	28682	29-10-62	4	10
Kannikegård, Åkirkeby:				
Bornholms Ydan	28560	19- 1-62	5	7

2. Sortbroget Dansk Malkerace.

Dybvadgård, Dybvad:				
Hjørring Vester	7658	6-12-62	4	8
Hjørring Zelo	7659	24- 1-63	4	7
Kronborg, Thisted:				
Thy Drost	7396	23-12-61	5	8
Thy Juvel	7398	26- 4-62	5	4
Morsø, Nykøbing M.:				
Morsø Drost	7617	30-12-62	4	8
Lundgård, Overlade:				
Ålborg Cor	7452	27- 1-62	5	7
Ålborg Knud	7451	9-11-61	5	9
Kern	7425	10-11-61	5	9
Krarup Nygård, Skive:				
Skive Bert	7245	20-10-60	6	10
Rosenfeldt, Ulstrup:				
Bjerringbro Frans	7480	12-11-61	5	9
Bjerringbro Rico	7482	6- 4-62	5	4

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Lars Bruun, Gudme	Sortemose	Årup Vestfyns Kvf.
Arne Hansen, Højagergård	Rudme Rolu	Sydvestfyns Kvf.
Søren Hansen, Rudme	Morsø Ejlekær	Sydøstfyns Kvf.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Morsø Ejlekær	Centrum og Odense Om. Kvf.
Erling Nielsen, Trunderup	Randers Ideal	Nordfyns Kvf.
Johs. Andersen, Nr. Asmindrup	Morsø Ejlekær	Holbæk Amts Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal	Morsø Ejlekær	Sydvestsjællands Kvf.
H. Moritz Hansen, Rynkeby	Rudme Ideal	Præstø Amts Kvf.
Chr. Sørensen, Holme	Hadsten Wahl	Præstø Amts Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal	Randers Samson	Maribo Amts Kvf.
Gert Jensen, Tårup	Nordfyns Frem	Langelands Elite-Kvf.
A. Grønnegaard, Corselitze	Stevns Klint	Bornholms Elite-Kvf.
Anders Vestergaard, Kjelstrup	Thy Tax	Kvf. for Hjørring Amt
Chr. Holt Sørensen, Strellev	Conzelo	Kvf. for Hjørring Amt
Peter Møller, Gundersted	Drost	Thy Kvf. for SDM
A. Ruyter, Ooster-Blokker, H.	Adema 493	Thy Kvf. for SDM
Juul Larsen, Års	Drost	Morsø Kvf.
Jens Sehested, Tvilum	Skovly Corr	Kvf. for Ålborg Amt
Knud Ottosen, Vadum	Ålborg Diamant	Kvf. for Ålborg Amt
A. Andreasen, Stavad	Hjørring Diamant	Vesthimmerlands Kvf.
Juul Larsen, Års	Bert	Skiveegnens Kvf.
A. Ruyter, Ooster-Blokker, H.	Frans Ij. 167	Bjerringbroegnens Kvf.
N. v.d. Burg, Jelsum, H.	Rik	Bjerringbroegnens Kvf.

	Reg./stbg.	Født	Alder 15/8-67 år	mdr.
Kalø Hovedgård, Rønde:				
Hadsten Adson	7506	30- 3-61	6	5
Elkjær, Hornslet:				
Århus Thor	7500	19- 8-62	5	0
Århus Tax	7627	25-12-62	4	8
Moesgård, Kibæk:				
Herning Esp	7513	9- 9-62	4	11
Østerhåb, Hatting:				
Horsens Bast	7645	25- 3-63	4	5
Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:				
Give Robinea	7620	25-10-62	4	10
Vardegård, Varde:				
Varde Regent	7438	9- 2-62	5	6
Gelballegård, Lunderskov:				
Kolding Bos	7616	5- 4-63	4	4
Brøstrupgård, Rødding:				
Sdj. Sten	7606	14- 5-62	5	3
Sdj. Peter	7607	6- 6-62	5	2
Sdj. Corr	7410	8- 2-62	5	6
Veesbæk, Sønderborg:				
Dybbøl Faust	7474	27- 3-62	5	5

3. Jerseyrace.

Dybvadgård, Dybvad:				
Hjørring Baun	3010	14-11-60	6	9
Hjørring Tæbring	3103	2-10-60	6	10
Lægård, Holstebro:				
Fåborg Nat	3492	9- 4-63	4	4
Kalø Hovedgård, Rønde:				
Randers Russ	3413	4- 1-63	4	7
Bjerringbro Hoff	3378	27- 9-62	4	11
Gefion	3569	2- 9-63	3	11
Moesgård, Kibæk:				
Årup Vestfyns Gems	3490	8- 2-63	4	6
Østerhåb, Hatting:				
Horsens Frank	3398	18- 2-63	4	6
Årup Vestfyns Fax	3489	6-12-62	4	8

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
H. M. Heeg, Ytens, H.	Adson Ferdinand	Hadstenegnens Kvf.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, S.	Trinton	Kvf. Østjyden
Anders Vestergaard, Kjelstrup	Thy Tax	Kvf. Østjyden
J. Esp. Sørensen, Bjerring	Kastor	Hammerum Herreds Kvf.
K. Rykind Eriksen, Grindstedgård	Bast	Horsensegnens Kvf.
A. Ruyter, Ooster-Blokker, H.	Sneeker Diamant	Vejle Vesteregns Kvf.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, S.	Trinton	Vardeegnens Kvf. og Kvf. Vestjyden
N. Skovrider Eriksen, Vrensted	Ålborg Bos	Koldingkredsens Kvf.
Fr. Palsma, Lieve Vrouwen, H.	Jelsumer G. Wouter	Sønderjydsk Kvf. f. SDM
Tj. I. Kerstma, Tjerkgast, H.	Jelsumer G. Wouter	Sønderjydsk Kvf. f. SDM
Jens Sehested, Tvilum	Skovly Corr	Sønderjydsk Kvf. f. SDM
Olaf Villumsen, Løgstrup	Bjarke	Gråsten-Sønderborg Kvf.
Johs. Pedersen, Bremerskov	Randers Baun	Kvf. for Hjørring Amt
Arne Jensen, Outrup	Prins Nørremark	Kvf. for Hjørring Amt
Aage Johansen, Lervang, Andst	Granat	Fåborg-Midtfyns Kvf.
Alfred Jørgensen, Ollerup	Nordfyns Russ	Kvf. Østjyden
Jens Hansen, Stenstrup	Sydfyns Hoff	Bjerringbroegnens Kvf.
Otto Storm, Verninge	Fåborg Gibs	Odder-Skanderborgegnens Jersey-Kvf.
Hans Knudsen, Martofte	Gem's Dandy Advancer	Årup Vestfyns Kvf.
Erik Bredholt, Edelslund	Hjørring Frank	Horsensegnens Kvf.
Rudolf Frandsen, Fårvang	Lars	Årup Vestfyns Kvf.

	Reg./stbg.	Født	Alder 15/8-67	
				mdr.
Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:				
Egholm Russ	3243	15-11-62	4	9
Skølvad, Gørding:				
Vax Syd	3432	9-11-61	5	9
Holm Syd	3431	10- 2-62	5	6
Hoff Syd	3430	24-11-62	4	9
Ejstrupgård, Kavslunde:				
Sydvestfyns Jon	3421	21-12-62	4	8
Torntofte, Høng:				
Holbæk Sjus	3485	7- 9-62	4	11

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Johs. Hansen, Melby	Nordfyns Russ	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
Niels og Georg Nielsen, Seden	Centrums Vax	Sydjydsk Jersey-Kvf.
Lars P. Pedersen, Lambæksgård	Sydfyns Ifa	Sydjydsk Jersey-Kvf.
Th. Larsen, Tårup, Gelsted	Sydfyns Hoff	Sydjydsk Jersey-Kvf.
Johs. Pedersen, Bremerskov	Coralads Dream Boy	Sydvestfyns Kvf.
Kaj Andersen, Hammelmose	Hjørring Holm	Holbæk Amts Kvf.

Tidligere udsendte beretninger om afkomsprøver med tyre.

1947.	226.	ber.	Afkomsprøver med Tyre.	(Udsolgt).
1948.	229.	–	Afkomsprøver med Tyre. II.	(1,50 kr.).
1948.	236.	–	Afkomsprøver med tyre. III.	(2,50 kr.).
1950.	245.	–	Afkomsprøver med tyre. IV.	(2,50 kr.).
1951.	254.	–	Afkomsprøver med tyre. V.	(2,50 kr.).
1952.	257.	–	Afkomsprøver med tyre. VI.	(Udsolgt).
1953.	263.	–	Afkomsprøver med tyre. VII.	(3,50 kr.).
1954.	270.	–	Afkomsprøver med tyre. VIII.	(3,50 kr.).
1954.	276.	–	Afkomsprøver med tyre. IX.	(4,50 kr.).
1956.	286.	–	Afkomsprøver med tyre. X.	(4,50 kr.).
1957.	295.	–	Afkomsprøver med tyre. XI.	(5,00 kr.).
1957.	301.	–	Afkomsprøver med tyre. XII.	(6,00 kr.).
1959.	309.	–	Afkomsprøver med tyre. XIII.	(6,00 kr.).
1960.	316.	–	Afkomsprøver med tyre. XIV.	(6,00 kr.).
1960.	324.	–	Afkomsprøver med tyre. XV.	(6,00 kr.).
1962.	329.	–	Afkomsprøver med tyre. XVI.	(6,00 kr.).
1962.	333.	–	Afkomsprøver med tyre 1945–60.	(7,00 kr.).
1963.	335.	–	Afkomsprøver med tyre XVII.	(7,50 kr.).
1964.	342.	–	Afkomsprøver med tyre XVIII.	(7,50 kr.).
1965.	348.	–	Afkomsprøver med tyre XIX.	(8,00 kr.).
1966.	352.	–	Afkomsprøver med tyre XX.	(8,00 kr.).
1967.	355.	–	Afkomsprøver med tyre XXI.	(8,00 kr.).