

367. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

Afkomsprøver med tyre

XXIII

Ved

Ejner Nielsen og Børge Vesth


With an English Summary




I kommission hos Landhusholdningsselskabets forlag,
Rolighedsvej 26,
1958 København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.


1969



Stamtræer over de i årene 1967-68 og 1968-69 afkomsprøvede tyre af Jerseyracen (negativ skrift).



Stamtræ over de i årene 1966–67 og 1967–68 afkomsprøvede tyre af Rød Dansk Malkerace (negativ skrift).



Stamtræer over de i årene 1967-68 og 1968-69 afkomsprøvede tyre af Sortbroget Dansk Malkerace (negativ skrift).

Forord.

Denne XXIII. beretning i serien »Afkomsprøver med tyre« er udarbejdet efter samme retningslinier som XXII. beretning.

Omtalen af de enkelte hold er delt i to afsnit, hvoraf forsøgsleder Ejner Nielsen har skrevet det første, som vedrører ydelse, malkbarhed og andre brugsmæssige egenskaber. Det andet afsnit indeholder beskrivelse af holdenes eksteriør. Eksteriørbedømmelserne er foretaget af landsdelsudvalg med stambogsførerne som sekretærer. Beskrivelserne er indsendt af konsulenterne C. P. Knudsen, Nykøbing Fl., Herluf Bruun, Århus, Helmer Hansen, Rønne, Harald Rasmussen, Århus, Jørg. Philipsen, Roskilde og A. Wulff Pedersen, Odense.

Trivlighedsundersøgelsen med nordamerikanske, sortbrogede tyre er gennemført i samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde ved forsøgslederne T. Wichmann Jørgensen og Jørgen Mandrup-Jensen. Afsnittet er udarbejdet af forsøgslederne Ejner Nielsen og Axel Nielsen samt af videnskabelig assistent L. Gjøøl Christensen. Videnskabelig assistent Aage Dissing Andersen har deltaget i opgørelsen af resultaterne.

Udover de anførte forfattere har afdelingens videnskabelige assistenter, H. F. Andersen, Sv. Aa. Hulgaard og J. Jørgensen samt assistent Cathrine Petersen og Helga Scheelke udført et stort arbejde i forbindelse med de omfattende revisions- og beregningsarbejder, der danner grundlaget for beretningens resultater.

København, november 1968.

A. Neimann-Sørensen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I. Afkomsprøverne 1945-68	7
II. Afkomsprøverne 1967-68	23
A. Tyrenes alder ved prøvens begyndelse	24
B. Afgangsårsagerne	25
C. Kælvetiden	26
D. Kælvningsforløbet	27
E. Kviernes vægt	36
F. Kalvenes vægt	37
G. Drægtighedsforholdene	38
H. Fodringen	38
1. Fodringen før kælvingen	38
2. Vinterperioden	40
3. Sommerperioden	47
I. Ydelsen	48
1. Ydelsen for de forskellige racer	49
2. Højtydende kvier	49
3. Udholdenheden i ydelsen	60
4. Ydelsen i 250 dage	60
5. Spredningen	60
J. Malkbarhedsundersøgelsen	61
K. Vejning og måling	65
L. De enkelte tyre og deres afkomsprøvehold	70
1. Rød Dansk Malkerace:	
Holbæk Morskær	70
Djurs Bitz	71
Langelands Gut	71
Ålborg Nor	73
Hammel Ideal	74
Hau Nøddekær	75
Nordfyns Urban	76
Haslev Ideal	77
Ribe Ås	78

Bjerringbro Munk	79
Skærup Ørnkær	79
Bornholms Ydan	80
Centrums Værn	81
Århus Gorm	82
Årup Vestfyns Prins	83
Fåborg Moss	84
Hjørring Vagn	84
Kolding Eg	85
M. A. Cæsar	86
Skive Sten	87
Rudme Søe	87
Varde Wano	88
Hjørring Nørreby	89
Herning Munk	90
Morsø Munk	91
Dybbøl Od	91
Åbenrå Sortemose	92
Sortkær	93
Dybbøl Rhin	94
Varde Bram	95
Ejlekær Sydvest	96
Sydvestfyns Fast	96

2. Sortbroget Dansk Malkerace:

Skive Bert	97
Bjerringbro Frans	98
Thy Drost	99
Kolding Bos	100
Dybbøl Faust	101
Kern	102
Bjerringbro Rico	102
Ålborg Cor	103
Århus Thor	104
Ålborg Knud	105
Hjørring Zelo	106
Herning Esp	106
Morsø Drost	107
Sdj. Sten	108
Thy Juvel	108
Sdj. Peter	109
Give Robinea	110
Sdj. Corr	111
Hadsten Adson	112
Horsens Bast	112
Varde Regent	113
Hjørring Vester	114
Århus Tax	115

3. Jerseyrace:

Horsens Frank	115
Egholm Russ	116
Gefion	117
Hjørring Baun	117
Holm Syd	118
Årup Vestfyns Fax	119
Holbæk Sjus	120

Bjerringbro Hoff	120
Fåborg Nat	121
Vax Syd	122
Randers Russ	123
Sydvestfyns Jon	123
Hjørring Tæbring	124
Hoff Syd	125
Arup Vestfyns Gems	126
III. Trivelighedsundersøgelse med nordamerikanske, sortbrogede tyre ..	127
IV. Sammendrag	131
V. Summary	133
VI. Hovedtabeller	135
VII. Oversigt over afkomsprøverne 1968-69	206
Tidligere udsendte beretninger om afkomsprøver med tyre	214

I. Afkomsprøverne 1945-68.


Afkomsprøverne med tyre er i de forløbne 23 år udført på 51 afkomsprøvestationer, og der er afprøvet 1505 hold.



Oversigt over afkomsprøvestationer og antal hold 1945-68.

Stationens navn	1945 /58	1958 /59	1959 /60	1960 /61	1961 /62	1962 /63	1963 /64	1964 /65	1965 /66	1966 /67	1967 /68	Antal år	Antal hold
Lægård	26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	46
Samsø	11	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	18	19
Kannikegård	14	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	20	28
Kalø	75	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7	19	158
Dybvad	31	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	19	90
Krarup Nygård ..	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17	34
Morsø	13	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	15	39
Vardegård	10	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	15	47
Sydsjælland	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
Lundgård	20	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	14	61
Skølvad	15	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	14	56
Tornstofte	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	24
Skovgård	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	11	43
Østerhåb	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	11	41
Gelballegård	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	11	32
Veesbæk	—	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	10	29
Enemærket	—	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	28
Bellinge	—	4	4	3	3	3	3	3	3	—	2	9	28
Brøstrupgård	—	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	36
Ejstrupgård	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	27
Grønhøjgård	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	18
Rosenfeldt	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	3	7	21
Elkjær	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	6	18
Moesgård	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	6	18
Kronborg	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	5	10
Nedlagte stationer	401	40	30	26	20	8	6	5	2	1	—	—	539
Antal stationer ..	—	34	34	31	30	28	28	27	26	25	24		1505
Antal hold	649	96	99	93	91	83	83	83	81	77	70		
kg smørfedt	—	223	223	208	217	214	216	224	227	229	230		
kg smør	—	251	251	235	244	241	243	252	255	258	259		


Lægård er den eneste station, som har været med i alle 23 år. Af de 1505 hold er de 539 afprøvet på stationer, som er nedlagt før prøveåret 1967-68. Samsø var ikke i funktion i prøveåret 1967-68, men i efteråret 1968 blev der igen indsat hold på Samsø. Der afprøvedes 70 hold i prøveåret 1967-68.

Nederst i oversigtstabellen findes oplysning om den gennemsnitlige






Protein %



Mælkeprotein kg



ydelse af smørfedt og smør for de sidste 10 år. I de første år var der en stigning i ydelsen, som kulminerede i 1958–60, men prøveårene 1958–59 og 1959–60 var også de to sidste år, hvor der blev malket 3 gange daglig i vinterperioden. I 1960–61 blev ydelsen lavere end de foregående år på grund af overgangen til 2 gange daglig malkning i hele prøveåret, men den steg noget i prøveåret 1961–62, og den var på samme niveau i de to følgende prøveår, selv om den ændrede gerbereringsmetode, som indførtes i efteråret 1962, virkede sænkende på fedtprocenten. I årene 1964–68 opnåedes meget høje ydelsesresultater, og der var en lille stigning i ydelsen fra år til år. I prøveåret 1967–68 sættes rekord med en gennemsnitsydelse på 230 kg smørfedt og 259 kg smør.

Fordelingen af holdene på de enkelte racer er følgende:

RDM	972 hold	64,6 %
SDM	316 »	21,0 %
Jerseyrace	211 »	14,0 %
DRK	6 »	0,4 %
I alt	1505 hold	100,0 %

Der er vedlagt stamtræer for RDM, SDM og Jerseyracen. For RDM er de tyre, som blev afprøvet i 1966–67 og 1967–68 anført med negativ skrift, hvorimod de tyre, som er med til at føre linien tilbage til stammen og tillige er afkomsprøvet, er anført med kursiv. Stamfædrene er anført med fed type, medens der er anvendt almindelige typer til de øvrige tyrenavne. For SDM og Jerseyracen er anvendt samme fremgangsmåde, dog er den negative skrift benyttet til tyre, som blev afprøvet i 1967–68 og som afprøves i 1968–69.

Inden for Rød Dansk Malkerace dominerer Højagerlinien, og det er sønnesønnerne Kærsholm Højager og Højvig, som er blevet stamfædre til næsten alle de afkomsprøvede tyre inden for Højagerlinien i årene 1966–67 og 1967–68. Inden for Esketyrene er der kun få afkomsprøvede tyre, og Eskelinien er i stærk tilbagegang i disse år. Den røde tyr Dybbøl Rhin er ikke medtaget, da den ikke i direkte linie kan føres tilbage til det anførte stamtræ.

Inden for Sortbroget Dansk Malkerace er der 5 stamtræer, men det er stamtræet med den vestfrisiske tyr Athleet som stamfader, der omfatter den største part af de afkomsprøvede tyre. Tyrelinierne efter Astor og Alex er østfrisiske, medens tyrelinierne efter Constantijn Frans og Oldambtster Adema 1 er nordhollandske.

Der er anført 6 stamtræer for Jerseyracen. De 4 kan føres tilbage til de kendte tyrelinier efter Indslev Ellekær, Nybøllegård 39, Abild 6 og Lyngsie, medens Zinnia's Wonderful Advancer og Draconis Royal Gem er amerikanske tyrelinier.

Tabel 1. Gennemsnitsydelsen for afkomsprøveholdene 1967-68.
Table 1. Average yield of the progeny tested groups in 1967-68

Tyrens navn Name of bull	Stbg. Herdbook	Tyrens fader Sire of bull	Antal døtre No. of daughters	Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smørfedt kg Butterfat kg	Smør kg Butter kg	Protein % Protein %	Mælke- protein kg Protein kg	Afkomsprøvestation Testing station
RDM:										
1. Holbæk Morskær	28672	Morsø Ejlekær	18	6306	4,50	283,61	319	3,75	236	Torntofte
2. Djurs Bitz	28748	Ålborg Bitz	18	5789	4,72	273,10	307	3,64	211	Kalø
3. Langelands Gut	28682	Nordfyns Frem	18	5638	4,67	263,17	296	3,73	210	Bellinge
4. Ålborg Nor	28374	Hadsten Wahl	17	5973	4,34	259,50	291	3,68	220	Lundgård
5. Hammel Ideal	28321	Rudme Ideal	19	5427	4,73	256,90	289	3,79	206	Kalø
6. Hau Nøddekær	28469	Hadsten Wahl	19	6002	4,28	256,90	288	3,71	223	Sydsjælland
7. Nordfyns Urban	28579	Randers Ideal	20	5466	4,62	252,53	284	3,70	202	Enemærket
8. Haslev Ideal	28484	Rudme Ideal	19	5589	4,44	248,09	279	3,64	203	Grønhøjgård
9. Ribe Ås	28650	Rudme Ideal	20	5175	4,79	247,99	279	3,84	199	Skølvad
10. Bjerringbro Munk	28585	Hjørring Munkdrup	20	5388	4,56	245,88	277	3,75	202	Rosenfeldt
11. Skærup Ørnkær	28818	Morsø Ejlekær	16	5202	4,64	241,29	271	3,88	202	Skovgård
12. Bornholms Ydan	28560	Stevns Klint	18	5607	4,29	240,80	270	3,73	209	Kannikegård
13. Centrums Værn	28690	Morsø Ejlekær	19	5168	4,65	240,52	271	3,79	196	Enemærket
14. Århus Gorm	28441	Hadsten Wahl	16	5351	4,37	233,81	263	3,66	196	Elkjær

15.	Arup Vestfyns Prins	28691	Sortemose	19	4982	4,66	232,41	262	3,74	186	Ejstrupgård
16.	Fåborg Moss	28761	Morsø Ejlekær	16	4955	4,68	231,81	261	4,00	198	Lægård
17.	Hjørring Vagn	28356	Hjørring No	20	4916	4,67	229,44	258	3,80	187	Dybvad
18.	Kolding Eg	28812	Hjørring Munkdrup	17	5016	4,51	226,12	254	3,71	186	Gelballegård
19.	M. A. Cæsar	28850	Randers Samson	16	4872	4,62	225,15	253	3,96	193	Bellinge
20.	Skive Sten	28376	Horsens Leif	20	4864	4,63	224,97	253	3,81	186	Krarup Nygård
21.	Rudme Søe	28687	Morsø Ejlekær	19	5466	4,11	224,43	251	3,73	204	Enemærket
22.	Varde Wano	28649	Fåborg Wano	18	4857	4,62	224,36	252	3,76	183	Vardegård
23.	Hjørring Nørreby	28615	Nordfyns Frem	19	4569	4,80	219,41	247	3,93	180	Dybvad
24.	Herning Munk	28630	Hjørring Munkdrup	19	4903	4,45	218,38	245	3,75	184	Moesgård
25.	Morsø Munk	28806	Munk 26	20	5121	4,25	217,54	244	3,58	183	Morsø
26.	Dybbøl Od	28740	Morsø Ejlekær	16	5007	4,08	204,44	229	3,78	189	Veesbæk
27.	Åbenrå Sortemose	28743	Sortemose	20	4218	4,72	199,23	224	3,90	164	Brøstrupgård
28.	Sortkær	28824	Sortemose	15	4468	4,44	198,46	223	3,69	165	Kalø
29.	Dybbøl Rhin	-	Normer	19	4427	4,39	194,32	218	3,77	167	Veesbæk
30.	Varde Bram	28713	Morsø Ejlekær	16	4336	4,39	190,28	214	3,78	164	Vardegård
31.	Ejlekær Sydvest	28791	Morsø Ejlekær	19	4228	4,40	185,98	209	3,75	158	Grønhøjgård
32.	Sydvestfyns Fast	28181	Rudme Rolu	19	3860	4,73	182,68	206	3,99	154	Ejstrupgård
Gns.				18	5098	4,52	230,42	259	3,77	192	

Tyrens navn	Stbg.	Tyrens fader	Antal døtre	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælke- protein kg	Afkomsprøvestation
<i>Name of bull</i>	<i>Herdbook</i>	<i>Sire of bull</i>	<i>No. of daughters</i>	<i>Milk kg</i>	<i>Fat %</i>	<i>Butterfat kg</i>	<i>Butter kg</i>	<i>Protein %</i>	<i>Protein kg</i>	<i>Testing station</i>
SDM:										
1. Skive Bert	7245	Bert	18	5876	4,42	259,58	292	3,66	215	Krarup Nygård
2. Bjerringbro Frans	7480	Frans Ij. 167	20	5635	4,53	255,42	287	3,73	210	Rosenfeldt
3. Thy Drost	7396	Drost	19	5612	4,29	241,02	270	3,51	197	Kronborg
4. Kolding Bos	7616	Ålborg Bos	19	5332	4,47	238,52	268	3,74	200	Gelballegård
5. Dybbøl Faust	7474	Bjarke	22	5367	4,40	236,38	265	3,61	194	Veesbæk
6. Kern	7425	Hjørring Diamant	17	5373	4,37	234,56	263	3,72	200	Lundgård
7. Bjerringbro Rico	7482	Rik	19	5319	4,39	233,67	262	3,69	196	Rosenfeldt
8. Ålborg Cor	7452	Skovly Corr	16	5470	4,27	233,58	262	3,56	195	Lundgård
9. Århus Thor	7500	Trinton	19	5085	4,48	227,57	256	3,72	189	Elkjær
10. Ålborg Knud	7451	Ålborg Diamant	18	5252	4,33	227,26	255	3,59	189	Lundgård
11. Hjørring Zelo	7659	Conzelo	13	4619	4,78	220,85	249	3,82	177	Dybvad
12. Herning Esp	7513	Kastor	18	5474	4,03	220,69	247	3,61	198	Moesgård
13. Morsø Drost	7617	Drost	20	5008	4,33	216,71	243	3,64	182	Morsø
14. Sdj. Sten	7606	Jelsummer G. Wouter	17	5014	4,32	216,50	243	3,62	182	Brøstrupgård
15. Thy Juvel	7398	Adema 493	20	5162	4,19	216,36	243	3,53	182	Kronborg
16. Sdj. Peter	7607	Jelsummer G. Wouter	19	4946	4,25	210,08	236	3,53	174	Brøstrupgård
17. Give Robinea	7620	Sneeker Diamant	18	4977	4,14	206,13	231	3,53	176	Skovgård
18. Sdj. Corr	7410	Skovly Corr	19	4624	4,33	200,02	225	3,65	169	Brøstrupgård
19. Hadsten Adson	7506	Adson Ferdinand	18	4100	4,60	188,74	212	3,72	152	Kalø
20. Horsens Bast	7645	Bast	20	4024	4,39	176,61	198	3,74	150	Østerhåb
21. Varde Regent	7438	Trinton	19	4007	4,34	173,82	195	3,74	150	Vardegård
22. Hjørring Vester	7658	Thy Tax	15	3769	4,59	173,10	195	3,76	142	Dybvad
23. Århus Tax	7627	Thy Tax	19	4019	4,24	170,36	191	3,55	143	Elkjær
Gns.			18	4959	4,36	216,41	243	3,65	181	

Tyrens navn Name of bull	Stbg. Herdbook	Tyrens fader Sire of bull	Antal døtre No. of daughters	Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smørfedt kg Butterfat kg	Smør kg Butter kg	Protein % Protein %	Mælke- protein kg Protein kg	Afkomsprøvestation Testing station
Jerseyrace:										
1. Horsens Frank	3398	Hjørring Frank	19	4022	6,81	274,09	312	4,26	171	Østerhåb
2. Egholm Russ	3243	Nordfyns Russ	19	4065	6,74	273,83	311	4,41	179	Skovgård
3. Gefion	3569	Fåborg Gibs	20	4060	6,49	263,51	299	4,18	170	Kalø
4. Hjørring Baun	3010	Randers Baun	19	4022	6,36	255,90	291	4,17	168	Dybvad
5. Holm Syd	3431	Sydfyns Ifa	21	3749	6,78	254,35	289	4,32	162	Skølvad
6. Årup Vestfyns Fax	3489	Lars	20	3849	6,60	254,19	289	4,24	163	Østerhåb
7. Holbæk Sjus	3485	Hjørring Holm	16	4012	6,34	254,17	289	4,22	169	Torntofte
8. Bjerringbro Hoff	3378	Sydfyns Hoff	16	3961	6,41	253,85	288	4,24	168	Kalø
9. Fåborg Nat	3492	Granat	17	3664	6,92	253,71	289	4,50	165	Lægård
10. Vax Syd	3432	Centrums Vax	22	3824	6,61	252,71	287	4,30	164	Skølvad
11. Randers Russ	3413	Nordfyns Russ	20	3665	6,63	243,14	276	4,24	155	Kalø
12. Sydvestfyns Jon	3421	Coralads Dream Boy	20	3717	6,34	235,53	267	4,25	158	Ejstrupgård
13. Hjørring Tæbring	3103	Prins Nørremark	18	3622	6,50	235,49	268	4,18	151	Dybvad
14. Hoff Syd	3430	Sydfyns Hoff	15	3469	6,75	234,18	266	4,31	149	Skølvad
15. Årup Vestfyns Gems	3490	Gems Dandy	20	3618	6,45	233,38	265	4,20	152	Moesgård
Advancer										
Gns.			19	3821	6,58	251,47	286	4,26	163	
Gns. for alle hold			18	4779	4,82	230,33	259	3,81	182	

Tabel 2. Tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner.

Table 2. Bulls with 3 or more tested sons

		Døtrenes ydelse				
Sønner	Stbg./ reg. nr.	mælk kg	fedt %	smørfedt kg	smør kg	Morfader
		Yield of daughters				
Sons	Herdbook or Reg. No.	Milk kg	Fat %	Butterfat kg	Butter kg	Maternal grand sire
RDM:						
Sortemose:						
⊙ Kolding Top 69 . . . e.A5044		5976	4,60	274,84	309	Ulvsager
⊙ ⊙ Rudme Ideal e.A4864		5522	4,89	269,92	304	Ulvsager
⊙ Stevns Ry e.A5028		5814	4,60	267,50	301	Buster
⊙ ⊙ Elbo Sortemose . . e.A4902		5366	4,95	265,79	300	Valde
⊙ ⊙ Hjørring Munkdrupe.A4906		5447	4,77	259,79	293	Randers Kronjyden
⊙ Kolding Sortem. 28e.A4980		5216	4,95	258,37	291	Kolding Kærsholm
⊙ Holbæk Rumø . . e.B4929		5530	4,43	245,21	275	Rudo
⊙ Randers Sortemosee.A5070		5587	4,38	244,69	275	Hadsten Wahl
⊙ Samsø Frej 28442		5225	4,66	243,46	274	Holbæk Frø
⊙ Skærup Karlby . . 28039		5380	4,36	234,71	264	Hjørring Ejler
Arup Vestfyns Prins	28691	4982	4,66	232,41	262	Dan
* ⊙ ⊙ Ørnmose 26200		5303	4,36	231,03	259	Ørnsvig 200
⊙ Hjørring Bakke . . 27447		4837	4,75	229,69	259	Buster
⊙ Give Uno 27884		5016	4,58	229,65	258	Tyrst. Lombjerger
⊙ Give Ask 28612		4718	4,86	229,42	259	Morsø Wahl
⊙ Varde Ott 28085		4929	4,60	226,52	255	Ott
⊙ ⊙ Lokker e.A4922		4995	4,50	224,71	253	Thor
* ⊙ ⊙ Moes 25739		5230	4,28	223,76	251	Brethvig
⊙ ⊙ Bornholms Guldal	4841	4790	4,64	222,06	250	Kærsholm Højager
⊙ Varde Bol 27832		4901	4,53	221,94	250	Buster
⊙ Ribe Dan 28084		5046	4,39	221,56	249	Høj
⊙ ⊙ Thy Moes 26472		4872	4,54	221,19	249	Ulvsager
⊙ Bjørn Sydvest . . . e.B4979		4868	4,54	221,05	249	Buster
⊙ Kolding Ejlekær 83	28076	4839	4,55	220,20	248	Nico
* ⊙ ⊙ Himmerbo 26588		5016	4,37	219,17	246	Lem Uffe
* ⊙ ⊙ Ribe Pors 26165		5015	4,33	217,31	244	Hammer
⊙ Rør Nordvest . . . e.A5026		4927	4,40	216,93	244	Buster
⊙ Erslev 28383		4465	4,71	210,38	237	Hadsten Wahl
⊙ ⊙ Tyrstrup Brethmose e.B4947		4674	4,49	209,74	236	Brethvig
⊙ ⊙ Hjørring Sortemose	26486	4494	4,46	200,36	225	Højvig 136
⊙ ⊙ Gråsten Sortemose	26780	4393	4,54	199,42	224	Hadsten Malm
Abenrå Sortemose .	28743	4218	4,72	199,23	224	Dan
Sortkær 28824		4468	4,44	198,46	223	Kær
33 sønner. Døtres gns.		5032	4,57	230,01	259	

* 3 gange daglig malkning i vinterhalvåret.

⊙ Fedtbestemmelsen foretaget med 11 ml mælk.

⊙ Eftermalket med hånd.

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		mælk kg	fedt %	smørfedt kg	smør kg	
		Yield of daughters				
Sons	Herdbook or Reg. No.	Milk kg	Fat %	Butterfat kg	Butter kg	Maternal grand sire
Rudme Ideal:						
⊙ Holme Øst	e.B4957	5955	4,62	275,25	310	Sverre
⊙ Dybbøl Ideal	28328	6075	4,42	268,45	302	Guldbjerg Ulvsager
⊙ Hornshøj Ideal ..	28057	5553	4,73	262,38	295	Valdøl
⊙ Ribe Ulf	28083	5626	4,64	261,19	294	Fåborg Elg
⊙ Drot. Østlolland ..	e.A5062	5581	4,67	260,86	294	Rudme Flax
⊙ Skive Ideal	28096	5842	4,41	257,86	290	Anders II
Hammel Ideal	28321	5427	4,73	256,90	289	Fåborg Ymer
⊙ Ålborg Børge	28372	5520	4,63	255,84	288	Buster
⊙ Dybbøl Holm	28377	5373	4,73	254,22	286	Ulvsager
Haslev Ideal	28484	5589	4,44	248,09	279	Kerteminde Ole
Ribe As	28650	5175	4,79	247,99	279	Møns Tramp
⊙ Skærup Bus	28388	5521	4,48	247,31	278	Bus
⊙ Bjerringbro King ..	27881	5149	4,63	238,25	268	Rudme Flax
⊙ Varde Rud	28086	5359	4,44	237,78	267	Rudme Fynbo
⊙ Hjørring Iver	28352	4949	4,66	230,44	259	Toke Sams
⊙ Århus Niels	28020	5345	4,28	228,76	257	Morsø Wahl
⊙ Centrum Prik	e.A5052	4946	4,56	225,46	254	Rudme Flax
⊙ Tyrstrup Buster ..	28066	4950	4,52	223,58	251	Buster
⊙ Randers Ideal	e.B4971	4827	4,59	221,41	249	Nordfyns Gjald
⊙ Holbæk Allaks	e.B4983	4804	4,61	221,38	249	Rudme Flax
⊙ Rødding Dal	28418	4711	4,67	219,84	247	Ålborg Wahl
⊙ Skjern Tvind	27804	4270	4,96	211,95	239	Nordfyns Gjald
22 sønner. Døtres gns.		5298	4,59	243,42	274	

Morsø Ejlekær:

Holbæk Morskær ..	28672	6306	4,50	283,61	319	Rørby Øst
⊙ Nordfyns Nich ..	e.A5016	5362	4,63	248,33	279	Morsø Wahl
Skærup Ørnkær ..	28818	5202	4,64	241,29	271	Kær
⊙ Skive Rajs	28097	5199	4,64	241,28	271	Rajs
Centrums Værn ..	28690	5168	4,65	240,52	271	Thor
⊙ Hjørring Od	27295	5383	4,34	233,81	262	Toke Sams
Fåborg Moss	28761	4955	4,68	231,81	261	Sortemose
⊙ Oll Nordvest	27770	5223	4,39	229,45	258	Ørnsvig 136
⊙ Hammel Ejlekær ..	e.A5036	5100	4,49	228,93	257	Morsø Uffe
⊙ Hornshøj Knold ..	e.A5012	5036	4,50	226,64	255	Ørnsvig 136
Rudme Søe	28687	5466	4,11	224,43	251	Fåborg Elg
⊙ Næstved Kærvig ..	e.A4994	5421	4,12	223,33	250	Flax Alsvig
⊙ Ejler Østlolland ..	e.A5064	5212	4,28	223,27	251	Toke Sams
⊙ Elo	27402	5032	4,39	221,10	248	Loke
⊙ Horsens Od	28053	4867	4,49	218,44	246	Sortemose
⊙ Lemvig Ejlekær ..	27849	5110	4,27	218,43	245	Rajs

⊙ Eftermalket med hånd.

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		mælk kg	fedt %	smørfedt kg	smør kg	
		Yield of daughters				
Sons	Herdbook or Reg. No.	Milk kg	Fat %	Butterfat kg	Butter kg	Maternal grand sire
⊙ Støtt	27953	4661	4,63	215,92	243	Hadsten Malm
⊙ Varde Nør	27124	4826	4,39	212,01	238	Morsø Buster
Dybbøl Od	28740	5007	4,08	204,44	229	Morsø Wahl
Varde Bram	28713	4336	4,39	190,28	214	Højvig Maegård
Ejlekær Sydvest . .	28791	4228	4,40	185,98	209	Morsø Wahl
21 sønner. Døtres gns.		5100	4,43	225,87	254	

Hadsten Wahl:

⊙ Horsens Borg	28051	5805	4,52	262,32	295	Buster
Ålborg Nor	28374	5973	4,34	259,50	291	Sortemose
Hau Nøddekær ..	28469	6002	4,28	256,90	288	Sverre
⊙ Rudme Unike.A5018		5544	4,54	251,66	283	Dan
⊙ Bonus	27960	5628	4,42	248,67	279	Guldbjerg Dan
⊙ Skov	28333	5397	4,55	245,69	276	Sortemose
⊙ Nordfyns Aman ...e.A5048		5201	4,68	243,43	274	Rudme Ideal
⊙ Åbenrå Øbo	28100	5497	4,36	239,93	269	Sydøstfyns Brage
⊙ Kolding Wahl 44 ...e.A5042		5571	4,26	237,20	266	Rolf
Århus Gorm	28441	5351	4,37	233,81	263	Kolding Højvig 143
⊙ Rødding Claus ..	27839	5274	4,25	223,93	251	Hadsten Juvel
⊙ Rør	27957	4862	4,58	222,86	251	Buster
⊙ Bakager Wahl	28062	5002	4,41	220,41	248	Ejlekær
⊙ Kolding Pall 23 ..	28081	4915	4,37	214,90	241	Højvig 47
⊙ Vald Nordvest ..	28126	4667	4,54	211,95	238	Kolding Valdal 174
⊙ Thy Skov	28440	4832	4,37	210,96	237	Sortemose
⊙ Bornholms Ran ...e.A5004		4839	4,31	208,47	234	Uffe Ørnsvig
⊙ Djurs Wahl	28311	4784	4,35	208,13	234	Loke
⊙ Tyrstrup Bent	27842	4533	4,51	204,42	230	Rudme No
19 sønner. Døtres gns.		5246	4,42	231,85	260	

Hjørring Munkdrup:

⊙ Samsø Ulf	28302	5847	4,61	269,40	303	Ørnsvig 136
Bjerringbro Munk .	28585	5388	4,56	245,88	277	Ejlekær
⊙ Sydfyns Allane.A5020		5159	4,65	239,67	270	Ørnsvig 136
⊙ Ribe Aks	28423	5515	4,21	232,06	260	Randers Loke
Kolding Eg	28812	5016	4,51	226,12	254	Kolding Højvig 143
⊙ Sydvestfyns Pol ..	28183	4747	4,73	224,64	253	Randers Lyn
Herning Munk ..	28630	4903	4,45	218,38	245	Ålborg Wahl
⊙ Ribe Klint	28421	4515	4,35	196,63	221	Horsens Klint
⊙ Kolding Munk 143	28382	4201	4,47	187,66	211	No Brethvig
9 sønner. Døtres gns.		5032	4,51	226,72	255	

⊙ Eftermalket med hånd.

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		mælk kg	fedt %	smørfedt kg	smør kg	
		Yield of daughters				
Sons	Herdbook or Reg. No.	Milk kg	Fat %	Butterfat kg	Butter kg	Maternal grand sire
Nordfyns Frem:						
Langelands Gut ..	28682	5638	4,67	263,17	296	Rudme Ideal
⊙ Ribe Frem	28422	5221	4,35	227,34	255	Høj
⊙ Rødding Frem	28420	4978	4,45	221,55	249	Nordfyns Vang
Hjørring Nørreby .	28615	4569	4,80	219,41	247	Toke Sams
4 sønner. Døtres gns.		5102	4,56	232,87	262	

Stevns Klint:

Bornholms Ydan ..	28560	5607	4,29	240,80	270	Kærsh. Knuthenl.
⊙ Århus Hof	28400	5379	4,22	227,10	255	Rud
⊙ Varde Grøn	28430	4795	4,45	213,61	240	Hermes
⊙ Århus Klint	28060	4422	4,31	190,61	214	Hermes
4 sønner. Døtres gns.		5051	4,32	218,03	245	

Alborg Bitz:

Djurs Bitz	28748	5789	4,72	273,10	307	Thor
⊙ Horsens Bitz	28407	5412	4,85	262,41	296	Toke Sams
⊙ Århus Ask	28404	4594	4,39	201,89	227	Toke Sams
3 sønner. Døtres gns.		5265	4,67	245,80	277	

SDM:

Drost:

⊙ Skive Hal	7464	5843	4,15	242,54	272	Eduard
Thy Drost	7396	5612	4,29	241,02	270	Ponto
⊙ Egholm Drost	7516	5535	4,17	230,57	258	Gordon
Morsø Drost	7617	5008	4,33	216,71	243	Gordon
⊙ Dybbøl Drost	7283	4825	4,30	207,65	233	Gordon
⊙ Horsens Top	7300	4764	4,29	204,30	229	Ponto
⊙ Randers Drost ..	7278	4829	4,22	203,87	229	Theo
⊙ Hjørring Drost ..	7502	4489	4,30	192,91	216	Foch
⊙ Herning Drost	7308	4223	4,14	174,67	196	Ålborg Sten
9 sønner. Døtres gns.		5014	4,24	212,69	239	

⊙ Eftermalket med hånd.

Sneeker Diamant:							
⊙ Drost		e.A60	5465	4,25	232,49	261	Adema 21 v.d.W.
⊙ Sdj. Blok		e.A64	5101	4,41	225,20	253	Adema 21 v.d.W.
Give Robinea		7620	4977	4,14	206,13	231	Bernard
⊙ Århus Pietje		e.B41	4564	4,49	205,03	230	Adema 21 v.d.W.
4 sønner, Døtres gns.			5027	4,32	217,21	244	

Jelsumer Gerard Wouter:

Sdj. Sten	7606	5014	4,32	216,50	243	Stiensner A. Ad. 2
Sdj. Peter	7607	4946	4,25	210,08	236	Strandjutter 11
⊙ Haskera	6903	4507	4,33	195,25	219	Diamant
3 sønner. Døtres gns.		4822	4,30	207,28	233	

Trinton:

Århus Thor	7500	5085	4,48	227,57	256	Reints
⊙ Sdj. Trin	7407	4632	4,10	189,93	213	Theo
Varde Regent	7438	4007	4,34	173,82	195	153 Foch
3 sønner, Døtres gns.		4575	4,31	197,11	221	

Bast:

⊙ Bjerringbro Basta...	7390	5040	4,52	227,60	256	Rubin
Horsens Bast	7645	4024	4,39	176,61	198	Opmand
⊙ Give Bast	6791	3943	4,37	172,30	193	Hilmann
3 sønner. Døtres gns.		4336	4,43	192,17	216	

Jerseyrace:

Prins Nørreremark:

⊙ Hjørring Prins ..	2625	3712	6,69	248,36	282	Stavad Favorit
Hjørring Tæbring..	3103	3622	6,50	235,49	268	Morsø Lasse
⊙ Primus	2841	3641	6,38	232,45	264	Munkgård Ellekær
⊙ Ask Nordvest	2988	3652	6,36	232,24	264	Hans
⊙ Århus Lyng	2755	3350	6,46	216,42	246	Wilmann
⊙ Prins Syd	2892	3567	5,88	209,89	238	Prins Ellegård
⊙ Dybbøl Prins	2712	2909	6,30	183,26	208	Kattrup Ægir
7 sønner. Døtres gns.		3493	6,37	222,59	253	

© Eftermalket med hånd.

Der er anført 5 figurer, som viser henholdsvis mælkeydelse, fedtprocent, smørfedtydelse, proteinprocent og ydelsen af mælkeprotein for såvel Rød Dansk Malke race som Sortbroget Dansk Malke race og Jersey racen. Mælkeydelsen har været stigende gennem årene for alle 3 racer. Mælkeydelsen har i reglen været på samme niveau for RDM og SDM. Der har været stor stigning i den gennemsnitlige mælkeydelse for Jersey racen i de to sidste prøveår. Af figuren vedrørende fedtprocenten fremgår det, at Jersey racen har haft den største fremgang gennem årene. Smørfedtydelsen har været stigende inden for alle tre racer. Kurverne for proteinprocenterne er næsten vandrette, og derved viser kurverne for ydelsen af mælkeprotein samme retningslinier som kurverne for mælkeydelsen.

Tabel 1 indeholder oplysninger om holdenes gennemsnitlige ydelse i afkomsprøveåret 1967–68. Der er tillige anført tyrens fader samt navnet på den afkomsprøvestation, hvor prøven er gennemført.

Tabel 2 giver en oversigt over de tyre, som har mindst 3 afkomsprøvede sønner, og hvoraf mindst en er afkomsprøvet i 1967–68. Der er vedføjet © for de hold, som er afprøvet før 1967–68, og derfor er eftermalket med hånd. Der er tillige vedføjet ○ for holdene, som blev afprøvet før 1962–63, hvor der anvendtes 11 ml mælk ved gerbereringen. Der er desuden vedføjet * ved de hold, som blev afprøvet før 1960–61, idet kvierne på disse hold blev malket 3 gange daglig i vinterperioden.

Efter Sortemose er der afprøvet 33 sønner, og gennemsnitsydelsen for disse hold blev 259 kg smør. Mange af holdene opnåede høj mælkeydelse, og næsten alle holdene havde særdeles gode fedtprocenter. Holdene efter helbrødrene Kolding Top 69 og Rudme Ideal samt efter Stevns Ry, Elbo Sortemose, Hjørring Munkdrup og Kolding Sortemose 28 nåede alle over en gennemsnitsydelse på 250 kg smørfedt. Sønnerne efter Sortemose vil få betydning i de kommende år, da de er muskuløse og trivelige samt i besiddelse af særdeles gode ydelsesanlæg, men det kniber ofte med kvaliteten af lemmer og malkeorganer, og manglende evne til at lægge mælken ned forekommer lidt for hyppigt i denne gruppe.

Efter Rudme Ideal er afprøvet 22 sønner, og der er opnået usædvanlig smukke ydelsesresultater for disse hold, hvor gennemsnitsydelsen nåede helt op på 274 kg smør, hvilket er en meget fin gennemsnitsydelse for 22 hold. De højeste ydelsesresultater blev opnået på holdene efter Holme Øst, Dybbøl Ideal, Hornshøj Ideal, Ribe Ulf og Drot Østlolland. Malkbarheden var usædvanlig god for holdene efter Holme Øst, Drot Østlolland og Århus Niels, men det kneb med malkbarheden på flere af de øvrige hold, og på en del af holdene har kvierne været lidt for malkeprægede. Rudme Ideal har været enestående til at producere sønner med fremragende anlæg til såvel mælkeydelse som høj fedtprocent.

Der er afprøvet 21 sønner efter Morsø Ejlekær, og gennemsnitsydelsen blev 254 kg smør. I det foregående år var der stor ensartethed i holdenes gennemsnitsydelse inden for denne gruppe, men variationsbredden forøgedes betydeligt med resultaterne fra prøveåret 1967-68. Det højestydende hold var efter Holbæk Morskær. Malkbarheden var gennemgående god inden for denne gruppe, og flere af holdene opnåede særdeles smukke malkbarhedsresultater. På nogle af holdene har der været kælvningsvanskeligheder, og der har været en del døde kalve på enkelte af holdene, men der var også kælvningsvanskeligheder på afkomsprøveholdet efter Morsø Ejlekær. På flere af holdene i denne gruppe har kvierne haft for fyldige yvere efter malkningen, men denne egenskab fandtes også på afkomsprøveholdet efter Morsø Ejlekær. Når man ser bort fra kælvningsvanskelighederne, har de brugsmæssige egenskaber været gode inden for denne gruppe.

De 19 sønner efter Hadsten Wahl nåede et gennemsnitligt afkomsprøve-resultat på 260 kg smør. De højeste ydelsesresultater blev opnået på holdene efter Horsens Borg, Ålborg Nor, Hau Nøddekær og Rudme Unik. Eksteriøret var meget fremragende på flere af holdene, og der er grund til at fremhæve holdene efter Horsens Borg, Bonus, Nordfyns Aman, Åbenrå Øbo, Kolding Wahl 44 og Århus Gorm, da kvierne på disse hold var meget velbyggede.

Det gennemsnitlige afkomsprøveresultat for de 9 sønner efter Hjørring Munkdrup blev 255 kg smør. Der er stor variation i ydelsen inden for denne gruppe, hvor holdet efter Samsø Ulf nåede den højeste ydelse. Der er særdeles god muskulatur inden for denne gruppe, og på holdene efter Samsø Ulf og Bjerringbro Munk var kvierne usædvanlig kraftige og muskuløse.

Efter Nordfyns Frem er der afprøvet 4 sønner, og holdenes gennemsnitsydelse blev 262 kg smør. Det højestydende hold var efter Langelands Gut, som udmærkede sig ved en meget flad laktationskurve.

Med Bornholms Ydan, der blev afprøvet i det forløbne år, er der nu afprøvet 4 sønner efter Stevns Klint, og det gennemsnitlige afkomsprøve-resultat blev 245 kg smør. Der var meget med yverbetændelse hos kvierne i disse hold, og kvierne var ikke så robuste, som man kunne ønske.

Der er afprøvet 3 sønner efter Ålborg Bitz, og gennemsnitsydelsen for disse hold blev 277 kg smør. Holdene efter Djurs Bitz og Horsens Bitz var højtydende, medens det tredje hold ikke nåede et antageligt ydelsesniveau.

Inden for Sortbroget Dansk Malkerace er anført 5 grupper.

Der er afprøvet 9 sønner efter Drost, og det gennemsnitlige afkomsprøveresultat blev 239 kg smør. Der opnåedes gode ydelsesresultater på holdene efter Skive Hal og Thy Drost, men det kneb med ydelsen på de lavestydende hold. Kvierne var meget kraftige og muskuløse på flertallet af holdene inden for denne gruppe.

Gennemsnitsydelsen for holdene efter de 4 sønner af Sneeker Diamant blev 244 kg smør. De bedste ydelsesresultater blev opnået på holdene efter Drost og Sdj. Blok.

De 3 sønner efter Jelsumer Gerard Wouter nåede kun et gennemsnitligt afkomsprøveresultat på 233 kg smør.

Efter Trinton er afprøvet 3 sønner, men holdenes gennemsnitsydelse blev kun 221 kg smør. De to af holdene var udpræget lavtydende.

Det gennemsnitlige afkomsprøveresultat for de 3 sønner efter Bast blev kun 216 kg smør. De to af holdene opnåede meget dårlige ydelsesresultater.

Inden for Jerseyracen findes kun gruppen efter Prins Nørremark, der omfatter holdene efter 7 sønner. Gennemsnitsydelsen blev 253 kg smør. Der er en del variation i ydelsestallene inden for denne gruppe. Den højeste ydelse blev opnået af holdet efter Hjørring Prins.

II. Afkomsprøverne 1967-68.

Beretningen omfatter 70 tyre, hvis døtre blev afprøvet på 24 stationer.

Jylland:

Dybvadgård, Dybvad: Hjørring Vagn, Hjørring Nørreby, Hjørring Zelo, Hjørring Vester, Hjørring Baun og Hjørring Tæbring.

Kronborg, Thisted: Thy Drost og Thy Juvel.

Morsø, Nykøbing M.: Morsø Munk og Morsø Drost.

Lundgård, Overlade: Ålborg Nor, Kern, Ålborg Cor og Ålborg Knud.

Krarup Nygård, Skive: Skive Sten og Skive Bert.

Lægård, Holstebro: Fåborg Moss og Fåborg Nat.

Rosenfeldt, Ulstrup: Bjerringbro Munk, Bjerringbro Frans og Bjerringbro Rico.

Kalø Hovedgård, Rønne: Djurs Bitz, Hammel Ideal, Sortkær, Hadsten Adson, Gefion, Bjerringbro Hoff og Randers Russ.

Elkjær, Hornslet: Århus Gorm, Århus Thor og Århus Tax.

Moesgård, Kibæk: Herning Munk, Herning Esp og Årup Vestfyns Gems.

Østerhåb, Hatting: Horsens Bast, Horsens Frank og Årup Vestfyns Fax.

Skovgård, Ammitsbøl, Vejle: Skærup Ørnkær, Give Robinea og Egholm Russ.

Vardegård, Varde: Varde Wano, Varde Bram og Varde Regent.

Gelballegård, Lunderskov: Kolding Eg og Kolding Bos.

Skølvad, Gørding: Ribe Ås, Holm Syd, Vax Syd og Hoff Syd.

Brøstrupgård, Rødding: Åbenrå Sortemose, Sdj. Sten, Sdj. Peter og Sdj. Corr.

Veesbæk, Sønderborg: Dybbøl Od, Dybbøl Rhin og Dybbøl Faust.

Fyn:

Ejstrupgård, Kavslunde: Årup Vestfyns Prins, Sydvestfyns Fast og Sydvestfyns Jon.

Enemærket, Lunde Fyn: Nordfyns Urban, Centrum's Værn og Rudme Søe.

Sjælland:

Torntofte, Høng: Holbæk Morskær og Holbæk Sjus.

Grønhøjgård, Fårdrup, Slagelse: Haslev Ideal og Ejlekær Sydvest.

Sydsjælland, Lundby: Hau Nøddekær.

Lolland-Falster:

Bellinge, Nykøbing FL.: Langelands Gut og M. A. Cæsar.

Bornholm:

Kannikegård, Akirkeby: Bornholms Ydan.

Der blev afprøvet 56 hold i Jylland, 6 på Fyn, 5 på Sjælland, 2 på Lolland-Falster og 1 på Bornholm.

Efter race var fordelingen følgende:

32 hold af RDM
23 hold af SDM
15 hold af Jerseyrace

A. Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

I nedenstående oversigt findes en gruppering efter tyrenes alder ved prøvens begyndelse for de sidste 3 år.

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1967—68		1966—67		1965—66	
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
under 4	1	1,4	1	1,3	3	3,7
4—5	41	58,6	46	59,7	44	54,4
5—6	22	31,4	27	35,1	26	32,1
6—7	6	8,6	3	3,9	6	7,4
7—8	—	—	—	—	1	1,2
over 8	—	—	—	—	1	1,2
I alt	70	100,0	77	100,0	81	100,0

42 af de 70 tyre, der afprøvedes i 1967—68 var under 5 år ved prøvens begyndelse. De 6 ældste tyre var i alderen 6—7 år ved prøvens begyndelse.

B. Afgangsårsagerne.

På enkelte af holdene blev udsætterprocenten meget stor, men ca. en fjerdedel af holdene gennemførte prøven med det samme antal kvier, som der var ved indsættelsen.

Følgende oversigt giver oplysning om afgangsårsagerne for hovedparten af kvierne:

44	blev	udsat	på	grund	af	yverlidelser		3,2	%	mod	2,6%	sidste	år
12	»	»	»	»	»	streng	kælvn. og børbet.	..	0,9%	»	0,9%	»	»
7	»	»	»	»	»	kælvning	før tiden		0,5%	»	0,7%	»	»
5	»	»	»	»	»	benlidelser		0,4%	»	0,1%	»	»	»
5	»	»	»	»	»	hormonale	forstyrrelser	..	0,4%	»	0,2%	»	»
2	»	»	»	»	»	lungeinfektioner		0,1%	»	0,3%	»	»	»
2	»	»	»	»	»	mave- og tarmlidelser		0,1%	»	0,1%	»	»	»
2	»	»	»	»	»	fremmedlegemer		0,1%	»	0,0%	»	»	»
2	»	»	»	»	»	hjerotelidelser		0,1%	»	0,0%	»	»	»
1	»	»	»	»	»	leverlidelser		0,1%	»	0,1%	»	»	»
7	»	»	»	»	»	andre årsager		0,5%	»	0,6%	»	»	»

Der udsattes i alt 89 kvier, og det svarer til 6,5 pct., hvilket er ret normalt. I 1966-67 blev udsætterprocenten kun 5,5, men i de to foregående år var den 6,7. Det var som sædvanlig yverlidelserne, der gav anledning til den hyppigste afgangsårsag, og ca. halvdelen af de udsatte kvier blev udsat på grund af yverlidelser. Procentisk er der udsat flere på grund af yverlidelse end i 1966-67, og dette har været medvirkende til, at udsætterprocenten blev højere end i 1966-67. Streng kælvning og børbetændelse kom på andenpladsen, men dette var også tilfældet i de to foregående år. Den tredje hyppigste afgangsårsag var kælvning før tiden, men denne afgangsårsag kom også på tredjepladsen i de to foregående år. Enkelte af disse kvier kælvde et godt stykke tid før den normale drægtighedstid var udløbet. For enkelte af kviernes vedkommende var der næppe tvivl om, at de kælvde efter at have været udsat for et kraftigt stød. 5 kvier blev udsat på grund af benlidelser, og der var forskellige former for benlidelser, men det var ikke staldkrampe. I 1966-67 blev kun udsat 0,1 pct. på grund af benlidelser, medens det var 0,4 pct. i 1965-66. Der blev udsat 5 kvier på grund af hormonale forstyrrelser, og de var fordelt med en kvie på holdene efter Varde Bram, Dybbøl Od, Kolding Bos, Bjerringbro Hoff og Sydvestfyns Jon. Disse kvier kunne eller ville ikke lægge mælken ned. Gruppen andre årsager omfatter 7 kvier. Ved beregning af udsætterprocenten er som sædvanlig ikke medregnet kvier, der er udsat før kælvning, hvilket finder sted for enkeltes vedkommende, men årsagen er næsten altid, at faderskabet ikke har kunnet bekræftes. Desuden kommer der i reglen et par kvier hvert år, som ikke er drægtige, men sådanne kvier betragtes ikke som indgæede forsøgskvier.

Der var stor forskel på, hvor mange kvier som blev udsat på de forskellige hold, hvilket fremgår af følgende oversigt:

På 18 hold er ingen afgået under prøven					
» 31 » » »	afgået 1 kvie pr. hold				
» 11 » » » »	2 kvier » »				
» 7 » » » »	3 » » »				
» 1 » » » »	4 »				
» 1 » » » »	5 »				
» 1 » » » »	6 »				

På holdene efter Langelands Gut, Ålborg Nor, Bornholms Ydan, M. A. Cæsar, Varde Bram, Varde Regent og Sydvestfyns Jon blev der udsat 3 kvier pr. hold. På holdet efter Ålborg Cor blev det nødvendigt at udsætte 4 kvier, men det kneb i øvrigt med konstitutionen på dette hold. De fleste udsættelser fandt imidlertid sted på holdene efter Sortkær og Århus Gorm, hvor der blev udsat henholdsvis 5 og 6 kvier.

Udsætterprocenten for de forskellige racer blev følgende:

RDM	8,2%	mod 7,0%	sidste år
SDM	6,0%	» 3,6%	» »
Jerseyrace	3,4%	» 4,5%	» »

Udsætterprocenten har været højest for Rød Dansk Malkerace i de to sidste år. Udsætterprocenten var lavest for Jerseyracen, men denne race har ofte haft den mindste udsætterprocent.

C. Kælvetiden.

Kvierne skal efter reglerne kælte fra 15. september til 31. oktober, men som det ses af følgende oversigt, er der en del, som har kælvet uden for de i reglerne fastsatte kælvningsdatoer.

	Før 15. september	Efter 31. oktober	I alt
Antal kvier i 1967-68	246	151	397
Procent » » 1967-68	19,1	11,7	30,8
» » » 1966-67	17,3	12,4	29,7
» » » 1965-66	14,5	14,0	28,5
» » » 1964-65	11,6	15,6	27,2

30,8 pct. af kvierne kælvende uden for det i reglerne fastsatte kælvningsinterval, men det skulle være muligt at få reglerne betydeligt bedre overholdt med hensyn til kælvningstidspunktet. Det ses af den sidste kolonne, at der er foregået en meget uheldig udvikling, idet der procentisk er forekommet en stigning fra år til år siden 1964-65 med hensyn til kvier, som har kælvnet uden for det tidsinterval, som er fastsat i reglerne. Der har været en ned-

gang i antallet af sene kælvninger i de seneste år, men der er til gengæld forekommet en endnu kraftigere stigning i antallet af tidlige kælvninger. Racemæssigt var det bedst for Rød Dansk Malkerace, hvor 72 pct. kævede i det rigtige tidsrum, mens den tilsvarende procent blev 69 og 66 for henholdsvis Jerseyracen og Sortbroget Dansk Malkerace. Der var således den største variation i kælvetiden for Sortbroget Dansk Malkerace.

Ingen af holdene havde i det forløbne år alle kvier til at kæve i det ønskede interval, men på holdene efter Ålborg Nor og Varde Regent var der kun 1 kvie, som kævede uden for det i reglerne fastsatte kævningsinterval.

Følgende hold havde mindst 50 pct. af kvierne, som kævede uden for det i reglerne fastsatte kævningsinterval: Nordfyns Urban, Haslev Ideal, Ålborg Cor, Ålborg Knud, Sdj. Sten, Holm Syd og Bjerringbro Hoff.

D. Kævningsforløbet.

I *tabel 3* findes oplysning om antallet af levende fødte og dødfødte kalve samt om de kalve, som døde i 1. eller 2. døgn. Der er 3 kolonner, som giver oplysning om normale og misdannede kalve samt om antallet af kalve, som ikke lå i naturlig stilling i moderen før fødslen. Kælvningerne er af assistenterne opgivet som normale, lidt besværlige eller meget besværlige. Der er desuden oplysning om antal kælvninger, hvor dyrlægen er tilkaldt. Endelig er anført antallet af kælvninger, hvor det har været nødvendigt at partere kalven eller tage den ved kejsersnit.

Denne undersøgelse omfatter ikke det samme antal kvier, som prøverne er gennemført med, idet eventuelt udsatte kvier er med i denne undersøgelse. Det ville give et forkert billede, hvis kvier, som blev udsat på grund af streng kælvning, ikke kom med i denne undersøgelse. Der er dog 16 kvier, som ikke kom med i denne undersøgelse, men det skyldes, at de har født tvillinger eller krydsningskalve, 11 kvier fødte tvillinger, og 5 fødte krydsningskalve. Disse 16 kvier var delt på 15 forskellige hold, og 10 var af RDM, 3 af SDM og 3 af Jerseyracen.

Inden for Rød Dansk Malkerace blev en kvie ikke medtaget på holdene efter Skærup Ørnkær, Bornholms Ydan, Hjørring Vagn, Skive Sten, Varde Wano, Morsø Munk og Ejlekær Sydvest på grund af tvillingfødsel, og desuden udgik en kvie på holdene efter Holbæk Morskær, Ålborg Nor og Sydvestfyns Fast, da de fødte krydsningskalve. Inden for Sortbroget Dansk Malkerace blev 3 kvier ikke medtaget på grund af tvillingfødsel, og disse kvier tilhørte holdene efter Skive Bert, Dybbøl Faust og Herning Esp. Der var kun 3 Jerseykvier, som ikke blev medtaget i undersøgelsen. En kvie var fra holdet efter Horsens Frank, den fødte en krydsningskalv. De to andre

Tabel 3. Oplysninger om kælvningsforløbet.
Table 3. Information about the calvingprocess

Tyrens navn	Antal døtre	Antal kalve							Antal kælvninger			Dyrlæge tilkaldt	Partering eller køjersnit
		levende fødte	død-fødte	døde i 1. døgn	døde i 2. døgn	normale	mis-dannede	lå forkert	normale	lidt besværlige	meget besværlige		
		Number of calves							Number of calvings				
Name of bull	Number of daughters	born alive	born dead	dead during 1st day	dead during 2nd day	normal	abnormal	mis-placed	normal	slightly difficult	very difficult	Vet. assistance	Dissection or caesarean
RDM:													
Holbæk Morskær	18	13	5	—	—	18	—	3	11	3	4	5	1
Djurs Bitz	20	19	1	—	—	20	—	1	14	5	1	3	1
Langelands Gut	21	20	1	—	—	21	—	—	21	—	—	—	—
Ålborg Nor	19	14	5	—	—	18	1	—	18	1	—	2	—
Hammel Ideal	20	17	3	—	—	20	—	2	18	1	1	1	1
Hau Nøddekær	19	17	2	—	1	19	—	2	15	1	3	3	—
Nordfyns Urban	21	21	—	—	—	21	—	—	20	—	1	1	—
Haslev Ideal	20	18	2	—	—	20	—	4	17	2	1	1	—
Ribe As	20	17	3	1	—	20	—	3	16	4	—	—	—
Bjerringbro Munk	20	20	—	—	—	20	—	—	20	—	—	—	—
Skærup Ørnkær	17	14	3	—	—	17	—	2	14	2	1	1	—
Bornholms Ydan	20	18	2	—	—	20	—	1	16	2	2	1	—
Centrums Værn	20	15	5	—	—	20	—	4	16	3	1	2	—

Århus Gorm	22	19	3	=	=	21	1	1	19	1	2	2	1
Årup Vestfyns Prins ..	20	18	2	1	-	19	1	-	18	2	-	-	1
Fåborg Moss	18	15	3	1	-	18	-	2	13	1	4	4	1
Hjørring Vagn	20	17	3	-	-	19	1	3	15	2	3	3	1
Kolding Eg	17	13	4	-	-	15	2	3	12	4	1	3	1
M. A. Cæsar	19	18	1	-	-	19	-	1	17	1	1	1	1
Skive Sten	20	19	1	-	-	19	1	1	19	-	1	2	1
Rudme Sø	21	14	7	-	-	21	-	2	17	3	1	2	1
Varde Wano	18	17	1	1	-	18	-	1	17	1	-	-	1
Hjørring Nørreby	20	19	1	-	-	20	-	1	15	2	3	2	1
Herning Munk	20	18	2	-	-	20	-	-	19	-	1	-	1
Morsø Munk	21	21	-	1	-	21	-	4	15	3	3	3	1
Dybbøl Od	17	14	3	-	-	16	1	-	16	-	1	-	1
Åbenrå Sortemose	21	19	2	-	-	21	-	1	20	1	-	-	1
Sortkær	20	17	3	-	-	20	-	1	18	1	1	-	1
Dybbøl Rhin	20	18	2	-	-	20	-	1	18	1	1	1	1
Varde Bram	19	17	2	1	-	19	-	1	16	1	2	-	1
Ejlekær Sydvest	19	18	1	-	-	19	-	1	16	2	1	2	1
Sydvestfyns Fast	19	19	-	-	-	19	-	1	17	2	-	-	1
I alt (Total)	626	553	73	6	1	618	8	47	533	52	41	45	3
Pct.	-	88,3	11,7	1,0	0,2	98,7	1,3	7,5	85,1	8,3	6,6	7,2	0,5

Tyrøns navn	Antal døtre	Antal kalve							Antal kælvninger			Dyrlæge til- kaldt	Partering eller kejserensnit
		levende fødte	død- fødte	døde i 1. døgn	døde i 2. døgn	nor- male	mis- dannede	lå forkert	nor- male	lidt be- sværlige	meget be- sværlige		
		Number of calves							Number of calvings				
Name of bull	Number of daughters	born alive	born dead	dead during 1st day	dead during 2nd day	nor- mal	abnor- mal	mis- placed	nor- mal	slightly difficult	very difficult	Vet. assist- ance	Dissection or caesarean
SDM:													
Skive Bert	18	18	—	—	—	18	—	3	18	—	—	1	—
Bjerringbro Frans	20	20	—	—	—	20	—	1	17	2	1	2	—
Thy Drost	21	20	1	—	—	21	—	1	17	3	1	3	—
Kolding Bos	20	20	—	2	—	20	—	—	19	1	—	1	—
Dybbøl Faust	21	18	3	—	—	21	—	4	16	3	2	1	—
Kern	18	16	2	—	—	18	—	—	17	—	1	2	—
Bjerringbro Rico	20	18	2	—	—	20	—	—	18	2	—	1	—
Ålborg Cor	20	14	6	—	—	20	—	1	14	3	3	8	2
Århus Thor	20	18	2	1	—	20	—	3	16	3	1	—	—
Ålborg Knud	19	17	2	—	—	19	—	1	19	—	—	—	—
Hjørring Zelo	14	13	1	—	—	14	—	2	9	1	4	2	—
Herning Esp	19	16	3	1	—	19	—	—	18	—	1	—	—
Morsø Drost	20	20	—	—	—	20	—	3	18	1	1	2	—
Sdj. Sten	18	18	—	—	—	18	—	2	18	—	—	1	—
Thy Juvel	20	20	—	—	—	20	—	1	18	2	—	—	—
Sdj. Peter	21	20	1	1	—	21	—	4	19	1	1	4	1
Give Robinea	20	19	1	1	—	20	—	1	16	4	—	—	—
Sdj. Corr	21	18	3	—	—	20	1	4	15	2	4	6	1
Hadsten Adson	19	18	1	—	—	19	—	2	15	3	1	2	—

Horsens Bast	20	19	1	1	-	20	-	1	19	-	1	-	-
Varde Regent	22	20	2	-	-	22	-	2	20	1	1	1	-
Hjørring Vester	16	14	2	-	-	16	-	-	9	4	3	1	1
Århus Tax	19	19	-	-	-	19	-	-	18	-	1	1	-
I alt (Total)	446	413	33	7	-	445	1	36	383	36	27	39	5
Pct.	-	92,6	7,4	1,6	-	99,8	0,2	8,1	85,9	8,1	6,0	8,7	1,1

Jerseyrace:

Horsens Frank	20	19	1	-	-	20	-	1	20	-	-	-	-
Egholm Russ	20	19	1	-	-	20	-	2	18	2	-	-	-
Gefion	20	20	-	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-
Hjørring Baun	19	19	-	-	-	19	-	1	17	1	1	-	-
Holm Syd	21	21	-	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-
Årup Vestfyns Fax	20	19	1	-	-	20	-	1	20	-	-	-	-
Holbæk Sjus	16	16	-	-	-	16	-	-	16	-	-	-	-
Bjerringbro Hoff	15	15	-	-	-	15	-	-	15	-	-	-	-
Fåborg Nat	17	17	-	-	-	17	-	1	17	-	-	-	-
Vax Syd	22	20	2	-	-	22	-	1	21	1	-	-	-
Randers Russ	21	20	1	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-
Sydvestfyns Jon	23	20	3	1	-	23	-	-	23	-	-	2	-
Hjørring Tæbring	19	19	-	-	-	19	-	1	17	2	-	-	-
Hoff Syd	16	16	-	-	-	16	-	-	16	-	-	-	-
Årup Vestfyns Gems ..	20	18	2	-	-	19	1	2	18	1	1	1	-
I alt (Total)	289	278	11	1	-	288	1	10	280	7	2	3	-
Pct.	-	96,2	3,8	0,3	-	99,7	0,3	3,4	96,9	2,4	0,7	1,0	-

Tabel 4. Kviernes vægt.

Table 4. Weight of the cows

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Vægt i kg				
	ved ankomst	efter kælvning	ved udbinding	ved prøvens afslutning	ved hjem- sendelse
	<i>Weight in kg</i>				
	<i>at arrival</i>	<i>after calving</i>	<i>before pasture</i>	<i>at end of testing</i>	<i>before sen- ding home</i>
RDM:					
Holbæk Morskær	541	524	560	571	571
Djurs Bitz	491	474	542	532	536
Langelands Gut	500	485	558	532	532
Ålborg Nor	531	530	609	597	597
Hammel Ideal	476	469	530	530	531
Hau Nøddekær	518	543	579	600	603
Nordfyns Urban	491	500	566	561	579
Haslev Ideal	485	488	537	545	545
Ribe Ås	489	499	556	550	554
Bjerringbro Munk	511	503	578	574	574
Skærup Ørnkær	471	481	538	553	556
Bornholms Ydan	504	495	537	537	537
Centrums Værn	496	500	564	561	578
Århus Gorm	497	491	543	561	561
Årup Vestfyns Prins	491	484	542	555	556
Fåborg Moss	458	471	534	536	536
Hjørring Vagn	515	492	533	549	549
Kolding Eg	481	473	549	550	550
M. A. Cæsar	453	483	568	572	572
Skive Sten	508	491	524	550	550
Rudme Søe	472	488	540	551	551
Varde Wano	511	504	523	546	555
Hjørring Nørreby	500	478	518	539	539
Herning Munk	523	521	575	599	600
Morsø Munk	529	512	564	575	577
Dybbøl Od	453	460	535	549	549
Åbenrå Sortemose	494	489	546	570	581
Sortkær	496	497	578	569	569
Dybbøl Rhin	538	521	589	600	600
Varde Bram	467	471	518	534	537
Ejlekær Sydvest	490	484	559	547	551
Sydvestfyns Fast	509	486	562	574	576
Gns. (Average)	497	493	552	558	561

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Vægt i kg				
	ved ankomst	efter kælvning	ved udbinding	ved prøvens afslutning	ved hjem- sendelse
	<i>Weight in kg</i>				
	<i>at arrival</i>	<i>after calving</i>	<i>before pasture</i>	<i>at end of testing</i>	<i>before sen- ding home</i>
SDM:					
Skive Bert	528	518	548	581	582
Bjerringbro Frans	578	555	605	617	617
Thy Drost	556	547	612	630	635
Kolding Bos	488	486	543	551	551
Dybbøl Faust	548	528	592	611	611
Kern	515	509	602	606	606
Bjerringbro Rico	525	524	581	606	606
Ålborg Cor	516	507	583	596	596
Århus Thor	503	494	551	594	594
Ålborg Knud	536	517	606	627	627
Hjørring Zelo	545	529	567	600	600
Herning Esp	511	527	548	589	589
Morsø Drost	531	528	581	591	592
Sdj. Sten	517	528	570	599	601
Thy Juvel	517	508	575	594	595
Sdj. Peter	515	512	564	582	591
Give Robinea	511	503	572	604	605
Sdj. Corr	533	517	570	594	594
Hadsten Adson	522	509	576	580	580
Horsens Bast	484	494	545	568	572
Varde Regent	514	510	552	586	591
Hjørring Vester	500	495	541	588	588
Århus Tax	500	496	549	597	598
Gns. (Average)	521	515	571	595	597

Jerseyrace:

Horsens Frank	326	346	351	370	370
Egholm Russ	322	339	371	383	384
Gefion	328	342	377	368	368
Hjørring Baun	338	351	353	370	370
Holm Syd	309	336	363	364	365
Årup Vestfyns Fax	321	333	350	360	360
Holbæk Sjus	316	331	349	366	366
Bjerringbro Hoff	332	351	384	365	365
Fåborg Nat	312	337	366	365	365
Vax Syd	300	331	355	345	345
Randers Russ	309	326	365	364	364
Sydvestfyns Jon	322	335	366	375	377
Hjørring Tæbring	348	357	373	392	392
Hoff Syd	313	335	362	359	362
Årup Vestfyns Gems	335	358	384	403	403
Gns. (Average)	322	341	365	370	370

Tabel 5. Kalvenes vægt.
Table 5. Weight of the calves

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Tyrekalve		Kviekalve		Alle kalve	
	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg
	<i>Males</i>		<i>Females</i>		<i>All calves</i>	
	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>
RDM:						
Holbæk Morskær	9	43	8	41	17	42
Djurs Bitz	8	41	10	40	18	41
Langelands Gut	12	38	5	34	17	37
Ålborg Nor	10	41	7	38	17	40
Hammel Ideal	6	40	12	36	18	37
Hau Nøddekær	7	36	12	36	19	36
Nordfyns Urban	11	41	9	39	20	40
Haslev Ideal	8	41	11	40	19	40
Ribe Ås	9	42	11	37	20	39
Bjerringbro Munk	11	39	9	37	20	38
Skærup Ørnkær	10	40	5	36	15	39
Bornholms Ydan	6	38	11	37	17	37
Centrums Værn	5	41	14	37	19	38
Århus Gorm	7	39	9	34	16	36
Årup Vestfyns Prins ..	11	40	8	37	19	39
Fåborg Moss	8	40	8	36	16	38
Hjørring Vagn	7	41	11	38	18	39
Kolding Eg	8	39	9	34	17	36
M. A. Cæsar	6	41	10	33	16	36
Skive Sten	8	39	11	37	19	38
Rudme Søe	10	41	9	37	19	39
Varde Wano	5	39	12	34	17	35
Hjørring Nørreby	8	45	11	38	19	41
Herning Munk	12	41	7	38	19	40
Morsø Munk	8	44	11	42	19	43
Dybbøl Od	11	41	5	41	16	41
Åbenrå Sortemose	9	39	11	39	20	39
Sortkær	7	39	8	35	15	37
Dybbøl Rhin	8	39	11	37	19	38
Varde Bram	8	37	8	36	16	36
Ejlekær Sydvest	14	44	4	40	18	43
Sydvestfyns Fast	9	39	9	36	18	38
Gns. (Average)	48%	40	52%	37	—	39

Tyrens navn	Tyrekalve		Kviekalve		Alle kalve	
	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg
	<i>Males</i>		<i>Females</i>		<i>All calves</i>	
<i>Name of bull</i>	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>
SDM:						
Skive Bert	11	37	6	33	17	35
Bjerringbro Frans	13	40	7	35	20	38
Thy Drost	8	38	11	35	19	36
Kolding Bos	7	38	12	34	19	35
Dybbøl Faust	10	39	11	37	21	38
Kern	6	36	10	34	16	35
Bjerringbro Rico	9	38	10	34	19	36
Ålborg Cor	7	36	8	33	15	35
Århus Thor	7	39	12	36	19	37
Ålborg Knud	12	38	6	34	18	37
Hjørring Zelo	8	39	4	34	12	37
Herning Esp	9	41	8	37	17	39
Morsø Drost	6	43	14	40	20	40
Sdj. Sten	9	40	8	36	17	38
Thy Juvel	10	40	10	37	20	38
Sdj. Peter	6	36	13	35	19	35
Give Robinea	9	38	9	35	18	36
Sdj. Corr	5	39	13	36	18	37
Hadsten Adson	12	40	6	35	18	39
Horsens Bast	10	38	10	34	20	36
Varde Regent	6	37	13	34	19	35
Hjørring Vester	7	40	8	36	15	38
Århus Tax	5	35	14	32	19	33
Gns. (Average)	46%	38	54%	35	—	37

Jerseyrace:

Horsens Frank	12	21	6	22	18	21
Egholm Russ	9	22	10	21	19	21
Gefion	9	24	11	22	20	23
Hjørring Baun	11	24	8	22	19	23
Holm Syd	12	26	9	23	21	25
Årup Vestfyns Fax	5	23	14	21	19	21
Holbæk Sjus	7	24	9	22	16	23
Bjerringbro Hoff	7	22	7	21	14	22
Fåborg Nat	8	24	9	21	17	22
Vax Syd	11	24	11	24	22	24
Randers Russ	10	23	10	20	20	21
Sydvestfyns Jon	10	23	10	19	20	21
Hjørring Tæbring	8	23	10	22	18	23
Hoff Syd	7	24	8	21	15	22
Årup Vestfyns Gems ..	10	23	9	24	19	23
Gns. (Average)	49%	23	51%	22	—	22

tilhørte holdet efter Bjerringbro Hoff. Den ene fødte en krydsningskalv, medens den anden fødte tvillinger.

Det fremgår klart af tabellen, at der procentisk blev født flest levende kalve inden for Jerseyracen, og at der procentisk var flest dødfødte kalve inden for Rød Dansk Malkerace, og dette er i overensstemmelse med den tilsvarende undersøgelse i 1966-67. Det var kun få kalve, der var født levende, som døde i 1. eller 2. døgn. Der var 8 røde, 1 sortbroget og 1 Jerseykalv, som var misdannet. Ca. 8 procent af røde og sortbrogede kalve havde en forkert placering før fødslen, medens der kun var 3,4 pct. inden for Jerseyracen.

Af kolonnerne vedrørende assistenternes oplysninger om kælvningsforløbet ses det, at ca. 8 pct. af kælvningerne inden for RDM og SDM er betegnet som lidt besværlige, medens 6-7 pct. er betegnet som meget besværlige. 96,9 pct. af Jerseykviernes kælvninger blev betegnet som normale, og denne race har betydeligt færre kælvningsvanskeligheder, end der findes inden for RDM og SDM.

Der har været dyrlægetilkaldelse til ca. 7 pct. af kælvningerne inden for RDM mod ca. 9 pct. for SDM. Der har kun været dyrlægetilkaldelse til 3 kælvninger inden for Jerseyracen, og det svarer til 1,0 pct. Inden for Rød Dansk Malkerace blev der foretaget 3 parteringer, medens der blev foretaget 4 parteringer og et kejsersnit inden for Sortbroget Dansk Malkerace. Det blev ikke nødvendigt at foretage parteringer eller kejsersnit inden for Jerseyracen.

E. Kviernes vægt.

I tabel 4 findes oplysning om kviernes gennemsnitsvægt på de forskellige hold. Gennemsnitsvægten er anført ved ankomst, efter kælvning, ved udbinding samt ved prøvens slutning og ved hjemsendelse, men på mange af holdene blev gennemsnitsvægten den samme i de to sidste kolonner.

Gennemsnitsvægten for de røde hold blev 497 kg ved modtagelse og 561 kg ved hjemsendelse, og det giver en tilvækst på 64 kg, hvilket er særdeles fint og lidt mere end i de nærmest foregående år. Tilvæksten er hovedsagelig forekommet i vinterperioden.

Den gennemsnitlige vægt for holdene af SDM blev 521 kg ved modtagelse og 597 kg ved hjemsendelse, og den gennemsnitlige tilvækst blev derved 76 kg. Tilvæksten var større end i de nærmest foregående år. Holdene af SDM havde lidt større tilvækst end holdene af RDM. Fra kælvning og til udbinding blev den gns. tilvækst 59 kg for RDM og 56 kg for SDM. Holdene af SDM havde betydelig større tilvækst i sommerperioden end holdene af RDM, men denne forskel har været karakteristisk fra år til år.

Jerseyholdene vejede 322 kg i gns. ved modtagelse og 370 kg ved hjem-

sendelse, og det giver en tilvækst på 48 kg, hvilket er knap så meget som i de nærmest foregående år. Jerseyholdene var fantastisk højtydende i det forløbne prøveår, og højtydende kvier har i reglen lidt mindre tilvækst end lavtydende.

F. Kalvenes vægt.

I tabel 5 er anført den gennemsnitlige fødselsvægt for kalvene på de forskellige hold, og der er oplysning om antallet af tyre- og kviekalve samt deres gennemsnitsvægt. Tvillingkalve er ikke medtaget i denne opgørelse, da de kan give misvisende resultater, idet de næsten altid er betydeligt mindre end enkeltfødte kalve.

Gennemsnitsvægten for Rød Dansk Malkerace blev 39 kg, og det er det samme som i de 3 foregående år. For Sortbroget Dansk Malkerace blev gennemsnitsvægten 37 kg, hvilket er det samme som i 1966-67. Jerseykalvenes gennemsnitlige fødselsvægt blev 22 kg, og i de sidste 4 år har den været 22 eller 23 kg. Kalvenes gennemsnitsvægt ligger ret konstant fra det ene år til det andet for alle tre racer, og kalvene af RDM vejer i gennemsnit lidt mere ved fødsel end kalvene af SDM; godt 50 pct. af kalvene var kviekalve for alle tre racer.

Inden for Rød Dansk Malkerace blev de tungeste kalve født på holdene efter Morsø Munk og Ejlekær Sydvest samt Holbæk Morskær, hvor gennemsnitsvægten blev henholdsvis 43 kg og 42 kg. Der blev også født store kalve på holdene efter Djurs Bitz, Hjørring Nørreby og Dybbøl Od, idet gennemsnitsvægten på disse hold blev 41 kg. De mindste kalve forekom på holdet efter Varde Wano, hvor gennemsnitsvægten kun blev 35 kg. Den gennemsnitlige fødselsvægt blev kun 36 kg for kalvene fra holdene efter Hau Nøddekær, Århus Gorm, Kolding Eg, M. A. Cæsar og Varde Bram.

Kalvene var forholdsvis små på en del af de sortbrogede hold, og den gennemsnitlige fødselsvægt blev kun 33 kg for de fødte kalve på holdet efter Århus Tax. Kalvene fra holdene efter Skive Bert, Kolding Bos, Kern, Ålborg Cor, Sdj. Peter og Varde Regent vejede kun 35 kg i gennemsnit ved fødsel. De tungeste kalve forekom på holdet efter Morsø Drost, hvor den gennemsnitlige fødselsvægt blev 40 kg.

Inden for Jerseyracen blev de tungeste kalve født på holdene efter Holm Syd og Vax Syd, hvor gennemsnitsvægten blev henholdsvis 25 og 24 kg. På de resterende hold blev gennemsnitsvægten for de fødte kalve 21, 22 eller 23 kg, hvilket er en ret normal fødselsvægt for kalve efter kvier af denne race.

Tyrekalvene vejede i gennemsnit 3 kg mere end kviekalvene for RDM og SDM, mens forskellen kun blev 1 kg for Jerseyracens vedkommende.

G. Drægtighedsforholdene.

96,7 pct. af kvierne var erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og dette er rekord, idet der ikke i de tidligere år procentisk har været så mange drægtige ved hjemsendelsen som i det forløbne år. I 1966-67 var 94,3 og i 1965-66 94,1 pct. af kvierne erklæret drægtige ved hjemsendelsen. 47,0 pct. blev erklæret drægtige efter 1. inseminering mod 46,0 i 1966-67. I gennemsnit medgik der 2,0 insemineringer pr. drægtighed, hvilket er det samme som i de to foregående år. Insemineringer pr. drægtighed udregnes på grundlag af de insemineringer, som er medgået til de kvier, der blev erklæret drægtige. Hvis en kvie kaster efter at være blevet erklæret drægtig, og den derefter bliver drægtig igen, medregnes kun insemineringer til den første drægtighed. Ved beregning af procent drægtige efter 1. inseminering medtages det samlede antal kvier i beregningen.

De opnåede drægtighedsresultater var særdeles tilfredsstillende. For de enkelte racer opnåedes følgende resultater:

RDM	97,3%	drægtige	- 2,0	ins. pr. drægtighed
SDM	96,4%	»	- 2,0	» » »
Jerseyrace	96,1%	»	- 1,9	» » »

Drægtighedsresultaterne var gode for alle 3 racer, og racemæssigt blev der på dette område opnået meget ensartede resultater, medens der i de foregående år ofte har været nogen forskel i drægtighedsresultaterne mellem racerne.

H. Fodringen.

Fodringen af kvierne er inddelt i fodringen før kælvningen, vinterperioden og sommerperioden.

1. Fodringen før kælvningen.

Kvierne var som helhed i god kondition og foderstand ved ankomsten til stationerne. Der var dog en del kvier, som var unge og i for dårlig foderstand, samt nogle, der havde haft dårlige ernæringsforhold i den foregående sommer, men det gik dog forholdsvis let med at få dem præpareret før kælvningen. Foderstanden ved kælvningen samt sundhedstilstanden var tilfredsstillende.

Fra ankomsten og indtil kælvningen fodres kvierne efter følgende hovedprincipper:

- a. Kvier, der skal kælte før 1. oktober, tages på stald om natten og fodres efter de i *tabel 6* angivne fodermængder, medens de i øvrigt går ude på græsmarkerne om dagen. I den første tid efter ankomsten fodres med bederoer med top i stedet for anvendelse af rod og top hver for sig. Ved kraftfoderets tildeling tages hensyn til kviernes huld og afstanden til kælvningen.
- b. Kvier, der skal kælte efter 1. oktober, sættes på græs hele døgnet, hvis de er i godt huld ved ankomsten til stationen. Kvierne får dog tilskudsfoder, hvis de ikke kan klare sig med græs alene. Senere kommer kvierne på stald om natten og bliver fodret som anført i *tabel 6*, men de får dog adgang til græsmarken om dagen, hvis vejret er godt. Såvel med hensyn til kraftfodertilskuddets størrelse som indbindingsdatoen tages hensyn til kviernes huld og kælvningsdato, idet man bestræber sig på at få kvierne til at kælte i så ensartet foderstand, som det er muligt.

Tabel 6. Foderplan før kælvningen.

Table 6. Rations before calving

	f. e. f. u.	g ford. renprotein g digest. true protein
4 f.e. roer (f.u. beets)	4,0	54
1 f.e. roetop (f.u. beet tops)	1,0	120
2 kg kraftfoder (kg concentrates) ..	2,0	286
I alt (Total)	7,0	460

Kraftfoderet havde følgende sammensætning:

35% blanding I
48% byg
15% hvedeklid
2% dikalciumfosfat

Blandingen indeholdt 1,00 f.e. og
143 g ford. renprotein pr. kg.

Fodermængderne sættes gradvis op på de mængder, som er anført i *tabel 6*. I de sidste ca. 10 dage før kælvningen går kvierne lidt efter lidt over på vinterfoderplanen, og der anvendes 5–10 kg kålroer og 0,5 kg blanding I pr. kvie daglig plus bederoer, roetop eller ensilage, høg og halm samt blanding II. Herved vænnes kvierne til at æde de fodermidler, som anvendes i vinterperioden. I dagene lige før og efter kælvningen fodres kvierne ret svagt, så deres ædelyst hele tiden bliver den bedst mulige.

I den tid kvierne er på græs, har de lejlighed til at æde af en mineralstofblanding, som er sammensat af 2 dele dikalciumfosfat, 2 dele dinatriumfosfat og 1 del kogsalt.

2. Vinterperioden.

Fra kælvningen og indtil udbindingen fodres kvierne efter vinterfoderplanen, som er anført i tabel 7. Så snart kvierne er normale efter kælvningen, fodres de efter en ydelse, som er 2 kg 4% mælk højere end den konstaterede. Dette ekstra tilskud gives kun i de første 6 uger efter kælvningen. Efter denne tid tildeles foderet efter ydelsen i den foregående uge, men blanding II må dog kun reduceres med 0,4 kg i dagligt foder hver uge. Ensilagefoderet hævedes efter 1. februar fra 1,0 til 1,8 f.e., samtidig med at blanding II reduceredes med 0,8 kg. Kvier, der yder fra 11,5 til 12,4 kg 4% mælk daglig, får dog kun forøget det daglige ensilagefoder til 1,4 f.e., og kvier, der

Tabel 7. Vinterfoderplan for afkomsprøvestationerne.

Table 7. Winter rations for progeny testing stations

Ydelse kg 4% mælk Yield in kg 4% fat corrected milk	kg kraftfoder kg concentrates		Foderenheder Feed units			kg hø kg hay	I alt pr. dag Total per day	
	Bl. I Mix- ture 1	Bl. II Mix- ture 2	Kål- roer Swedes	Bede- roer Beets	Ensi- lage el. roetop Silage or beet tops		f. e. f. u.	g ford. renprot. g digest. true protein
6,5—7,4	1,40	—	1,5	2,25	1,0	2,5	7,5	626
7,5—8,4	1,55	—	1,5	2,50	1,0	2,5	7,9	670
8,5—9,4	1,70	—	1,5	2,75	1,0	2,5	8,4	716
9,5—10,4	1,85	—	1,5	3,00	1,0	2,5	8,8	761
10,5—11,4	2,00	—	1,5	3,25	1,0	2,5	9,2	806
11,5—12,4	2,00	0,4	1,5	3,25	1,0	2,5	9,6	863
12,5—13,4	2,00	0,8	1,5	3,25	1,0	2,5	10,0	920
13,5—14,4	2,00	1,2	1,5	3,25	1,0	2,5	10,4	978
14,5—15,4	2,00	1,6	1,5	3,25	1,0	2,5	10,8	1035
15,5—16,4	2,00	2,0	1,5	3,25	1,0	2,5	11,2	1092
16,5—17,4	2,00	2,4	1,5	3,25	1,0	2,5	11,6	1149
17,5—18,4	2,00	2,8	1,5	3,25	1,0	2,5	12,0	1206
18,5—19,4	2,00	3,2	1,5	3,25	1,0	2,5	12,4	1264
19,5—20,4	2,00	3,6	1,5	3,25	1,0	2,5	12,8	1321
20,5—21,4	2,00	4,0	1,5	3,25	1,0	2,5	13,2	1378
21,5—22,4	2,00	4,4	1,5	3,25	1,0	2,5	13,6	1435
22,5—23,4	2,00	4,8	1,5	3,25	1,0	2,5	14,0	1492
23,5—24,4	2,00	5,2	1,5	3,25	1,0	2,5	14,4	1550
24,5—25,4	2,00	5,6	1,5	3,25	1,0	2,5	14,8	1607
25,5—26,4	2,00	6,0	1,5	3,25	1,0	2,5	15,2	1664
26,5—27,4	2,00	6,4	1,5	3,25	1,0	2,5	15,6	1721
27,5—28,4	2,00	6,8	1,5	3,25	1,0	2,5	16,0	1778
28,5—29,4	2,00	7,2	1,5	3,25	1,0	2,5	16,4	1836
29,5—30,4	2,00	7,6	1,5	3,25	1,0	2,5	16,8	1893
30,5—31,4	2,00	8,0	1,5	3,25	1,0	2,5	17,2	1950
31,5—32,4	2,00	8,4	1,5	3,25	1,0	2,5	17,6	2007

Jerseykvierne får dog kun 1,0 f.e. kålroer og 3,0 f.e. bederoer pr. kvie daglig.

yder mindre end 11,5 kg 4% mælk, får ingen forøgelse af ensilagefoderet. Der var dog enkelte stationer, hvor ensilagefoderet ikke blev øget på grund af utilstrækkelige mængder; der var også et par stationer, hvor ensilagefoderet først øgedes på et senere tidspunkt. Desuden var der enkelte Jerseyhold, som ikke fik forøget ensilagefoderet eller kun fik det forøget til 1,4 f.e. pr. kvie daglig, da de ikke var i stand til at æde den fulde ration. Da kálroerne hen på foråret blev opfodret, blev de erstattet med bederoer. Kvierne fik den mængde halm, de kunne æde.

Kraftfoderblandingerne havde følgende sammensætning:

<i>Blanding I</i>	<i>Blanding II</i>
40% bomuldsfrøkager	35% blanding I
17% sojaskrå	48% byg
15% solsikkekager	15% hvedeklid
10% kokoskager	2% dikalciumfosfat
8% hørfrøkager	
5% fl. melasse	
3% animalsk fedt	
2% dikalciumfosfat	

I nedenstående oversigt findes oplysninger om fodermidlernes kemiske sammensætning og foderværdi:

Fodermiddel	Rå- prot. ‰	Ren- prot. ‰	Rå- fedt ‰	N-fri ekstr. st. ‰	Træ- stof ‰	f. e. pr. kg	g ford. renprot. pr. kg
Blanding I ..	33,68	31,79	8,50	31,23	9,47	1,13	279
Byg	8,77	8,27	1,80	67,85	4,21	1,00	61
Hvedeklid ..	13,07	11,79	4,22	53,53	9,07	0,78	101
Hø	9,42	7,72	1,69	39,35	27,72	0,47	41
Roetopensil. *)	18,17	11,29	3,92	40,91	16,38	0,10	8
Græsensilage *)	16,98	9,63	5,96	35,30	29,07	0,14	8

*) Analyseresultaterne refererer til tørstoffet.

Tallene er gennemsnit af analyserne fra de forskellige stationer, men for græsensilagens vedkommende er der dog kun analyser fra 23 stationer, da en af stationerne ikke anvendte græsensilage. Der blev anvendt mere græsensilage end i de foregående år, men der var dog ingen af stationerne, som anvendte græsensilage i hele vinterperioden. Der var et lavere proteinindhold i blanding I end i de foregående år. De fleste af tallene svarede ret godt til gennemsnitsresultaterne fra de nærmest foregående år.

Blanding II indeholdt 1,00 f.e. og 143 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

Tabel 8. Ydelse, tilvækst og

Table 8. Yield, gain and

Tyrens navn	Antal døtre	Antal foder- dage	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	4% mælk kg	Vægt i kg eft. kælv.
Name of bull	Number of daughters	No. of feeding days	Milk kg	Fat %	Butterfat kg	Butter kg	kg 4% F.C.M.	Weight in kg after calving
RDM:								
1 Holbæk Morskær	18	214	4753	4,45	211,27	237	5070	524
2 Djurs Bitz	18	215	4392	4,66	204,61	230	4826	474
3 Langelands Gut	18	223	4335	4,57	198,03	223	4704	485
4 Ålborg Nor	17	205	4343	4,33	187,85	211	4555	530
5 Hammel Ideal	19	207	4005	4,72	189,05	213	4438	469
6 Hau Nøddekær	19	199	4263	4,22	179,71	202	4401	543
7 Nordfyns Urban	20	206	4038	4,51	181,99	205	4345	500
8 Haslev Ideal	19	203	4046	4,38	177,30	199	4278	488
9 Ribe Ås	20	212	3807	4,74	180,61	203	4232	499
10 Bjerringbro Munk	20	206	3842	4,55	174,86	197	4160	503
11 Skærup Ørnkær	16	199	3655	4,56	166,70	187	3963	481
12 Bornholms Ydan	18	195	3928	4,21	165,45	186	4053	495
13 Centrums Værn	19	201	3823	4,57	174,55	196	4147	500
14 Århus Gorm	16	206	3904	4,33	169,15	190	4099	491
15 Årup Vestfyns Prins	19	202	3472	4,57	158,65	178	3769	484
16 Fåborg Moss	16	202	3512	4,60	161,37	182	3825	471
17 Hjørring Vagn	20	217	3728	4,56	169,90	191	4040	492
18 Kolding Eg	17	209	3603	4,42	159,29	179	3831	473
19 M. A. Cæsar	16	205	3550	4,51	160,13	180	3822	483
20 Skive Sten	20	206	3547	4,57	162,00	182	3849	491
21 Rudme Søe	19	193	3851	4,03	155,03	174	3866	488
22 Varde Wano	18	217	3637	4,62	167,90	189	3973	504
23 Hjørring Nørreby	19	214	3433	4,71	161,75	182	3799	478
24 Herning Munk	19	200	3559	4,34	154,57	174	3742	521
25 Morsø Munk	20	205	3696	4,16	153,88	172	3787	512
26 Dybbøl Od	16	194	3554	4,02	142,75	160	3563	460
27 Åbenrå Sortemose	20	211	3095	4,66	144,32	162	3403	489
28 Sortkær	15	209	3417	4,35	148,47	167	3594	497
29 Dybbøl Rhin	19	209	3432	4,36	149,52	168	3616	521
30 Varde Bram	16	205	3158	4,38	138,19	155	3336	471
31 Ejlekær Sydvest	19	231	3441	4,34	149,32	168	3616	484
32 Sydvestfyns Fast	19	204	2741	4,61	126,35	142	2992	486
Gns. (Average)	18	207	3736	4,45	166,39	187	3990	493

Foderforbrug i vinterperioden.

feed consumption in the winter period

Vægt i kg ved udbind.	Til- vækst kg	Kraftfoder, f. e.		Kål- roer f. e.	Bede- roer f. e.	Roetop f. e.	Ensilage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	I alt		Udbind. dato		
		Blan- ding I	Blan- ding II							ford.	renprot. kg			
													f. e.	f. e.
Weight in kg at end of winter- period	Gain kg	Concentrates f. u.		Swedes	Beets	Beet tops	Silage	Hay	Straw	Total kg dig. true prot.	Date on pasture			
		Mix. I	Mix. II	f. u.	f. u.	f. u.	f. u.	f. u.	f. u.	f. u.	f. u.			
560	36	494	1058	262	694	52	218	252	53	3083	346	24-4		
542	68	486	1035	206	729	36	214	207	47	2960	322	25-4		
558	73	509	965	309	670	52	172	240	91	3008	340	25-4		
609	79	467	887	131	775	18	227	235	—	2740	285	23-4		
530	61	467	941	199	691	—	104	198	46	2646	292	25-4		
579	36	445	841	138	689	1	338	212	85	2749	288	26-4		
566	66	473	836	164	736	—	251	233	41	2734	281	19-4		
537	49	449	921	142	791	12	249	211	64	2839	288	1-5		
556	57	469	764	233	724	46	225	249	42	2752	281	27-4		
578	75	462	845	239	719	6	216	237	25	2749	278	25-4		
538	57	458	807	220	620	21	285	167	48	2626	275	25-4		
537	42	406	763	252	539	26	222	232	45	2485	277	25-4		
564	64	463	781	158	718	—	247	228	43	2638	270	19-4		
543	52	466	777	290	643	43	174	248	63	2704	279	19-4		
542	58	459	596	181	760	3	251	242	47	2539	242	18-4		
534	63	455	653	244	644	23	240	236	23	2518	271	26-4		
533	41	483	687	225	670	15	271	256	33	2640	278	1-5		
549	76	472	655	199	757	48	209	246	30	2616	266	25-4		
568	85	466	704	286	623	36	173	220	83	2591	283	25-4		
524	33	449	621	296	616	—	261	227	52	2522	248	26-4		
540	52	443	724	145	691	24	215	218	42	2502	255	19-4		
523	19	490	632	197	780	44	226	249	47	2665	259	24-4		
518	40	474	613	223	661	14	267	251	33	2536	264	1-5		
575	54	458	641	260	633	32	248	235	45	2552	256	26-4		
564	52	459	684	217	682	14	213	218	49	2536	265	24-4		
535	75	445	602	115	756	25	245	172	73	2433	245	19-4		
546	57	471	549	203	730	33	214	247	58	2505	253	24-4		
578	81	472	610	202	729	32	213	200	47	2505	256	25-4		
589	68	481	561	130	817	39	245	191	77	2541	253	19-4		
518	47	462	443	180	745	33	223	235	47	2368	223	24-4		
559	75	505	543	184	886	32	252	242	103	2747	256	1-5		
562	76	464	319	184	766	2	254	245	47	2281	206	18-4		
552	59	466	721	207	709	24	230	227	51	2635	271			

Tyrens navn	Antal døtre	Antal foder- dage	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	4% mælk kg	Vægt i kg eft. kæl.v.
<i>Name of bull</i>	<i>Number of daughters</i>	<i>No. of feeding days</i>	<i>Milk kg</i>	<i>Fat %</i>	<i>Butterfat kg</i>	<i>Butter kg</i>	<i>kg 4% F. C. M.</i>	<i>Weight in kg. after calving</i>
SDM:								
1 Skive Bert	18	207	4274	4,39	187,49	211	4522	518
2 Bjerringbro Frans	20	213	4190	4,49	187,95	211	4495	555
3 Thy Drost	19	203	4007	4,24	169,93	191	4152	547
4 Kolding Bos	19	206	3789	4,38	165,95	186	4005	486
5 Dybbøl Faust	22	204	4006	4,35	174,41	196	4219	528
6 Kern	17	208	3939	4,23	166,72	187	4076	509
7 Bjerringbro Rico	19	208	3870	4,31	166,76	187	4049	524
8 Ålborg Cor	16	204	3907	4,21	164,58	185	4032	507
9 Århus Thor	19	201	3627	4,43	160,74	181	3862	494
10 Ålborg Knud	18	216	3980	4,32	171,78	193	4169	517
11 Hjørring Zelo	13	225	3620	4,68	169,41	191	3989	529
12 Herning Esp	18	191	3795	3,94	149,46	167	3760	527
13 Morsø Drost	20	204	3626	4,23	153,30	172	3750	528
14 Sdj. Sten	17	196	3394	4,30	146,05	164	3548	528
15 Thy Juvel	20	197	3661	4,17	152,79	171	3756	508
16 Sdj. Peter	19	210	3592	4,20	150,86	169	3700	512
17 Give Robinea	18	206	3589	4,02	144,39	162	3601	503
18 Sdj. Corr	19	214	3429	4,25	145,84	164	3559	517
19 Hadsten Adson	18	210	3135	4,53	142,15	160	3386	509
20 Horsens Bast	20	208	2980	4,27	127,17	143	3100	494
21 Varde Regent	19	204	3064	4,29	131,48	148	3198	510
22 Hjørring Vester	15	214	2887	4,47	129,11	145	3091	495
23 Århus Tax	19	199	2870	4,17	119,76	134	2944	496
Gns. (Average)	18	206	3619	4,30	155,57	175	3781	515

Jerseyrace:

1 Horsens Frank	19	204	2935	6,67	195,76	223	4110	346
2 Egholm Russ	19	210	3051	6,57	200,27	228	4224	339
3 Gefion	20	197	2909	6,38	185,58	211	3947	342
4 Hjørring Baun	19	208	2944	6,17	181,72	206	3903	351
5 Holm Syd	21	193	2622	6,56	171,88	195	3627	336
6 Årup Vestfyns Fax	20	210	2911	6,49	189,05	215	4000	333
7 Holbæk Sjus	16	213	3055	6,19	189,08	215	4058	331
8 Bjerringbro Hoff	16	199	2896	6,27	181,48	206	3881	351
9 Fåborg Nat	17	200	2640	6,76	178,37	203	3732	337
10 Vax Syd	22	194	2616	6,43	168,20	191	3569	331
11 Randers Russ	20	197	2690	6,41	172,52	196	3664	326
12 Sydvestfyns Jon	20	199	2613	6,15	160,57	182	3454	335
13 Hjørring Tæbring	18	212	2710	6,31	170,90	194	3648	357
14 Hoff Syd	15	196	2445	6,60	161,48	184	3400	335
15 Årup Vestfyns Gems	20	202	2657	6,25	166,17	189	3555	358
Gns. (Average)	19	202	2780	6,41	178,20	203	3785	341
Gns. af alle hold (Average of all groups)	18	206	3493	4,73	165,37	186	3878	468

Vægt i kg ved udbind.	Til- vækt kg	Kraftfoder, f. e.								I alt		Udbind. dato							
		Bian- ding I	Bian- ding II	Kål- roer f. e.	Bede- roer f. e.	Roetop f. e.	Ensilage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	ford. renprot. kg									
											Concentrates f. u.		Swedes f. u.	Beets f. u.	Beet tops f. u.	Silage f. u.	Hay f. u.	Straw f. u.	Total kg dig. true prot.
Weight in kg at end of winter- period	Gain kg											Date on pasture							
548	30	450	868	297	618	—	262	227	52	2774	284	26-4							
605	50	477	932	249	746	10	218	244	26	2902	296	25-4							
612	65	462	794	235	660	38	253	191	23	2656	275	19-4							
543	57	464	735	199	746	51	202	242	30	2669	275	25-4							
592	64	469	811	119	804	29	257	184	74	2747	283	19-4							
602	93	475	692	136	789	20	223	240	—	2575	260	23-4							
581	57	467	789	243	729	10	213	239	37	2727	272	25-4							
583	76	469	677	129	775	23	220	234	—	2527	256	23-4							
551	57	455	713	282	623	36	177	242	63	2591	265	19-4							
606	89	493	695	149	816	24	223	249	—	2649	267	23-4							
567	38	499	653	237	696	22	270	266	33	2676	280	1-5							
548	21	438	698	246	606	24	248	225	45	2530	257	26-4							
581	53	455	677	218	678	16	210	216	48	2518	263	24-4							
570	42	441	626	182	691	27	207	229	54	2457	253	24-4							
575	67	449	713	228	645	33	244	185	21	2518	258	19-4							
564	52	473	637	199	723	31	217	245	58	2583	266	24-4							
572	69	471	633	232	649	26	283	174	49	2517	255	25-4							
570	53	480	562	206	739	35	215	250	59	2546	258	24-4							
576	67	472	530	201	728	33	214	201	47	2426	245	25-4							
545	51	464	334	270	699	18	235	250	51	2321	212	25-4							
552	42	440	480	182	711	34	209	237	47	2340	222	24-4							
541	46	475	384	222	661	14	269	251	33	2309	232	1-5							
549	53	444	388	279	605	34	176	231	59	2216	215	19-4							
571	56	464	653	215	702	26	228	228	40	2556	259								
351	5	456	754	171	573	10	197	245	50	2456	260	25-4							
371	32	477	974	144	503	18	217	183	—	2516	297	25-4							
377	35	445	834	121	559	18	164	186	28	2355	272	25-4							
353	2	462	686	138	515	6	200	244	9	2260	262	1-5							
363	27	428	655	141	591	29	166	227	—	2237	243	27-4							
350	17	470	688	177	590	12	199	252	49	2437	256	25-4							
349	18	489	704	166	609	51	218	251	53	2541	291	24-4							
384	33	449	795	124	574	23	165	189	29	2348	268	25-4							
366	29	449	673	154	547	20	172	233	—	2248	263	26-4							
355	24	430	635	141	590	31	166	228	—	2221	241	27-4							
365	39	443	724	120	567	19	162	186	28	2249	255	25-4							
366	31	451	515	119	660	1	228	238	25	2237	224	18-4							
373	16	471	584	142	518	15	191	248	9	2178	251	1-5							
362	27	433	565	142	591	33	166	224	—	2154	232	27-4							
384	26	462	574	173	573	33	248	238	46	2347	245	26-4							
365	24	454	691	145	571	21	191	225	22	2320	257								
518	50	463	692	196	677	24	221	227	41	2541	264								

Mineralstofindholdet pr. kg blev udregnet til følgende i de to kraftfoderblandinger:

	g Ca	g P
Blanding I	7,5	12,3
Blanding II	8,0	11,4

I roeoptagningstiden anvendes i reglen 10 kg roetop som erstatning for ensilagen. Roetopensilagen undersøges hver 14. dag, og der regnes med 1,25 kg organisk stof til 1 f.e. Foderværdien udregnes ved vinterperiodens slutning på grundlag af den kemiske analyse fra det opsamlede tørstof fra de indsendte prøver. Beregningerne viste, at der medgik 1,63 kg tørstof eller 1,29 kg organisk stof til 1 f.e., og i 1966-67 var de tilsvarende tal 1,63 og 1,30. Der medgik 10,39 kg til 1 f.e. mod 10,57 i 1966-67. Den gennemsnitlige tørstofprocent blev 15,82 mod 15,54 i 1966-67.

For græsensilagens vedkommende regnes med 1,5 kg tørstof til 1 f.e. På grundlag af den kemiske analyse af det opsamlede tørstof fra de indsendte prøver viste beregningerne, at der i gennemsnit medgik 1,44 kg tørstof til 1 f.e., medens der i 1966-67 kun medgik 1,40. Den gennemsnitlige tørstofprocent blev 19,98, og der medgik 7,29 kg til 1 f.e., medens de tilsvarende tal i 1966-67 var 19,67 og 7,22.

Såvel kårroer som bederoer undersøgtes for tørstofindholdet, og resultaterne dannede grundlag for roefoderets størrelse. Af kårroer og bederoer medgik henholdsvis 9,88 og 6,84 kg til 1 f.e., medens de tilsvarende tal i 1966-67 var 9,39 og 6,26. Den gennemsnitlige tørstofprocent i kårroer og bederoer blev henholdsvis 11,13 og 16,08. Tørstofprocenten i bederoerne var lavere end i de nærmest foregående år.

Kraftfoder, kårroer, bederoer, roetop og ensilage vejes ud til de enkelte kvier ved hver fodring, medens høet vejes ud til nogle kvier eller et helt hold ad gangen. Forbruget af halm kontrolleres et par gange om ugen.

Tabel 8 giver oplysning om ydelse og tilvækst i vinterperioden samt om foderforbruget på de enkelte hold, men da der er forskel i vinterperiodens længde fra hold til hold, har dette givet sig udslag i nogen variation i foderforbruget. De højestydende hold har selvfølgelig haft det største kraftfoderforbrug, hvilket ses meget tydeligt af tallene. På enkelte af stationerne blev noget af høet erstattet med ensilage eller blanding II.

Vinterperioden blev 206 dage i gennemsnit, hvilket var en dag mindre end i 1966-67. Der anvendtes 1386 f.e. grovfoder mod 1410 i 1966-67. Forbruget af kårroer + bederoer faldt fra 932 f.e. i 1966-67 til 873 f.e. i det forløbne prøveår. Der anvendtes 227 f.e. hø i 1967-68, og det var 37 f.e. mere end i 1966-67. For de øvrige grovfodermidler lå forbruget på samme niveau som i de to foregående år.

På afkomsprøvestationerne Dybvad og Grønhøjgård fandt udbindingen

sted den 1. maj, medens kvierne på de øvrige stationer kom på græs i april måned. Udbindingen forekom forholdsvis tidligt, og de fleste af holdene kom på græs i dagene omkring den 25. april.

Forbruget til produktion af 1 kg 4% mælk blev følgende:

Rød Dansk Malke race	0,39 p.f.e. og 50 g ford. renprotein
Sortbroget Dansk Malke race	0,39 » » 49 » » »
Jersey race	0,41 » » 57 » » »

I gennemsnit af alle hold blev det 0,39 p.f.e. og 51 g ford. renprotein pr. kg 4% mælk, medens de tilsvarende tal i 1966-67 var 0,40 og 60. Når der forekom en stærk nedgang i ford. renprotein pr. kg 4% mælk, skyldes det i nogen grad en ændring af beregningsmetoden, idet der i de foregående år er regnet med 5 g ford. renprotein pr. kg kårroer og 6 g ford. renprotein pr. kg bederoer, medens der i det forløbne prøveår er regnet med 2 g ford. renprotein pr. kg for såvel kårroer som bederoer. Desuden var der kun 279 g ford. renprotein pr. kg i blanding I, medens der var 291 g i 1966-67. Nedgangen i proteinindholdet i blanding I medførte selvfølgelig, at der forekom en nedgang i proteinindholdet i blanding II. I det forløbne år var der 143 g ford. renprotein pr. kg i blanding II mod 147 i 1966-67. For græs- og roetopensilage er der for g ford. renprotein anvendt de udregnede værdier fra de kemiske analyser.

3. Sommerperioden.

Sommerperioden blev på 98 dage, og der var gennemgående god græsning på stationerne. Der var forholdsvis store beholdninger af bederoer ved udbindingen, og roer og ensilage udgjorde en stor part af sommerens tilskudsfoder.

Tabel 9. Kraftfodertilskuddets størrelse i forhold til græskvaliteten.

Table 9. Concentrates given according to quality of pasture

Ydelse i kg 4% mælk Yield in kg 4% fat corrected milk	ug excellent	mg very good	g good	tg fair	mdl. poor	slet bad
kg kraftfoder kg concentrates						
0- 2,5	-	-	-	-	-	-
2,6- 5,0	-	-	-	-	-	0,5
5,1- 7,5	-	-	-	-	0,5	1,0
7,6-10,0	-	-	-	0,5	1,0	2,0
10,1-12,5	-	-	0,5	1,0	2,0	3,0
12,6-15,0	-	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
15,1-17,5	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17,6-20,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
20,1-22,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
22,6-25,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
25,1-27,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

Kraftfodertilskuddet blev givet efter planen i tabel 9.

Kraftfoderblandingen bestod af:

30% blanding I
60% byg
10% klidmelasse

Blandingen indeholdt 1,02 f.e. og 126 g ford. renprotein pr. kg.

I gennemsnit af hele sommerperioden anvendtes 2,5 f.e. kraftfoder pr. kvie daglig, medens det var 2,4 i 1967. I sommeren 1966 anvendtes 2,9 f.e. kraftfoder pr. kvie daglig.

For samtlige hold har fodringen i de sidste 4 somre været følgende:

			Antal foder- dage	Kraft- foder f.e.	Roer og ensilage m. m. f.e.	Tilskuds- foder i alt f.e.	Beregnet græs f.e.	I alt f.e.
Sommeren	1968		98	242	266	508	536	1044
»	1967		97	234	280	514	531	1045
»	1966		93	270	192	462	528	990
»	1965		100	219	306	525	523	1048

Det beregnede græsfoderforbrug blev 536 f.e., hvilket var i god overensstemmelse med resultaterne fra de foregående år.

I de sidste ca. 2 uger før udbindingen blev givet 50 g magnesiumoxyd pr. kvie daglig, og dette tilskud anvendtes også i de to første uger efter udbindingen, hvorefter der i de to følgende uger foregik en gradvis nedsættelse af tilskuddet, som ophørte 4 uger efter udbindingen. Dette tilskud blev givet på roefoderet.

Gennem hele sommeren havde kvierne adgang til at æde en mineralstofblanding, der var sammensat af 2 dele dikalciumfosfat, 2 dele dinatriumfosfat og 1 del kogsalt.

I. Ydelsen.

Ydelsen er som sædvanlig udregnet i 304 dage i gennemsnit af holdene.

Mælken vejes hver uge i to på hinanden følgende døgn, og der foretages en fedtbestemmelse for de to dages mælkemængde. Proteinprocenten bestemmes ugentlig i de første 2 eller 3 uger efter kælvningen og derefter hver anden uge i den resterende del af prøvetiden. Proteinprocenten bestemmes på grundlag af det første døgn's mælkemængde ved kontrolleringen. Hver anden uge indsendes mælkeprøver fra stationerne til efterkontrol for fedtprocent på den kemiske afdeling.

I hovedtabellerne, der findes bag i beretningen, er der oplysninger om de enkelte kviers ydelse på alle holdene, og opstillingen er foretaget efter holdenes gennemsnitlige ydelse af smørfedt inden for hver af racerne.

1. Ydelsen for de forskellige racer.

I nedenstående opstilling findes gennemsnitsydelsen for de forskellige racer samt for alle hold:

Gennemsnitsydelsen i 304 dage.

Race	Antal hold	Antal kvier	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprotein kg
RDM	32	584	5098	4,52	230,42	259	3,77	192
SDM	23	422	4959	4,36	216,41	243	3,65	181
Jerseyrace	15	282	3821	6,58	251,47	286	4,26	163
Alle hold	70	1288	4779	4,82	230,33	259	3,81	182

Jerseyholdene opnåede en fantastisk høj gennemsnitsydelse, og den blev 17 kg smør højere end i 1966-67, hvor racen opnåede det hidtil højeste ydelsesresultat. Den gennemsnitlige smørydelse blev 2 kg højere for Rød Dansk Malkerace end i 1966-67, hvorimod Sortbroget Dansk Malkerace måtte notere en tilbagegang fra 1966-67 på 9 kg smør. Middelfedtprocenterne lå på samme niveau for alle 3 racer som sidste år. Jerseyholdene havde lidt lavere middelproteinprocent end i 1966-67, medens middelproteinprocenten for de to andre racer har været af samme størrelsesorden i de to sidste prøveår. Rød Dansk Malkerace opnåede den højeste ydelse af mælkeprotein, men dette var også tilfældet i de foregående år.

2. Højtydende kvier.

Der var i alt 6 kvier, som ydede over 350 kg smørfedt, og heraf var 3 af Rød Dansk Malkerace, en af Sortbroget Dansk Malkerace og 2 af Jerseyracen.

Nr.	Antal foderdage	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprotein kg	Fader
62	340	5441	7,23	393,36	448	4,60	250	Holm Syd
14	308	7592	4,97	377,07	425	3,83	290	Holbæk Morskær
31	327	7618	4,94	376,01	424	3,69	281	Langelands Gut
46	323	8444	4,33	365,67	410	3,53	298	Skive Bert
49	287	7730	4,61	356,70	401	3,54	274	Djurs Bitz
34	328	4806	7,36	353,88	403	4,42	212	Horsens Frank

Den højestydende kvie nåede 448 kg smør, men den havde også mange foderdage. Der var tillige nogle højtydende kvier, der knap nåede 350 kg smørfedt i prøvetiden. Enkelte af disse kvier ville have været med i denne oversigt, hvis de havde haft lidt flere dage i prøvetiden.

Tabel 10. Forholdstal for smørydelsen gennem laktationsperioden.

Table 10. Proportionals for the yield of butter during the lactation period

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
RDM:			
Holbæk Morskær	100	98	87
Djurs Bitz	100	97	84
Langelands Gut	100	105	100
Ålborg Nor	100	96	81
Hammel Ideal	100	94	78
Hau Nøddekær	100	95	82
Nordfyns Urban	100	105	88
Haslev Ideal	100	102	86
Ribe Ås	100	89	84
Bjerringbro Munk	100	97	89
Skærup Ørnkær	100	102	89
Bornholms Ydan	100	93	80
Centrums Værn	100	99	78
Århus Gorm	100	85	78
Årup Vestfyns Prins	100	99	96
Fåborg Moss	100	91	86
Hjørring Vagn	100	101	95
Kolding Eg	100	94	94
M. A. Cæsar	100	102	89
Skive Sten	100	88	81
Rudme Søe	100	100	79
Varde Wano	100	84	81
Hjørring Nørreby	100	98	90
Herning Munk	100	88	78
Morsø Munk	100	91	86
Dybbøl Od	100	94	75
Åbenrå Sortemose	100	93	88
Sortkær	100	93	76
Dybbøl Rhin	100	94	69
Varde Bram	100	88	77
Ejlekær Sydvest	100	92	83
Sydvestfyns Fast	100	96	94
Gns. (Average)	100	95	84

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
SDM:			
Skive Bert	100	91	82
Bjerringbro Frans	100	95	86
Thy Drost	100	88	82
Kolding Bos	100	95	94
Dybbøl Faust	100	92	73
Kern	100	101	94
Bjerringbro Rico	100	91	87
Ålborg Cor	100	101	90
Århus Thor	100	86	78
Ålborg Knud	100	95	83
Hjørring Zelo	100	98	92
Herning Esp	100	93	81
Morsø Drost	100	92	84
Sdj. Sten	100	92	87
Thy Juvel	100	83	73
Sdj. Peter	100	84	84
Give Robinea	100	94	91
Sdj. Corr	100	89	89
Hadsten Adson	100	89	73
Horsens Bast	100	92	83
Varde Regent	100	73	61
Hjørring Vester	100	100	87
Århus Tax	100	82	76
Gns. (Average)	100	91	83

Jerseyrace:

Horsens Frank	100	96	83
Egholm Russ	100	105	89
Gefion	100	95	77
Hjørring Baun	100	104	96
Holm Syd	100	98	85
Årup Vestfyns Fax	100	92	79
Holbæk Sjus	100	98	85
Bjerringbro Hoff	100	101	79
Fåborg Nat	100	92	81
Vax Syd	100	105	94
Randers Russ	100	93	75
Sydvestfyns Jon	100	99	91
Hjørring Tæbring	100	99	92
Hoff Syd	100	97	83
Årup Vestfyns Gems	100	95	81
Gns. (Average)	100	98	85

Tabel 11. Middeltal og middelfejl. (Afkortede laktationsperioder på 250 dage).

Table 11. Mean yields and the corresponding standard errors. (Truncated lactations of 250 days)

Nr.	Tyrens navn	Antal døtre	kg mælk	% fedt	kg smørfedt	kg smør	% protein	kg mælkeprot.
No.	Name of bull	Number of daughters	kg milk	Fat percentage	kg butterfat	kg butter	Protein percentage	kg protein
RDM:								
1.	Holbæk Morskær	18	5474 ± 181	4,44 ± 0,08	243,30 ± 7,8	273	3,70 ± 0,04	202,52 ± 6,3
2.	Djurs Bitz	18	5024 ± 139	4,68 ± 0,04	235,12 ± 6,2	265	3,63 ± 0,04	182,46 ± 4,8
3.	Langelands Gut	18	4817 ± 194	4,60 ± 0,08	221,81 ± 8,2	250	3,74 ± 0,03	179,98 ± 6,5
4.	Ålborg Nor	17	5166 ± 199	4,34 ± 0,08	224,37 ± 8,6	252	3,67 ± 0,04	189,36 ± 6,7
5.	Hammel Ideal	19	4691 ± 121	4,73 ± 0,06	221,92 ± 6,2	250	3,78 ± 0,03	177,41 ± 4,0
6.	Hau Nøddekær	19	5181 ± 195	4,25 ± 0,05	219,96 ± 7,2	247	3,67 ± 0,04	190,11 ± 6,1
7.	Nordfyns Urban	20	4758 ± 165	4,57 ± 0,05	217,51 ± 8,2	245	3,69 ± 0,04	175,43 ± 5,7
8.	Haslev Ideal	19	4862 ± 179	4,41 ± 0,07	214,52 ± 7,2	241	3,61 ± 0,04	175,64 ± 5,9
9.	Ribe Ås	20	4409 ± 125	4,77 ± 0,06	210,40 ± 7,1	237	3,82 ± 0,03	168,54 ± 4,8
10.	Bjerringbro Munk	20	4587 ± 179	4,57 ± 0,05	209,42 ± 7,8	236	3,74 ± 0,03	171,47 ± 6,3
11.	Skærup Ørnkær	16	4475 ± 190	4,62 ± 0,07	206,64 ± 6,3	232	3,85 ± 0,04	172,24 ± 6,1
12.	Bornholms Ydan	18	4866 ± 203	4,27 ± 0,06	207,56 ± 8,3	233	3,72 ± 0,04	180,93 ± 6,6
13.	Centrums Værn	19	4548 ± 189	4,62 ± 0,07	210,05 ± 8,6	236	3,76 ± 0,04	170,86 ± 6,4

14. Århus Gorm	16	4591 ± 155	4,35 ± 0,07	199,87 ± 6,6	224	3,62 ± 0,05	166,37 ± 4,7
15. Årup Vestfyns Prins	19	4201 ± 130	4,64 ± 0,07	194,79 ± 6,9	219	3,73 ± 0,04	156,71 ± 4,5
16. Fåborg Moss	16	4253 ± 151	4,64 ± 0,06	197,26 ± 7,2	222	3,97 ± 0,03	168,70 ± 6,0
17. Hjørring Vagn	20	4228 ± 137	4,61 ± 0,04	194,73 ± 5,4	219	3,78 ± 0,05	159,87 ± 4,3
18. Kolding Eg	17	4253 ± 173	4,47 ± 0,07	190,07 ± 6,9	214	3,69 ± 0,04	156,91 ± 5,8
19. M. A. Cæsar	16	4207 ± 227	4,57 ± 0,06	192,40 ± 10,1	216	3,96 ± 0,04	166,67 ± 7,9
20. Skive Sten	20	4199 ± 159	4,60 ± 0,06	193,12 ± 6,7	217	3,79 ± 0,04	159,12 ± 5,0
21. Rudme Sø	19	4772 ± 197	4,09 ± 0,09	194,94 ± 8,0	218	3,71 ± 0,03	177,00 ± 7,1
22. Varde Wano	18	4137 ± 159	4,63 ± 0,05	191,69 ± 8,2	216	3,71 ± 0,03	153,61 ± 5,8
23. Hjørring Nørreby	19	3947 ± 145	4,77 ± 0,10	188,18 ± 5,7	212	3,94 ± 0,04	155,47 ± 4,6
24. Herning Munk	19	4262 ± 132	4,42 ± 0,10	188,26 ± 6,8	211	3,71 ± 0,04	158,25 ± 4,7
25. Morsø Munk	20	4375 ± 200	4,20 ± 0,05	183,94 ± 8,6	206	3,55 ± 0,02	155,25 ± 6,7
26. Dybbøl Od	16	4328 ± 227	4,05 ± 0,05	175,24 ± 9,3	196	3,76 ± 0,03	162,75 ± 7,8
27. Åbenrå Sortemose	20	3615 ± 168	4,70 ± 0,07	169,83 ± 8,3	191	3,89 ± 0,03	140,57 ± 6,2
28. Sortkær	15	3942 ± 237	4,39 ± 0,07	173,25 ± 9,1	195	3,66 ± 0,05	144,34 ± 7,2
29. Dybbøl Rhin	19	3968 ± 196	4,37 ± 0,05	173,33 ± 7,6	195	3,74 ± 0,03	148,47 ± 6,6
30. Varde Bram	16	3747 ± 182	4,39 ± 0,04	164,49 ± 8,2	185	3,75 ± 0,03	140,52 ± 6,2
31. Ejlekær Sydvest	19	3687 ± 206	4,37 ± 0,07	160,97 ± 9,7	181	3,72 ± 0,04	137,24 ± 7,5
32. Sydvestfyns Fast	19	3285 ± 179	4,69 ± 0,07	154,22 ± 7,5	174	3,97 ± 0,04	130,27 ± 6,2
Gns. (Average)	18	4402	4,49	197,60	222	3,74	164,85

Nr.	Tyrens navn	Antal døtre	kg mælk	% fedt	kg smørfedt	kg smør	% protein	kg mælkeprot.
No.	Name of bull	Number of daughters	kg milk	Fat percentage	kg butterfat	kg butter	Protein percentage	kg protein
SDM:								
1.	Skive Bert	18	5033 ± 218	4,41 ± 0,06	221,85 ± 9,6	249	3,64 ± 0,04	183,14 ± 7,4
2.	Bjerringbro Frans	20	4842 ± 187	4,50 ± 0,07	217,70 ± 9,4	245	3,69 ± 0,03	178,59 ± 6,1
3.	Thy Drost	19	4797 ± 119	4,26 ± 0,05	204,39 ± 5,9	229	3,47 ± 0,04	166,35 ± 3,7
4.	Kolding Bos	19	4490 ± 175	4,43 ± 0,07	198,90 ± 7,0	223	3,72 ± 0,03	167,23 ± 5,8
5.	Dybbøl Faust	22	4684 ± 180	4,37 ± 0,03	204,66 ± 8,0	230	3,57 ± 0,03	167,36 ± 6,2
6.	Kern	17	4624 ± 251	4,29 ± 0,06	198,49 ± 10,0	223	3,69 ± 0,05	170,76 ± 7,6
7.	Bjerringbro Rico	19	4529 ± 101	4,35 ± 0,06	197,06 ± 3,9	221	3,67 ± 0,03	166,16 ± 3,4
8.	Ålborg Cor	16	4714 ± 200	4,25 ± 0,07	200,16 ± 9,0	225	3,55 ± 0,06	167,38 ± 6,3
9.	Århus Thor	19	4415 ± 190	4,45 ± 0,06	196,57 ± 7,8	221	3,69 ± 0,04	162,95 ± 6,6
10.	Ålborg Knud	18	4481 ± 176	4,32 ± 0,07	193,45 ± 7,3	217	3,58 ± 0,05	160,42 ± 5,7
11.	Hjørring Zelo	13	3960 ± 209	4,73 ± 0,06	187,18 ± 10,4	211	3,84 ± 0,03	151,94 ± 7,6
12.	Herning Esp	18	4714 ± 180	4,00 ± 0,08	188,36 ± 7,5	211	3,59 ± 0,02	169,15 ± 6,0
13.	Morsø Drost	20	4313 ± 200	4,29 ± 0,06	184,86 ± 9,3	207	3,61 ± 0,04	155,88 ± 7,1
14.	Sdj. Sten	17	4259 ± 167	4,32 ± 0,04	184,01 ± 6,6	207	3,61 ± 0,03	153,75 ± 6,0
15.	Thy Juvel	20	4464 ± 208	4,17 ± 0,06	186,29 ± 8,9	209	3,50 ± 0,03	156,41 ± 6,7
16.	Sdj. Peter	19	4203 ± 171	4,24 ± 0,05	178,03 ± 7,6	200	3,52 ± 0,04	147,76 ± 5,3
17.	Give Robinea	18	4258 ± 206	4,07 ± 0,06	173,41 ± 9,2	194	3,50 ± 0,04	148,83 ± 6,7
18.	Sdj. Corr	19	3948 ± 181	4,30 ± 0,06	169,75 ± 8,8	190	3,63 ± 0,05	143,19 ± 6,5
19.	Hadsten Adson	18	3594 ± 194	4,58 ± 0,06	164,53 ± 9,3	185	3,72 ± 0,05	133,63 ± 6,1
20.	Horsens Bast	20	3487 ± 157	4,33 ± 0,05	150,93 ± 6,2	169	3,72 ± 0,03	129,64 ± 5,3
21.	Varde Regent	19	3547 ± 292	4,32 ± 0,05	153,06 ± 12,9	172	3,70 ± 0,03	131,32 ± 10,6
22.	Hjørring Vester	15	3329 ± 230	4,53 ± 0,06	150,88 ± 10,0	170	3,74 ± 0,04	124,58 ± 8,0
23.	Århus Tax	19	3468 ± 225	4,19 ± 0,04	145,18 ± 8,9	163	3,54 ± 0,04	122,63 ± 6,8
Gns. (Average)		18	4268	4,33	184,77	207	3,63	154,74

Jerseyrace:

1. Horsens Frank	19	3470 ± 99	6,76 ± 0,12	234,62 ± 7,5	267	4,21 ± 0,04	146,24 ± 4,0
2. Egholm Russ	19	3509 ± 112	6,65 ± 0,12	233,36 ± 6,0	265	4,36 ± 0,04	153,06 ± 4,3
3. Gefion	20	3513 ± 83	6,46 ± 0,05	226,97 ± 5,5	258	4,18 ± 0,03	146,68 ± 3,6
4. Hjørring Baun	19	3437 ± 117	6,29 ± 0,09	216,32 ± 6,4	246	4,16 ± 0,04	143,09 ± 4,5
5. Holm Syd	21	3224 ± 114	6,69 ± 0,07	215,80 ± 7,7	245	4,26 ± 0,04	137,45 ± 4,6
6. Årup Vestfyns Fax	20	3334 ± 114	6,57 ± 0,10	219,02 ± 6,2	249	4,21 ± 0,04	140,40 ± 4,0
7. Holbæk Sjus	16	3487 ± 122	6,25 ± 0,07	217,83 ± 7,5	247	4,16 ± 0,04	145,09 ± 4,9
8. Bjerringbro Hoff	16	3459 ± 155	6,35 ± 0,11	219,60 ± 9,7	249	4,22 ± 0,06	146,01 ± 6,0
9. Fåborg Nat	17	3159 ± 128	6,86 ± 0,12	216,79 ± 8,2	247	4,46 ± 0,04	140,79 ± 5,8
10. Vax Syd	22	3260 ± 122	6,56 ± 0,09	213,96 ± 7,2	243	4,27 ± 0,04	139,19 ± 4,5
11. Randers Russ	20	3196 ± 116	6,56 ± 0,06	209,63 ± 6,7	238	4,23 ± 0,03	135,10 ± 4,9
12. Sydvestfyns Jon	20	3151 ± 63	6,27 ± 0,06	197,55 ± 5,3	224	4,21 ± 0,03	132,53 ± 3,6
13. Hjørring Tæbring	18	3116 ± 118	6,41 ± 0,10	199,79 ± 7,0	227	4,19 ± 0,03	130,70 ± 4,9
14. Hoff Syd	15	3002 ± 164	6,66 ± 0,14	200,04 ± 9,0	227	4,26 ± 0,05	127,75 ± 5,9
15. Årup Vestfyns Gems	20	3133 ± 128	6,38 ± 0,08	199,92 ± 7,0	227	4,16 ± 0,04	130,27 ± 4,6
Gns. (Average)	19	3297	6,51	214,75	244	4,23	139,62

Tabel 12. Spredning (standardafvigelse) af døtrenes ydelsestal.

Table 12. Standard deviation of the daughters' yield-figures

Tyrens navn Name of bull	kg mælk kg milk	% fedt Fat percentage	kg smørfedt kg butterfat	% protein Prot. percentage	kg mælkeprot. kg protein	Afkomsprøvestation Testing station
<i>RDM:</i>						
Hjørring Vagn	612	0,17	24,2	0,22	19,2	Dybvad
Hjørring Nørreby	631	0,43	24,9	0,18	20,1	Dybvad
Skærup Ørnkær	761	0,27	25,3	0,15	24,5	Skovgård
Djurs Bitz	592	0,19	26,2	0,15	20,3	Kalø
Århus Gorm	621	0,29	26,3	0,21	19,0	Elkjær
Hammel Ideal	527	0,27	27,1	0,14	17,5	Kalø
Kolding Eg	714	0,28	28,6	0,15	23,8	Gelballegård
Fåborg Moss	605	0,25	29,0	0,13	24,1	Lægård
Herning Munk	576	0,43	29,8	0,19	20,5	Moessgård
Skive Sten	712	0,28	30,0	0,18	22,4	Krarup Nygård
Årup Vestfyns Prins	567	0,30	30,0	0,18	19,6	Ejstrupgård
Haslev Ideal	778	0,28	31,3	0,16	25,5	Grønhøjgård
Hau Nøddekær	852	0,21	31,4	0,16	26,6	Sydsjælland
Ribe Ås	560	0,27	31,6	0,15	21,3	Skølvd

Varde Bram	729	0,16	32,6	0,13	24,8	Vardegård
Sydvestfyns Fast	782	0,30	32,7	0,19	27,1	Ejstrupgård
Holbæk Morskær	769	0,34	33,0	0,15	26,7	Torntofte
Dybbøl Rhin	855	0,22	33,2	0,13	28,7	Veesbæk
Varde Wano	673	0,21	34,6	0,12	24,7	Vardegård
Langelands Gut	825	0,32	34,9	0,13	27,6	Bellinge
Bjerringbro Munk	801	0,23	34,9	0,14	28,3	Rosenfeldt
Rudme Søe	861	0,38	35,1	0,15	30,9	Enemærket
Bornholms Ydan	863	0,26	35,1	0,19	28,1	Kannikegård
Sortkær	919	0,29	35,2	0,19	27,9	Kalø
Ålborg Nor	821	0,34	35,4	0,16	27,8	Lundgård
Nordfyns Urban	739	0,22	36,7	0,16	25,3	Enemærket
Åbenrå Sortemose	754	0,29	37,2	0,14	27,7	Brøstrupgård
Dybbøl Od	909	0,19	37,3	0,12	31,2	Veesbæk
Centrums Værn	822	0,29	37,4	0,16	28,0	Enemærket
Morsø Munk	896	0,20	38,4	0,10	29,8	Morsø
M. A. Cæsar	906	0,24	40,5	0,17	31,6	Bellinge
Ejlekær Sydvest	898	0,31	42,4	0,16	32,7	Grønhøjgård
Gns. (Average)	748	0,27	32,6	0,16	25,4	

Tyrens navn Name of bull	kg mælk kg milk	% fedt Fat percentage	kg smørfedt kg butterfat	% protein Prot. percentage	kg mælkeprot. kg protein	Afkomsprøvestation Testing station
<i>SDM:</i>						
Bjerringbro Rico	441	0,25	16,8	0,15	14,8	Rosenfeldt
Thy Drost	519	0,22	25,9	0,17	16,3	Kronborg
Sdj. Sten	687	0,18	27,3	0,12	24,5	Brøstrupgård
Horsens Bast	700	0,23	27,5	0,15	23,9	Østerhåb
Kolding Bos	763	0,29	30,3	0,13	25,1	Gelballegård
Ålborg Knud	748	0,29	30,8	0,22	24,1	Lundgård
Herning Esp	764	0,32	31,8	0,11	25,6	Moesgård
Sdj. Peter	743	0,21	33,3	0,17	23,0	Brøstrupgård
Århus Thor	830	0,26	34,0	0,16	28,6	Elkjær
Ålborg Cor	799	0,27	35,8	0,24	25,2	Lundgård
Hjørring Zelo	754	0,21	37,4	0,12	27,5	Dybvad
Dybbøl Faust	843	0,14	37,6	0,13	29,1	Veesbæk
Sdj. Corr	788	0,26	38,3	0,20	28,4	Brøstrupgård
Århus Tax	980	0,18	38,8	0,19	29,8	Elkjær
Hjørring Vester	891	0,23	38,9	0,17	30,8	Dybvad
Give Robinea	875	0,27	39,2	0,17	28,3	Skovgård
Hadsten Adson	824	0,26	39,6	0,20	26,1	Kalø
Thy Juvel	931	0,29	39,8	0,14	30,1	Kronborg
Skive Bert	927	0,25	40,6	0,18	31,4	Krarup Nygård
Kern	1034	0,24	41,2	0,22	31,3	Lundgård
Morsø Drost	892	0,26	41,5	0,16	31,9	Morsø
Bjerringbro Frans	834	0,32	42,2	0,15	27,4	Rosenfeldt
Varde Regent	1272	0,23	56,3	0,15	46,1	Vardegård
Gns. (Average)	819	0,25	35,9	0,17	27,4	

Jerseyrace:

Sydvestfyns Jon	283	0,29	23,8	0,15	16,1	Ejstrupgård
Gefion	369	0,22	24,4	0,14	16,1	Kalø
Egholm Russ	489	0,53	26,2	0,17	18,9	Skovgård
Arup Vestfyns Fax	509	0,46	27,7	0,18	17,8	Østerhåb
Hjørring Baun	508	0,41	27,8	0,18	19,5	Dybvad
Hjørring Tæbring	501	0,44	29,6	0,14	20,6	Dybvad
Holbæk Sjus	490	0,29	30,0	0,17	19,4	Torntofte
Randers Russ	520	0,27	30,1	0,14	22,1	Kalø
Arup Vestfyns Gems	571	0,37	31,5	0,18	20,6	Moesgård
Horsens Frank	433	0,52	32,8	0,19	17,3	Østerhåb
Vax Syd	573	0,40	33,9	0,16	21,3	Skølvad
Fåborg Nat	529	0,50	33,9	0,16	23,9	Lægård
Hoff Syd	634	0,53	34,8	0,20	22,7	Skølvad
Holm Syd	524	0,33	35,4	0,17	20,9	Skølvad
Bjerringbro Hoff	619	0,44	38,6	0,25	23,9	Kalø
Gns. (Average)	503	0,40	30,7	0,17	20,1	

3. Udholdenheden i ydelsen.

I *tabel 10* findes oplysning om udholdenheden i ydelsen for de forskellige afkomsprøvehold. Ydelsen i de første 100 dage er sat til 100, medens ydelsen i perioden 101–200 og 201–304 dage er udtrykt i procent af ydelsen i de første 100 dage. Hvis der er udsat kvier, efter at 100 dages opgørelsen er foretaget, er der udregnet nye opgørelser, således at det er de samme kvier, som er med i alle opgørelser.

For alle 3 racers vedkommende var der som helhed god udholdenhed i ydelsen. For Rød Dansk Malkerace var der knap så god udholdenhed i ydelsen i den sidste del af prøvetiden som i 1966–67, men der var også meget fin udholdenhed i ydelsen i 1966–67. Udholdenheden i ydelsen var enestående god i vinterperioden for Jerseyholdene, medens udholdenheden i ydelsen i den sidste del af prøvetiden svarede fint til de opnåede resultater i 1966–67.

Inden for Rød Dansk Malkerace havde holdet efter Langelands Gut en usædvanlig flad laktationskurve. Der var også en fin udholdenhed i ydelsen på holdene efter Nordfyns Urban, Skærup Ørnkær, Årup Vestfyns Prins, Hjørring Vagn, Kolding Eg, M. A. Cæsar, Hjørring Nørreby og Sydvestfyns Fast.

Af de sortbrogede hold blev den bedste udholdenhed i ydelsen opnået af holdet efter Kern, men der var dog også særdeles god udholdenhed i ydelsen på holdene efter Kolding Bos, Ålborg Cor, Hjørring Zelo og Give Robinea.

Inden for Jerseyracen havde holdet efter Hjørring Baun den bedste udholdenhed i ydelsen. Holdene efter Egholm Russ, Vax Syd, Sydvestfyns Jon og Hjørring Tæbring havde også god udholdenhed i ydelsen.

4. Ydelsen i 250 dage.

Til denne opgørelse er ydelsen udregnet i 250 dage for hver enkelt kvie. Holdene er rangeret i samme rækkefølge som ved 304 dages opgørelsen.

Holdenes gennemsnitlige ydelse er anført i *tabel 11*, og for mælk, fedtprocent, smørfedt, proteinprocent og mælkeprotein er desuden vedføjet middelfejlen på middeltallet.

5. Spredningen.

Spredningen i holdenes ydelse er anført i *tabel 12* og omfatter mælk, fedtprocent, smørfedt, proteinprocent og mælkeprotein. Holdene er rangeret efter spredningen i smørfedydelsen, således at holdet med den mindste spredning er placeret øverst. Spredningen udregnes på grundlag af de enkelte kviers ydelse i 250 dage.

Ved 250 dages opgørelsen havde holdet efter Hjørring Vagn en gennemsnitlig smørfedydelse på 194,7 kg smørfedt. Havde der været en kvie mere

på holdet, ville der have været 68,3 pct. sandsynlighed for, at den ydede $194,7 \pm 24,2$ kg smørfedt, hvilket vil sige i intervallet fra 170,5 til 218,9 kg smørfedt. Sandsynligheden for, at ydelsen skulle blive $194,7 \pm 48,4$ kg smørfedt, er 95,4 procent.

Den gennemsnitlige spredning i ydelsestallene for Rød Dansk Malakerace blev en smule større end i 1966-67, men der er dog kun tale om små forskelle. Inden for Rød Dansk Malakerace fandtes den mindste spredning i smørfedtydelsen på holdene efter Hjørring Vagn, Hjørring Nørreby og Skærup Ørnkær. Den største spredning i smørfedtydelsen forekom på holdene efter Ejlekær Sydvest og M. A. Cæsar.

Da et af holdene inden for Sortbroget Dansk Malakerace havde meget stor variation i mælkeydelsen, blev den gennemsnitlige spredning for ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein lidt større end for holdene af Rød Dansk Malakerace. Ydelsestallene var meget ensartede for holdet efter Bjerringbro Rico, som havde den mindste spredning i smørfedtydelsen af årets hold. Holdet efter Varde Regent havde den største spredning i ydelsestallene for mælk og smørfedt af samtlige hold i afkomsprøvernes historie.

Inden for Jerseyracen var der ret stor spredning i fedtprocenten, medens den gennemsnitlige spredning for de øvrige ydelsestal svarede fint til de tilsvarende tal i 1966-67. Den mindste spredning i smørfedtydelsen inden for Jerseyracen blev opnået af holdene efter Sydvestfyns Jon og Gefion, medens den største forekom på holdet efter Bjerringbro Hoff.

Som i de foregående år havde Jerseyholdene den mindste spredning i ydelsestallene for mælk og mælkeprotein, medens de havde den største spredning i fedtprocenten. Det er bemærkelsesværdigt, at selv om proteinprocenten er højere for Jerseyracen end for de to andre racer, er der år efter år samme størrelsesorden i spredningen af proteinprocenten for alle 3 racer.

J. Malkbarhedsundersøgelsen.

Malkearbejdet på afkomsprøvestationer gennemførtes efter følgende retningslinier:

1. Yverne aftørredes med en klud vredet op i vand på ca. 30-40°C, ca. 1 minut før maskinen blev sat på.
2. Yveret fik massage umiddelbart før maskinmalkningen.
3. Der anvendtes maksimalt to maskiner pr. mand.
4. Malkerne skulle sørge for, at maskinen ikke sad for længe på kvien.
5. Der måtte ikke eftermalkes med hånd.
6. Der var 11 timer mellem påbegyndelse af morgen- og aftenmalkning, medens natintervallet blev på 13 timer.

Tabel 13. Malkbarhedsundersøgelser.
Table 13. Investigations on milking ability

RDM:	Kg mælk, gns. pr. kvie		Malk- barheds- tallet	% af mælken i de første 3 min.	Malke- tid i min. gns. pr. kvie	Opstukket eller op- blokket		Afkom- prøvestation
	dgl.	pr. min.				an- tal kvi- ter	an- tal pat- ter	
Tyrens navn			Milk- ing rate	% of milk in the first 3 min.	Milking time in min. av. per cow	Treated teats*)		Testing station
Name of bull	daily	per min.				no. of cows	no. of teats	
Hjørring Vagn	17,4	2,80	2,69	88,8	3,3	0	0	Dybvad
Ejlekær Sydvest	14,6	2,40	2,52	87,4	3,3	0	0	Grønhøjgård
Centrums Værn	18,7	2,60	2,38	89,8	3,6	1	4	Enemærket
Fåborg Moss	17,5	2,28	2,16	83,0	4,0	0	0	Lægård
Kolding Eg	17,1	2,16	2,08	80,4	4,2	0	0	Gelballegård
Nordfyns Urban	18,9	2,30	2,07	80,6	4,3	0	0	Enemærket
Djurs Bitz	20,0	2,35	2,03	77,9	4,4	1	1	Kalø
Dybbøl Od	18,1	2,18	2,01	78,4	4,4	0	0	Veesbæk
Rudme Søe	20,3	2,35	2,00	73,8	4,5	1	2	Enemærket
Haslev Ideal	20,2	2,30	1,96	72,4	4,6	0	0	Grønhøjgård
Åbenrå Sortemose	14,5	1,84	1,96	81,9	4,1	1	4	Brøstrupgård
M. A. Cæsar	17,0	2,03	1,95	80,4	4,4	0	0	Bellinge
Hammel Ideal	19,6	2,23	1,94	76,5	4,7	0	0	Kalø
Århus Gorm	17,8	2,09	1,94	74,5	4,5	1	1	Elkjær
Hjørring Nørreby	16,3	1,93	1,91	76,6	4,4	1	4	Dybvad
Morsø Munk	18,0	2,07	1,90	74,4	4,5	0	0	Morsø
Årup Vestfyns Prins	17,5	2,01	1,89	77,0	4,7	0	0	Ejstrupgård
Skive Sten	17,0	1,97	1,88	77,6	4,4	0	0	Krarup Nygård
Bornholms Ydan	19,4	2,15	1,88	76,4	4,7	0	0	Kannikegård
Sortkær	16,1	1,83	1,82	74,9	4,7	0	0	Kalø
Herning Munk	17,7	1,93	1,79	68,4	4,8	0	0	Moesgård
Varde Bram	15,0	1,70	1,78	76,1	4,8	0	0	Vardegård
Ålborg Nor	20,9	2,18	1,78	68,2	5,0	0	0	Lundgård
Holbæk Morskær	22,6	2,24	1,70	66,5	5,3	0	0	Tornstofte
Ribe As	17,2	1,68	1,58	69,9	5,5	0	0	Skølvad
Varde Wano	16,7	1,64	1,58	69,3	5,3	0	0	Vardegård
Langlands Gut	19,2	1,76	1,50	61,6	5,7	0	0	Bellinge
Skærup Ørnkær	18,0	1,57	1,41	63,6	6,0	0	0	Skovgård
Dybbøl Rhin	16,2	1,35	1,33	54,4	6,3	0	0	Veesbæk
Sydvestfyns Fast	13,5	1,13	1,33	59,6	6,1	2	2	Ejstrupgård
Bjerringbro Munk	18,7	1,47	1,26	55,8	6,8	0	0	Rosenfeldt
Hau Nøddekær	21,4	1,65	1,21	54,6	6,8	1	4	Sydsjælland
Gns. (Average)	17,9	2,01	1,85	73,5	4,8			

*) A dilator was used to widen the teat canal.

(fortsat).

SDM:	Kg mælk, gns. pr. kvie		Malk- barheds- tallet	% af mælken i de første 3 min.	Malke- tid i min. gns. pr. kvie	Opstukket eller op- blokket		Afkom- sprøve- station
	dgk.	pr. min.				an- tal kvie- ter	an- tal pat- ter	
Tyrens navn			Corr. milk- ing rate	% of milk in the first 3 min.	Milking time in min. av. per cow	Treated teats*)		Testing station
Name of bull	daily	per min.				no. of cows	no. of teats	
Sdj. Peter	16,2	2,67	2,65	91,3	3,2	0	0	Brøstrupgård
Bjerringbro Rico	18,0	2,61	2,44	88,1	3,6	0	0	Rosenfeldt
Århus Tax	13,5	2,19	2,39	92,0	3,2	0	0	Elkjær
Hjørring Vester	13,3	2,15	2,37	89,5	3,2	0	0	Dybvad
Horsens Bast	13,4	2,14	2,34	91,2	3,3	0	0	Østerhåb
Kolding Bos	18,6	2,52	2,31	85,2	3,8	0	0	Gelballegård
Århus Thor	17,9	2,39	2,24	84,0	3,8	0	0	Elkjær
Morsø Drost	17,5	2,33	2,21	81,3	4,0	0	0	Morsø
Hadsten Adson	14,1	2,04	2,20	87,8	3,7	0	0	Kalø
Ålborg Knud	17,6	2,33	2,20	81,1	4,0	0	0	Lundgård
Sdj. Corr	15,2	2,13	2,19	85,6	3,7	0	0	Brøstrupgård
Kern	18,4	2,36	2,17	80,2	4,2	0	0	Lundgård
Bjerringbro Frans	19,1	2,41	2,16	81,0	4,1	0	0	Rosenfeldt
Thy Juvel	17,2	2,21	2,12	78,8	4,1	0	0	Kronborg
Varde Regent	13,6	1,88	2,08	86,3	3,7	0	0	Vardegård
Dybbøl Faust	18,5	2,27	2,07	80,7	4,2	0	0	Veesbæk
Sdj. Sten	16,9	2,13	2,06	80,4	4,1	0	0	Brøstrupgård
Thy Drost	18,2	2,11	1,93	73,2	4,8	0	0	Kronborg
Ålborg Cor	19,7	2,23	1,92	73,3	4,7	0	0	Lundgård
Herning Esp	19,8	2,20	1,90	70,2	4,8	0	0	Moesgård
Give Robinea	16,3	1,78	1,75	72,8	5,1	0	0	Skovgård
Skive Bert	20,2	2,07	1,73	70,6	5,1	0	0	Krarup Nygård
Hjørring Zelo	16,0	1,67	1,67	66,4	4,8	0	0	Dybvad
Gns. (Average)	16,9	2,21	2,13	81,3	4,1			

Jerseyrace:

Hjørring Tæbring	12,6	2,16	2,12	89,8	3,1	0	0	Dybvad
Sydvestfyns Jon	13,0	2,11	2,04	94,8	3,1	0	0	Ejstrupgård
Holbæk Sjus	13,7	2,05	1,94	88,5	3,4	0	0	Torntofte
Hjørring Baun	13,7	2,06	1,94	87,9	3,5	0	0	Dybvad
Årup Vestfyns Fax	12,7	1,90	1,85	89,1	3,4	0	0	Østerhåb
Årup Vestfyns Gems	12,3	1,86	1,84	89,3	3,4	0	0	Moesgård
Horsens Frank	13,8	1,93	1,81	83,4	3,7	0	0	Østerhåb
Holm Syd	12,7	1,71	1,66	85,0	4,0	0	0	Skølvad
Bjerringbro Hoff	14,6	1,81	1,64	78,1	4,2	0	0	Kalø
Fåborg Nat	13,1	1,65	1,57	83,2	4,1	0	0	Lægård
Hoff Syd	12,3	1,56	1,54	85,6	4,0	0	0	Skølvad
Randers Russ	12,8	1,58	1,52	79,1	4,2	0	0	Kalø
Vax Syd	13,2	1,50	1,42	78,8	4,6	0	0	Skølvad
Egholm Russ	13,5	1,39	1,29	70,0	5,1	0	0	Skovgård
Gefion	14,1	1,43	1,28	65,2	5,2	0	0	Kalø
Gns. (Average)	13,2	1,78	1,70	83,2	3,9			

Der blev foretaget en ekstra malkbarhedsundersøgelse i november og december måned for alle hold af RDM og SDM samt for en del af Jerseyholdene, men resultaterne fra denne undersøgelse blev kun anvendt ved udpegningen af de tyre, som skulle have sønner afprøvet på Egtved.

Den egentlige malkbarhedsundersøgelse begyndte den 3. januar og blev afsluttet den 14. marts. Der blev foretaget to målinger, som hver omfattede et døgn, hvorved kviernes malkbarhed blev undersøgt ved 4 malkninger. To assistenter foretog undersøgelserne af holdene. De hold, som undersøgtes først i januar måned, undersøgtes i slutningen i den sidste omgang, således at det ikke var de samme hold, som undersøgtes først i begge omgange.

Ved malkbarhedsundersøgelserne bestemmes kg mælk for hvert minut, maskintidens længde og mælkemængden.

Resultaterne findes anført i *tabel 13*, og opstillingen er foretaget efter malkbarhedstallet inden for hver af racerne.

Ved udregningerne af tallene er anvendt følgende fremgangsmåde:

$$\text{kg mælk pr. minut} = \frac{\text{kg mælk}}{\text{malketiden i min.}}$$

$$\text{pct. af mælken i de første 3 min.} = \frac{\text{kg mælk i de første 3 min.} \times 100}{\text{kg mælk i alt}}$$

$$\text{malketid i min.} = \frac{\text{maskinmalketiden i min.}}{\text{antal malkninger}}$$

Malkbarhedstallet udregnes efter følgende formler for de 3 racer:

$$\begin{aligned} \text{RDM:} & \quad \text{kg mælk pr. min.} \div 0,081 \text{ (kg mælk daglig} \div 16,0) \\ \text{SDM:} & \quad \text{kg mælk pr. min.} \div 0,081 \text{ (kg mælk daglig} \div 16,0) \\ \text{Jerseyrace:} & \quad \text{kg mælk pr. min.} \div 0,068 \text{ (kg mælk daglig} \div 12,0) \end{aligned}$$

Malkbarhedstallet er udregnet for de enkelte kvier, og tallene findes anført i hovedtabellerne, som findes sidst i beretningen. Gennemsnittet af de enkelte kviers malkbarhedstal angiver holdets malkbarhedstal og er anført i *tabel 13*.

Det er naturligt, at der i gennemsnit opnåedes lavere malkbarhedstal for alle 3 racer end i 1966-67, hvor der blev eftermalket med hånd. Undladelsen af eftermalkning med hånd har medvirket til en forlængelse af malketiden.

Inden for Rød Dansk Malkerace fik holdet efter Hjørring Vagn det fineste resultat med et højt malkbarhedstal. De følgende 3 pladser besattes med holdene efter halvbrødrene Ejlekær Sydvest, Centrum Værn og Fåborg Moss. Flere af de følgende hold opnåede også gode malkbarhedsresultater.

De dårligste malkbarhedsresultater blev opnået på holdene efter Hau Nøddekær, Bjerringbro Munk, Sydvestfyns Fast og Dybbøl Rhin. Der blev foretaget opstikninger eller opblokninger på 22 patter, og det svarer til 0,7 patter pr. hold, medens det var 1,1 i 1966-67.

Af holdene inden for Sortbroget Dansk Malkerace blev de bedste resultater opnået af holdene efter Sdj. Peter og Bjerringbro Rico, medens de følgende to pladser blev besat med holdene efter halvbrødrene Århus Tax og Hjørring Vester. De dårligste resultater blev opnået af holdene efter Hjørring Zelo, Skive Bert og Give Robinea. Der blev ikke foretaget behandlinger af patterne på nogen af kvierne.

Inden for Jerseyracen opnåedes de fineste malkbarhedsresultater på holdene efter Hjørring Tæbring, Sydvestfyns Jon, Holbæk Sjus og Hjørring Baun. Af disse 4 tyre er Sydvestfyns Jon og Hjørring Baun halvbrødre, da de begge er tillagt på nr. 23 hos Johs. Pedersen, Bremerskov. De dårligste malkbarhedsresultater blev opnået på holdene efter Gefion, Egholm Russ og Vax Syd. Der blev ikke foretaget nogen behandlinger af patterne, men dette var heller ikke tilfældet i de 3 foregående år.

K. Vejning og måling.

Kvierne vejes ved ankomsten til stationen. Efter kælvningen og umiddelbart før udbindingen vejes kvierne i 3 på hinanden følgende dage, hvor forskellen mellem den højeste og den laveste vægt højest udgør 2 pct. Desuden vejes kvierne i januar og marts samt en gang månedlig i sommerperioden. Endelig vejes kvierne ved prøvens slutning og før hjemsendelsen, men disse to vejninger kan falde sammen, da kvierne ofte hjemsendes ved prøvens slutning.

Målingerne af kvierne blev begyndt den 1. marts og afsluttet den 28. marts, og alle målene blev taget af videnskabelig assistent, agronom Børge Vesth. Holdenes gennemsnitsresultater fra målingen og vejningen i marts måned findes anført i *tabel 14*.

For alle 3 racer var kvierne i gennemsnit lidt ældre end i 1966-67. Gennemsnitsmålene viste god overensstemmelse med resultaterne fra 1966-67 for såvel Rød Dansk Malkerace som Sortbroget Dansk Malkerace. For Jerseyracens vedkommende blev brystomfanget i gennemsnit 3 cm mindre end i 1966-67, medens der for de øvrige måls vedkommende var god overensstemmelse med de opnåede resultater i de to sidste prøveår. De røde hold havde samme gennemsnitsvægt som i 1966-67, hvorimod gennemsnitsvægten for de sortbrogede blev 10 kg større end i 1966-67. Jerseyholdene vejede derimod 10 kg mindre i gennemsnit end i 1966-67.

Tabel 14. Holdenæs gns. alder, vægt og mål i marts 1968.

Table 14. The average age, weight and measurements of the groups in March 1968

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm	Afkomsprøvestation
<i>Name of bull</i>	<i>Age days</i>	<i>Weight kg</i>	<i>Heart girth cm</i>	<i>Height at withers cm</i>	<i>Depth of chest cm</i>	<i>Width at hips cm</i>	<i>Width at thurls cm</i>	<i>Testing station</i>
RDM:								
1. Holbæk Morskær	1082	546	188	132	71	54	51	Torntofte
2. Djurs Bitz	1014	526	184	128	69	53	50	Kalø
3. Langelands Gut	1080	544	191	128	71	53	50	Bellinge
4. Alborg Nor	1136	593	194	134	73	56	52	Lundgård
5. Hammel Ideal	1071	518	187	129	70	53	50	Kalø
6. Hau Nøddekær	1105	559	192	131	72	54	50	Sydsjælland
7. Nordfyns Urban	1062	552	193	131	68	50	47	Enemærket
8. Haslev Ideal	1043	528	186	130	70	52	49	Grønhøjgård
9. Ribe Ås	1027	540	187	131	71	54	50	Skølvad
10. Bjerringbro Munk	1045	553	190	130	70	53	51	Rosenfeldt
11. Skærup Ørnkær	1080	523	187	129	71	53	50	Skovgård
12. Bornholms Ydan	1028	527	185	129	70	54	50	Kannikegård
13. Centrums Værn	1058	551	190	129	70	53	50	Enemærket

14. Århus Gorm	1127	533	189	128	71	54	50	Elkjær
15. Årup Vestfyns Prins	1049	522	187	130	69	52	49	Ejstrupgård
16. Fåborg Moss	1031	518	185	127	69	52	49	Lægård
17. Hjørring Vagn	1126	519	189	131	72	53	50	Dybvad
18. Kolding Eg	995	536	186	128	69	52	49	Gelballegård
19. M. A. Cæsar	1027	547	191	130	70	53	50	Bellinge
20. Skive Sten	1117	520	191	132	72	54	51	Krarup Nygård
21. Rudme Sø	985	531	186	129	70	52	50	Enemærket
22. Varde Wano	1047	517	190	132	72	54	50	Vardegård
23. Hjørring Nørreby	1084	511	186	130	70	53	50	Dybvad
24. Herning Munk	1104	562	193	130	72	53	50	Moesgård
25. Morsø Munk	1054	551	190	129	71	54	51	Morsø
26. Dybbøl Od	1028	523	188	127	70	52	49	Veesbæk
27. Åbenrå Sortemose	1090	544	192	131	71	54	50	Brøstrupgård
28. Sortkær	1087	559	192	129	72	54	51	Kalø
29. Dybbøl Rhin	1138	588	196	130	72	54	50	Veesbæk
30. Varde Bram	967	506	187	129	69	53	49	Vardegård
31. Ejlekær Sydvest	1069	554	189	128	70	53	50	Grønhøjgård
32. Sydvestfyns Fast	1003	541	191	130	71	54	50	Ejstrupgård
Gns. (Average)	1061	539	189	130	71	53	50	

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm	Afkomsprøvestation
Name of bull	Age days	Weight kg	Heart girth cm	Height at withers cm	Depth of chest cm	Width at hips cm	Width at thurls cm	Testing station
SDM:								
1. Skive Bert	1064	530	193	133	72	55	51	Krarup Nygård
2. Bjerringbro Frans	1064	585	200	131	73	57	54	Rosenfeldt
3. Thy Drost	1075	596	201	131	73	59	54	Kronborg
4. Kolding Bos	998	523	188	127	69	53	50	Gelballegård
5. Dybbøl Faust	1158	579	201	128	74	56	53	Veesbæk
6. Kern	1059	586	199	130	72	57	54	Lundgård
7. Bjerringbro Rico	1064	557	196	128	72	55	53	Rosenfeldt
8. Ålborg Cor	1064	563	192	129	71	55	53	Lundgård
9. Århus Thor	1043	541	190	127	71	54	52	Elkjær
10. Ålborg Knud	1082	595	195	131	72	57	55	Lundgård
11. Hjørring Zelo	1145	561	198	130	73	57	53	Dybvad
12. Herning Esp	1066	540	193	128	71	54	51	Moesgård
13. Morsø Drost	1042	564	195	130	73	57	53	Morsø
14. Sdj. Sten	1095	561	196	129	71	55	52	Brøstrupgård
15. Thy Juvel	1054	562	193	128	71	56	53	Kronborg
16. Sdj. Peter	1081	555	194	129	71	56	53	Brøstrupgård
17. Give Robinea	1063	553	199	130	72	55	51	Skovgård
18. Sdj. Corr	1085	561	195	129	72	56	53	Brøstrupgård
19. Hadsten Adson	1120	557	197	129	72	56	53	Kalø
20. Horsens Bast	982	533	190	130	69	54	52	Østerhåb
21. Varde Regent	1081	539	195	129	71	55	51	Vardegård
22. Hjørring Vester	1055	536	194	130	72	55	52	Dybvad
23. Århus Tax	1010	543	197	129	72	54	52	Elkjær
Gns. (Average)	1067	557	195	129	72	56	53	

Jerseyrace:

1. Horsens Frank	946	342	163	119	63	43	39	Østerhåb
2. Egholm Russ	982	363	168	122	65	45	40	Skovgård
3. Gefion	886	365	168	118	64	44	41	Kalø
4. Hjørring Baun	954	345	162	120	64	46	41	Dybvad
5. Holm Syd	927	356	165	121	63	44	39	Skølvad
6. Årup Vestfyns Fax	920	340	164	117	63	44	39	Østerhåb
7. Holbæk Sjus	883	336	161	119	62	44	40	Torntofte
8. Bjerringbro Hoff	990	373	169	119	64	45	41	Kalø
9. Fåborg Nat	885	350	165	116	64	45	40	Lægård
10. Vax Syd	914	346	165	116	63	44	40	Skølvad
11. Randers Russ	927	351	163	119	63	45	41	Kalø
12. Sydvestfyns Jon	883	351	164	118	63	45	40	Ejstrupgård
13. Hjørring Tæbring	949	359	168	121	64	47	41	Dybvad
14. Hoff Syd	918	352	165	118	64	45	40	Skølvad
15. Årup Vestfyns Gems	935	373	167	119	64	46	41	Moesgård
Gns. (Average)	927	353	165	119	64	45	40	

L. De enkelte tyre og deres afkomsprøvehold.

1. RØD DANSK MALKERACE

Holbæk Morskær, s. 28672, f. 9. marts 1963

hos Johannes Andersen, Enggård, Hønsinge, Nørre-Asmindrup.

Afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1968 v. De s. sj. Ldf.

Ejer: Holbæk Amts Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416. Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 59, s. 26537. Mf. Rørby Øst, s. 4463. Mm. Nr. 18, s. 21408.

Gns. af 18 døtre på Torntofte:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
6306	4,50	284	3,75	236

Kvierne startede prøvetiden med høje dagsydelser, og holdet fik førstepladsen ved alle korttidsopgørelserne. Fedt- og proteinprocenterne var middelhøje, og da mælkeydelsen var meget høj, opnåedes en høj ydelse af smør og mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var fremragende, og der var en meget flad ydelseskurve i vinterperioden. Der var ret stor spredning i fedtprocenterne, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Den højestydende kvie ydede 425 kg smør i 308 foderdage, og den lavestydende kom på 261 kg smør i 263 dage. Alle kvier opnåede høje ydelsestal. Der opnåedes ret gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Der var flere vanskelige kælvninger på dette hold, hvilket bevirkede, at 5 af kalvene døde ved fødslen. En af kalvene blev parteret. Kvierne fødte også meget store kalve, og gennemsnitsvægten blev 42 kg. Ædelysten var god, og kvierne havde et roligt temperament. Der opnåedes en knap middelstor tilvækst, men kvierne var også lidt malkeprægede. Sundhedstilstanden må betegnes som ret tilfredsstillende, selv om det tog lidt tid, inden flere af kvierne blev i orden efter de strenge kælvninger. Der medgik 2,5 ins. pr. drægtighed, og der var kun 5 kvier, som blev drægtige efter 1. ins.

Overvejende store eller godt middelhøje, jævnt dybe, ret ensartede mellemrøde og mørkmellemrøde kvier af markeret eller lidt skarp type. Velformet hoved og hals, flere med en smule fremskudt bov, gennemgående ret god dybde; ryggen hos nogle velbåret, hos andre lidt vigende eller en smule ujævn; krydset ret velformet, men gennemgående kun middelbredt og hos en ret stor del med markerede hofter eller noget fremtrædende, men gennemgående ikke grov korsbenskam og halerod, velformede lår, hos nogle dog med lidt flad skank og flere med lidt stærktbøjede eller en smule tætstillede haser. Velformet og velbåret yver med velformede og velstillede patter, enkelte dog med en smule fremskudt yver og flere med overtallige patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Djurs Bitz, s. 28748, f. 27. december 1962
hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

Ejer: Kvægavlsforeningen Østjyden.

Fader: Ålborg Bitz, e.A 4892. Ff. Højvig 47, s. 4221. Fm. Nr. 18, s. 22540.

Moder: Nr. 174, e.s. 28867. Mf. Thor, s. 4697. Mm. Nr. 149, s. 26764.

Gns. af 18 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5789	4,72	273	3,64	211

Selv om mange af kvierne havde meget høje fedtprocenter, og der opnåedes en høj middelfedtprocent, blev proteinprocenterne forholdsvis lave. Der opnåedes en høj smørydelse, og den højestydende kvie nåede 401 kg smør i 287 foderdage. Der var stor ensartethed i ydelsestallene, og der var god udholdenhed i ydelsen. De brugsmæssige egenskaber var særdeles gode, idet der opnåedes fine malkbarhedsresultater, og kvierne havde særdeles god ædelyst og reagerede ikke over for foderændringer. Kvierne havde et meget roligt temperament, og i sommerperioden så man dem ikke stå ved leddet og vente på at blive hentet hjem. En af kvierne var syg ved kælvningen, og dette bevirkede, at kalven blev parteret. De øvrige kvier fødte alle levende kalve. Sundhedstilstanden må som helhed betegnes som tilfredsstillende, selv om enkelte havde noget yverbetændelse. Der opnåedes en knap middelstor tilvækst. Kalvene var gennemgående store, og de vejede 41 kg i gennemsnit. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, gennemgående middelstore og muskuløse, ret anselige, adskillige uregelmæssigt byggede, de øvrige ret velformede, mellemrøde dyr af pæn bredde og god dybde samt ganske godt slag. Kønt hoved, velformet hals, en ret stor part løstbyggede med fremskudt bov og vigende til lav lænd, ret bredt, adskillige grovknoglet og lidt opsvejet kryds med høj halerod, velformede lår, velstillede lemmer. Rummeligt, overvejende velophængt yver med godt væv, adskillige ret kraftige og strittende patter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Langelands Gut, s. 28682, f. 29. oktober 1962
hos Gert Jensen, Tårup, Frørup.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1968 v. De s.f. Ldf.


Ejer: Langelands Elite-Kvægavlsforening.

Fader: Nordfyns Frem, e.A 4866. Ff. Morsø Wahl, e.A 4930. Fm. Nr. 65, s. 24793.

Moder: Nr. 9, e.s. 27639. Mf. Rudme Ideal, e.A 4864. Mm. Nr. 91, e.s. 26934.

kg
4 % mælk

Laktationskurve for holdet efter Langelands Gut 1967 - 68.



Gns. af 18 døtre på Bellinge:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5638	4,67	263	3,73	210

Kvierne på dette hold hostede meget i den første tid, de opholdt sig på stationen, og det blev derfor nødvendigt at tage dem på stald hele døgnet. Næsten alle kvierne kælvende meget tidligt, og da de ikke var helt sunde og raske ved kælvningen, var ydelsen ikke overvældende høj i begyndelsen af prøveåret. Sundhedstilstanden blev dog hurtigt bedre, og den gennemsnitlige dagsydelse steg en del, og holdet forbedrede sin position fra den ene korttidsopgørelse til den anden. Det er i øvrigt sjældent at se så flad en laktationskurve, som der blev opnået på dette hold, der havde den højeste ydelse i den midterste tredjedel af prøvetiden. Mælkeydelsen var særdeles god, fedtprocenterne over middel, medens proteinprocenterne var middelhøje. Den højestydende kvie nåede 424 kg smør i 327 foderdage, men der var i øvrigt intet særligt at bemærke med hensyn til variationen i ydelsestallene. Det tog lidt lang tid at malke kvierne i begyndelsen af prøveåret, og der opnåedes kun jævnt gode malkbarhedsresultater, men malkbarheden forbedredes dog betydeligt i den sidste halvdel af prøvetiden. Kvierne var gode at arbejde med, og de havde særdeles god ædelyst. Der opnåedes kun en knap middelstor tilvækst, men kvierne var også langt henne i drægtighedsperioden ved ankomsten til stationen. Kælvningerne forløb normalt. Det blev nødvendigt at udsætte 3 kvier under prøven, men der var jo også lidt problemer med sundhedstilstanden i begyndelsen af prøveåret. Kalvene vejede kun 37 kg i gennemsnit. Alle kvier nåede at blive erklæret drægtige inden hjemsendelsen, og 9 blev drægtige efter 1. ins. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Middelhøje og knap det, særdeles dybe, velbyggede og velprægede, mørk mellemrøde dyr. Fortrinlig dybde af midtstykke og af lyske, overvejende velbåret ryg; krydset velformet og velbåret, hos nogle dog med lidt høj korsbenskam samt lidt afrundet bagover, velformede lår. Yveret gennemgående velformet og velbåret, hos enkelte lidt fremskudt samt med lidt vidtstillede patter.

Holdet tilkendt mg ÷ for eksteriør.

Ålborg Nor, s. 28374, f. 4. april 1962
hos Thomas Sørensen, Norring Hougård, Hinnerup.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Ålborg Amt.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Ålborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 44, e.s. 27526. Mf. Sortemose, s. 4680. Mm. Nr. 15, f. 6. december 1952 hos Thomas Sørensen, Norring Hougård, Hinnerup.

Gns. af 17 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5973	4,34	260	3,68	220

Mælkeydelsen var særdeles høj, og selv om middelprocenten for fedt og protein ikke nåede racens gennemsnit, opnåedes alligevel en høj ydelse af smør og mælkeprotein. Der var en del variation i ydelsestallene for mælk, fedtprocent og smørfedt, medens der var middelstor spredning i proteinprocenten og mælkeproteinet. Enkelte af kvierne havde for lav fedtprocent. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til udholdenheden i ydelsen. Der opnåedes ret gode malkbarhedsresultater. Efter kælvningen var der en del af kvierne, som ikke kunne lægge mælken ned, hvorfor flere måtte behandles med hormoner, og enkelte måtte behandles flere gange. Kvierne var rolige og havde god ædelyst, og de opnåede en god tilvækst i prøvetiden. Det blev nødvendigt at udsætte 3 kvier af forskellige årsager. 5 kvier fik dødfødte kalve. Det kneb med drægtighedsforholdene, selv om 9 af de 17 kvier blev drægtige efter 1. ins. To kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige inden hjemsendelse. 3 kvier kastede, og det lykkedes kun at få den ene af dem erklæret drægtig igen, inden kvierne skulle hjemsendes.

Pænt ensartede, nær middelstore til store, anselige, adskillige betydelige, med regelmæssige til kun jævnt solide linier, muskuløse, triveligt prægede, mellemrøde dyr af godt slag. Almindeligt hoved, pæn hals, en del lidt fremskudt bov, udmærket bredde og dybde, adskillige noget lange, en del vigende ryg med lidt tynd kam og blød lænd, velbåret, bredt kryds, overvejende med gode rammer, kraftige lår, pæn benstilling. Overvejende velophængt yver af tilfredsstillende udstrækning, adskillige lange og kraftige patter, jævnt god pattestilling.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Hammel Ideal, s. 28321, f. 25. november 1960
hos Bent H. Nielsen, Nørremosegård, Kværndrup.

Ejer: Kvægavlsforeningen Midtjyden.

Fader: Rudme Ideal, e.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 175, s. 26225. Mf. Fåborg Ymer, s. 4272. Mm. Nr. 156, s. 25493.

Gns. af 19 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5427	4,73	257	3,79	206

Kvierne havde meget høje dagsydelser i begyndelsen af prøveåret, og selv om dagsydelsen faldt lidt for stærkt i den sidste halvdel af prøvetiden,

blev der alligevel opnået fine ydelsestal. Mælkeydelsen var god og fedtprocenterne høje, medens proteinprocenterne var middelhøje. Med undtagelse af fedtprocenterne, der udviste normal variation, var der stor ensartethed i ydelsestallene. De brugsmæssige egenskaber var fremragende, idet malkbarheden var god, og kvierne havde et roligt temperament og særdeles god ædelyst. Selv om en del af kvierne var malkeprægede, blev der alligevel opnået en god tilvækst i prøvetiden. Kalven blev parteret fra en af kvierne, og der var yderligere to dødfødte kalve. Kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 37 kg, men flertallet af dem var også kviekalve. Kvierne var forholdsvis robuste. De reagerede ikke over for foderændringer, og der var som helhed en god sundhedstilstand. Alle 19 kvier var erklæret drægtige inden hjemsendelsen, og der blev kun foretaget enkelte insemineringer efter udbindingen. Der var imidlertid kun 4 kvier, som blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,5 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, middelstore til godt middelstore, jævnt anselige og muskuløse, mellemrøde dyr af kun jævnt godt slag og flertallet uregelmæssigt byggede med usolide rammer og linier. Pænt hoved, velansat hals, adskillige fremskudt bov og vigende til lav eller noget ujævn ryg, kun jævnt brede, ret god dybde, overvejende lige, men oftest noget uregelmæssigt og tilspidset kryds med lave omdrejere eller noget fremtrædende korsbenskam, jævnt gode lår, enkelte noget indadtrejede haser, ellers ret pæn benstilling. Ret velformet og velophængt, dog noget varierende yver, enkelte noget grove og uregelmæssigt stillede patter.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Hau Nøddekær, s. 28469, f. 21. juni 1962
hos Chr. Sørensen, Holme, Havbro.

Ejer: Præstø Amts Kvægavlsforening.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Ålborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 100, s. 26810. Mf. Sverre, s. 4759. Mm. Nr. 35, s. 25294.

Gns. af 19 døtre på Sydsjælland:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
6002	4,28	257	3,71	223

Dette hold startede prøven med høje dagsydelser, og holdet kom til at slutte prøveåret med den næsthøjeste gennemsnitlige mælkeydelse af årets hold. Adskillige af kvierne havde for lave fedtprocenter i vinterperioden, og det er sandsynligvis en svaghed, som stammer fra kviernes farfader. Selv om fedtprocenterne var noget lave, blev proteinprocenterne omtrent middelhøje, og der opnåedes en høj ydelse af mælkeprotein. Fedtprocenterne var ret ensartede, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal.

Der var normal udholdenhed i ydelsen. Kvierne var langsomme og besværlige at malke, og holdet fik den ringeste placering af samtlige røde hold ved malkbarhedsundersøgelsen, men kviernes farmoder krævede også lang malketid, da den som 1. kalvs kvie stod i et afkomsprøvehold. Alle 19 kvier, som kælvende på stationen, gennemførte prøven, og de opnåede en meget stor tilvækst i prøvetiden. Flere af kvierne fødte små kalve, hvis gennemsnitsvægt kun blev 36 kg. 7 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Godt middelstore, dybe, velprægede, mellemrøde og mørklemmelrøde kvier. Markeret, hos nogle en smule fremskudt bov, gennemgående fortrinlig dybde; ryggen hos nogle velbåret, hos mange noget vigende og hos enkelte en smule ujævn; krydset gennemgående af god bredde, hos enkelte regelmæssigt firsidet og velformet, men hos mange med lidt kraftig korsbenskam og halerod eller en smule fremtrædende sædebensparti, velformede lår og overvejende ret velstillede lemmer, flere dog med lidt stærktbøjede eller en smule tætstillede haser. Veludviklet og ret velbåret hos en del dog en smule fremskudt yver; patterne velformede og ret velansatte, hos nogle dog lidt uregelmæssigt placeret eller en smule fremadstrittende.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Nordfyns Urban, s. 28579, f. 30. januar 1963
hos Erling Nielsen, Trunderup Møllegård, Kværndrup.

Afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1968 v. De s.f. Ldf.

Ejer: Nordfyns Kvægavlsforening.

Fader: Randers Ideal, e.B 4971. Ff. Rudme Ideal, e.A 4864. Fm. Nr. 56, s. 24661.

Moder: Nr. 55, s. 24787. Mf. Poul Ib, s. 4257. Mm. Nr. 40, s. 23384.

Gns. af 20 døtre på Enemærket:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5466	4,62	253	3,70	202

Takket være en særdeles fin udholdenhed i ydelsen avancerede holdet i løbet af vinterperioden til en fin position. Mælkeydelsen blev god og fedtprocenterne godt middelhøje, medens proteinprocenterne lige knap nåede racens gennemsnit. Fedtprocenterne var ret ensartede, men der var en del variation i smørfedtydelsen. Proteinprocenterne samt ydelsestallene for mælk og mælkeprotein udviste normal variation. Kvierne var robuste og havde særdeles god sundhedstilstand. Kvierne var rolige og havde god ædelyst, og de opnåede en stor tilvækst i prøvetiden. Malkbarheden var særdeles god, og der opnåedes fine malkbarhedsresultater. Det gik gennemgående fint med kælvningerne, og alle kalvene blev født levende. Alle 20 kvier var erklæret drægtige inden hjemsendelsen, men to af kvierne kastede, og det

lykkedes kun at få den ene af disse erklæret drægtig igen inden prøvens slutning. 7 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Store og middelstore, dels velbyggede og dels noget uregelmæssige, mørk mellemrøde og mellemrøde dyr. Nogle stykker med løst fremskudt bovparti, god brystdybde, velrundet ribbensbygning, god dybde af midtstykke; ryggen gennemgående velbåret, på en del noget ujævn og hos enkelte lidt skarp; krydset overvejende af god bredde, men ret ofte med grov korsbenskam og halerod, velformede lår, nogle stykker med kun ret velstillede lemmer. Velformet eller ret velformet yver med store, ret velstillede patter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Haslev Ideal, s. 28484, f. 7. september 1961

hos Holger Moritz Hansen, Toftegård, Tvinde, Rynkeby.

Ejer: Præstø Amts Kvægavlsforening.

Fader: Rudme Ideal, e.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 79, e.s. 26898. Mf. Kerteminde Ole, s. 4771. Mm. Nr. 51, s. 24660.

Gns. af 19 døtre på Grønhøjgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5589	4,44	248	3,64	203

Mælkeydelsen var særdeles god, men da enkelte af kvierne i perioder havde lave fedtprocenter, blev middelfedtprocenten knap middelhøj, og flere af de kvier, hvor det kneb med fedtprocenten, havde også lave proteinprocenter. Middelproteinprocenten kom noget under racens gennemsnit. Der var normal variation i ydelsestallene, og der var særdeles fin udholdenhed i ydelsen gennem det meste af prøveåret. Malkbarheden var god. Kvierne var gennemgående rolige og med god ædelyst, og der opnåedes en god tilvækst på stationen, selv om de var lidt malkeprægede. I en del af vinterperioden kneb det for flere af kvierne at tåle foderet, og de fleste af kvierne behøvede ret lang tilvænningsstid ved ændringer af foderet. Drægtighedsforholdene var gode, idet alle kvier blev erklæret drægtige inden prøvens afslutning, og 12 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Overvejende middelstore, enkelte knap middelhøje og flere lidt klejne eller en smule skarpe, mellemrøde og mørk mellemrøde kvier. Markeret og hos flere en smule fremskudt bov, flertallet med velbåret, hos enkelte en smule ujævn ryg, et par med lidt vigende lænd; krydset hos nogle middelbredt og ret regelmæssigt, hos andre knap bredt nok og med en smule lave omdrejere eller lidt langt sædebensparti, flere med lidt fremtrædende korsbenskam og halerod, middeldybe, hos

nogle en smule flade lår, en del med lidt lang skank eller en smule tætstillede haser. Velformet og velbåret yver med velstillede og velformede, hos flere dog en smule tynde patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Ribe Ås, s. 28650, f. 6. januar 1963

hos Karl Aagaard, Tomsholm, Krarup, Espe.

Ejer: Kvægavlsforeningen Vestjyden.

Fader: Rudme Ideal, c.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 65, e.s. 29723. Mf. Møns Tramp, s. 4720. Mm. Nr. 41, s. 20993.

Gns. af 20 døtre på Skølvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5175	4,79	248	3,84	199

Dette hold udmærkede sig med de meget høje fedtprocenter, og der var tillige gode proteinprocenter. Da mælkeydelsen fuldt ud var middelhøj opnåedes en særdeles god smørydelse. Ydelsen var høj i den første tid efter kælvningen, men den faldt lidt for stærkt i den sidste halvdel af vinterperioden. Der var ikke ret stor variation i ydelsestallene for mælk og mælkeprotein, medens der var middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Flere af kvierne var lidt vanskelige at malke i den første tid efter kælvningen, men malkbarheden forbedredes betydeligt i løbet af prøveåret. Der opnåedes kun jævnt gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Flere af kvierne havde tykke haser om efteråret, og det så ud til, at de havde svage baglemmer, men i løbet af den første halvdel af vinterperioden forbedredes dette forhold ganske betydeligt. På øvrige områder var sundhedstilstanden god, og alle 20 kvier gennemførte prøven. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til temperamentet, og kvierne havde en god ædelyst og opnåede en pæn tilvækst. Alle 20 kvier blev erklæret drægtige på stationen, men en af dem kastede sidst i april, og det lykkedes ikke at få den erklæret drægtig igen inden hjemsendelsen. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, middelstore, jævnt anselige, ikke særlig muskuløse, mellemrøde dyr af pænt malkepræg, men flertallet med usolide linier og rammer. Kønne af hoved og hals, en del løs og fremskudt bov, ret pæn bredde, god dybde, adskillige vigende til blød ryg, lige, gennemgående ret bredt kryds med noget varierende, kun enkelte regelmæssig form og overflade, nogenlunde muskuløse lår, ret velstillede lemmer, tørre, markerede haser. Ret velformet yver med noget varierende, men overvejende jævnt godt yvervæv, godt pattesæt.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Bjerringbro Munk, s. 28585, f. 24. september 1962
hos N. Kr. Kristiansen, Højvang, Daugård.

Ejer: Kvægavlsforeningen Jyden.

Fader: Hjørring Munkdrup, e.A 4906. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 43, s. 24522.

Moder: Nr. 199, e.s. 28148. Mf. Ejlekær, s. 4416. Mm. Nr. 111, s. 23102.

Gns. af 20 døtre på Rosenfeldt:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5388	4,56	246	3,75	202

Fedt- og proteinprocenterne grupperede sig omkring racens gennemsnit, og da mælkeydelsen var god, opnåedes en god ydelse af smør og mælkeprotein. Fedt- og proteinprocenterne udviste knap middelstor spredning, medens spredningen fuldt ud var middelstor for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var god. Den store part af kvierne var langsomme og besværlige at malke, og der opnåedes dårlige resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne var rolige at arbejde med, og alle 20 kvier gennemførte prøven. Ædelysten var særdeles god, og der opnåedes en god tilvækst i prøvetiden. Kælvningsmæssigt opnåedes smukke resultater, idet alle kælvninger blev betegnet som normale og gennemførtes uden dyrlægehjælp. Alle 20 kvier fødte en levende kalv. Det kneb noget med drægtighedsforholdene, men det lykkedes dog at få 19 kvier erklæret drægtige inden hjemsendelsen. Kun 3 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 3,2 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, passende store, brede, dybe, ret anselige og muskuløse, mellemrøde dyr af godt slag og overvejende pæn regelmæssighed. Velformet hoved og hals, på få nær velstillet bov, adskillige vigende til blød ryg, velbåret kryds af pæn bredde og jævnt gode rammer, enkelte lave omdrejere og højt sædebensparti, velformede lår, enkelte lidt stærkt bøjet has, de øvrige pæn benstilling. Overvejende velformet og velophængt yver, enkelte lidt kraftige patter, pæn pattestilling.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Skærup Ørnkær, s. 28818, f. 15. oktober 1962
hos Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

Ejer: Vejle- og Fredericiaegns Sædcentral.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416. Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 273, e.s. 29448. Mf. Kær, s. 4700. Mm. Nr. 200, e.s. 28170.

Gns. af 16 døtre på Skovgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5202	4,64	241	3,88	202

Udholdenheden i ydelsen var fremragende, og derved kom holdet til at slutte prøven med en god placering. Såvel mælkeydelsen som fedt- og proteinprocenterne lå lidt over racens gennemsnit. Der var kun lille spredning i mælkeydelsen samt i smørfedtydelsen, medens der var normal variation i fedt- og proteinprocenterne samt i ydelsen af mælkeprotein. Allerede hurtigt efter kælvningen blev det klart, at nogle af kvierne var meget langsomme og besværlige at malke, og holdet opnåede heller ikke et tilfredsstillende resultat ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne var rolige at arbejde med og havde særdeles god ædelyst, og de opnåede en meget stor tilvækst på stationen. Drægtighedsforholdene var gode, idet alle 16 kvier var erklæret drægtige inden prøvens afslutning. To kvier kastede i prøve-tiden, men det lykkedes at få dem drægtige igen, inden prøven blev afsluttet. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Kun jævnt ensartede, passende store, ret anselige, overvejende jævnt velformede og velprægede, mellemrøde dyr af pæn bredde, god dybde og med jævnt god muskulatur. Almindelige af hoved og hals, adskillige lidt fremskudt bov og blød ryg, lige, jævnt bredt kryds, gennemgående med ret pæne rammer, men noget varierende overfladeform, gode lår og lemmer. Adskillige velformede malkeorganer, men en del lidt uregelmæssigt yver og kun ret pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Bornholms Ydan, s. 28560, f. 19. januar 1962
hos A. Grønnegaard, Corselitze, Nykøbing Fl.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1968 v. Bh.I.F.

Ejer: Bornholms Elite-Kvægavlsforening.

Fader: Stevns Klint, s. 4659. Ff. Højvig 47, s. 4221. Fm. Nr. 57, s. 18493.

Moder: Nr. 257, e.s. 28696. Mf. Kærsholm Knuthenlund, e.A 4880. Mm. Nr. 68, f. 3. december 1955 hos A. Grønnegaard, Corselitze, Nykøbing Fl.

Gns. af 18 døtre på Kannikegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5607	4,29	241	3,73	209

Holdet startede prøven med høje dagsydelser, men det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen. Enkelte af kvierne havde lidt for lav fedtprocent,

men den høje mælkeydelse skaffede holdet fine ydelsestal for smør og mælkeprotein. Selv om flere af kvierne havde lidt lave fedtprocenter, grupperede proteinprocenterne sig omkring racens gennemsnit. Fedtprocenterne udviste normal variation, medens der var godt middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til malkbarhed, og holdets malkbarhedstal lå i nærheden af racens gennemsnit. Kvierne var meget rolige at arbejde med, og de havde særdeles god ædelyst, men der opnåedes ikke ret stor tilvækst i prøvetiden. Kalvene vejede kun 37 kg i gennemsnit. Drægtighedsforholdene var ikke helt tilfredsstillende, idet kun 5 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. En kvie var ikke erklæret drægtig ved prøvens afslutning, men vedkommende kvie havde haft borbetændelse, hvilket kan have vanskeliggjort en efterfølgende drægtighed. Der medgik 2,5 ins. pr. drægtighed.

Et ensartet hold af godt middelstore og middelstore, velbyggede og veludviklede mellemrøde dyr. Velformet af hoved og hals, et par enkelte lidt løs, ellers velstillet bov, god dybde og bredde, bred, jævn og velbåret ryg, bredt velformet kryds, enkelte lidt halerod, passende dybe og brede lår og velstillede lemmer. Passende størrelse af yver, de fleste velbårne, dog enkelte lidt fremskudte, gennemgående pæne, velansatte patter, dog nogle for lange.

Holdet tilkendt mg ÷ for eksteriør.

Centrums Værn, s. 28690, f. 4. december 1962
hos Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1968 v. De s.f. Ldf.

Ejer: Centrum og Odense Omegns Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416. Fm. Nr. 188,
Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 300, e.s. 28863. Mf. Thor, s. 4697. Mm. Nr. 207, s. 26752.

Gns. af 19 døtre på Enemærket:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5168	4,65	241	3,79	196

Enkelte af kvierne havde udpræget høje fedtprocenter, og holdets midelfedtprocent lå noget over racens gennemsnit. Mælkeydelsen blev godt middelhøj, medens proteinprocenterne tangerede racens gennemsnit. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, medens spredningen var godt middelstor for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var særdeles god i det meste af vinterperioden, men ydelsen faldt lidt for stærkt i den sidste del af prøvetiden. Kvierne havde flere meget fremragende brugsmæssige egenskaber, de var således rolige at arbejde med, og da de var hurtige og lette at malke, opnåedes et smukt resultat ved malkbarheds-

undersøgelsen. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde en gennemsnitlig tilvækst fra ankomst til hjemsendelse på 82 kg. Selv om der kun var en enkelt meget vanskelig kælvning, fik 5 af kvierne alligevel dødfødte kalve. En af kvierne blev brummer, men de øvrige 18 kvier blev erklæret drægtige inden hjemsendelsen. 7 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,4 ins. pr. drægtighed.

Middelhøje, enkelte noget lavstammede, særdeles dybe og rummelige, meget velbyggede og meget tiltalende, mellemrøde dyr af ganske fortrinlig type. Gennemgående bred og velbåret ryg, enkelte med lidt lav lænd; bredt og hos mange meget bredt og særdeles velformet kryds, god lårbygning og velstillede lemmer. Yveret overvejende særdeles velformet og velbåret hos enkelte lidt fremskudt, pæne og velstillede patter af ganske fortrinlig form og størrelse.

Holdet tilkendt mg for eksteriør.

Århus Gorm, s. 28441, f. 28. maj 1962
hos Hans Hundevad, Berntlund, Starup, Ågård.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1968 v. F. a.j. Ldf.

Ejer: Kvægavlsforeningen Østjyden.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Ålborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 46, e.s. 28123. Mf. Kolding Højvig 143, s. 4747. Mm. Nr. 26, e.s. 27411.

Gns. af 16 døtre på Elkjær:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5351	4,37	234	3,66	196

Ydelsen var høj i begyndelsen af prøveåret, men da det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen, forringedes holdets position noget i løbet af prøvetiden. Den gennemsnitlige mælkeydelse var god, medens fedt- og proteinprocenterne knap nåede racens gennemsnit. Der var middelstor spredning i fedtprocenterne og stor spredning i proteinprocenterne, hvorimod der kun var lille variation i de øvrige ydelsestal. De brugsmæssige egenskaber var gode, idet kvierne havde et roligt temperament, en god malkbarhed, særdeles god ædelyst, og de var i det hele taget herlige at arbejde med. Kvierne udviklede sig godt på stationen, og de opnåede en god tilvækst. Der indsattes 22 kvier på holdet, men det sluttede med kun 16, da der blev udsat 6 kvier i prøveåret. Hovedårsagen til denne store udsætterprocent må tilskrives yverlidelser, og meget tyder på, at flere af kvierne var inficeret i yveret inden ankomsten til stationen. Flere af kvierne fødte ret små kalve, hvis gennemsnitsvægt kun blev 36 kg. Drægtighedsresultaterne blev fine.

Alle 16 kvier blev erklæret drægtige, men en af dem kastede sidst i maj 12 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,6 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, passende store, ret anselige, overvejende regelmæssigt byggede, ret muskuløse, mellemrøde dyr af godt præg og ganske tiltalende type. Pænt hoved, velansat hals, velstillet bov, pæn bredde og dybde, enkelte vigende, de øvrige udmærket overlinie, velbåret, overvejende middelbredt kryds med pæne rammer, enkelte lave omdrejere og lidt højt sædebensparti, velformede lår, velstillede lemmer. Velformet og velophængt yver med velformede og velstillede patter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Årup Vestfyns Prins, s. 28691, f. 11. december 1962
hos Lars Bruun, Stenhøjgård, Gudme.

Afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1968 v. De s.f. Ldf.

Ejer: Årup Vestfyns Kvægavlsforening.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 11, Dana, e.s. 27564. Mf. Dan, s. 4470. Mm. Nr. 3, Jane, s. 22520.

Gns. af 19 døtre på Ejstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4982	4,66	232	3,74	186

Flere af kvierne startede prøvetiden med forholdsvis små dagsydelser, men udholdenheden i ydelsen var enestående god, og holdets placering forbedredes betydeligt i løbet af prøvetiden. Den gennemsnitlige mælkeydelse og proteinprocenterne var middelhøje, medens fedtprocenterne var gode, og enkelte af kvierne nåede en meget høj fedtprocent. Der var ikke ret stor spredning i ydelsestallene for mælk og mælkeprotein, medens der var ret normal variation i de øvrige ydelsestal. De brugsmæssige egenskaber var gode, idet kvierne havde et roligt temperament, en god malkbarhed og særdeles god ædelyst. Der opnåedes en god tilvækst i prøvetiden. Alle 19 kvier blev erklæret drægtige, men 3 af dem kastede, og det lykkedes kun at få de to erklæret drægtige igen inden hjemsendelsen. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Store og middelstore, velprægede og velbyggede, mellemrøde dyr. Velrundet ribbensbygning, overvejende god eller fortrinlig dybde af midtstykke, bred og velbåret ryg, enkelte med lidt lav lænd; krydset overvejende velformet og velbåret, en smule afrundet bagover, enkelte med lidt høj halerod, velformede lår, nogle stykker med lidt stærktbøjede haser. Yveret overvejende velbåret og velformet samt med velformede patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Fåborg Moss, s. 28761, f. 18. februar 1963
hos Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing M.

Ejer: Fåborg-Midtfyns Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416. Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 77, s. 26004. Mf. Sortemose, s. 4680. Mm. Nr. 17, s. 21696.

Gns. af 16 døtre på Lægård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4955	4,68	232	4,00	198

Det mest bemærkelsesværdige ved dette holds ydelsestal er de meget høje og tillige ensartede proteinprocenter. Fedtprocenterne var særdeles gode, medens mælkeydelsen kun blev middelhøj. Der var kun knap middelstor spredning i ydelsestallene. Udholdenheden i ydelsen var ret tilfredsstillende. De brugsmæssige egenskaber var gode, idet kvierne havde et roligt temperament, og de var hurtige og lette at malke, hvilket gav holdet en fin placering ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var særdeles god, og kvierne udviklede sig godt på stationen og opnåede en stor tilvækst i prøvetiden. Enkelte af kvierne havde kælvningsvanskeligheder. Drægtighedsresultaterne må betegnes som tilfredsstillende. En af kvierne nåede ikke at blive erklæret drægtig på stationen, og en anden kastede først i marts. 8 blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, enkelte store, velprægede, gennemgående velbyggede, mørk mellemrøde dyr. Velformet hoved, fin hals, boven lidt løs, hos enkelte noget slap og udstående, god brystdybde, velrundet ribbensbygning, god dybde af midtstykke; ryggen overvejende velbåret, hos nogle en smule skarp og ujævn; krydset gennemgående velbåret og velformet, hos en del dog noget afrundet bagover samt med lidt høj korsbenskam og halerod, velformede lår. Overvejende meget velformet og velbåret yver med velformede og velstillede patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Hjørring Vagn, s. 28356, f. 14. oktober 1961
hos Vagn Bundgaard, Skovsager, Bjergby, Hjørring.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Hjørring No, s. 4806. Ff. Rudme No, s. 4448. Fm. Nr. 55, s. 23396.

Moder: Nr. 58, s. 26642. Mf. Rolf, s. 4617. Mm. Nr. 46, s. 24443.

Gns. af 20 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4916	4,67	229	3,80	187

Laktationskurven var usædvanlig flad for dette hold, og derved kom holdet til at slutte med en væsentlig bedre ydelse, end det tegnede til i begyndelsen af prøveåret. Mælkeydelsen blev knap middelhøj, medens proteinprocenterne var middelhøje og fedtprocenterne særdeles gode. Proteinprocenten udviste stor variation, men derimod var spredningen lille for de øvrige ydelsestal. Kvierne var usædvanlig lette og hurtige at malke, og holdet fik den fineste placering af årets røde hold ved malkbarhedsundersøgelsen. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til ædelyst og temperament, men sundhedstilstanden var særdeles god. Der opnåedes kun en knap middelstor tilvækst i prøvetiden. Drægtighedsforholdene var særdeles gode, idet alle 20 kvier var erklæret drægtige ved prøvens afslutning, og 10 blev drægtige efter 1. inseminering. En af kvierne kastede i april, men den nåede at blive drægtig igen, inden prøven sluttede. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Noget uensartede, omtrent middelstore, nogenlunde anselige og muskuløse, flertallet uregelmæssigt byggede, mellemrøde dyr. Almindeligt hoved, pæn hals, en del løstbyggede med fremskudt bov og lav ryg, god dybde, overvejende knap middelbrede, flertallet noget tilspidset kryds og lave omdrejere, adskillige fremtrædende korsbenskam og halerod eller højt og snævert sædebensparti, enkelte stærktbøjlet has og usolid hasestilling. Gennemgående velophængt, ret velformet yver med godt væv, almindeligt pattesæt.

Holdet tilkendt $g \div$ for eksteriør.

Kolding Eg, s. 28812, f. 24. februar 1963

hos Koldingkredsens Kvægavlsforening, Dortheasminde, Gelballe, Lunderskov.

Ejer: Koldingkredsens Kvægavlsforening.

Fader: Hjørring Munkdrup, e.A 4906. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 43, s. 24522.

Moder: Nr. 19, e.s. 28825. Mf. Kolding Højvig 143, s. 4747. Mm. Nr. 6, s. 26711.

Gns. af 17 døtre på Gelballegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5016	4,51	226	3,71	186

Såvel den gennemsnitlige mælkeydelse som middelfedtprocenten lå i nærheden af racens gennemsnit, medens proteinprocenterne blev knap middelhøje. Udholdenheden i ydelsen var særdeles god. Der var knap middelstor spredning i smørfedtydelsen, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne var lette og hurtige at malke, og der opnåedes fine malkbarhedsresultater. De øvrige brugsmæssige egenskaber var også gode, idet kvierne havde et roligt temperament, særdeles god ædelyst samt god sund-

hedstilstand. Kvierne opnåede særdeles god tilvækst på stationen. 4 af kvierne fødte dødfødte kalve. Gennemsnitsvægten for kalvene blev kun 36 kg. Holdet fik det fineste drægtighedsresultat, der gennem årene er opnået på afkomsprøvestationer. 15 af kvierne blev drægtige efter 1. inseminering, og de to resterende blev drægtige efter 2. inseminering. Der medgik kun 1,1 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, passende store, jævnt anselige og muskuløse, ret regelmæssigt byggede, mellemrøde dyr af pæn bredde, god dybde og godt slag. Almindelige af hoved og hals, adskillige lidt fremskudt bov, en del blød, men flertallet ret velbåret til lige ryg, enkelte lidt opsvejet, de øvrige lige, jævnt bredt, adskillige lidt tilspidset kryds, velformede lår, velstillede lemmer. Enkelte ikke helt regelmæssigt pattesæt, ellers gode malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

M. A. Cæsar, s. 28850, f. 13. juni 1963
hos N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

Afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1968 v. De s.l.-f. Ldf.

Ejer: Maribo Amts Kvægavlsforening.

Fader: Randers Samson, r. 27861. Ff. Sverre, s. 4759. Fm. Nr. 86, s. 21040.

Moder: Nr. 87, Karen XVIII, e.s. 29387. Mf. Rudme Ideal, e.A 4864.
Mm. Nr. 33, Karen X, e.s. 28126.

Gns. af 16 døtre på Bellinge:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4872	4,62	225	3,96	193

Fedtprocenterne var godt middelhøje og proteinprocenterne udpræget høje, medens den gennemsnitlige mælkeydelse knap nåede racens gennemsnit. Udholdenheden i ydelsen var særdeles god. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, hvorimod der var stor spredning i de øvrige ydelsestal. Holdet havde den næststørste spredning af årets røde hold med hensyn til smørfedt og mælkeprotein. De brugsmæssige egenskaber var gode. Kvierne var gode at malke, og de havde særdeles god ædelyst og et roligt temperament. Der var lidt problemer med sundhedstilstanden i begyndelsen af prøveåret, og det blev nødvendigt at udsætte 3 kvier af prøven. Kvierne udviklede sig særdeles godt, og de nåede en gennemsnitlig tilvækst fra prøvens begyndelse i august og til dens afslutning på 119 kg. Kalvene vejede kun 36 kg i gennemsnit. Alle 16 kvier blev erklæret drægtige inden prøvens afslutning, og 6 af dem blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, ret ensartede, velprægede og tiltalende dyr. God dybde af bryst og midtstykke, velrundet ribbensbygning, stærke og lige af ryg, nogle med lidt

skarp kam, middelbrede kryds, en del velformede, men en ret stor part med noget kneben omdrejer- og sædebensparti, de fleste med velformede lår, en overvejende del med noget hasende benstilling.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Skive Sten, s. 28376, f. 4. maj 1962

hos Lars Bruun, Stenhøjgård, Gudme.

Ejer: Skiveegnens Kvægavlsforening.

Fader: Horsens Leif, e.A 5010. Ff. Leif, s. 4807. Fm. Nr. 68, s. 25880.

Moder: Nr. 24, Inger, s. 21793. Mf. Ulvsager, s. 4268. Mm. Nr. 17, Grethe, s. 18102.

Gns. af 20 døtre på Krarup Nygård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4864	4,63	225	3,81	186

Dette hold startede prøveåret med høje ydelsestal, men dagsydelsen faldt lidt for stærkt gennem det meste af prøveåret, og derved forringedes holdets placering en del fra de første kortidsopgørelser til resultatet ved prøvens afslutning. Fedtprocenterne var gode, proteinprocenterne fuldt ud middelhøje, hvorimod den gennemsnitlige mælkeydelse knap nåede racens gennemsnit. Der var normal variation i ydelsestallene. Når man ser bort fra, at 3-4 kvier var lidt nervøse, var de brugsmæssige egenskaber særdeles gode. Holdet fik et middelhøjt malkbarhedstal, og kvierne havde særdeles god ædelyst. Sundhedstilstanden var særdeles god, og 20 indsatte kvier gennemførte prøven. Drægtighedsforholdene var gode, idet alle kvier blev erklæret drægtige på stationen, og 11 blev drægtige efter 1. inseminering. En af kvierne kastede i juni. Der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, passende store, ret anselige og muskuløse, brede, dybe, ret regelmæssigt byggede, mellemrøde dyr af godt slag. Pænt hoved, velansat hals, velstillet bov, adskillige vigende ryg med blød lænd, overvejende velbåret, en del noget opsvejet kryds af ret god bredde, noget varierende overfladeform, adskillige høj, men ikke grov korsbenskam, velformede, jævnt kraftige lår, pæn benstilling. Velformet og velophængt yver af ret god udstrækning og med tilfredsstillende væv, gennemgående godt pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Rudme Søe, s. 28687, f. 4. december 1962

hos Søren Hansen, Rudme.

Afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1968 v. De s.f. Ldf.

Ejer: Sydøstfyns Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416. Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 13, s. 26134. Mf. Fåborg Elg, s. 4583. Mm. Nr. 25, f. 7. april 1950 hos Frederik Dahlkild, Svanninge, Millinge.

Gns. af 19 døtre på Enemærket:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5466	4,11	224	3,73	204

Sundhedstilstanden var ikke tilfredsstillende på dette hold. Holdet startede prøveåret med problemer med kælvningerne, og 7 kvier fødte dødfødte kalve. Kvierne var heller ikke tilstrækkelig robuste, og det kneb lidt med ædelyst i begyndelsen af prøveåret, og flere kvier havde fordøjelsesforstyrrelser. Dette kan muligvis have medvirket til, at enkelte kvier i perioder havde meget lave fedtprocenter. Mælkeydelsen blev særdeles god, medens middelfedtprocenten blev for lav. Proteinprocenterne lå i nærheden af racens gennemsnit. Kvierne holdt ydelsen fint i vinterperioden, men den faldt lidt for stærkt i den sidste del af prøvetiden. Proteinprocenterne udviste normal variation, medens der var stor spredning i de øvrige ydelsestal. Der opnåedes et fint resultat ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne udviklede sig særdeles godt på stationen, og de opnåede en stor tilvækst i prøvetiden. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til kviernes temperament. Alle 19 kvier blev erklæret drægtige. Der var 4 kvier, som kastede, men det lykkedes at få 3 af dem drægtige igen, inden prøven var afsluttet. Der var kun 6 kvier, som blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,8 ins. pr. drægtighed.

Middelstore og store, dybe og rummelige, overvejende meget velprægede, mellemrøde dyr. Nogle stykker med noget løs bov, overvejende god eller fortrinlig dybde af midtstykke; velbåret, hos enkelte lidt skarp ryg; krydset overvejende velformet og velbåret, hos nogle dog med lidt store hofter samt lidt høj halerod, velformede lår, enkelte med lidt usikker hasebygning. Gennemgående velformet og velbåret yver, enkelte med lidt fremskudt yver, pæne velformede patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Varde Wano, s. 28649, f. 20. november 1962
hos Jørgen Folke Nielsen, Lindholm, Brangstrup, Ringe.

Ejer: Vardeegnens Kvægavlsforening.

Fader: Fåborg Wano, e.A 4982. Ff. Morsø Wahl, e.A 4930. Fm. Nr. 20, s. 24769.

Moder: Nr. 55, s. 23396. Mf. Ulvsager, s. 4268. Mm. Nr. 45, s. 20480.

Gns. af 18 døtre på Vardegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4857	4,62	224	3,76	183

Holdet startede prøveåret med høje dagsydelser, men ydelsen faldt for stærkt i en stor del af prøveåret, og den gennemsnitlige mælkeydelse ved prøvens afslutning kom under racens gennemsnit. Proteinprocenterne var middelhøje, medens fedtprocenterne var godt middelhøje. Der var ret ensartede fedt- og proteinprocenter, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne havde et roligt temperament og en god ædelyst, men der opnåedes kun jævnt gode malkbarhedsresultater. Ingen af kvierne fødte store kalve, og gennemsnitsvægten blev kun 35 kg. Sundhedstilstanden var tilfredsstillende, men 4 kvier måtte have en patte stukket op efter pattetråd. Alle 18 kvier blev erklæret drægtige, men en af dem kastede sidst i juni. 7 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, middelstore, kun jævnt anselige og muskuløse, flertallet noget uregelmæssigt byggede, mellemrøde dyr af godt slag. Almindelige af hoved og hals, overvejende velstillet bov, ret god bredde og dybde, adskillige blød ryg med lav lænd, en del velbåret kryds af god bredde, men flere kun ret regelmæssig form og enkelte noget opsvejet kryds, nogenlunde muskuløse lår, pæn benstilling, markerede haser. Ret velformet yver og pattesæt, enkelte med bipatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Hjørring Nørreby, s. 28615, f. 23. februar 1962
hos Ejler Iversen, Stensgårdsminde, Stensby, Skamby.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Nordfyns Frem, e.A 4866. Ff. Morsø Wahl, e.A 4930. Fm. Nr. 65, s. 24793.

Moder: Nr. 95, s. 26142. Mf. Toke Sams, s. 4433. Mm. Nr. 63, s. 21102.

Gns. af 19 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4569	4,80	219	3,93	180

Såvel fedt- som proteinprocenterne var særdeles gode, hvorimod mælkeydelsen ikke nåede op på et tilfredsstillende niveau. Flere af kvierne havde meget høje fedtprocenter, og der var stor variation i denne egenskab. Der var ret normal variation i de gode proteinprocenter. Der var kun lille spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var særdeles god. Der opnåedes gode malkbarhedsresultater. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til temperamentet, men ædelysten var god, og der var en god sundhedstilstand. Flere af kvierne fødte store kalve, og gennemsnitsvægten blev 41 kg. 18 af de 19 kvier nåede at blive erklæret drægtige på stationen, og 3 af dem nåede efter en kastning at blive erklæret drægtige for 2. gang. Selv om der kun var 4, som blev drægtige efter 1. inseminering, medgik der kun 2,2 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, knap middelstore til passende store, kun jævnt anseelige og muskuløse, overvejende uregelmæssigt byggede, mellemrøde dyr af kun ret godt slag. Almindelige af hoved og hals, adskillige fremskudt bov og vigende til lav ryg, en del knap middelbrede, ellers pæn bredde og dybde, nogle velbåret kryds af god bredde, men adskillige snævert eller opsvejet kryds, varierende rammer og overfladeform, jævnt gode lår, en del stærktbøjet has, de øvrige ganske god benstilling. Jævnt velformet og velophængt yver, en ret stor part kraftige og over middellange patter.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Herning Munk, s. 28630, f. 25. oktober 1962
hos Oskar Nielsen, Nørre Bjergene, Præstbro.

Ejer: Hammerum Herreds Kvægavlsforening.

Fader: Hjørring Munkdrup, e.A 4906. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 43, s. 24522.

Moder: Nr. 58, e.s. 28869. Mf. Ålborg Wahl, s. 4344. Mm. Nr. 42, s. 23139.

Gns. af 19 døtre på Moesgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4903	4,45	218	3,75	184

Ydelsen var god i den første tid efter kælvningen, men den faldt lidt for stærkt gennem det meste af prøveåret. Den gennemsnitlige mælkeydelse og middelfedtprocenten nåede lige knap racens gennemsnit, medens proteinprocenterne blev middelhøje. Enkelte af kvierne havde en periode med lave fedtprocenter, og der var meget stor variation i fedtprocenterne ved prøvens slutning, idet en kvie sluttede prøven med en fedtprocent på 3,76, medens en anden kom på 5,75. Da der var stor spredning i fedtprocenterne, blev der også en del variation i proteinprocenterne. Spredningen var derimod knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Der opnåedes ret gode malkbarhedsresultater. Kvierne var behagelige at arbejde med, idet ædelysten var særdeles god, og de havde et roligt temperament. Kvierne var trivelige og muskuløse, og de opnåede en stor tilvækst på stationen. En af kvierne havde fået børen beskadiget, men de øvrige nåede at blive erklæret drægtige i prøvetiden. To kvier kastede sidst på vinteren, men de nåede at blive drægtige igen, inden prøven blev afsluttet. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, middelstore til godt middelstore, gennemgående anseelige, brede, dybe, ret muskuløse og regelmæssigt byggede, mellemrøde dyr af godt præg. Typisk hoved og hals, overvejende velstillet bov, adskillige blød ryg med vigende til lav lænd, på enkelte nær lige, bredt kryds med pæne rammer, jævnt god overfladeform, pæn lårbygning og benstilling. Velophængt yver af overvejende god form og kvalitet, enkelte ret kraftige patter, ellers pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Morsø Munk, s. 28806, f. 10. oktober 1962
hos Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

Ejer: Morsø Kvægavlsforening.

Fader: Munk 26, s. 4625. Ff. Munk, s. 3749. Fm. Nr. 26, s. 18952.

Moder: Nr. 255, e.s. 28861. Mf. Ørnsager, r. 24900. Mm. Nr. 114, s. 24523.

Gns. af 20 døtre på Morsø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5121	4,25	218	3,58	183

Mælkeydelsen blev middelhøj, men fedtprocenterne nåede ikke et tilfredsstillende niveau, og proteinprocenterne var udpræget lave. Proteinprocenterne var usædvanlig ensartede, og der var heller ikke ret stor variation i fedtprocenterne, medens der var stor spredning i de øvrige ydelses-tal. Ydelsen faldt lidt for stærkt i vinterperioden, men i den sidste tredjedel af prøvetiden var der god udholdenhed i ydelsen. Malkbarheden forbedredes en del i prøvetiden, og der blev opnået et godt resultat ved malkbarhedsundersøgelsen. De brugsmæssige egenskaber var tilfredsstillende, idet kvierne havde særdeles god ædelyst og et roligt temperament. Flere af kvierne fødte meget store kalve, og selv om godt halvdelen var kviekalve, blev kalvenes gennemsnitlige fødselsvægt 43 kg. 3 kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige på stationen. En af kvierne kastede i februar, men den nåede at blive drægtig igen, inden prøven sluttede. 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Noget uensartede, middelstore, dybe, ret brede, jævnt anselige og muskuløse, flertallet noget løst og uregelmæssigt byggede, mellemrøde dyr af kun ret godt slag. Almindelige af hoved og hals, en ret stor part fremskudt bov samt blød og noget tynd ryg, enkelte noget opsvejet, i øvrigt lige, ret bredt, men flertallet kun nogenlunde regelmæssigt kryds, enkelte lave omdrejere, adskillige kraftig korsbenskam, pæn lårbygning, på få nær velstillede lemmer. Jævnt god yverform og -ophængning, en del lange og kraftige patter.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Dybbøl Od, s. 28740, f. 18. februar 1963
hos Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing M.

Ejer: Gråsten-Sønderborg Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416. Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 97, f. 22. september 1957 hos Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing M. Mf. Morsø Wahl, e.A 4930. Mm. Nr. 72, s. 26002.

Gns. af 16 døtre på Veeshæk:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5007	4,08	204	3,78	189

Selv om næsten alle kvierne havde lave eller knap middelhøje fedtprocenter, blev middelpoteinprocenten alligevel middelhøj. Mælkeydelsen blev middelhøj, men da fedtprocenterne svigtede, opnåedes ikke en tilstrækkelig høj smørydelse. Udholdenheden i ydelsen var god i vinterperioden, men ydelsen faldt lidt for stærkt i sommerperioden, og det er muligt, at forbedelserne til en kommende lufthavn har haft uheldig indflydelse på afkomsprøveresultatet. Der var ikke ret stor variation i fedt- og proteiprocenterne, men der var stor spredning i de øvrige ydelsestal. Kvierne var gode at malke, og der blev opnået et fint resultat ved malkbarhedsundersøgelsen. Det var forholdsvis rolige kvier at arbejde med, og sundhedstilstanden var god, men kvierne var ikke særlig robuste, og det kneb i perioder med at tåle roefoderet. Kvierne var små ved ankomsten til stationen, men de udviklede sig godt i prøvetiden, hvor de opnåede en gennemsnitlig tilvækst på 96 kg. Selv om kvierne var små, fødte de fleste af dem ret store kalve, og gennemsnitsvægten for de fødte kalve blev 41 kg. 3 kvier fik dødfødte kalve, men den ene af dem blev udsat af prøven, da den ikke ville eller kunne lægge mælken ned. To kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige i prøvetiden, og en tredje kastede i maj. Selv om der kun var 4, der blev drægtige efter 1. inseminering, medgik der dog kun 1,9 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, nær middelstore, kun ret anelige og muskuløse, mellemrøde dyr af pæn bredde og dybde, jævnt godt slag, overvejende med noget usolide linier. Pænt hoved, velformet hals, adskillige fremskudt bov og vigende ryg, lige, ret bredt og regelmæssigt firsidet kryds, adskillige noget lave omdrejere, enkelte noget høj, men fin korsbenskam, gode lår, pæn benstilling. På et par nær velophængt yver af god form og kvalitet, adskillige over middellange patter og noget vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Åbenrå Sortemose, s. 28743, f. 12. februar 1963
hos C. Tornbjerg Pedersen, Næragård, Årslev.

Ejer: Åbenrå- og Tønderegnens Kvægavlsforeninger.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 115, e.s. 27745. Mf. Dan, s. 4470. Mm. Nr. 81, s. 24129.

Gns. af 20 døtre på Brøstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4218	4,72	199	3,90	164

Holdet startede prøveåret med lave dagsydelser, og selv om udholdenheden i ydelsen i den sidste del af prøvetiden var god, opnåedes alligevel ikke en tilfredsstillende smørydelse. Det var mælkeydelsen, som svigtede, medens såvel fedt- som proteinprocenterne var høje. Der var ret stor spredning i smørfedydelsen, medens der ikke var noget særligt at bemærke med hensyn til variationen i de øvrige ydelsestal. Selv om det under malkningen kneb med, at en del af kvierne blev færdige samtidig med de enkelte yverkirtler, blev der alligevel opnået et godt resultat ved malkbarhedsundersøgelsen. Flere af kvierne var noget nervøse, og hele holdet var meget uroligt på græsmarken efter udbindingen. Kvierne udviklede sig godt på stationen, hvor de havde en gennemsnitlig tilvækst på 87 kg. Alle kvier blev erklæret drægtige, og med en enkelt undtagelse blev de drægtige på et tidligt tidspunkt af prøveåret. En af kvierne kastede, men den nåede at blive drægtig igen for anden gang i vinterhalvåret. 15 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, middelstore til godt middelstore, på få nær anselige, kun ret muskuløse og regelmæssigt byggede, mellemrøde til lysmellemrøde dyr af ret godt slag. Almindeligt hoved, pæn hals, overvejende velstillet bov, jævnt god bredde og dybde, en del noget blød, de øvrige velbåret ryg, adskillige noget tilspidset kryds og høj, men ikke grov korsbenskam og halerod, en del flade lår, pæn benstilling. Noget varierende yverform, pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Sortkær, s. 28824, f. 7. november 1962
hos Robert Bak Nielsen, Frøslev, Nykøbing M.

Ejer: Hadstenegnens Kvægavlsforening.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 7, e.s. 29457. Mf. Kær, s. 4700. Mm. Nr. 80, s. 24540.

Gns. af 15 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4468	4,44	198	3,69	165

Den gennemsnitlige mælkeydelse nåede ikke et tilstrækkeligt højt niveau, og da hverken fedt- eller proteinprocenterne nåede racens gennemsnit, blev der ikke opnået tilfredsstillende resultater med hensyn til ydelsen af smør og mælkeprotein. Der var en godt middelstor spredning i alle ydelsestallene. Udholdenheden i ydelsen var kun jævnt tilfredsstillende, men det er muligt, at ydelsen blev påvirket lidt af, at der ikke længere eftermalkes med hånd, idet kvierne ikke var gode til at lægge mælken ned. Der opnåedes et middeld godt malkbarhedstal ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var særdeles

god, temperamentet roligt, og der opnåedes en stor tilvækst på stationen. Det kneb med sundhedstilstanden, og der blev udsat 5 kvier under prøven. Kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 37 kg. Alle 15 kvier nåede at blive erklæret drægtige, men 3 af dem kastede, og heraf kastede den ene to gange. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, godt middelstore, anselige, enkelte betydelige, brede, særdeles dybe, meget muskuløse, triveligt prægede, enkelte noget usolide linier, i øvrigt regelmæssigt byggede, mellemrøde dyr af godt slag. Velformet hoved og hals, enkelte løstbyggede med fremskudt bov og blød ryg, de øvrige velstillet bov og velbåret ryg, overvejende velbåret, bredt kryds med ganske gode rammer, enkelte dog noget opsvejet kryds og høj halerod, kraftige, velformede lår, god benstilling. Velophængt yver af jævnt god form, varierende vævskvalitet, en del ret kraftige patter og enkelte vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Dybbøl Rhin, f. 17. januar 1963

hos Otto Hauter, Herschweiler-Pettersheim, Rhinland-Pfalz, Vesttyskland.

Ejer: Gråsten-Sønderborg Kvægavlsforening.

Fader: Normer, s.B 2269. Ff. Nero, s.B 2000. Fm. Mina, s. 15380.

Moder: Friedel, s. 18605 RL. Mf. General, s.B 1550. Mm. Frieda, s. 16647.

Gns. af 19 døtre på Veesebæk:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4427	4,39	194	3,77	167

Mælkeydelsen blev ikke tilfredsstillende, og da fedtprocenterne kun blev knap middelhøje, opnåedes ikke en antagelig smørydelse. Enkelte af kvierne malkede særdeles fint, men en del havde for ringe ydelse. Der var ret ensartede fedt- og proteinprocenter, medens der var ret normal variation i de øvrige ydelsestal. Ydelsen faldt for stærkt i sommerperioden, men anlæggelsen af en ny lufthavn kan have haft uheldig indflydelse på ydelsen. De fleste af kvierne krævede for lang malketid, og der opnåedes dårlige resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne var meget rolige, og de havde særdeles god ædelyst. Der var en god sundhedstilstand, og kvierne udviklede sig godt i prøvetiden. Tilvæksten var særdeles god, og kviernes gennemsnitsvægt blev 600 kg ved prøvens slutning. Drægtighedsforholdene var gode, idet alle 19 kvier blev erklæret drægtige, men en af dem kastede i juli. 12 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, velvoksne, anselige, muskuløse, triveligt prægede, ret regelmæssigt byggede, mellemrøde til lysmellemrøde dyr af god bredde og dybde. Pænt hoved, velansat hals, velstillet bov, adskillige vigende eller lidt ujævn ryg, lige, jævnt bredt, kun ret velformet kryds, flertallet kraftig korsbenskam og hale-rod, et par noget ret has, ellers udmærket lårbygning og benstilling. Velophængt, jævnt velformet, adskillige kort yver, en ret stor part over middellange patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Varde Bram, s. 28713, f. 3. juni 1963
hos Jørgen Riis Rasmussen, Gabelsvej, Bramminge.

Ejer: Vardeegnens Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416. Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 35, s. 25273. Mf. Højvig Maegård, s. 4125. Mm. Nr. 30, s. 23886.

Gns. af 16 døtre på Vardegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4336	4,39	190	3,78	164

Dagsydelsen var ikke særlig god i den første tid efter kælvningen, og da der tillige var lidt for stærk nedgang i ydelsen gennem det meste af prøveåret, fik holdet en dårlig placering ved prøvens slutning. Mælkeydelsen var for ringe, og fedtprocenterne blev kun knap middelhøje, hvorimod proteinprocenterne blev middelhøje. Fedt- og proteinprocenterne var ret ensartede, medens spredningen var middelstor for de øvrige ydelsestal. Der opnåedes ret gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var god, og kvierne var forholdsvis rolige at arbejde med. Kvierne var små ved ankomsten til stationen, men de udviklede sig godt under prøven og opnåede en god tilvækst. Sundhedstilstanden var ret god, men det blev alligevel nødvendigt at udsætte 3 kvier i begyndelsen af vinterhalvåret. Kvierne fødte ret små kalve, og gennemsnitsvægten blev kun 36 kg. Alle 16 kvier blev erklæret drægtige inden prøvens slutning, og 10 af dem blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Noget uensartede, knap middelstore til middelstore, ret anselige til noget ubetydelige og uregelmæssigt byggede, ikke særlig muskuløse, nogenlunde velprægede, mellemrøde dyr af kun jævnt god bredde og dybde. Kønt hoved, velansat hals, ret velstillet, enkelte dog fremskudt bov, en ret stor part vigende til lav ryg samt kun ret velbåret kryds med nogenlunde tilfredsstillende rammer og overfladeform, enkelte korte eller lidt flade, de øvrige ret velformede lår, adskillige lidt stærkt-bøjlet has. Ret velformet, pænt ophængt yver, velformede patter.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Ejlekær Sydvest, s. 28791, f. 4. november 1962
hos N. Hvirvelkær, Valdøl, Havndal.

Ejer: Sydvestsjællands Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416. Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 46, Alba XI, e.s. 27420. Mf. Morsø Wahl, e.A 4930. Mm. Nr. 2, Alba VII, s. 26675.

Gns. af 19 døtre på Grønhøjgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4228	4,40	186	3,75	158

Kvierne startede prøveåret med forholdsvis lave dagsydelser, og da udholdenheden i ydelsen kun var jævnt tilfredsstillende, opnåedes kun en ringe gennemsnitsydelse i prøvetiden. Der var imidlertid meget stor spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein, og der var 3 kvier, som nåede over 300 kg smør i prøvetiden. Flere af kvierne var imidlertid udpræget lavtydende, og holdet fik den største spredning i smørfedtydelsen af årets røde hold. Flere af kvierne var noget nervøse, men de var hurtige og lette at malke, og der opnåedes et særdeles smukt resultat ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var god, og der opnåedes en pæn tilvækst på stationen. Enkelte af kvierne fødte meget store kalve, hvis gennemsnitsvægt blev 43 kg, men hovedparten af dem var tyrekalve. Drægtighedsresultaterne var fine, og alle 19 kvier blev erklæret drægtige, men en af dem kastede først i juli. 14 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed.

Fra godt middelstore til knap middelhøje, ret kraftige, overvejende mørk-mellemrøde kvier. Flere med lidt fremskudt bov, gennemgående god eller fortrinlig dybde; ryggen hos en del velbåret, hos andre lidt vigende eller en smule ujævn; krydset af god bredde over hofterne, men hos en del ikke tilsvarende bredt bagtil, en del med lidt høj eller lidt kraftig korsbenskam og halerod, gennemgående fyldige og velformede lår og velstillede lemmer. Ret velformet og velbåret, hos flere lidt fremskudt, eller lidt skævt yver, overvejende med velformede og velstillede patter, flere med lidt tætstillede bagpatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Sydvestfyns Fast, s. 28181, f. 15. februar 1961
hos Arne Hansen, Højagergård, Ringe.

Ejer: Sydvestfyns Kvægavlsforening.

Fader: Rudme Rolu, s. 4708. Ff. Rolf, s. 4369. Fm. Nr. 47, Laura, s. 21903.

Moder: Nr. 11, s. 24645. Mf. Sydfyns Hess, s. 4641. Mm. Nr. 1, s. 23975.

Gns. af 19 døtre på Ejstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3860	4,73	183	3,99	154

Allerede ved prøvens start var det klart, at dette hold ville opnå dårlige ydelsesresultater, idet næsten alle kvierne startede med lave dagsydelser. Laktationskurven var meget flad, men den lå på et lavt niveau. Det var mælkeydelsen, som svigtede, medens der var gode fedtprocenter og høje proteinprocenter. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til spredningen i ydelsestallene ud over, at der var en del variation i proteinprocenterne. Kvierne var langsomme og besværlige at malke, og der opnåedes dårlige resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Der var intet specielt vedrørende kviernes temperament, men de havde særdeles god ædelyst og opnåede en god tilvækst på stationen. Kvierne havde forholdsvis let ved at kælte, men en del af dem havde noget yverbetændelse i begyndelsen af prøveåret. Alle 19 kvier blev erklæret drægtige, men en af dem kastede først i august. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Store og middelstore, noget uens af type og af præg, mørk mellemrøde af lød. Flere med løs og fremskudt bov, god brystdybde, bagtil velrundet ribbensbygning, god dybde af midtstykke; ryggen velbåret, men hos en del dog lidt slap og noget ujævn; krydset er på ganske enkelte regelmæssig firsidet og velformet, på de allerfleste noget uregelmæssigt samt med grov korsbenskam og halerod, lårene lidt korte, men ellers overvejende ret kraftige. Yveret af meget forskellig form og størrelse, en del med noget lange forpatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

2. SORTBROGET DANSK MALKERACE

Skive Bert, s. 7245, f. 20. oktober 1960
hos Juul Larsen, Tandrupgård, Års.

Ejer: Skiveegnens Kvægavlsforening.

Fader: Bert, s. 6757. Ff. 153 Foch, sv. e.s. 26351. Fm. Nr. 241, Fokje, sv. s. 115585.

Moder: Nr. 118, e.s. 5294. Mf. Gordon, e.s. 6462. Mm. Nr. 65, f. 7. juni 1950 hos Juul Larsen, Tandrupgård, Års.

Gns. af 18 døtre på Krarup Nygård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5876	4,42	260	3,66	215

Kvierne startede prøveåret med høje dagsydelser, og da udholdenheden i ydelsen var meget normal for et sortbroget hold, blev der opnået høje ydelsestal ved prøvens slutning. Det var den høje mælkeydelse, som frembragte de høje ydelsestal for smør og mælkeprotein, medens fedtprocenterne blev godt middelhøje og proteinprocenterne middelhøje. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, hvorimod der var ret stor spredning i de øvrige ydelsestal. Der opnåedes ikke fine malkbarhedsresultater, da enkelte af kvierne havde for lang malketid. Kvierne havde forholdsvis let ved at kælte, og de fødte alle levende kalve. Kalvenes gennemsnitlige fødselsvægt blev kun 35 kg. Kvierne havde et roligt temperament samt særdeles god ædelyst, og når man ser bort fra malkbarheden, var de brugsmæssige egenskaber gode. To kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige inden hjemsendelsen, men der var 10, som blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed. En af kvierne kastede sidst i juni.

Pænt ensartede, passende store, jævnt anselige, af ganske god form, nogenlunde muskuløse, malkeprægede, pænt sortbrogede dyr af ret god bredde og dybde. Kønt hoved, velansat, noget tynd hals, velstillet bov, overvejende velbåret ryg, lige, nogenlunde bredt, ret regelmæssigt kryds, adskillige lave omdrejere og høj halerod, enkelte noget tynd skank og stærktbøjlet has, ellers velformede lår og god benstilling. Velophængt, overvejende rummeligt og velformet yver, pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Bjerringbro Frans, s. 7480, f. 12. november 1961
hos A. Ruyter, Ooster-Blokker, Noordholland, Holland.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1968 v. F. a.j. Ldf.

Ejer: Kvægavlsforeningen Jyden.


Fader: Frans Ij. 167, n.r.s. 40474. Ff. Frans Ij. 107, n.r.s. 32366. Fm. Paula 8, n.r.s. 326214.

Moder: Pietje 80, n.r.s. 464839. Mf. Adema 21 v.d. Woudhoeve, n.r.s. 26781. Mm. Pietje 32, n.r.s. 201334.

Gns. af 20 døtre på Rosenfeldt:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5635	4,53	255	3,73	210

Såvel mælkeydelsen som fedt- og proteinprocenterne var særdeles gode, og der opnåedes fine ydelsestal for smør og mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var fin. Proteinprocenterne samt ydelsen af mælkeprotein udviste normal variation, medens der var stor spredning i de øvrige ydelsestal. En af kvierne ydede 379 kg smør i 317 dage, og en anden nåede 366 kg smør i 264 dage. De brugsmæssige egenskaber var fremragende, idet kvierne



Afkomsprøveholdet efter Bjerringbro Frans.

havde et roligt temperament, særdeles god ædelyst og en fin malkbarhed. Alle 20 kvier fødte levende kalve, og der blev ikke udsat kvier under prøven. Kvierne var meget tunge, og gennemsnitsvægten var 578 kg ved ankomst og 617 ved hjemsendelse. Der var kun 3 kvier, som blev drægtige efter 1. inseminering, men de var dog alle blevet erklæret drægtige ved prøvens slutning. En af kvierne kastede i juli. Der medgik 2,8 ins. pr. drægtighed.

Ensartede, godt middelstore til store, meget brede og dybe, adskillige betydelige, muskuløse, velprægede, smukt sortbrogede dyr med gode til særdeles gode linier og rammer. Typisk hoved og hals, velstillet bov, på et par nær god overlinie, velbåret, bredt, overvejende velformet kryds, adskillige noget fremtrædende halerod, fyldige lår, pæn benstilling, men adskillige noget uklare haser. Velbåret og rummeligt yver af gennemgående tilfredsstillende form, pænt pattesæt.

Holdet tilkendt mg for eksteriør.

Thy Drost, s. 7396, f. 23. december 1961
hos Peter Møller, Vestergård, Gundersted, Nibe.

Ejer: Thy Kvægavlsforening for SDM.

Fader: Drost, e.A 60. Ff. Sneeker Diamant, n.r.s. 33792. Fm. Laura 36, n.r.s. 257137.

Moder: Nr. 115, e.s. 5318. Mf. Ponto, e.s. 6381. Mm. Nr. 98, e.s. 5314.

Gns. af 19 døtre på Kronborg:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5612	4,29	241	3,51	197

Holdet startede prøveåret med en høj gennemsnitlig dagsydelse, og da udholdenheden i ydelsen var ret tilfredsstillende, opnåedes en fin placering ved prøvens slutning. Mælkeydelsen var høj, medens fedtprocenterne var knap middelhøje og proteinprocenterne lave. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, medens der var stor ensartethed i de øvrige ydelsestal. De brugsmæssige egenskaber var gode, idet kvierne var rolige og særdeles robuste. Ædelysten var særdeles god, og kvierne var hurtige til at æde deres foderration. En enkelt af dem krævede lidt for lang malketid, men som helhed blev der opnået ret gode malkbarhedsresultater. Selv om kvierne var tunge ved ankomsten til stationen, blev der opnået en stor tilvækst. Gennemsnitsvægten ved ankomsten til stationen var 556 kg, og den var 635 kg ved hjemsendelsen. En af kvierne havde haft børbetændelse, og den nåede ikke at blive erklæret drægtig inden prøvens afslutning. De øvrige 18 kvier blev alle erklæret drægtige, og de 12 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, middelstore til godt middelstore, meget brede og dybe, anselige, muskuløse, meget triveligt prægede, pænt sortbrogede dyr af godt slag, men kun jævnt god form. Typisk hoved og hals, adskillige lidt fremskudt bov, flertallet vigende til lav ryg, overvejende bredt, velbåret, et par hældende eller opsvejet, enkelte regelmæssigt kryds, men flertallet noget uharmoniske af rammer og overfladeform med lave omdrejere og grov halerod, kraftige lår, en ret stor part rette haser og usolid benstilling. Gennemgående jævnt velophængt yver af noget varierende form og kvalitet, enkelte over middellange patter, ret ordinær pattestilling.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Kolding Bos, s. 7616, f. 5. april 1963

hos Niels Skovrider Eriksen, Rykind, Vrensted, Løkken.

Ejer: Koldingkredsens Kvægavlsforening.

Fader: Ålborg Bos, e.A 80. Ff. Friso Wouter, f.r.s. 44116. Fm. Reino 24, f.r.s. 192426.

Moder: Nr. 55, e.s. 5419. Mf. Cæsar, e.s. 6339. Mm. Nr. 43, e.s. 5029.

Gns. af 19 døtre på Gelballegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5332	4,47	239	3,74	200

Det var den fine udholdenhed i ydelsen, som var stærkt medvirkende til, at holdet fik en fin placering ved prøvens slutning. Såvel den gennemsnitlige mælkeydelse som middelpercenten for fedt og protein lå noget over racens gennemsnit. Der var en del variation i fedtprocenterne, medens spredningen var knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Der blev udsat en kvie, som ikke kunne eller ville lægge mælken ned, men de øvrige gennemførte prøv-

ven, og holdet opnåede særdeles fine malkbarhedsresultater. Flere af kvierne var nervøse, men ellers var de brugsmæssige egenskaber gode. Alle kvierne fødte levende kalve, hvis gennemsnitsvægt kun blev 35 kg. En del af kvierne var små ved ankomsten til stationen, men der opnåedes gode tilvækstresultater i prøvetiden. To kvier blev ikke erklæret drægtige på stationen, og en tredje kastede i april. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, middelstore, jævnt anselige og muskuløse, ret regelmæssigt byggede og velprægede, pænt sortbrogede dyr af ret god bredde og dybde. Velformet hoved og hals, velstillet bov, overvejende velrundet rib, en del lidt ujævn og enkelte vigende ryg, lige, nogenlunde bredt til bredt kryds, adskillige noget lave eller snævre omdrejere, pæn lårbygning, velstillede lemmer. En del vidtstillede forpatter, ellers gode malkorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Dybbøl Faust, s. 7474, f. 27. marts 1962
hos Olaf Villumsen, Vordegård, Løgstrup.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1968 v. F. a.j. Ldf.

Ejer: Gråsten-Sønderborg Kvægavlsforening.

Fader: Bjarke, s. 7087. Ff. Blitsaerd Jet Adema, f.r.s. 44850. Fm. Buttenmoark Boukje 144, f.r.s. 246890.

Moder: Nr. 138, e.s. 5975. Mf. Gordon, e.s. 6462. Mm. Nr. 109, e.s. 5632.

Gns. af 22 døtre på Veesbæk:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5367	4,40	236	3,61	194

Ydelsen var særdeles god i vinterperioden, men i sommerperioden faldt den lidt for stærkt. Sandsynligvis har anlæg af en lufthavn haft uheldig indflydelse på ydelsen i sommerperioden. Mælkeydelsen var god, medens fedt- og proteinprocenterne lå i nærheden af racens gennemsnit. Fedt- og proteinprocenterne var ensartede, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Flere af kvierne var lidt nervøse, men der opnåedes fine resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Sundhedstilstanden var god, og alle 22 indsatte kvier gennemførte prøven. Kvierne havde særdeles god ædelyst, og de opnåede en god tilvækst i prøvetiden. En kvie blev brummer, og den blev derfor ikke drægtig i prøveåret. En anden kastede i juni. 8 blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Ensartede, middelstore, anselige, muskuløse, pænt sortbrogede dyr af god bredde og dybde, tiltalende type og form og med pæn farvetegning. Velformet hoved og hals, velstillet bov, velbåret, enkelte lidt ujævn ryg, lige, bredt, gennemgående regelmæssig firsidet kryds med god overfladeform, gode lår, velstillede

lemmer. Gennemgående gode malkeorganer, enkelte dog noget kort og lidt frem-skudt yver samt over middellange patter og noget uregelmæssigt pattesæt.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Kern, s. 7425, f. 10. november 1961

hos Andreas Andreassen, Nielsminde, Stavad, Manna.

Ejer: Vesthimmerlands Kvægavlsforening.

Fader: Hjørting Diamant, e.A 28. Ff. Felsum Diamant Athleet, f.r.s. 43898. Fm. Akke 25 B, f.r.s. 219252.

Moder: Nr. 66, e.s. 5508. Mf. Cæsar, e.s. 6339. Mm. Nr. 26, f. 13. februar 1956 hos Arne Andreassen, Nielsminde, Stavad, Manna.

Gns. af 17 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5373	4,37	235	3,72	200

Laktationskurven var usædvanlig flad for dette hold, og det bevirkede, at holdet fik en fin ydelse ved prøvens slutning. Mælkeydelsen var god, fedtprocenterne middelhøje og proteinprocenterne godt middelhøje. Fedtprocenterne udviste normal variation, medens der var ret stor spredning i de øvrige ydelsestal. Enkelte af kvierne var lidt nervøse, men det var ellers et godt hold at arbejde med, og der blev opnået et fint malkbarhedsresultat. Ædelysten var særdeles god, og der opnåedes en meget stor tilvækst på stationen, idet kviernes gennemsnitsvægt ved ankomst var 515 kg, medens den var 606 ved prøvens slutning. Kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 35 kg. Selv om en af kvierne ikke blev erklæret drægtig på stationen, må drægtighedsresultaterne alligevel betegnes som meget fremragende, idet 14 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,1 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, passende store, brede, dybe, anselige, jævnt muskuløse, velformede og velprægede, pænt sortbrogede dyr. Ret fint hoved, velansat hals, velstillet bov, enkelte lidt ujævn overgang fra kam til lænd, i øvrigt velbåret ryg, lige, bredt, overvejende velformet kryds med gode rammer, enkelte lidt fremtrædende, men ikke grov korsbenskam, velformede lår, velstillede, lidt klejne lemmer. Pænt ophængt yver af lidt varierende, men overvejende regelmæssig form, adskillige godt middellange patter og vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Bjerringbro Rico, s. 7482, f. 6. april 1962

hos N. v. d. Burg, Jelsum, Friesland, Holland.

Ejer: Kvægavlsforeningen Jyden.

Fader: Rik, f.r.s. 55593. Ff. Rutjes Adema, f.r.s. 48400. Fm. Aafke 272, f.r.s. 291817.

Moder: Aafke 226, f.r.s. 199727. Mf. Nico, f.r.s. 31652. (n.r.s. 31831).
Mm. Aafke 186, f.r.s. 131070.

Gns af 19 døtre på Rosenfeldt:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5319	4,39	234	3,69	196

Holdet bør især fremhæves for den store ensartethed i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein og for de fremragende malkbarhedsegenskaber, idet kvierne på dette hold var usædvanlig lette og hurtige at malke. Mælkeydelsen var god, medens fedt- og proteinprocenterne var middelhøje. Udholdenheden i ydelsen var god, og der var en god sundhedstilstand på holdet. Kvierne var lette at arbejde med, selv om enkelte af dem var lidt nervøse. Ædelysten var særdeles god, og der blev opnået en stor tilvækst på stationen. To kvier var ikke erklæret drægtige ved hjemsendelsen, men heraf havde den ene kastet. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, middelstore til store, overvejende anselige og pænt muskuløse, mørksortbrogede og pænt sortbrogede dyr af jævnt god bredde og dybde, en del noget uharmoniske, de øvrige af ret pæn form. Kønne af hoved og hals, enkelte noget fremskudt, ellers velstillet bov, en ret stor part vigende eller ujævn ryg, overvejende ret bredt, enkelte noget hældende kryds med varierende overfladeform, adskillige fremtrædende korsbenskam, jævnt gode lår, adskillige noget klejne af skank og lemmer, men på enkelte nær solid benstilling. Velophængt, overvejende velformet yver af god kvalitet, pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Ålborg Cor, s. 7452, f. 27. januar 1962
hos Jens Sehested, Tvillum, Fårvang.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Ålborg Amt.

Fader: Skovly Corr, e.A 46. Ff. Hein Adema, f.r.s. 43638. Fm. Roosjes Corrie 6, f.r.s. 160893.

Moder: Nr. 94, e.s. 5607. Mf. Strib, e.A 24. Mm. Nr. 75, f. 11. decem-
ber 1954 hos Jens Sehested, Tvillum, Fårvang.

Gns. af 16 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5470	4,27	234	3,56	195

Ydelsen var ikke overvældende god i den første tid efter kælvningen, men takket være en god udholdenhed i ydelsen fik holdet en fin placering ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev særdeles god, medens fedt- og proteinprocenterne blev knap middelhøje. Der var intet særligt at bemærke

med hensyn til variationen i ydelsestallene ud over, at der var stor variation i proteinprocenterne. Der opnåedes ret gode malkbarhedsresultater, men der var en del variation i malkbarhedstallet. Kvierne var ikke tilstrækkelig robuste, og de krævede megen dyrlægehjælp. Der var kælvningsbesværigheder, og der blev født 6 dødfødte kalve. To af kalvene blev parteret. 4 kvier blev udsat under prøven, og heraf blev de to udsat på grund af yverlidelser, medens de to andre havde dårligt hjerte, og den ene tillige en leverlidelse. To af kvierne, som gennemførte prøven, stod med såleknusning i 3-4 måneder. Kalvenes fødselsvægt blev kun 35 kg i gennemsnit. Kvierne havde en stor tilvækst på stationen. Drægtighedsforholdene var dårlige, idet 3 kvier ikke blev erklæret drægtige, og der var kun 3, som blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, knap middelstore til middelstore, jævnt anselige og muskuløse, ret pænt sortbrogede dyr af pæn bredde og dybde, men en ret stor part med noget usikre linier. Kønt hoved, velformet hals, adskillige noget løs bov og vigende ryg, overvejende velrundet rib, lige, enkelte regelmæssig firsidet kryds, de øvrige varierende rammer og overfladeform, velformede af lår og skank, enkelte stærktbøjede has, ellers pæn benstilling. En del uregelmæssige, men flertallet ret velformede til velformede og velansatte malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Århus Thor, s. 7500, f. 19. august 1962

hos Thorsten Ingvarsson, Katrinetorp, Malmø, Sverige.

Ejer: Kvægavlsforeningen Østjyden.

Fader: Trinton, sv.s. 29500. Ff. Annas Adema, f.r.s. 30587. Fm. Trijntje 32, f.r.s. 187663.

Moder: Nr. 981, Frigga, sv. e.s. 2256. Mf. Reints, sv. s. 25024. Mm. Nr. 150, Frigga, f. 9. februar 1948 hos Thorsten Ingvarsson, Katrinetorp.

Gns. af 19 døtre på Elkjær:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5085	4,48	228	3,72	189

Ydelsen var god i den første tid efter kælvningen, men da det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen, forringedes holdets placering lidt fra den første korttidsopgørelse til den endelige opgørelse ved prøvens slutning. Såvel den gennemsnitlige mælkeydelse som middelpercenten for fedt og protein blev godt middelhøj. Der var normal variation i alle ydelsestallene. De brugsmæssige egenskaber var fortræffelige, og kvierne var lette og hurtige at malke. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde en stor tilvækst i prøvetiden. Sundhedstilstanden og drægtighedsforholdene var særdeles gode. Alle kvier blev erklæret drægtige, men en af dem kastede sidst på vinteren.

11 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, overvejende velvoksne og anselige samt ret muskuløse og velformede, nogenlunde velprægede dyr med tiltalende farvetegning. Lidt langt hoved, en del kort hals, adskillige noget fremskudt bov samt vigende og ujævn ryg, gennemgående rummeligt midtstykke, en del lidt opsvejet, ellers velbåret kryds, noget varierende rammer og overfladeform, adskillige fremtrædende korsbenskam, jævnt muskuløse lår, et par stærktbøjede has, ellers pæn benstilling. Velformet og velophængt yver, enkelte med bipatter, i øvrigt godt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Ålborg Knud, s. 7451, f. 9. november 1961
hos Knud Ottosen, Nordkær, Nørhøne, Vadum.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1968 v. F. a.j. Ldf.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Ålborg Amt.

Fader: Ålborg Diamant, e.A 84. Ff. Haskera Gouverneur, f.r.s. 44506.
Fm. Langwarder Trijntje 26, f.r.s. 259419.

Moder: Nr. 11, e.s. 5637. Mf. Ålborg Zar, e.A 70. Mm. Nr. 56, f. 13.
februar 1955 hos Knud Ottosen, Nordkær, Nørhøne, Vadum.

Gns. af 18 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5252	4,33	227	3,59	189

Mælkeydelsen var særdeles god og fedtprocenterne middelhøje, medens proteinprocenterne blev knap middelhøje. Udholdenheden i ydelsen var god og specielt i vinterhalvåret. Der var en del variation i fedtprocenterne og stor variation i proteinprocenterne, medens der var knap middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Enkelte af kvierne var lidt nervøse, men konstitutionen var god, og kvierne var lette og hurtige at malke. Ædelysten var særdeles god, og der opnåedes en meget stor tilvækst på stationen, idet kviernes gennemsnitsvægt var 536 kg ved ankomst og 627 ved hjemsendelse. To kvier var ikke drægtige ved hjemsendelse, men heraf havde den ene kastet først i juli, og den anden havde haft børbetændelse. 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, passende store, brede, meget dybe, anselige, muskuløse, overvejende pænt sortbrogede dyr af udmærket slag og jævnt god til god form. Pænt hoved, velansat hals, velstillet bov, fortrinlig ribbensrundning, overvejende velbåret ryg med fast, meget bred kam, enkelte noget ujævn ryg og vigende lænd, lige, bredt, flertallet regelmæssigt kryds, enkelte lidt lave omdrejere, gode lår, enkelte noget ret has, ellers pæn benstilling. Velophængt, overvejende velformet yver, adskillige lidt vidtstillede forpatter, ellers pænt pattesæt.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Hjørring Zelo, s. 7659, f. 24. januar 1963
hos Chr. Holt Sørensen, Ellegård, Strellev, Ølgod.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Conzelo, s. 7299. Ff. Conzelo 33, n.r.s. 49051. Fm. Willy 20, n.r.s. 391754.

Moder: Nr. 202, e.s. 5779. Mf. Janki, s. 6695. Mm. Nr. 183, e.s. 5347.

Gns. af 13 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4619	4,78	221	3,82	177

Prøveåret blev startet med forholdsvis lave daglige mælkemængder, men da udholdenheden i ydelsen var usædvanlig god og fedtprocenterne meget høje, blev der opnået en tilfredsstillende smørydelse ved prøvens slutning. Selv om proteinprocenten var høj, blev der kun opnået en knap middelhøj ydelse af mælkeprotein. Proteinprocenterne var ensartede, medens variationen var ret normal i de øvrige ydelsestal. Kvierne var gennemgående rolige at arbejde med, men det tog for lang tid at malke dem, og der opnåedes dårlige malkbarhedsresultater. Ædelysten var god, og der opnåedes en god tilvækst i prøvetiden. Alle 13 kvier blev erklæret drægtige i prøvetiden, og 6 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, nær middelstore til store, kraftige, brede, meget dybe, anselige, flertallet muskuløse, pænt sortbrogede dyr, overvejende med usolide linier og rammer. Almindelige af hoved og hals, adskillige fremskudt bov og vigende til lav ryg, enkelte velformet, men flertallet noget uregelmæssigt kryds med grov korsbenskam og halerod, pæn lårbygning, enkelte stærktbøjede has, ellers pæn benstilling. Jævnt gode malkeorganer, adskillige over middellange patter.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Herning Esp, s. 7513, f. 9. september 1962
hos J. Esp Sørensen, Bjerring, Bjerringbro.

Ejer: Hammerum Herreds Kvægavlsforening.

Fader: Kastor, e.A 4. Ff. Deyne P. A. Koerier, f.r.s. 41550. Fm. Aafke 225, f.r.s. 187349.

Moder: Nr. 6, Minna, e.s. 5782. Mf. Sdj. Ernst, e.A 44. Mm. Nr. 77, Minna, e.s. 4791.

Gns. af 18 døtre på Moesgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5474	4,03	221	3,61	198

Enkelte af kvierne havde en periode med lave fedtprocenter, og holdets middelfedtprocent blev derfor for lav. Mælkeydelsen var særdeles god, og

da proteinprocenterne tangerede racens gennemsnit, opnåedes en høj ydelse af mælkeprotein. Det var bemærkelsesværdigt, at selv om der blev stor variation i fedtprocenterne, var proteinprocenterne meget ensartede. Spredningen var knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Der var normal udholdenhed i ydelsen. Kvierne var rolige og behagelige at arbejde med, og der opnåedes ret gode malkbarhedsresultater, men der blev dog udsat en kvie, som var nervøs og ondsksfuld, medens en anden blev udsat på grund af yverlidelse. Ædelysten var særdeles god, og kvierne opnåede en meget stor tilvækst på stationen. Kalvene var ret store, og de vejede 39 kg i gennemsnit. Alle kvier blev erklæret drægtige på stationen, og 7 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, middelstore, jævnt anselige og muskuløse, pænt sortbrogede dyr af pæn bredde og dybde, men flertallet noget uregelmæssig form med usikre linier og rammer. Typisk hoved og hals, velstillet bov, velrundet rib, en del velbåret, men adskillige vigende til blød ryg, enkelte velformet, men flertallet noget uregelmæssigt kryds, en del lave omdrejere samt fremtrædende korsbenskam eller hale-rod, gode lår, pæn benstilling. Overvejende gode malkeorganer.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Morsø Drost, s. 7617, f. 30. december 1962
hos Juul Larsen, Tandrupgård, Års.

Ejer: Morsø Kvægavlsforening.

Fader: Drost, e.A 60. Ff. Sneeker Diamant, n.r.s. 33792. Fm. Laura 36, n.r.s. 257137.

Moder: Nr. 128, e.s. 5705. Mf. Gordon, e.s. 6462. Mm. Nr. 84 (sen. 66), e.s. 5037.

Gns. af 20 døtre på Morsø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5008	4,33	217	3,64	182

Ydelsestallene for dette hold svarede fint til gennemsnitsydelsen for årets sortbrogede hold. Der var såvel højtydende som lavtydende kvier på dette hold, men der var også stor variation i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Der var normal udholdenhed i ydelsen. Kvierne var gode at arbejde med, og der blev opnået fine resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde en god tilvækst på stationen. Sundhedstilstanden var særdeles god, og alle 20 kvier fødte levende kalve og gennemførte prøven. Ingen af kvierne fødte små kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev 40 kg. Alle kvier blev erklæret drægtige, og 10 blev drægtige efter 1. inseminering. 4 kvier kastede, og det lykkedes kun at få en af dem erklæret drægtig igen, inden prøven sluttede. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, middelstore til godt middelstore, ret anselige og muskuløse, af jævnt godt slag, gennemgående kun nogenlunde velformede, pænt sortbrogede dyr af god bredde og dybde. Pænt hoved, velansat hals, adskillige lidt fremskudt bov og vigende til blød ryg, lige, bredt, flertallet noget uregelmæssigt kryds af varierende overfladeform, adskillige noget lave omdrejere og høj halerød, gode lår, en del stærkthøjet has, de øvrige pæn benstilling. Adskillige noget skævt yver, almindeligt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Sdj. Sten, s. 7606, f. 14. maj 1962

hos Fr. Palsma, Lieve Vrouwen Parochie, Friesland, Holland.

Ejer: Sønderjydsk Kvægavlsforening for SDM.

Fader: Jelsumer Gerard Wouter, f.r.s. 47475. Ff. Friso Wouter, f.r.s. 44116. Fm. Jelsumer Grietje 169, f.r.s. 264750.

Moder: Geertje A. A. 18, f.r.s. 287831. Mf. Stiensers Annas Adema 2, f.r.s. 42520. Mm. Geertje A. 14, f.r.s. 208694.

Gns. af 17 døtre på Brøstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5014	4,32	217	3,62	182

Der var stor ensartethed i ydelsestallene for dette hold, som sluttede prøveåret med middelhøje ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var god. De brugsmessige egenskaber var gode, og kvierne var gode at malke. Ædelysten var særdeles god, og holdet opnåede en meget stor tilvækst på stationen. Alle kvierne fødte levende kalve. Alle kvier var erklæret drægtige inden prøvens slutning, og 7 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, passende store, brede, dybe, anselige, pænt muskuløse, gennemgående velformede, velprægede, overvejende pænt sortbrogede dyr. Ret kønt hoved, velansat hals, velstillet bov, fast kam, enkelte vigende, men overvejende velbåret lænd, lige, ret bredt kryds med jævnt gode rammer, adskillige noget lave omdrejere, velformede lår, enkelte usikker hasestilling, ellers velstillede lemmer. Overvejende pæne malkeorganer, enkelte fremadrettede patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Thy Juvel, s. 7398, f. 26. april 1962

hos A. Ruyter, Ooster-Blokker, Noordholland, Holland.

Ejer: Thy Kvægavlsforening for SDM.

Fader: Adema 493, n.r.s. 41347. Ff. Nette 82, f.r.s. 42317. Fm. Adema 413, f.r.s. 228280.

Moder: Pietje 108, n.r.s. 722134. Mf. Cammingha Dinas Adema 13, n.r.s. 46224 (f.r.s. 49594). Mm. Pietje 80, n.r.s. 464839.

Gns. af 20 døtre på Kronborg:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5162	4,19	216	3,53	182

Mælkeydelsen var god, men derimod kneb det lidt med fedt- og proteinprocenterne. Proteinprocenterne var ret ensartede, men derimod var der ret stor variation i de øvrige ydelsestal. Dagsydelsen var høj i begyndelsen af prøveåret, men ydelsen faldt lidt for stærkt gennem det meste af prøve-tiden. Kvierne var gennemgående rolige at arbejde med, og der blev opnået gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var særdeles god, og der blev opnået en stor tilvækst på stationen. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier fødte levende kalve og gennemførte prøven. Drægtighedsforholdene var tilfredsstillende, idet alle 20 kvier blev erklæret drægtige inden prøvens slutning. 11 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, middelstore til godt middelstore, overvejende anselige samt velformede og velprægede, jævnt muskuløse dyr af pæn bredde og dybde, adskil-lige mørksortbrogede, men i øvrigt med pæn farvetegning. Kønt hoved, velansat hals, velstillet bov, enkelte lidt vigende eller ujævn, men hovedparten velbåret ryg, gennemgående lige kryds af pæn bredde og med ganske taltalende rammer og overfladeform, gode lår, velstillede lemmer, markerede haser. Velformet yver af god kvalitet, regelmæssigt pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Sdj. Peter, s. 7607, f. 6. juni 1962

hos Tj. I. Kerstma, Tjerkgaast, Friesland, Holland.

Ejer: Sønderjydsk Kvægavlsforening for SDM.

Fader: Jelsumer Gerard Wouter, f.r.s. 47475. Ff. Friso Wouter, f.r.s. 44116. Fm. Jelsumer Grietje 169, f.r.s. 264750.

Moder: Pytsje W. 13, f.r.s. 173198. Mf. Strandjutter 11, f.r.s. 30834. Mm. Pietje W. 7, f.r.s. 135662.

Gns. af 19 døtre på Brøstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4946	4,25	210	3,53	174

Den gennemsnitlige mælkeydelse nåede et middelhøjt niveau, men fedt- og proteinprocenterne blev kun knap middelhøje. Ydelsen faldt lidt for stærkt i den sidste halvdel af vinterperioden, men der var normal udholden-hed i ydelsen i sommerperioden. Der var lidt mindre variation i ydelsestal-

lene, end der forekommer på et sortbroget gennemsnitshold. Kvierne var usædvanlig lette og hurtige at malke, hvilket skaffede holdet fløjpladsen af årets sortbrogede hold ved malkbarhedsundersøgelsen. Det kneb for enkelte af kvierne at holde mælken fra den ene malkning til den anden. Ædelysten var gennemgående god, og kvierne opnåede en stor tilvækst på stationen. Kalvene vejede kun 35 kg i gennemsnit, men kviekalvene udgjorde også størstedelen. En af kalvene blev parteret. Alle 19 kvier blev erklæret drægtige, men en af dem kastede i juli. 13 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, middelstore, ret anselige, meget dybe, jævnt brede og muskuløse, ret pænt sortbrogede dyr med usikre linier og rammer. Kønt hoved, pæn hals, velstillet bov, meget velrundet rib, en ret stor part vigende til blød ryg, lige, gennemgående ret bredt kryds med varierende rammer og overfladeform, adskillige snævre omdrejere og flade af lår og skank, velstillede, sunde lemmer. Enkelte noget kort og fremskudt yver, de øvrige pæne malkeorganer og godt yvervæv.

Holdet tilkendt $g \div$ for eksteriør.

Give Robinea, s. 7620, f. 25. oktober 1962

hos A. Ruyter, Ooster-Blokker, Noordholland, Holland.

Ejer: Vejle Vesteregns Kvægavlsforening.

Fader: Sneeker Diamant, n.r.s. 33792. Ff. Diamant, f.r.s. 33251. Fm. Sneeker 52, f.r.s. 149843.

Moder: Anna 42, n.r.s. 722140. Mf. Bernard, n.r.s. 29100. Mm. Anna 35, n.r.s. 513359.

Gns. af 18 døtre på Skovgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4977	4,14	206	3,53	176

Det kneb med fedt- og proteinprocenterne, medens den gennemsnitlige mælkeydelse blev middelhøj. Der var godt middelstor spredning i ydelseshallene. Kvierne startede prøveåret med for lave dagsydelser, men der var til gengæld god udholdenhed i ydelsen i hele prøveåret. Der var stor variation i malkbarheden, idet nogle var hurtige at malke, medens enkelte behøvede en lang malketid, og det gennemsnitlige malkbarhedstal blev ikke helt tilfredsstillende. Kvierne var rolige, og de havde særdeles god ædelyst. Den gennemsnitlige tilvækst på stationen blev meget stor, idet kviernes gennemsnitsvægt blev 511 kg ved modtagelse og 605 ved hjemsendelse. Alle kvier blev erklæret drægtige, og 7 blev drægtige efter 1. inseminering. En af kvierne kastede i marts, men den nåede at blive erklæret drægtig igen, inden prøven sluttede. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, middelstore til godt middelstore, anselige, flertallet triveligt prægede, af godt slag, men kun ret regelmæssigt byggede, pænt sortbrogede dyr af god bredde og dybde. Ret velformet hoved, velansat hals, enkelte fremskudt bov, en del vigende eller ujævn ryg, overvejende lige, bredt kryds med noget varierende rammer og overfladeform, adskillige noget kraftig korsbenskam, velformede lår, pæn benstilling, adskillige præget af hasetryk. Jævnt velformet og velophængt yver, adskillige lange patter og uregelmæssig pattestilling.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Sdj. Corr., s. 7410, f. 8. februar 1962
hos Jens Sehested, Tvillum, Fårvang.

Ejer: SønderjydsK Kvægavlsforening for SDM.

Fader: Skovly Corr, e.A 46. Ff. Hein Adema, f.r.s. 43638. Fm. Roosjes Corrie 6, f.r.s. 160893.

Moder: Nr. 77, e.s. 5459. Mf. Nico, e.s. 6138. Mm. Nr. 64, f. 7. december 1952 hos Jens Sehested, Tvillum, Fårvang.

Gns. af 19 døtre på Brøstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4624	4,33	200	3,65	169

Fedt- og proteinprocenterne var middelhøje, medens mælkeydelsen kun blev knap middelhøj. Udholdenheden i ydelsen var jævnt god i vinterperioden og god i sommerperioden. Der var ret normal variation i ydelsestallene. Der opnåedes fine malkbarhedsresultater. To kvier blev udsat på grund af yverlidelser, og heraf havde den ene fået hormonbehandling, da det kneb med nedlægningen af mælken. Konstitutionen var ikke tilfredsstillende for dette hold. Flere af kvierne havde kælvningsvanskeligheder, og det blev nødvendigt at udføre kejsersnit på en af kvierne. Næsten alle kvier havde meget dårlig ædelyst lige efter kælvning, og samtlige kvier havde såleknusninger om efteråret. Ædelysten forbedredes efterhånden, og der opnåedes en god tilvækst under prøven. Alle 19 kvier blev erklæret drægtige, inden prøven sluttede, og 8 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Noget uensartede, middelstore til godt middelstore, jævnt anselige og muskuløse, gennemgående noget uregelmæssigt byggede dyr af pæn bredde og dybde og med ret typisk farvetegning. Velformet hoved og hals, en del fremskudt bov, gennemgående velrundet rib, enkelte lidt lette af bryst og side, en del velbåret, men en ret stor part vigende til lav ryg, lige, ret bredt, på få nær noget uregelmæssigt kryds, adskillige fremtrædende korsbenskam og halerod, pæn lårbygning, jævnt god benstilling. Yveret af varierende form, ophængning og kvalitet, gennemgående velformede og velstillede patter.

Holdet tilkendt g ÷ for eksteriør.

Hadsten Adson, s. 7506, f. 30. marts 1961
hos H. M. Heeg, Ytens, Friesland, Holland.

Ejer: Hadstenegnens Kvægavlsforening.

Fader: Adson Ferdinand, f.r.s. 53716. Ff. Jelsumer Diamant Adema, f.r.s. 45974. Fm. Adson Froukje 31, f.r.s. 291272.

Moder: Akke 44, f.r.s. 215397. Mf. Gijsbert Japicx, f.r.s. 34622. Mm. Akke 28, f.r.s. 152667.

Gns. af 18 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4100	4,60	189	3,72	152

Næsten alle kvierne havde høje fedtprocenter, men da mælkeydelsen blev for ringe, opnåedes ikke en tilfredsstillende smørydelse. Proteinprocenterne blev godt middelhøje. Ydelsen faldt lidt for stærkt i den sidste halvdel af prøveåret. Der var ret stor spredning i smørfedtydelsen og proteinprocenterne, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne var gennemgående rolige at arbejde med, og der blev opnået fine malkbarhedsresultater. Kvierne havde særdeles god ædelyst, og de reagerede ikke over for foderændringer. Sundhedstilstanden var god, og kvierne var ret robuste. Flere af kvierne fødte ret store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev 39 kg. En af kvierne havde kronisk børbetændelse, men de øvrige blev erklæret drægtige inden prøvens slutning. Kun 6 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,4 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, middelstore til godt middelstore, anselige, muskuløse, meget brede og dybe, gennemgående ret velformede, pænt sortbrogede dyr. Velformet hoved, velansat hals, velstillet bov, enkelte noget vigende lænd, ellers velbåret ryg, lige, bredt kryds, adskillige lave omdrejere og kraftig korsbenskam, enkelte brede hofter, fyldige lår, enkelte lidt usikker hasestilling, i øvrigt velstillede lemmer. Adskillige noget uregelmæssige malkeorganer.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Horsens Bast, s. 7645, f. 25. marts 1963
hos Kr. Rykind Eriksen, Grindstedgård, Brønderslev.

Ejer: Horsensegnens Kvægavlsforening.

Fader: Bast, e.s. 6258. Ff. Willem, f.r.s. 34593. Fm. Tietje 15, f.r.s. 140992.

Moder: Nr. 3, Irna, e.s. 5521. Mf. Opmand, e.s. 6427. Mm. Nr. 213, Irna, e.s. 4619.

Gns. af 20 døtre på Østerhåb:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4024	4,39	177	3,74	150

Flere af kvierne havde et lille yver ved kælvningen, og dagsydelsen var for ringe ved prøvens start. Det var mælkeydelsen, som svigtede, medens fedtprocenterne var middelhøje og proteinprocenterne godt middelhøje. Udholdenheden i ydelsen var meget normal. Der var knap middelstor spredning i ydelsestallene. Alle kvierne var hurtige og lette at malke, og der opnåedes fine malkbarhedsresultater. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 indsatte kvier gennemførte prøven. Ædelysten var god, og kvierne havde en meget stor tilvækst på stationen. Drægtighedsresultaterne var gode, idet alle kvier blev erklæret drægtige inden hjemsendelse, og 12 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,6 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, middelstore, jævnt anselige, kun nogenlunde brede og dybe samt muskuløse, overvejende uregelmæssigt byggede dyr med ret typisk farvetegning. Almindelige af hoved og hals, adskillige fremskudt bov og ujævn eller vigende ryg, flertallet lige, jævnt bredt, men uregelmæssigt kryds med lave eller snævre omdrejere og fremtrædende korsbenskam, jævnt gode lår, ret velstillede lemmer, markerede haser. Overvejende lille og kort, enkelte lidt fremskudt yver, almindeligt pattesæt.

Holdet tilkendt $g \div$ for eksteriør.

Varde Regent, s. 7438, f. 9. februar 1962

hos Thorsten Ingvarsson, Katrinetorp, Malmø, Sverige.

Ejer: Vardeegnens Kvægavlsforening og Kvægavlsforeningen Vestjyden.

Fader: Trinton, sv. e.s. 29500. Ff. Annas Adema, f.r.s. 30587. Fm. Trijntje 32, f.r.s. 187663.

Moder: Nr. 842, Regina, sv. e.s. 2248. Mf. 153 Foch, sv. e.s. 26351. Mm. Nr. 383, Regina, sv. s. 127647.

Gns. af 19 døtre på Vardegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4007	4,34	174	3,74	150

Holdet havde den største spredning i ydelsestallene for mælk og smørfedt af alle hold i de 23 år, afkomsprøverne har fungeret. Der var ret normal variation i fedt- og proteinprocenterne, medens der var meget stor spredning i ydelsestallene for mælkeprotein. En del af kvierne startede prøveåret med gode dagsydelser, men det store flertal af holdets kvier havde stor ydelsesnedgang gennem det meste af prøveåret. Det var mælkeydelsen, som svigtede, medens fedtprocenterne var middelhøje og proteinprocenterne godt middelhøje. Der opnåedes gode malkbarhedsresultater. 3 kvier måtte udsættes af prøven af forskellige årsager. Ædelysten var god, og kvierne opnåede en meget stor tilvækst. Kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 35 kg, men flertallet af kalvene var kviekalve. En af kvierne nåede ikke at blive

erklæret drægtig på stationen. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, knap middelstore til godt middelstore, jævnt anselige, knap middelbrede til brede, ret muskuløse, overvejende pænt sortbrogede dyr af ret godt slag, men flertallet noget usolide linier. Kønne af hoved og hals, velstillet bov, velrundet rib, adskillige noget vigende ryg, lige, oftest noget smalt og lidt tagdannet kryds, enkelte fedt sædebensparti, velformede lår, noget varierende hasebøjning, men flertallet pæn benstilling. Overvejende lille og adskillige frem-skudt yver, almindeligt pattesæt.

Holdet tilkendt $\frac{g}{+}$ for eksteriør.

Hjørring Vester, s. 7658, f. 6. december 1962
hos Anders Vestergaard, Østergård, Kjelstrup, Thisted.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Thy Tax, s. 7115. Ff. Botermijn 2, f.r.s. 48927. Fm. Raerder Pietje 113, f.r.s. 279196.

Moder: Nr. 110, e.s. 5792. Mf. Thy Gran e.s. 6566. Mm. Nr. 88, e.s. 5363.

Gns. af 15 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3769	4,59	173	3,76	142

Prøven indledtes med meget lave dagsydelser, og selv om udholdenheden i ydelsen var særdeles god, blev der alligevel ikke opnået et antageligt ydelsesresultat ved prøvens slutning. Det var mælkeydelsen, som svigtede, medens fedt- og proteinprocenterne var særdeles gode. Der var godt middelstor spredning i ydelsestallene for smørfedt og mælkeprotein, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne var lette og hurtige at malke, og der opnåedes særdeles fine malkbarhedsresultater. Kvierne havde god ædelyst, og de opnåede en stor tilvækst i prøvetiden. En af kalvene blev parteret. En kvie blev brummer, men de øvrige blev erklæret drægtige på stationen. To kvier kastede, men de nåede at blive erklæret drægtige igen, inden prøven sluttede. Kun 4 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, middelstore til godt middelstore, overvejende brede, dybe og anselige, pænt sortbrogede dyr af godt slag og med pæn muskulatur, adskillige ret harmoniske, men en del kun ret solide linier og rammer. Almindelige af hoved og hals, enkelte fræmskudt, ellers velstillet bov, rummeligt midtstykke, en del noget vigende eller ujævn, men flertallet velbåret ryg, adskillige lidt hældende eller uregelmæssigt kryds, de øvrige pæne krydsrammer, gode lår, ret velstillede lemmer. Kun nogenlunde rummeligt, ret velophængt yver, almindeligt pattesæt.

Holdet tilkendt $\frac{g}{+}$ for eksteriør.

Århus Tax, s. 7627, f. 25. december 1962

hos Anders Vestergaard, Østergård, Kjelstrup, Thisted.

Ejer: Kvægavlsforeningen Østjyden.

Fader: Thy Tax, s. 7115. Ff. Botermijn 2, f.r.s. 48927. Fm. Raerder Pietje 113, f.r.s. 279196.

Moder: Nr. 107, e.s. 5791. Mf. Thy Gran, e.s. 6566. Mm. Nr. 78, e.s. 4966.

Gns. af 19 døtre på Elkjær:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4019	4,24	170	3,55	143

Kvierne startede prøveåret med lave dagsydeler, og da der tillige var for stor ydelsesnedgang i en del af prøveåret, blev der opnået for dårlige ydelsestal ved prøvens slutning. Mælkeydelsen blev for lav, og fedt- og proteinprocenterne blev kun middelhøje. Fedtprocenterne var ret ensartede, medens spredningen var godt middelstor for de øvrige ydelsestal. Kvierne var hurtige og lette at malke, og der opnåedes meget fine malkbarhedsresultater. Alle 19 indsatte kvier gennemførte prøven. Ædelysten var god, og kvierne havde en meget stor tilvækst i prøveåret. Flere af kvierne fødte små kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 33 kg. Drægtighedsresultaterne var meget fine, idet alle 19 kvier blev erklæret drægtige, og 16 blev drægtige efter 1. inseminering. En af kvierne kastede, men den nåede at blive drægtig for anden gang i vinterhalvåret. Der medgik kun 1,3 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede og anselige, af noget varierende højde, enkelte meget store, pænt sortbrogede dyr med varierende muskulatur, en del uharmoniske og af mindre solid type. Almindelige af hoved og hals, enkelte noget fremskudt, ellers velstillet bov, ret rummeligt, flere dog noget let midtstykke, en del vigende eller ujævn ryg, overvejende lige, men oftest uregelmæssigt kryds, en del lave omdrejere og fremtrædende korsbenskam, ret gode lår, pæn benstilling, tørre og markerede haser. Velophængt, men lille kort yver, almindeligt pattesæt.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

3. JERSEYRACE

Horsens Frank, s. 3398, f. 18. februar 1963

hos Erik Bredholt, Edelslund, Løgten.

Ejer: Horsensegnens Kvægavlsforening.

Fader: Hjørring Frank, e.s. 135. Ff. Wilmann, e.s. 83. Fm. Nr. 30, e.s. 4054.

Moder: Nr. 99, e.s. 7035. Mf. Edelslund Knægt, e.s. 95. Mm. Nr. 42, e.s. 4210.

Gns. af 19 døtre på Østerhåb:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4022	6,81	274	4,26	171

Holdet besatte fløjpladsen ved 50 dages opgørelsen, og det bevarede denne plads ved alle følgende opgørelser. Såvel den gennemsnitlige mælkeydelse som middelfedtprocenten lå på et højt niveau, og proteinprocenterne blev godt middelhøje. Udholdenheden i ydelsen var ret god. Der var ret stor ensartethed i mælkeydelsen, men der var til gengæld stor variation i fedtprocenterne. Der opnåedes fine resultater ved malkbarhedsundersøgelsen, og kvierne var gode at arbejde med. Sundhedstilstanden var god, og kvierne havde god ædelyst. Det lykkedes at få alle kvier erklæret drægtige, men en af dem kastede først i august. Der var kun 5 kvier, som blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, ensartede, lysgrågule enkelte brogede kvier, særdeles tiltalende og kønt hold, fintpræget af hoved og hals, god bov, smukt midtstykke, god overlinie, enkelte lidt vigende, velformet kryds, gode lår, fine, velstillede lemmer, middelstort, velformet og stærkt yver, middelstore til små, velstillede patter.

6 dyr tilkendt type Ia, 5 Ib, 6 Ib, 1 IIb og 1 type III.

Egholm Russ, s. 3243, f. 15. november 1962
hos Johs. Hansen, Melby.

Ejer: Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening.

Fader: Nordfyns Russ, e.s. 138. Ff. Holm Vestfyn, e.s. 88. Fm. Nr. 38, e.s. 3200.

Moder: Nr. 37, e.s. 6547. Mf. Nordfyns Man, s. 2001. Mm. Nr. 28, s. 09105, f. 12. oktober 1953 hos Johs. Hansen, Melby, Jullerup.

Gns. af 19 døtre på Skovgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4065	6,74	274	4,41	179

Det var den usædvanlig fine udholdenhed i ydelsen, som bragte holdet frem til den fine placering ved prøvens slutning. Mælkeydelsen var høj, og såvel fedt- som proteinprocenterne var særdeles gode. Der var knap middelstor spredning i smørfedydelsen, men der var stor variation i fedtprocenterne. Kvierne havde et roligt temperament, men det tog for lang tid at malke en del af dem, og der opnåedes ikke tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var god, og kvierne opnåede en stor tilvækst på stationen. Sundhedstilstanden var særdeles god, og kvierne havde en god konstitution. En af kvierne blev ikke drægtig, da børen var blevet

beskadiget, og en anden kastede sidst i maj. Kun 4 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,5 ins. pr. drægtighed.

Middelstore til godt middelstore tiltalende ret ensartede lysegule til gule kvier, velformet af hoved og hals, store horn, god bov, dybt, velformet midtstykke, god overlinie, enkelte vigende, velformet kryds, højt korsbens- og halerodsparti, gode lår, fine, velstillede lemmer, stort velformet yver, middelstore, velstillede patter.

5 dyr tilkendt type Ia, 2 Ib, 6 Ib, 1 IIby, 4 IIb og 1 type III.

Gefion, s. 3569, f. 2. september 1963
hos Otto Storm, Hindslykke, Verninge.

Ejer: Odder-Skanderborgegnens Jersey-Kvægavlsforening.

Fader: Fåborg Gibs, e.s. 137. Ff. Plet Nørremark, e.s. 130. Fm. Nr. 60, f. 11. marts 1955 hos Tage Toft, Laurbjerg.

Moder: Nr. 64, e.s. 6458. Mf. Fynboen, s. 1601. Mm. Nr. 15, e.s. 1313.

Gns. af 20 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4060	6,49	264	4,18	170

Mælkeydelsen var særdeles god, medens fedt- og proteinprocenterne var knap middelhøje. Der var stor ensartethed i ydelsestallene. Ydelsen faldt lidt for stærkt i sommerperioden. Kvierne havde en lang malketid, og der opnåedes ikke tilfredsstillende malkbarhedsresultater. Der var aldrig besvær med nedlægningen af mælken, men der kom for lille stråle fra patterne. Enkelte af kvierne var lidt nervøse, men der var særdeles god ædelyst. Der var ret god sundhedstilstand, og alle 20 kvier gennemførte prøven. Alle kvierne havde normal kælvning og fødte levende kalve. Alle kvier blev erklæret drægtige på stationen, men en af dem kastede sidst i juli. Drægtighedsresultaterne var særdeles fine, idet 15 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,4 ins. pr. drægtighed.

Godt middelstore til middelstore ret tiltalende brungule kvier, velformet af hoved og hals, god bov, dybt, velformet midtstykke, god overlinie, enkelte lidt hoftebrede og uregelmæssige af halerodsparti, fine, velstillede lemmer. Stort, veludviklet, lidt løst yver, med middelstore ret velstillede patter, flere med vidtstillede forpatter.

2 dyr tilkendt type Ia, 13 Ib og 5 type IIb.

Hjørring Baun, s. 3010, f. 14. november 1960
hos Johs. Pedersen, Bremerskov, Langeskov.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Randers Baun, e.s. 131. Ff. Nybølle Baun, s. 1295. Fm. Nr. 1, e.s. 1870.

Moder: Nr. 23, e.s. 6350. Mf. Wilmann, e.s. 83. Mm. Nr. 5, Viby, e.s. 1720.

Gns. af 19 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4022	6,36	256	4,17	168

Ydelsen var ikke ret høj i begyndelsen af prøveåret, men da udholdenheden i ydelsen var meget fremragende, fik holdet en fin placering ved prøvens slutning. Mælkeydelsen var særdeles god, medens fedt- og proteinprocenterne blev knap middelhøje. Spredningen i smørfedtydelsen blev knap middelstor, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne var lette og hurtige at malke, og der opnåedes fine resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne havde også fremragende brugsmæssige egenskaber på andre områder, idet ædelysten var særdeles god, og de havde et roligt temperament. Sundhedstilstanden var fremragende, og alle 19 indsatte kvier fødte levende kalve og gennemførte prøven. Alle kvier blev erklæret drægtige inden prøvens slutning, og 9 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Middelstore ensartede og tiltalende brungule køer, særdeles velformede af hoved, horn og hals, god bov, passende dybt velformet midtstykke, vigende overlinie, velformet kryds, enkelte med noget fremtrædende halerodsparti, gode lår, særdeles fine og velstillede lemmer, gennemgående stort og veludviklet yver, enkelte lidt uregelmæssige, middelstore patter, pattestillingen hos en del lidt fremadrettede.

1 dyr tilkendt type Ia, 5 Iby, 12 Ib og 1 type IIby.

Holm Syd, s. 3431, f. 10. februar 1962
hos Lars P. Pedersen, Lambæksgård, Middelfart.

Ejer: Sydjydsk Jersey-Kvægavlsforening.

Fader: Sydfyns Ifa, e.s. 118. Ff. Jesper Jason, e.s. 114. Fm. Nr. 40, e.s. 1289.

Moder: Nr. 37, e.s. 7896. Mf. Holm Vestfyn, e.s. 88. Mm. Nr. 17, e.s. 5134.

Gns. af 21 døtre på Skøl vad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3749	6,78	254	4,32	162

Dette hold udmærkede sig ved meget høje fedtprocenter og godt middelhøje proteinprocenter. Mælkeydelsen var god, og der var fin udholdenhed i ydelsen. Den højestydende kvie ydede 448 kg smør i 340 dage. Der var

ret stor spredning i smørfedtydelsen og knap middelstor spredning i fedtprocenterne, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. De brugsmæssige egenskaber var særdeles gode, idet kvierne var rolige at arbejde med samt lette at malke, og de havde særdeles god ædelyst og reagerede ikke over for foderændringer. Sundhedstilstanden var enestående god, og der var kun få sygdomstilfælde. Der opnåedes en stor tilvækst på stationen. Der indsattes 21 kvier, og de havde alle en normal kælvning og fødte levende kalve, og alle kvier gennemførte prøven. Flere af kvierne fødte store kalve, og gennemsnitsvægten blev 25 kg. En kvie blev brummer, men de øvrige blev erklæret drægtige. To kvier kastede, men det lykkedes at få den ene af dem erklæret drægtig igen, inden prøven blev afsluttet. 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, ensartede og tiltalende, lysegule kvier, velformede af hoved og hals, markeret bov, passende dybt, velformet midtstykke, god overlinie, enkelte vigende, velformet kryds, enkelte lidt fremtrædende halerodsparti, enkelte lidt hoftebrede, særdeles fine, velstillede lemmer, stort velformet og stærkt yver, enkelte lidt uregelmæssige, middelstore, velstillede patter.

4 dyr tilkendt type Ia, 5 Ib, 7 Ib, 1 IIa, 2 IIb og 2 type IIb.

Årup Vestfyns Fax, s. 3489, f. 6. december 1962
hos Rudolf Frandsen, Skovladen, Fårvang.

Ejer: Årup Vestfyns Kvægavlsforening.

Fader: Lars, e.s. 148. Ff. Hans, e.s. 100. Fm. Nr. 34, e.s. 3075.

Moder: Nr. 30, e.s. 7462. Mf. Katstrup Ægir, e.s. 85. Mm. Nr. 14, e.s. 5072.

Gns. af 20 døtre på Østerhåb:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3849	6,60	254	4,24	163

Kvierne på dette hold startede med høje dagsydelse, men det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen. Såvel den gennemsnitlige mælkeydelse som fedtprocenterne var gode, medens proteinprocenterne var middelhøje. Der var en del variation i fedtprocenterne, men en knap middelstor spredning i smørfedtydelsen. En del af kvierne var noget nervøse under malkningen, men malketiden var kort, og der opnåedes fine resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Sundhedstilstanden var god, og kvierne havde en god ædelyst. Kælvningerne forløb godt, og alle kvier gennemførte prøven. En af kvierne nåede ikke at blive erklæret drægtig på stationen. 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Små, særdeles tiltalende, fintprægede og velformede, lysegule til brungule kvier, fintpræget af hoved og hals, god bov, passende dybt, velformet midtstykke,

god overlinie for de fleste, enkelte lidt vigende, velformet kryds, særdeles fine, velstillede lemmer, passende stort, velformet og velbåret yver, enkelte lidt stort for-
yver, middelstore, velstillede patter.

9 dyr tilkendt type Ia, 3 Iby, 7 Ib og 1 type IIb.

Holbæk Sjus, s. 3485, f. 7. september 1962
hos Kaj Andersen, Hammelmose, Manna.

Ejer: Holbæk Amts Kvægavlsforening.

Fader: Hjørring Holm, e.s. 145. Ff. Holm Vestfyn, e.s. 88. Fm. Nr. 48, e.s. 1860.

Moder: Nr. 36, e.s. 7931. Mf. Munkgård, e.s. 101. Mm. Nr. 30, e.s. 7032.

Gns. af 16 døtre på Torntofte:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4012	6,34	254	4,22	169

Mælkeydelsen var særdeles god og proteinprocenterne middelhøje, hvorimod middelfedtprocenten ikke nåede racens gennemsnit. Udholdenheden i ydelsen var meget normal. Der var ikke ret stor spredning i fedtprocenterne, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne var gode at arbejde med, og de var hurtige at malke, hvorfor der opnåedes fine resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til ædelyst, men kvierne udviklede sig godt på stationen, og de opnåede en god tilvækst. Sundhedstilstanden var fremragende, og alle 16 kvier gennemførte prøven. Alle kvierne havde normale kælvninger og fødte levende kalve. Alle kvier blev erklæret drægtige på stationen, og 8 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Middelstore til knap middelstore, særdeles fintprægede og meget velformede lysegule kvier, fint præget af hoved og hals, god bov, smukt velformet midtstykke, lige velbåret overlinie. Velformet kryds, gode lår, fine velstillede lemmer, stort velformet og velbåret yver, middelstore, velstillede patter.

7 dyr tilkendt type Ia, 3 Iby og 6 Ib.

Bjerringbro Hoff, s. 3378, f. 27. september 1962
hos Jens Hansen, Dongshøjrup, Stenstrup.

Ejer: Kvægavlsforeningen Jyden.

Fader: Sydfyns Hoff, e.s. 116. Ff. Nørr Vestfyn, e.s. 111. Fm. Nr. 20, e.s. 1278.

Moder: Nr. 50, e.s. 7303. Mf. Max, e.s. 75. Mm. Nr. 17, f. 14. marts 1950 hos Jens Hansen, Stenstrup.

Gns. af 16 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3961	6,41	254	4,24	168

Holdet havde en meget flad laktationskurve i hele vinterperioden, men ydelsesnedgangen var lidt for stor i den sidste tredjedel af prøvetiden. Mælkeydelsen var god og proteinprocenterne middelhøje, hvorimod fedtprocenterne knap nåede racens gennemsnit. Der var stor variation i ydelsestallene. Kvierne havde et roligt temperament, og de var gode at malke, men det blev nødvendigt at udsætte en kvie, der ikke kunne eller ville lægge mælken ned. Sundhedstilstanden var fremragende for dette hold, og kvierne havde særdeles god ædelyst. Kælvningerne havde et normalt forløb, men det var vanskeligt at konstatere brunsten på de fleste af kvierne. To kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige inden hjemsendelsen. Kun 4 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Godt middelstore til middelstore noget uregelmæssige, lysegule til brungule kvier, velformet af hoved, ret store horn, god bov, dybt, ret velformet midtstykke, en del med vigende overlinie, en del hoftebrede og noget uregelmæssige af kryds, gode lår, fine, velstillede lemmer, gennemgående ret stort, noget uregelmæssigt yver, kun enkelte med ret godt yver, uregelmæssig pattestilling.

1 dyr tilkendt type Ia, 8 Ib, 1 IIb, 5 IIb og 1 type III.

Fåborg Nat, s. 3492, f. 9. april 1963
hos Aage Johansen, Lervang, Roved, Andst.

Ejer: Fåborg-Midtfyns Kvægavlsforening.

Fader: Granat, e.s. 126. Ff. Monark, s. 1429. Fm. Nr. 64, e.s. 3171.

Moder: Nr. 51, e.s. 5526. Mf. Lorentz, f. 30. januar 1952 hos V. Lorentzen, Bubbeltgård, Ejby. Mm. Nr. 45, f. 7. april 1952 hos Aage Johansen, Lervang, Roved, Andst.

Gns. af 17 døtre på Lægård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3664	6,92	254	4,50	165

Det mest bemærkelsesværdige ved dette holds ydelsesresultater var de meget høje fedt- og proteinprocenter. Da mælkeydelsen tillige var tilfredsstillende, opnåedes pæne ydelsestal for smør og mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen var kun nogenlunde tilfredsstillende, og derved forringedes holdets placering noget fra de første korttidsoppgørelser til den endelige

opgørelse ved prøvens slutning. Der var en del variation i ydelsestallene for smørfedt og mælkeprotein, og der var stor variation i fedtprocenterne. Kvierne var rolige at arbejde med, og der opnåedes ret gode malkbarhedsresultater. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde en god udvikling og opnåede en god tilvækst på stationen. Sundhedstilstanden var fremragende, og alle 17 kvier fødte levende kalve og gennemførte prøven. En af kvierne blev ikke erklæret drægtig på stationen, og en anden kastede, men det lykkedes at få vedkommende kvie drægtig for anden gang i prøvetiden. Kun 5 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, fintprægede, særdeles tiltalende, meget ensartede lysegule til næsten sorte kvier, fintprægede af hoved og hals, god bov, middeldybt, velformet midtstykke, god overlinie, velformet kryds, særdeles fine, velstillede lemmer, stort velformet og velbåret yver, middelstore velstillede patter.

6 dyr tilkendt type Ia, 2 Ib, 8 Ib og 1 type IIa.

Vax Syd, s. 3432, f. 9. november 1961
hos Niels og Georg Nielsen, Seden Ågård, Seden.

Ejer: Sydjydsk Jersey-Kvægavlsforening.

Fader: Centrums Vax, e.s. 141. Ff. Edelslund Knægt, e.s. 95. Fm. Nr. 42, e.s. 4210.

Moder: Nr. 79, e.s. 7512. Mf. Millinge Munk, e.s. 87. Mm. Nr. 58, e.s. 5620.

Gns. af 22 døtre på Skølvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3824	6,61	253	4,30	164

Mælkeydelsen var god, og såvel fedt- som proteinprocenterne var fuldt ud middelhøje. Der var god udholdenhed i ydelsen, og holdet fik en meget flad laktationskurve. Der var godt middelstor spredning i ydelsestallene for mælk og smørfedt, medens der var middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Kvierne var lidt vanskelige at malke i begyndelsen af prøveåret, og der opnåedes ikke tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen, men der forekom dog en forbedring af malkbarheden gennem det meste af prøveåret. Det kneb med nedlægningen af mælken hos enkelte af kvierne. Kvierne havde særdeles god ædelyst og et godt temperament. Sundhedstilstanden var god, og alle 22 kvier gennemførte prøven. Alle kvier blev erklæret drægtige på stationen, og 10 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, ret ensartede og tiltalende lysegule, en del brogede kvier, velformet af hoved og horn, god bov, velformet midtstykke, velbåret overlinie, enkelte lidt ujævne, velformet kryds, gode lår, meget fine, velstillede lemmer, gen-

nemgående stort yver flere noget uregelmæssige og ret stort foryver, middelstore velformede patter.

5 dyr tilkendt type Ia, 1 Iby, 14 Ib og 2 type IIb.

Randers Russ, s. 3413, f. 4. januar 1963
hos Alfred Jørgensen, Sandkrogen, Ollerup.

Ejer: Kvægavlsforeningen Østjyden.

Fader: Nordfyns Russ, e.s. 138. Ff. Holm Vestfyn, e.s. 88. Fm. Nr. 38, e.s. 3200.

Moder: Nr. 54, e.s. 7196. Mf. Millinge Munk, e.s. 87. Mm. Nr. 30, e.s. 4547.

Gns. af 20 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3665	6,63	243	4,24	155

Kvierne startede prøveåret med særdeles gode ydelsestal, men ydelsen faldt lidt for stærkt gennem det meste af prøveåret. Mælkeydelsen blev god, og fedt- og proteinprocenterne blev middelhøje. Fedt- og proteinprocenterne var ret ensartede, medens spredningen var middelstor for de øvrige ydelsestal. Hos nogle af kvierne kneb det med nedlægningen af mælken de første dage efter kælvningen, men det gik dog hurtigt i orden, og der mærkedes ikke mere til det senere i prøvetiden. Det kneb også med malkbarheden i den første del af prøvetiden, og der opnåedes kun ret gode malkbarhedsresultater. En af kvierne kom ikke med i malkbarhedsundersøgelsen, da den havde så mange vorter på patterne, at den måtte håndmalkes. Kvierne havde et roligt temperament samt særdeles god ædelyst. Drægtighedsresultaterne var særdeles fine, og alle kvier blev erklæret drægtige inden prøvens slutning. En af kvierne kastede i marts, men det lykkedes at få den drægtig igen, inden den skulle hjemsendes. 14 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,3 ins. pr. drægtighed.

Middelstore meget tiltalende, lysgule kvier, velformede af hoved, horn og hals, god bov, god overlinie, passende dybt, velformet midtstykke, middelbredt, velformet kryds, gode lår, særdeles fine og velstillede lemmer, ret stort, gennemgående velformet yver, lidt store forpatter og fremadrettede bagpatter på en del.

5 dyr tilkendt type Ia, 3 Iby, 10 Ib og 2 type IIb.

Sydvestfyns Jon, s. 3421, f. 21. december 1962
hos Johs. Pedersen, Bremerskov, Langeskov.

Ejer: Sydvestfyns Kvægavlsforening.

Fader: Coralads Dream Boy, U.S.A. s. 560800. Ff. Zinnia's Corald, U.S.A. s. 540908. Fm. Lad's Eagle Jenny, U.S.A. s. 1811928.

Moder: Nr. 23, e.s. 6350. Mf. Wilmann, e.s. 83. Mm. Nr. 5, Viby, e.s. 1720.

Gns. af 20 døtre på Ejstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3717	6,34	236	4,25	158

Den store ensartethed i ydelsestallene og den gode udholdenhed i ydelsen var et kendetegn for dette hold. Mælkeydelsen og proteinprocenterne nåede et middelhøjt niveau, medens fedtprocenterne blev knap middelhøje. Kvierne var usædvanlig lette og hurtige at malke, og der opnåedes meget fine resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Der blev udsat 3 kvier i prøvetiden, og for den ene af dem var der store vanskeligheder med nedlægningen af mælken, idet den ikke kunne eller ville lægge mælken ned. Ædelysten var god, og kvierne opnåede en god tilvækst. To kvier blev brummere, men de øvrige blev erklæret drægtige inden prøvens slutning. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, ret tiltalende og ret ensartede lysgrågule kvier, velformet hoved og hals, god bov, dybt, velformet midtstykke, gennemgående god overlinie, flere lidt vigende og ujævne, hoftebredt, lidt langt kryds hos en del, fine velstillede lemmer, enkelte lidt ret af has, stort noget afrundet velbåret yver, middelstore, velstillede patter.

4 dyr tilkendt type Ia, 3 Iby, 8 Ib, 1 IIby, 3 IIb og 1 type III.

Hjørring Tæbring, s. 3103, f. 2. oktober 1960
hos Arne Jensen, Engelund, Outrup, Nykøbing M.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Prins Nørreremark, e.s. 120. Ff. Prins Kærby, e.s. 106. Fm. Nr. 10, e.s. 1743.

Moder: Nr. 59, e.s. 6528. Mf. Morsø Lasse, s. 1854. Mm. Nr. 56, e.s. 5857.

Gns. af 18 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3622	6,50	235	4,18	151

Ydelsen var forholdsvis lav i den første del af prøvetiden, men udholdenheden i ydelsen var meget fin, og den flade laktationskurve bevirkede, at holdet kom til at slutte med et pænt ydelsesresultat. Den gennemsnitlige mælkeydelse og middelfedtprocenten blev middelhøj, medens proteinprocenten

blev knap middelhøj. Proteinprocenterne var ret ensartede, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Kvierne var usædvanlig lette og hurtige at malke, og holdet fik racens førsteplads ved malkbarhedsundersøgelsen. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til temperament og ædelyst. Alle kvierne fødte levende kalve. En kvie blev brummer, men de øvrige blev drægtige inden prøvens slutning. Drægtighedsresultaterne var meget fine, idet 11 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,4 ins. pr. drægtighed.

Middelstore noget uregelmæssige lysgule til brungule kvier. Velformede af hoved, horn og hals, markeret bov, passende dybt og velformet midtstykke, hos mange vigende overlinie og højt korsbensparti, gode lår, fine velstillede lemmer, ret stort noget uregelmæssigt yver, middelstore patter, lidt fremadrettede bagpatter.

1 dyr tilkendt type Ia, 2 Ib, 10 Ib, 1 IIb, 2 IIb og 2 type III.

Hoff Syd, s. 3430, f. 24. november 1962
hos Th. Larsen, Tårup Vestergård, Gelsted.

Ejer: Sydjdysk Jersey-Kvægavlsforening.

Fader: Sydfyns Hoff, e.s. 116. Ff. Nørr Vestfyn, e.s. 111. Fm. Nr. 20, e.s. 1278.

Moder: Nr. 21, e.s. 7598. Mf. Årup Glimt, s. 1838. Mm. Nr. 11, e.s. 4927.

Gns. af 15 døtre på Skølvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3469	6,75	234	4,31	149

Mælkeydelsen blev knap middelhøj, medens fedtprocenterne var særdeles gode og proteinprocenterne middelhøje. Der var normal udholdenhed i ydelsen. Spredningen var godt middelstor for alle ydelsestallene. Kvierne havde et roligt temperament, og der opnåedes ret gode malkbarhedsresultater. Sundhedstilstanden var god, og kvierne havde god ædelyst og reagerede ikke over for foderændringer. Kælvningerne forløb normalt, og alle kvierne fødte levende kalve. En af kvierne nåede ikke at blive erklæret drægtig på stationen, og to kastede i sommerperioden. 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,6 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, noget uregelmæssige lysegule kvier, velformede af hoved og hals, markeret bov, middeldybt, ret velformet midtstykke, lav i ryggen, langt, hældende kryds, flere med højt halerodsparti, gennemgående ret fine, velstillede lemmer, ret stort og veludviklet yver, flere lidt uregelmæssige, middelstore, velstillede patter.

2 dyr tilkendt type Ia, 1 Ib, 10 Ib og 2 type III

Årup Vestfyns Gems, s. 3490, f. 8. februar 1963
hos Hans Knudsen, Skrallehavegård, Martofte.

Ejer: Årup Vestfyns Kvægavlsforening.

Fader: Gem's Dandy Advancer, U.S.A. s. 541866. Ff. Gem's Royal Prince, U.S.A. s. 493509. Fm. Breezy Farm Dolly, U.S.A. s. 1423802.

Moder: Nr. 58, e.s. 7588. Mf. Odds, s. 1543. Mm. Nr. 51, e.s. 7093.

Gns. af 20 døtre på Moesgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3618	6,45	233	4,20	152

Mælkeydelsen blev middelhøj, medens fedt- og proteinprocenterne blev knap middelhøje. Der var godt middelstor spredning i mælkeydelsen, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var kun jævnt tilfredsstillende. Flere af kvierne var nervøse ved påsætning og aftagning af malkemaskinen, men der opnåedes alligevel gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde en meget stor tilvækst på stationen. Alle 20 kvier gennemførte prøven, og de 19 var erklæret drægtige ved hjemsendelse. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Godt middelstore til middelstore, lysgule til brungule, en del brogede kvier, velformet af hoved og hals, markeret bov, dybt, velformet midtstykke, enkelte lidt vigende, de fleste god overlinie, velformet kryds, enkelte lidt højt korsbensparti, ret fine, velstillede lemmer, veludviklet og velbåret yver, enkelte lidt uregelmæssige, middelstore, gennemgående velstillede patter.

3 dyr tilkendt type Ia, 2 Ib, 8 IIa og 4 type IIb.

III. Trivelighedsundersøgelse med nordamerikanske, sortbrogede tyre.

Ved Ejner Nielsen, Axel Nielsen og L. Gjøl Christensen.

På initiativ af Hovedforeningen for Sortbroget Dansk Malkekvæg blev der importeret sæd af nordamerikanske tyre, og man ønskede at undersøge, om disse tyre kunne medvirke til en forbedring af lemmer og malkeorganer i det danske, sortbrogede kvæg. Der har været nogen skepsis med hensyn til de nordamerikanske, sortbrogede tyres egenskaber vedrørende kødproduktion, og det blev derfor vedtaget, at der skulle gennemføres trivelighedsundersøgelser med disse tyre. Der blev importeret sæd efter følgende fire tyre fra Canada: Glenafton Gaiety, Kayen Farm Anthony, Seiling Petro og Seiling Rockman. Desuden importeredes sæd efter to tyre fra U.S.A., Skokie Black Magic og Mooseheart Alliance. Trivelighedsunder-

Tabel 1. Skummetmælkskalve.

Nr.	Fader	g dgl. netto- tilvækst	g dgl. tilvækst	f.e. pr. kg		Station
				netto- tilvækst	tilvækst	
12	Glenafton Gaiety	708	1227	4,84	2,79	Skølvad
16	Skokie Black Magic	669	1199	5,04	2,81	Dybvad
3	Kayen Farm Anthony	620	1109	5,64	3,15	Skølvad
7	Skokie Black Magic	618	1106	5,60	3,13	Skølvad
15	Kayen Farm Anthony	612	1128	5,68	3,09	Dybvad
4	Glenafton Gaiety	610	1097	5,53	3,07	Dybvad
5	Skokie Black Magic	609	1099	5,70	3,16	Skølvad
19	Seiling Petro	608	1140	5,32	2,83	Dybvad
13	Skokie Black Magic	606	1085	5,62	3,14	Skølvad
6	Glenafton Gaiety	603	1101	5,86	3,21	Skølvad
14	Mooseheart Alliance	595	1106	5,84	3,14	Skølvad
2	Skokie Black Magic	572	995	5,95	3,42	Dybvad
20	Seiling Rockman	565	1105	5,70	2,92	Dybvad
5	Kayen Farm Anthony	565	1078	5,90	3,09	Dybvad
8	Glenafton Gaiety	559	1056	5,99	3,17	Dybvad
6	Glenafton Gaiety	556	1082	6,09	3,13	Dybvad
Gns. for 9 kalve		591	1098	5,69	3,06	Dybvad
Gns. for 7 kalve		623	1119	5,57	3,10	Skølvad
Gns. for 16 kalve		605	1107	5,63	3,08	
Gns. for 9 hold		595	1083	5,78	3,18	Egtved

søgelsen blev foretaget med 8 dyr efter 3 af tyrene, nemlig Glenafton Gaiety, Kayen Farm Anthony og Skokie Black Magic. Efter Seiling Rockman og Mooseheart Alliance blev prøverne gennemført med hver 3 dyr, medens der kun var en efter Seiling Petro.

Sidst i marts og i første halvdel af april 1967 blev der indsat kalve til trivlighedsundersøgelse efter de nævnte tyre. Kalvene blev født i foråret og derfor født for sent til at blive prøvet på stationen i Egtved, det blev derfor vedtaget, at undersøgelsen skulle foretages på afkomsprøvestationerne Dybvad og Skølvad. Forsøget er gennemført i samarbejde med *Slagte-riene Forskningsinstitut* i Roskilde. (Rapport nr. 01.282).

Der blev indsat 20 kalve på Dybvad og 14 på Skølvad. To af de indsatte kalve på Dybvad døde under prøven. Den ene brækkede halsen ved et uheld under en vejning, og den anden havde en nyrelidelse. En tredje kalv på Dybvad blev udsat under prøven, da den led alvorligt af navlebrok. Prøverne gennemførtes derved med 31 kalve, men da man ønskede, at to af ungtirene fra Dybvad skulle anvendes i avlen, kom slagte- og kødkvalitetsundersøgelserne kun til at omfatte 29 dyr. 16 blev opfodret til skummetmælkskalve og 15 til ungtyre, og for begge holds vedkommende blev fodringen gennemført efter samme foderplan, som anvendtes på Egtved.

Resultaterne for tilvækst og foderudnyttelse er anført i *tabellerne 1 og 2*.

Tabel 2. Ungtyre.

Nr.	Fader	g dgl. netto- tilvækst	g dgl. tilvækst	f.e. pr. kg		Station
				netto- tilvækst	tilvækst	
10	Mooseheart Alliance	681	1280	7,26	3,86	Skølvad
7	Seiling Rockman	—	1262	—	4,09	Dybvad
9	Kayen Farm Anthony	—	1220	—	4,23	Dybvad
2	Skokie Black Magic	658	1214	7,59	4,11	Skølvad
18	Kayen Farm Anthony	657	1207	7,58	4,12	Dybvad
14	Kayen Farm Anthony	645	1211	7,70	4,10	Dybvad
8	Kayen Farm Anthony	631	1166	7,90	4,28	Skølvad
4	Mooseheart Alliance	631	1156	8,11	4,42	Skølvad
12	Glenafton Gaiety	619	1160	7,98	4,26	Dybvad
11	Kayen Farm Anthony	619	1150	7,68	4,14	Dybvad
9	Glenafton Gaiety	606	1127	8,64	4,65	Skølvad
3	Seiling Rockman	599	1118	8,51	4,56	Dybvad
11	Skokie Black Magic	598	1093	8,72	4,77	Skølvad
13	Glenafton Gaiety	594	1107	8,34	4,48	Dybvad
1	Skokie Black Magic	582	1096	8,46	4,49	Skølvad
Gns. for 6 (8) ungtyre		622	1179	7,96	4,25	Dybvad
Gns. for 7 ungtyre		627	1162	8,10	4,37	Skølvad
Gns. for 13 (15) ungtyre		625	1171	8,04	4,30	
Gns. for 9 hold		633	1123	7,54	4,25	Egtved

Dyrene er rangeret efter den daglige nettotilvækst, som beregnes efter følgende formel:

$$\frac{\text{Vægt af den kolde slagtekrop} \div \frac{1}{2} \times \text{vægt af kalven 15 dage gammel}}{\text{Antal dage i prøven}}$$

Der opnåedes meget ensartede gennemsnitsresultater for både skummet-mælkskalve og ungtyre på stationerne Dybvad og Skølvad, og gennemsnitsresultaterne for alle dyr er sammenlignet med de opnåede gennemsnitsresultater for de sortbrogede hold i det første prøveår på Egtved.

Det ses af *tabel 1*, at der for skummetmælkskalvene er opnået fuldt så gode gennemsnitsresultater for tilvækst og foderudnyttelse som på Egtved. Af *tabel 2* fremgår det, at ungtyrene efter de nordamerikanske tyre har haft større daglig tilvækst end opnået på Egtved. Der er derimod ingen forskel i den daglige nettotilvækst, hvilket kan skyldes, at de to bedste ungtyre fra Dybvad overgik til avlen, hvorfor de ikke blev slagtet. Af den sidste kolonne fremgår det, at der ikke kan påvises forskelle i foderudnyttelsen. Når der er opnået de bedste resultater på Egtved for f. e. pr. kg nettotilvækst, skyldes det hovedsagelig, at de nævnte ungtyre ikke blev medtaget. Antallet af dyr efter de forskellige tyre er for ringe til at give en karakteristik af dem. For ungtyrene er der opnået meget fine resultater for afkommet efter Kayen Farm Anthony.

Tabel 3. Slagte- og kødkvalitetsundersøgelser.

	Nordamerikanske tyre Dybvad og Skølvad		SDM tyre Egtved	
	Skummet- mælkskalve	Ung- tyre	Skummet- mælkskalve	Ung- tyre
Levende vægt, kg	262,1	463,5	258,7	459,1
Slagteprocent	53,7	53,4	54,1	55,8
Procent kød	68,7	67,1	70,2	69,8
Procent talg	9,8	15,5	8,6	13,5
Procent knogler	19,3	17,4	19,4	16,7
Procent pistolkød	33,8	30,9	34,5	32,3
Farvetal	16,3	14,3	16,4	13,6
Konsistens	12,6	10,5	13,3	12,5
Analyser af kød:				
Procent fedt	0,80	1,32	0,69	1,33
Procent kvælstof	3,48	3,53	3,52	3,51
Procent tørstof	23,7	24,5	23,6	24,3

I *tabel 3* er anført de væsentligste resultater fra slagte- og kødkvalitetsundersøgelserne. For ungtyrene blev der opnået en højere slagteprocent for dyrene på Egtved end for afkommet efter de nordamerikanske tyre, medens

slagteprocenten lå på samme niveau for holdene med skummetmælkskalve. Dyrene fra Egtved opnåede de bedste resultater med hensyn til kødprocent og procent pistolkød, og de havde også den laveste talgprocent. Knogleprocenten var en antydning højere for ungtyrene efter de nordamerikanske tyre end for ungtyrene fra Egtved, men der var ingen forskel i knogleprocenten mellem de to hold skummetmælkskalve. Ved slagtebedømmelserne var såvel skummetmælkskalve som ungtyre efter de nordamerikanske tyre blevet bedømt fra 0,5 til 1,5 points dårligere end dyrene fra Egtved. For farvetal, konsistens, pct. fedt, pct. tørstof og pct. kvælstof fandtes kun små forskelle mellem forsøgsholdene og de opnåede resultater for de sortbrogede hold på Egtved. Antallet efter de forskellige nordamerikanske tyre er ikke så stort, at der kan drages vidtgående konklusioner om de enkelte tyres egenskaber vedrørende kødproduktionen, men det fremgår dog klart for såvel skummetmælkskalve som ungtyre, at afkommet efter Glenafton Gaiety og Skokie Black Magic har produceret meget mørt kød, medens dyrene efter Kayen Farm Anthony har fået meget dårlige konsistenskarakterer, og det samme blev konstateret ved smagsbedømmelserne.

Ved smagsbedømmelserne blev for skummetmælkskalvenes vedkommende forsøgsholdet sammenlignet med hold 1 fra fodringsforsøget Ka. 184, medens ungtyrenes kontrolhold blev 12 tilfældigt udtagne tyre fra Egtved. For egenskaberne farve og egensmag blev afkommet efter de nordamerikanske tyre bedømt signifikant bedre end kontrolholdet.

Forsøget har vist, at der er god tilvækstevne i afkommet efter de nordamerikanske tyre og specielt for ungtyrenes vedkommende, men slagteprocent, kødprocent og procent pistolkød var lavere end de opnåede gennemsnitsresultater for de sortbrogede hold på Egtved. Med undtagelse af Kayen Farm Anthony, der har dårlige anlæg vedrørende kødets konsistens, har de afprøvede nordamerikanske tyre haft gode egenskaber med hensyn til kød-kvaliteten. Ved smagsbedømmelserne opnåede afkommet efter de nordamerikanske tyre bedre resultater end kontrolholdet.

IV. Sammendrag.

I prøveåret 1967-68 afprøvedes 70 hold på 24 stationer. Kvierne blev i vinterperioden fodret efter foderplanen, som er anført i *tabel 7*. Fodringen i sommerperioden gennemførtes efter foderplanen, der er anført i *tabel 9*. Ved prøveårets begyndelse var reglerne for afkomsprøverne blevet ændret, således at der ikke længere foretoges eftermalkning med hånd på afkomsprøvestationerne.

Gennemsnitsydelsen for de enkelte racer blev følgende:

Race	Antal hold	Antal kvier	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Prot. %	Mælkepr. kg
RDM	32	584	5098	4,52	230,42	259	3,77	192
SDM	23	422	4959	4,36	216,41	243	3,65	181
Jerseyrace	15	282	3821	6,58	251,47	286	4,26	163
Alle hold .	70	1288	4779	4,82	230,33	259	3,81	182

Den gennemsnitlige smørfedtydelse blev 230 kg, og det er 1 kg mere end i 1966-67. Jerseyholdene opnåede den højeste gennemsnitlige smørfedtydelse, og alle Jerseyholdene opnåede fine eller gode ydelsesresultater. Rød Dansk Malke race opnåede som sædvanlig den højeste gennemsnitlige ydelse af mælkeprotein.

Det højestydende hold inden for hver af racerne opnåede følgende ydelse:

Race	Tyrens navn	Antal kvier	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Prot. %	Mælkepr. kg
RDM	Holbæk Morskær	18	6306	4,50	283,61	319	3,75	236
SDM	Skive Bert	18	5876	4,42	259,58	292	3,66	215
Jerseyrace	Horsens Frank	19	4022	6,81	274,09	312	4,26	171

Holdet efter Holbæk Morskær nåede en gennemsnitsydelse på 284 kg smørfedt, og det er en høj gennemsnitsydelse for 1. kalvs kvier i 304 dage.

De enkelte holds gennemsnitsresultater er anført i *tabel 1*, og i hovedtabellerne findes oplysning om ydelse, foderforbrug og malkbarhed for de enkelte kvier. Udholdenheden i ydelsen for de enkelte hold er anført i *tabel 10*, og i *tabel 12* er holdene anført efter spredningen i smørfedtydelsen inden for hver af racerne.

Der blev ikke eftermalket med hånd, men ellers gennemførtes malkbarhedsundersøgelsen efter de sædvanlige retningslinier. Malkbarhedstallet er udregnet efter følgende formler:

RDM:	kg mælk pr. minut	$\div 0,081$	(kg mælk daglig $\div 16,0$)
SDM:	kg mælk pr. minut	$\div 0,081$	(kg mælk daglig $\div 16,0$)
Jerseyrace:	kg mælk pr. minut	$\div 0,068$	(kg mælk daglig $\div 12,0$)

Der opnåedes følgende gennemsnitsresultater for racerne:

Race	kg mælk pr. minut	Malkbar- hedstal	% af mælken i de første 3 minutter	Malketid i min. gns. pr. kvie pr. malkning
RDM	2,01	1,85	73,5	4,8
SDM	2,21	2,13	81,3	4,1
Jerseyrace	1,78	1,70	83,2	3,9

Malkbarhedsresultaterne var som helhed bedst for holdene af Sortbroget Dansk Malkerace og Jerseyracen.

Der er foretaget afkomsprøver med tyrekalve og ungtyre efter nordamerikanske, sortbrogede tyre på afkomsprøvestationerne Dybvad og Skølvad. Prøverne omfattede 16 skummetmælkskalve og 15 ungtyre, men da to ungtyre overgik til avlen, kom slagteresultaterne kun til at omfatte 13 ungtyre. Fædrene var 2 tyre fra USA og 4 fra Canada, medens mødrene var sortbrogede, danske køer. Der opnåedes følgende hovedresultater:

	Antal dyr	Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst	Slagte- procent	Kød- pro- cent	Procent pistol- kød
Skummetmælkskalve	16	1107	3,08	53,7	68,7	33,8
Ungtyre	15(13)	1171	4,30	53,4	67,1	30,9

Den daglige tilvækst og foderudnyttelsen var særdeles god. Skummetmælkskalvenes slagteprocent var tilfredsstillende, medens den var under middel for ungtyrene. Kødtypene og procent pistolkød blev lidt lavere end for dyr af Sortbroget Dansk Malkerace. Med undtagelse af Kayen Farm Anthony, der har dårlige anlæg vedrørende kødets konsistens, har de afprøvede nordamerikanske tyre haft gode egenskaber med hensyn til kødkvaliteten. Ved smagsbedømmelserne opnåede afkommet efter de nordamerikanske tyre særdeles gode resultater.

V. Summary.

During the testing year 1967-68, 70 sire progeny groups were tested at 24 stations. In the winter period the cows were rationed according to the feeding plan in Table 7 while the plan in Table 9 was used during the summer period. The rules for the stations were amended at the beginning of the testing year so that hand stripping was no longer used after the machine milking.

The average performance of the individual breeds was as follows:

Breed	No. of Groups	No. of Cows	Milk Yield kg	Fat %	Butterfat Yield kg	Protein %	Protein Yield kg
RDM	32	584	5098	4.52	230.42	3.77	192
SDM	23	422	4959	4.36	216.41	3.65	181
Jersey	15	282	3821	6.58	251.47	4.26	163
Total	70	1288	4779	4.82	230.33	3.81	182

At 230 kg, the average butterfat yield was 1 kg greater than in 1966-67. The Jerseys achieved the highest average butterfat yield and all Jersey groups had fine or good productions. RDM had, as in previous years, the highest yield of milk protein.

The highest yielding groups of each breed gave the following yields:

Breed	Name of bull	No. of Cows	Milk Yield kg	Fat %	B. F. Yield kg	Protein %	Protein Yield kg
RDM:	Holbæk Morskær	18	6306	4.50	283.61	3.75	236
SDM:	Skive Bert	18	5876	4.42	259.58	3.66	215
Jersey:	Horsens Frank	19	4022	6.81	274.09	4.26	171

The group by Holbæk Morskær averaged 284 kg butterfat which is a high 304-day average for 1st-calf cows.

The average yields of individual groups are given in Table 1 and the yield, food consumption, and corrected rate of milking of individual cows in the group tables. Yield persistency of individual groups is given in Table 10 and standard deviation of daughter yields in each group in Table 12.

With exception of no stripping by hand, the investigation of milking ability was carried out in the usual manner. The corrected milking rates were calculated as follows:

RDM:	kg milk per min. - 0.081 (kg daily milk yield - 16.0)
SDM:	kg milk per min. - 0.081 (kg daily milk yield - 16.0)
Jersey:	kg milk per min. - 0.068 (kg daily milk yield - 12.0)

The following average results were obtained for the three breeds:

Breed	kg milk per minute	Corrected milking rate	% milk in the first 3 min.	Milking time in min. av. per cow per milking
RDM	2.01	1.85	73.5	4.8
SDM	2.21	2.13	81.3	4.1
Jersey	1.78	1.70	83.2	3.9

On the whole, SDM and Jersey cows were easiest to milk.

A progeny testing of bull calves and young bulls, sons of Friesian bulls from USA and Canada, was carried out at the progeny testing stations Dybvad and Skølvad. The test comprised 16 bull calves and 15 young bulls, but as two of the young bulls were too good to be slaughtered, the investigations for carcass quality only included 13 young bulls. The sires were two bulls from USA and four from Canada while the dams were cows of Black and White Danish Milk breed. The following results were obtained:

No. of Animals	Weight at Slaughter kg	Daily Liveweight Gain g	Feed Units per kg Liveweight Gain	Dressing %	Meat %	% Lean in Pistolcut
Bull calves 16	262.1	1107	3.08	53.7	68.7	33.8
Young bulls 15 (13)	463.5	1171	4.30	53.4	67.1	30.9

The daily liveweight gain and food conversion were very good. The dressing percentage was satisfactory for the bull calves but was a little too low for the young bulls. The meat percentage and percent of lean in pistolcut were not so high as usually in animals of SDM. The offspring of Kayen Farm Anthony was poor in meat consistency while the sons of the other bulls tested were very good as to the quality of meat. Very fine results were obtained in the investigation of flavour of meat from the carcasses of animals in this test.

VI.
HOVEDTABELLER

Hovedtabel 1. Afkomsprøve for tyren Holbæk Morske

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvile nr.	Født	Kælvn.- dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Foder- dage	Kraft- foder f. e.	I a f. e.
14	17- 5-65	23- 9	859	521	7592	4,97	377,07	425	3,83	290	308	308	2582	49
13	26- 3-65	27- 9	915	548	7189	4,62	331,92	373	3,81	274	304	304	2225	45
11	6- 3-65	24- 9	932	503	7353	4,42	324,79	365	3,51	258	307	307	2247	45
16	3- 3-65	25- 9	936	500	7194	4,32	311,00	349	3,70	266	306	306	2168	44
9	26- 2-65	28- 9	944	535	6611	4,69	309,87	349	3,82	252	303	303	2074	43
2	12- 1-65	30- 8	960	575	6697	4,57	306,35	345	3,85	258	332	332	2047	45
7	13- 2-65	8- 9	937	580	6651	4,42	293,86	330	3,79	252	323	323	1964	43
1	31- 5-65	31-10	883	613	6168	4,68	288,91	325	3,71	229	270	270	1902	40
6	17- 1-65	1-10	987	568	6308	4,54	286,08	322	3,94	248	300	300	1910	42
15	12- 2-65	15- 9	945	546	5617	5,04	283,04	319	3,89	219	296	316	1908	43
41	14- 3-65	7- 9	907	557	5585	4,70	262,64	296	4,05	226	324	324	1625	42
18	4- 3-65	27- 9	937	486	5743	4,54	260,56	293	3,63	209	304	304	1656	40
3	8- 3-65	23- 8	898	598	5458	4,65	253,82	286	3,79	207	339	339	1513	41
20	28- 2-65	4-11	979	500	7295	3,45	251,94	280	3,52	257	266	266	1969	38
8	14- 4-65	1- 9	870	512	5602	4,47	250,15	281	3,67	206	330	330	1539	39
5	18- 5-65	30- 9	865	655	5106	4,71	240,62	271	4,00	204	301	301	1438	36
10	18- 3-65	22-10	948	526	5546	4,31	238,99	268	3,49	194	279	279	1550	36
17	25- 3-65	7-11	957	501	5784	4,03	233,30	261	3,54	205	263	263	1587	35
Gns. af 18 kvier			926	546	6306	4,50	283,61	319	3,75	236	303	304	1884	41

1 Trepattet efter yverbetændelse.

Hovedtabel 2. Afkomsprøve for tyren Djurs Bjerg

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvile nr.	Født	Kælvn.- dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Foder- dage	Kraft- foder f. e.	I a f. e.
49	23- 3-65	13-10	934	491	7730	4,61	356,70	401	3,54	274	287	287	2701	457
45	9- 7-65	6-10	819	481	5939	4,97	294,93	333	3,74	222	294	294	2036	398
38	22- 3-65	6- 9	898	546	5774	5,09	293,74	331	3,48	201	324	324	1929	402
50	10- 7-65	18- 9	800	544	6242	4,67	291,23	328	3,71	232	312	312	2052	420
32	5- 1-65	30- 9	998	504	6423	4,52	290,25	326	3,63	233	300	300	2096	409
37	9- 2-65	24- 9	957	577	5924	4,73	280,31	316	3,61	214	306	306	1946	401
33	22-10-65	15- 9	693	530	5852	4,73	276,74	312	3,82	223	315	315	1877	402
40	1- 4-65	1- 9	883	511	5474	5,04	275,69	311	3,95	216	329	329	1874	402
31	30- 7-65	1-10	793	544	5911	4,60	272,15	306	3,52	208	299	299	1867	386
48	6-12-64	1-10	1029	517	5907	4,58	270,51	304	3,70	218	299	299	1869	388
36	1- 3-65	21- 8	903	529	5657	4,74	267,91	302	3,75	212	340	340	1771	412
39	20- 1-65	30- 9	983	585	5341	4,94	264,03	298	3,81	203	300	300	1754	367
34	16- 7-65	3-10	809	562	5873	4,45	261,58	294	3,50	206	297	297	1804	375
43	16- 7-65	24-10	830	479	5759	4,48	257,72	290	3,39	195	276	276	1810	375
47	25- 9-65	17- 9	722	502	5325	4,71	250,76	282	3,53	188	313	313	1640	381
46	28- 9-65	3-11	766	502	5068	4,93	250,10	282	3,67	186	266	266	1672	346
35	14- 8-65	6- 9	753	565	5089	4,63	235,65	265	3,49	178	324	324	1566	368
41	10- 8-65	11-10	792	490	4916	4,59	225,88	254	3,82	188	289	289	1544	350
Gns. af 18 kvier			853	526	5789	4,72	273,10	307	3,64	211	304	304	1878	391

1 Højre bagpatte blokket op.

8672, på Torntofte.

ke- Malk- 1 bar- in. hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
9 1,89	17- 2	51	Holbæk Bure, s. 28116	Børge Olsen, Stadslunde.
8 1,44	15- 1	36	Holbæk Ægil, s. 4787	Jens Chr. Jensen, Veddinge.
4 1,01	27- 3	14	Holbæk Trym, e.B 4935	Aage Rasmussen, Hørlykke.
8 1,97	12- 2	52	Hjalte, s. 4828	Leif Jørgensen, Vig.
2 1,67	5- 2	40	Zar, s. 4160	Egon Hansen, Kastholm, Lejre.
3 2,06	16- 2	87	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Morten Sørensen, Tingerup.
2 1,61	16- 2	57	Horsens Leif, e.A 5010	Karen Andersen, Hønsinge.
3 1,26	26- 2	72	Holbæk Oddgeir, e.B 4931	Jens Ove Pedersen, Mårsø.
3 1,26	23-12	40	Hjalte, s. 4828	Karen Andersen, Hønsinge.
8 1,80	2-12	51	Holbæk Ægil, s. 4787	Kr. Ove Hansen, Marke.
8 2,21	8- 1	69	Holbæk Ægil, s. 4787	Aage Chr. Nielsen, Sønderstrup.
4 1,25	19-12	29	Hjalte, s. 4828	P. Kargaard Jensen, Snertinge.
4 1,48	15- 2	57	Holbæk Kørvind, s. 4729	Aage Chr. Nielsen, Sønderstrup.
0 1,93	22- 6	5	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Erik Svane, Mårup.
2 1,95	—	111	Nr. 45, f. 21-7-60	Harry Nielsen, Kastrup.
3 1,27	18- 3	21	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Alfred Nielsen, Butterup.
8 1,42	25- 4	19	Holbæk Okke, s. 4723	Brdr. Hansen, Tingtved.
3 3,10	30- 1	88	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Svend Mortensen, Udby.
3 1,70				

Byld i børen.

8748, på Kalø.

ke- Malk- d bar- in. hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
1 1,81	7- 3	32	Djurs Sex, r. 26888	Jørgen Thrane, Gjerrild.
0 2,25	31- 1	30	Djurs Gert, s. 4858	Harald Møller, Voldby Mark.
6 2,36	—	19	Pil, s. 4420	Peter Sloth, Stenvad Hede.
5 1,96	20- 1	1	Djurs Vinkel, r. 27666	Karl Nielsen, Tvedhuse.
5 2,68	28- 3	70	Djurs El, r. 26890	Bent Svane, Kni, Ørum.
5 1,49	16- 3	45	Djurs Wahl, s. 28311	Ole Givskov, Kirial.
2 2,06	18-12	31	ukendt	Herluf Jørgensen, Skærvad.
4 2,47	14- 2	7	Djurs Gert, s. 4858	Søren Udsen, Voldby.
3 0,87	3- 6 ¹	39	Randers Frøy, r. 27859	Evald Nielsen, Glæsborg.
4 1,98	1- 2	44	Djurs Frøy, r. 27972	Jørgen Thrane, Gjerrild.
8 2,97	16-12	15	Djurs Gert, s. 4858	Helge Lassen, Gjerrild.
0 2,09	19- 1	29	Djurs Gert, s. 4858	N. E. Pallesen, Balle.
6 1,46	4- 5	97	Djurs Jakob, r. 27641	M. Sørensen, Skindbjerg.
2 2,07	3- 2	97	Djurs Jakob, r. 27641	M. Sørensen, Skindbjerg.
4 2,46	16- 1	26	Djurs Ejler, s. 28312	Laus Jensen, Overbroen, Ørum.
4 1,55	8- 4	40	Djurs Gert, s. 4858	Rasmus Laursen, Enslev.
7 1,73	1-12	61	Djurs El, r. 26890	Robert Sloth, Sødal, Ålsrode.
3 2,26	1- 4	17	Djurs Jakob, r. 27641	Ejner Kjær, Allelev.
4 2,03				

Kastet 5-5 efter ins. 18-12.

Hovedtabel 3. Afkomsprøve for tyren Langelands Gut,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i maris kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-teinn %	Mælke-prot. kg	Mælke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
31	19-1-65	26-8	949	531	7618	4,94	376,01	424	3,69	281	327	327	2572	4854
43	20-8-65	20-9	761	542	6428	4,84	311,00	350	3,72	239	302	302	2155	4296
36	5-1-65	31-8	968	553	6598	4,42	291,86	328	3,65	241	322	322	2015	4275
49	8-3-65	21-10	957	560	6872	4,24	291,12	327	3,63	249	271	271	2143	4012
35	21-12-64	28-8	980	557	6232	4,48	279,09	314	3,76	234	321	321	1873	4077
46	5-4-65	11-10	919	509	6341	4,39	278,15	312	3,60	228	281	281	1967	3933
44	4-3-65	18-9	928	542	5110	5,40	276,07	312	4,01	205	304	304	1706	3817
41	10-2-65	18-9	950	541	5367	5,13	275,21	311	3,69	198	304	304	1748	3935
51	18-1-65	21-9	976	572	5580	4,78	266,99	301	3,73	208	301	301	1735	3762
50 ¹	11-2-65	16-10	977	577	5531	4,76	263,01	296	3,82	211	276	276	1755	3638
39	28-2-65	12-9	926	531	5513	4,49	247,29	278	3,66	202	310	310	1594	3616
48	7-8-65	7-10	791	515	5692	4,34	246,98	277	3,61	205	285	285	1671	3708
38	28-3-65	2-9	888	567	5333	4,60	245,55	276	3,69	197	320	320	1523	3851
37	4-6-65	1-9	819	473	5845	4,18	244,33	274	3,61	211	321	321	1612	3911
32	30-3-65	25-8	878	572	4775	5,10	243,67	275	4,01	191	328	328	1430	3695
47	22-11-65	29-9	676	489	4824	4,61	222,15	250	3,76	182	293	293	1381	3416
45	21-3-65	8-10	931	572	4150	4,67	193,91	218	3,75	156	284	284	1117	3046
34	19-1-65	1-9	955	589	3683	5,01	184,63	208	3,92	144	321	321	1001	3240
Gns. af 18 kvier			902	544	5638	4,67	263,17	296	3,73	210	304	304	1722	3838

¹ Trepattet fra kælvning.

Hovedtabel 4. Afkomsprøve for tyren Ålborg Nor,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i maris kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-teinn %	Mælke-prot. kg	Mælke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
5	10-10-64	27-9	1082	613	7150	4,78	341,81	385	3,78	270	313	313	2200	4539
2	11-12-64	23-9	1016	613	7165	4,50	322,14	362	3,73	267	317	317	2059	4353
4	9-11-64	29-9	1054	639	6517	4,73	308,06	347	3,88	253	311	311	1954	4311
3 ¹	29-11-64	17-10	1052	696	6662	4,61	306,88	345	3,80	253	293	293	1944	4180
19	22-3-65	7-9	899	575	7488	3,99	299,04	335	3,50	262	333	333	1963	4432
15	30-10-64	19-10	1084	549	7062	3,97	280,06	313	3,46	244	291	291	1873	4129
11	27-12-64	29-10	1036	611	5927	4,28	253,45	284	3,80	225	281	281	1540	3576
14	8-3-65	7-10	943	563	5871	4,25	249,64	280	3,55	208	303	303	1456	3635
20	8-10-65	29-10	751	500	5920	4,19	248,19	278	3,47	206	281	281	1487	3556
8	6-2-65	29-9	965	623	5368	4,55	244,01	274	3,73	200	311	311	1426	3858
16	14-2-65	31-10	989	556	6343	3,75	237,65	265	3,41	216	279	279	1558	3630
7 ²	11-3-65	20-9	923	570	4587	5,16	236,49	267	3,85	177	320	320	1155	3417
6	15-3-65	2-10	931	615	6052	3,91	236,42	264	3,69	223	308	308	1434	3793
13	14-10-64	15-9	1066	572	5531	4,23	234,05	263	3,80	210	324	324	1284	3710
9	31-3-65	24-9	907	648	5068	4,50	228,26	257	3,72	188	316	316	1278	3636
17	22-1-65	29-10	1010	578	4999	4,35	217,40	244	3,84	192	281	281	1161	3279
18	12-12-64	11-10	1033	558	3839	4,37	167,88	189	3,76	144	299	299	730	2926
Gns. af 17 kvier			985	593	5973	4,34	259,50	291	3,68	220	304	304	1559	3821

¹ Beskadiget ringmusklen i venstre forpatte efter pattetråd.² Trepattet efter yverbetændelse før kælvning.

582, på Bellinge.

Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
1,39	19-12	80	Cato Langeland, s. 4530	Helmer Hansen, Tressebølle.
1,82	25-11	24	Odd 88, r. 25779	Helge Kruse, Bønneløkke.
1,68	16-12	54	Nr. 5, Eg, f. 11-10-58	Poul F. Hansen, Søndebro.
0,69	23- 3	55	No Langeland, e.A 4916	Egon Madsen, Fodsløtte.
1,48	20-11	44	Langelands Eg, r. 26712	Jens Chr. Groth, Dunkær.
1,95	27- 4	17	John Langeland, s. 4763	Henrik Guldborg, Vesterby.
2,35	4-12	50	Langelands Dax, r. 26711	Poul F. Hansen, Søndebro.
1,38	11-12	13	Rex Langeland, r. 26081	Karl Aage Jensen, Kassebølle.
1,73	23- 1	64	John Langeland, s. 4763	Poul F. Hansen, Søndebro.
1,33	21- 3	32	Nr. 42, John, f. 10-12-58	P. R. S. Christensen, Dunkær.
1,60	5- 2	16	Højter Langeland, s. 4704	Astrid Navne, Simmerbølle.
0,96	20- 1	48	Langelands Eg, r. 26712	Bernhardt Nielsen, Botofte.
1,45	30-11	36	Rex Langeland, r. 26081	Peter Jensen, Humble.
1,53	15- 1	28	John Langeland, s. 4763	Jørgen Madsen, Vindeby.
1,83	21- 5	24	ukendt	Ejnar Rasmussen, Stryng.
1,59	18-12	12	Rudme Ideal, e.A 4864	Niels P. Nielsen, Snaremoose.
1,09	29- 2	87	John Langeland, s. 4763	H. Nygaard Pedersen, Vindeballes.
1,13	4-12	89	Langelands Eg, r. 26712	Poul M. Petersen, Haugbølle.

1,50

374, på Lundgård.

Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
1,86	4- 1	69	Ålborg Bitz, e.A 4892	Gregers Winther, Sdr. Tranders.
1,26	21-12 ¹	165	Ålborg Bitz, e.A 4892	I. Th. Bastholm, Kjeldingbro.
2,14	8- 6 ²	95	Ålborg Bitz, e.A 4892	Ole Mouritzen, Oue.
1,33	17- 1	80	Ålborg Golf, r. 26505	Herman Sveistrup, Oue.
1,99	—	108	Ålborg Golf, r. 26505	Jens Vittrup, Støvring.
2,25	8- 2	20	Ålborg Bitz, e.A 4892	Evald Christensen, Kongerslev.
1,53	6- 6	19	Ålborg Bitz, e.A 4892	Chr. Lauersen, Bælum.
2,59	4- 1	138	Ålborg Jess, e.A 4938	Gunnar Christiansen, Bratbjerg.
1,71	8- 3	49	Ålborg Bitz, e.A 4892	Niels Aage Jensen, Ulsted.
1,51	11- 1 ³	53	Ålborg Park, r. 27137	Svend Hald, Veddum.
1,52	19- 1	136	Ålborg Ørn, s. 4851	Per Nørgaard, Vognsild.
2,07	12-12	—	ukendt	Chr. Nielsen, Gjøl.
1,62	2- 2	3	Ålborg Golf, r. 26505	Chr. Lauersen, Bælum.
2,36	5-12	34	Ålborg Bitz, e.A 4892	Poul Sørensen, Hals.
1,76	13-12	37	Ålborg Bitz, e.A 4892	Chr. J. Christensen, Terndrup.
1,22	—	72	ukendt	Johs. Starcke, Sulsted.
1,60	13- 2	12	Ålborg Ås, r. 26504	Evald Christensen, Kongerslev.

1,78

Kastet 28-4.

Kastet i maj efter ins. 26-2.

Kastet 20-6.

Hovedtabel 5. Afkomsprøve for tyren Hammel Ide

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I a f. e.
64	21- 1-65	19-10	1001	551	6165	5,17	318,43	360	3,82	235	289	289	2220	403
62	21- 5-65	14- 9	846	534	6294	5,01	315,44	356	3,83	241	324	324	2147	433
80	12- 3-65	24- 8	895	506	6650	4,61	306,50	345	3,66	244	345	345	2150	434
77	1- 5-65	20- 9	872	458	6616	4,58	303,30	341	3,83	253	318	318	2269	422
66	17- 6-65	8-10	843	517	5865	4,93	289,39	326	3,80	223	300	300	2018	383
74	15- 1-65	9-10	997	512	6116	4,68	286,47	322	3,63	222	299	299	2019	399
72	16- 7-65	16- 9	792	496	5748	4,86	279,48	315	3,90	224	322	322	1896	368
63	10-12-64	12-10	1036	576	5512	4,75	261,77	295	3,90	215	296	296	1850	369
71	18- 1-65	7-10	992	541	5516	4,67	257,83	290	3,79	209	301	301	1774	352
76	18- 4-65	1-10	896	492	5409	4,53	244,90	275	3,70	200	307	307	1783	384
68	10- 3-65	4-10	938	556	5238	4,67	244,71	275	3,84	201	304	304	1622	343
73 ¹	9- 5-65	2-10	876	521	5811	4,13	239,88	269	3,57	207	306	306	1702	365
78	7- 3-65	16-10	953	477	5050	4,70	237,48	267	3,80	192	292	292	1593	346
79	11- 6-65	30-10	871	450	4889	4,84	236,72	267	3,53	173	278	278	1608	336
67	25- 1-65	2- 9	950	521	5222	4,42	230,74	259	3,78	197	336	336	1608	369
65	19- 7-65	12-10	815	546	4322	5,21	225,33	254	4,06	176	296	296	1460	333
75	13- 1-65	30- 9	990	527	4623	4,86	224,74	253	3,84	177	308	308	1415	333
70	30- 6-65	14-10	836	512	4376	4,69	205,40	231	4,03	176	294	294	1313	319
69	3- 1-65	22-11	1053	546	3693	4,67	172,57	194	3,90	144	255	255	1110	278
Gns. af 19 kvier			919	518	5427	4,73	256,90	289	3,79	206	304	304	1766	367

¹ Trepatlet.

Hovedtabel 6. Afkomsprøve for tyren Hau Nøddek

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I a f. e.
3	16- 9-64	20-10	1129	561	7984	4,19	334,64	375	3,45	275	300	300	2216	468
9	25- 2-65	28- 8	914	526	8170	4,09	334,18	374	3,46	283	349	349	2215	493
2	17- 8-65	9- 9	753	572	7592	4,12	312,51	350	3,64	276	341	341	1993	482
16	26- 2-65	25-10	971	536	7345	4,00	294,06	329	3,56	261	295	295	1899	424
15	11- 2-65	15-11	1007	510	6427	4,48	287,90	324	3,88	249	274	274	1819	406
20	1- 4-65	15-10	927	549	6674	4,26	284,55	319	3,71	248	305	305	1811	436
7	26- 5-65	23- 9	850	620	6057	4,43	268,03	301	3,85	233	327	327	1578	430
14	20- 3-65	10- 9	904	518	5751	4,43	254,68	286	3,90	224	329	329	1512	423
13	25- 3-65	26-10	945	540	5760	4,32	249,10	280	3,84	221	294	294	1482	400
5	3- 3-65	25- 9	936	560	5882	4,22	248,42	279	3,58	210	300	300	1500	393
4	21- 3-65	2- 9	895	665	5576	4,33	241,48	271	3,78	211	348	348	1299	408
19	25- 1-65	9-11	1018	552	6111	3,90	238,30	266	3,58	219	280	280	1491	370
1 ¹	28-12-64	12- 9	988	631	4820	4,78	230,23	259	4,00	193	320	320	1238	388
11	23- 1-65	26-10	1006	500	5071	4,48	227,39	256	3,84	195	294	294	1232	361
8	30- 1-65	28-10	1001	505	4997	4,53	226,60	255	3,73	186	292	292	1260	370
12	30- 5-65	21-11	905	581	5221	4,34	226,52	254	3,69	193	268	268	1337	356
17	24- 1-65	16-11	1026	509	5479	3,99	218,39	244	3,71	204	273	273	1365	360
6	5- 3-65	25-10	964	554	4788	4,55	217,63	245	3,92	188	295	295	1156	357
10	2- 4-65	11-10	922	635	4340	4,30	186,47	209	3,65	159	298	298	913	336
Gns. af 19 kvier			951	559	6002	4,28	256,90	288	3,71	223	304	304	1543	403

¹ Alle patter stukket op.

28321, på Kalø.

Alke- id n. in.	Malk- bar- n. in.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
8	2,39	23- 4	41	Hammel Ejlekær, e.A 5036	Robert Andersen, Lading.
1	1,66	5-12	42	Lokesønnen, s. 4843	P. M. Sønderriis, Tjærbæk.
1	2,88	12- 1	53	Nør, r. 26227	Knud Aage Jensen, Sall.
7	1,47	7- 2	84	ukendt	Erik Andersen, Hammel.
8	2,34	4- 3	106	Hammel Kær, r. 27874	Jens Ove Krogh, Sorring.
8	1,81	5- 2	54	Lokesønnen, s. 4843	Anhardt Mikkelsen, Houlbjerg.
6	1,85	1- 4	8	Lokesønnen, s. 4843	Jens Thomsen, Haxholm Mark.
9	1,37	10- 1	2	Hammel No, r. 26796	Søren Petersen, Ellerup.
1	1,36	13- 1	24	Hammel Ejlekær, e.A 5036	Svend Jakobsen, Skjoldlev.
8	2,34	7-12	87	ukendt	Børge Clausen, Skivholme.
6	1,83	11-12	38	Strøm, r. 26226	Jens J. Jensen, Houlbjerg.
5	1,97	5- 3	55	Hammel Ejlekær, e.A 5036	Aksel Petersen, Toustrup.
9	1,38	25- 4	70	Hammel Ejlekær, e.A 5036	M. Westergaard, Skivholme.
2	2,85	8- 6	80	ukendt	Jens Høgh, Låsby.
5	2,43	21-12	93	Hammel Falk, r. 27424	Lauge Nielsen, Farre, Sporup.
0	2,63	13- 6	101	Lokesønnen, s. 4843	Jens Ove Krogh, Sorring.
3	1,53	3- 5	6	Bus, s. 4849	Henning Damgaard, Odder.
8	1,37	26- 1	38	Strøm, r. 26226	P. M. Sønderriis, Tjærbæk.
3	1,31	23- 4	52	Ejlekær, s. 4416	J. Vig, Tandholm.
7	1,94				

28469, på Sydsjælland.

Alke- id n. in.	Malk- bar- n. in.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2	0,98	30- 4	59	Guldbj. Rode Nøddekær, s. 4611	Jørgen Hansen, Sallerup.
9	1,38	16-12	76	Bak Nøddekær, s. 4837	Holger Petersen, Munkeskov.
6	1,19	22-12	68	Alf Øst, s. 4668	Verner Ebbesen, Ølsemagle.
6	1,14	14- 3	5	Dan Nøddekær, r. 25839	Anders Larsen, Hammer.
3	0,77	30- 3	26	Samsø Rislev, s. 4860	Jens Tjener, Lidemark.
2	1,29	11- 3	23	Ull Nøddekær, s. 4607	Gottfred Lorentsen, Bækkeskov.
6	1,85	26-12	62	Karl Nøddekær, e.A 4874	Harald Olsen, Rødstofte.
5	1,94	5-12	79	Stevns Ry, e.A 5028	Aksel Andersen, Levetofte.
2	1,05	26-12	19	Nr. 5	Karen M. Lorentsen, Ladby.
1	1,66	25-11	283	Ull Nøddekær, s. 4607	Oremandsgård, Mern.
0	1,14	6- 4	57	Guldbj. Rode Nøddekær, s. 4611	Sigurd Nielsen, Svinø.
2	0,61	4- 3	63	Haslev Golf, r. 26811	K. H. Birch, Skuderløse.
3	1,53	1-12	59	Bak Nøddekær, s. 4837	Harald Olsen, Rødstofte.
4	1,05	11- 3	122	Nimbus, s. 4825	K. Iuel, Petersgård, Langebæk.
5	1,03	22- 2	12	Rolf Nøddekær, r. 26930	Poul Petersen, Svinø.
2	0,86	5- 4	263	Nør Nøddekær, r. 25202	Oremandsgård, Mern.
6	0,56	—	8	Samsø Rislev, s. 4860	Arne Rasmussen, Børsted.
0	1,14	26-12	77	Ris Næstved, s. 4598	Ejner J. Boye, Hyllinge.
4	1,79	11-12	85	Bak Nøddekær, s. 4837	E. Skovgaard Hansen, Sandvig.
8	1,21				

Hovedtabel 7. Afkomsprøve for tyren Nordfyns Urba

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I a f. e.
77	24-8-65	30-9	767	540	6987	4,91	342,91	387	3,63	254	303	303	2543	44
64	21-2-65	9-10	960	568	6992	4,72	329,92	371	3,62	253	294	294	2450	44
61	30-12-64	21-8	964	565	5643	5,12	288,85	326	4,02	227	335	335	1958	42
68	22-8-65	2-11	802	536	6153	4,64	285,41	321	3,57	220	270	270	2138	40
65	28-2-65	30-8	913	526	6078	4,67	283,58	319	3,75	228	334	334	1985	40
76	3-1-65	15-10	1015	535	5795	4,82	279,10	314	3,93	228	288	288	2027	38
72	7-3-65	5-9	912	555	6281	4,33	271,76	305	3,45	217	328	328	1964	41
66	21-2-65	31-8	921	650	5770	4,68	269,85	304	3,64	210	318	318	1879	38
62	30-3-65	30-8	883	645	5532	4,59	253,73	285	3,72	206	334	334	1717	38
74	26-3-65	13-9	901	520	5564	4,53	252,05	283	3,72	207	320	320	1743	37
67	15-4-65	30-9	898	560	5413	4,64	251,08	283	3,75	203	303	303	1765	37
75	17-9-65	30-8	712	557	5100	4,75	242,06	273	3,57	182	334	334	1585	38
71	23-2-65	20-10	969	524	5666	4,09	231,97	260	3,81	216	283	283	1764	38
69	8-3-65	31-10	967	485	4978	4,64	231,21	260	3,58	178	272	272	1678	37
70	27-5-65	1-11	888	540	4839	4,60	222,75	251	3,73	180	271	271	1592	34
80	7-9-65	1-10	754	505	4702	4,65	218,82	246	3,70	174	302	302	1492	32
63	5-3-65	5-11	975	582	5062	4,20	212,55	238	3,39	172	267	267	1520	34
78	26-1-65	30-9	977	540	4815	4,38	210,80	237	3,85	185	303	303	1441	33
81	21-9-65	12-10	751	536	4138	4,54	188,06	211	3,69	152	291	291	1245	31
73	31-12-64	11-9	984	580	3803	4,84	184,06	207	4,04	154	322	322	1132	32
Gns. af 20 kvier			896	552	5466	4,62	252,53	284	3,70	202	304	304	1781	37

Hovedtabel 8. Afkomsprøve for tyren Haslev Ide

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I a f. e.
34	19-8-64	13-9	1120	490	7709	4,16	320,91	360	3,46	267	337	337	2568	50
32	3-11-64	13-11	1105	578	5892	4,88	287,67	324	3,86	228	276	276	1828	39
47	5-4-65	23-10	931	511	6280	4,57	287,27	323	3,75	236	297	297	1862	41
31	15-5-65	13-11	912	526	6756	4,16	281,06	315	3,50	237	276	276	2126	42
50	21-9-65	6-10	745	485	6770	4,04	273,32	306	3,57	242	314	314	1839	43
49	12-8-65	12-11	822	521	6025	4,50	271,30	305	3,50	211	277	277	1731	37
41	14-2-65	29-8	926	490	5367	4,84	259,64	293	4,03	216	341	341	1887	45
33 ¹	29-9-64	31-8	1066	597	5619	4,48	251,89	283	3,77	212	350	350	1446	40
42	28-5-65	22-10	877	510	6195	4,06	251,38	281	3,30	204	298	298	1759	39
39	22-7-65	5-11	836	537	5464	4,57	249,83	281	3,51	192	284	284	1517	36
35 ²	25-4-65	25-11	944	501	5502	4,54	249,76	281	3,68	203	264	264	1606	36
36	9-3-65	2-9	907	573	5268	4,66	245,74	277	3,66	193	337	337	1434	40
40	10-6-65	9-9	821	551	5122	4,58	234,42	264	3,83	196	337	337	1476	41
38	6-5-65	24-9	871	516	5104	4,38	223,47	251	3,72	190	326	326	1612	41
37	6-1-65	2-10	999	606	4760	4,65	221,26	249	3,88	185	318	318	1174	36
44	3-9-65	4-10	761	508	4843	4,53	219,47	247	3,61	175	316	316	1449	38
48	15-9-65	18-11	794	458	5063	3,99	202,25	226	3,45	175	271	271	1383	35
46	5-4-65	1-11	940	541	4107	4,88	200,42	226	3,64	149	288	288	1015	32
43	28-8-65	19-11	813	524	4344	4,20	182,57	205	3,61	157	270	270	1020	31
Gns. af 19 kvier			905	528	5589	4,44	248,09	279	3,64	203	304	304	1617	39

¹ Trepatte efter yverbetændelse ved kælvnings.² Venstre forpatte stukket op efter pattetråd.

s. 28579, på Enemærket.

Malke- tid i min.	Malk- bar- i min. hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,1	2,26	27-12 ¹	18	Nordfyns Hørlyk, e.A 4912	Hans Pedersen, Sørslev.
4,5	2,10	21- 6 ²	1	Kerteminde Ole, s. 4771	Ejvind Kristensen, Revninge.
4,8	1,71	22-11	14	Nordfyns Vang, s. 4774	Harald Nielsen, Ø.-Lunde.
4,0	2,43	3- 1	30	Kerteminde Ole, s. 4771	Aksel Hansen, Bovense.
4,1	2,09	15- 1	59	Nordfyns Hørlyk, e.A 4912	Eigil Rasmussen, Moderup.
4,0	2,23	24- 1	214	Kerteminde Laus, s. 4705	K. A. Haustrup, Kølstrup.
4,0	2,26	5- 1	49	Nordfyns Stig, e.A 4988	Harald Hansen, Ny Sandager.
5,1	1,60	18-11	64	Nordfyns Frem, e.A 4866	Harald Hansen, Ny Sandager.
4,4	1,86	2- 4	88	Kerteminde Øst, r. 27454	John Andersen, Birkende.
4,4	1,94	9- 2	56	ukendt	Eigil Rasmussen, Moderup.
4,3	1,98	8- 1	91	Nordfyns Gjald, s. 4769	Jørgen Lykke, Grindløse.
4,0	1,99	31- 1	33	ukendt	Johs. Jørgensen, Farstrup.
3,4	2,55	7- 2	16	Nordfyns Gjald, s. 4769	Jørgen Lykke, Grindløse.
3,4	2,30	22- 1	74	Nordfyns Lind, e.A 4948	Harald Madsen, Hjadstrup.
3,4	2,60	2- 2	92	Årup Tjalfe, r. 26071	Jørgen Ove, Hjorslev.
3,7	2,34	20- 6	56	Nordfyns Frem, e.A 4866	Anton Madsen, Roerslev.
5,9	1,39	4- 3	15	Centrums Dau, s. 4650	Jørgen Hansen, Bremerskovgård.
3,5	2,35	19- 1	108	Centrums Rup, s. 4772	Rasmus Jensen, Flødstrup.
3,8	2,12	6-12	49	Kerteminde Kry, e.A 4918	Verner Pedersen, Urup.
6,3	1,29	18- 1	47	Nordfyns Bo, r. 26973	H. Verner Rasmussen, Gyngstrup.
4,3	2,07				

¹ Kastet 14-6.² Kastet 24-5 efter ins. 2-1.

s. 28484, på Grønhøjgård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- i min. hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,3	2,18	16- 5	90	Bak Nøddekær, s. 4837	H. Petersen, Munkeskov, Lundby.
3,5	2,70	12- 1	13	Haslev Et, s. 4777	Erik Jørgensen, Freerslev.
6,2	1,30	5- 1	62	Stevns Højvig, s. 4599	Evald Nielsen, Ødemark.
5,6	1,50	6- 2	42	Thor, s. 4697	Marius Larsen, Tryggvælde Mark.
3,6	2,55	11- 1	43	Haslev Jarl, r. 27074	Herluf Pedersen, Skudrløse.
3,8	2,50	14- 3	81	Nr. 28, Dan, r. 27571	Niels Nielsen, Førslev.
5,3	1,53	11-12	75	Ris Næstved, s. 4598	Sv. Aage Pedersen, Hyllinge.
3,8	2,20	5- 2	7	Haslev Kærolf, r. 27768	J. Erik Andersen, Troelstrup.
5,3	1,64	30-12	13	Haslev Kærolf, r. 27768	N. P. Larsen, Kæderup, Tureby.
7,5	0,98	8- 1	39	Stevns Ry, e.A 5028	Sv. Christensen, Ørslev.
3,9	2,42	5- 2	50	Ingo Øst, e.A 4960	Gunnar Lund, Herfølge.
3,9	2,16	7-12	6	Ris Næstved, s. 4598	Peder Olsen, Klinteby.
3,5	2,40	13-12	12	Haslev Tjep, r. 25988	Herluf Pedersen, Skudrløse.
4,0	2,08	8- 1	18	Rørby Øst, s. 4463	Jens Nielsen, Hyllede Skovgård.
5,4	1,48	16- 1	73	Haslev Jarl, r. 27074	K. H. Birch, Skudrløse.
4,9	1,67	22-12	58	Nr. 131, f. 6-9-60	Rs. Andersen, Ringsbjerg.
6,0	1,35	18- 3	94	Haslev Et, s. 4777	Niels Nielsen, Førslev.
3,6	2,08	5- 1	82	Haslev Et, s. 4777	Haslev Landbrugsskole.
3,2	2,55	6- 4	48	Haslevs Albion, s. 4536	Ejnar Hansen, Teestrup, Haslev.
4,6	1,96				

Hovedtabel 9. Afkomsprøve for tyren Ribe Ås,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved mælk	Vægt i mælk kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
11	23-5-65	21-9	851	567	7128	4,78	340,94	384	3,81	272	315	315	2323	4640
5	15-7-65	17-9	794	524	6120	5,16	315,50	356	3,84	235	319	319	2018	4359
10	20-4-65	5-9	868	587	5565	4,95	275,22	310	3,99	222	313	313	1737	3976
6	20-5-65	22-9	855	502	5727	4,80	274,97	310	3,75	215	314	314	1701	4001
20	24-4-65	20-9	879	510	5503	4,99	274,65	310	3,89	214	312	312	1683	3968
15	27-7-65	14-10	809	487	5258	5,07	266,81	301	3,88	204	292	292	1665	3757
2	19-5-65	21-9	855	568	5265	5,05	266,14	300	4,05	213	315	315	1597	3855
7	2-8-65	14-10	803	542	5365	4,93	264,70	298	3,92	211	292	292	1681	3842
19	19-4-65	6-9	870	525	5387	4,87	262,58	296	3,86	208	319	319	1612	3854
3	31-5-65	24-10	876	574	5261	4,90	257,92	291	3,91	206	282	282	1602	3730
14	12-6-65	16-9	826	500	5431	4,70	255,05	287	3,49	190	320	320	1575	3828
1	28-4-65	18-10	903	630	5016	4,91	246,20	278	3,78	190	288	288	1505	3619
17	13-7-65	11-10	820	504	5262	4,47	234,95	264	3,79	199	295	295	1484	3710
13	10-6-65	16-9	828	587	5114	4,45	227,72	256	3,85	197	320	320	1372	3712
18	28-4-65	29-9	884	450	5322	4,12	219,03	245	3,59	191	307	307	1362	3622
8	17-4-65	24-9	890	565	4379	4,95	216,86	245	3,94	173	312	312	1230	3418
22	3-6-65	14-11	894	487	4439	4,48	198,99	224	3,71	165	261	261	1134	3155
16	5-5-65	5-10	883	551	4025	4,86	195,70	221	3,91	157	301	301	1040	3266
12	5-5-65	15-9	863	580	4161	4,53	188,34	212	4,03	168	321	321	1068	3331
4	26-6-65	30-9	826	555	3773	4,70	177,47	200	3,86	146	288	288	947	3138
Gns. af 20 kvier			854	540	5175	4,79	247,99	279	3,84	199	304	304	1517	3739

Hovedtabel 10. Afkomsprøve for tyren Bjerringbro Munk,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved mælk	Vægt i mælk kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
8	16-2-65	14-9	940	559	7474	4,44	332,05	373	3,76	281	325	325	2356	4666
4	3-3-65	28-9	939	561	7076	4,23	299,21	336	3,53	250	311	311	2104	4334
3	22-2-65	11-10	961	502	6372	4,60	292,82	329	3,85	245	298	298	2123	4139
13	23-2-65	7-10	956	529	6433	4,54	291,79	328	3,67	236	302	302	2047	4232
16	21-4-65	25-10	917	518	5692	4,84	275,43	310	3,88	221	284	284	1856	3829
20	25-7-65	10-10	807	486	5737	4,76	272,95	307	3,54	203	299	299	1815	4061
18	23-5-65	12-9	842	534	5801	4,64	269,19	303	3,84	223	327	327	1790	4214
11	29-1-65	4-10	978	584	5602	4,77	267,22	301	3,86	216	305	305	1758	3879
9	24-4-65	22-9	881	588	5553	4,54	251,88	283	3,87	215	317	317	1671	3916
19	1-12-64	16-11	1080	573	5556	4,46	247,71	278	3,49	194	262	262	1709	3598
1	22-2-65	25-10	975	541	4959	4,71	233,51	263	3,93	195	284	284	1487	3535
14	12-4-65	30-9	901	538	5685	4,09	232,68	261	3,58	203	309	309	1540	3767
2	25-6-65	24-10	851	600	4630	5,00	231,54	261	4,01	186	285	285	1438	3554
12	9-8-65	29-9	781	559	5140	4,44	227,97	256	3,72	191	310	310	1430	3698
15	7-6-65	17-9	832	547	4665	4,77	222,61	251	3,77	176	322	322	1369	3793
10 ¹	15-2-65	23-9	950	556	4986	4,39	219,09	246	3,70	184	316	316	1357	3665
5	26-7-65	13-10	809	579	4577	4,48	204,93	230	3,77	173	296	296	1292	3623
7	5-9-65	16-10	771	615	4341	4,45	193,35	217	3,84	167	293	293	1180	3428
17	8-4-65	24-9	899	555	4039	4,77	192,53	217	3,76	152	315	315	1100	3336
6	16-8-65	20-9	765	544	3443	4,62	159,10	179	3,83	132	319	319	902	3226
Gns. af 20 kvier			892	553	5388	4,56	245,88	277	3,75	202	304	304	1616	3825

¹ Venstre forpatte uden kanal.

28650, på Skølvad.

Alke- tid min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
7,4	0,98	7-12	36	Ribe Jarl, r. 26692	Johs. Schmidt, Kirkeby.
5,0	1,35	15- 1	44	Gran, s. 4691	Børge Andersen, Gjettrup.
5,2	1,56	15-11	56	Ribe Esp, r. 26166	Hans Bendiksen, Sneum.
4,2	1,97	29- 1	45	Lærk, s. 4803	Th. Kristiansen, Bramminge.
7,0	1,14	4-12	31	Ribe Gorm, e.B 4949	Niels O. Thøgersen, Grimstrup.
5,9	1,44	2- 1	50	ukendt	Anton Nielsen, Gredsted.
7,2	1,12	3- 2	59	Ribe Jarl, r. 26692	Johs. Frederiksen, Lundsmark.
4,8	1,66	3- 1	17	ukendt	Poul W. Mortensen, Andrup.
4,1	2,02	28-11	33	Lærk, s. 4803	Jørgen Thygesen, Sdr. Farup.
5,2	1,29	15- 1	73	Lærk, s. 4803	Chr. N. Jensen, Tanderup.
4,2	2,55	9-12 ¹	16	ukendt	Henning Troelsen, Lundsmark.
4,1	2,78	26- 1	67	Lærk, s. 4803	P. Schmidt Pedersen, Jyllerup.
3,8	0,87	18-12	55	Gran, s. 4691	Ejvind Andersen, Vejrup.
6,2	1,27	18-12	82	Torn, r. 25390	Thomas Knudsen, Bøel.
4,6	1,81	13- 2	20	ukendt	Verner Andersen, Vester Vedsted.
4,7	1,40	8- 5	48	Ribe Ras, r. 26461	Jens D. Jensen, Glejbjerg.
4,4	1,86	19- 2	84	Lærk, s. 4803	Henning Jensen, Villebøl.
4,4	1,74	18-12	64	Fyr, r. 25747	Henning Jensen, Villebøl.
4,7	1,61	8- 5	24	Gran, s. 4691	Hans Sørensen, Roager.
4,9	1,13	15-11	56	Gran, s. 4691	Chr. Appel, Fauerskov.
5,5	1,58				

¹ Kastet 27-4.

28585, på Rosenfeldt.

Alke- tid min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,4	1,60	5- 6	36	Bjerringbro Prim, r. 26947	Kristian Dalby, Tange St.
5,0	1,73	18- 1	33	Leif, s. 4807	Kristian Mumm, Kvorning.
5,6	1,17	13- 5	41	Flid, r. 25856	Hans Nygaard, Gjerning.
5,2	1,58	26- 3	80	Bjerringbro King, r. 27881	Henry Pedersen, V. Velling.
5,0	1,37	18- 3	55	Bjerringbro Prim, r. 26947	Esther Vestergaard, Vindum.
7,7	1,16	17- 2	17	Bjerringbro King, r. 27881	Edmund Christensen, Ilsø.
5,0	0,78	2- 1	16	Bjerringbro Prim, r. 26947	Aksel Hansen, Løvskaal.
4,4	1,25	30- 4	3	Bjerringbro Prim, r. 26947	Jes Hermansen, Mammen.
4,4	1,51	10- 4	31	Bjerringbro Ørn, e.A 4942	Tage Vingborg, Hjermin.
4,4	0,44	—	243	Bjerringbro Ørn, e.A 4942	Alfred Hedegaard, Taulgård.
5,2	1,61	12- 4	41	Flid, r. 25856	Hans Nygaard, Gjerning.
5,0	1,70	26- 1	246	Bjerringbro Hejn, r. 27146	Alfred Hedegaard, Taulgård.
5,5	0,77	8- 5	36	Bus, s. 4849	Hans Nygaard, Gjerning.
5,8	1,16	2- 1	37	Bjerringbro Ørn, e.A 4942	Jens Eriksen, Tindbæk.
5,2	1,52	3- 1	31	Bjerringbro King, r. 27881	Svend Tang, Hammershøj.
5,8	1,17	29- 1	102	Bjerringbro Ørn, e.A 4942	Peder Grønbæk, Skovsborg.
5,8	1,16	2- 1	55	Bjerringbro King, r. 27881	A. Schaltz Andersen, Hvorslev.
5,2	0,85	27-12	49	Bjerringbro Prim, r. 26947	Magnus Kirkegaard, Aidt Skov.
5,2	1,18	22- 1	45	Bjerringbro King, r. 27881	Jesper Iversen, Bjerring.
5,5	1,42	27-12	20	Bjerringbro Prim, r. 26947	Thorvald Jensen, Rødkærsbro.
5,8	1,26				

Hovedtabel 11. Afkomsprøve for tyren Skærup Ørnkæ

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i maris kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I al f. e.
10	7- 4-65	4-10	910	498	7937	3,96	314,51	352	3,62	287	315	315	2376	449
13	25- 3-65	29- 9	918	492	6243	4,56	284,83	320	3,74	233	320	320	2087	426
8	8- 1-65	12-10	1007	531	6305	4,42	278,78	313	3,78	238	290	307	2044	426
15	1- 3-65	3-10	946	528	5195	5,21	270,88	306	4,08	212	316	316	1718	391
1	22-10-64	25- 9	1068	554	5425	4,84	262,49	296	4,05	220	324	324	1666	422
2	16- 3-65	9- 9	907	515	5731	4,53	259,53	292	3,94	226	323	323	1731	408
3	27- 4-65	15-10	901	545	5356	4,57	244,93	275	3,86	207	304	304	1598	384
18	15- 7-65	25-10	832	548	4914	4,80	235,72	266	3,99	196	294	294	1496	361
6	15- 3-65	7-11	967	518	4613	4,94	227,87	257	3,90	180	281	281	1448	356
16	1- 9-65	2-10	761	472	4467	4,96	221,43	250	4,06	181	317	317	1311	354
17	2- 3-65	9-11	982	505	4724	4,67	220,70	248	3,66	173	279	279	1450	351
4	25- 2-65	10-10	957	511	4819	4,54	218,93	246	3,85	185	309	309	1315	362
12	2- 5-65	15- 9	866	532	4527	4,77	216,13	243	4,16	188	303	303	1379	362
5	28- 4-65	21-11	937	485	4717	4,49	211,92	238	3,71	175	267	267	1525	345
7	17- 2-65	18- 9	943	587	4267	4,70	200,50	226	4,03	172	300	331	1291	381
9	10- 8-65	10-11	822	542	3999	4,79	191,46	216	3,85	154	278	278	1107	317
Gns. af 16 kvier			920	523	5202	4,64	241,29	271	3,88	202	301	304	1596	387

Hovedtabel 12. Afkomsprøve for tyren Bornholms Yds

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i maris kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I al f. e.
10	6- 5-65	7-10	884	490	7100	4,30	305,06	342	3,61	257	314	314	2092	431
15	14- 6-65	12-10	850	492	6995	4,16	291,01	326	3,65	256	309	309	2015	411
20	1- 5-65	5-11	918	460	6916	4,02	278,34	312	3,47	240	285	285	1949	391
16	3- 4-65	7-10	917	488	6603	4,16	274,89	308	3,78	250	314	314	1827	401
13	15- 7-65	25- 9	802	537	6277	4,36	273,57	307	3,80	238	326	326	1742	401
11	1- 8-65	22-10	812	538	6145	4,27	262,20	294	3,74	230	299	299	1700	381
1	9-12-64	14-10	1039	610	6470	4,04	261,42	293	3,63	235	307	307	1701	391
6	19- 9-65	18-10	759	515	5813	4,49	261,24	294	3,75	218	303	303	1678	381
19 ¹	20- 8-65	2-10	773	475	5393	4,56	245,91	277	3,85	208	319	319	1393	371
7	21- 4-65	5-10	897	552	5415	4,48	242,75	273	3,90	211	304	304	1463	361
2	7- 7-65	2-10	817	584	5870	4,09	239,91	269	3,59	211	314	314	1449	361
18	10- 9-65	12-11	793	500	4910	4,79	235,39	265	3,85	189	278	278	1408	331
12	25- 9-65	29-10	764	490	5502	4,21	231,77	260	3,51	193	292	292	1430	341
17	20- 6-65	12-10	844	470	5457	4,21	229,71	258	3,62	198	309	309	1437	341
8	16- 2-65	20-10	976	563	4613	4,87	224,71	253	4,22	194	301	301	1204	331
14	30- 3-65	19-10	933	562	4082	4,29	175,18	197	4,06	166	302	302	918	301
4 ²	22- 6-65	10-10	840	555	4166	3,92	163,21	183	3,68	153	311	311	847	321
3	22- 4-65	12-11	934	600	3205	4,31	138,09	155	3,82	123	278	278	626	251
Gns. af 18 kvier			864	527	5607	4,29	240,80	270	3,73	209	304	304	1493	361

¹ Trepatet efter yverbetændelse.² Trepatet efter yverbetændelse. Håire haematte blokket op efter pattetråd

s. 28818, på Skovgård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,8	1,92	29- 6	49	Vejle Dam, s. 4862	Aksel Nielsen, Høgsholt.
4,3	2,02	20- 3	48	Bredsten Lombjerger, s. 4554	Sv. Aage Pedersen, Kølholt.
7,9	0,89	2- 1	114	Elbo Sortemose, e.A 4902	Thomas Nielsen, Pjedsted.
4,6	1,74	24- 1	51	Junior, s. 4854	Chr. Langkjær, Rugballe.
5,4	1,53	27- 1	31	Elbo Sortemose, e.A 4902	Svend Hansen, Erritsø.
7,2	1,09	4-12	124	Vejle Birk, s. 4698	Jens Mic. Mikkelsen, Grejs.
7,2	1,11	25-12	27	Vejle Birk, s. 4698	Hans Jacobsen, Kollerup.
9,0	0,88	17- 4 ¹	52	Bredsten Nørreby, r. 27164	Hans Sørensen, Balle.
5,4	1,51	16- 2	9	Elbo Sortemose, e.A 4902	Johs. Bruun, Balle.
5,4	1,48	23-12 ²	182	Elbo Sortemose, e.A 4902	Jens Mic. Mikkelsen, Grejs.
7,0	1,12	25- 1	84	Elbo Sortemose, e.A 4902	Peter Skov, Sdr. Vilstrup.
6,6	1,21	15- 3	70	Vejle Birk, s. 4698	Kr. Jensen, Agersbøl.
5,0	1,61	21-11	13	Elbo Sortemose, e.A 4902	Aksel Iversen, Ødsted.
5,8	1,40	9- 3	42	Vejle Birk, s. 4698	Hans Jacobsen, Kollerup.
4,8	1,68	19-12	81	Ødsted Loke, r. 26490	Aksel Kristensen, Ravning.
6,0	1,32	10- 1	71	Elbo Sortemose, e.A 4902	A. Hummelose, Gårslev.
6,0	1,41				

¹ Kastet 25-3 efter ins. 28-12.² Kastet 11-6.

s. 28560, på Kannikegård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
6,2	1,31	13- 2	2	Bornholms Nøk, e.B 4921	Kn. Lund, Kildesgård, Nylars.
4,3	2,17	11- 3	8	Kærsholm Sandkilde, s. 4735	J. Kofoed Hansen, Skadegård, Pedersker.
6,8	1,11	31- 1	34	Bornholms Guldal, s. 4841	M. Hansen, St. Duegård, Aker.
5,0	1,71	12- 2	13	Bornholms Janos, e.A 4886	H. P. Thinggaard, Pluggegård, Nyker.
5,2	1,62	8- 2	36	Bornholms Titov, e.A 5032	H. Ipsen, Styrmandsgård, Østermarie.
3,9	2,33	19- 2	44	Kærsholm Sandkilde, s. 4735	H. A. Kofoed, Kratlund, Pedersker.
5,9	1,38	8- 1	30	Bornholms Høg, s. 4842	H. Jensen, Grønvang, Vestermarie.
4,8	1,77	31- 5	35	Bornholms Høg, s. 4842	G. Petersen, Ahlegård, Vestermarie.
5,8	1,40	23-12	53	Bornholms Guldal, s. 4841	Kn. Munch, Fynergård, Knudsker.
3,3	2,63	6-12	6	Bornholms Odin, e.B 4941	P. Schou, I Skoven, Bodilsker.
3,7	2,34	13-12	5	Bornholms Nøk, e.B 4921	Aage Clausen, Præstegaden, Østermarie.
5,2	1,60	20- 1	67	Borg, r. 27539	N. Chr. Byder, Vibegård, Knudsker.
3,1	2,85	25- 5	31	Bornholms Janos, e.A 4886	K. Mogensen, Rosenhøj, Klemensker.
4,1	2,09	21- 2	67	Bornholms Høg, s. 4842	Kn. Svendsen, Skovgård, Knudsker.
3,7	2,17	23-12	13	Bornholms Høg, s. 4842	Kn. Kure, Granegård, Nyker.
4,5	1,75	24- 5	95	Ull, s. 4486	Sv. Møller, Dammegård, Aker.
5,2	1,51	29-12	73	Bornholms Ran, e.A 5004	K. Hansen, Duegård, Østermarie.
3,4	2,09	—1	94	Bornholms Guldal, s. 4841	Sv. Kofoed Hansen, Præstegård, Knuds
4,7	1,88				

¹ Børbetændelse.

Hovedtabel 13. Afkomsprøve for tyren Centrums Værn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved marts kælvn.	Vægt i marts	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.	
31	21-	2-65	16- 9	937	602	6644	4,51	299,32	336	3,60	239	321	2192	4431	
37	20-	1-65	11-10	994	526	6475	4,58	296,61	334	3,69	239	296	2229	4268	
32	28-	4-65	25- 9	880	571	5659	5,12	289,73	327	3,75	212	312	2078	3920	
33	29-	3-65	11- 9	896	517	6133	4,68	287,30	323	3,52	216	321	2050	4163	
35	29-	4-65	9-10	893	550	6055	4,60	278,70	314	3,92	237	298	2019	4016	
50	21-	1-65	7-10	989	536	6300	4,38	276,08	310	3,54	223	300	2045	4077	
38	24-	9-64	8- 9	1079	654	5757	4,74	272,78	307	3,94	227	329	1878	3905	
39	7-	4-65	10-10	916	560	5081	5,12	260,15	294	3,86	196	297	1770	3729	
46	1-	4-65	27-10	939	520	5553	4,61	255,79	288	3,73	207	280	1845	3706	
42	30-	3-65	22- 9	906	570	5343	4,61	246,56	277	3,93	210	315	1658	3778	
41	15-	3-65	21- 9	920	597	5348	4,43	236,90	266	3,79	203	316	1670	3715	
49	24-	8-65	11- 9	748	522	4614	5,12	236,04	266	4,06	188	326	1509	3604	
47	29-	4-65	13-10	897	487	5109	4,35	222,39	250	3,86	197	294	1585	3529	
36 ¹	9-	2-65	10-10	973	524	4692	4,52	212,07	238	4,06	191	297	1412	3373	
34	2-	5-65	10- 9	861	600	3906	5,25	204,97	232	3,98	156	315	1277	3300	
43	16-	9-65	1-11	776	508	4376	4,42	193,39	217	3,60	158	275	1322	3210	
48	8-	8-65	30-10	813	550	4274	4,33	184,90	208	3,79	162	277	1262	3110	
40 ²	8-	7-65	28- 9	812	572	3646	4,50	164,23	185	3,78	138	304	1075	3076	
45	15-	8-65	17-10	793	512	3226	4,71	152,01	171	3,76	121	290	986	2833	
Gns. af 19 kvier				896	551	5168	4,65	240,52	271	3,79	196	303	304	1677	3671

¹ Alle patter stukket op.² Trepattet efter yverbetændelse.

Hovedtabel 14. Afkomsprøve for tyren Århus Gorm,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1967	Alder ved marts kælvn.	Vægt i kg	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Foder- dage	Kraft- foder f. e.	I alt f. e.	
7	12-	4-65	7- 9	878	486	6785	4,43	300,31	337	3,52	239	325	325	2077	4518
1	31-	10-64	1-10	1065	600	6077	4,66	283,23	319	3,76	228	301	301	1930	4213
10	7-	10-64	19- 9	1077	521	5909	4,55	269,14	303	3,65	216	313	313	1774	4157
13	20-	4-65	15- 9	878	518	6212	4,28	265,70	298	3,73	232	317	317	1841	4401
3	28-	10-64	8- 9	1045	580	6347	4,11	260,77	292	3,44	218	324	324	1785	4274
17	19-	4-65	18- 9	882	498	6240	4,00	249,33	279	3,53	221	314	314	1698	4092
6 ¹	17-	9-64	16- 9	1094	515	5822	4,17	242,88	272	3,66	213	316	316	1586	4041
12	29-	3-65	10- 9	895	513	4665	5,14	239,74	271	4,12	192	322	322	1435	3841
5 ¹	15-	9-64	30- 9	1110	601	5197	4,47	232,16	261	3,76	195	302	302	1466	3560
19 ²	21-	5-65	25-10	887	524	5211	4,30	224,01	251	3,60	188	277	277	1472	3662
9	23-	3-65	3-10	924	506	5323	4,15	221,07	248	3,56	190	299	299	1419	3563
8	27-	10-64	13- 9	1051	491	5203	4,03	209,52	235	3,52	183	319	319	1294	3707
15	20-	3-65	9-10	933	503	4816	4,13	198,81	223	3,37	163	293	293	1241	3512
2	22-	10-64	1-10	1074	599	4070	4,51	183,60	206	3,84	156	301	301	1026	3419
16	13-	8-65	13-11	822	507	3960	4,63	183,51	206	3,73	148	258	258	1043	2916
11	19-	5-65	14-10	878	561	3782	4,68	177,12	199	4,10	155	288	288	966	3084
Gns. af 16 kvier				968	533	5351	4,37	233,81	263	3,66	196	304	304	1503	3810

¹ Trepattet efter fluestik før kælvning.² Høire hagnatte blokket on.

s. 28690, på Enemarket.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,9	2,40	6-12	84	Centrums Gavn, s. 4764	Henrik Petersen, Sanderum.
4,8	1,88	20- 1	10	Rudme Ideal, e.A 4864	Karl Chr. Mortensen, Hjelmerup.
4,0	2,45	— ¹	50	Centrums Falk, s. 28188	Laur. Larsen, Kragelund, Herrested.
3,6	2,49	2-12	79	Fåborg Elg, s. 4583	A. P. Højmark, Årslev.
3,5	2,66	16-12	111	Hjelmerup Fynbo, r. 26652	Knud Enggaard, Hjelmerup.
4,3	2,05	1- 3	15	Østfyns Mol, r. 26978	Johs. Hansen, Ejbygård, Lamdrup.
4,0	2,12	10- 6	91	Hadsten Wahl, e.A 4940	Henrik Petersen, Sanderum.
3,6	2,28	29- 1	16	Centrums Dau, s. 4650	Egon Jensen, Villestofte.
2,8	3,25	30- 3	72	Centrums Aslak, s. 4649	Hans Rueskov Nielsen, Rolfsted.
3,4	2,48	24- 2	55	Centrums Ekspert, e.A 4990	Henrik Larsen, Allerup.
3,8	2,31	24- 1	24	Centrums Nil, e.A 4868	Knud Pedersen, Birkende.
2,8	2,80	12- 3	49	Centrums Z, r. 26708	Rasmus Nielsen, Nr. Lyndelse.
3,9	2,16	11-12	111	Hjelmerup Fynbo, r. 26652	Knud Enggaard, Hjelmerup.
3,0	2,77	21-12	69	Centrums Ekspert, e.A 4990	Poul Jørgensen, Villestofte.
3,3	2,25	28-11	72	Centrums Lærk, s. 28186	Henrik Larsen, Allerup.
3,8	2,13	31-12	16	Munk 26, s. 4625	Harry Hansen, Tyrstbjerg.
3,8	2,18	12- 2	43	Centrums Gavn, s. 4764	Nicolai Hansen, Bellinge.
3,3	2,34	18-12	35	Centrums Gavn, s. 4764	Peder Nielsen Elmélund Mark.
3,0	2,25	11- 6	59	Rudme Ideal, e.A 4864	Johs. Limkilde, Sdr. Næra.
3,6	2,38				

¹ Brummer.

s. 28441, på Elkjær.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,6	2,63	30-12	55	Århus Rollo, e.B 4989	Børge Hviid Jensen, Harlev Mark.
3,3	2,72	24-12	88	Århus Rolf, r. 26760	Helge Andersen, Nimtofte.
4,5	1,92	6- 1	34	Kolding Kærsholm, s. 4622	Jens Jensen, Kolind.
4,5	1,84	12-12	85	Sortemose, s. 4680	Johs. Hansen, Yderup.
3,5	2,52	11-12	89	Århus Rollo, e.B 4989	Helge Andersen, Nimtofte.
5,1	1,64	11- 5	31	Løke 79, r. 25398	Ejvind Katholm, Attrup.
4,2	1,95	30- 1	33	Århus Rollo, e.B 4989	Jens Jensen, Kolind.
3,0	2,63	6-12	25	Ørnsvig 34, r. 26179	Jens B. Kristensen, Sjelle.
4,9	1,43	28-12 ¹	32	Århus Rolf, r. 26760	Jens Jensen, Kolind.
4,4	1,97	9- 1	90	Århus Rollo, e.B 4989	Erhard Borgbjerg, Bering.
4,2	1,99	6- 4	45	Århus Nico, r. 26758	Børge Olsen, Kvottrup.
4,6	1,74	25- 1	99	Århus Høst, e.B 4987	Aksel Hegelund, Sjelle.
4,7	1,74	29-12	3	Arne, r. 25743	Bendix Olsen, Agri.
6,6	1,23	15-12	193	Ørnsvig 34, r. 26179	Harlev Mølle, Harlev J.
6,0	1,32	30- 1	43	Århus Rolf, r. 26760	Johs. Jacobsen, Hvilsted.
4,4	1,74	6- 1	73	Junker, r. 24927	Arne Nielsen, Ajstrup, Malling.
4,5	1,94				

¹ Kastet 28-5.

Hovedtabel 15. Afkomsprøve for tyren Årup Vestfyns Prins,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved marts kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
5	16-4-65	10-9	877	521	6050	5,06	306,43	346	3,76	228	328	328	1868	4295
9	10-8-65	24-9	775	486	6246	4,79	299,40	337	3,77	235	314	314	1946	4399
1	20-2-65	29-9	951	590	6127	4,60	281,59	317	3,61	221	303	303	1822	4203
17	5-3-65	4-9	913	491	5554	4,85	269,47	304	3,67	204	334	334	1612	4160
2	14-1-65	14-10	1003	568	4938	5,44	268,62	304	4,09	202	288	288	1641	4012
11	2-1-65	7-10	1008	524	5998	4,12	247,26	277	3,32	199	301	301	1579	3977
13	15-3-65	7-10	936	520	5414	4,40	238,24	268	3,59	194	301	301	1461	3778
7 ¹	14-3-65	18-10	948	528	4661	5,05	235,39	266	3,95	184	290	290	1358	3799
12	20-4-65	10-9	873	506	5078	4,60	233,65	263	3,57	181	328	328	1361	3929
8 ¹	27-7-65	16-10	811	538	4739	4,92	233,31	263	3,96	188	292	292	1379	3533
20	3-8-65	21-10	809	490	5033	4,55	229,21	258	3,70	186	287	287	1360	3548
6	3-4-65	1-10	911	580	4896	4,55	222,86	251	3,89	191	307	307	1299	3527
3	21-7-65	18-9	789	514	4979	4,47	222,62	250	3,80	189	320	320	1294	3653
18	20-3-65	10-9	904	512	4793	4,46	213,72	240	3,63	174	315	315	1213	3601
15	25-8-65	24-10	790	478	4442	4,47	198,54	223	3,79	168	284	284	1107	3211
16	28-4-65	27-9	882	480	4106	4,63	190,15	214	3,74	153	311	311	1075	3416
14 ¹	5-2-65	29-9	966	490	3893	4,75	184,73	208	3,89	151	296	296	912	3210
4	23-5-65	27-10	887	549	3727	4,59	171,21	193	3,66	136	281	281	849	3053
10 ¹	12-7-65	18-10	828	554	3991	4,25	169,44	190	3,80	152	290	290	854	3046
Gns. af 19 kvier			887	522	4982	4,66	232,41	262	3,74	186	304	304	1368	3703

¹ Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 16. Afkomsprøve for tyren Fåborg Moss,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved marts kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
3	27-5-65	10-9	836	564	7002	4,91	343,63	387	3,96	278	329	329	2349	4677
14	2-3-65	9-11	982	458	5436	4,82	262,25	295	4,16	226	274	274	1628	3575
13	2-5-65	20-9	871	477	5382	4,81	258,95	292	4,07	219	319	319	1598	3984
5	15-5-65	26-9	864	558	5258	4,78	251,56	283	4,07	214	318	318	1472	3900
11	22-6-65	23-9	823	478	5876	4,14	243,23	273	3,89	229	321	321	1569	3833
8	1-6-65	15-10	866	537	5252	4,53	237,70	267	3,96	208	299	299	1454	3669
9	6-4-65	20-9	897	531	4729	4,91	232,06	262	4,31	204	324	324	1252	3620
1 ¹	17-3-65	4-10	931	549	4428	5,15	227,84	257	3,93	174	310	310	1254	3460
10	10-8-65	9-10	790	512	4820	4,68	225,78	254	3,95	190	300	300	1340	3725
15	17-3-65	11-10	938	495	4689	4,81	225,49	254	4,00	187	303	303	1297	3522
2	5-5-65	22-9	870	563	4605	4,79	220,49	248	3,88	179	322	322	1249	3562
6	2-3-65	14-10	956	531	4782	4,42	211,47	238	3,88	185	300	300	1195	3357
7 ¹	3-9-65	28-10	785	487	4538	4,64	210,58	237	3,94	179	286	286	1199	3232
16	14-5-65	30-10	899	544	4721	4,43	209,00	235	4,10	193	284	284	1260	3343
18	2-9-65	22-10	780	496	4506	4,34	195,53	220	3,78	170	292	292	1090	3211
12	14-2-65	3-11	992	514	3256	4,71	153,33	173	4,14	135	280	280	744	2902
Gns. af 16 kvier			880	518	4955	4,68	231,81	261	4,00	198	304	304	1372	3598

¹ Trepattet efter yverbetændelse før kælvning.

28691, på Ejstrupgård.

Ålke- tid min.	Malk- bar- min.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
7,4	1,02	10- 2	99	Vestfyns Bus, r. 26417	Johs. Nielsen, Skydebjerg, Årup.
3,6	2,47	31-12	39	Vestfyns Bus, r. 26417	A. Gynthersen, Skovby Nymark.
3,9	2,38	4-12	27	Årup Vestfyns Håb, e.A 4950	Niels Lauridsen, Eskør.
6,1	1,32	31-12	90	ukendt	Herluf Jensen, Vierne.
3,7	2,31	4-12	44	Hadsten Rørvig, r. 26856	Orla Jensen, Staurby.
6,8	1,14	8- 1	62	Vestfyns Bus, r. 26417	Juul Jørgensen, Rolundgård, Nr. Åby.
4,6	1,83	12- 1	45	Vestfyns Elsø, e.A 4872	Axel Hansen, Hjerup, Årup.
4,8	1,70	16-12	65	Årup Vestfyns Sverke, r. 27799	Ebbe Hansen, Gamby.
3,8	2,12	18- 1	101	Årup Vestfyns Håb, e.A 4950	Sigfred Pedersen, Ørslev.
3,2	2,65	10- 6 ¹	19	Årup Stenø, r. 25674	Henning Pedersen, Ørsbjerg.
5,6	1,45	18- 3	22	Vestfyns Bus, r. 26417	Svend Holmgaard, Rud, Nr. Åby.
3,2	2,64	19- 3 ²	70	Årup Vestfyns Håb, e.A 4950	Aage Andersen, Bred.
4,3	1,90	17- 2	61	Årup Vestfyns Sverke, r. 27799	P. Pedersen, Tommerup.
4,6	1,78	27-11	15	Skov Vestfyn, s. 4144	Johs. Larsen, Husby.
7,7	1,06	24- 2	14	Årup Balle, s. 4711	N. A. Nielsen, Kellebjerg.
3,9	2,03	25- 3	65	ukendt	A. Jørgensen, Staurby.
3,4	2,22	27-11	45	Årup Søby, s. 4643	Niels Jensen, Hygind, Ejby.
4,4	1,75	30-12	1	Årup Vestfyns Sverke, r. 27799	Henry Rubæk, Kådekilde, Bred.
3,6	2,10	9-12 ³	72	Ejlekær, s. 4416	M. Christensen, Kelleby.
4,7	1,89				

¹ Kastet 16-2 efter ins. 18-12.² Kastet 14-2 efter ins. 5-12.³ Kastet 9-6.

. 28761, på Lægård.

Ålke- tid min.	Malk- bar- min.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,2	1,61	8-12	51	Holbæk Ægil, s. 4787	Hans Chr. Madsen, Heden.
4,2	2,19	13- 6	41	Fåborg Uran, s. 4815	Erik Nøhr, Bjerne, Horne.
3,2	2,71	8-12	9	Fåborg Elg, s. 4583	Hans Helge Sørensen, Nybølle.
3,4	2,46	15- 1	56	Fåborg Øvli, r. 27781	Jens Sørensen, Gestelev.
5,0	1,68	8-12 ¹	98	Fåborg Flid, s. 4653	Johs. Andersen, Allested.
4,7	1,78	23-12	2	Fåborg Elg, s. 4583	Harald Andersen, Hillerslev.
2,9	2,74	1- 3	87	Fåborg Ørn, s. 4444	Jørgen Andersen, Øster Hæsing.
4,4	1,76	—	50	Fåborg Wano, e.A 4982	K. Nordtorp, Østrup, Håstrup.
5,2	1,57	8-12	51	Fåborg Elg, s. 4583	Bent Villadsen, Allested.
3,0	2,87	30-12	99	Fåborg Elg, s. 4583	Hans A. Nielsen, Salling.
3,5	2,26	27- 3	53	Fåborg Elg, s. 4583	N. P. Hansen, Mørkesø, Leby.
3,7	2,17	7- 3	2	Fåborg Cito, r. 27470	Erik Bild, Bøjden, Horne.
4,2	1,98	1- 7	39	Fåborg Wano, e.A 4982	Kr. Vejsgaard, Sandholts-Lyndelse.
5,6	1,44	8- 1	50	Fåborg Pal, r. 26976	L. og G. Hansen, Øster Hæsing.
2,6	3,09	5- 3	21	Fåborg Wano, e.A 4982	Jørgen S. Jensen, Sofienlund, Fåborg.
3,1	2,32	2- 2	37	Kerteminde Tell, e.A 5046	Niels Jessen, Åstrup.
4,0	2,16				

¹ Kastet 6-3.

Hovedtabel 17. Afkomsprøve for tyren Hjørring Vag

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
1	1- 3-65	29- 8	911	599	6086	4,86	296,01	334	3,94	240	337	337	1777	442
21	27-12-64	1-10	1008	573	6273	4,55	285,40	321	3,69	231	304	304	1786	417
8	15- 4-65	19- 9	887	491	6297	4,33	272,46	306	3,53	222	316	316	1719	405
14	23- 1-65	9-10	989	490	6056	4,47	270,85	304	3,48	211	296	296	1687	389
3	10-11-64	6- 9	1030	499	5521	4,71	260,20	293	4,09	226	329	329	1532	405
17	23-12-64	11-10	1022	521	5253	4,80	251,93	284	3,51	185	294	294	1509	372
12	10- 4-65	8-10	911	501	5367	4,47	239,72	269	3,73	200	297	297	1414	371
19	6- 1-65	23-10	1020	500	5136	4,54	233,41	262	3,65	187	282	282	1359	345
13 ¹	23- 4-65	14-10	904	506	5019	4,58	229,63	258	3,74	188	291	291	1340	356
7	28- 3-65	27- 9	913	531	4644	4,94	229,47	259	4,28	199	308	308	1238	362
6	25-12-64	18- 9	997	511	4881	4,63	226,21	255	3,85	188	317	317	1236	362
11	1- 2-65	8-10	979	519	4537	4,77	216,22	244	3,85	175	297	297	1169	323
10	3- 4-65	2-10	912	440	4424	4,74	209,49	236	3,86	171	303	303	1247	351
16	20- 3-65	30-10	954	544	4491	4,54	203,77	229	3,77	169	275	275	1091	321
5	16- 1-65	12- 9	969	528	4230	4,66	197,15	222	3,92	166	323	323	1038	352
2	17-12-64	5- 9	992	515	3776	5,21	196,63	222	4,23	160	330	330	1001	343
20	6- 1-65	28-10	1025	471	4142	4,74	196,36	221	3,64	151	277	277	1148	319
9	4- 4-65	25- 9	904	528	4082	4,79	195,70	220	3,83	156	310	310	1004	332
4	26-12-64	14- 9	992	584	3998	4,74	189,65	214	3,97	159	321	321	968	358
18 ²	30-12-64	27-10	1031	531	4116	4,58	188,50	212	3,84	158	278	278	956	300
Gns. af 20 kvier			968	519	4916	4,67	229,44	258	3,80	187	304	304	1311	361

¹ Træpattet, ingen forbindelse fra yver til pattekanal.² Træpattet.

Hovedtabel 18. Afkomsprøve for tyren Kolding Eg

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
9	7- 5-65	22- 9	868	557	6505	4,42	287,68	323	3,66	238	315	315	1971	423
16	10- 9-65	26- 9	746	504	6138	4,57	280,41	315	3,49	215	311	311	1865	415
4	8- 7-65	27- 9	811	546	6034	4,52	272,82	307	3,90	236	310	310	1810	403
5	19- 6-65	13- 9	816	523	5662	4,58	259,15	291	3,63	205	324	324	1620	405
10	13- 7-65	14- 9	793	602	5839	4,30	251,32	282	3,67	214	318	318	1660	396
1	2- 7-65	3-10	823	557	5080	4,61	234,14	263	3,79	192	304	304	1472	378
2	4- 7-65	17- 9	805	571	4699	4,96	232,94	263	3,94	185	320	320	1358	371
7	14- 6-65	5-10	843	522	4910	4,69	230,22	259	3,70	182	302	302	1405	357
13	23- 5-65	12- 9	842	544	4915	4,63	227,69	256	3,72	183	320	320	1388	381
6	9- 5-65	19-10	893	528	4708	4,83	227,34	256	3,81	179	288	288	1348	340
8	11- 5-65	26- 9	868	521	5310	4,26	226,11	254	3,52	187	311	311	1434	369
11	29- 6-65	27- 9	820	541	5149	4,39	225,79	254	3,81	196	310	310	1373	355
15	6- 6-65	24- 9	840	506	5239	4,02	210,76	236	3,45	181	308	308	1337	360
17	15- 7-65	20-11	858	492	4884	4,11	200,52	225	3,69	180	256	256	1313	321
12	12- 8-65	26- 9	775	567	3686	4,74	174,72	197	3,94	145	311	311	984	318
18	18- 7-65	20-11	855	513	3617	4,38	158,43	178	3,74	135	256	256	876	278
14	8- 8-65	1-10	784	524	2892	4,98	144,06	162	3,83	111	306	306	764	309
Gns. af 17 kvier			826	536	5016	4,51	226,12	254	3,71	186	304	304	1410	364

s. 28356, på Dybvad.

Malke- tid i min.	Malke- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,2	2,74	26-12	49	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Juhl Villumsen, Tårs.
2,9	3,22	25- 2	31	Munk 26, s. 4625	Laurids Dissing, Tårs.
2,6	3,51	15- 41	78	Samsø Bjørk, s. 4629	Peter Dahl, Vidstrup.
4,5	1,93	27- 2	11	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Jacob Jacobsen, Hune.
3,0	2,83	9- 1	39	Elm, s. 4638	Rich. Vestergaard Jensen, Asdal.
2,3	3,93	2- 1	5	Ull, r. 25067	Møller Pedersen, Em.
5,2	1,59	18- 1	91	Hjørring Bøg, r. 25787	Niels Christensen, Vrå.
2,7	3,35	24- 2	87	Hjørring No, s. 4806	Harald Christensen, Ø. Burskov.
4,4	1,99	25- 3	50	Samsø Bjørk, s. 4629	Verner Juul Olesen, V. Borriholt.
2,5	3,23	3- 1	92	Hjørring Sortemose, r. 26486	Børge Thomsen, Krustrup.
4,2	1,87	26- 1	94	Munk 26, s. 4625	Peter Jensen, Bjergby.
3,4	2,43	18- 3	3	Hjørring Bakke, r. 27447	Henry Møller, Tårs.
3,2	2,58	19- 2	55	Uffe Højvang, s. 4429	Alfred Sonnesen, Poulstrup.
3,4	2,46	7- 2	10	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Bent Spanner, Bindsløv.
3,6	2,13	15- 1	55	Hjørring Elssø, r. 27875	Martin Jørgensen, Snevre.
2,8	2,44	29-12	36	Poul 96, f. 20-8-53	Karl Jensen, Østervrå.
2,1	3,87	17- 2	87	Hjørring No, s. 4806	Harald Christensen, Ø. Burskov.
2,2	3,42	4- 1	54	Munk 26, s. 4625	Søren P. Møllergaard, Em.
2,8	2,62	26-12	50	Mors, s. 4688	Niels Gade, Rendbæk.
4,8	1,66	4- 3	138	ukendt	Svend Steffensen, Snevre.
3,3	2,69				

¹ Kastet 11-4 efter ins. 5-2.

s. 28812, på Gelballegård.

Malke- tid i min.	Malke- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,0	3,22	16-12	49	Kolding Holm 36, e.A 4978	Harald Christensen, Donslund.
4,1	2,23	26- 1	33	Kolding Rolf, 73, e.A 4946	Søren Krag, Overby, Hejls.
4,2	2,05	12- 1	22	Kolding 139, r. 27115	Johs. Schmidt, Bastrup.
4,6	1,84	9-12	26	Kolding Buster 36, r. 25501	Aage Winther, Vorbasse.
4,4	1,92	4-12	124	Kolding Sortemose 28, e.A 4980	Frede Melvang, Askov.
3,6	2,32	9-12	94	ukendt	Frede Melvang, Askov.
4,6	1,67	16-12	29	Kolding Rolf 73, e.A 4946	Aage Winther, Vorbasse.
4,2	1,96	12-12	38	Kolding Holm 36, e.A 4978	Eigil Hansen, Vesterhede.
2,6	3,13	29-11	42	Kolding Rolf 73, e.A 4946	Johs. Christensen, Gåskjær.
5,4	1,51	13- 1	60	Kolding Rolf 73, e.A 4946	Hans Chr. Christensen, Donslund.
2,8	2,90	14-12	74	Kolding Hvirvelkær 159, s. 4811	Orla Olesen, Brakker.
4,6	1,82	8-12	44	Kolding Sverre 38, r. 27941	Svend Mathiesen, Vorbasse.
4,9	1,67	30-11	34	Kolding Kær 3, r. 27114	Niels Lauridsen, Egholt.
6,0	1,40	30- 1	63	Kolding Holm 36, e.A 4978	Jens Staarup, Røjlund, Verst.
3,1	2,30	5- 3	20	Kolding Frøy 86, r. 27943	Verner Jessen, Nørbølling.
4,6	1,70	24- 1	19	Samson 72, s. 4564	Richardt Nissen, Almstok.
4,2	1,68	13-12	58	Kolding Sortemose 28, e.A 4980	Svend Nielsen, Bølling.
4,2	2,08				

Hovedtabel 19. Afkomsprøve for tyren M. A. Cæsar

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-teint %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
1	28- 4-65	10- 9	865	574	6785	4,93	334,23	377	3,91	265	331	331	2227	4596
3	3- 5-65	19- 9	869	518	6724	4,55	305,93	344	3,88	261	320	320	2073	4402
4	20- 6-65	30- 9	832	500	6171	4,50	277,95	312	3,85	238	309	309	1870	4292
7	3- 5-65	3-10	883	490	5720	4,74	271,40	306	3,96	227	306	306	1779	4167
13	15- 5-65	14-10	882	564	5440	4,43	240,79	271	3,87	211	297	297	1564	3827
14	26- 5-65	8-10	865	512	5678	4,21	239,31	268	3,86	219	303	303	1546	3701
19	21- 4-65	22-10	914	557	4896	4,56	223,32	251	3,90	191	289	289	1350	3544
17	9- 5-65	24-10	898	627	4506	4,89	220,36	248	4,04	182	287	287	1312	3565
8	19- 6-65	12-10	845	543	4462	4,87	217,44	245	3,99	178	299	299	1264	3667
5	14- 6-65	30- 9	838	553	4164	4,66	194,17	219	4,13	172	311	311	1086	3409
16	25- 6-65	24-10	851	584	4615	4,16	192,09	215	3,66	169	287	287	1153	3137
12	30- 5-65	3-10	856	553	3857	4,89	188,68	213	4,25	164	306	306	1005	3336
6	13- 6-65	10-10	849	582	4049	4,62	187,18	211	4,01	162	301	301	1016	3089
11	24- 6-65	8-10	836	538	3538	4,91	173,66	196	4,23	150	303	303	925	3257
2	21- 4-65	11- 9	873	531	3669	4,60	168,76	190	4,16	152	330	330	847	3297
18	13- 4-65	25-10	925	525	3679	4,54	167,19	188	3,96	146	286	286	890	2855
Gns. af 16 kvier			868	547	4872	4,62	225,15	253	3,96	193	304	304	1369	3634

Hovedtabel 20. Afkomsprøve for tyren Skive Sten,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-teint %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
9	28- 2-65	30- 9	944	534	6680	4,30	287,53	323	3,55	237	310	310	1952	4281
19	20- 3-65	1-11	956	501	5368	5,04	270,52	305	3,85	207	278	278	1709	3709
20	22- 2-65	28-10	978	463	5771	4,59	264,75	298	3,71	214	282	282	1721	3726
14	26- 2-65	8-10	954	495	4954	4,98	246,55	278	3,80	188	302	302	1436	3672
11	11- 4-65	28- 9	900	518	5130	4,77	244,87	276	4,08	209	311	311	1475	3732
10	18- 3-65	11-10	937	510	4997	4,64	232,06	261	3,75	187	299	299	1392	3714
21	23- 1-65	1-10	981	537	5010	4,58	229,56	258	3,74	187	309	309	1368	3690
8	6- 2-65	19-10	985	529	5172	4,42	228,67	257	3,83	198	291	291	1399	3659
1	5- 4-65	26-10	934	465	5264	4,33	227,86	256	3,63	191	284	284	1431	3589
4	22- 2-65	10-10	960	579	4825	4,67	225,55	254	3,84	185	300	300	1340	3593
6	30- 3-65	8-10	922	510	5095	4,23	215,43	242	3,69	188	302	302	1293	3681
2	22- 2-65	11- 9	931	505	4283	5,03	215,28	243	4,03	173	329	329	1211	3721
3	17- 2-65	18- 9	943	564	4703	4,57	214,85	242	3,89	183	322	322	1213	3714
17	19- 5-65	20- 9	854	520	4545	4,72	214,50	241	3,89	177	320	320	1155	3524
5	7- 1-65	21- 9	987	512	4931	4,33	213,44	240	3,66	181	318	318	1240	3721
18	2- 2-65	12- 9	952	558	4281	4,89	209,14	236	3,99	171	320	320	1124	3570
16	25- 2-65	9-10	956	474	4506	4,63	208,49	235	3,69	166	293	293	1229	3527
13	16- 2-65	2-10	958	539	4780	4,35	207,76	233	3,77	180	308	308	1163	3392
12	13- 3-65	24- 9	925	505	4196	4,79	200,92	226	4,04	170	316	316	1070	3520
7	14- 2-65	21-10	979	584	2783	5,09	141,67	160	4,27	119	289	289	756	2734
Gns. af 20 kvier			947	520	4864	4,63	224,97	253	3,81	186	304	304	1334	3623

28850, på Bellinge.

Alke- id bar- nin.	Malk- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2	2,13	24- 6	21	Dalgas, s. 4840	Erik Koch, Torkilstrup.
1	2,20	11-12	57	Eg, e.B 4871	L. C. Mortensen, Erikstrup.
6	2,61	7-12	74	Stevns Klint, s. 4659	Vilhelm Petersen, Maglebrænde.
6	1,86	5-12	7	ukendt	Frede Larsen, Truelstrup.
5	1,49	23-12	48	Nr. 28, f. 14-1-60	Jørgen Krogh, Tjæreby.
4	1,90	13- 5	144	Ejler Østlolland, e.A 5064	S. Svendsen, Pårupgård, Nørreballe.
5	1,86	1- 2	21	Drot Østlolland, e.A 5062	Henning Hansen, Radsted.
0	1,62	22- 1	71	Taurus Færch, r. 27181	Thorkild Bonde, Ulslev.
8	2,91	18- 1	35	Falsters Primus, e.B 4919	Georg Strange, Sdr. Grimmestrup.
7	2,13	15- 1	18	El Sydfalster, e.A 4928	Karl Ringsing, Sillestrup.
2	1,57	30- 1	93	Falsters Sverre, s. 28201	Ove Eriksen, Tingsted.
4	1,73	8-12	49	Rørby Øst, s. 4463	Peder Hansen, Kildedal, Kettinge.
2	1,90	25- 3	88	Mads, s. 4792	Arnold Hansen, Frejlev.
0	1,53	29- 3	16	Mads, s. 4792	Karl Lindquist, Hydesby.
8	2,44	31-12	65	Pil Østlolland, r. 27173	Carl G. Rasmussen, Krungerup.
8	1,38	17- 2	7	Stevns Klint, s. 4659	Villy Petersen, Maglebrænde.
4	1,95				

28376, på Krarup Nygård.

Alke- id bar- nin.	Malk- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4	1,57	22-12	65	Ørnmose, r. 26200	Gustav Nielsen, Lihme.
2	2,15	29- 1	60	Skive Vink, e.A 4936	Kristian Jensen, Vestenbjerg.
6	2,63	14- 3	12	Skive Vink, e.A 4936	Aksel Jensen, Vejby.
6	2,24	25- 5	81	Elok, s. 4845	Aage Hansen, Grætrup.
2	2,03	5-12	38	Skive Hind, r. 26467	Svend Aage Jensen, Ramsing.
4	1,51	5- 1	29	Elok, s. 4845	Henning Trærup, Lihme.
3	1,91	20-12	13	Una, s. 4753	Aksel Jensen, Gamstrup.
6	1,47	19- 1	5	Thor, s. 4697	Aage Justesen, Ilbjerg.
0	1,70	27- 3	38	Olle, s. 4632	Kristian D. Torp, Durup.
9	1,67	27-12	94	Elok, s. 4845	Hans Goul, Tolstrupminde.
9	1,66	19-12	13	Skive Øvli, r. 26171	Christoffer Christoffersen, Hvidbjerg.
6	2,08	15-12	56	Toke, s. 4802	Harald Baarstrøm, Balling.
1	1,58	17- 1	39	Skive Hind, r. 26467	Frits Krejberg, Krejbjerg.
3	2,33	13- 2	51	Skive Himmerbo, r. 27182	Chr. Stisen, Roslev.
5	2,33	9-12	33	Toke, s. 4802	Aage Baarstrøm, Vejby.
2	1,82	1-12	43	Skive Vink, e.A 4936	Niels Kristensen, Grinderslev.
6	1,44	29-11	38	Lærk, s. 4803	Niels Chr. Andersen, Ø. Dølby.
1	1,90	21- 2	64	Thor, s. 4697	Marius Vestergaard, Volling.
2	1,76	1- 2	81	Skive Mark, r. 27183	Aage Goul Møller, Tøndering.
4	1,89	26- 1	49	Ørnmose, r. 26200	Kristian Larsen, Lund.
4	1,88				

Hovedtabel 21. Afkomsprøve for tyren Rudme S

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i maris kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I a f. e.
8	9- 5-65	12- 9	856	612	6669	4,67	311,59	351	4,02	268	333	333	2276	45
10	3- 5-65	7-10	887	586	6438	4,62	297,17	334	3,94	253	308	308	2196	42
12	15- 7-65	17-10	824	527	7825	3,60	281,64	314	3,56	279	298	298	2358	42
6	27- 2-65	16-10	961	524	6028	4,41	265,87	299	3,67	221	299	299	1967	40
5	2-12-64	22- 9	1024	572	6603	3,83	252,85	282	3,71	245	323	323	1923	39
2	30- 6-65	29- 9	821	570	5993	3,98	238,49	267	3,72	223	316	316	1741	37
16	18- 4-65	17- 9	882	449	5855	4,05	237,34	266	3,58	210	328	328	1757	40
11	12-10-65	5-10	723	500	6088	3,88	236,34	264	3,65	222	310	310	1757	38
14	6- 7-65	13- 9	799	530	5887	4,01	235,96	264	3,74	220	332	332	1721	38
7	5- 9-65	5-11	791	536	5297	4,39	232,72	261	3,90	207	279	279	1677	36
21	18- 9-65	22-11	795	551	4751	4,54	215,52	242	3,80	181	262	262	1518	32
18	18- 9-65	27-10	769	520	4705	4,52	212,73	239	3,76	177	288	288	1486	33
15	15- 9-65	11-10	756	445	5854	3,36	196,82	219	3,47	203	304	304	1672	37
17	29-10-65	5-11	737	516	4428	4,30	190,51	214	3,63	161	279	279	1328	33
19	30- 9-65	23- 9	723	436	4771	3,97	189,60	212	3,87	185	322	322	1404	34
1	15- 8-65	27- 8	742	648	4086	4,41	180,06	202	3,96	162	349	349	1198	34
9	25- 2-65	19-11	997	581	4765	3,63	172,94	193	3,68	175	265	265	1275	31
20 ¹	4-10-65	18-10	744	452	3965	4,11	162,80	182	3,71	147	297	297	1083	29
13 ²	2- 3-65	5-11	956	540	3853	3,98	153,29	172	3,61	139	279	279	1040	29
Gns. af 19 kvier			831	531	5466	4,11	224,43	251	3,73	204	304	304	1651	36

¹ Trepatet efter yverbetændelse ved kælvning.² Bagpatterne stukket op.

Hovedtabel 22. Afkomsprøve for tyren Varde Wan

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i maris kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I a f. e.
9 ¹	20- 5-65	22- 9	855	483	5366	5,06	271,46	306	3,97	213	306	306	1754	42
12	7- 7-65	23- 9	808	479	6121	4,42	270,43	304	3,69	226	305	305	1724	39
17 ²	15- 4-65	22- 9	890	510	5657	4,56	258,11	290	3,69	209	306	306	1624	38
15	24- 7-65	5-10	803	477	5392	4,78	257,79	290	3,75	202	293	293	1533	37
7	7- 5-65	4-10	880	515	5302	4,84	256,50	289	3,83	203	294	294	1514	38
3 ²	16- 4-65	15-10	912	514	5497	4,66	256,02	288	3,66	201	283	283	1604	39
1	29- 6-65	6- 9	799	512	5117	4,79	245,32	276	3,80	194	319	319	1430	39
19	6- 4-65	22- 9	899	457	5262	4,58	240,93	271	3,68	194	306	306	1446	38
18 ³	20- 2-65	17- 9	939	505	5279	4,56	240,80	271	3,74	197	311	311	1384	39
10	9- 3-65	3-10	938	538	4939	4,70	232,14	261	3,93	194	295	295	1302	36
6	6- 6-65	11- 9	827	530	4656	4,70	218,71	246	3,93	183	317	317	1166	37
4	23- 5-65	19-10	879	482	4842	4,40	212,96	239	3,50	169	279	279	1290	34
11	1- 4-65	25- 8	876	538	4357	4,67	203,31	229	3,80	166	334	334	1012	36
8	25- 4-65	1-10	889	531	4193	4,71	197,36	222	3,83	161	297	297	994	32
5	1- 5-65	26- 9	878	572	4443	4,13	183,68	206	3,57	159	302	302	968	33
13	17- 6-65	13- 9	818	548	3879	4,62	179,36	202	3,84	149	315	315	932	32
2	24- 4-65	19- 9	878	584	3662	4,34	158,86	178	3,80	139	309	309	801	31
14	12- 5-65	2-10	873	538	3469	4,46	154,74	174	3,74	130	296	296	705	30
Gns. af 18 kvier			869	517	4857	4,62	224,36	252	3,76	183	304	304	1288	36

¹ Højre bagpatte stukket op efter pattetråd.² Venstre bagpatte stukket op efter pattetråd.³ Højre forpatte stukket op efter pattetråd.

28687, på Enemærket.

Alke- tid nln.	Malk- bar- hedstal	Draegtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
0	2,23	16- 1	36	Rudme Ideal, e.A 4864	Henning Pedersen, Lørup Hede.
3	2,98	16-12	46	Guldbjerg Ulvsager, s. 4703	Viggo Kildegaard, Tårup.
4	1,68	6- 4	37	Aktuel Tåsinge, s. 4765	Ejner Pelle, Sdr. Vornæs.
8	1,83	18- 1	17	Carlsro Klintholm, r. 25661	Gerhard Frederiksen, Lamdrup.
9	1,81	2- 1	13	Rudme Kalle, s. 4821	Inger Eriksen, Herringe.
8	1,82	27- 5 ¹	70	Fåborg Quitus, e.A 4984	Chr. Nielsen, Nr. Søby.
6	1,84	19- 3	20	Rudme Kalle, s. 4821	Henning Pedersen, Lørup Hede.
6	2,61	5- 6 ²	58	Rudme Ideal, e.A 4864	Ejner Nørremose, Ellested.
0	1,69	10- 6	21	Rudme Ramon, s. 4592	Arnold Møller, Volstrup.
3	2,12	9- 2	67	Moses Tåsinge, e.A 5014	Kurt Sørensen, Trunderup, Dong.
6	1,19	26- 2	78	Rudme Unik, e.A 5018	Sv. Aage Poulsen, Boltinge.
0	2,10	4- 6 ³	41	Rudme Ideal, e.A 4864	Ejner Nørremose, Ellested.
0	2,20	12- 2	14	Rudme Ideal, e.A 4864	Kaj Jensen, Fjellebro Mark.
8	1,41	3- 1	80	Rudme Ideal, e.A 4864	Ejner Nørremose, Ellested.
0	2,89	5- 4	41	Rudme Ideal, e.A 4864	Bent Møller, Søby.
4	2,87	18- 3 ⁴	79	Rudme Ideal, e.A 4864	Ejner Hansen, Ellested.
9	1,39	16- 3	32	Rudme Ideal, e.A 4864	Jørgen Buk, Kværndrup.
7	1,68	19- 1	4	Østfyns Høj, s. 4818	Karl Madsen, Skalkendrup.
7	1,70	13- 3	32	Rudme Bent, r. 26667	Niels Johansen, Slude.
5,5	2,00				

¹ Kastet 20-7.² Kastet 23-4 efter ins. 9-3.³ Kastet 28-5 efter ins. 16-1.⁴ Kastet 21-2 efter ins. 7-12.

28649, på Vardegård.

Alke- tid nln.	Malk- bar- hedstal	Draegtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,1	1,64	14-12	88	Dyb, s. 4847	William Thuesen, Frisvad.
3,3	2,80	27- 5	73	Varde Sven, r. 27865	Ejlert Kristensen, Nørrehede.
3,3	0,85	10- 1	24	Varde Hav, r. 26158	Erik Hansen, Kokspang.
5,4	1,25	12- 3	86	Varde Gør, r. 26689	Peder Søgaa, Hinnum.
4,4	1,90	11- 1	54	Varde Keld, r. 26162	H. Chr. Pedersen, Kvang.
5,7	1,44	25- 1	58	Varde Hejn, r. 27404	Tage Drewsen, Klinting.
3,8	2,17	24-11	19	Varde Bro, r. 27405	Elvin Nielsen, Vrenderup.
5,0	1,64	23- 1	58	Varde Gør, r. 26689	Bent Christensen, Gunderup.
5,4	1,23	30-11	35	Varde Hav, r. 26158	Andr. Andreasen, Bovbjerg.
4,8	1,74	20-12	50	Lo, s. 4758	Valdemar Nielsen, Hallum.
4,9	1,60	28- 2	12	Varde Hav, r. 26158	Bych Lauridsen, Sdr. Tange.
4,5	1,89	3- 1	59	Varde Bol, r. 27832	Tage Drewsen, Klinting.
4,7	1,70	20-12	63	Birk, s. 4500	Niels Jensen, Biltøft.
4,3	1,29	16- 1	81	Varde Mos, r. 26161	Laur. Bollerup, Gødsvang.
4,6	1,21	20-12	47	Varde Alex, r. 26687	William Christensen, Snorup.
5,4	1,26	21-12 ¹	2	Lo, s. 4758	Marnar Jørgensen, Lifstrup.
4,7	1,61	15- 2	28	Varde Gør, r. 26689	Verner Christensen, Randsig.
5,9	1,20	27-12	95	Dyb, s. 4847	Sv. O. Sørensen, Krarup.
5,3	1,58				

¹ Kastet 29-6.

Hovedtabel 23. Afkomsprøve for tyren Hjørring Nørreke

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I a f.
39	16- 2-65	30- 9	956	512	6684	4,00	267,39	299	3,55	238	308	308	1753	405
31	6- 3-65	6- 9	914	518	5707	4,57	260,78	293	3,90	222	332	332	1508	391
43	8-12-65	1-11	693	532	4731	5,27	249,44	282	4,05	192	276	276	1403	351
41	25- 3-65	4-10	923	453	5319	4,54	241,38	271	3,80	202	304	304	1395	371
47	13- 4-65	27-10	927	493	4982	4,79	238,53	269	3,92	196	281	281	1343	341
36	16-11-64	17- 9	1035	590	4537	5,23	237,10	268	3,98	181	321	321	1277	381
44	8- 4-65	2-10	907	505	4390	5,25	230,53	260	4,10	180	306	306	1162	341
33	10- 3-65	15- 9	919	516	3997	5,63	224,86	254	4,37	175	323	323	1211	381
49	5- 1-65	4-11	1033	489	4332	5,13	222,23	251	3,93	170	273	273	1200	311
48	20- 3-65	30-10	954	511	4509	4,92	221,78	250	3,96	179	278	278	1178	321
35 ¹	25- 3-65	13- 9	902	508	4132	5,27	217,58	246	4,06	168	325	325	1083	351
40	27- 2-65	30- 9	945	454	5101	4,23	215,84	242	3,71	189	308	308	1411	371
37	13- 3-65	24- 9	925	474	4610	4,54	209,42	235	3,89	179	314	314	1125	341
34	28- 4-65	15- 9	870	561	3792	5,31	201,46	228	4,18	159	323	323	1012	341
50 ²	9- 3-65	20- 9	925	493	4003	4,92	196,81	222	3,98	159	318	318	1023	341
38	14-12-64	15- 9	1005	521	4194	4,61	193,39	218	3,79	159	323	323	945	341
42	30-12-64	10-10	1014	536	4194	4,58	191,92	216	4,07	171	298	298	978	321
45 ³	20- 3-65	29-10	953	551	4018	4,46	179,27	201	3,86	155	279	279	928	301
46	29- 6-65	26-10	849	496	3571	4,73	169,06	190	3,98	142	282	282	773	301
Gns. af 19 kvier			929	511	4569	4,80	219,41	247	3,93	180	304	304	1195	351

¹ Venstre bagpatte stukket op efter pattetråd.² Alle patter stukket op.³ Trepattet efter pattetråd.

Hovedtabel 24. Afkomsprøve for tyren Herning Mun

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1967	Alder ved marts kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I a f.
19	19- 3-65	11-10	936	570	5063	5,75	291,37	330	4,22	214	307	307	1865	421
2	27- 9-64	25- 9	1093	635	5970	4,36	260,33	292	3,68	219	323	323	1793	421
6	5- 3-65	1-11	971	578	5676	4,59	260,31	293	3,75	213	286	286	1774	371
1	5- 6-65	20- 9	837	577	5557	4,64	257,99	290	3,68	205	328	328	1692	421
3	13-10-64	1-10	1083	646	5834	4,30	250,92	282	3,74	218	308	308	1743	411
5	5- 1-65	27- 9	995	570	5765	4,30	247,91	278	3,66	211	312	312	1683	401
16	28- 9-65	28-10	760	533	5627	4,24	238,37	267	3,74	211	290	290	1662	381
20	13-11-64	16- 9	1037	550	5259	4,43	232,86	262	3,70	194	302	302	1575	381
18	3- 5-65	12-10	892	569	4654	5,00	232,79	263	4,02	187	306	306	1445	371
10	6- 3-65	1-11	970	567	4618	4,64	214,42	241	3,77	174	286	286	1378	341
11	30-10-65	6-10	706	532	5013	4,20	210,50	236	3,52	176	312	312	1394	361
13	28- 2-65	13- 9	927	548	4230	4,89	206,65	233	3,97	168	326	326	1220	361
9	13- 3-65	19-10	950	548	4655	4,29	199,66	224	3,76	175	299	299	1289	351
17	18- 4-65	31-10	926	552	4645	4,10	190,67	214	3,80	177	287	287	1238	331
8	19- 4-65	12-10	906	572	4255	4,43	188,39	212	3,73	159	306	306	1162	341
4 ¹	2- 3-65	13-11	986	520	4726	3,76	177,68	198	3,39	160	274	274	1203	321
7	23- 4-65	25-10	915	543	4148	4,19	173,60	195	3,67	152	293	293	1094	331
12	30- 3-65	27- 9	911	550	4233	3,96	167,66	188	3,51	149	321	321	1025	341
15	2-11-64	7-10	1069	522	3229	4,56	147,21	166	3,97	128	260	311	952	311
Gns. af 19 kvier			941	562	4903	4,45	218,38	245	3,75	184	301	304	1431	370

¹ Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

s. 28615, på Dybvad.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,4	2,02	15- 5	5	Hjørring No, s. 4806	Jens L. Jensen, Flauenskjold.
4,6	1,80	19- 4 ¹	8	Hjørring No, s. 4806	Gunnar Jensen, Dybvad.
3,1	2,88	8- 2	79	Hjørring No, s. 4806	Jørgen Hedegaard, Harken.
5,6	1,45	10- 2	76	Ålborg Høj, s. 4623	Viggo Vestergaard, Hallund.
4,8	1,72	—	40	ukendt	Chr. Villumsen, Løkken.
3,7	2,12	15-12	43	Hjørring Sortemose, r. 26486	Chr. Larsen, Bindslev.
5,3	1,49	8- 6 ²	1	Nr. 78, f. 3-12-58	Carl Thomsen, Sæsing.
4,5	1,70	12-12	72	Hjørring No, s. 4806	Folmer Overby, Dybvad.
5,3	1,56	6- 5	79	Hjørring No, s. 4806	Otto Thomsen, Astrup.
3,6	2,35	26- 2	27	Hjørring Leif, e.B 4911	Henning Nielsen, Østervrå.
3,9	1,89	3- 1	76	Ålborg Høj, s. 4623	Viggo Vestergaard, Hallund.
3,7	2,33	12- 1	45	Hjørring Sortemose, r. 26486	Anders P. Madsen, Brønderslev.
3,3	2,39	20- 2	73	Hjørring No, s. 4806	Gunnar Madsen, Em.
3,0	2,37	30- 4 ³	29	Hjørring No, s. 4806	Gunnar Christensen, Høgsted.
4,4	1,76	27- 3	37	ukendt	Leif Pedersen, Thorup.
4,6	1,62	5- 2	59	Samsø Bjørk, s. 4629	Jens Aage Pedersen, Thorup.
5,6	1,44	19- 2	3	Lokesøn, r. 25443	Knud Thomsen, Østervrå.
7,1	1,10	25- 3	54	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Karl Jensen, Østervrå.
3,4	2,25	25- 3	19	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Bent Spanner, Bindslev.

4,4 1,91

¹ Kastet 24-3 efter ins. 18-1.² Kastet 7-5 efter ins. 9-2.³ Kastet 27-3 efter ins. 14-1.

s. 28630, på Moesgård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,8	1,74	26-12	41	ukendt	Johs. Hagelskjær, Sunds.
4,2	2,04	26- 4	46	Herning Ravn, r. 27644	E. Langkjær, Kibæk.
5,4	1,55	29- 5	39	Herning Høj, r. 26042	Jens Knudsen, Gullestrup.
3,4	2,55	16- 1	60	Klit, e.A 4932	Jens Frølund, Drongstrup.
6,8	1,17	7-12	113	ukendt	Terkel Hansen, Højgård, Herning.
3,9	2,24	9-12	84	Bro, e.B 4877	Frede Thalund, Helstrup.
5,0	1,69	15- 2	9	Herning Hav, e.B 4993	Vilhelm Christensen, Videbæk.
5,8	1,41	21-11	64	Herning Dux, r. 27189	E. Langkjær, Kibæk.
5,2	1,51	14- 3 ¹	48	Herning Toke, r. 26612	Sv. Aa. Christensen, Aulum.
6,0	1,33	17- 4	21	Bro, e.B 4877	Magne Thomsen, Albæk.
3,2	2,54	— ²	39	Klit, e.A 4932	Villy Mathiassen, Fjelstrup.
4,8	1,63	7-12	70	Bøg, s. 4561	N. A. Thalund, Gjødstrup.
4,6	1,84	30- 3	6	Bro, e.B 4877	Th. Andersen, Helstrup.
4,0	2,10	15- 2	65	Bro, e.B 4877	Arne Lauridsen, Vildbjerg.
3,4	2,28	19-12	75	Herning Ejlekær, r. 27187	Carlo Bank Olsen, Brejning.
8,2	0,83	1- 4	21	Bro, e.B 4877	Harald Jensen, Agersig.
5,3	1,48	23- 2	35	Bro, e.B 4877	Dynes Kaac, Studsgård, Herning.
4,5	1,74	6- 3 ³	40	ukendt	Svend Nørregaard, Aulum.
3,3	2,29	8- 3	47	Herning Dux, r. 27189	Villiam Østergaard, Linå.

4,8 1,79

¹ Kastet 20-2 efter ins. 19-12.² Børen beskædiget.

Hovedtabel 25. Afkomsprøve for tyren Morsø Munk

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-teint %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
15	25-2-65	14-9	931	531	7637	4,41	336,43	378	3,59	274	328	328	2426	4732
4	17-1-65	13-9	969	583	6915	4,52	312,41	351	3,66	253	329	329	2077	4478
16	8-3-65	15-9	921	551	6755	4,09	276,29	309	3,40	230	317	317	1899	4171
11	7-2-65	17-9	952	504	6313	3,95	249,59	279	3,47	219	315	315	1771	4116
8	16-4-65	11-10	908	479	5626	4,37	245,59	276	3,65	205	301	301	1631	3990
21	21-2-65	10-9	931	549	5346	4,35	232,58	261	3,67	196	329	329	1356	3667
12	7-4-65	16-10	922	495	5820	3,98	231,80	259	3,41	198	296	296	1578	3690
22	23-8-65	26-10	794	487	5048	4,49	226,43	254	3,64	184	286	286	1328	3427
2	11-3-65	18-10	951	639	5072	4,32	219,25	246	3,60	183	284	284	1392	3645
18	11-4-65	2-11	935	565	5187	4,16	215,90	242	3,53	183	279	279	1441	3609
5	21-1-65	4-10	986	566	4625	4,52	209,16	235	3,69	170	308	308	1191	3532
9	18-9-65	13-10	755	546	5206	3,97	206,65	231	3,39	177	299	299	1285	3528
14 ¹	13-1-65	24-10	1014	556	4837	4,24	205,26	230	3,59	174	288	288	1238	3484
19	17-4-65	29-10	925	498	4659	4,19	195,35	219	3,58	167	283	283	1230	3409
17	13-7-65	27-9	806	637	4526	4,22	191,08	214	3,57	162	315	315	1052	3477
7	14-3-65	18-9	918	576	4206	4,32	181,74	204	3,81	160	324	324	944	3337
6	10-9-65	20-10	770	559	4325	4,20	181,66	204	3,60	156	292	292	1014	3134
1	7-3-65	25-9	932	645	3742	4,52	169,22	190	3,63	136	317	317	849	3178
13	26-4-65	4-10	891	529	3427	3,93	134,68	151	3,64	125	308	308	664	2887
20 ²	27-8-65	21-10	785	533	3153	4,11	129,72	145	3,64	115	288	288	718	2856
Gns. af 20 kvier			900	551	5121	4,25	217,54	244	3,58	183	304	304	1354	3617

¹ Trepattet efter yverbetændelse.² Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 26. Afkomsprøve for tyren Dybbøl Od,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-teint %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
34	9-6-65	5-9	818	570	8115	4,23	343,05	385	3,69	299	341	341	2442	5008
35	29-4-65	12-9	866	549	7418	4,03	298,80	335	3,72	276	334	334	2097	4685
31	29-4-65	2-10	886	525	5843	4,04	236,02	264	3,70	216	314	314	1508	3925
41	20-5-65	16-10	879	502	5775	3,98	229,94	257	3,72	215	300	300	1471	3713
42	1-6-65	30-9	851	500	5785	3,77	218,03	243	3,74	217	316	316	1399	3761
48	3-5-65	9-10	889	455	5017	4,16	208,75	234	3,74	188	307	307	1227	3581
37	14-4-65	10-10	909	515	4630	4,40	203,95	229	3,93	182	306	306	1172	3557
44	7-5-65	27-9	873	519	4617	4,25	196,25	220	3,94	182	305	305	1138	3480
47	4-3-65	5-11	976	528	4516	4,29	193,91	218	4,02	182	280	280	1096	3255
33	13-5-65	12-9	852	528	4730	3,97	187,76	210	3,65	173	320	320	1121	3519
36	26-2-65	26-9	942	520	4582	3,92	179,57	201	3,76	172	320	320	1042	3481
39	27-5-65	7-11	894	540	4303	4,10	176,38	198	3,83	165	278	278	972	3128
38	22-9-65	19-10	757	525	4109	4,26	174,87	196	3,94	162	297	297	963	3168
32	22-4-65	6-11	928	545	3887	3,92	152,46	170	3,73	145	279	279	814	3038
46	7-10-65	16-11	770	510	3525	4,22	148,69	167	3,82	135	269	269	736	2762
45	19-9-65	22-10	763	543	3262	3,76	122,64	137	3,83	125	294	294	670	2706
Gns. af 16 kvier			866	523	5007	4,08	204,44	229	3,78	189	304	304	1242	3548

s. 28806, på Morsø.

Malketid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,1	2,34	—	18	Morsø Wahl, e.A 4930	Kr. Aggerholm, Ø. Assels.
6,0	1,33	19- 2	24	Morsø Wahl, e.A 4930	Gustav Vilsgaard, Sindbjerg.
4,6	1,88	1-12	13	Morsø Wahl, e.A 4930	Gustav Vilsgaard, Sindbjerg.
5,3	1,59	3-12	34	Gråsten Ørn, e.A 5008	Oluf Petersen, Tødsø.
5,0	1,64	9- 2	44	Morsø Wahl, e.A 4930	Viggo S. Andersen, Vodstrup.
5,4	1,50	9-12	66	Morsø Ejlekær, e.A 4900	Jens Møller, Erslev.
5,7	1,43	6- 5	66	Morsø Loke, r. 27200	Charles Jensen, Fårtoft.
4,4	1,94	27- 3	61	Gråsten Ørn, e.A 5008	J. Kjær Nielsen, Ø. Hvidbjerg.
5,5	1,50	3-12	99	Morsø Sverre, r. 26393	Kristian Olsen, Elsp.
3,6	2,59	26- 1	48	Morsø Ejlekær, e.A 4900	Aage Jepsen, Fredsø.
4,6	1,71	9- 1	64	Morsø Ejlekær, e.A 4900	Charles Jensen, Fårtoft.
3,3	2,53	14- 3	67	Morsø Ejlekær, e.A 4900	Ejnar Aggerholm, Lødderup.
3,8	2,25	1- 5	44	Morsø Ejlekær, e.A 4900	Sv. Jacobsen, Gullerup.
3,4	2,45	— ¹	21	Morsø Vinkel, s. 4844	Magnus Blaabjerg, Thorup.
5,2	1,53	—	32	Morsø Buster, s. 4626	J. Kr. Felthaus, Ml. Jølby.
5,0	1,59	13- 1	98	Nr. 69, f. 2-5-58	Klaus Hyldig, Tødsø.
3,9	2,12	14-12	49	Morsø Vinkel, s. 4844	Gustav Vilsgaard, Sindbjerg.
3,0	2,28	25- 4 ²	189	Morsø Ejlekær, e.A 4900	Jørgen Nørsgaard, Elsp.
3,5	2,05	28- 4	22	Morsø Ejlekær, e.A 4900	Aage Nielsen, Fredsø.
4,1	1,82	9-12	65	Sortemose, s. 4680	S. P. Lyndrup, Fjallerslev.
4,5	1,90				

¹ Kan ikke blive drægtig.² Kastet 13-2 efter ins. 27-11.

s. 28740, på Veesbæk.

Malketid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,6	2,06	— ¹	74	Lau, s. 4810	Jens Jensen, Skelde.
4,1	2,29	26- 1	31	Djurs Gert, s. 4858	Peter Clausen, Lundsgårdsmark.
4,6	1,81	30- 5 ²	105	Skjold, f. 18-7-56	Gråsten Landbrugsskole.
5,3	1,59	27- 2	41	Nørherreds Gram, r. 26499	Chr. Christensen, Lambjerg.
7,3	1,05	7- 3	46	Nørherreds Rolf, r. 26782	Jørgen Eriksen, Bovrup.
3,2	2,63	8- 1	76	Olaf, s. 4809	Hans Jepsen, Staugård.
3,7	2,14	31-12	84	Ole, r. 26209	Andreas Jacobsen, Lavensby.
3,3	2,46	28-11	90	Ørnsvig 21, f. 27-11-56	Henrik Eriksen, Broballemark.
3,9	2,16	7- 3	144	Lau, s. 4810	Erik Nissen, Hovedgården.
3,7	2,21	4-12	43	Olaf, s. 4809	Lorenz Petersen, Pæleværk.
3,2	2,59	23- 2	127	Als Anker II, r. 26779	Erik Nissen, Hovedgården.
3,3	2,49	28-12	61	Dybbøl Bill, r. 27151	Chr. Lassen, Kegnæs.
5,2	1,55	—	68	Olaf, s. 4809	Jens Møller, Augustenhoff.
5,0	1,57	12- 2	39	Dybbøl Nil, r. 27618	Jørgen Iversen, Tombøl.
5,9	1,36	27-12	46	Lums, s. 4856	Ejner Lyck, Birkholm.
3,6	2,14	24-12	52	Gråsten Fynbo, e.B 4985	Laura Schütt, Rinkenæs.
4,4	2,01				

¹ Brummer.² Kastet i maj efter ins. 8-2.

Hovedtabel 27. Afkomspørve for tyren Åbenrå Sortemose.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvle nr.	Født	Kælvn.- dato 1967	Alder ved marts kælvn.	Vægt i kg	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Foder- dage	Kraft- foder f. e.	I alt f. e.	
1	3-	4-65	2-10	912	559	5878	4,84	284,64	321	3,80	224	303	303	1890	4099
18	28-	3-65	29- 9	915	496	5472	4,74	259,51	292	3,67	201	306	306	1702	4053
2	1-	5-65	28- 9	880	558	4765	5,38	256,29	290	4,11	196	307	307	1506	3762
15	28-	3-65	24- 9	910	474	4954	4,93	244,17	275	4,13	205	311	311	1478	3895
11	21-	4-65	26- 9	888	516	4792	5,06	242,70	274	3,91	187	309	309	1427	3922
6	2-	3-65	9- 9	921	572	4981	4,68	233,02	262	3,78	189	326	326	1394	3853
4	6-	4-65	12-11	950	557	4812	4,42	212,57	239	3,81	183	262	262	1357	3330
10	23-	5-65	23-10	883	565	4484	4,70	210,91	237	3,92	176	282	282	1278	3643
3	9-	1-65	10- 9	974	567	3995	4,89	195,52	220	3,94	157	315	315	1104	3453
7	24-	4-65	1-10	890	533	4402	4,43	194,87	219	3,89	171	304	304	1114	3527
16	5-	1-65	30- 9	998	528	4595	4,22	193,90	217	3,74	172	305	305	1200	3504
14	25-	4-65	13- 9	871	508	4449	4,35	193,47	217	3,67	163	312	312	1119	3575
5	24-	2-65	25- 9	943	569	4087	4,65	190,22	214	4,08	167	310	310	1051	3436
13	2-	5-65	8- 9	859	526	4107	4,61	189,42	213	3,89	160	324	324	1001	3608
17	22-	3-65	14- 9	906	528	3630	4,99	181,30	204	3,98	145	318	318	956	3236
21	15-	3-65	7-10	936	528	3688	4,37	161,00	181	4,02	148	298	298	909	3210
20	21-	3-65	28-10	951	542	3112	5,06	157,48	178	3,84	119	277	277	836	2934
8	30-	3-65	12- 9	896	600	2661	4,94	131,44	148	4,11	109	323	323	749	3004
12	21-	3-65	19-10	942	538	2817	4,53	127,62	143	3,90	110	286	286	686	2866
9 ¹	11-	4-65	8-10	910	609	2679	4,65	124,56	140	3,98	107	297	297	840	3075
Gns. af 20 kvier				917	544	4218	4,72	199,23	224	3,90	164	304	304	1180	3495

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 28. Afkomspørve for tyren Sortkær

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvle nr.	Født	Kælvn.- dato 1967	Alder ved marts kælvn.	Vægt i kg	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Foder- dage	Kraft- foder f. e.	I alt f. e.	
1	25-	2-65	5-10	952	574	6960	3,93	273,64	306	3,42	238	301	2056	4094	
7	2-	3-65	28- 9	940	587	5661	4,48	253,78	285	3,62	205	308	1731	3829	
8	2-	3-65	3- 9	915	585	4873	5,13	250,21	282	3,90	190	333	1574	3802	
5	26-	2-65	4-10	950	550	5029	4,57	229,62	258	3,57	180	302	1538	3677	
16	20-	3-65	15- 9	909	542	5182	4,39	227,51	256	3,68	191	321	1464	3533	
18	18-	9-65	22-10	764	477	4556	4,67	212,77	239	3,65	166	284	1387	3385	
4	23-	1-65	28-10	1008	606	4780	4,33	206,87	232	3,71	177	278	1385	3167	
13	12-	2-65	21- 9	951	551	4750	4,24	201,48	226	3,53	168	315	1300	3385	
14	7-	4-65	1- 9	877	555	4096	4,39	179,68	202	3,68	151	335	1060	3358	
11	1-	4-65	26-10	938	511	4288	4,15	177,78	199	3,56	153	280	1138	3247	
10	7-	1-65	26- 9	992	611	3976	4,23	168,24	189	3,72	148	310	1050	3065	
9	29-	1-65	19-10	993	522	3484	4,48	156,11	175	3,79	132	287	918	2952	
17	14-	4-65	2-10	901	536	3445	4,48	154,45	174	3,81	131	304	926	2886	
2	8-	2-65	6-10	970	624	3129	4,72	147,74	166	4,05	127	300	929	2943	
15	26-	3-65	4-10	922	548	2816	4,87	137,06	154	4,04	114	302	833	2895	
Gns. af 15 kvier				932	559	4468	4.44	198,46	223	3.69	165	304	304	1286	3345

s. 28743, på Brøstrupgård.

Malke- i min.	Malk- tid bar- hestal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,0	2,32	12- 6	75	Åbenrå Pan, r. 27410	Marquard Thomsen, Vester Terp.
5,0	1,70	27-12	39	Åbenrå Ulv, s. 4738	Herbert Lousen, Barsmark.
3,2	2,52	26- 2	153	Bornholms Guldal, s. 4841	Hans Wind Christensen, Hellevad.
3,4	2,47	18-12	43	ukendt	Jørgen Lorentzen, Årup.
3,4	2,39	9-12	196	Djurs Gert, s. 4858	Jens Groth Christensen, Hellevad.
3,2	2,46	11-12	54	Åbenrå No, r. 26586	Peter Bonde, Uge.
5,1	1,65	21- 3	18	Åbenrå No, r. 26586	Jørgen Bertelsen, Genner.
4,2	2,00	8- 1	76	Åbenrå Lang, r. 27041	Niels P. Rasmussen, Nørreskov.
3,5	2,13	27-11	58	Åbenrå Ulv, s. 4738	Andreas Petersen, Travsted.
3,6	2,15	26-12	36	Åbenrå Lang, r. 27041	Arthur Jessen, St. Jyndeved.
5,0	1,62	18-12	229	Åbenrå Pan, r. 27410	Niels Justesen, Bolderslev.
3,8	2,03	27-11	65	Åbenrå Høj, r. 26222	Nis Bejer, Visbjerg.
5,2	1,51	9-12	57	Åbenrå Holm, r. 26223	Johs. Torp, Nybølsskov.
4,6	1,64	2-12	97	Kørbitz 40, r. 25800	Asmus Jepsen, Stubbæk.
3,2	2,16	29-11	51	Åbenrå Ager, r. 26585	Jørgen Warming, Stollig.
6,3	1,30	25- 1	66	Åbenrå Vig, e.B 4887	Niels Jørgensen, Årslev.
5,2	1,52	3- 1	54	Rødning Golf, r. 27037	Verner Hansen, Løgumkloster.
4,2	1,57	27- 2 ¹	34	Åbenrå Lang, r. 27041	Villy Christensen, Sdr. Hostrup.
2,7	2,43	12- 2	37	Åbenrå Pan, r. 27410	Herbert Lousen, Barsmark.
4,0	1,69	13- 1	61	Åbenrå Vig, e.B 4887	Andreas Petersen, Travsted.

4,1 1,96

¹ Kastet 15-1 efter ins. 21-11.

s. 28824, på Kalø.

Malke- i min.	Malk- tid bar- hestal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,2	1,73	24- 5	81	Højmark, r. 26511	Jens Andersen, Haldum.
4,0	2,10	8-12	164	Hadsten Wahl, e.A 4940	Aksel Rasmussen, Røved.
2,3	3,57	2- 1	79	Ejlekær, s. 4416	Børge Pedersen, Hallendrup.
4,0	2,18	20-12	28	Sortemose, s. 4680	Knud Holm Sørensen, Erslev.
4,5	1,83	9- 3	77	Højmark, r. 26511	Jens Sørensen Balle, Haldum.
5,2	1,58	10- 1	24	Hadsten Jess, s. 28061	Groes Helles, Søby.
5,7	1,41	28-12 ¹	76	Hadsten Wahl, e.A 4940	Tage Østergaard, Vissing.
4,8	1,65	21- 2	69	Hadsten Wahl, e.A 4940	Hans Godtfredsen, Lyngå.
4,5	1,68	30- 3 ²	61	Højmark, r. 26511	Vagn Thomsen, Hadsbjerg.
4,0	2,05	15- 1	34	Poul Ruholm, s. 4850	Chr. Nielsen, Grundfør.
4,6	1,71	11-12	143	Ejlekær, s. 4416	Tage Særkær, Højstrup, Ødum.
5,2	1,49	25- 4 ³	165	Højmark, r. 26511	Aksel Rasmussen, Røved.
4,8	1,58	24- 1	51	Lervang, r. 26281	Niels Braad, Haldum.
7,0	1,19	21- 2	29	ukendt	Niels Thomsen, Spørring Kær.
4,7	1,57	23- 2	17	ukendt	Jens Sørensen Balle, Haldum.

4,7 1,82

¹ Kastet.² Kastet 9-7. Har desuden kastet 14-2 efter ins. 2-12.³ Kastet i februar efter ins. 16-12.

Hovedtabel 29. Afkomsprøve for tyren Dybbøl Rhin.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved marts	Vægt i kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-teint %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
9	6- 3-65	13-10	951	545	6539	4,25	277,93	312	3,55	232	289	289	1907	4129
15	23- 2-65	21- 9	940	552	5843	4,61	269,48	303	3,79	222	311	311	1713	4173
13	15- 2-65	20- 9	947	593	6356	3,87	245,68	275	3,59	228	305	305	1711	4045
2	5- 2-65	29- 9	966	619	5296	4,47	236,51	266	3,89	206	303	303	1461	3791
12	25-12-64	13- 9	992	588	5110	4,45	227,36	255	3,85	197	319	319	1370	3772
8	3- 3-65	28- 9	939	592	4725	4,38	206,73	232	3,67	174	304	304	1240	3434
5	14- 1-65	21- 9	980	638	4436	4,43	196,32	221	3,81	169	304	304	1087	3379
1	8- 2-65	12- 9	946	640	4480	4,32	193,49	217	3,58	160	320	320	1114	3643
10	6- 2-65	4-10	970	584	4184	4,60	192,67	217	3,79	159	298	298	1053	3153
17	30- 1-65	18- 9	961	556	4282	4,38	187,62	211	3,83	164	300	307	1098	3367
14	5- 3-65	2-10	941	556	4213	4,26	179,59	201	3,72	157	293	293	1043	3265
4	24-12-64	7- 9	987	616	3962	4,50	178,10	200	3,92	155	311	318	1039	3447
19	9- 1-65	7-10	1001	558	3930	4,49	176,36	198	3,87	152	274	295	1077	3264
6	15- 3-65	17- 9	916	615	3583	4,74	169,95	191	3,99	143	308	308	856	3136
3	18- 3-65	24- 9	920	622	4154	4,07	169,19	189	3,63	151	294	308	987	3245
16	25-12-64	19- 9	998	560	3325	4,79	159,24	179	3,93	131	299	306	836	3142
7	17- 2-65	10- 9	935	621	3587	4,36	156,24	175	3,80	136	308	315	843	3158
20	7- 3-65	4-11	972	531	3377	4,33	146,38	164	3,82	129	260	267	772	2803
18	28- 1-65	19- 9	964	586	2727	4,52	123,32	139	3,83	104	292	306	638	2769
Gns. af 19 kvier			959	588	4427	4,39	194,32	218	3,77	167	300	304	1150	3427

Hovedtabel 30. Afkomsprøve for tyren Varde Bram,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved marts	Vægt i kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-teint %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
38	1- 7-65	2-10	823	531	6256	4,18	261,63	293	3,70	231	312	312	1664	3870
34	29- 8-65	9- 9	741	496	5342	4,69	250,40	282	3,72	199	316	316	1472	3902
42	20- 8-65	17- 9	758	452	5494	4,49	246,61	277	3,64	200	327	327	1397	3899
32	19- 6-65	16-10	849	531	5270	4,25	223,85	251	3,63	191	298	298	1314	3803
49	30- 9-65	9-11	770	446	4684	4,63	216,71	244	3,83	180	274	274	1213	3378
44	16- 6-65	12- 9	818	500	4837	4,19	202,87	227	3,76	182	313	313	1162	3560
35	9- 9-65	23- 9	744	536	4610	4,27	196,84	221	3,81	176	309	309	1063	3509
39	14- 5-65	5-10	874	535	4335	4,42	191,64	215	3,81	165	309	309	964	3322
43	2- 9-65	2-10	760	492	4086	4,47	182,64	205	3,76	154	312	312	935	3360
36	17- 9-65	2-10	745	490	3863	4,54	175,30	197	4,10	158	307	307	830	3231
33	20- 8-65	22- 9	763	528	3806	4,46	169,62	191	3,75	143	322	322	848	3293
37	16- 5-65	12-10	879	520	3932	4,16	163,52	183	3,69	145	302	302	801	3141
45	19- 8-65	29-10	801	501	3655	4,45	162,51	183	3,83	140	285	285	760	2993
40	26- 5-65	19-10	876	523	3631	4,33	157,35	177	3,83	139	295	295	697	2843
46	20-10-65	24-10	734	457	2981	4,32	128,89	145	3,89	116	290	290	604	2711
31	20- 5-65	16-10	879	564	2597	4,39	114,07	128	4,00	104	286	298	536	2680
Gns. af 16 kvier			801	506	4336	4,39	190,28	214	3,78	164	304	304	1016	3343

f. 17-1-63, på Veeshæk.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,8	1,42	4-12	58	Olaf, s. 4809	Peter Christensen, Hokkerup.
4,0	2,19	27-12	57	Olaf, s. 4809	Jes Petersen, Ulkebøl.
5,4	1,57	25-11	91	Gråsten Fynbo, c.B 4985	Chr. Ihle, Dubjerg.
7,6	1,01	26- 3	67	Gråsten Fynbo, c.B 4985	Jens Jensen, Skelde.
5,7	1,41	15-12	58	Olaf, s. 4809	Hans Petersen, Stevning.
7,8	1,02	15- 2	16	Olaf, s. 4809	Nis Christensen, Hønsnap.
5,6	1,42	25-11 ¹	91	Gråsten Sortemose, r. 26780	Johan Friederichsen, Bovrup.
5,2	1,54	29-11	62	Rollo, s. 4679	Frede Toft, Dynt.
7,1	1,13	26- 3	58	Olaf, s. 4809	Hans Christensen, Lysborg.
6,0	1,34	23-11	56	Gråsten Sortemose, r. 26780	Chr. Lassen, Kegnæs.
8,0	1,01	28-11	15	Gråsten Karl, r. 26496	Holger Warncke, Bovrup.
5,9	1,36	25-11	20	Olaf, s. 4809	Claus Nielsen, Ulkebølskov.
7,4	1,08	27-12	77	Lums, s. 4856	H. Lassen Jørgensen, Felsted.
7,3	1,14	23-11	62	Lums, s. 4856	Jes P. Hansen, Sdr. Hostrup.
6,2	1,30	13-12	83	Lums, s. 4856	Herluf Sørensen, Christiansminde.
4,9	1,54	23-11	58	Lums, s. 4856	Hans W. Petersen, Rinkenæs.
6,4	1,27	27-11	19	Vaks, r. 24403	Chr. E. Christensen, Asserballe.
6,9	1,18	20- 1	54	Lau, s. 4810	Frantz Karlson, Oksbølmark.
5,8	1,34	27-11	48	Nr. 20, f. 27-9-57	Mads Schmidt Eriksen, Broballe.
6,3	1,33				

¹ Kastet i juli.

s. 28713, på Vardegård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,2	2,15	6- 4	37	Varde Bol, r. 27832	Arne K. Thomsen, Sdr. Hebo.
3,6	2,37	23-11	98	Varde Rud, s. 28086	Niels Madsen, Hoddeskov.
4,1	2,03	1- 4	55	Varde Nør, r. 27124	Arne Dahl, Stenderup.
5,4	1,50	15- 1	16	Skive Mark, r. 27183	William Jessen, Grindsted Mark.
7,2	1,09	27- 1	121	Varde Gynn, r. 27042	Jens Henneberg, Kvong.
4,6	1,78	27-11	77	Varde Roht, r. 27044	Hans Larsen, Forum.
4,3	1,86	1-12	59	ukendt	Erik Agersnap, Rotbøl.
4,3	1,80	4- 6	27	Lærk, s. 4803	Rich. Pedersen, Kjærising.
8,7	0,98	10- 1	41	ukendt	Harald Nielsen, Vestermarken.
3,3	2,25	7-12	69	Varde Sam, r. 26464	Trier Kristensen, Frøstrup.
3,9	1,90	12-12	12	ukendt	Hans Paulsen, Bahl.
4,0	1,97	29- 1	52	Varde Gør, r. 26689	Johs. Pedersen, Eg.
3,0	2,36	17- 1	6	ukendt	Gunner Burgdorf, Tistrup.
6,6	1,23	1- 4	53	Ullsager, s. 4268	Thomas Jensen, Henneby.
5,0	1,50	19- 1	64	Varde Sven, r. 27865	S. Kirkegaard Jensen, Vrenderup.
4,2	1,68	22- 1	36	ukendt	Ove S. Larsen, Hoddemark.
4,8	1,78				

Hovedtabel 31. Afkomsprøve for tyren Ejlekær Sydvest,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
12	25-4-65	14-9	872	521	6648	4,19	278,86	313	3,68	244	313	313	1841	4072
8	16-12-64	2-9	990	528	6092	4,53	275,71	310	3,81	232	325	325	2102	4607
7	17-12-64	6-9	993	578	5277	5,15	271,67	307	3,98	210	312	312	1573	3926
17	30-8-65	16-9	747	511	4966	4,70	233,58	263	3,77	187	302	302	1508	3865
6	2-8-65	10-10	799	545	4840	4,78	231,42	261	3,98	193	287	287	1668	3868
9	18-3-65	28-9	924	581	4901	4,27	209,06	235	3,67	180	299	299	1191	3284
15	1-9-65	18-9	747	521	4503	4,50	202,83	228	3,60	162	309	309	1058	3420
1	16-3-65	19-9	917	623	5049	3,84	193,94	217	3,39	171	306	306	1205	3727
10	22-5-65	26-9	857	546	4049	4,36	176,69	198	3,81	154	301	301	929	3064
3	19-3-65	30-8	894	621	3823	4,54	173,49	195	3,83	147	298	298	976	3558
19	26-5-65	8-9	835	500	4358	3,82	166,32	186	3,52	153	319	319	862	3221
16	13-1-65	15-9	975	522	3941	4,21	166,10	186	3,60	142	312	312	867	3184
14	8-2-65	14-10	978	492	4061	3,88	157,68	176	3,66	149	283	283	1183	3155
13	19-4-65	2-9	866	550	3414	4,45	152,09	171	3,81	130	302	302	749	2943
2	22-12-64	6-10	1018	628	3057	4,48	136,91	154	3,83	117	291	291	826	2808
11 ¹	13-12-64	2-10	1023	592	3068	4,43	135,95	153	3,91	120	295	295	632	2695
20 ¹	27-2-65	31-8	915	502	2968	4,58	135,86	153	3,85	114	297	304	724	2871
18 ¹	1-4-65	2-9	884	538	3054	4,26	130,03	146	3,73	114	295	295	673	2733
5	8-3-65	9-9	915	627	2272	4,64	105,39	119	4,03	92	318	318	656	2601
Gns. af 19 kvier			903	554	4228	4,40	185,98	209	3,75	158	303	304	1117	3347

¹ Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 32. Afkomsprøve for tyren Sydvestfyns Fast,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
39	16-7-65	23-10	829	469	5161	4,56	235,11	264	3,79	196	283	283	1396	3775
42	20-8-65	9-10	780	498	4688	4,93	230,91	260	3,98	187	297	297	1313	3608
45	6-8-65	12-10	797	488	4733	4,73	223,84	252	3,96	188	294	294	1285	3558
38	21-7-65	27-9	798	515	5371	4,10	220,29	247	3,78	203	309	309	1342	3713
31 ¹	4-4-65	19-9	898	542	4507	4,68	210,84	237	3,91	176	317	317	1176	3530
40	16-7-65	30-9	806	546	4527	4,63	209,59	236	3,72	168	295	295	1198	3451
36	11-6-65	8-9	819	621	4084	4,79	195,44	220	4,07	166	310	310	1102	3511
43	15-5-65	6-10	874	566	4000	4,73	189,35	213	3,98	159	300	300	951	3231
48	27-8-65	5-10	769	573	3801	4,96	188,58	213	4,21	160	297	297	926	3292
49	24-3-65	22-9	912	541	3687	5,02	184,98	209	4,21	155	314	314	911	3266
35	10-4-65	17-10	920	562	4019	4,58	184,15	207	3,90	157	289	289	988	3292
33	25-6-65	19-10	846	581	3898	4,41	172,04	193	3,94	154	287	287	896	3077
44	21-5-65	14-9	846	507	2916	5,56	162,26	184	4,29	125	322	322	695	3035
47 ²	26-6-65	22-9	818	498	3172	5,11	161,95	183	4,29	136	314	314	692	3160
41	27-7-65	7-10	802	527	3546	4,41	156,46	176	3,91	138	299	299	723	2949
50 ³	4-5-65	4-10	883	521	2867	5,04	144,55	163	4,32	124	302	302	649	2901
34	17-5-65	19-9	855	584	2983	4,77	142,39	160	4,00	119	317	317	614	2960
46	17-8-65	27-9	771	500	3138	4,52	141,87	159	3,93	123	309	309	623	3075
32	13-3-65	10-9	911	640	2233	5,21	116,23	131	4,26	95	326	326	549	2908
Gns. af 19 kvier			839	541	3860	4,73	182,68	206	3,99	154	304	304	949	3279

¹ Højre bagpatte blokket op.² Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning. Venstre bagpatte blokket op.³ Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

s. 28791, på Grønhøjgård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
6,2	1,30	6- 2 ¹	22	ukendt	Carl Beirholm, Ørslev.
3,8	2,30	13- 1	64	Snap, s. 4835	Sv. Aage Rasmussen, Gerlev.
3,7	2,20	20-11	8	Hjalte, s. 4828	Sv. Aage Rasmussen, Gerlev.
3,6	2,35	20-11	74	Abel Sydvest, e.B 4913	William Aaskov, Seerdrup.
3,2	2,65	6-12	25	Pilot, s. 4464	Hans Andersen, Nordrup.
5,2	1,55	5-12	90	Thor, s. 4665	Hans Jensen, Flemstofte.
2,5	3,28	21-12	39	Ørn, s. 4730	J. Kristensen, Erdrup Enghave.
3,2	2,58	25-11	49	Ørn, s. 4730	Henrik Larsen, Gudum.
4,2	1,86	13-12	1	Thor, s. 4665	Knud Olsen, Bendslev.
1,9	3,57	25-10	14	Ras, s. 4402	Viggo Petersen, Ting-Jellinge.
3,2	2,43	29-11	91	Ras, s. 4402	Valdemar Hansen, Gudum.
2,8	2,59	18- 3	74	Give 62, r. 25732	Johs. Nielsen, Gudum.
5,6	1,43	28- 3	36	Thor, s. 4665	Arne Larsen, Lyng-Eskildstrup.
1,6	4,14	31-10	71	Rørby, s. 4535	Aage Simonsen, Fårdrup.
1,8	3,23	15- 1	39	Gorm Sydvest, e.A 4878	Frede Rasmussen, Frølund.
2,6	2,53	4-12	84	Gorm Sydvest, e.A 4878	Lars Jensen, Lundby.
3,0	2,25	31-10	63	Rørby, s. 4535	Chr. Sardal, Esholte.
2,2	2,84	25-10	43	Ørn, s. 4730	Ejvind Petersen, Flakkebjerg.
1,6	2,80	4-12	87	Ørn, s. 4730	Arvid Larsen, Stigsnaes.
3,3	2,52				

¹ Kastet 4-7.

s. 28181, på Ejstrupgård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
10,1	0,71	2- 1	39	Sydvestfyns Rørbæk, s. 4646	A. Jørgensen, Sø Søby.
7,0	1,14	8-12	39	Sydvestfyns Merkur, r. 26701	Brdr. Jørgensen, Bregnemose.
6,8	1,17	6- 1	52	Sydvestfyns Ekko, s. 4702	Peter Hansen, Helnæs.
7,1	1,12	13- 2	33	Sydvestfyns Ekko, s. 4702	Peter Hansen, Helnæs.
6,1	1,31	3- 5	18	Sydvestfyns Helt, s. 4820	Peter Hansen, Hesle.
8,0	0,99	27-11	18	Sydvestfyns Opus, s. 4819	Jens Jørgen Jensen, Sjød.
5,8	1,39	16-11	38	ukendt	P. Rasmussen, Ebberup.
4,6	1,67	30- 4	68	Sydvestfyns Al, e.A 4910	Søren Leth, Vøjstrup.
5,3	1,49	1-12 ¹	38	Rudme Ideal, e.A 4864	Johs. Pedersen, Snav.
5,7	1,38	19- 1	7	Sydvestfyns Al, e.A 4910	Carl Pedersen, Dærup.
6,0	1,32	3- 1	11	Sydvestfyns Pan, s. 4590	Hans Jacobsen, Glamsbjerg.
6,6	1,23	24- 1	22	Sydvestfyns Rørbæk, s. 4646	Johs. Petersen, Kirke Søby.
4,6	1,55	23- 3	9	Sydvestfyns Lux, s. 4589	Asger Pedersen, Trunderup.
6,6	1,24	6-12	43	Sydvest, s. 4270	L. Graversen, Enemærket.
4,0	1,83	3- 5	61	Sydvestfyns Al, e.A 4910	J. Illum Møller, Nappe Mark.
6,8	1,23	15- 1	33	Sydvestfyns Merkur, r. 26701	Peter Hansen, Hesle.
4,5	1,61	8- 2	45	Sydvestfyns Toke, r. 25670	Rich. Absalonsen, Mosebo.
5,4	1,43	8- 1	123	Sydvestfyns Ursus, s. 4701	Carl Rabøl, Aborg.
4,6	1,48	16-12	34	Sydvestfyns Merkur, r. 26701	Johs. Petersen, Kirke Søby.
6,1	1,33				

¹ Kastet 4-8.

Hovedtabel 33. Afkomsprøve for tyren Skive Bert,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved marts kælvn.	Vægt i kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
46	29-4-65	17-9	871	464	8444	4,33	365,67	410	3,53	298	323	323	2604	4965
40	12-3-65	11-9	913	432	7046	4,88	343,98	388	3,88	274	329	329	2270	4738
37	19-2-65	13-9	936	527	8117	4,13	335,17	376	3,54	287	327	327	2383	4860
47	24-5-65	13-10	872	548	6844	4,31	294,91	331	3,56	243	297	297	2039	4286
33	15-2-65	21-9	948	485	6695	4,37	292,83	329	3,52	236	319	319	2014	4528
441	6-3-65	12-10	950	513	6334	4,49	284,17	319	3,73	236	298	298	1901	4297
48	3-6-65	11-10	860	491	6101	4,37	266,79	300	3,72	227	299	299	1750	3941
32	1-3-65	24-10	967	436	5279	4,95	261,35	295	3,63	192	286	286	1595	3870
41	26-5-65	13-9	840	511	6001	4,23	253,58	284	3,74	224	326	326	1634	4212
39	29-3-65	11-11	957	572	5886	4,25	250,05	280	3,63	214	268	268	1671	3892
42	22-5-65	28-9	859	503	5670	4,35	246,42	277	3,72	211	312	312	1537	4015
38	26-2-65	3-10	949	606	5270	4,64	244,79	275	3,79	200	307	307	1464	3702
36	30-4-65	1-10	884	554	5431	4,50	244,22	275	3,84	209	309	309	1516	3906
49	8-2-65	25-9	959	470	5622	4,07	228,63	256	3,33	187	315	315	1414	3832
45	7-4-65	7-11	944	551	4330	4,86	210,48	237	4,05	175	272	272	1212	3285
35	24-2-65	29-9	947	592	4645	4,40	204,58	230	3,87	180	311	311	1198	3649
31	14-9-65	8-11	785	508	4509	4,25	191,53	215	3,43	155	271	271	1118	2984
43	17-3-65	11-9	908	585	3543	4,33	153,24	172	3,62	128	307	307	874	3311
Gns. af 18 kvier			908	530	5876	4,42	259,58	292	3,66	215	304	304	1677	4015

1 Yverbetændelse i alle patter ved kælvning.

Hovedtabel 34. Afkomsprøve for tyren Bjerringbro Frans,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved marts kælvn.	Vægt i kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
35	8-4-65	15-9	890	576	7191	4,68	336,58	379	3,67	264	317	317	2328	4797
42	10-8-65	7-11	819	577	6559	4,95	324,96	366	3,48	228	264	264	2323	4333
41	7-7-65	17-10	832	566	6591	4,69	309,28	348	3,57	236	285	285	2163	4233
47	24-1-65	28-8	946	549	6492	4,59	298,05	335	3,63	236	335	335	2001	4617
45	23-2-65	13-9	932	552	6146	4,65	285,72	322	3,77	232	319	319	1865	4272
37	6-3-65	1-10	939	631	6449	4,39	283,02	318	3,81	246	301	301	2006	4454
49	11-3-65	21-9	924	593	6120	4,60	281,29	316	3,79	232	311	311	1866	4165
38	26-4-65	13-9	870	571	6087	4,60	280,15	315	3,77	229	319	319	1837	4416
50	21-2-65	6-10	957	540	6281	4,43	278,10	312	3,73	234	296	296	1905	4109
46	18-2-65	20-10	974	589	5583	4,86	271,54	306	3,58	200	282	282	1777	3795
44	16-1-65	4-9	961	595	5208	5,04	262,58	296	3,79	197	328	328	1580	3997
40	23-5-65	27-9	857	600	5513	4,44	244,94	275	3,84	212	305	305	1601	3913
33	22-3-65	30-9	922	581	5029	4,81	241,90	273	3,99	201	302	302	1456	3716
43	21-5-65	20-10	882	570	5870	3,97	232,83	260	3,78	222	282	282	1624	3780
34	16-4-65	20-9	887	638	5432	4,17	226,30	254	3,52	191	312	312	1392	3788
361	8-4-65	5-9	880	614	4613	4,62	213,00	240	3,92	181	327	327	1337	3917
31	1-3-65	5-11	979	609	5614	3,75	210,44	235	3,59	201	266	266	1454	3524
32	3-4-65	10-10	920	570	4212	4,73	199,16	224	3,97	167	292	292	1240	3532
39	12-2-65	14-9	944	612	4055	4,22	170,97	192	3,72	151	318	318	967	3347
48	9-8-65	23-9	775	576	3657	4,31	157,68	177	3,83	140	309	309	880	3186
Gns. af 20 kvier			905	585	5635	4,53	255,42	287	3,73	210	304	304	1680	3995

1 Højre forpatte uden kanal.

7245, på Krarup Nygård.

Malk- tid min.	Malk- bar- min. hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
6,1	1,32	14- 5	138	Skive Holt, s. 6811	Svend Jeppesen, Krejbjerg.
3,4	2,73	—	82	Århus Coba, e.A 66	Bertel Hald, Lihme.
6,6	1,14	22- 1	58	Skive Pluto, e.A 26	Kresten Kirk Jensen, Frammerslev.
5,4	1,59	26- 1	68	Skive Juvel, s. 6655	Ejgil Have Pedersen, Lånem.
4,4	2,03	26- 1	12	Skive Foss, s. 6810	Peder Goul, Vinde.
5,2	1,65	22-12	13	Wolan, e.s. 6141	Kristian Faarbæk, Engedal.
4,6	1,89	9- 1 ¹	55	ukendt	Chr. Nørgaard, Rønbjerg.
5,0	1,67	12- 2	37	Skive Foss, s. 6810	Frederik Dahl, Vejsmark.
6,0	1,33	6-12	8	Skive Holt, s. 6811	Anker Møller Vraa, Bajlum.
5,8	1,44	9- 1	43	Kees, e.s. 6290	Kristian Jensen, Engedal.
4,2	2,03	27- 1	87	Arup, e.s. 6213	Ejvind Toftgaard, Balling.
3,7	2,21	31-12	54	ukendt	Karl Graugaard, Bustrup.
6,2	1,28	17- 1	88	Skive Sultan, s. 7131	Kristian Jensen, Vinkel.
4,8	1,72	—	73	Kees, e.s. 6290	Erik Bilstrup, Lundholm.
3,6	2,36	19- 1	37	Otto, s. 6746	Hans Hansen, Oddense.
8,0	1,04	28-12	98	Skive Pluto, e.A 26	Ingomar Dueholm, Ø. Børsting.
4,4	1,95	5- 1	46	Skive Dolfus, s. 7244	Svend Aage Jensen, Sdr. Feldingbjerg.
4,0	1,78	15-11	54	Hvam, e.s. 6364	Jens Møller, Hvidbjerg.
5,1	1,73				

¹ Kastet 20-6.

7480, på Rosenfeldt.

Malk- tid min.	Malk- bar- min. hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,3	2,89	6- 2	4	Kastor, e.A 4	Vilhelm Jensen, Sahl.
4,8	1,92	7- 5	6	Sdj. Ernst, e.A 44	J. Esp Sørensen, Bjerring.
3,4	2,96	17- 4 ¹	92	Kastor, e.A 4	Poul Johansen, Mammen.
3,8	2,32	26-12	91	Strib, e.A 24	Johannes Christensen, Grauballe.
4,4	1,94	8- 2	5	Kastor, e.A 4	Johannes Andersen, Vejrumbro.
5,2	1,63	19- 2	70	ukendt	Erik Bjerre, Hvorslev.
5,3	1,57	5- 2	78	Ahlm, s. 6321	E. Koue Christensen, Hjorthede.
4,6	1,82	9-12	62	Obel, e.s. 6096	Emil Mikkelsen, Hjerminde.
2,3	4,16	19- 4	5	153 Foch, sv.s. 26351	Rasmus Christensen, Futting.
5,2	1,60	8- 4	60	Kastor, e.A 4	Christian Hansen, Vindum.
3,0	2,64	20- 2	68	Kastor, e.A 4	Christian Hansen, Vindum.
5,0	1,66	12- 2	17	Gorm, s. 6478	Kristen Bach, Bjerring.
3,1	2,71	20- 3	11	Kastor, e.A 4	Regnar Kristensen, Årup.
4,6	1,88	15- 6	83	Kastor, e.A 4	Magnus Andersen, Astrup.
3,9	2,11	8- 1	24	ukendt	Eskild Bjerre, Enslev.
3,1	2,24	3- 2	75	Kastor, e.A 4	Poul Johansen, Mammen.
5,6	1,50	17- 1	72	Kastor, e.A 4	Knud Nielsen, Lund, Højslev.
4,5	1,76	18- 3	56	Bjerringbro Wouter, s. 6951	Henry Lund, Torup, Ulstrup.
3,6	2,00	26- 1	51	Ahlm, s. 6321	Knud Mortensen, Vellev.
3,6	1,97	25- 1	15	ukendt	Svend Pedersen, Højbjerg.
4,1	2,16				

¹ Kastet 11-7.

Hovedtabel 35. Afkomsprøve for tyren Thy Dros

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
10	6-5-65	1-9	848	520	7338	4,29	314,98	353	3,37	247	335	335	2126	469
6	24-5-65	18-9	847	600	6754	4,52	305,52	343	3,56	241	318	318	1978	443
15	17-4-65	6-10	902	570	6238	4,59	286,46	322	3,48	217	300	300	1832	407
16	23-3-65	12-10	933	541	6247	4,31	269,38	302	3,36	210	294	294	1725	403
12	14-3-65	4-9	904	588	6402	4,11	262,86	294	3,35	214	328	328	1680	427
7	28-2-65	21-9	935	571	5473	4,54	248,30	279	3,54	193	315	315	1453	402
14	21-4-65	17-10	909	562	5568	4,46	248,07	279	3,48	194	289	289	1506	380
2	17-1-65	23-9	979	664	6154	4,01	246,73	276	3,42	210	313	313	1534	397
4	20-5-65	13-9	846	659	5845	4,19	244,86	275	3,54	207	323	323	1475	402
3	20-3-65	7-10	931	586	5328	4,55	242,49	273	3,60	192	299	299	1445	385
9	17-2-65	17-10	972	554	5624	4,15	233,17	261	3,55	200	289	289	1455	369
17	2-3-65	10-10	952	655	5230	4,33	226,52	254	3,67	192	296	296	1361	374
21	25-10-64	8-11	1109	587	4867	4,42	215,00	242	3,78	184	267	267	1269	322
20	26-8-65	4-11	800	574	4891	4,40	214,97	241	3,64	178	271	271	1243	338
5 ¹	15-4-65	17-10	915	609	4950	4,32	213,97	240	3,69	183	289	289	1227	364
1	1-1-65	10-9	982	673	5327	4,02	213,96	239	3,26	174	326	326	1311	397
8	19-4-65	25-9	889	592	4685	4,43	207,74	233	3,75	176	311	311	1207	368
18	10-4-65	3-9	876	599	4910	4,08	200,09	224	3,59	176	333	333	1109	376
13	4-5-65	19-10	898	616	4799	3,84	184,40	206	3,22	155	287	287	1063	334
Gns. af 19 kvier			917	596	5612	4,29	241,02	270	3,51	197	304	304	1474	387

¹ Venstre forpatte uden kanal.

Hovedtabel 36. Afkomsprøve for tyren Kolding Bo

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
31	26-4-65	15-9	872	547	6948	4,29	298,14	335	3,70	257	327	327	2069	458
43	5-3-65	13-9	922	545	6151	4,67	287,11	323	3,69	227	329	329	1888	410
36	19-5-65	14-9	848	582	6187	4,61	285,12	321	3,75	232	325	325	1851	446
41	29-5-65	26-9	850	493	6160	4,58	282,25	317	3,69	227	316	316	1843	410
42	25-5-65	7-9	835	525	5380	4,96	266,69	301	3,85	207	318	318	1664	394
48	29-9-65	8-10	739	495	6325	4,11	259,83	291	3,61	229	304	304	1815	408
32	20-6-65	9-9	811	513	5517	4,64	255,91	288	3,72	205	323	323	1596	405
40	18-8-65	19-10	792	480	6389	3,96	253,21	283	3,60	230	293	293	1804	401
44	28-4-65	19-10	904	553	5812	4,20	244,15	274	3,58	208	293	293	1621	377
45	3-8-65	14-10	802	523	5393	4,43	238,83	268	3,67	198	298	298	1546	382
39	29-5-65	23-10	877	508	5128	4,65	238,70	269	3,90	200	289	289	1515	375
33	24-4-65	7-11	927	496	5117	4,51	230,68	259	3,75	192	274	274	1486	356
38	8-6-65	7-10	851	573	4831	4,70	226,98	256	3,98	192	305	305	1346	362
37	25-9-65	20-9	725	545	5259	4,22	222,07	249	3,58	188	305	305	1430	383
50	23-6-65	2-10	831	498	4734	4,66	220,41	248	3,80	180	310	310	1303	358
34	22-6-65	19-9	819	509	4391	4,94	216,88	245	3,99	175	323	323	1196	355
47	7-6-65	1-11	877	577	4384	4,47	195,94	220	3,90	171	280	280	1129	317
46	22-9-65	9-11	778	475	4600	4,19	192,96	216	3,74	172	272	272	1195	327
49	30-9-65	15-10	745	499	2595	4,47	116,11	130	3,87	100	297	297	685	280
Gns. af 19 kvier			832	523	5332	4,47	238,52	268	3,74	200	304	304	1525	379

7396, på Kronborg.

Malketid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2,5	3,84	10-12	41	Thy Gran, e.s. 6566	Peter Kjær, Jegindø.
3,7	2,41	5- 1	96	Thy Gran, e.s. 6566	Lars Dalgaard, Sennels.
4,9	1,73	— 1	61	ukendt	Arnold Bojer, Bersted.
5,0	1,68	6- 1	43	Thy Gran, e.s. 6566	Aksel Christensen, Hassing.
3,2	2,76	4-12	34	Thy Gran, e.s. 6566	Martin B. Larsen, Villerslev.
6,4	1,24	8- 1	41	Horsens Pold, s. 6580	Joacim Nicolajsen, Ettrup.
5,2	1,61	6- 1	23	Thy Gran, e.s. 6566	Jørg. Godiksen, Nors Havreland.
4,2	2,05	15-12	110	Thy Gran, e.s. 6566	Carl Aage Riis, Uglev.
4,1	2,00	3- 4	130	ukendt	Vilhelmsborg, Thisted.
4,8	1,77	13- 4	41	Thy Ask, s. 6532	Martin B. Larsen, Villerslev.
3,8	2,32	4- 1	1	ukendt	Søren Andersen, Hov.
8,0	1,05	29-12	46	Thy Røn, e.B 21	Aage Pedersen, Sennels.
6,0	1,36	7- 2	87	Thy Gran, e.s. 6566	Herluf Vestergaard, Kåstrup.
6,5	1,22	3- 5	168	Thy Bos, s. 6762	H. Nielsen, Koldbygård.
4,4	1,84	28- 1	13	Skjern Foch, e.A 50	Karl Hansen, Vestervig.
4,2	1,92	26-12	77	Thy Lærk, s. 6945	Chr. Gravesen, Ø. Vandet.
6,3	1,27	24-12	95	Thy Gran, e.s. 6566	Laur. Hedegaard, Visby.
4,1	1,88	16-12	65	Nr. 10, f. 21-9-54	Chr. R. Slot Odgaard, Ullerupgård.
3,1	2,69	10- 2	19	Thy Gran, e.s. 6566	Marius Dresler, Hørsted.
4,8	1,93				

¹ Børbetændelse.

7616, på Gelballegård.

Malketid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,4	2,77	23-12	56	Sdj. Jarl, e.A 78	H. Nissen Conradsen, Nørbølling.
3,5	2,56	11- 1 ¹	10	Sdj. Paul, e.s. 6369	Chr. Buhl, Østerby, Vamdrup.
3,4	2,66	8-12	43	ukendt	Viggo Christensen, Gelballe.
6,0	1,36	—	67	Sdj. Dorn, s. 6766	Bøjsen Hviid, Vester Nebel.
4,1	2,00	25-11	50	ukendt	Ejner Eriksen, Veerst.
3,3	2,84	27-12	6	Sdj. Jarl, e.A 78	Harald Langkjær, Sjølund.
3,7	2,24	4-12	61	Sdj. Nobel, s. 7109	Ejner Jøcumsen, Lindknud.
3,8	2,50	2- 1	39	Sdj. Ceres, s. 6453	Karlo Hansen, Vittrup.
4,8	1,77	11- 6	35	Sdj. Diamant, s. 6456	Hans G. Iversen, Fitting.
3,6	2,44	16-12	20	Sdj. Odin, s. 6455	Svend Sørensen, Vester Nebel.
4,1	2,10	15- 1	50	Nr. 11	Henning Nielsen, Brørup.
3,9	2,32	13- 1	18	ukendt	Arne Lilleris, Ødis-Bramdrup.
3,2	2,55	—	3	ukendt	Holger Andersen, Lindknud.
3,6	2,33	28-11	2	ukendt	R. Busk Jensen, Hejnsvig.
4,3	1,90	11- 5	98	Elkærholm	Hans J. Jørgensen, Ferup.
3,2	2,29	11- 3	13	Sdj. Reklame, e.A 42	Mathias Jessen, Nyskov.
2,8	2,91	3- 1	22	Sdj. Foch, f. 27-2-57	Henning Nielsen, Brørup.
4,8	1,77	26- 3	23	Sdj. Jong, s. 7099	Johs. Thing Poulsen, Gammelby.
2,4	2,57	30- 3	25	Kolding Drost, s. 7303	Johs. Thing Poulsen, Gammelby.
3,8	2,31				

¹ Kastet 21-4.

Hovedtabel 37. Afkomsprøve for tyren Dybbøl Faust

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
68	23- 4-65	18- 9	878	562	7291	4,43	322,75	363	3,57	261	316	316	2231	4825
81	2- 2-65	9- 9	949	516	7098	4,38	311,15	349	3,47	246	325	325	2163	4583
76	30-10-64	21- 9	1056	576	6560	4,45	292,09	328	3,74	245	313	313	1977	4255
78	12-10-64	4- 9	1057	520	6204	4,48	277,64	312	3,56	221	328	328	1813	4420
65	11- 9-64	27- 9	1111	615	6248	4,44	277,33	312	3,73	233	305	305	1853	4255
66	8- 4-65	30- 9	905	618	6444	4,30	276,84	311	3,54	228	304	304	1866	4100
82	5- 1-65	28-10	1026	539	5954	4,35	259,17	291	3,35	199	276	276	1725	3825
67	14- 3-65	15- 9	915	588	6042	4,25	256,76	288	3,49	211	319	319	1714	4379
80	6- 4-65	19- 9	896	559	5375	4,74	254,69	287	3,76	202	315	315	1548	3968
77	19- 2-65	3-10	956	550	5835	4,16	242,65	272	3,49	204	301	301	1582	3808
69	1- 4-65	30- 9	912	563	5153	4,65	239,48	269	3,59	185	304	304	1484	3883
70	23-11-64	5- 9	1016	642	5240	4,57	239,24	269	3,87	203	327	327	1430	3838
63	11-10-64	8-10	1092	609	5236	4,45	232,89	262	3,68	193	296	296	1443	3717
71	16- 2-65	18- 9	944	575	5020	4,52	227,04	255	3,84	193	316	316	1364	3812
72	22- 3-65	3-10	925	540	4778	4,55	217,58	245	3,64	174	301	301	1314	3648
62	26- 1-65	16- 9	963	610	5056	4,20	212,57	238	3,53	178	318	318	1313	3813
79	11-12-64	12- 9	1005	576	4908	4,29	210,46	236	3,56	175	322	322	1239	3857
73	16- 3-65	5-11	964	552	4434	4,39	194,71	219	3,52	156	268	268	1153	3344
64	29-10-64	6-10	1072	652	4423	4,32	191,18	215	3,72	164	298	298	1084	3505
61	3- 4-65	29- 9	909	664	3786	4,35	164,58	185	3,75	142	303	303	849	3270
75	12-10-64	8-11	1122	535	3859	4,14	159,60	179	3,55	137	265	265	864	2940
74	1- 3-65	12-11	986	576	3133	4,47	140,02	157	3,46	108	261	261	755	2742
Gns. af 22 kvier			985	579	5367	4,40	236,38	265	3,61	194	304	304	1489	3854

Hovedtabel 38. Afkomsprøve for tyren Kern

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
102	8-11-64	21- 9	1047	531	7501	4,06	304,79	341	3,56	267	316	316	2045	4586
96	11- 3-65	6- 9	909	608	5854	5,13	300,09	339	3,94	231	331	331	1724	4232
91	21- 2-65	13-10	964	585	6974	4,14	288,40	323	3,52	246	294	294	1873	4271
98	31-10-64	30- 8	1033	605	6465	4,43	286,54	322	3,42	221	338	338	1726	4166
99	15- 3-65	26- 9	925	590	6344	4,44	281,86	317	3,60	229	311	311	1725	4034
97	25- 9-64	18-10	1118	564	6818	4,09	279,13	313	3,46	236	289	289	1815	4075
103	19- 7-65	11- 9	784	590	6056	4,28	259,16	291	3,85	233	326	326	1514	3875
100	11-10-65	9-10	728	615	5710	4,29	244,88	275	3,52	201	298	298	1417	3795
107	19-10-65	31-10	742	518	5125	4,56	233,69	263	3,82	196	276	276	1294	3384
93	13- 3-65	11- 9	912	627	5290	4,34	229,79	258	3,85	204	326	326	1224	3765
94	14-10-64	2-11	1114	617	5536	4,10	226,98	254	3,66	203	274	274	1368	3458
92	10-12-64	10- 9	1004	631	4846	4,51	218,44	246	3,98	193	327	327	1078	3600
101	17- 9-65	21-11	795	551	4133	4,52	187,01	210	3,97	164	255	255	908	2958
105	25- 7-65	17-10	814	585	4056	4,50	182,64	205	4,00	162	290	290	859	3052
95	23- 6-65	14-10	843	620	3973	4,25	168,87	189	3,81	151	293	293	793	3033
108	9- 9-65	22- 9	743	520	3702	4,48	165,92	186	3,75	139	315	315	745	3067
104	11- 4-65	23- 9	895	603	2952	4,38	129,36	145	4,15	122	314	314	614	2798
Gns. af 17 kvier			904	586	5373	4,37	234,56	263	3,72	200	304	304	1337	3656

. 7474, på Veeshæk.

fælke- tid min.	Malk- bar- min.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,1	2,28	11-12	2	Sdj. Wass, e.A 2	Jørgen Johansen, Stolbroeløkke.
4,6	1,96	— ¹	45	Sdj. Martin, s. 7106	Peter Lenger, Kværsløkke.
4,0	2,32	11- 4	9	Nestor, s. 6403	Chr. Gregersen, Ankulgård.
4,4	1,93	2-12	45	Dybbøl Holt, e.B 43	Jørn Staugaard, Veeshæk.
5,6	1,49	4-12	122	Paul Wass, f. 25-2-56	H. Winckelmann, Gunstrup.
4,0	2,33	11- 1	53	Sdj. Mars, e.s. 6367	Aksel Nielsen, Dybbøl.
3,6	2,68	14-12	12	Sdj. Mars, e.s. 6367	Jørgen Johansen, Stolbroeløkke.
3,8	2,20	6- 1	37	ukendt	H. Laue Pedersen, Tandshede.
3,0	2,79	18- 5	72	Kastor, e.A 4	Aksel Nielsen, Dybbøl.
4,8	1,76	14- 5	63	Dybbøl Arnold, s. 6795	Aksel Nielsen, Dybbøl.
2,9	3,00	5- 4	1	Sdj. Wass, e.A 2	Jørgen Johansen, Stolbroeløkke.
4,2	1,90	29-11 ²	32	Sdj. Nico, e.s. 6370	Peter Lenger, Kværsløkke.
4,5	1,85	9- 4	145	Klaus 87, s. 6894	H. Winckelmann, Gunstrup.
6,0	1,33	11-12	1	Kastor, e.A 4	Chr. Gregersen, Ankulgård.
3,0	2,77	5- 4	7	Sdj. Bull, e.s. 5982	Jørgen Johansen, Stolbroeløkke.
4,8	1,66	15- 1	46	Dybbøl Holt, e.B 43	Chr. Nissen, Vejbæk.
3,2	2,48	5-12	50	Sdj. Wass, e.A 2	Peter Petersen, Vesterlund.
4,9	1,68	8- 1	31	Sdj. Nico, e.s. 6370	Peter Lenger, Kværsløkke.
5,2	1,55	16-12	123	Paul Wass, f. 25-2-56	H. Winckelmann, Gunstrup.
3,5	2,08	29-11	34	ukendt	Chr. Nissen, Vejbæk.
5,3	1,53	13- 4	36	Sdj. Nico, e.s. 6370	Alfred Clausen, Lambjerglund.
4,0	1,89	23- 3	3	Dybbøl Holt, e.B 43	Chr. Gregersen, Ankulgård.

4,2 2,07

¹ Brummer.² Kastet 6-6.

. 7425, på Lundgård.

fælke- tid min.	Malk- bar- min.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,0	2,45	12- 2	28	Odin, s. 7089	Kr. Schønning, Mejlstrup.
4,0	2,15	19- 2	43	Drost, e.A 60	Martin Poulsen, Bystrup.
3,2	3,30	31- 1	121	Gordon, e.s. 6462	Brdr. Dollerup, Farsø.
3,0	2,93	9-12	80	Dolfus, s. 6758	Peder Pedersen, Mejlstrup.
3,2	2,90	11-12	3	Hoofdmann, e.s. 6152	Rytter Hansen, Mejlstrup.
4,9	1,80	—	127	Dolfus, s. 6758	Aage Bach, Morum.
4,9	1,70	23-12	138	Bjerringbro Cim, s. 6639	Juul Larsen, Tandrup.
2,8	3,15	1- 1	187	Napoleon, e.B 31	Brdr. Liengaard, Ebdrup.
5,4	1,50	1- 1	21	Franco, s. 6759	Jens Lund, Strandby.
5,1	1,58	15-12	22	Drost, e.A 60	Frøde Aarup, St. Binderup.
5,1	1,66	17- 1	96	Drost, e.A 60	Henry Pedersen, Binderup.
6,6	1,23	16-12	61	Franco, s. 6759	Niels Bach, Kgs. Tisted.
5,1	1,60	11- 3	35	Bjarke, s. 7087	Gunnar B. Nielsen, Levring.
3,1	2,49	10- 1	36	Laurits, s. 7024	Th. Aarup, Kallestrup.
3,4	2,29	15-12	66	Gordon, e.s. 6462	Knud Pinstrup, Skørbæk.
2,9	2,37	8-12	39	Napoleon, e.B 31	Arne Poulsen, Mejlstrup.
3,9	1,74	9-12	43	Sivert, s. 6658	Rytter Hansen, Mejlstrup.

4,2 2,17

Hovedtabel 39. Afkomsprøve for tyren Bjerringbro Rico

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved fødsel	Vægt i marts	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mælke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
65	7-1-65	2-9	968	558	5992	4,61	276,39	311	3,91	234	335	335	1773	4331
78	22-5-65	22-8	822	565	5997	4,58	274,70	309	3,81	228	346	346	1726	4425
77	6-9-65	4-9	728	553	6206	4,37	271,18	305	3,55	220	333	333	1794	4377
70	26-4-65	27-9	884	579	5688	4,36	248,09	279	3,54	201	310	310	1672	4080
66	23-8-65	20-10	788	536	4911	5,04	247,28	279	4,01	197	287	287	1632	3900
71	22-3-65	14-9	906	533	5595	4,36	244,21	274	3,62	202	323	323	1560	4040
72	28-3-65	5-9	891	460	6046	4,01	242,67	272	3,42	207	320	320	1621	4145
69	27-8-65	16-11	811	513	5528	4,39	242,44	272	3,71	205	260	260	1647	3647
75	3-3-65	6-10	947	548	5874	4,02	236,15	264	3,62	213	301	301	1599	3933
68	14-12-64	2-10	1022	584	5437	4,26	231,49	260	3,71	202	305	305	1516	3767
80	14-2-65	15-9	943	605	5261	4,37	230,15	258	3,67	193	322	322	1361	3948
64	25-3-65	14-10	933	593	4989	4,57	227,89	256	3,75	187	293	293	1480	3818
73	6-7-65	28-10	844	506	5417	4,15	224,89	252	3,63	197	279	279	1514	3750
62	25-2-65	29-10	976	583	4884	4,49	219,37	247	3,77	184	278	278	1407	3557
79	5-4-65	2-10	910	563	4979	4,23	210,55	236	3,52	175	305	305	1319	3733
76	10-11-64	11-9	1035	589	4479	4,62	207,14	233	3,83	171	326	326	1205	3605
74	28-8-65	15-11	809	538	5111	4,05	206,80	232	3,52	180	261	261	1384	3411
61	21-2-65	29-10	980	614	4454	4,51	200,90	226	3,89	173	278	278	1313	3593
67	17-10-64	2-10	1080	569	4207	4,69	197,43	222	3,84	162	305	305	1214	3677
Gns. af 19 kvier			909	557	5319	4,39	233,67	262	3,69	196	304	304	1512	3887

Hovedtabel 40. Afkomsprøve for tyren Ålborg Con

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved fødsel	Vægt i marts	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mælke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
33	28-8-64	1-11	1160	641	6525	4,47	291,42	327	3,52	230	279	279	1859	3921
47	14-1-65	26-10	1015	550	6630	4,24	281,42	316	3,34	222	285	285	1797	3960
45	9-9-65	4-11	786	557	5841	4,53	264,42	297	3,29	192	276	276	1592	3680
35	23-5-65	10-9	840	639	6354	4,11	261,22	293	3,48	221	331	331	1569	4090
42	18-11-64	25-11	1102	530	5841	4,43	258,99	291	3,76	220	255	255	1617	3600
43	8-9-65	28-8	719	555	5693	4,35	247,72	278	3,60	205	344	344	1288	3900
49	18-12-65	23-11	705	515	5550	4,22	234,45	263	3,68	204	257	257	1417	3357
39 ¹	3-3-65	3-9	914	550	5479	4,06	222,38	249	3,53	194	338	338	1149	3720
36	24-10-64	19-10	1090	584	5060	4,30	217,64	244	3,67	186	292	292	1207	3420
40 ²	2-3-65	16-10	958	490	5579	3,89	217,04	243	3,38	189	295	295	1244	3480
44 ³	15-9-65	12-9	727	551	5335	3,98	212,27	238	3,45	184	329	329	1116	3520
38	22-3-65	18-8	879	644	5173	4,08	210,99	236	3,70	191	354	354	1115	3680
46	12-3-65	9-10	941	531	5252	4,00	209,94	235	3,36	177	302	302	1166	3530
50 ²	28-8-65	21-10	784	465	4827	4,34	209,46	235	3,47	167	290	290	1042	3260
48 ⁴	13-3-65	7-9	908	569	4275	4,80	205,08	231	4,12	176	334	334	933	3230
41	21-10-64	10-10	1084	630	4104	4,70	192,87	217	3,99	164	299	299	879	3140
Gns. af 16 kvier			913	563	5470	4,27	233,58	262	3,56	195	304	304	1312	3597

¹ Nedsat mælkeydelse på to patter efter yverbetændelse.² Såleknusning.³ Trepatet efter yverbetændelse ved kælvning.

. 7482, på Rosenfeldt.

Ålke- tid min.	Malk- bar- min.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,2	2,63	1- 2	43	Kastor, e.A 4	Edvard Østergaard, Vorning.
2,8	2,98	29- 1 ¹	38	Kastor, e.A 4	Aage Hansen, Tange Skovgård, Ans.
2,8	2,96	5- 2	20	ukendt	Mads Brøndum, Hammershøj.
3,7	2,34	12- 1	63	Kastor, e.A 4	Jens Bay, Nørnbæk, Fårup.
2,1	4,13	6- 3	182	Kastor, e.A 4	Hellerup Madsen, Kvorning.
4,3	1,94	6-12	5	Bjerringbro Bert, s. 6638	Jens Sørensen, Terp, Ulstrup.
3,8	2,22	23-11	11	Bjerringbro Bert, s. 6638	Magnus Andersen, Astrup.
5,5	1,54	8- 5	68	Bjerringbro Marcel, s. 7085	Henry Aarestrup, Vinkel.
4,1	2,12	6- 2	86	Ahlm, s. 6321	Viggo Jensen, V. Velling.
3,0	2,99	31- 1	112	Bjerringbro Wouter, s. 6951	Peter Møller, Bjerring.
3,3	2,39	15-12	93	Bjerringbro Bert, s. 6638	Vagn Vrou, Bøstrup, Højslev.
4,0	2,08	13- 1	84	Bjerringbro Bert, s. 6638	Emanuel Mikkelsen, Grønbæk.
4,1	2,15	18- 1	20	Bjerringbro Marcel, s. 7085	Kristian Sørensen, Hingeblalle.
3,8	2,28	—	23	Gorm, s. 6478	Ejner Hedegaard, Foulum.
3,0	2,66	8- 2	71	Bjerringbro Bert, s. 6638	Jens Fruelund, Thorsø.
3,1	2,37	3- 2	38	Kastor, e.A 4	Oluf Dalsgaard, Hjermin.
5,8	1,42	10- 2	89	Kastor, e.A 4	Egon Christensen, Grønbæk.
2,8	3,07	24- 2	113	Kastor, e.A 4	Peter Møller, Bjerring.
3,5	2,17	20-12	38	Kastor, e.A 4	Jens Kristian Sørensen, Vorning.
3,6	2,44				

¹ Kastet 1-5.

. 7452, på Lundgård.

Ålke- tid min.	Malk- bar- min.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,3	2,19	5- 1	91	Ålborg Diamant, e.A 84	S. Nørgaard Jensen, St. Arden.
6,0	1,37	27- 3	57	Ålborg Ike, e.B 1	Henry Foldager, Støvring.
4,1	2,30	—	46	Ålborg Jarl, s. 6812	Jens L. Jensen, Vadum.
4,4	2,10	13- 3	86	Ålborg Zar, e.A 70	Henning Møller, Holmager.
4,0	2,53	25- 5	13	Ålborg Diamant, e.A 84	Morten Glad, Ø. Hurup.
4,0	2,10	6- 1	36	Ålborg Bos, e.A 80	Karl Zinck Wulff, Smedie, Bælum.
5,0	1,78	15- 4	58	Østermark 13, f. 23-12-59	Erik Paulstrup, Gandrup.
3,2	2,52	— ¹	96	Ålborg Træf, s. 6813	Olin Pedersen, Bislev.
5,6	1,47	—	25	Ålborg Diamant, e.A 84	Poul Andersen, Ø. Hassing.
6,1	1,32	9- 3	34	Ponto, e.s. 6381	Henry Foldager, Støvring.
6,1	1,31	6- 1	40	ukendt	Ejnar Christiansen, Fløe.
4,0	2,02	26- 2	81	Ålborg Ymke, e.A 18	Søren Uhrenholt, Dronninglund.
2,9	2,99	10- 2	38	Ålborg Hass, s. 6981	Otto Thomsen, Grydsted.
5,3	1,54	13- 3	—	Ålborg Diamant, e.A 84	Harald Eriksen, Skovstrup.
4,9	1,58	23- 3	—	ukendt	Kristine Nielsen, Nørholm.
4,8	1,67	11-12	4	Merkur Langholt, e.s. 6190	Anton Kristensen, Holmager.
4,7	1,92				

¹ Børbetændelse.

Hovedtabel 41. Afkomsprøve for tyren Århus Thor

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
31	25-2-65	15-10	962	601	7311	4,18	305,79	343	3,50	256	295	295	2264	4690
38	24-8-65	13-10	780	503	6812	4,19	285,47	320	3,55	242	297	297	2057	4237
39	21-4-65	11-10	903	554	5502	4,99	274,50	310	3,84	211	299	299	1788	4034
41	1-1-65	16-10	1018	549	5631	4,53	254,81	286	3,88	218	294	294	1695	4068
32 ¹	17-4-65	9-9	875	563	5927	4,19	248,29	278	3,51	208	323	323	1661	4320
42	22-12-64	28-10	1040	549	5521	4,42	244,22	274	3,75	207	282	282	1630	3977
37	8-7-65	17-10	831	546	4996	4,67	233,07	262	3,74	187	293	293	1470	3906
50	21-8-65	14-9	754	492	4680	4,80	224,41	253	3,94	184	311	311	1314	3894
44	25-5-65	30-9	858	540	4820	4,57	220,25	248	3,53	170	310	310	1309	3766
47	11-1-65	22-10	1014	494	4906	4,42	216,60	243	3,93	193	288	288	1357	3583
43	17-7-65	11-10	816	518	4702	4,60	216,39	243	3,65	172	284	299	1382	3698
49	10-5-65	20-9	863	542	4614	4,67	215,42	242	3,70	171	320	320	1291	3766
45	25-12-64	14-9	993	541	4699	4,58	215,02	242	4,03	189	311	311	1298	3800
33	1-1-65	30-8	971	544	5137	4,15	213,21	239	3,64	187	326	326	1286	3799
46	23-7-65	20-9	789	541	4488	4,66	209,36	236	3,80	171	305	305	1226	3753
35	8-9-65	25-10	777	549	4283	4,88	208,91	235	3,92	168	285	285	1258	3466
36	20-6-65	30-10	853	499	4789	4,18	200,26	225	3,43	164	280	280	1255	3577
40	12-1-65	25-9	986	573	4323	4,12	178,30	200	3,77	163	315	315	1050	3522
34	10-6-65	2-9	814	578	3469	4,60	159,57	180	3,74	130	338	338	714	3187
Gns. af 19 kvier			889	541	5085	4,48	227,57	256	3,72	189	303	304	1437	3844

¹ Venstre forpatte blokket op efter pattetråd.

Hovedtabel 42. Afkomsprøve for tyren Ålborg Knud

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
80	8-4-65	18-9	893	518	6904	4,15	286,43	321	3,13	216	311	311	1844	4278
70	16-1-65	4-9	961	581	7000	3,98	278,71	312	3,45	241	325	325	1798	4214
64	15-1-65	18-8	945	637	5286	5,26	278,20	314	3,92	207	342	342	1499	4086
66	5-5-65	15-9	863	576	5776	4,64	268,21	302	3,79	219	314	314	1553	3993
71	12-3-65	11-8	882	580	5894	4,37	257,32	289	3,45	203	349	349	1472	4054
77	25-2-65	27-8	913	590	6074	4,07	247,25	277	3,52	214	333	333	1431	3964
65	14-3-65	17-8	886	641	5668	4,23	239,87	269	3,55	201	343	343	1298	3764
68	1-1-65	20-10	1022	598	5057	4,72	238,66	269	4,04	204	279	279	1330	3627
76	5-5-65	24-8	841	602	5330	4,45	237,15	266	3,68	196	336	336	1291	3932
61	15-4-65	17-10	915	674	5859	4,01	234,80	263	3,50	205	282	282	1476	3763
69	4-6-65	24-10	872	536	4896	4,51	220,84	248	3,69	181	275	275	1196	3611
73	14-3-65	1-11	962	564	5165	4,15	214,59	241	3,57	184	267	267	1253	3443
75	6-1-65	1-9	968	553	5201	4,03	209,63	235	3,32	173	328	328	1193	3575
72	19-5-65	22-9	856	635	4447	4,61	204,80	230	3,76	167	307	307	1048	3446
63	3-2-65	15-9	954	598	4721	4,22	199,12	223	3,62	171	314	314	1048	3527
67	2-3-65	18-11	991	618	4423	4,29	189,76	213	3,76	166	250	250	1033	3063
79	19-5-65	14-11	909	594	4342	4,07	176,69	198	3,55	154	254	254	955	3225
74	10-5-65	31-10	904	614	2489	4,37	108,71	122	3,74	93	268	268	434	2459
Gns. af 18 kvier			919	595	5252	4,33	227,26	255	3,59	189	304	304	1286	3668

. 7500, på Elkjær.

Malk- tid min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,0	3,50	10- 1	66	Århus Coba, e.A 66	Bent Lyshøj, Hørslevbole.
5,1	1,70	9- 3	3	Eduard, s. 6471	Fr. Kruse Andersen, True.
3,0	2,94	3- 4	17	Århus Pietje, e.B 41	A. B. Sørensen, Lillering.
4,4	2,00	11- 1	7	Århus Coba, e.A 66	Chr. Thomsen, Ajstrup.
3,8	2,24	4-12	11	ukendt	Bent Højgaard Sørensen, Vrinner.
4,2	2,19	6- 1	25	Eduard, s. 6471	Gunner K. Hansen, Todbjerg.
4,2	1,97	27- 1	35	ukendt	Kr. Østergaard, Skjørring.
3,4	2,34	22-11	71	Århus Coba, e.A 66	Sigvard Thuesen, Agri.
4,7	1,70	18-12	53	Århus Ponto, s. 6669	Gunnar Christensen, Ugelhøj.
3,1	2,83	13- 2	28	Århus Coba, e.A 66	Sv. E. Bach, Thorsager.
4,2	2,03	18-12	57	Århus Coba, e.A 66	Gunnar Christensen, Ugelhøj.
3,2	2,57	12-12	79	Århus Coba, e.A 66	Anders Holm, Kolt.
3,8	2,08	27-11	20	Århus Coba, e.A 66	Anders Jørgensen, Høver.
3,2	2,57	27-11	6	Århus Coba, e.A 66	Chr. Thomsen, Ajstrup.
3,8	2,09	22-11	23	Eduard, s. 6471	Holger Hansen, Sundby.
4,5	1,74	23- 1	8	Århus Coba, e.A 66	Søren Thomsen, True.
4,0	2,14	30-12	22	Århus Ponto, s. 6669	Jens Rasmussen, Ingerslev.
3,5	2,13	20- 1 ¹	51	Århus Coba, e.A 66	Knud Mortensen, Thorsager.
4,0	1,75	10- 4	19	Århus Coba, e.A 66	Gunner K. Hansen, Todbjerg.
3,8	2,24				

¹ Kastet 1-3.

. 7451, på Lundgård.

Malk- tid min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,6	2,62	2- 2	83	Ålborg Mofke, e.A 18	Johs. Christensen, Nørholm.
4,2	2,17	13- 2	15	Thor 31, f. 29-10-58	Simon Simonsen, Ørum.
3,8	2,06	2- 1	26	Ålborg Træf, s. 6813	Jens Nielsen, Komdrup.
4,6	1,80	2- 4	83	Ålborg Diamant, e.A 84	J. Esp Sørensen, Vestbjerg.
2,9	2,86	9- 1	84	Ålborg Blesk, e.s. 6270	Robert Frandsen, Nørholm.
3,6	2,43	19- 2	90	Hof, f. 15-6-54	Chr. Christensen, Suldrup.
4,0	2,02	22- 1 ¹	85	Ålborg Diamant, e.A 84	Rask Thomsen, Sørup.
4,4	1,85	19- 1	20	Ålborg Hass, s. 6981	Jens Holger Toft, Hals.
3,2	2,44	15- 1	152	Ålborg Piet, s. 6556	Frederikshøj, Svenstrup J.
5,2	1,61	6- 3	80	Ålborg Ymke, e.A 18	Peder Rasmussen, Grydsted.
3,7	2,28	15- 1	31	Ålborg Thor, s. 6423	Frøde Jensen, Foulum.
4,3	2,03	19- 2	27	Gordon, e.s. 6462	Kr. Simonsen, Barmer.
2,0	4,20	— ²	26	Ålborg Fri, s. 6983	Jacob Andersen, Kirketerp.
3,6	2,11	21- 2	37	Ålborg Piet, s. 6556	Kr. Bjørn Nielsen, Vokslev.
3,2	2,48	26- 1	33	Vejgård Leopold, f. 26-10-52	Andreas Vadsholt, Ulsted.
5,5	1,47	9- 3	81	Ålborg Tema, e.A 6	J. C. Søndergaard, Lillevorde.
5,5	1,49	24- 1	67	Ponto, e.s. 6381	Ejvind Andersen, Vokslev.
3,9	1,73	16-12	47	Ålborg Zar, e.A 70	Ejnar Veggerby, Holmager.
4,0	2,20				

¹ Kastet 6-7.² Børbetændelse.

Hovedtabel 43. Afkomsprøve for tyren Hjørring Zelo

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
102	14-11-64	15-10	1065	557	5304	5,14	272,47	308	3,96	210	282	282	1629	3933
94	23- 2-65	8- 9	927	556	5433	4,86	264,31	298	3,79	206	319	319	1557	3913
91	26- 1-65	11- 8	927	639	5748	4,59	263,87	297	3,70	213	347	347	1669	4341
101	16- 2-65	11-10	967	442	5189	5,01	259,93	293	3,72	193	286	286	1530	3611
98	26-10-64	15- 9	1054	545	5222	4,64	242,32	273	3,87	202	312	312	1383	3789
99	26- 7-65	16- 9	782	547	4977	4,84	240,91	271	3,66	182	311	311	1388	3722
105	23- 2-65	25- 9	944	574	4547	4,80	218,14	246	3,86	176	302	302	1170	3324
104	8- 2-65	29-10	993	565	4514	4,80	216,46	244	3,90	176	268	268	1261	3481
93	29-12-64	14- 9	989	606	4896	4,42	216,33	243	3,79	186	313	313	1192	3767
103	3-12-64	28-10	1059	544	4701	4,50	211,70	238	3,80	178	269	269	1191	3310
92 ¹	27-11-64	31- 8	1007	594	3417	4,94	168,69	190	4,08	139	327	327	785	3336
95	8-11-64	11- 9	1037	564	3047	4,94	150,57	170	3,86	118	316	316	819	3450
100	28- 1-65	24- 9	969	555	3046	4,77	145,32	164	3,88	118	303	303	799	3110
Gns. af 13 kvier			978	561	4619	4,78	220,85	249	3,82	177	304	304	1259	3623

¹ Trepattet efter pattetråd.

Hovedtabel 44. Afkomsprøve for tyren Herning Esp

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
47	10- 4-65	8-10	911	535	7456	3,90	290,75	325	3,56	265	316	316	2241	4611
50	29-12-64	23-10	1028	541	6924	4,04	279,55	313	3,49	241	301	301	2260	4370
43	31- 3-65	24-10	937	482	5898	4,48	264,32	297	3,77	222	300	300	1846	4024
32	10- 5-65	16-10	889	549	6336	3,87	245,18	274	3,45	219	308	308	1828	4264
34	15- 2-65	17-10	974	556	5208	4,53	236,06	265	3,74	195	307	307	1573	3970
39	22- 2-65	19-10	969	512	5757	4,09	235,70	264	3,60	208	305	305	1692	3917
35	21- 2-65	9-10	960	570	5611	4,17	233,76	262	3,53	198	315	315	1587	4053
48	4- 3-65	20-11	991	575	5181	4,38	227,12	255	3,75	194	273	273	1573	3653
37	16- 2-65	25- 9	951	561	5176	4,24	219,71	246	3,71	192	329	329	1463	3940
42	30- 3-65	20- 9	904	504	5252	4,13	217,17	243	3,67	193	334	334	1418	3900
41	2- 9-65	16-10	774	494	5798	3,69	213,75	238	3,57	207	308	308	1545	3977
44	4- 2-65	14-11	1013	532	5048	4,14	208,95	234	3,70	187	279	279	1433	3487
36	18- 3-65	17-10	943	593	5226	3,93	205,51	230	3,59	188	307	307	1410	3821
40	11-10-65	25-10	744	538	4937	3,99	196,97	220	3,73	184	299	299	1394	3553
31	2- 2-65	18-10	988	584	5049	3,90	196,70	220	3,65	184	306	306	1299	3807
38	5-10-65	29-10	754	538	4970	3,91	194,20	217	3,51	175	295	295	1301	3714
46	19- 6-65	3-11	867	520	5798	3,19	184,96	205	3,50	203	290	290	1418	3653
45 ¹	1- 8-65	17-10	807	530	2900	4,21	122,08	137	3,67	106	307	307	783	3060
Gns. af 18 kvier			911	540	5474	4,03	220,69	247	3,61	198	304	304	1559	3877

¹ Alle patter stukket op.

7659, på Dybvad.

alke- min.	Malk- tid bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,3	1,98	9- 1	92	Hjørring Pilot, e.s. 6495	Johannes Pedersen, Lyngså.
5,4	1,48	1- 2	2	Hjørring Foch, e.A 52	Peder Dam, V. Hjerimitslev.
4,8	1,71	2- 2	10	Hjørring Rykind, e.B 17	Niels M. Poulsen, Furreby.
4,7	1,77	15- 5	81	Hjørring Adema, e.A 16	Johanne Nielsen, Tolstrup.
4,4	1,80	13- 2	92	Hjørring Adema, e.A 16	Jørgen Andersen, Vrå.
5,0	1,59	14- 1	14	Bisp, e.s. 6168	Karl E. Jensen, Bindslev.
3,8	2,03	13- 1	12	Hero Langholt, s. 6785	E. Wurring Nørgaard, Dvergetved.
7,2	1,05	22- 1	75	Hjørring Foch, e.A 52	Nicolaj Hedegaard, Pandrup.
4,6	1,75	12- 12	88	Trads, f. 5-5-55	Ankjær Kræmmergaard, Hellum.
6,0	1,36	14- 3	188	Hjørring Foch, e.A 52	Georg Pedersen, Bindslev.
4,8	1,54	4- 6	34	Hjørring Ernst, e.A 76	Knud Søndergaard, Ø. Brønderslev.
4,1	1,74	12- 1	50	Cesar, e.s. 6339	Jørgen Sørensen, Sindal.
3,6	1,89	6- 1	51	Hjørring Adema, e.A 16	Carl E. Nielsen, Mygdal.
4,8	1,67				

7513, på Moesgård.

alke- min.	Malk- tid bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,4	2,03	3- 4	50	ukendt	Severin Rigtrup, Aulum.
4,5	2,14	19- 4	73	ukendt	Chr. Hjøllund, Hammerum.
3,7	2,25	13- 6	74	Butenmoark Haro, e.s. 6182	Chr. Hansen, Olling.
6,3	1,25	6- 2	13	Herning Strib, s. 6828	Johs. Jensen, Herborg.
3,3	2,63	8- 1	70	ukendt	Hans Evald Jensen, Aulum.
7,0	1,08	12- 2	2	Herning Consello, s. 6831	Chr. Hansen, Olling.
3,8	2,25	6- 1	45	Butenmoark Haro, e.s. 6182	Benedikte Kjærsgaard, Hammerum
3,4	2,90	12- 2	74	Julian, e.s. 6485	Brdr. Overgaard, Vrå.
4,2	1,94	2- 1	154	ukendt	Laurids Jensen, Linå.
4,7	1,74	20- 2	97	Torp, s. 6412	Anders Andersen, Mørup.
5,0	1,74	9- 1	165	Skjern Foch, e.A 50	Mads Chr. Kaasgaard, Herborg.
6,1	1,31	6- 5	59	Herning Jelle, e.s. 6698	Flemming Jensen, Assing.
4,3	2,00	7- 2	19	Julian, e.s. 6485	Holger Christensen, Barde.
5,3	1,54	13- 4	131	Herning Jelle, e.s. 6698	Mads Chr. Kaasgaard, Herborg.
3,7	2,24	23- 2	7	Herning Consello, s. 6831	Kjær Andersen, Frølund.
4,0	2,14	8- 1	58	Grindsted Jack, s. 6986	Brdr. Dyhrvig, Herborg.
4,6	1,85	29- 1	49	Herning Pol, s. 6827	Johs. Damsgaard, Hammerum.
7,3	1,17	20- 2	32	Butenmoark Haro, e.s. 6182	Chr. Knudsen, Kibæk.
4,8	1,90				

Hovedtabel 45. Afkomsprøve for tyren Morsø Dros

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I al- f. e.
32	15- 4-65	4- 9	872	590	6851	4,72	323,45	364	3,77	258	339	339	2153	456
47	12- 4-65	26-10	927	467	5927	4,86	288,25	325	3,89	231	287	287	2059	407
46 ¹	12- 1-65	29- 9	990	550	6087	4,34	264,45	297	3,38	206	314	314	1761	389
38	7- 2-65	11-10	976	565	6595	4,00	263,64	295	3,46	228	302	302	1780	400
42	14- 1-65	16- 9	975	545	6428	4,03	259,36	290	3,61	232	327	327	1722	407
41	4- 4-65	6- 9	885	615	5338	4,52	241,34	271	3,64	194	337	337	1421	387
44	1- 2-65	28- 8	938	534	5888	4,05	238,63	267	3,46	204	346	346	1447	403
34	12- 7-65	25-10	835	608	5177	4,59	237,62	267	3,93	204	288	288	1445	364
40	28- 4-65	21-10	906	553	5317	4,27	226,83	254	3,56	189	292	292	1518	374
31	16-12-64	5- 9	993	627	5033	4,46	224,52	252	3,63	183	334	334	1282	408
36 ²	18- 2-65	29- 9	953	581	5121	4,34	222,13	249	3,65	187	314	314	1319	370
48	18-11-65	13-11	725	515	4610	4,37	201,35	226	3,68	170	269	269	1206	321
33	7- 3-65	12-10	949	565	4638	4,31	200,04	225	3,68	171	301	301	1136	350
49	5- 7-65	4-11	852	532	4612	4,06	187,27	210	3,77	174	278	278	1139	333
37	15- 4-65	21-10	919	557	4532	4,12	186,71	209	3,56	161	292	292	1093	334
45	22- 6-65	16- 9	816	560	3873	4,60	178,19	200	3,71	144	327	327	904	322
39	1-10-65	28-10	757	527	4340	4,07	176,66	198	3,50	152	285	285	981	320
50	12- 9-65	11-11	790	551	4198	4,16	174,60	196	3,56	150	271	271	1008	286
35 ³	11- 8-65	4-11	815	584	3454	3,97	137,25	154	3,59	124	278	278	732	299
43	15- 3-65	14- 9	913	645	2136	4,78	102,00	115	4,02	86	304	304	592	264
Gns. af 20 kvier			889	564	5008	4,33	216,71	243	3,64	182	304	304	1335	360

¹ Højre forpatte stukket op efter pattetråd.² Trepattet før kælvning.³ Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 46. Afkomsprøve for tyren Sdj. Steen

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I al- f. e.
32	18- 2-65	1-10	955	565	5970	4,32	258,19	290	3,71	221	320	320	1667	421
44	1- 3-65	4-11	978	502	5456	4,56	248,63	280	3,54	193	286	286	1644	377
46	6- 3-65	31- 8	908	549	5580	4,44	247,88	279	3,57	199	332	332	1590	405
31	9- 4-65	23-10	927	581	5712	4,20	240,06	269	3,56	203	298	298	1570	406
38 ¹	11-12-64	14- 9	1007	558	5796	4,14	240,03	269	3,43	199	337	337	1519	394
47	2- 3-65	7-11	980	582	5693	4,17	237,50	266	3,88	221	283	283	1602	383
39	26- 2-65	22- 9	938	544	5144	4,37	224,94	253	3,55	183	329	329	1332	390
43	25- 3-65	7-11	957	562	5584	4,03	224,77	252	3,52	196	283	283	1548	372
49	25- 4-65	31-10	919	557	5213	4,29	223,42	251	3,66	191	290	290	1431	378
36	23- 5-65	27- 9	857	567	4919	4,46	219,42	247	3,62	178	319	319	1287	380
33	16- 3-65	17- 9	915	525	5037	4,24	213,54	240	3,45	174	334	334	1235	393
37	2- 1-65	14-11	1046	596	4454	4,59	204,33	230	3,67	163	276	276	1242	330
48	6- 2-65	16-11	1013	591	4640	4,32	200,67	225	3,73	173	274	274	1216	338
45	13-12-65	3-11	690	531	4827	4,13	199,45	224	3,56	172	287	287	1234	346
35	21- 2-65	2-10	953	553	4471	4,45	198,86	223	3,76	168	319	319	1132	368
41	9- 4-65	19- 9	893	571	4225	4,30	181,59	204	3,68	155	313	313	1027	343
34	25- 2-65	5-11	983	595	2513	4,67	117,25	132	3,80	96	285	285	624	296
Gns. af 17 kvier			936	561	5014	4,32	216,50	243	3,62	182	304	304	1347	372

¹ Venstre forpatte stukket op efter pattetråd.

7617, på Morsø.

alke- min.	Malk- bar- min.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,7	2,60	5-12 ¹	75	Foch, e.s. 6197	Johs. Martinussen, Tødsø.
4,2	2,29	9- 2 ²	119	Morsing, e.B 13	Kr. Bukhave Madsen, Tødsø.
5,4	1,26	6- 2	97	Morsø Rykind, s. 6840	J. D. Klausen, Lødderup.
7,2	1,04	26- 3 ³	46	Hugin, e.s. 5946	Kr. Hansen, Solbjerg.
3,4	2,62	4- 5	115	Morsø Sten, s. 6935	Mads Østergaard, Tødsø.
3,6	2,22	29- 5	257	Morsø Trinton, s. 7201	Klaus Dalgaard, Galtrup.
2,8	2,98	12- 1	58	Morsø Kalle, s. 6729	Aage Krejbjerg, Tæbring.
3,6	2,43	26-12	14	Morsing, e.B 13	Harry Pedersen, Andrup.
3,4	2,55	14- 2	45	Skals Hendrik, e.s. 6522	Kr. Hangaard, Ørding.
2,3	3,50	5-12	112	Hugin, e.s. 5946	Kr. Bukhave Madsen, Tødsø.
3,9	2,15	10- 1	50	Foch, e.s. 6197	Chr. Overgaard, Fårtoft.
3,7	2,33	7- 2	28	Morsø Rykind, s. 6840	Peder Bukh, Flade.
5,1	1,56	13-12	52	Foch, e.s. 6197	Chr. Overgaard, Fårtoft.
3,6	2,38	28- 2	90	Morsing, e.B 13	S. Thomsen, Bjergby.
4,3	1,86	21- 1	60	Morsø Kalle, s. 6729	Jens Møller, Erslev.
2,6	2,48	21- 4	44	Morsing, e.B 13	Niels Hansen, Frøslev.
3,5	2,35	20- 1	31	Foch, e.s. 6197	S. Svenningsen, Vodstrup.
4,9	1,64	12- 1 ⁴	52	Morsø Rykind, s. 6840	Niels Hansen, Frøslev.
4,6	1,68	23- 1	85	Gordon, e.s. 6462	Kr. Møller, Tæbring.
2,3	2,20	17-11	97	Morsø Sten, s. 6935	Kr. Møller, Tæbring.

4,0 2,21

¹ Kastet 25-5.² Kastet i april.³ Kastet 12-2 efter ins. 9-12.⁴ Kastet 5-6.

7606, på Brøstrupgård.

alke- min.	Malk- bar- min.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,8	1,39	27- 1	98	Wass 327, f. 9-9-57	Jeppe B. Jessen, Skovbølling.
3,7	2,48	5- 3	26	Sdj. Ernst, e.A 44	Ejner Ellegaard, Sillerup.
4,1	2,04	29-11	34	Henriksen, f. 26-2-53	Asger Lund, Gammelby.
4,7	1,76	15- 1	63	Sdj. Nico, e.s. 6370	Math. Lausten, Gærup.
4,9	1,69	2- 3	50	Sdj. Dan, e.s. 6296	Chr. Feddersen, Højer.
4,4	2,03	26- 2	41	Sdj. Dan, e.s. 6296	H. Marquardsen, Favrbj.
3,8	2,12	15- 1	30	Sdj. Ørn, s. 6691	Jens H. Friis, Visby.
3,6	2,48	27- 1	41	ukendt	Vagn Jensen, Bjerndrup.
5,1	1,59	9- 2	48	Sdj. Gordon, s. 7108	Peter Dahlmann, Nr. Skærbæk.
4,4	1,80	12-12	187	Sdj. Dan, e.s. 6296	Nis Matzen, Løjtved.
3,6	2,33	19-12	103	Sdj. Thor, s. 6692	Jeppe B. Jessen, Skovbølling.
3,0	2,70	4- 3	68	Sdj. Ceres, s. 6453	Boj Friis-Andresen, Emmerlev.
4,7	1,74	25- 3	96	Sdj. Erko, s. 6765	Ricard Petersen, Hjerpsted.
2,6	3,12	16- 2	11	Sdj. Tim, e.A 38	Hans Eriksen, Sdr. Sejerslev.
3,8	2,00	23-12	37	Sdj. Mars, e.s. 6367	Svend Lausten, Skærbæk.
5,8	1,39	1-12	18	ukendt	Villy Kristensen, Bjerndrup.
2,5	2,34	15- 2	33	Sdj. Dan, e.s. 6296	Boj Friis-Andresen, Emmerlev.

4,1 2,06

Hovedtabel 47. Afkomsprøve for tyren Thy Juve

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mælke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
32	18- 1-65	21- 9	976	609	6365	4,47	284,25	319	3,48	222	322	322	1797	421
45	8- 4-65	8-10	913	562	6358	4,31	274,00	308	3,41	217	305	305	1730	402
31	18-12-64	30- 8	985	638	6114	4,39	268,49	302	3,70	227	344	344	1685	434
41	25- 4-65	20-10	908	541	6295	4,20	264,65	297	3,49	220	293	293	1771	395
46	14- 9-65	13-10	759	502	5972	4,35	259,86	292	3,44	205	300	300	1697	403
49	20- 9-65	31-10	771	527	5615	4,50	252,68	284	3,74	210	282	282	1599	380
33	16- 1-65	8-10	995	613	5839	4,20	245,39	275	3,49	204	305	305	1538	401
42	25- 4-65	27-10	915	560	5355	4,56	244,29	275	3,67	196	286	286	1538	377
37	3- 4-65	20- 9	900	518	6818	3,41	232,21	258	3,34	228	319	319	1670	414
44	12- 3-65	4-10	936	540	5577	4,09	228,35	256	3,59	200	309	309	1387	387
35	28-12-64	7-10	1013	565	5252	4,34	228,03	256	3,51	184	306	306	1400	388
38	1- 9-65	23-10	782	562	5744	3,82	219,48	245	3,27	188	290	290	1396	363
39	22- 2-65	1-10	951	513	5340	3,84	205,30	229	3,43	183	312	312	1212	364
50	3- 9-65	19- 9	746	484	4579	4,23	193,89	217	3,54	162	324	324	1052	357
36	2- 2-65	23-10	993	592	4580	4,07	186,42	209	3,59	165	290	290	1046	335
40	15- 3-65	3- 9	902	604	4182	4,37	182,81	205	3,56	149	322	322	1060	338
48	2- 9-65	2-11	791	518	4078	4,12	168,19	188	3,68	150	280	280	893	308
43	1- 4-65	15- 9	897	549	3427	4,13	141,42	158	3,80	130	317	317	791	314
34	17- 1-65	6-11	1023	652	3219	4,37	140,67	158	3,61	116	276	276	851	287
47	1- 5-65	8-10	890	592	2530	4,22	106,73	120	3,60	91	287	305	749	299
Gns. af 20 kvier			902	562	5162	4,19	216,36	243	3,53	182	303	304	1343	368

Hovedtabel 48. Afkomsprøve for tyren Sdj. Pete

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mælke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
66	28- 2-65	15-10	959	542	6693	4,34	290,49	326	3,34	223	290	290	2089	430
63	16- 1-65	24- 9	981	580	5554	4,70	261,24	294	3,64	202	311	311	1691	395
68	31- 5-65	12-10	864	528	6375	4,05	257,94	289	3,41	217	293	293	1833	419
82	21- 4-65	9- 9	871	539	5736	4,12	236,47	265	3,23	185	323	323	1545	392
74	26- 3-65	16-10	934	531	5578	4,19	233,78	262	3,50	195	289	289	1516	367
75	2- 3-65	13- 9	925	538	5295	4,30	227,64	255	3,49	185	322	322	1425	385
78	12- 3-65	24- 9	926	570	5308	4,22	223,76	251	3,50	186	311	311	1431	380
67	20- 2-65	27-10	979	583	4925	4,27	210,26	236	3,51	173	278	278	1342	352
81	6- 6-65	2-10	848	528	4972	4,22	210,03	236	3,54	176	303	303	1265	372
79	10- 4-65	27-10	930	529	4488	4,54	203,61	229	3,55	159	278	278	1252	341
69	31- 3-65	29- 9	912	549	4746	4,28	203,31	228	3,72	176	306	306	1212	362
65	25- 2-65	14- 9	931	595	4719	4,28	201,83	226	3,53	167	318	318	1197	370
73	31- 5-65	21- 9	843	567	5041	3,98	200,76	225	3,48	176	314	314	1243	353
61	24- 1-65	19- 9	968	585	4740	4,20	199,03	223	3,84	182	313	313	1139	350
64	10- 4-65	28- 9	901	623	3940	4,54	178,91	201	3,70	146	307	307	1045	343
62 ¹	28-12-64	3-10	1009	588	4260	4,13	175,91	197	3,72	158	302	302	994	330
70 ²	8- 8-65	24- 9	777	528	3795	4,33	164,36	184	3,80	144	311	311	860	313
71	14- 7-65	24-10	832	518	4022	3,96	159,13	178	3,35	135	281	281	897	306
72	27- 4-65	17- 9	873	532	3794	4,04	153,11	171	3,37	128	318	318	835	326
Gns. af 19 kvier			909	555	4946	4,25	210,08	236	3,53	174	304	304	1306	362

¹ Trepatte. Ingen forbindelse fra yvervæv til pattekanal.² Højre forpatte stukket op på grund af sårdannelse omkring pattespidsen efter fjernelse af en vorte.

s. 7398, på Kronborg.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hestal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,1	1,62	12-12	7	Thy Gran, e.s. 6566	Viggo Oddershede, Vandtrang.
5,2	1,62	20- 2	139	Thy Gran, e.s. 6566	Harald Krabbe, Helligsø.
4,7	1,70	17-12	39	Thy Gran, e.s. 6566	Preben Villadsen, Jestrup.
4,0	2,29	30- 1	116	ukendt	Alfred Dalgaard, Kjelstrup.
3,3	2,82	19- 2	54	Thy Elm, s. 6787	Poul Rask, Thorsted.
4,1	2,12	8- 4	76	Franco, s. 6759	Niels E. Gravesen, Brund.
3,6	2,48	2- 1	45	Thy Bos, s. 6762	Aage Pedersen, Sennels.
5,0	1,70	11- 1	116	ukendt	Alfred Dalgaard, Kjelstrup.
4,7	1,88	9-12	12	Butenmoark Haro, e.s. 6182	Askov Christoffersen, Odby.
4,5	1,80	7- 2	33	Thy Tax, s. 7115	Jens Overgaard, Gærup.
4,9	1,64	2- 1	25	Thy Lærk, s. 6945	Mads Pedersen, Gundtoft.
3,9	2,27	14- 3	37	Thy Gran, e.s. 6566	Preben Villadsen, Jestrup.
3,3	2,50	4- 5	123	Anton 2, f. 30-4-57	Alfred Pedersen, Sennels.
2,4	3,01	14-12	85	Thy Gran, e.s. 6566	Kr. Krabbe, Trankjær.
4,0	2,03	18- 3	47	Thy Gran, e.s. 6566	Chr. Tange, Brund.
3,6	2,07	24-11	27	Thy Gran, e.s. 6566	Askov Christoffersen, Odby.
4,5	1,78	20- 1	60	ukendt	Chr. Gravesen, Ø. Vandet.
1,8	3,31	29-11	90	Nr. 31, f. 5-4-59	Vagn Brun, Sjørringvig.
6,6	1,23	1- 3	70	Thy Røn, e.B 21	Viggo Knudsen, Sdr. Ydby.
2,3	2,45	22-12	24	Thy Gran, e.s. 6566	Aksel Kristensen, Ashøje.
4,1	2,12				

s. 7607, på Brøstrupgård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hestal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,8	1,85	30-12	211	Klaaskes Johan, e.B 27	Anders Conradsen, Lintrup.
5,0	1,65	25- 1	45	Sdj. King, s. 7100	Jens Grosbøl Nielsen, Fole.
3,2	3,09	24- 1	44	Sdj. Reklame, e.A 42	N. Aa. Madsen, Ladegård.
2,5	3,30	29-11	17	Sdj. Dorn, s. 6766	Anders Carstensen, Grønnebæk.
3,0	2,89	8- 1	41	Sdj. Ernst, e.A 44	Peter Nissen, Langetved.
2,9	2,85	6-12	13	Sdj. Thor, s. 6692	Anders Carstensen, Grønnebæk.
3,4	2,38	9-12	15	Sdj. Ursus, s. 6454	Jens Birk, Fole.
3,6	2,36	4- 1	116	Sdj. Ernst, e.A 44	Ejner Petersen, Tornumgård.
3,0	2,78	27-12	71	Sdj. Thor, s. 6692	Magnus Grøndahl, Jels.
3,5	2,33	6- 1	29	Sdj. Tim, e.A 38	Jens Therkelsen, Skodborg.
2,5	3,04	18-12	118	Sdj. Henrik, e.s. 6219	Poul Rossen, Ørderup.
2,4	3,05	2-12	15	Sdj. Henrik, e.s. 6219	Anker Boisen, Langetved.
2,4	3,29	12- 2	75	Sdj. Ernst, e.A 44	Paul Sørensen, Jels.
2,4	3,22	1-12	91	Sdj. Argus, s. 6764	Gunnar Larsen, Vellerup.
5,2	1,50	26- 1	15	Sdj. Blok, e.A 64	Henning Jensen, Fæsted.
2,8	2,77	29-12	107	Sdj. Henrik, e.s. 6219	Carsten Carstensen, Tirslund.
2,5	2,71	22- 2 ¹	89	Sdj. Hof, s. 6963	Anders Fink, Bevtoft.
3,6	2,21	23-12	60	Sdj. Dorn, s. 6766	Jens Peter Ravn, Gram.
2,2	3,06	23-12	69	Sdj. Tim, e.A 38	Marie Aagaard, Kolsnap.
3,2	2 65				

¹ Kastet 19-7.

Hovedtabel 49. Afkomsprøve for tyren Give Robinea.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i ved marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
33	8- 5-65	18- 9	863	509	7211	4,19	302,23	339	3,38	244	323	323	2303	4887
42	24- 1-65	13- 9	962	570	6838	4,12	282,04	316	3,64	249	328	328	2025	4533
40	29- 4-65	30- 9	884	570	5563	4,64	257,98	290	3,65	203	311	311	1677	4166
32	21- 1-65	20-10	1002	576	6203	3,96	245,34	274	3,34	207	291	291	1774	3946
44	7- 3-65	25-10	962	482	6085	4,02	244,50	274	3,23	196	286	286	1726	3971
34	3- 4-65	25- 8	874	578	5153	4,60	236,89	266	3,86	199	331	331	1484	4044
47	25- 7-65	13- 9	780	508	5098	4,42	225,44	253	3,60	184	326	326	1421	3891
43	8- 5-65	12-10	887	520	4853	4,30	208,58	234	3,52	171	299	299	1346	3638
31	1- 7-65	26-11	878	509	5031	4,10	206,37	231	3,45	173	254	254	1459	3381
35 ¹	3- 4-65	9-10	919	599	4712	4,34	204,59	230	3,74	176	302	302	1272	3641
37	31-12-64	14- 9	987	598	5360	3,71	198,68	222	3,33	179	325	325	1298	3896
50	7- 7-65	25-10	840	516	4152	4,45	184,81	208	3,75	156	286	286	1112	3382
38	26- 5-65	11-11	899	584	4371	3,92	171,55	192	3,64	159	269	269	1070	3174
45	x- 6-65	15- 9	822	538	4305	3,91	168,42	188	3,54	152	326	326	978	3467
39 ²	25- 1-65	12-10	990	607	3960	3,94	155,86	174	3,39	134	299	299	862	3098
46	23- 4-65	1-10	891	532	4021	3,76	151,28	169	3,35	135	310	310	829	3213
49	12- 8-65	24- 9	773	575	3617	3,95	143,01	160	3,61	131	317	317	820	3045
48	14- 3-65	15-10	945	590	3051	4,02	122,79	137	3,62	111	296	296	676	2827
Gns. af 18 kvier			898	553	4977	4,14	206,13	231	3,53	176	304	304	1341	3678

¹ Venstre bagpatte stukket op efter pattetråd.² Højre forpatte stukket op efter pattetråd.

Hovedtabel 50. Afkomsprøve for tyren Sdj. Corr.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i ved marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
91	25- 1-65	7-10	985	555	6317	4,41	278,37	313	3,54	224	295	295	1932	4319
110	26- 4-65	25-10	912	544	5310	4,87	258,57	291	4,05	215	277	277	1664	3633
92	12- 5-65	28- 9	869	581	5602	4,54	254,10	286	3,70	207	304	304	1667	3895
109	12- 1-65	25- 9	986	502	5847	4,34	253,76	285	3,58	209	307	307	1661	4075
103	7- 4-65	8- 9	884	560	5192	4,47	232,08	261	3,80	197	317	317	1450	3773
94	8- 3-65	12- 9	918	610	4963	4,26	211,58	237	3,74	186	320	320	1222	3586
93	23- 1-65	5-10	985	588	5188	4,03	209,11	234	3,33	173	297	297	1285	3618
107	7- 1-65	12-10	1008	551	5273	3,92	206,44	231	3,41	180	290	290	1370	3600
108	20- 4-65	10- 9	873	555	4852	4,23	205,41	230	3,45	167	322	322	1214	3715
106	16- 5-65	25- 9	862	483	4452	4,37	194,47	218	3,56	158	307	307	1091	3493
111	22- 3-65	14- 9	906	498	4485	4,25	190,70	214	3,62	162	318	318	1114	3608
100	18- 4-65	14-10	909	600	4257	4,40	187,17	210	3,63	155	288	288	1088	3336
102	19- 7-65	30- 9	803	611	4212	4,40	185,24	208	3,75	158	302	302	1038	3347
97	14- 4-65	11- 9	880	563	4283	4,16	178,05	200	3,51	150	321	321	1002	3549
104	27- 2-65	25- 9	940	576	4037	4,40	177,72	200	3,89	157	307	307	968	3424
96	8- 3-65	4- 9	910	553	3691	4,65	171,59	193	3,85	142	314	314	946	3351
95	31- 3-65	8-10	921	569	3334	4,45	148,23	167	3,87	129	294	294	768	3077
105	3- 7-65	14- 9	803	581	3602	3,84	138,14	154	3,55	128	318	318	798	3181
101	18- 4-65	22-10	917	576	2962	4,04	119,60	134	3,59	106	280	280	666	2812
Gns. af 19 kvier			909	561	4624	4,33	200,02	225	3,65	169	304	304	1208	3547

s. 7620, på Skovgård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,3	2,86	31- 1	10	Nico, e.s. 6138	Vagn Nielsen, Flø.
4,3	2,00	27- 2	59	Give Gordon, e.B 19	Julius Kristensen, Kragtig.
3,8	2,22	21-12	95	Nr. 116	Jydsk Kultørv, Blåhøj.
6,9	1,12	24- 1	1	Give Gordon, e.B 19	Elvin Løth, Blåhøj.
3,7	2,45	25- 5 ¹	46	Dan-Klaas, s. 6379	Jens Venø, Karstoft.
4,0	1,94	23-11	38	Give Gordon, e.B 19	Antonius Hansen, Filskov.
5,2	1,55	9-12	8	Varde Strib, s. 6889	Vilfred Nielsen, Ulkind.
6,0	1,35	12-12	87	ukendt	Aage V. Christensen, Grarup.
10,2	0,64	4- 6	66	Guvernør, s. 6661	Søren Jensen, Blåhøj.
7,5	1,08	21-12	38	Give Gordon, e.B 19	Antonius Hansen, Filskov.
6,1	1,32	9-12	74	Dan-Klaas, s. 6379	Otto Kjær, Ulkind.
5,4	1,46	17- 2	24	Ole, e.s. 6229	Osvald Andreasen, Oksenbjerger.
3,2	2,53	12- 2	—	ukendt	Godtfred Herskind, Molger.
2,6	2,79	18-12	4	Give Gordon, e.B 19	Oluf Møller, Risbjerg.
4,4	1,70	15-12	78	Give Bast, s. 6791	Elmer Damkær, Vemmelund.
5,0	1,54	13- 4	84	Blitsaerd, s. 6459	Aage Nielsen, Ll. Risager.
6,1	1,32	11- 3	42	Give Bast, s. 6791	Johs. Jørgensen, Lindet.
4,3	1,64	25- 5	65	Ole, e.s. 6229	Skov Troelsen, Langelund.
5,1	1,75				

¹ Kastet i marts efter ins. 16-2.

s. 7410, på Brøstrupgård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,9	2,34	2- 2	11	Sdj. Paul, e.s. 6369	Jens Forum, Kolstrup.
3,6	2,47	5- 6	89	Sdj. Reklame, e.A 42	Valdemar Bjørnsen, Stubbum.
4,6	1,81	31- 5	100	Sdj. Ernst, e.A 44	Anker Lund, Skodborg J.
3,4	2,59	2- 1	128	Sdj. Reklame, e.A 42	Ejner Petersen, Tornumgård.
3,8	2,13	27-11	22	Sdj. Nico, e.s. 6370	Th. Juhl, Fårkrog.
4,6	1,68	18- 1	32	Sdj. Mars, e.s. 6367	Heinrich Følster, Fole.
3,6	2,24	15- 5	33	Sdj. Ernst, e.A 44	Marie Østergaard, Gabøl.
3,8	2,21	3- 1	74	Sdj. Hof, s. 6963	Frøde Tryk, Hjerting.
3,2	2,44	5-12	152	Nr. 220, f. 22-9-54	Tage Frandsen, Refsø.
4,5	1,71	18- 1	158	Sdj. Blok, e.A 64	H. Kjems Simonsen, Fæsted.
4,0	1,92	2-12	112	Sdj. Tim, e.A 38	Ejner Petersen, Tornumgård.
4,3	1,81	30-12	66	Sdj. Dorn, s. 6766	Iver H. Ottesen, Grønnebæk.
2,1	3,41	24- 4	200	Sdj. Juvel, e.s. 6217	E. Rostgaard Andersen, Københoved.
3,0	2,41	18-12	26	Nr. 66, f. 30-9-59	Fr. Greisen, Vedbøl.
3,1	2,37	14-12	35	Sdj. Ernst, e.A 44	Peter Ravn, Krogstrup.
4,3	1,76	20-11	24	Sdj. Tim, e.A 38	Peter Nissen, Langetved.
2,5	2,58	2- 1	61	Sdj. Ernst, e.A 44	Niels Aggesen, Magstrup.
3,0	2,23	4- 1	108	Sdj. Dorn, s. 6766	Niels Nielsen, Refsømark.
4,7	1,57	13- 1	60	Sdj. Kejser, s. 7104	Nis Paulsen, Ladegård.
3,7	2,19				

Hovedtabel 51. Afkomsprøve for tyren Hadsten Adson,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i maris kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
97	31-1-65	25-9	967	559	5946	4,70	279,31	314	3,57	213	310	310	1892	4021
99	8-10-64	30-9	1087	550	6076	4,45	270,51	304	3,42	208	305	305	1899	3991
104	18-4-65	26-9	891	537	5661	4,55	257,36	289	3,44	195	309	309	1737	3796
91	7-11-64	3-9	1030	644	4669	4,90	228,73	258	3,89	182	332	332	1401	3756
101	23-1-65	1-10	981	603	4850	4,62	223,98	252	3,63	176	304	304	1438	3583
110	17-3-65	15-9	912	491	4509	4,83	217,87	245	3,83	173	320	320	1336	3529
108	15-3-65	29-8	897	513	4676	4,58	214,12	241	3,76	176	337	337	1281	3559
103	19-5-65	1-11	896	540	4244	4,90	208,11	235	3,78	160	273	273	1324	3255
98	24-2-65	6-10	954	555	3736	4,51	168,52	189	3,82	143	299	299	1042	3159
93	12-1-65	12-9	973	590	3844	4,21	161,65	181	3,52	135	323	323	940	3172
102	20-11-64	12-10	1056	539	3336	4,68	155,99	176	3,76	125	293	293	870	2974
92	23-11-64	5-9	1016	576	3240	4,78	154,71	174	4,15	135	330	330	840	3158
109	8-12-65	30-10	691	488	3439	4,44	152,86	172	3,96	136	275	275	924	2880
96	20-3-65	11-11	966	540	3370	4,51	152,08	171	3,55	120	263	263	907	2772
107	14-12-64	2-10	1022	550	2987	5,09	151,99	172	4,03	120	303	303	1014	3033
94	9-11-64	8-9	1033	605	3245	4,60	149,17	168	3,74	121	327	327	833	3048
95	9-2-65	11-10	974	581	3299	4,02	132,69	149	3,66	121	294	294	774	2875
106	30-1-65	7-11	1011	572	2680	4,39	117,64	132	3,87	104	267	267	707	2529
Gns. af 18 kvier			964	557	4100	4,60	188,74	212	3,72	152	304	304	1176	3283

Hovedtabel 52. Afkomsprøve for tyren Horsens Bast,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i maris kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
7	17-4-65	25-9	891	548	6306	4,28	269,96	303	3,74	236	318	318	1796	4322
3	9-5-65	4-9	848	584	4540	4,57	207,40	233	3,74	170	321	321	1158	3666
2	17-4-65	4-9	870	535	4502	4,56	205,37	231	3,83	172	293	293	1199	3404
11	19-8-65	15-10	787	539	4206	4,74	199,45	225	3,82	161	298	298	1125	3493
6	17-6-65	26-9	831	555	4232	4,65	196,96	222	3,95	167	317	317	1055	3361
18	4-9-65	1-11	788	476	4517	4,29	193,78	217	3,65	165	281	281	1161	3402
20	6-7-65	12-10	828	553	4940	3,88	191,48	214	3,49	172	301	301	1158	3577
21	14-9-65	26-10	772	504	4738	4,01	189,96	213	3,47	164	287	287	1173	3458
13	16-5-65	20-10	887	557	4552	4,17	189,85	213	3,60	164	293	293	1112	3487
4	23-8-65	17-9	755	538	3862	4,61	177,96	200	3,88	150	322	322	915	3424
9	12-8-65	8-10	787	507	3716	4,68	173,96	196	3,95	147	305	305	893	3339
12	7-9-65	6-10	759	521	3768	4,55	171,57	193	3,60	136	303	303	908	3125
5	21-7-65	24-9	795	540	3841	4,36	167,51	188	3,67	141	319	319	847	3184
8	16-6-65	28-9	834	551	3725	4,32	161,10	181	3,80	142	297	297	847	3055
15	15-9-65	18-10	763	539	3842	4,17	160,02	179	3,66	141	295	295	834	3158
10	28-6-65	4-10	828	502	3483	4,08	142,15	159	3,95	138	309	309	722	2849
17	13-10-65	29-10	746	520	3067	4,52	138,63	156	3,84	118	284	284	687	2834
19	30-5-65	19-9	842	540	3055	4,43	135,47	152	3,80	116	313	313	698	3109
1	18-5-65	1-9	836	586	2910	4,65	135,35	152	3,87	113	324	324	648	2874
14	10-6-65	13-10	855	467	2678	4,64	124,27	140	3,69	99	300	300	596	2691
Gns. af 20 kvier			815	533	4024	4,39	176,61	198	3,74	150	304	304	977	3291

s. 7506, på Kalø.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2,7	3,36	19- 4	49	Berk, s. 6904	Karl Jensen, Norring.
3,0	2,98	5-12	37	Bjerring, e.A 32	Ivar Mohr, Hadbjerg.
4,4	1,91	18- 3	20	Jelsum, s. 6484	Herluf Andersen, Mejlbj.
2,6	2,89	8- 1	145	Berk, s. 6904	H. J. Tranberg, Halling.
4,4	1,86	22- 1	19	Jelsum, s. 6484	Nikolaj Høj, Erslev.
3,2	2,41	7-12	50	Haskera, s. 6903	Karl Jensen, Norring.
3,1	2,49	4- 5	87	Jelsum, s. 6484	C. E. Bl. Mathiesen, Hinnerup.
3,1	2,71	28-12	8	Jelsum, s. 6484	Chr. Mortensen, Haldum.
2,8	2,69	9-12	6	ukendt	Kjeld Mathiesen, Tinning.
3,4	2,07	13- 2	28	Haskera, s. 6903	Chr. Mortensen, Haldum.
4,3	1,75	12- 1	48	Jelsum, s. 6484	Peter Mondrup, Hårup.
2,7	2,36	14-12	29	Berk, s. 6904	Chr. Mortensen, Haldum.
4,5	1,70	27- 1	74	Haskera, s. 6903	Kjeldsen og Christensen, Rud.
3,9	1,97	— 1	24	Jelsum, s. 6484	Hans Grosen, Hadbjerg.
4,4	1,65	3- 1	121	Bjerring, e.A 32	Over Løjstrup, Laurbjerg.
4,4	1,64	3- 6	67	Haskera, s. 6903	Laur. Poulsen, Ødum.
4,2	1,73	12- 2	106	ukendt	Over Løjstrup, Laurbjerg.
5,9	1,34	16- 4	23	Nr. 47, f. 23-2-61	Sigvald Mondrup, Mejlbj.
3,7	2,20				

¹ Kronisk børbetændelse.

s. 7645, på Østerhåb.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2,7	3,30	27- 1	81a	Nico, e.s. 6138	Sigfred Andreasen, Såby.
4,4	1,75	25-11	81	Horsens Mads, s. 6728	Knud Nielsen, Hvirring.
2,6	2,91	21-11	81b	Nico, e.s. 6138	Sigfred Andreasen, Såby.
2,3	3,19	8- 2	51	Horsens Dolfus, s. 7111	Jørgen Husmann, Hårby.
3,6	2,19	27- 3	65	Horsens Markus, s. 7002	Vagn Laursen, Dørup.
3,4	2,47	30-12	42	Horsens Bonne, s. 7001	Svend Wurtz Nielsen, Hårby.
4,2	1,93	16-12	99	Horsens Pold, s. 6580	Sigfred Andreasen, Såby.
3,4	2,38	14- 3	65	Horsens Dolfus, s. 7111	Marius Jensen, Elling.
3,2	2,49	5- 2	106	ukendt	Gunner Enevoldsen, Marienborg.
3,2	2,20	11-12	123	Horsens Dolfus, s. 7111	Børge Jørgensen, Serridslev.
2,5	2,72	9- 1	2	Horsens Dolfus, s. 7111	Hans Chr. Jensen, Tåning.
3,0	2,31	9-12	16	Horsens Top, s. 7300	Stounbjerg Sørensen, Serridslev.
3,5	2,00	28-12	93	Horsens Leo, e.s. 6289	Poul Høgh Lyse, Ølsted.
2,6	2,69	25-11	22	Bjerringbro Marcel, s. 7085	Anton Jørgensen, Brund.
4,3	1,78	9- 1	3	Horsens Markus, s. 7002	Søren Andersen, Hansted.
3,4	2,07	14- 5	76	Horsens Pold, s. 6580	Oluf Houmann, Vinten.
2,5	2,64	12- 1	80	Skals Gordon, e.A 30	Simon Mortensen, Hornborg.
3,4	2,02	4-12	13	Skals Gordon, e.A 30	Tyrstinggård, Brædstrup.
2,5	2,32	23-11	17	Nr. 77, f. 8-10-58	Sigfred Andreasen, Såby.
4,6	1,53	3- 1	43	Horsens Dolfus, s. 7111	Søren B. Sørensen, Monbjerg.
3,3	2,34				

Hovedtabel 53. Afkomsprøve for tyren Varde Regent,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
72	13-	4-65	22- 9	892	503	6249	4,40	275,03	309	3,71	232	317	1750	4375
61	30-	3-65	15- 9	899	479	5707	4,55	259,69	292	3,88	222	324	1627	4467
62	27-	5-65	10-10	866	547	5606	4,46	250,10	281	3,83	215	299	1509	3933
81	4-	4-65	19-10	928	470	5304	4,52	239,85	270	3,75	199	290	1500	3795
82	30-	5-65	20-10	873	502	5707	4,14	236,26	265	3,85	220	289	1524	3902
65	25-	4-65	13-10	901	500	5561	4,20	233,62	262	3,33	185	296	1402	3697
66	31-	1-65	11-10	983	600	4485	4,54	203,52	229	3,68	165	298	1162	3575
70	16-	2-65	8- 9	934	572	4740	3,97	188,04	210	3,58	170	331	1088	3635
79	16-	6-65	13-10	849	504	4045	4,60	185,98	209	3,78	153	296	1027	3372
77	11-	4-65	4-10	906	546	4499	3,91	176,08	197	3,61	162	305	946	3330
78	17-	4-65	6-10	902	506	4020	4,28	172,24	193	3,75	151	303	885	3290
64	18-	2-65	4-10	958	587	3498	4,61	161,23	181	3,81	133	305	807	3286
68	21-	2-65	22- 9	943	602	3273	4,61	150,73	170	3,80	124	317	863	3223
69	22-	2-65	22- 9	942	516	3300	4,19	138,23	155	3,80	125	317	713	3086
80	9-	2-65	21-10	984	496	2591	4,49	116,46	131	4,05	105	288	544	2700
75	19-	5-65	1-10	865	548	2507	4,42	110,82	124	3,86	97	308	563	2600
71	6-	1-65	8-10	1005	584	2397	4,04	96,82	108	3,63	87	301	482	2496
74	24-	4-65	23-10	912	595	1753	4,02	70,47	79	3,73	65	286	537	2222
76	24-	6-65	6-10	834	587	900	4,16	37,46	42	3,92	35	177	303	1823
Gns. af 19 kvier				915	539	4007	4,34	173,82	195	3,74	150	297	304	3306

Hovedtabel 54. Afkomsprøve for tyren Hjørring Vester,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
78	22-	1-65	10-11	1022	502	5115	4,52	231,05	260	3,64	186	267	1374	3470
68	11-	7-65	28- 9	809	550	4860	4,55	221,21	249	3,66	178	310	1197	3735
75	23-	2-65	25-10	974	565	4757	4,62	219,82	247	3,72	177	283	1228	3493
77	24-10-65	14-11	751	470	4478	4,57	204,86	230	3,57	160	263	263	1134	3196
73	27-	2-65	25-10	970	519	4398	4,25	186,73	210	3,63	160	283	1022	3322
66	23-	9-65	20- 9	727	490	4117	4,49	184,82	208	3,75	154	318	935	3319
63	1-	7-65	15- 9	806	558	3795	4,86	184,54	208	4,11	156	323	836	3343
74	6-	1-65	5-10	1002	529	4069	4,51	183,32	206	3,70	151	303	920	3420
79	7-	5-65	2-10	878	580	4111	4,31	177,02	199	3,78	156	306	906	3431
61	15-	2-65	24- 8	920	510	3465	4,70	162,77	183	3,82	132	345	804	3456
65	25-	1-65	19- 9	967	517	3008	5,34	160,54	181	4,17	125	319	739	3253
62	7-	4-65	17- 9	893	535	3281	4,83	158,40	178	3,80	125	321	732	3442
70	22-	4-65	8-10	899	561	2732	4,65	126,92	143	3,89	106	300	669	2852
71 ¹	3-	1-65	11-10	1011	573	2445	4,58	112,07	126	3,57	87	297	601	2816
64	28-	4-65	23- 9	878	576	1898	4,34	82,38	92	3,76	71	288	623	2858
Gns. af 15 kvier				900	536	3769	4,59	173,10	195	3,76	142	302	304	3294

¹ Trepatet efter yverbetændelse.

s. 7438, på Vardegård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,6	1,87	3- 1	68	Varde Bob, e.A 54	Hans Jepsen, Skonager.
3,6	2,33	20- 1	21	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Karl Nørlund, Gårde.
4,4	1,92	28- 2	38	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Hans Kristiansen, Kærup.
5,0	1,66	29- 1	76	Reintkje El, e.s. 6377	Gunnar Lauridsen, Bjerremose.
3,5	2,53	11- 3	158	Varde Zijlster, s. 6642	Henning Pedersen, Sønderbygård.
4,6	1,89	22- 2	115	Varde Strib, s. 6889	Chr. Strandbygaard, Ølgod.
3,1	2,55	24- 4	83	Lindbjerg Willem, s. 5941	Eigil Jeppesen, Lindbjerg.
2,9	2,76	5- 1	46	Varde Sultan, s. 6778	Peder Jensen, Forsomho.
2,9	2,61	19-12	33	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Kr. Gejl Jensen, Hauge.
3,6	2,19	10- 2	58	Sudhoekster A. Eduard, e.s. 6375	Albert Kristensen, Yderik.
3,7	2,07	15- 1	50	Varde Roelof, e.A 34	Peder Midtgaard, Tinghøj.
3,8	1,92	13-12	110	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Peder Sørensen, Kvong.
4,1	1,71	12-12	77	Piet El, s. 6536	Eigil Jeppesen, Lindbjerg.
4,2	1,70	11-12	49	Varde Yge, s. 6641	Møller O. Kristensen, Mejlvang.
2,9	2,21	8- 1	111	Varde Gerard, s. 7124	Ebbe Johannesen, Ølgod.
2,7	2,20	6- 1	86	Varde Roelof, e.A 34	Georg Jensen, Høgsbro.
3,1	1,99	—	26	Varde Yge, s. 6641	Svend Højen, Terp.
5,3	1,36	13- 1	73	Varde Ruyter, s. 6776	Peder Schmidt, Sadderup.
1,6	2,03	16- 3	67	Varde Jep, s. 6915	Lambert Lauridsen, Vestkær.
3,7	2,08				

s. 7658, på Dybvad.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,4	1,99	7- 2	49	ukendt	Jens Olsen, Ravnstrup.
3,2	2,44	10- 1	127	Hjørring Matrose, s. 6818	Poul Dam, Fristrupgård, Vrå.
2,4	3,55	— ¹	59	Haven 53, s. 6824	Axel Kjær, Skånvadgård, Brønderslev.
4,0	2,15	4- 3	106	Hjørring Rykind, e.B 17	Kristen Kjeldsen, Mygdal.
5,4	1,48	3- 3	77	Gordon 108, s. 6825	Axel Kjær, Skånvadgård, Brønderslev.
2,8	2,67	26- 4 ²	61	Hero Langholt, s. 6785	Albert Thomsen, Understed.
2,6	2,67	24-12	23	Cæsar, e.s. 6339	Thomas Jensen, Furreby.
3,4	2,21	15- 3	46	Hjørring Adema, e.A 16	Holger Larsen, Mygdal.
2,8	2,62	7- 4	144	Bisp, e.s. 6168	Poul Sørensen, Kræmmergård, Løkken.
2,3	2,78	12- 1	8	Bisp, e.s. 6168	Johs. Jensen, Nr. Knuden.
3,3	2,04	2- 1	60	Opmand, s. 6427	Poul Erik Nielsen, Ingstrup.
2,1	2,75	15- 1	2	ukendt	Chr. Vestergaard, Bagterp.
2,9	2,09	20- 5 ³	70	Cæsar, e.s. 6339	Viggo Villumsen, Skallerup.
3,5	1,83	2- 3	23	Hjørring Dolfus, s. 7297	Harry Sørensen, Sdr. Saltum.
2,4	2,22	30- 3	20	ukendt	Arne Bendixen Brok, Lørslev.
3,2	2,37				

¹ Brummer.² Kastet 1-4 efter ins. 2-2.³ Kastet 17-5 efter ins. 18-3.

Hovedtabel 55. Afkomsprøve for tyren Århus Tax,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved marts	Vægt i kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
67	14-2-65	30-10	988	526	6229	4,05	252,09	282	3,33	208	281	281	1787	4062
64	16-5-65	11-9	848	549	5297	4,46	236,41	266	3,57	189	330	330	1458	4123
77	31-7-65	14-10	805	499	5754	4,04	232,40	260	3,14	181	297	297	1621	3946
63	7-7-65	27-8	781	538	4886	4,49	219,43	247	3,68	180	345	345	1265	3908
69	25-4-65	30-8	857	550	4886	4,37	213,75	240	3,67	179	340	340	1235	3892
75	2-5-65	5-9	856	521	5200	3,99	207,60	232	3,40	177	334	334	1256	3840
76	13-8-65	20-10	798	500	4772	4,26	203,43	228	3,58	171	291	291	1278	3579
62 ¹	3-7-65	14-10	833	524	4577	4,08	186,75	209	3,39	155	297	297	1101	3610
71	12-2-65	19-10	979	515	4134	4,11	169,72	190	3,48	144	292	292	922	3325
80	10-6-65	27-9	839	524	3640	4,61	167,86	189	3,74	136	314	314	886	3293
66	9-5-65	31-8	844	589	3747	3,96	148,37	166	3,52	132	318	318	788	3247
65	23-4-65	18-10	908	581	3295	4,29	141,24	158	3,71	122	293	293	695	2979
61	17-4-65	22-10	918	549	3141	4,46	140,19	158	3,87	121	289	289	691	2991
74	1-8-65	15-10	805	501	3404	4,10	139,43	156	3,57	122	296	296	714	3060
72	9-7-65	15-10	828	581	2977	4,43	131,92	148	3,68	109	280	280	620	2865
68	23-4-65	28-9	888	560	3125	4,22	131,79	148	3,62	113	313	313	617	2948
78	18-4-65	1-11	927	531	2816	4,39	123,71	139	3,71	105	279	279	569	2637
70	13-6-65	28-9	837	601	2679	4,31	115,45	130	3,89	104	311	311	586	2992
73	20-9-65	3-11	774	571	1804	4,17	75,30	84	3,53	64	212	277	525	2477
Gns. af 19 kvier			859	543	4019	4,24	170,36	191	3,55	143	301	304	980	3357

¹ Trepattet efter yverbetændelse.

Hovedtabel 56. Afkomsprøve for tyren Horsens Frank,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved marts	Vægt i kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
34	7-4-65	16-9	892	382	4806	7,36	353,88	403	4,42	212	328	328	2078	4256
47	21-9-65	1-11	771	361	4310	7,78	335,52	383	4,43	191	282	282	1959	3861
36	2-6-65	20-9	840	323	4926	6,79	334,66	381	4,16	205	324	324	1978	4115
38	15-5-65	25-9	863	347	4438	6,85	303,90	346	4,27	190	300	300	1785	3641
50	29-11-65	4-11	705	355	4689	6,48	303,65	345	4,02	189	279	279	1828	3705
37	1-6-65	22-9	843	336	4192	7,12	298,36	340	4,33	181	322	322	1654	3736
35	2-8-65	23-9	782	369	4640	6,12	284,07	322	4,15	193	321	321	1633	3704
45	31-3-65	21-10	934	361	4100	6,59	270,25	307	4,32	177	293	293	1553	3390
32	2-9-65	10-9	738	325	3276	8,19	268,39	306	4,78	157	329	329	1329	3485
49	13-10-65	2-11	750	332	3814	7,01	267,36	304	4,18	159	281	281	1504	3282
40	21-9-65	19-9	728	300	3979	6,63	263,94	300	4,17	166	325	325	1411	3533
48	2-4-65	28-9	909	345	3880	6,76	262,20	298	4,48	174	304	304	1443	3492
46	16-8-65	29-10	804	338	3824	6,75	258,05	293	4,41	169	285	285	1488	3396
41	28-8-65	13-10	776	324	3915	6,36	249,06	283	4,01	157	301	301	1363	3341
51	30-12-65	14-10	653	331	4102	5,92	242,92	275	4,08	168	300	300	1340	3310
42	10-10-65	12-10	732	341	3501	6,93	242,69	276	4,24	148	302	302	1262	3197
43	22-12-65	3-11	681	286	3496	6,63	231,94	264	4,02	140	280	280	1229	3019
33	10-9-65	14-9	734	371	3290	6,91	227,31	259	4,28	141	311	311	1157	3182
39	22-9-65	7-10	745	366	3247	6,45	209,50	238	4,28	139	307	307	1030	2973
Gns. af 19 kvier			783	342	4022	6,81	274,09	312	4,26	171	304	304	1528	3506

s. 7627, på Elkjær.

Malke- i min.	Malk- tid bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,1	3,35	15- 3	3	Århus Ponto, s. 6669	Frode Jensen, Katstrup.
2,7	3,16	19-12	64	Århus Coba, e.A 66	Gunnar Tranberg, Skibby.
4,5	1,90	29-12	89	Kalman, s. 6326	Fr. Kruse Andersen, True.
2,5	3,16	26- 2	80	Århus Berk, s. 7256	Marie Mathiasen, Stjær.
2,6	2,90	9-12	84	Århus Coba, e.A 66	Jens O. Andersen, Høver.
3,4	2,25	11-12	90	Århus Coba, e.A 66	Jens O. Andersen, Høver.
3,5	2,39	19-12	57	Århus Coba, e.A 66	Holger Birk, Porskjær, Galtén,
2,8	2,80	14-12	5	Århus Ponto, s. 6669	Peter Brandt, Storrø.
3,7	2,10	10- 1	55	Århus Ponto, s. 6669	Tage Jensen, Stabrand.
3,3	2,12	12-12	58	Århus Coba, e.A 66	Ellen Jensen, Ravnholt.
2,3	2,67	20-11	10	Skjold, s. 6314	Sv. Thomsen, Lillering.
3,8	1,90	18-12	9a	Hertug, s. 6401	Hans Tage Hansen, Åbo.
2,8	2,44	16-12	4	Århus Blika, s. 6760	H. Kreutzfeld Rasmussen, Saksild.
3,1	2,20	16- 1	56	Århus Coba, e.A 66	Holger Birk, Porskjær, Galtén.
2,8	2,35	28-11	48	Hertug, s. 6401	Marie Mathiasen, Stjær.
2,7	2,36	2- 2 ¹	9b	Hertug, s. 6401	Hans Tage Hansen, Åbo.
4,7	1,54	18-12	43	Kastor, e.A 4	Jens Andersen, Hadrup.
2,7	2,19	5-12	24	Århus Blika, s. 6760	H. Kreutzfeld Rasmussen, Saksild.
4,3	1,59	19-12	2	ukendt	Frits Høgh, Knebel.
3,2	2,39				

¹ Kastet 10-1 efter ins. 1-12.

s. 3398, på Østerhåb.

Malke- i min.	Malk- tid bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,4	1,44	8- 2	57	Horsens Seas, s. 2558	Søren Bregendahl, Egebjerg.
5,7	1,15	7- 3	22	Prins Holm, e.s. 127	Niels Otto Munch, Nebel.
4,4	1,48	30- 1	20	Elkær, s. 2600	Sigurd Mortensen, Sattrup.
3,9	1,73	25-11 ¹	19	Man, s. 2410	Svend Aage Møller, Ravnholt.
4,8	1,56	20- 2	2	Prins Holm, e.s. 127	Johan Refsgaard, Oens.
4,4	1,39	19-12	96	Prins Holm, e.s. 127	Hans Baymler, Klakring.
4,0	1,65	11- 3	40	Egholm Bille, s. 2413	Knud Lauritzen, Linnerup.
2,8	2,72	7- 5	71	Horsens Milo, s. 2590	Herdis Poulsen, Ejer.
2,1	2,62	6-12	98	ukendt	Vagn Mikkelsen, Klejs.
4,0	1,59	2- 3	32	Prins Holm, e.s. 127	Aksel Wulff, Riis.
3,7	1,58	15-12	77	Prins Holm, e.s. 127	Laurits Wendelboe, Ølsted.
3,2	2,06	4-12	32	Odsøn, s. 2971	Niels Otto Munch, Nebel.
3,0	2,29	14- 3	62	Habil, s. 1688	Børge Sølvsten, Åes, Tvingstrup.
3,3	1,86	14- 2	—	ukendt	Egon Nielsen, Klakring.
4,1	1,53	16- 1	41	Lambæk 12, s. 2231	Harald Egebjerg, Hatting.
2,6	2,41	2- 1	2	Hammel, e.s. 113	Bøge Nielsen, Bjerre.
3,2	2,04	13- 2	1	Prins Holm, e.s. 127	Vagn Mikkelsen, Klejs.
3,6	1,54	23-11	30	Prins Holm, e.s. 127	Leo Munch, Serridslev.
3,2	1,74	21-12	82	Prins Holm, e.s. 127	P. Østerbæk, Honumskov.
3,7	1,81				

¹ Kastet 3-8.

Hovedtabel 57. Afkomsprøve for tyren Egholm Russ,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
75	24- 7-65	9-10	807	335	4854	6,91	335,23	381	4,39	213	297	297	2116	3949
63	5- 5-65	12- 9	860	348	4755	6,90	327,88	373	4,35	207	324	324	2125	4084
68	27- 4-65	10- 9	866	376	4789	6,50	311,49	354	4,40	211	326	326	1949	3791
66	18- 2-65	27- 8	920	390	4442	6,80	302,11	344	4,61	205	340	340	1845	3824
74	23-10-65	28-10	735	362	4319	6,90	297,86	339	4,38	189	278	278	1867	3457
65	12- 3-65	6- 9	908	389	4389	6,60	289,62	329	4,52	198	330	330	1790	3828
61	23- 5-65	19- 9	849	376	3975	7,18	285,23	325	4,42	176	317	317	1741	3574
80	24- 7-65	18- 9	786	349	3684	7,63	281,19	321	4,67	172	318	318	1599	3405
70	10-12-65	9-11	699	378	4623	5,99	276,78	314	4,34	201	266	266	1795	3483
76	10-10-65	18- 9	708	374	4103	6,58	269,80	307	4,39	180	318	318	1661	3577
67	14-10-65	7-11	754	358	3655	7,38	269,59	307	4,47	163	268	268	1623	3226
79	19- 6-65	9-10	842	303	4732	5,56	263,22	298	3,99	189	297	297	1688	3567
71	4-12-65	24- 9	659	371	3352	7,47	250,29	285	4,74	159	312	312	1500	3227
69	27- 5-65	24- 9	850	326	3823	6,50	248,61	282	4,19	160	312	312	1560	3421
73	10- 2-65	10-10	972	330	3710	6,65	246,80	281	4,47	166	296	296	1574	3214
72	20- 9-65	6-10	746	398	3894	6,31	245,53	279	4,36	170	300	300	1516	3333
77	6- 8-65	26-10	811	348	3812	6,32	240,83	273	4,23	161	280	280	1513	3187
78	16- 6-65	28-10	864	397	3185	7,27	231,62	264	4,43	141	278	278	1385	2878
64	22- 6-65	29- 8	798	392	3137	7,30	229,04	261	4,53	142	320	320	1538	3203
Gns. af 19 kvier			812	363	4065	6,74	273,83	311	4,41	179	304	304	1704	3486

Hovedtabel 58. Afkomsprøve for tyren Gefion,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
193	21- 9-65	5-10	744	341	5097	6,30	321,19	365	4,17	213	314	314	2080	3795
196	5-10-65	28- 9	723	361	4820	6,35	306,31	348	4,24	205	321	321	1930	3628
181	25- 9-65	20- 9	725	400	4479	6,68	299,27	340	4,04	181	329	329	1828	3672
198 ¹	14- 8-65	29- 9	776	338	4400	6,54	287,93	327	4,18	184	317	317	1879	3659
182	8- 9-65	13-10	765	395	4139	6,89	285,27	324	4,50	186	306	306	1755	3452
191	22-10-65	17-10	725	345	4288	6,63	284,20	323	4,19	180	302	302	1777	3508
197	18- 9-65	13-10	755	353	4130	6,81	281,33	320	4,43	183	306	306	1720	3379
199	23- 9-65	30- 9	737	347	4132	6,63	273,94	311	4,22	174	309	309	1670	3414
185	11-10-65	9-10	728	401	4227	6,42	271,27	308	4,00	169	310	310	1655	3478
188	22- 9-65	23- 9	731	360	4413	6,11	269,54	306	4,06	179	323	323	1663	3477
195	27- 9-65	22-10	755	365	4112	6,51	267,79	304	4,17	172	297	297	1678	3347
183	17-10-65	1-11	745	357	4047	6,40	258,89	294	4,24	172	287	287	1641	3330
190	5- 9-65	13-10	768	383	3857	6,66	256,73	292	4,11	158	303	303	1555	3238
189	8-11-65	29-10	720	334	3918	6,43	251,95	286	4,04	158	290	290	1559	3194
192	5-10-65	30-10	755	364	3908	6,33	247,49	281	4,10	160	289	289	1545	3091
194	12-11-65	5-11	723	380	3686	6,68	246,22	280	4,24	156	283	283	1512	3143
187	30- 9-65	8-10	738	361	3664	6,62	242,62	276	4,30	157	311	311	1493	3140
186	15-10-65	7-11	753	401	3513	6,42	225,48	256	4,16	146	281	281	1350	2960
200	22-10-65	27-10	735	295	3611	6,01	216,88	246	4,04	146	292	292	1307	2869
184	3- 9-65	10-10	767	411	2757	6,38	175,99	200	4,17	115	309	309	1051	2719
Gns. af 20 kvier			743	365	4060	6,49	263,51	299	4,18	170	304	304	1632	3325

¹ Trepatet efter yverbetændelse.

s. 3243, på Skovgård.

Malketid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,0	2,29	15- 3	43	Egholm Hans, s. 3067	Frede Nørregaard, Føvling.
4,3	1,45	—	52	Egholm Bille, s. 2413	Herluf Stilou, Ejstrupholm.
5,4	1,19	28-12	22	Habil, s. 1688	Oscar Pedersen, Honum.
7,7	0,77	24- 2	59	Plet Nørreremark, e.s. 130	Anders Marcussen, Hjortsvang.
3,8	1,89	27- 5	35	Skærup Prins, s. 3370	Tage Erbs, Taulov.
6,0	1,04	14-12	43	Lambæk 12, s. 2231	Oscar Pedersen, Honum.
4,2	1,52	14- 2	3	Plet Nørreremark, e.s. 130	Karl Hansen, Jelling.
4,4	1,35	18- 3	43	Egholm Hans, s. 3067	Frede Nørregaard, Føvling.
6,8	0,94	15- 2	81	Lambæk 12, s. 2231	Thorvald Nielsen, Træden.
4,6	1,30	18- 11	35	Lambæk 12, s. 2231	Bent Østergaard, Østbirk.
5,9	1,05	10- 1	31	Egholm Bille, s. 2413	Jens Kristiansen, Hjøllund.
4,8	1,37	2- 2	61	Egholm Knægt, s. 2068	Jens Juhl, Jelling.
4,2	1,38	1- 6	30	Lambæk 12, s. 2231	Ejnar Thygesen, Fårup.
7,8	0,79	5- 1	9	Lambæk 12, s. 2231	Karl Hansen, Jelling.
4,3	1,42	17- 1	49	ukendt	Marinus Jørgensen, Brandbjerg.
5,5	1,13	10- 1	147	Manna, s. 1566	N. P. Ladefoged, Dagnæs.
4,4	1,47	17- 1	13	ukendt	Arthur Hansen, Nim.
5,3	1,10	7- 5	99	Elkær, s. 2600	Johanne Krogh, Smidstrup.
5,2	1,06	21-11	37	Lambæk 12, s. 2231	Børge Mikkelsen, Kollemorten.
5,1	1,29				

¹ Kastet 24-5.

s. 3569, på Kalø.

Malketid min.	Malk-bar-hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,9	1,09	29- 3	52	Brams, s. 2958	Johs. Sørensen, Højby.
5,2	1,25	22- 11	189	Brage, s. 3205	P. Overgaard, Falling.
7,2	0,83	19- 2	65	Mos, s. 2222	Aksel Kristensen, Snæild.
6,2	0,98	15-12	51	Lambæk 12, s. 2231	Sv. Fredslund Madsen, Svejstrup.
4,4	1,51	28-12	15	ukendt	Gunnar Slyngborg, Rude.
4,7	1,34	9- 3	39	Lars, e.s. 148	Iver Christensen, Svorbæk.
6,3	0,99	6- 1	16	Mos, s. 2222	Claus Bonde, Svorbæk.
5,4	1,17	7-12	187	Brage, s. 3205	Karl Møller, Hvilsted.
3,3	2,06	24-12	77	Habil, s. 1688	Holger Mikkelsen, Dyngby.
5,4	1,18	15-12	59	Lars, e.s. 148	Ove Rasmussen, Ørting.
4,2	1,66	19- 1	42	Pan, s. 1489	Søren Sørensen, Dyngby.
3,6	1,96	5- 1	26	Lars, e.s. 148	Frede Albrechtsen, Gylling.
5,3	1,15	13-12	94	Lars, e.s. 148	Holger Mikkelsen, Dyngby.
8,0	0,75	15- 1	19	Lars, e.s. 148	Alb. Christensen, Svinballe.
5,3	1,18	15- 2	196	Brage, s. 3205	Erik B. Fogh, Ulvskov.
4,6	1,42	29- 3	44	Mos, s. 2222	Villy Nielsen, Svorbæk.
4,7	1,27	20- 2	17	Plet Nørreremark, e.s. 130	Rs. Jensen, Driften, Assedrup.
5,2	1,18	10- 1	181	Brage, s. 3205	H. Schønning Andersen, Spanien.
4,8	1,27	29- 1	46	Lars, e.s. 148	Peter Nielsen, Oldrup.
3,8	1,44	22- 1	17	Nr. 75, f. 23-11-60	Laurits Knudgaard, Torrild.
5,2	1,28				

¹ Kastet 30-7.

Hovedtabel 59. Afkomsprøve for tyren Hjørring Baun

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-teint %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
135	23-10-65	24-10	731	349	4829	6,58	317,64	361	4,16	201	290	290	1895	3635
123	16- 3-65	25- 9	923	327	5143	6,00	308,64	350	4,17	214	319	319	1919	4004
122	25- 2-65	24- 9	941	402	4474	6,45	288,76	328	4,10	183	320	320	1499	3607
124	21- 9-65	4-10	743	363	4699	6,03	283,20	321	4,09	192	310	310	1508	3530
136	27- 3-65	21-10	938	349	4571	6,07	277,61	315	4,13	189	293	293	1648	3543
130	25- 7-65	16-10	813	322	4376	6,33	276,84	314	4,25	186	298	298	1456	3351
121	18- 9-65	4- 9	716	337	4629	5,98	276,67	314	3,85	178	340	340	1418	3617
126	2- 1-65	4-10	1005	321	3863	7,00	270,39	308	4,32	167	310	310	1330	3387
127	11-11-65	14-10	702	368	3979	6,74	268,24	305	4,28	170	300	300	1358	3345
128	10-10-65	29- 9	719	329	4484	5,89	263,90	299	4,11	184	315	315	1391	3407
129	18- 9-65	19-10	761	335	4140	6,37	263,53	299	4,07	169	295	295	1351	3227
140	29- 6-65	19- 9	812	343	4098	6,38	261,37	297	4,28	175	325	325	1278	3299
137	21- 9-65	26-10	765	327	3359	7,11	238,67	272	4,40	148	288	288	1104	2945
131	20-10-65	10-10	720	320	3513	6,48	227,66	259	3,94	138	304	304	1087	2985
139	16- 9-65	27-10	771	340	3685	5,91	217,82	247	4,04	149	287	287	1075	2940
138	25-10-65	5-11	741	313	3198	6,77	216,56	246	4,27	136	278	278	1015	2843
134	9- 7-65	19-10	832	323	3629	5,96	216,27	245	4,10	149	295	295	1025	2924
125	6- 4-65	5-10	912	382	3032	6,76	204,95	233	4,24	129	309	309	981	2843
133	23- 9-65	18-10	755	396	2710	6,77	183,40	209	4,61	125	296	296	764	2588
Gns. af 19 kvier			805	345	4022	6,36	255,90	291	4,17	168	304	304	1321	3266

Hovedtabel 60. Afkomsprøve for tyren Holm Syd

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-teint %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
62	5-10-64	15- 9	1075	436	5441	7,23	393,36	448	4,60	250	340	340	2373	4411
64	4- 8-65	23- 9	780	335	4914	6,59	323,77	368	3,98	196	332	332	1902	3900
63	18- 9-65	3-11	776	377	4853	6,23	302,32	343	4,06	197	291	291	1850	3699
78	30- 4-65	4- 9	857	342	4459	6,68	297,84	339	4,47	199	351	351	1676	3877
81	15- 7-65	14-10	821	383	4021	7,10	285,67	325	4,30	173	311	311	1580	3643
68	18- 4-65	12- 9	877	363	4057	6,84	277,37	315	4,25	172	327	327	1536	3533
76	17-11-65	12-10	694	308	4075	6,73	274,11	312	4,12	168	313	313	1516	3499
80	20- 8-65	28- 9	769	342	4070	6,71	273,21	311	4,34	177	327	327	1472	3455
61	23- 9-65	24-10	761	360	3907	6,96	271,82	309	4,42	173	301	301	1510	3466
69	22- 9-65	25- 9	733	377	3823	7,11	271,82	309	4,48	171	330	330	1486	3577
65	18-10-65	14- 9	696	340	3635	7,03	255,49	291	4,40	160	325	325	1329	3333
79	5-10-65	29-10	754	381	3362	7,47	251,21	286	4,49	151	296	296	1305	3100
67	30- 6-65	2-11	855	350	3686	6,51	239,79	272	4,22	156	292	292	1305	3133
75	14- 1-66	13-11	668	355	3307	6,93	229,12	261	4,28	142	281	281	1199	3033
66	26- 9-65	23-11	788	375	3339	6,84	228,46	260	4,23	141	271	271	1196	2944
72	29-12-65	16-11	687	304	3093	6,72	207,90	236	4,11	127	278	278	1027	2799
74	14-10-65	6-11	753	315	3408	6,07	206,89	235	4,27	146	288	288	1080	2866
70	21-10-65	31-10	740	413	2922	6,97	203,70	232	4,61	135	294	294	986	2711
77	16-11-65	10-11	724	322	3126	6,31	197,38	224	4,38	137	284	284	959	2777
73	1- 1-66	26-11	694	339	3023	6,48	195,93	223	4,21	127	268	268	1007	2677
71	12-10-65	8-10	726	355	2218	6,95	154,13	175	4,58	102	280	280	687	2422
Gns. af 21 kvier			773	356	3749	6,78	254,35	289	4,32	162	304	304	1380	3277

s. 3010, på Dybvad.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,0	1,88	3- 2	11	Hans, e.s. 100	Jens Peter Høgh, Mygdal.
3,3	2,18	6- 1	39	Hans, e.s. 100	Peder Staub, Hørby.
4,4	1,46	11- 2	77	Hjørring Hylle, s. 2621	Jørgen Hedegaard, Harken.
4,7	1,42	6- 6	35	Hjørring Frank, e.s. 135	Svend Sørensen, Tårs.
4,8	1,43	28- 2	18	Hans, e.s. 100	Holger Boelskifte, Skallerup.
4,6	1,42	30- 1	28	Hjørring Bob, s. 2296	Linnemann Pedersen, Hvidsted.
2,7	2,34	20- 1	13	Hans, e.s. 100	Alfred Christensen, Åsen, Bindslev.
2,8	2,26	17- 1	15	Hans, e.s. 100	Holger Jacobsen, Hørmested.
3,2	2,15	13- 3	16	Hjørring Bob, s. 2296	Erik Brobak, Høgsted.
3,9	1,71	26-12	30	Hjørring Georg, s. 3012	Chr. Sørensen, Østervrå.
2,6	2,77	15- 5	33	Hjørring Hylle, s. 2621	Laurits Sørensen, Sønderskov.
3,0	2,13	15- 4	98	Hjørring Wilmann, s. 2295	Chr. Thomsen, Rakkeby.
3,0	2,01	2- 5	23	Hjørring Holm, e.s. 145	Jens Christensen, Rønnovsholm Mk.
4,0	1,53	27- 2	35	Hjørring Hylle, s. 2621	Karl K. Jensen, Bindslev.
3,2	2,11	23- 2	72	Max Knægt, s. 1360	Carl Nielsen, Sønderskov.
3,2	1,78	10- 2	25	Hjørring Frank, e.s. 135	Aksel Larsen, Hammelmose Mk.
2,6	2,16	6- 1	57	Hans, e.s. 100	Emanuel Møller, Sæsing.
2,2	2,61	5- 1	59	ukendt	Holger Jacobsen, Hørmested.
3,6	1,50	22- 1	32	ukendt	Svend Sørensen, Tårs.
3,5	1,94				

s. 3431, på Skølvd.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,5	1,19	29- 1	91	Jul Garbo, e.s. 136	Simon Simonsen, Jennings.
4,3	1,48	15- 2	49	ukendt	Lars Christiansen, Skudstrup.
4,7	1,56	17- 2	56	Horn Syd, s. 2891	Erik Hansen, Ågård.
4,1	1,54	12- 1	119	Prins Enggård, s. 2749	Laurids Clausen, Gjærndrup.
4,1	1,55	14- 8	50	ukendt	Anton Jørgensen, Rådvad.
3,0	1,99	8-12	56	B.W.B., e.s. 125	A. Chr. Rasmussen, Lintrup.
3,4	1,96	16- 1	116	B.W.B., e.s. 125	Chr. Thøstesen, Fæsted.
3,2	1,86	1- 7 ¹	19	Granat, e.s. 126	Hans Jacobsen, Bølling.
6,8	0,91	22- 2	60	Bøg, s. 2206	Kaj Hansen, Askov.
4,3	1,40	28-12	38	Manna Syd, s. 3043	Gunnar Hansen, Kurkmark.
3,0	1,82	5-12	41	Lass Bill, s. 2228	Kr. Westergaard Jensen, Hunderup.
5,6	1,05	— ²	12	ukendt	H. O. Sommer, Alminde.
4,6	1,37	3- 2	16	Bøg, s. 2206	Viggo Dam, Vester Nebel.
3,4	1,79	9- 1	92	B.W.B., e.s. 125	Arne Grøn, Brøstrup.
2,5	2,78	6- 3	122	B.W.B., e.s. 125	Niels Wiuff, Ødis.
4,2	1,47	19- 1	19	Jul Garbo, e.s. 136	Søren Kr. Sørensen, Bramminge.
3,0	2,13	8- 1	29	Bøg, s. 2206	Niels Bygvraa, Taps.
3,6	1,59	5- 2 ³	64	ukendt	Poul Høgggaard, Ferup.
2,8	2,12	13- 1	41	Bøg, s. 2206	Peter Birk Nielsen, Farris.
4,8	1,29	3- 2	55	B.W.B., e.s. 125	Ole Pedersen, Brøstrup.
2,2	1,95	17-11	45	B.W.B., e.s. 125	Johs. Ottesen, Stenderup.
4,0	1,66				

¹ Kastet 28-4 efter ins. 23-11.² Brummer.³ Kastet 19-6.

Hovedtabel 61. Afkomsprøve for tyren Arup Vestfyns Fax

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
70	3- 9-65	18- 9	745	323	5177	6,39	330,73	376	4,18	216	317	317	2006	4104
62	16- 9-65	19-10	763	298	4828	6,28	303,42	344	4,04	195	286	286	1857	3682
73	18- 9-65	10-10	752	310	4273	6,80	290,37	330	4,37	187	295	295	1675	3522
68	26- 9-65	25- 9	729	326	4377	6,53	285,64	325	4,14	181	310	310	1648	3592
77	13- 9-65	9- 9	726	348	4717	5,81	274,23	311	3,98	188	326	326	1584	3644
79	1-10-65	19-10	748	365	3928	6,93	272,16	310	4,14	163	286	286	1554	3344
61	26- 9-65	10- 9	714	310	4385	6,17	270,44	307	4,08	179	325	325	1538	3619
71	24- 9-65	31- 8	706	338	3858	6,99	269,58	307	4,55	176	335	335	1462	3592
66	3-10-65	19-10	746	327	3634	7,18	261,10	297	4,33	158	286	286	1457	3267
69	10- 9-65	9-10	759	341	3836	6,58	252,29	287	4,24	163	296	296	1379	3312
67	19- 9-65	25- 9	736	316	3623	6,90	250,06	284	4,21	153	310	310	1308	3204
78	14- 5-65	26- 9	865	363	3532	7,00	247,39	282	4,23	150	309	309	1276	3178
74	26- 9-65	17- 9	721	341	3871	6,18	239,26	271	4,33	168	318	318	1270	3263
65	3- 9-65	26-10	783	328	3499	6,80	238,02	271	4,13	145	279	279	1261	3040
64	14- 9-65	24- 9	740	350	3374	7,05	237,92	271	4,40	148	301	301	1271	3201
63	10- 9-65	24-10	774	318	3966	5,76	228,57	259	3,95	157	281	281	1325	3078
72	29- 9-65	23- 9	724	346	3514	6,47	227,43	258	4,49	158	312	312	1176	3144
75	14- 9-65	27- 9	743	374	3235	7,01	226,65	258	4,43	143	308	308	1162	3052
80	6-10-65	26- 9	720	410	2549	7,57	192,92	220	4,54	116	309	309	975	2871
76	25- 7-65	17-10	814	360	2811	6,60	185,62	211	4,40	124	288	288	912	2761
Gns. af 20 kvier			750	340	3849	6,60	254,19	289	4,24	163	304	304	1405	3324

Hovedtabel 62. Afkomsprøve for tyren Holbæk Sjus

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
32	25- 8-65	7- 9	743	321	4419	7,18	317,47	361	4,62	204	325	325	1732	3966
36	11- 6-65	22- 9	833	368	4512	6,46	291,50	331	4,01	181	310	310	1654	3766
40	30-11-65	10- 9	649	312	4552	6,02	274,13	311	4,25	193	322	322	1492	3756
44	24-11-65	7- 9	652	335	4331	6,25	270,63	307	4,23	183	325	325	1469	3539
45	7-10-65	16-10	739	315	4595	5,87	269,78	306	4,16	191	286	286	1548	3521
38	13-11-65	9- 9	665	319	4485	5,95	266,82	302	4,18	188	323	323	1438	3604
43	29- 8-65	18- 9	750	324	4191	6,29	263,77	299	3,98	167	314	314	1410	3490
31	9-12-65	7-11	698	294	4359	6,04	263,34	299	4,01	175	264	264	1569	3481
35	8-10-65	9-10	731	377	3939	6,59	259,43	295	4,25	167	293	293	1394	3390
42	13-10-65	20-10	737	321	4015	6,44	258,37	293	4,32	173	282	282	1425	3358
37	12-11-65	26-10	713	366	4064	6,32	256,87	292	4,24	172	276	276	1406	3402
39	18- 3-65	29- 8	894	311	3570	6,56	234,28	266	4,19	149	334	334	1295	3501
46	18-10-65	28- 9	710	347	3504	6,43	225,20	256	4,21	148	304	304	1129	3322
41	9- 1-66	29-10	658	317	3543	6,35	225,11	256	4,10	145	273	273	1140	3032
34 ¹	23-10-65	18- 9	695	379	3196	6,30	201,46	229	4,31	138	314	314	944	3070
33 ²	24- 7-65	7- 9	775	362	2918	6,46	188,58	214	4,55	133	325	325	884	3070
Gns. af 16 kvier			728	336	4012	6,34	254,17	289	4,22	169	304	304	1371	3455

¹ Trepatet efter yverbetændelse.² Højre forpatte uden kanal.

s. 3489, på Østerhåb.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hestal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,0	1,69	16-12	40	Vestfyns Als, s. 2438	Frede Nielsen, Skåstrup.
3,1	2,31	1- 2	63	Årup Vestfyns Jaffa, s. 3005	Verner Madsen, Rold Skovgård.
3,5	1,96	17- 4	7	Å. V. Ravn Hestehave, s. 2568	Laur. M. Jørgensen, Svendstrup.
3,6	1,86	13- 1	5	Årup Løkke, e.s. 123	Thorvald Jørgensen, Jarlebjerg.
4,6	1,41	2- 3	99	Sydfyns Hoff, e.s. 116	Ejnar Jensen, Husby.
3,6	1,78	30-12	51	Årup Løkke, e.s. 123	Brdr. Hansen, Kærbyholm.
4,4	1,48	8-12	37	Vestfyns Als, s. 2438	P. Møller, Gamborg.
3,0	1,96	8-12	123	Vestfyns Als, s. 2438	Finn Jespersen, Gamborg.
3,8	1,69	9- 4	64	Årup Lak, s. 2436	K. Løchte, Kielshøj.
4,6	1,36	5- 2	25	Årup Glimt, s. 1838	Laur. Barlebo, Barlebogård.
3,2	1,87	23- 1	74	Årup Vestfyns Sim, s. 2587	Julius Jensen, Indslev.
3,1	1,90	6-12	27	Holm Vestfyn, e.s. 88	Brdr. Hansen, Kærbyholm.
3,0	1,98	6-12	10	Holm Vestfyn, e.s. 88	Hans Hansen, Skrillinge.
2,6	2,49	24- 2	29	Vestfyns Als, s. 2438	H. Nybo Jørgensen, Tårup.
3,4	1,70	25-11	93	Årup Løkke, e.s. 123	Jens Rud, Balslev Damgård.
2,9	2,26	16- 1	17	Årup Vestfyns Stig, s. 2719	Kaj Hansen, Havelund.
3,8	1,55	27- 2	17	Finn Vestfyn, s. 2111	Ejnar Rasmussen, Stubberup.
3,9	1,45	—	51	Finn Vestfyn, s. 2111	Claus Bang, Husby.
2,0	2,26	2- 1	43	Vestfyns Als, s. 2438	Chr. Hansen, Ronæs Skov.
2,4	2,07	12-12	29	Årup Løkke, e.s. 123	Villy Nielsen, Vejlbj.
3,4	1,85				

s. 3485, på Torntofte.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hestal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,0	1,71	23-12	43	Holbæk Punch, s. 2700	Richard Jacobsen, Høed.
3,6	1,97	16-12	66	Wilmann, e.s. 83	Erling Petersen, Torslunde.
3,1	2,10	8- 1	58	Plet Søkilde, s. 3018	Jørgen Steen, Tuse.
3,5	1,81	12- 6	57	Holbæk Cloc Herslevgård, s. 2869	Jørgen Steen, Tuse.
2,8	2,50	3- 1	15	Raket, s. 2173	Aksel Sørensen, Skelbæk.
2,8	2,32	23-12	55	Plet Søkilde, s. 3018	Jørgen Steen, Tuse.
2,9	2,26	20- 1	18	Holbæk Cloc Herslevgård, s. 2869	Aksel Sørensen, Skelbæk.
4,8	1,49	5- 2	45	Holbæk Punch, s. 2700	Helge Andersen, Fårevejle.
4,0	1,66	5- 1	31	Nr. 37	Arne Jensen, Vindekilde.
5,4	1,15	23-12	43	Valiant Hau, s. 2851	Arne Jensen, Vindekilde.
3,4	2,11	20- 1	13	Holbæk Cloc Herslevgård, s. 2869	Aage Christensen, Glostrup.
2,2	2,24	14-12	64	Fynbo, f. 27-3-53	Poul E. Rasmussen, Vipperød.
2,6	2,29	2- 2	63	Bornholms Ras, e.s. 128	Jens Jensen, Kvarmløse.
2,8	2,36	5- 2	35	Nørvad, s. 3030	Helge Andersen, Fårevejle.
3,8	1,41	8- 3	50	Holbæk Cloc Herslevgård, s. 2869	Jørgen Steen, Tuse.
3,2	1,66	8-12	39	Holbæk Cloc Herslevgård, s. 2869	Richard Jacobsen, Høed.
3,4	1,94				

Hovedtabel 63. Afkomsprøve for tyren Bjerringbro Hoff,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
156	5- 9-65	7- 9	732	389	4991	6,51	324,90	369	4,19	209	339	339	2037	3736
151	17- 3-65	5- 9	902	400	4475	7,13	319,01	363	4,75	212	341	341	1926	3782
158	26- 1-65	10-11	1018	407	5192	5,83	302,56	343	3,90	202	275	275	2022	3540
164	6- 5-65	12-10	889	324	4674	6,44	301,18	342	3,89	182	304	304	1932	3555
155	25- 5-65	9- 9	837	345	4312	6,98	301,01	342	4,53	195	337	337	1801	3695
152	16- 3-65	25- 8	892	382	4279	6,74	288,32	328	4,58	196	352	352	1745	3682
154	24- 7-65	11- 9	779	349	4225	6,63	280,14	318	4,22	178	335	335	1721	3537
159	14- 2-65	26-10	984	410	4428	6,17	273,12	310	4,21	186	290	290	1719	3340
153	18- 4-65	16-11	942	378	3842	6,87	263,85	300	4,34	167	269	269	1641	3095
157	2- 8-65	15-10	804	378	4204	5,58	234,40	265	3,94	166	301	301	1490	3154
163	27- 5-65	13-11	900	360	3565	6,44	229,54	261	4,38	156	272	272	1401	2845
165	26-10-65	14-11	749	374	3296	6,46	213,04	242	4,29	141	271	271	1258	2712
166	23-11-65	23-11	730	348	3300	6,16	203,30	231	4,32	143	262	262	1223	2774
167	3-11-65	3-11	730	360	3301	5,68	187,64	212	3,98	131	282	282	1272	2737
162	15-12-65	16-10	670	357	3015	6,22	187,62	213	4,11	124	300	300	1079	2788
160	23- 1-65	10- 9	960	400	2270	6,70	152,03	173	4,34	99	336	336	816	2597
Gns. af 16 kvier			845	373	3961	6,41	253,85	288	4,24	168	304	304	1568	3223

Hovedtabel 64. Afkomsprøve for tyren Fåborg Nat,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
39	20- 9-65	21-10	761	346	4586	6,90	316,27	360	4,35	199	295	295	1807	3572
31	9- 7-65	24- 9	807	361	4613	6,71	309,38	352	4,50	208	322	322	1751	3733
33	22- 8-65	24- 8	732	355	4410	6,87	303,03	345	4,45	196	353	353	1580	3667
46	10-11-65	1-11	721	337	4437	6,59	292,51	332	4,49	199	284	284	1682	3380
37	5- 9-65	6-10	761	343	4132	7,05	291,28	331	4,53	187	310	310	1570	3446
34	28- 8-65	5-11	799	409	3625	7,66	277,56	316	4,79	174	280	280	1512	3267
32	3-11-65	15-10	711	351	3829	6,93	265,31	302	4,72	181	301	301	1434	3361
40	23- 9-65	24- 9	731	356	4005	6,33	253,57	288	4,58	183	322	322	1356	3401
35	10-10-65	8-10	728	331	3553	6,96	247,14	281	4,62	164	308	308	1355	3256
43	20-11-65	24-10	703	371	3644	6,71	244,43	278	4,53	165	292	292	1262	3050
45	18- 9-65	15-10	757	362	3124	7,65	239,02	272	4,70	147	301	301	1163	2865
42	30-11-65	19-10	688	291	3376	6,88	232,20	264	4,40	149	297	297	1234	2939
47	29- 9-65	16-10	747	332	2820	8,07	227,57	260	4,57	129	300	300	1040	2937
44	29-11-65	1-11	702	346	3261	6,82	222,53	253	4,42	144	284	284	1109	2916
38	26-10-65	21- 9	695	371	3174	6,94	220,31	251	4,36	138	318	318	1103	3106
41	20- 9-65	18-10	758	325	3569	6,05	215,87	245	4,13	147	298	298	1104	2935
36	22-10-65	7-10	715	371	2129	7,28	155,06	177	4,41	94	309	309	799	2610
Gns. af 17 kvier			736	350	3664	6,92	253,71	289	4,50	165	304	304	1345	3202

¹ Yverbetændelse ved kælvning.

s. 3378, på Kalø.

Malke- i min.	Malke- tid bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,5	1,18	29- 3	50	Bjerringbro Skov, s. 2831	Magn. Kirkegaard, Aidt Skov.
4,3	1,46	13- 5	33	ukendt	Niels Andersen, Hjermin.
5,9	1,16	30- 5	7	ukendt	R. Skødt Nørgaard, Vellev Mark
5,6	1,18	—	57	Bjerringbro Skov, s. 2831	Anton Jensen, Højbjerg.
3,4	1,91	24-12	24	Bjerringbro Blach, s. 2706	P. Ginnerup Pedersen, Hjorthede.
3,2	1,93	13- 1	36	Manna, s. 1566	S. Møller Christiansen, Hulbæk.
3,0	2,21	15-12	32	Hammel Knægt, s. 2630	Eli Petersen, Aptrup.
3,6	1,99	5- 2	57	Max Grambo, f. 15-11-55	N. Kr. Pedersen, Amstrup.
4,6	1,48	16- 5	4	ukendt	K. G. Rasmussen, Allingkloster.
4,1	1,66	13-12	45	Bjerringbro Skov, s. 2831	Anton Jensen, Højbjerg.
5,4	1,20	9- 3	65	Bjerringbro Blach, s. 2706	S. Møller Christiansen, Hulbæk.
4,9	1,32	31- 5	111	Bjerringbro Skov, s. 2831	Fr. Bruun, Hulbæk.
3,7	1,86	9- 3	29	Bjerringbro Toft, s. 2487	Gunnar Jensen, Løvskal.
4,1	1,63	19- 1	39	Kattrup Ægir, e.s. 85	Søren Pedersen, Grønbæk.
2,6	2,21	31-12	16	Bjerringbro Skov, s. 2831	Mourits Madsen, Øster-Vandet.
2,5	1,78	—	40	Bjerringbro Skov, s. 2831	Gunnar Jensen, Løvskal.
4,2	1,64				

s. 3492, på Lægård.

Malke- i min.	Malke- tid bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,9	1,14	14- 3	41	Julius Garbo, e.s. 117	Hans Pedersen, Allested.
4,3	1,53	13- 4 ¹	16	Ulv, f. 3-12-52	J. K. Hvilendal, Gærup.
4,0	1,56	17- 2	36	Fåborg Sten, e.s. 129	R. N. Rasmussen, Allested.
4,0	1,76	—	91	Fåborg Gibs, e.s. 137	Søren Christoffersen, Horne.
3,7	1,75	13- 2	37	Fåborg Gibs, e.s. 137	Kjeld Nielsen, Diernæs.
5,0	1,26	23- 3	39	Sydvestfyns Plet, e.s. 143	Helge Jeppesen, Håstrup.
4,5	1,40	18- 1	52	Fåborg Gibs, e.s. 137	Aksel Krogh, Hågerup.
3,8	1,67	16- 2	31	Fåborg Blach, s. 1663	C. Morsbøl, Millinge.
5,4	1,13	25- 1	42	Midtjyden, e.s. 99	Alfred Storm, Millinge.
2,8	2,34	19- 2	75	Fåborg Tax, s. 2912	Frede Poulsen, Horne.
4,4	1,35	2- 4	56	Fåborg Gibs, e.s. 137	O. M. Dreyer, Pejrup.
3,0	2,06	31- 1	41	Fåborg Lyng, s. 2588	Johs. Andersen, Allested.
4,0	1,39	8- 1	15	Fåborg Gibs, e.s. 137	Otto Jensen, Nr. Søby.
4,1	1,51	5- 1	15	Fåborg Sten, e.s. 129	Fredy Nielsen, Nr. Søby.
2,7	1,98	6-12	135	Julius Garbo, e.s. 117	P. Jensen, Millinge.
4,6	1,38	12- 1	24	Fåborg Blach, s. 1663	W. Bächler, Jordløse.
3,0	1,55	4- 1	5	Fåborg Gibs, e.s. 137	Svend Andersen, Allested.
4,1	1,57				

¹ Kastet 22-3 efter ins. 26-12.

Hovedtabel 65. Afkomsprøve for tyren Vax Syd,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i ved marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
41	4-3-65	6-9	916	370	5603	5,95	333,17	378	4,16	233	352	352	2050	4088
49	1-4-65	4-10	916	375	4477	7,02	314,09	357	4,42	198	312	312	1827	3779
34	22-10-65	25-11	764	302	4525	6,80	307,64	350	4,05	183	272	272	1847	3480
36	3-11-65	19-9	685	313	4194	6,99	293,17	334	4,40	185	339	339	1601	3591
43	16-5-65	22-11	920	357	4414	6,56	289,52	329	4,29	189	275	275	1685	3374
42	7-1-66	5-10	636	311	4576	6,21	284,04	322	4,15	190	323	323	1630	3664
31	20-3-65	7-10	931	368	4205	6,65	279,73	318	4,18	176	309	309	1602	3435
32	8-11-65	13-9	674	343	4251	6,28	266,94	303	4,16	177	345	345	1516	3518
46	28-10-65	11-10	713	328	3922	6,74	264,15	300	4,42	173	317	317	1437	3403
35	5-5-65	27-10	905	362	3613	7,23	261,13	297	4,67	169	301	301	1422	3116
52	4-11-65	20-10	715	347	3769	6,71	252,85	287	4,35	164	308	308	1359	3200
45	10-11-65	10-11	730	278	4326	5,80	250,72	284	3,97	172	287	287	1468	3230
48	16-3-65	30-11	989	369	3829	6,48	248,08	282	4,24	162	267	267	1397	3008
47	26-11-65	23-9	666	394	3870	6,22	240,72	273	4,22	163	316	316	1313	3236
50	20-11-65	31-10	710	391	3221	7,24	233,04	265	4,43	143	297	297	1180	3022
39	12-10-65	17-10	735	368	3241	6,87	222,81	253	4,53	147	311	311	1108	3026
37	18-1-66	23-9	613	276	3156	7,00	221,05	252	4,32	136	335	335	1052	3039
44	20-12-65	17-11	697	336	3171	6,85	217,30	247	4,48	142	280	280	1088	2738
33	8-10-65	31-8	692	354	3346	6,34	212,26	241	4,28	143	255	255	1328	2815
38	8-11-65	22-10	713	355	2781	7,04	195,84	223	4,41	123	301	301	994	2853
51	11-11-65	12-10	700	331	2956	6,61	195,48	222	4,44	131	316	316	949	2889
40	15-1-66	21-11	675	383	2684	6,55	175,91	200	4,41	118	276	276	842	2619
Gns. af 22 kvier			759	346	3824	6,61	252,71	287	4,30	164	304	304	1395	3233

Hovedtabel 66. Afkomsprøve for tyren Randers Russ,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i ved marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
132	7-9-65	24-9	747	345	4976	6,22	309,37	351	4,24	211	325	325	1981	3810
125	15-9-65	10-9	725	354	4771	6,42	306,33	348	4,29	205	339	339	1879	3797
127	26-4-65	18-8	844	352	4202	6,92	290,77	331	4,22	177	359	359	1714	3757
131	24-5-65	10-10	869	338	4450	6,46	287,67	327	4,26	190	309	309	1790	3585
129	18-9-65	1-10	743	356	4096	6,81	278,80	317	4,19	172	318	318	1684	3421
140	24-4-65	21-10	910	340	3966	6,82	270,49	308	4,53	180	298	298	1641	3307
123	28-8-65	7-10	770	351	3971	6,79	269,70	307	3,98	158	302	302	1634	3407
138	19-10-65	28-9	709	310	4187	6,31	264,33	300	4,22	177	321	321	1585	3464
122	19-9-65	17-10	758	361	3690	6,89	254,21	289	4,32	159	302	302	1477	3192
135	13-9-65	11-11	789	349	3880	6,38	247,47	281	4,02	156	277	277	1539	2991
124	3-10-65	2-10	729	349	3671	6,71	246,32	280	4,13	152	317	317	1463	3219
134	25-8-65	27-10	793	383	3409	7,03	239,60	273	4,08	139	292	292	1401	3016
126 ¹	14-6-65	26-10	864	403	3411	6,84	233,44	265	4,47	152	293	293	1356	3034
130	10-11-65	2-11	722	350	3614	6,38	230,75	262	4,42	160	286	286	1451	3059
139	1-5-65	24-10	906	322	3189	6,49	207,10	235	4,26	136	295	295	1195	2916
128	29-7-65	22-10	815	380	2943	6,84	201,42	229	4,27	126	297	297	1155	2866
133	16-9-65	17-10	761	350	3189	6,30	200,92	228	4,14	132	299	299	1119	2888
141 ¹	17-9-65	23-11	797	324	2885	6,78	195,51	222	4,20	121	265	265	1186	2737
137	18-11-65	13-10	694	324	2378	7,11	169,07	192	4,33	103	303	303	902	2550
121	21-10-65	10-11	750	372	2423	6,58	159,51	181	4,21	102	278	278	904	2441
Gns. af 20 kvier			785	351	3665	6,63	243,14	276	4,24	155	304	304	1453	3173

¹ Trepatet efter yverbetændelse ved kælvning.

s. 3432, på Skølvad.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
6,0	1,10	18- 3	88	B.W.B., e.s. 125	Ejner Philipsen, Vonsild.
3,8	1,72	14-12	51	Nr. 46, f. 25-1-58	August Sørensen, Agerskov.
4,3	1,70	29- 4	54	B.W.B., e.s. 125	Ole Pedersen, Brøstrup.
5,5	1,12	14- 5	52	B.W.B., e.s. 125	Otto Knudsen, Andst.
5,4	1,29	23- 1	77	Horn Syd, s. 2891	Kristoffer Smidt, Hunderup.
3,7	1,64	3- 1	52	B.W.B., e.s. 125	Niels Chr. Lorentzen, Langetved.
3,8	1,73	15-12	36	ukendt	Kristoffer Smidt, Hunderup.
6,4	0,94	27-12	30	B.W.B., e.s. 125	Hans Johansen, Vrenderup.
4,0	1,49	8- 1	134	Manna Syd, s. 3043	Arne Grøn, Brøstrup.
4,6	1,35	2- 3	75	Abild Vest, s. 2675	Kristoffer Smidt, Hunderup.
4,0	1,57	28-12	59	Granat, e.s. 126	Ejner Hansen, Assenbøl.
5,2	1,29	1- 4	44	Bøg, s. 2206	Chr. Christensen, Lunderskov.
4,2	1,66	19- 6	87	B.W.B., e.s. 125	Simon Simonsen, Jenning.
4,9	1,22	5-12	48	ukendt	Svend Pedersen, Andst.
5,1	1,18	6- 1	65	Faruk, s. 1576	Aage Johansen, Andst.
3,0	1,89	10- 2	43	B.W.B., e.s. 125	Gunnar Jørgensen, Københoved.
3,5	1,52	13- 1	26	B.W.B., e.s. 125	Hans Johansen, Vrenderup.
6,8	0,89	30- 1	26	Bøg, s. 2206	Kr. Pedersen, Brøstrup.
3,9	1,55	29- 4	39	Granat, e.s. 126	Arne Sørensen, Verst.
2,8	1,92	22-12	111	B.W.B., e.s. 125	Niels Viuff, Ødis.
4,4	1,28	27- 1	135	B.W.B., e.s. 125	Arne Grøn, Brøstrup.
5,1	1,13	15- 1	53	B.W.B., e.s. 125	Ole Pedersen, Brøstrup.
4,6	1,42				

s. 3413, på Kalø.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
3,4	2,04	29- 1	51	Ollerup, s. 2443	Poul E. Grøn, Dalbyover.
5,4	1,19	6- 4	26	Randers Masta, e.s. 146	Ejner Molbo, Stevnstrup.
3,5	1,62	16-12	99	Randers Baun, e.s. 131	Hans Winther, Purhus.
4,3	1,50	16- 1	13	Plet Nørremark, e.s. 130	Gert Frederiksen, Stenvad.
4,4	1,48	12- 1	22	Randers Baun, e.s. 131	Jens Bugge, Øster-Tørslev.
5,4	1,16	21-12	55	Lars, e.s. 148	Tage Vad, Vedhovedgård.
4,8	1,36	11-12	46	Randers Baun, e.s. 131	M. Th. Kjær, Kalø Landboskole.
4,3	1,54	16- 1	16	Randers Garbo, s. 1839	Ejner Tukjær, Trustrup.
4,5	1,38	20-12	85	Randers Masta, e.s. 146	Gunnar Kahr, Fannerup.
4,1	1,71	23- 2	8	Randers Masta, e.s. 146	Preben Christensen, Uggelhuse.
5,8	1,04	24-12	50	Lund, s. 2633	Peter Mougard, Batum.
—1	—1	30- 1	21	Bjerringbro Skov, s. 2831	Kristian Nielsen, Frederiks.
5,0	1,21	16- 1	24	Randers Masta, e.s. 146	Jens Mogensen, Asferg.
3,9	1,56	12- 3	92	Randers Baun, e.s. 131	Peter Mols Jensen, Trustrup.
3,6	1,71	19-12	41	Randers Baun, e.s. 131	Jørgen Jacobsen, Linde.
2,6	2,13	12- 1	61	Ping, s. 2079	E. Grud, Toftegård, Langå.
3,2	1,72	16-12	39	Randers Plet, s. 3055	Anna Sørensen, Tranehuse.
4,0	1,47	20- 2	50	Randers Garbo, s. 1839	H. Nielsen, Dalsgård, Assentoft.
2,9	1,66	18-12	35	Randers Knægt, s. 3056	Peter Mikkelsen, Lindå, Hornslet.
3,8	1,46	30- 3 ²	39	Abild 16, s. 1526	Eli Jacobsen, V.-Alling Mark.
4,2	1,52				

¹ Håndmalket.² Kastet 11-3 efter ins. 16-1.

Hovedtabel 67. Afkomsprøve for tyren Sydvestfyns Jon,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved marts kælvn.	Vægt i kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tejn %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
82	16- 7-65	13- 9	789	403	4421	6,50	287,40	326	4,28	189	328	328	1566	3823
70	10-11-65	17- 9	676	340	4307	6,45	277,60	315	4,01	173	315	315	1515	3552
80	19- 9-65	16- 9	727	336	4181	6,59	275,40	313	4,27	179	325	325	1445	3581
74	30-11-65	18-10	687	332	4119	6,52	268,56	305	4,35	179	293	293	1477	3389
76	26-10-65	7- 9	681	348	3945	6,78	267,30	304	4,53	179	334	334	1392	3498
77	27- 9-65	3-10	736	359	4090	6,24	255,35	290	4,35	178	308	308	1363	3496
66	17-11-65	20-10	702	328	4418	5,66	249,88	283	3,96	175	291	291	1419	3372
69	11-11-65	25-10	713	370	3766	6,59	248,21	282	4,22	159	286	286	1341	3178
78	5-10-65	15-10	740	392	4304	5,65	243,08	275	4,13	178	294	294	1379	3468
61	1-12-65	13-10	681	315	3659	6,43	235,29	267	4,45	163	298	298	1208	3242
83	6- 7-65	25- 9	811	381	3786	6,17	233,74	265	4,06	154	307	307	1198	3315
62	2-11-65	16- 9	683	333	3695	6,31	233,23	265	4,36	161	325	325	1141	3279
63	22- 7-65	30- 9	800	365	3614	6,15	222,34	252	4,19	151	311	311	1083	3255
73	23- 5-65	10-10	870	343	3604	6,02	217,05	246	4,17	150	292	292	1130	3054
75	13-10-65	20- 9	707	346	3339	6,33	211,38	240	4,21	140	319	319	983	3121
67	9-10-65	3-10	724	336	3279	6,35	208,21	236	4,39	144	308	308	964	3049
64	4-12-65	31-10	696	342	3147	6,49	204,09	232	4,16	131	280	280	1073	2878
72	23-12-65	23-10	669	354	3240	6,30	204,03	232	4,23	137	288	288	986	2896
68	23-11-65	23-10	699	328	2834	6,67	189,09	215	4,53	128	288	288	834	2780
65	24-11-65	22-10	697	360	2582	6,95	179,39	204	4,39	113	289	289	776	2687
Gns. af 20 kvier			724	351	3717	6,34	235,53	267	4,25	158	304	304	1214	3246

Hovedtabel 68. Afkomsprøve for tyren Hjørring Tæbring,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved marts kælvn.	Vægt i kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tejn %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
151 ¹	8- 1-65	16- 9	981	388	4455	6,93	308,86	351	4,36	194	324	324	1713	3696
156	21-10-65	4-10	713	346	4755	6,10	289,83	329	4,01	191	306	306	1619	3545
171	1- 9-65	13- 9	742	321	4451	6,41	285,28	324	3,93	175	327	327	1472	3561
162	23-12-64	22-10	1033	395	4471	5,97	267,11	303	4,18	187	288	288	1445	3387
154	22- 3-65	20- 9	912	346	4057	6,14	248,95	282	4,14	168	320	320	1252	3321
160	1-10-65	20-10	749	353	3821	6,47	247,38	281	4,30	164	290	290	1246	3156
157	10-10-65	2- 9	692	383	3507	6,87	240,78	274	4,12	145	338	338	1121	3282
159	30-10-65	11-10	711	347	3338	7,20	240,17	273	4,22	141	299	299	1158	3018
165	12- 2-65	21-10	981	371	3634	6,51	236,41	269	4,23	154	289	289	1180	3133
164	28-10-65	20-10	722	384	3461	6,75	233,59	266	4,37	151	290	290	1161	3068
155	14- 9-65	19- 9	735	358	3354	6,71	224,95	256	4,27	143	321	321	1047	3043
152	16- 6-65	12- 9	818	368	3352	6,71	224,80	256	4,26	143	328	328	1032	3008
166	6- 9-65	25-10	779	372	2866	7,35	210,73	240	4,23	121	285	285	918	2685
158	3-10-65	9-10	736	345	3038	6,67	202,72	230	4,32	131	301	301	901	2914
167	27-12-65	2-11	675	340	3457	5,82	201,12	228	3,98	137	277	277	950	2748
170	14-12-65	6-11	692	328	3255	5,96	193,94	220	4,04	132	273	273	921	2640
153	4- 4-65	18- 9	897	349	3064	6,28	192,30	218	4,06	124	322	322	854	2954
161 ²	21- 9-65	18-10	757	366	2856	6,65	189,93	216	4,38	125	292	292	821	2630
Gns. af 18 kvier			796	359	3622	6,50	235,49	268	4,18	151	304	304	1056	3100

¹ Trepatet efter yverbetændelse.² Trepatet efter yverbetændelse ved kælvning.

s. 3421, på Ejstrupgård.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2,6	2,67	13- 4	3	Ravn Munkgård, s. 2569	Alfred Hansen, Bæring.
2,9	2,39	4-12	45	Sydvestfyns Bull, s. 3063	Mogens Lohmann, Verninge.
2,4	2,57	19- 1	14	Sydvestfyns Hother, s. 2110	Robert Nielsen, Brunsvig.
2,9	2,36	14- 5	63	Sydvestfyns Bull, s. 3063	Karl Rasmussen, Verninge.
2,6	2,28	—1	47	Sydvestfyns Gry, s. 2109	Niels Chr. Nielsen, Hårby.
3,6	1,69	5- 3	33	Sydvestfyns Bull, s. 3063	Holger Pedersen, Turup.
3,4	2,10	2- 1	14	Sydvestfyns Plet, e.s. 143	P. Rasmussen, Follesled, Kærum.
3,4	2,02	10- 5	87	Ravn Munkgård, s. 2569	L. P. Nielsen, Voldtofte.
4,2	1,66	5-12	64	Sydvestfyns Plet, e.s. 143	Erik Olsen, Frøbjærg Vænge.
3,4	1,83	3- 2	62	Sydvestfyns Bull, s. 3063	Johs. Øbro Jensen, Jordløse.
3,6	1,77	30-11	16	Sydvestfyns Hother, s. 2110	Johs. Sørensen, Ebberup.
2,8	2,11	25- 3 ²	47	Sydvestfyns Plet, e.s. 143	Henry Hansen, Verninge.
2,7	2,30	21-12	21	Abild 15, e.s. 105	Holger Hedelund, Verninge.
3,1	2,05	4-12	53	ukendt	Alfred Hansen, Hårby.
3,9	1,43	5-12	51	Årup Løkke, e.s. 123	Carl Andersen, Mullerød.
3,2	1,85	22-12	3	Sydvestfyns Plet, e.s. 143	Uffe Pedersen, Thorslund.
2,8	2,27	25- 1	57	Sydvestfyns Bull, s. 3063	Brdr. Nielsen, Hesselbjerg.
3,5	1,75	8- 1	23	Sydvestfyns Bull, s. 3063	P. Christensen, Nårup.
2,8	1,85	28-12	50	Sydvestfyns Bull, s. 3063	Carl Hansen, Skovkrogen.
2,8	1,83	—1	98	Sydvestfyns Gry, s. 2109	P. Rasmussen, Follesled, Kærum.
3,1	2,04				

¹ Brummer.² Kastet 19-3 efter ins. 15-1.

s. 3103, på Dybvad.

Malke- tid i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,0	1,72	—1	15	Hans, e.s. 100	Finn Christensen, Bindslev.
5,4	1,23	3- 1	44	Hjørring Plet, s. 2624	Jens Kr. Jensen, Lyngså.
3,5	1,89	23- 1	19	ukendt	Alfred Christensen, Bindslev.
5,3	1,24	31- 1	46	Hjørring Frank, e.s. 135	Vagn Lund, Bjergby.
2,4	2,61	12- 1	43	Lasse 30, s. 1998	Asger Andersen, Tårs.
4,3	1,43	14- 2	30	Hjørring Frank, e.s. 135	Karl Jensen, Stenhøj.
2,2	2,43	26-12	29	Hjørring Holm, e.s. 145	Peter Hansen, Lyngså.
3,2	1,89	24- 1	24	Hjørring Frank, e.s. 135	Lars M. Jensen, Østervrå.
2,6	2,51	6- 3	60	Hjørring Bob, s. 2296	Eigil Rævdal, Asted.
2,6	2,38	24- 1	17	Brygger 36, e.s. 147	Kjeld Sørensen, Tårs.
2,2	2,63	28- 2	23	Hjørring Frank, e.s. 135	Werner Kristensen, Jerslev J.
2,9	1,80	19-12	27	Hjørring Plet, s. 2624	Holger Jensen, Gærum.
3,2	1,73	4- 2	32	Lasse 30, s. 1998	Alfred Jensen, Vennebjerg.
1,8	2,94	26- 1	42	Hjørring Holm, e.s. 145	Alfred Jensen, Vennebjerg.
2,8	2,32	10- 2	41	Stender 55, s. 1857	Svend Aage Toldbod, Bindslev.
2,2	2,93	31- 1	23	Brygger 36, e.s. 147	Jens Kr. Jensen, Lyngså.
3,0	1,83	19-12	2	Hjørring Frank, e.s. 135	Øjvind Bæk, Guldager, Vrå.
2,1	2,62	29- 1	29	Hjørring Frank, e.s. 135	Ulrich Bech, Bjergby.
3,1	2,12				

¹ Brummer.

Hovedtabel 69. Afkomsprøve for tyren Hoff Syd,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
100	17-10-65	19-10	732	374	4822	6,54	315,38	358	4,16	201	306	306	1866	3719
106	29-11-65	15-10	685	341	4287	7,01	300,73	342	4,41	189	310	310	1742	3473
99	18-7-65	29-8	772	377	3708	7,30	270,68	308	4,50	167	357	357	1355	3600
102	24-4-65	4-9	863	359	3216	7,84	252,09	288	4,52	145	314	314	1305	2986
98	9-4-65	27-11	962	342	4369	5,77	251,96	285	3,82	167	267	267	1469	3074
91	16-6-65	22-9	828	343	3743	6,68	250,00	284	4,24	159	310	310	1384	3315
103	27-9-65	4-10	737	360	3261	7,36	240,16	274	4,45	145	298	298	1231	3068
93	28-9-65	16-9	718	384	3613	6,62	239,36	272	4,32	156	339	339	1211	3416
92	8-6-65	18-9	832	378	3827	6,24	238,93	271	4,31	165	337	337	1317	3483
101	5-9-65	14-11	800	342	3600	6,39	229,96	261	4,27	154	280	280	1243	3031
95	16-9-65	8-10	752	317	3083	6,81	209,84	239	4,52	139	317	317	990	2985
105	26-11-65	29-11	733	335	3007	6,62	199,04	226	4,34	130	265	265	985	2534
97	27-12-65	22-11	695	301	3011	6,28	189,00	215	4,09	123	272	272	911	2672
104	12-1-66	1-11	658	349	2605	7,00	182,24	207	4,37	114	293	293	828	2667
94	7-1-66	23-10	654	380	1887	7,59	143,27	163	4,58	86	293	293	602	2396
Gns. af 15 kvier			761	352	3469	6,75	234,18	266	4,31	149	304	304	1229	3095

Hovedtabel 70. Afkomsprøve for tyren Årup Vestfyns Gems,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1967	Alder ved kælvn.	Vægt i marts kg	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f. e.	I alt f. e.
77	22-9-65	19-9	727	370	5698	5,80	330,36	374	3,86	220	324	324	2195	4271
76	19-3-65	24-9	919	392	4338	6,73	291,80	332	4,30	187	319	319	1743	3817
61	30-9-65	30-8	699	347	3926	6,95	272,67	310	4,30	169	344	344	1521	3763
79	1-6-65	30-10	881	386	3889	6,92	268,96	306	4,31	168	283	283	1595	3478
78	28-9-65	2-10	734	385	4326	6,07	262,80	298	4,23	183	311	311	1573	3629
67	26-9-65	20-9	724	371	3721	6,87	255,79	291	4,16	155	323	323	1418	3573
71	15-7-65	19-9	796	378	3873	6,41	248,23	282	4,11	159	324	324	1404	3575
80	29-8-65	7-11	800	345	4027	6,13	246,68	280	3,89	157	275	275	1491	3291
73	16-9-65	28-9	742	383	3589	6,80	244,18	278	4,25	153	315	315	1335	3383
65	13-10-65	21-10	738	349	3744	6,49	243,01	276	4,42	166	292	292	1418	3402
75	24-9-65	13-10	749	387	4010	6,00	240,50	273	4,15	166	300	300	1451	3413
62	17-9-65	4-11	778	373	3547	6,66	236,09	268	4,46	158	278	278	1343	3178
74	14-8-65	19-10	796	393	3382	6,27	212,13	241	4,26	144	294	294	1211	3185
72	2-9-65	25-9	753	369	3286	6,17	202,62	230	3,94	129	318	318	1067	3161
69	9-10-65	19-10	740	366	3108	6,43	199,93	227	4,25	132	294	294	1085	2988
66	5-10-65	4-10	729	378	3149	6,14	193,20	219	4,14	130	309	309	1051	3123
63	27-9-65	22-10	755	368	2851	6,75	192,35	219	4,16	118	291	291	1023	2852
68	5-10-65	23-10	748	338	3044	6,16	187,39	213	4,31	131	290	290	971	2959
64	9-10-65	3-11	755	387	2521	6,91	174,17	198	4,42	112	279	279	875	2662
70	7-6-65	21-9	836	388	2324	7,09	164,73	187	4,44	103	322	322	842	2920
Gns. af 20 kvier			770	373	3618	6,45	233,38	265	4,20	152	304	304	1331	3331

s. 3485, på Skølvad.

Malke- i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5,0	1,37	1- 6	103	B.W.B., e.s. 125	Arne Grøn, Brøstrup.
3,3	2,04	31-12 ¹	53	Granat, e.s. 126	Svend Nielsen, Gamst.
3,2	1,75	18- 1	92	Søgård Klint, s. 1743	Aksel Jacobsen, Alminde.
3,8	1,43	20-11 ²	27	Nr. 29, f. 14-7-49	Alfred Buchholt, Rødding.
5,1	1,47	1- 4	39	Jul Garbo, e.s. 136	Kr. Sørensen, Nørremarken.
3,9	1,58	2-12	133	Nr. 98	Chr. Thøstesen, Fæsted.
4,6	1,24	4-12	175	Plet Syd, s. 3202	Karl V. Jensen, Varmark.
4,6	1,31	—	65	ukendt	Aksel Hansen, Brørup.
4,6	1,35	4- 1	28	Bøg s. 2206	Henning Ingemansen, Skodborg Skov.
4,8	1,34	1- 2	87	Askov Syd, s. 3203	Magnus Christensen, Krogager.
4,0	1,47	30-12	59	Hans, e.s. 100	Aage Skov, Rødding.
6,8 ³	0,99 ³	26- 4	9	ukendt	Vagn Lindegaard, Korsvang.
3,4	1,90	29- 1	65	ukendt	Th. Johansen, Bastrup.
2,8	1,74	30-12	55	Plet Syd, s. 3202	Holger Hansen, Foldingbro.
2,8	1,63	12-12	33	ukendt	Johs. Pedersen, Krogager.
4,0	1,54				

¹ Kastet 13-5.² Kastet 8-7.³ Ikke med i gennemsnittet, fordi en bipatte er vokset sammen med højre bagpatte.

s. 3490, på Moesgård.

Malke- i min.	Malk- bar- hedstal	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4,0	1,92	22- 3	21	Holm Vestfyn, e.s. 88	Ejnar Münster, Hesle.
3,1	2,03	21-12	77	Årup Vestfyns Stig, s. 2719	Bent Simonsen, Moselund, Årup.
3,1	1,81	22- 3	61	ukendt	H. Aa. Jespersen, Nr. Aby.
3,6	1,86	25- 1	4	Holm Vestfyn, e.s. 88	Johs. Sørensen, Højgård, Røjle.
4,8	1,34	13-12	16	Å. V. Ravn Hestehave, s. 2568	Kloppenborg Kristensen, Båring.
3,0	2,02	16-12	32	Årup Løkke, e.s. 123	Hans Greve, Lavvang.
2,6	2,29	3- 1	78	Prins Garbo, e.s. 55	Chr. Jepsen, Båring.
4,1	1,69	11- 3	33	Prins Garbo, e.s. 55	Ejnar Rasmussen, Mosegård, Ejby.
3,1	1,90	4- 1	32	Ravn Munkgård, s. 2569	A. P. Brønserud, Skrillinge.
3,3	1,97	17- 1	32	Årup Vestfyns Jaffa, s. 3005	Hans E. Hansen, Grimmøløkke.
3,4	1,92	11- 5	34	Vestfyns David, s. 2256	Ejnar Münster, Hesle.
3,4	1,91	12- 3	131	Prins Nørr, s. 2480	A. Juul Hansen, Juulsgård.
3,2	1,83	20- 2	12	Holm Vestfyn, e.s. 88	Ole Nielsen, Svendstrup.
2,4	2,19	8- 2	58	Årup Løkke, e.s. 123	Emil Storm, Blanke.
4,7	1,23	1- 5	120	Årup Vestfyns Stig, s. 2719	Gunnar Larsen, Avlby.
3,1	1,75	1- 4	77	Årup Løkke, e.s. 123	Laur. Barlebo, Barlebogård.
3,4	1,60	6- 6	40	Finn Vestfyn, s. 2111	Ejnar Rasmussen, Mosegård, Ejby.
2,7	2,01	12- 3	107	Årup Vestfyns Skov, s. 3004	Johs. Pedersen, Eskør.
4,4	1,26	—	46	Årup Løkke, e.s. 123	H. Henriksen, Vestergård, Røjle.
1,9 ¹	2,34 ¹	7- 2	35	Årup Vestfyns Sim, s. 2587	Johs. Larsen, Avlby.
3,4	1,84				

¹ Kun 2. måling.

VII. Oversigt over

1. Rød Dansk Malkerace.

	Stbg.	Født	Alder ¹² / ₁₈₋₆₈	
			år	mdr.
Dybvadgård, Dybvad:				
Hjørring Grønne	28838	9-10-63	4	10
Lundgård, Overlade:				
Alborg Elm	28815	5- 6-63	5	2
Krarup Nygård, Skive:				
Skive Nør	28592	31-12-62	5	8
Lægård, Holstebro:				
Hornshøj Borg	28703	15- 8-62	6	0
Ringkøbing Sortemose	28720	28- 3-63	5	5
Rosenfeldt, Ulstrup:				
Bjerringbro Aks	28826	27-10-63	4	10
Kalø Hovedgård, Rønne:				
Sydvestfyns Tamp	29076	29-12-63	4	8
Dybbøl Kær vig	29125	1- 8-63	5	0
Randers Eg	28888	1-12-63	4	8
Moesgård, Kibæk:				
Herning Vang	28921	1-11-63	4	9
Herning Sø	28922	13- 1-64	4	7
Østerhåb, Hatting:				
Horsens Holm	28904	23-11-63	4	9
Horsens Elm	28903	10-11-63	4	9
Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:				
Give Ejlekær	28804	18- 2-63	5	6
Skærup Højvang	29028	22- 4-64	4	4
Vardegård, Varde:				
Varde Jes	28925	7-12-63	4	8
Gelballegård, Lunderskov:				
Kolding Vang	28811	25- 1-63	5	7
Skølvad, Gørding:				
Ribe Vang	29119	15- 7-64	4	1
Ribe Hang	29118	17- 7-64	4	1
Brøstrupgård, Rødding:				
Rødding Sø	28915	1- 3-64	4	5

afkomsprøverne 1968-69.

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
A. Grønnegaard, Corselitze	Falsters Vinkel	Kvf. for Hjørring Amt
N. A. Nielsen, Tyrstedgård	Give Elm 24	Kvf. for Ålborg Amt
P. Vig Nør, Solbjerg	Sortemose	Skiveegnens Kvf.
Kr. Elkjær, Elsborg	Rudme Ideal	Holstebroegnens Kvf.
A. Clausen, Laurbjerg	Sortemose	Ringkøbing-Skjernegnens Kvf.
Aksel Aaskov, Lakkendrup	Morsø Ejlekær	Kvf. Jyden
K. Rasmussen, Nørreby Mosegård	Horsens Leif	Sydvestfyns Kvf.
Henning Kristiansen, Ryslinge	Næstved Kærving	Gråsten-Sønderborg Kvf.
A. Gert Nielsen, Bjerregrav	Horsens Leif	Kvf. Østjyden
Vagn Bundgaard, Bjergby	Horsens Vang	Hammerum Herreds Kvf.
V. Svansø, Hindborggård	Skive Vink	Hammerum Herreds Kvf.
Poul Christensen, Sebbesund	Ålborg Bitz	Horsensegnens Kvf.
M. Mogensen, Bederslev	Nordfyns Frem	Horsensegnens Kvf.
Asta Bjerring, Ulstrup	Morsø Ejlekær	Vejle V. og Tørring-B. Kvf.
N. Kr. Kristiansen, Højvang	Horsens Leif	Vejle- og Fr. Sædcentral
Arne Høgh, Karlby	Ålborg Jess	Kvf. Vestjyden
N. Kr. Kristiansen, Højvang	Horsens Leif	Koldingkredsens Kvf.
Erling Nielsen, Trunderup	Horsens Vang	Kvf. Vestjyden
Aage Nielsen, Fredsø	Morsø Ejlekær	Kvf. Vestjyden
Kr. Søberg, Ø. Hæsingø	Horsens Vang	Sønderjyds Tyrestation

	Stbg.	Født	Alder ¹⁸ /a-68	
			år	mdr.
<i>Samsø, Brundby:</i>				
Samsø Gorm	29040	28- 5-64	4	3
<i>Ejstrupgård, Kavslunde:</i>				
Årup Vestfyns Ring	28767	15- 3-63	5	5
<i>Enemærket, Lunde Fyn:</i>				
Rudme Nør	29064	15- 5-64	4	3
Nordfyns Top	28763	23- 9-62	5	11
<i>Torniofte, Høng:</i>				
Holm Nordvest	29042	28- 3-64	4	5
<i>Grønhøjgård, Fårdrup, Slagelse:</i>				
Lumsås Sydvest	29043	26- 2-64	4	6
<i>Bellinge, Nykøbing Fl.:</i>				
Fåborg Kær	28700	15- 6-63	5	2
<i>Kannikegård, Akirkeby:</i>				
Bornholms Banko	28756	7- 1-63	5	7
2. Sorthroget Dansk Malkerace.				
<i>Dybvaadgård, Dybvad:</i>				
Hjørring Tell	7718	20-12-62	5	8
<i>Lundgård, Overlade:</i>				
Ålborg Ryt	7611	20-11-62	5	9
Edison	7626	25- 2-63	5	6
<i>Krarup Nygård, Skive:</i>				
Skive Frans	7785	17- 2-64	4	6
<i>Rosenfeldt, Ulstrup:</i>				
Viborg Kallestrup	7599	6-10-63	4	10
Bjerringbro Magnet	7730	5-12-63	4	8
<i>Kalø Hovedgård, Rønde:</i>				
Randers Kimbrer	7705	6- 1-64	4	7
<i>Moesgård, Kibæk:</i>				
Herning Mik	7789	6- 9-63	4	11
<i>Vardegård, Varde:</i>				
Varde Kastor	7822	10- 2-64	4	6
Varde Frans	7824	23-11-63	4	9

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Johs. Begtrup, Nørre-Alslev	Falsters Vinkel	Samsø Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal	Hjørring Munkdrup	Årup Vestfyns Kvf.
Bent H. Nielsen, Nørremosegård A. Grønnegaard, Corselitze	Horsens Leif Stevns Klint	Syddøstfyns Kvf. Nordfyns Kvf.
J. Holm Jensen, Rørby	Horsens Vang	Holbæk Amts Kvf.
Børge Hansen, Bakkegård	Horsens Leif	Sydvestsjællands Kvf.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård	Næstved Kærving	Fåborg-Midtfyns Kvf.
C. M. Hansen, Bodilsker	Bornholms Janos	Bornholms Elite-Kvf.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, S.	Riemer	Kvf. for Hjørring Amt
A. Gr. Andersen, Grusbakgård Chr. Oostenbrug, Beetgumer- molen, H.	Reuter Jelsumer Gerard Wouter 6	Kvf. for Ålborg Amt Vesthimmerlands Kvf.
A. Ruyter og søn, Ooster- Blokker, H.	Bjerringbro Frans	Skiveegnens Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup Fritz Lampe, Oldenburg, T.	Aros John	Kvf. Jyden Kvf. Jyden
Th. Aarup, Kallestrup	Kimbrer	Kvf. Østjyden
Søren Mikkelsen, Farsø	Kimbrer	Hammerum Herreds Kvf.
Chr. Byrialsen, Farsø A. Ruyter og søn, Ooster- Blokker, H.	Kastor Bjerringbro Frans	Kvf. Vestjyden Kvf. Vestjyden

	Stbg.	Født	Alder 18/8-68	
			år	mdr.
<i>Gelballegård, Lunderskov:</i>				
Kolding Diamant	7733	26- 2-64	4	6
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Varde Thor	7825	18- 1-64	4	7
Varde Napoleon	7820	30-10-63	4	10
<i>Brøstrupgård, Rødding:</i>				
Dybbøl Atlas	7818	13-10-63	4	10
Sdj. Fyr	7444	9- 2-62	6	6
3. Jerseyrace.				
<i>Dybvadgård, Dybvad:</i>				
Hjørring Brem	3647	23- 4-64	4	4
<i>Morsø, Nykøbing M.:</i>				
Morsø Just	3602	11- 1-64	4	7
Morsø Gibs	3663	3- 8-64	4	0
<i>Lundgård, Overlade:</i>				
Ålborg Milo	3650	13- 9-64	3	11
<i>Kalø Hovedgård, Rønde:</i>				
Dybbøl Frank	3630	28- 3-64	4	5
Randers Gibs	3637	4-12-64	3	8
Randers Høj	3636	2-10-64	3	10
<i>Østerhåb, Hatting:</i>				
Franko	3574	5- 3-64	4	5
<i>Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:</i>				
Skærup Gibs	3639	10-11-64	3	9
Årup Vestfyns Haka	3491	26-10-63	4	10
<i>Vardegård, Varde:</i>				
Gibskær Syd	3719	30- 9-63	4	11
<i>Gelballegård, Lunderskov:</i>				
Jack Syd	3564	28-12-63	4	8
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Russ Syd	3562	5-11-63	4	9
<i>Brøstrupgård, Rødding:</i>				
Åbenrå Frank	3486	5-12-63	4	8

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Brdr. Poulsen, Vognsild	Ålborg Diamant	Koldingkredsens Kvf.
C. Ruyter, Berkhout, H.	Bjerringbro Frans	Kvf. Vestjyden
Brdr. Poulsen, Vognsild	Napoleon	Kvf. Vestjyden
G. Henneberg-Zimmer, Slesvig-Holsten	Atlas	Gråsten-Sønderborg Kvf.
A. Ruyter, Ooster-Blokker, H.	Frans Ij. 167	Sønderjyds Kvf. for SDM
Johs. Pedersen, Bremerskov	Nordfyns Russ	Kvf. for Hjørring Amt
Erik Justesen, Skjerne	Hjørring Frank	Morsø Kvf.
Hans og Karl Hansen, Kærbyholm	Fåborg Gibs	Morsø Kvf.
Johs. Pedersen, Bremerskov	Milo	Kvf. for Ålborg Amt
Marinus Nørgaard, Ingstrup	Hjørring Frank	Gråsten-Sønderborg Kvf.
Jens Bugge, Øster-Tørslev	Fåborg Gibs	Kvf. Østjyden
O. Skov Andersen, Svanebjerg, Korsør	Bornholms Knægt	Kvf. Østjyden
Kaj Andersen, Hammelse	Hjørring Frank	Horsensegnens Kvf.
Valdemar Rasmussen, Kærbyholm	Fåborg Gibs	Vejle og Fr. Sædcentral og Tørring-B. Kvf.
Hans og Karl Hansen, Kærbyholm	Fåborg Gibs	Årup Vestfyns Kvf.
Hans og Karl Hansen, Kærbyholm	Fåborg Gibs	Sydjyds Jersey-Kvf.
Lars P. Pedersen, Lambæksgård	V. A. J. Jack	Sydjyds Jersey-Kvf.
Hans Jensen, Gislev	Nordfyns Russ	Sydjyds Jersey-Kvf.
Chr. Jensen, Hammelse	Hjørring Frank	Sønderjyds Tyrestation

Alder ¹⁰/₁₀-68

	Stbg.	Født	år	mdr.
<i>Ejstrupgård, Kavslunde:</i>				
Sydvestfyns Lun	3495	15- 9-63	4	11
Årup Vestfyns Ejby	3700	3- 2-64	4	6
<i>Enemærket, Lunde Fyn:</i>				
Fyns Jako	3702	15- 2-64	4	6
<i>Torntofte, Høng:</i>				
Elm Nordvest	3572	2-12-63	4	8
<i>Bellinge, Nykøbing Fl.:</i>				
Sydfyns Sif	3481	8- 1-63	5	7

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Otto Storm, Verninge Harry Hansen, Ejby Mark	Fåborg Gibs Årup Vestfyns Jaffa	Sydvestfyns Kv. Årup Vestfyns Kv.
Johanne Hansen, Røjle	Årup Vestfyns Jaffa	Nordfyns Kv.
Arne Jensen, Outrup	Fåborg Gibs	Holbæk Amts Kv.
Lars P. Pedersen, Lambæksgård	V. A. J. Jack	Sydfyns Kv.

Tidligere udsendte beretninger om afkomsprøver med tyre.

1947.	226.	ber.	Afkomsprøver med Tyre.	(Udsolgt).
1948.	229.	—	Afkomsprøver med Tyre. II.	(1,50 kr.).
1948.	236.	—	Afkomsprøver med tyre. III.	(2,50 kr.).
1950.	245.	—	Afkomsprøver med tyre. IV.	(2,50 kr.).
1951.	254.	—	Afkomsprøver med tyre. V.	(2,50 kr.).
1952.	257.	—	Afkomsprøver med tyre. VI.	(Udsolgt).
1953.	263.	—	Afkomsprøver med tyre. VII.	(3,50 kr.).
1954.	270.	—	Afkomsprøver med tyre. VIII.	(3,50 kr.).
1954.	276.	—	Afkomsprøver med tyre. IX.	(4,50 kr.).
1956.	286.	—	Afkomsprøver med tyre. X.	(4,50 kr.).
1957.	295.	—	Afkomsprøver med tyre. XI.	(5,00 kr.).
1957.	301.	—	Afkomsprøver med tyre. XII.	(6,00 kr.).
1959.	309.	—	Afkomsprøver med tyre. XIII.	(6,00 kr.).
1960.	316.	—	Afkomsprøver med tyre. XIV.	(6,00 kr.).
1960.	324.	—	Afkomsprøver med tyre. XV.	(6,00 kr.).
1962.	329.	—	Afkomsprøver med tyre. XVI.	(6,00 kr.).
1962.	333.	—	Afkomsprøver med tyre 1945-60.	(7,00 kr.).
1963.	335.	—	Afkomsprøver med tyre XVII.	(7,50 kr.).
1964.	342.	—	Afkomsprøver med tyre XVIII.	(7,50 kr.).
1965.	348.	—	Afkomsprøver med tyre XIX.	(8,00 kr.).
1966.	352.	—	Afkomsprøver med tyre XX.	(8,00 kr.).
1967.	355.	—	Afkomsprøver med tyre XXI.	(8,00 kr.).
1968.	361.	—	Afkomsprøver med tyre XXII.	(10,00 kr.).