

401. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

11. meddelelse fra

Kaninkontrolstationen

for årene 1969–70, 1970–71 og 1971–72

Af

Jens Nielsen



I kommission hos Landhusholdningsselskabets forlag,

Rolighedsvej 26, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri,

1973

INDHOLDSFORTEGNELSE


Indledning	5
A. Afkomskontrollen med kødkaniner	7
1. Materialet	7
2. Kontrolresultater	8
B. Andre forsøg	11
1. Fodringsforsøg	11
2. Forsøg med antibiotica og coccidiostater	21
Hovedtabel 1. Kødkaniner 1969-70	24
Hovedtabel 2. Kødkaniner 1970-71	31
Hovedtabel 3. Kødkaniner 1971-72	38
Tidligere udsendte beretninger om afkomsprøver og forsøg med kaniner	46

Indledning.

Nærværende beretning omfatter tre kontrol- og forsøgsår, nemlig årene 1969-70, 1970-71 og 1971-72. Årene går fra 1. april til 31. marts. Der er berettet om afkomskontrollen med kødkaniner, altså om de udførte afkomsprøver, samt om fodringsforsøgene og andre forsøg, og det daglige arbejde på kontrolstationen er som i de foregående år varetaget af forsøgsassistent Th. Tuxen og forsøgsmedhjælper Lars Hansen.

Kaninerne slagtes nu i Holbæk. Fra kaninkontrolstationens oprettelse i 1944 og indtil den 1. februar 1972 er dyrene blevet slagtet på Andels-Fjerkræslagteriet i Ringsted, men som følge af andelsfjerkræslagteriernes centralisering af slagtingerne ophørte slagteriet med at slagte kaniner fra nævnte dato at regne. I stedet henvistes til slagting på Danpo Sydjysk Andels Slakteri i Vamdrup, men da forsøgsledelsen fandt den lange transport fra Nordrup til Vamdrup temmelig uheldig, blev der truffet aftale med slagterier H. V. Nielsen, Holbæk Fjerkræ- og Kaninslagteri om at lade dyrene slagte på dette slagteri.

Kaninkontrolstationen tillægger selv de dyr, der indgår i afkomskontrollen og de øvrige forsøg. Bestanden af avlshunner er som hidtil ca. 120 stk., der alle er af racen Hvid Land. De avlere, der ønsker hanner afkomsprøvet, indsender derfor pågældende hanner til kontrolstationen, hvor hver han i dagene efter modtagelsen bedækker 3-4 hunner. De tilmeldte hanner



Kaninkontrolstationen set fra øst.

modtages om torsdagen og hjemsendes følgende tirsdag. En del af alvshunnerne parres til kontrolstationens egne hanner, og det herved frembragte afkom indgår i de øvrige forsøg. Der avles året rundt, men dog i noget begrænset omfang i fældningstiden.

Avlens omfang er vist i følgende oversigt.

	Antal hunner parret	Heraf folet		Antal unger pr. kuld ved	
		Antal	Procent	føds.	frav.
1969-70	690	465	67	7,7	6,4
1970-71	690	493	71	7,5	6,3
1971-72	646	445	69	7,9	6,5

I gennemsnit for alle tre år er der 7,7 unger ved fødsel og 6,4 ved fravænning. I gennemsnit dør der altså 1,3 unge i hvert kuld i dietiden, men hertil skal føjes, at der højst ønskes 8 unger i kullet, da det ellers giver for dårlig vækst inden fravænning. Hvis der fødes flere end 8 unger, bliver de overskydende derfor aflivet i dagene efter fødslen, eller de i sjældnere tilfælde bliver sat til andre hunner med små kuld.

A. Afkomskontrollen med kødkaniner.

1. Materialet.

Tilslutningen til afkomskontrollen har været stor i alle tre år, om end den har været noget mindre i 1971-72 end i de nærmest foregående år. Kontrollens omfang fremgår nærmere af tabel 1.

Tabel 1.

Race	Antal dyr ved kontrollens								
	Antal hold			begyndelse			slutning		
	69-70	70-71	71-72	69-70	70-71	71-72	69-70	70-71	71-72
Hvid Land	63	57	48	912	808	616	796	617	499
Bourgogne	4	3	5	67	20	80	60	19	59
Californian	2	4	4	28	64	67	28	44	47
Blå Wiener	11	8	8	158	145	158	124	116	130
Hvid Wiener	2	0	0	21	—	—	19	—	—
Stor Chinchilla	1	3	0	17	32	—	16	28	—
Stor Sølv	5	8	4	67	169	63	58	106	53
Fransk Vædder	33	34	23	509	558	346	450	391	293
Tysk Kæmpeschecke	1	1	0	10	20	—	10	18	—
Belgisk Kæmpe	12	7	17	172	95	276	137	76	234
I alt	134	126	109	1961	1879	1606	1698	1433	1315

Holdenes gennemsnitlige størrelse er 14,7 dyr ved kontrollens begyndelse og 12,1 ved kontrollens slutning.

I 1969-70 er der 1961 dyr ved kontrollens begyndelse. Heraf døde 205, og 58 er udsatte. Døds- og udsætterprocenten er dermed 13,4.

I 1970-71 er der 1879 dyr ved kontrollens begyndelse. Heraf døde 281, og 165 blev udsat, hvilket svarer til en døds- og udsætterprocent på 23,7.

I 1971-72 er der 1606 dyr ved kontrollens begyndelse. Heraf døde 167, og 124 blev udsat, hvormed døds- og udsætterprocenten er 18,1.

Fravænningen sker, når ungerne er 5 uger gamle, men dog således, at der tages hensyn til kuldenes størrelse, idet mindre kuld oftest fravænnens et par dage yngre end større kuld. Den første vejning efter fravænnning finder sted 10-12 dage efter fravænnning, og som regel udviser dyrene normal tilvækst i denne periode, hvorfor de betragtes som indsat i kontrol på selve fravænningsdagen. I forholdsvis få tilfælde er det dog således, at et dyr af en eller anden grund ikke har nævneværdig tilvækst inden første vejning, og når det er således, udsættes kontrollens begyndelse til dagen for denne vejning. Såfremt et dyr dør inden første vejning, udelades det af opgørelsen.

2. Kontrolresultater.

I det følgende er de gennemsnitlige resultater for de enkelte racer anført.

Tabel 2. Alder i dage ved kontrollens begyndelse og slutning.

Race	Ved kontrollens begyndelse			Ved kontrollens slutning		
	69-70	70-71	71-72	69-70	70-71	71-72
Hvid Land	38	36	36	88	88	91
Bourgogne	39	35	37	86	79	90
Californian	35	36	35	82	85	82
Blå Wiener	39	36	37	94	97	93
Hvid Wiener	36	—	—	79	—	—
Stor Chinchilla	35	36	—	85	85	—
Stor Sølv	39	36	36	86	92	90
Fransk Vædder	37	36	36	88	90	93
Tysk Kæmpeshecke	35	36	—	90	100	—
Belgisk Kæmpe	39	36	36	87	89	91

Som det ses i tabel 2 varierer alderen ved kontrollens begyndelse fra 35 til 39 dage, og alderen er som helhed lidt højere i 1969-70 end i de to følgende år. Forklaringen herpå er overvejende en nedgang i antallet af dyr med for ringe tilvækst i perioden fra fravænnning til følgende vejning.

Alderen ved kontrollens slutning, der jo er identisk med alderen ved slagtning, er i gennemsnit 88 dage i 1969-70, 89 dage i 1970-71 og 91 dage i 1971-72.

I tabel 3 er anført den gennemsnitlige vægt ved kontrollens begyndelse og slutning. Det ses, at vægten ved kontrollens begyndelse er faldende, hvilket i hvert fald delvis skyldes den faldende alder ved kontrollens begyndelse. Med hensyn til vægten ved kontrollens slutning er der også en faldende tendens, men denne er dog ikke større end, at vægtforøgelsen i kontroltiden er svagt stigende. Eksempelvis er vægtforøgelsen for Hvid Land 1,79 kg i 1969-70 mod 1,81 kg i 1970-71 og 1,84 kg i 1971-72.

Tabel 3. Vægt i kg ved kontrollens begyndelse og slutning.

Race	Ved kontrollens begyndelse			Ved kontrollens slutning		
	69-70	70-71	71-72	69-70	70-71	71-72
Hvid Land	0,85	0,78	0,72	2,64	2,59	2,56
Bourgogne	0,92	0,89	0,74	2,64	2,63	2,56
Californian	0,92	0,76	0,80	2,59	2,58	2,58
Blå Wiener	0,90	0,77	0,74	2,84	2,89	2,78
Hvid Wiener	0,93	—	—	2,66	—	—
Stor Chinchilla	1,02	0,94	—	2,97	2,86	—
Stor Sølv	0,95	0,80	0,78	2,86	2,84	2,85
Fransk Vædder	0,96	0,86	0,80	3,06	2,96	2,96
Tysk Kæmpeshecke ..	0,90	0,74	—	3,13	3,11	—
Belgisk Kæmpe	1,05	0,92	0,86	3,17	3,16	3,04

I tabel 4 er den gennemsnitlige daglige tilvækst og foderforbruget pr. kg tilvækst anført. Med hensyn til den daglige tilvækst er der som helhed en svag nedgang fra 1969-70 til 1970-71, og nedgangen er fortsat i samme tempo i 1971-72.

Tabel 4. Gram daglig tilvækst og f.e. pr. kg tilvækst.

Race	Ved kontrollens begyndelse			Ved kontrollens slutning		
	69-70	70-71	71-72	69-70	70-71	71-72
Hvid Land	35,5	34,3	33,5	3,24	3,15	2,74
Bourgogne	35,8	39,7	34,1	3,19	2,84	2,74
Californian	35,6	35,8	37,6	3,45	3,11	2,89
Blå Wiener	35,7	34,7	35,6	3,22	3,15	2,80
Hvid Wiener	39,2	—	—	3,12	—	—
Stor Chinchilla	38,7	38,7	—	3,07	3,29	—
Stor Sølv	39,3	36,5	36,7	3,14	3,01	2,59
Fransk Vædder	41,2	38,2	37,8	3,19	3,04	2,71
Tysk Kæmpeshecke ..	40,8	36,7	—	3,33	3,11	—
Belgisk Kæmpe	43,5	41,2	39,5	3,15	3,00	2,65

Denne nedgang skal ses i relation til foderets energiindhold. Indtil april 1970 fodredes med kaninpiller fra Øernes Andel med en indholdsgaranti på 12 procent fordøjeligt renprotein og 88 f.e. i 100 kg. Med fusionen på foderstofhandelens område ophørte fremstillingen af denne pillesort, og i stedet forhandlede DLG Kaninpiller-11 med en noget lavere indholdsgaranti, nemlig 11 procent fordøjeligt renprotein og 85 f.e. i 100 kg. Samtidig begyndte forsøgsledelsen at rette blikket mod brugen af hø. Tidligere undersøgelser havde vist, at gennemsnitskaninen kun åd ca. 15 g hø daglig, når der var fri adgang til såvel piller som hø. Dels fordi optagelsen af hø var meget beskeden, og dels fordi det ofte var vanskeligt at fremskaffe hø af bare nogenlunde ensartet beskaffenhed, iværksattes et forsøg med fodring uden hø. Endvidere påbegyndtes en række forsøg vedrørende pillernes sammensætning, energiindhold og træstofindhold.

Efter forsøget med fodring uden hø ophørte man fra begyndelsen af kontrolåret 1971-72 med at give hø til afkomsholdene. Endvidere havde overgangen til brug af DLG Kaninpiller-11 medført en nedsættelse af pillernes energiindhold, herunder også af proteinindholdet, og denne linie blev i nogen grad fortsat, idet energiindholdet yderligere blev sænket, hvorimod der skete en svag stigning af proteinindholdet. Ligeledes blev træstofindholdet øget. Det gennemsnitlige forhold for samtlige kontrolhold fremgår af tabel 5.

Tabel 5. F.e. pr. kg tilvækst, kg foder pr. kg tilvækst samt det samlede foders indhold af ford. råprotein og træstof.

År	F.e. pr. kg tilv.	Kg pr. kg tilvækst			Procent ford. råprotein	Procent træstof
		Piller	Hø	Ialt		
1969-70	3,21	3,44	0,42	3,86	12,57	10,83
1970-71	3,07	3,54	0,29	3,83	11,86	10,57
1971-72	2,73	3,81	0	3,81	12,05	12,96

Som det ses, er den samlede fodermængde i kg pr. kg tilvækst næsten ens fra år til år.

I tabel 6 er slagteresultaterne opført for alle tre år under ét. Racemæssigt varierer kødfylden fra 8,1 til 8,4 og Blå Wiener, Stor Chinchilla, Fransk Vædder og Belgisk Kæmpe har klarer sig bedst.

Slagtesvindet varierer fra 40,0 til 44,0 procent, og her har Hvid Land, Bourgogne, Blå Wiener og Stor Sølv klarer sig bedst.

Kroplængden varierer fra 37,1 til 40,3 cm, men i denne forbindelse må erindres, at de førstnævnte racer slagtes ved en lavere vægt end de sidstnævnte, hvorfor der alene af denne grund må forekomme en forskel i længden.

Tabel 6. Slagteresultater.

Race	Points for kødfylde	Procent slagte- svind	Krop- længde i cm	Procent dyr i klasse			
				Iff	If	I	II
Hvid Land	8,2	41,3	37,1	0	5	88	7
Bourgogne	8,2	41,2	37,4	0	6	86	8
Californian	8,1	42,6	37,1	0	6	88	6
Blå Wiener	8,4	41,1	38,3	0	4	89	7
Hvid Wiener	8,2	44,0	38,0	0	16	74	10
Stor Chinchilla	8,4	41,7	38,3	0	18	73	9
Stor Sølv	8,3	40,9	38,8	1	6	87	6
Fransk Vædder	8,4	41,5	38,9	1	13	83	3
Tysk Kæmpeshecke ...	8,2	43,0	40,0	0	0	86	14
Belgisk Kæmpe	8,4	41,6	40,3	0	6	89	5

Ved bedømmelsen af fedningsgraden er foretaget en opdeling i klasserne Iff, If, II og III. Dyr i klasserne Iff og If er henholdsvis meget fede og noget for fede. Dyr i klasserne I, II og III er henholdsvis passende fede, noget magre og magre. Det ses, at langt de fleste dyr er i klasse I, forholdsvis få i klasserne If og II, kun ganske få dyr i klasse Iff og ingen i klasse III.

B. Andre forsøg.

1. Fodringsforsøg.

Som tidligere nævnt er der udført forsøg med fodring uden hø, og som motivering er nævnt, at dyrene kun æder meget lidt hø, når der er fri adgang til både piller og hø, samt at det ofte er besværligt at fremskaffe hø af tilstrækkelig ensartet kvalitet. Hertil kan føjes, at en nøjagtig måling af den fortærede hømængde er vanskelig, idet en del af høet spildes under tygningen og falder gennem burets trådbund, hvor det blandes med gødningen. En anden grund til at forsøge med fodring uden hø er, at der må ske en rationalisering af arbejdet, såfremt kaninhold skal drives i større målestok, og udeladelsen af høfodring er jo et led i den retning.

Bortfaldet af høfodring har medført en total overgang til brug af fuldfoder. Dette måtte på forhånd formenes at skulle være mindre energirig og mere træstofrig end de tidligere anvendte kaninpiller, hvorfor forsøgene det sidste års tid da også især har angået dette forhold.

I 1969-70 anvendtes kaninpiller fra Øernes Andelselskab (benævnt ØA-piller), når der ikke af forsøgsmæssige grunde blev fodret med andet. Fra foråret 1970 ophørte fremstillingen af ØA-piller, og i stedet forhandles en mere enkelt sammensat pillesort, DLG Kaninpiller-11 til fededyr. Denne benyttedes et års tid, men dog i aftagende grad, idet der forsøgsmæssigt også anvendtes kaninpiller fra Korn- og Foderstof Kompagniet (KFK-piller) og kaninpiller fra firmaet J. Boserup A/S, Fakse (ØH-piller). Derefter gik kaninkontrolstationen over til at lade fremstille kaninpiller efter egen opskrift for sammensætningen, da man ønskede at finde frem til et fuldfoder, hvor der foruden egnetheden også blev taget hensyn til prisen. Disse kaninpiller er betegnet som Nordrup A, Nordrup B o.s.v., og endvidere er der fremstillet et parti, hvor ØH-piller før fremstillingen blev tilsat 20 procent havreskaller; denne er benævnt ØH-20.

Sammensætningen af disse piller fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Kaninpillernes sammensætning.

	Nordrup A	Nordrup B	Nordrup C	Nordrup D	Nordrup E	ØH-20
Havre	20,00	30,00	30,00	25,00	30,00	
Byg	20,00	20,00	16,00	16,00	16,00	20,50
Majs						10,00
Hvedeklid	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	18,25
Lucernegrønmel ...	37,00	30,00	30,00	35,00	30,00	40,00
Soyaskrå					4,00	1,50
Solsikkekrå	6,25	8,00	12,00	12,00	8,00	
Solsikkeexpeller						6,00
Sildemel						1,00
Kødbenmel						1,00
Melasse	5,00					
Havreskaller						20,00
Mineralsalt	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,00
Vitaminblanding ...	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
I alt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00

Med hensyn til ØA-piller, DLG Kaninpiller-11, KFK-piller og ØH-piller blev der på disse i alt foretaget 16 analyser, der som helhed viste, at pillerne indeholdt det garanterede indhold.

For de i tabel 7 nævnte piller fandtes følgende tal som gennemsnit af anførte analyser.

	Antal analyser	F.e. i 100 kg	Procent ford. råprotein	Procent træstof
Nordrup A	1	77,6	14,46	11,54
Nordrup B	4	72,5	11,14	13,13
Nordrup C	2	70,1	12,33	15,10
Nordrup D	1	68,6	12,39	14,77
Nordrup E	3	72,0	12,40	13,11
ØH-20	2	69,7	12,02	12,58

I det følgende er for så vidt angår nogle af tabellerne sket visse forkortelser af pladshensyn. DLG Kaninpiller-11 er forkortet til DLG-11, Nordrup A til NA, Nordrup B til NB o.s.v.

For samtlige tabeller gælder endvidere, at normalholdene er betegnet ved N og forsøgholdene ved F. Foderets værdi er udtrykt ved antal f.e. i 100 kg, procent ford. råprotein og procent træstof, og angivelsen er for det samlede foder altså for piller + hø, hvis der foruden piller også er fodret med hø. Inden den nærmere omtale af forsøgene skal endvidere bemærkes, at holdinddelingen som sædvanlig er sket ved deling af de enkelte kuld, så der på denne måde er taget højde for afstamning, mødrene indflydelse og kuldernes størrelse.

Følgende forsøg er omtalt:

Forsøg nr. 30, foretaget	4/6	69-10/11	69.
» » 34, »	19/11	69- 9/3	70.
» » 35, »	15/10	69- 9/3	70.
» » 36, »	10/12	69- 6/4	70.
» » 37, »	4/2	70- 5/5	70.
» » 38, »	8/4	70- 4/1	71.
» » 39, »	6/5	70- 2/11	70.
» » 41, »	30/6	70-16/11	70.
» » 43, »	9/12	70-15/3	71.
» » 45, »	10/11	70- 8/3	71.
» » 47, »	27/1	71-13/4	71.
» » 48, »	31/3	71-14/6	71.
» » 50, »	9/6	71- 6/9	71.
» » 51, »	7/7	71- 4/10	71.
» » 53, »	7/9	71-20/12	71.
» » 54, »	3/11	71-22/2	72.
» » 55, »	22/12	71-27/3	72.
» » 56, »	16/2	72- 8/5	72.

I tabel 8 er resultaterne fra tre års græsningsforsøg meddelt.

Forsøg nr. 30. Begge hold fodredes med ØA-piller. Det drejede sig om en ældre græsmark, og burene flyttedes så ofte, at der altid var den fornødne mængde græs til rådighed. Som det fremgår af tallene, havde græsningsholdet den største dødelighed, den mindste daglige tilvækst, det største slagtesvind og den laveste karakter for kødfylde.

Forsøg nr. 39. Begge hold fik DLG Kaninpille-11. Græssets kvalitet var noget bedre end i det foregående år, men forsøgets resultater var de samme. Større dødelighed, mindre daglig tilvækst, større slagtesvind og lavere karakter for kødfylden.

Forsøg nr. 51. Begge hold fik Nordrup B piller, men græsningsholdet fik halvdelen af pillerne erstattet med valset byg, da der nu overvejende græssedes på en ny og bedre græsmark. Inden forsøgets begyndelse blev der foretaget en ændring af burene, idet trådvævsbunden i den overdækkede del blev hævet ca. 5 cm. Meningen hermed var først og fremmest, at gødningen skulle samle sig under trådbunden, og for at dette ikke skulle forhindres, blev der ikke brugt strøhalm. Tilsyneladende var denne ændring en forbedring, idet resultatet nu var lavere dødelighed for græsningsholdet, hvorimod den daglige tilvækst, slagtesvindet og kødfylden var som i de foregående år.

I alle tre år var det således, at græsningsholdet ikke blev vandet på anden måde end, at græsset en gang imellem blev overbruset med vand. Der regnedes altså med, at græssets vandindhold + vedhængende dug og regnvand var stort nok til at dække vandbehovet. For at få nærmere klarhed i så henseende er der foretaget en undersøgelse over den optagne mængde drikkevand, når der til stadighed var vand i drikkeskålene. Forsøget, der udførtes på stald og omfattede 68 dyr, strakte sig over et år. Det

Tabel 8. Græsningsforsøg.

Forsøg nr. Hold	30		39		51	
	N	F	N	F	N	F
Fortæret pr. dyr/dag:						
g kaninpiller	122	82	117	80	131	55
g valset byg						55
g hø	15	0	15	0	0	0
Kraftfoderets og høets værdi:						
f.e. i 100 kg	81,8		79,0		72,4	
% ford. råprotein	13,4		11,8		11,3	
% træstof	10,3		11,1		14,1	
Antal dyr ved forsøgets begyndelse	146	142	162	116	103	83
Antal dyr ved forsøgets slutning	118	89	133	68	70	70
Antal døde	28	51	19	40	74	8
Antal udsatte	0	2	10	8	19	5
% døde og udsatte	19,2	37,3	17,9	41,4	32,0	15,7
Alder i dage ved forsøgets begyndelse ..	36	36	36	36	36	35
Alder i dage ved forsøgets slutning	94	107	91	109	98	108
Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	0,81	0,81	0,83	0,82	0,73	0,71
Vægt i kg ved forsøgets slutning	2,78	2,72	2,79	2,70	2,88	2,76
g daglig tilvækst	34,9	26,5	35,5	25,2	34,4	27,9
f.e. pr. kg tilvækst	3,19		2,93		2,76	
% slagtesvind	41,3	42,4	41,2	42,6	40,9	42,5
Points for kødfylde	8,3	8,0	8,3	8,0	8,4	7,9

viste, at vandforbruget stiger med stigende legemsvægt og dermed også med størrelsen af foderet, der bestod af piller og hø, hvorimod der ikke var nogen udtalt årsvariation. De gennemsnitlige tal for gram optaget drikkevand pr. dyr pr. dag fremgår af følgende oversigt, hvor materialet er inddelt i tre grupper efter legemsvægt:

	Gruppe I 0,9-1,5 kg	Gruppe II 1,5-2,1 kg	Gruppe III 2,1-2,7 kg
Januar kvartal	189 g	239 g	272 g
April kvartal	190 g	263 g	277 g
Juli kvartal	184 g	243 g	259 g
Oktober kvartal	187 g	237 g	267 g

Tallene dækker over betydelige individuelle forskelle, idet de mest tørstige drak omtrent dobbelt så meget som de mindst tørstige i samme vægtgruppe. Det gennemsnitlige forbrug var 234 g pr. dyr pr. dag, og den gennemsnitlige daglige fodermængde 127 g ØA-piller og hø. Dette svarer til 185 g drikkevand pr. 100 g foder, hvilket igen svarer til 210 g drikkevand pr. 100 g tørstof, idet foderet indeholdt 88 procent tørstof.

Vedrørende græsset blev vandindholdet bestemt i følgende fire partier:

- I. Mellemsvært græs og kløver, dugvådt, slået kl. 6.
- II. Noget ældre græs og kløver, tørt, slået kl. 17.
- III. Mellemsvært græs og kløver, regnvådt, slået kl. 17.
- IV. Fint græs med noget hvidkløver, tørt, slået kl. 17.

Resultatet var, at parti I havde et vandindhold ved slåningen på 83 procent, parti II 79 procent, parti III 87 procent og parti IV 80 procent. Så vidt det kan afgøres, har gennemsnitskaninen ædt ca. 200 g græs daglig. Der har således ikke direkte været fuld dækning for vandbehovet, men da dyrene desuden kan slikke dug i sig fra græsset i de tidlige morgentimer samt også kan slikke regnvand i sig fra regnvådt græs, er behovet formentlig dækket. Dertil kommer, at græsset undertiden blev overbruset med vand i tørre perioder.

Tabel 9 omfatter nogle rationeringsforsøg.

I forsøgene nr. 35 og 37 er der tale om en direkte rationering af pillefoderet til hold F. Pr. dyr pr. dag er der i dette hold givet 114 g ØA-piller mod 127 til normalholdet. Besparselsen er altså 13 g, hvilket svarer til 10 procent. Procent døde og udsatte er ens for begge hold. Slagtesvind og kødfylde er også ens. Normalholdet har den største daglige tilvækst, men forsøgsholdet har det laveste foderforbrug pr. kg tilvækst, så der i så henseende er en svag gevinst for rationering.

I forsøg nr. 36 har hold F fået et tilskud af kálroer, og for at få dyrene til at æde mest muligt af dette foder er der foretaget en ret stærk rationering af pillefoderet (ØA-piller). I forhold til hold N er der sparet 45 g piller pr. dyr daglig, og til gengæld er der fortæret 199 g kálroer. Procenttallet for døde og udsatte dyr er omtrent ens for begge hold. Den daglige tilvækst er lavest for hold F, og selv om tallet for f.e. pr. kg tilvækst også er lavest for dette hold, er forskellen i daglig tilvækst alligevel så meget større, at hold F alt i alt ingenlunde har klaret sig bedre end hold N.

I forsøg nr. 43 er rationeringen af pillefoderet sket ved, at hold F ikke har haft adgang til pillefoderet i dagtimerne. Der blev anvendt ØH-piller, og som det ses, er den daglige foderoptagelse omtrent ens for holdene.

Tabel 9. Foderet rationeret.

Forsøg nr. Hold	35 + 37		36		43	
	N	F	N	F	N	F
Fortæret pr. dyr/dag:						
g kaninpiller	127	114	137	92	135	128
g hø	15	15	15	15	0	0
g kårloer			0	199		
Kaninpillernes, høets og roernes værdi*)						
f.e. i 100 kg	81,6	81,6	82,1	77,2	78,8	78,8
%ford. råprotein	13,4	13,4	13,5	11,5	14,0	14,0
%træstof	10,2	10,2	10,2	10,1	12,3	12,3
Antal dyr ved forsøgets begyndelse	84	85	90	89	105	105
Antal dyr ved forsøgets slutning	78	79	88	85	78	75
Antal døde	6	6	2	3	15	13
Antal udsatte	0	0	0	1	12	17
% døde og udsatte	7,1	7,1	2,2	4,4	25,7	28,6
Alder i dage ved forsøgets begyndelse ..	35	36	36	36	36	36
Alder i dage ved forsøgets slutning	85	88	85	91	86	85
Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	0,88	0,89	0,90	0,89	0,83	0,87
Vægt i kg ved forsøgets slutning	2,74	2,72	2,81	2,77	2,71	2,61
g daglig tilvækst	36,4	34,7	38,6	34,5	36,4	34,5
f.e. pr. kg tilvækst	3,18	3,03	3,22	3,06	2,93	2,93
% slagtesvind	41,4	41,7	41,5	41,2	41,7	42,0
Points for kødfylde	8,2	8,2	8,1	8,0	8,1	8,1

Procenttallet for døde og udsatte dyr er også omtrent ens, og det samme er tilfældet med hensyn til slagtesvind og kødfylde. Der var således intet udslag til fordel for denne rationeringsform.

Tabel 10 omfatter tre forsøg af forskellig art.

Baggrunden for forsøg nr. 34 var ønsket om at undersøge, om et større indhold af fosfor i foderet ville være en fordel. Der blev derfor fremstillet et parti KFK-piller med et ekstra indhold på 0,5 kg mononatriumfosfat pr. 100 kg. Herved blev fosforindholdet bragt op fra 0,59 til 0,69 procent, medens indholdet af Ca uforandret var 0,85 procent. Som det ses, viste forsøget intet udslag til fordel for det større fosforindhold, idet hold F ikke klarede sig bedre end normalholdet.

Forsøg nr. 38 er det tidligere nævnte høforsøg. Det ses, at døds- og ud-sætterprocenten stort set er ens for holdene, og at også den daglige tilvækst er ens. Hold F har altså klaret sig lige så godt som normalholdet, selv om det ikke fik hø og derfor alt i alt også fik mindst træstof i foderet.

*) Roerne er omregnet til samme tørstofprocent som pillernes.

Tabel 10. Forskellige forsøg.

Forsøg nr. Hold	34		38		41	
	N	F	N	F	N	F
Fortæret pr. dyr/dag:						
g kaninpiller	144	145	118	122	126	120
g hø	15	15	15	0	15	15
Kraftfoderets og høets værdi:						
f.e. i 100 kg	82,1	81,3	77,2	84,0	78,7	83,5
% ford. råprotein	13,5	11,6	11,8	12,5	11,4	12,1
% træstof	10,1	10,8	10,9	9,5	12,1	11,3
Antal dyr ved forsøgets begyndelse	148	145	211	211	239	231
Antal dyr ved forsøgets slutning	143	143	144	149	174	176
Antal døde	4	0	42	30	43	36
Antal udsatte	1	2	25	32	22	19
% døde og udsatte	3,4	1,4	31,8	29,4	27,2	23,8
Alder i dage ved forsøgets begyndelse ..	36	36	36	36	37	36
Alder i dage ved forsøgets slutning	85	86	92	90	94	92
Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	0,90	0,89	0,77	0,77	0,74	0,75
Vægt i kg ved forsøgets slutning	2,96	2,96	2,84	2,79	2,84	2,79
g daglig tilvækst	41,7	41,4	34,4	34,5	35,9	35,9
f.e. pr. kg tilvækst	2,98	2,99	2,98	2,97	3,09	3,13
% slagtesvind	40,9	41,0	41,0	41,0	41,7	41,8
Points for kødfylde	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3

Forsøg nr. 41. Fra veterinær side var der fremsat formodning om, at finmalingsgraden for de fodermidler, der anvendes til fremstilling af piller, måske har forbindelse med de til tider ret jævntligt forekommende tilfælde af forstoppelse med dødelig udgang. Der blev derfor fremstillet et parti piller af groftformalede foderstoffer til anvendelse i hold F. Forsøget pegede ikke i retning af, at foderets struktur i så henseende øvede nogen særlig indflydelse på forekomsten af forstoppelse, idet denne sygdom optrådte omtrent lige hyppigt i begge hold, ligesom også døds- og udsætterprocenten var omtrent ens.

I tabellerne 11 og 12 er hovedresultaterne anført for en række forsøg med piller af forskellig sammensætning og indhold.

I tabel 11 har alle fire normalhold fået DLG Kaninpiller-11, og der er ikke givet hø, selv om denne pillesort ikke er fremstillet som fuldfoder. I forsøg nr. 45 er der en beskedent forskel til fordel for hold F, i forsøg nr. 47 er der en kendelig forskel til fordel for hold F, og denne forskel er endnu mere udtalt i forsøg nr. 48. I forsøg nr. 50 har F-holdet derimod klaret sig en del dårligere end normalholdet, formentlig især fordi proteinindholdet har været for lavt.

I tabel 12 er der udelukkende tale om fuldfoderblandinger.

Tabel 11. Forsøg med kaninpiller af forskellig sammensætning og indhold.

Forsøg nr.	45		47		48		50	
Hold	N	F	N	F	N	F	N	F
Kaninpillernes art og værdi:								
Art	DLG-11	ØH	DLG-11	NA	DLG-11	ØH-20	DLG-11	NB
f.e. i 100 kg	83,0	79,4	82,4	77,6	81,9	69,0	81,9	72,4
% ford. råprotein	12,0	13,8	12,0	14,5	12,3	12,7	12,3	11,4
% træstof	10,0	12,7	9,4	11,5	8,7	11,6	8,7	12,9
Antal dyr ved forsøgets begyndelse	202	200	128	128	61	70	34	41
Antal dyr ved forsøgets slutning	139	141	75	96	46	69	22	27
Antal døde	40	39	34	12	9	1	5	8
Antal udsatte	23	20	19	20	6	0	7	6
% døde og udsatte	31,2	29,5	41,4	25,0	24,6	1,4	35,3	34,1
Alder i dage ved forsøgets begyndelse	36	36	38	37	37	37	36	36
Alder i dage ved forsøgets slutning	84	84	89	88	91	87	94	95
Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	0,80	0,82	0,81	0,80	0,74	0,75	0,66	0,72
Vægt i kg ved forsøgets slutning	2,66	2,63	2,67	2,71	2,60	2,63	2,65	2,67
g daglig tilvækst	36,2	37,1	34,1	36,1	33,4	37,2	33,4	31,9
f.e. pr. kg tilvækst	3,11	3,05	3,13	2,95	3,18	2,78	3,27	2,97
% slagtesvind	42,4	42,1	41,7	41,0	41,2	40,4	4,10	41,6
Points for kødfylde	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,4	8,1	8,1

Tabel 12. Fortsatte forsøg med kaninpillér af forskellig sammensætning og indhold.

Forsøg nr.	53		54		55		56	
Hold	N	F	N	F	N	F	N	F
Kaninpillernes art og værdi:								
Art	NB	NC	NC	ND	NE	ØH-20	NE	ØH
f.e. i 100 kg	72,5	70,3	69,5	68,6	72,0	68,9	72,0	78,1
% ford. råprotein	11,0	12,2	12,8	12,4	12,4	11,3	12,4	13,8
% træstof	12,7	15,1	14,7	14,8	12,4	13,6	12,7	13,4
Antal dyr ved forsøgets begyndelse	145	158	135	126	133	135	106	107
Antal dyr ved forsøgets slutning	125	149	116	112	101	102	98	94
Antal døde	7	0	5	5	27	23	8	12
Antal udsatte	13	9	14	9	5	10	0	1
% døde og udsatte	13,8	5,7	14,1	11,1	24,1	24,4	7,5	12,1
Alder i dage ved forsøgets begyndelse ..	36	36	35	35	35	35	36	36
Alder i dage ved forsøgets slutning	91	88	86	85	96	101	86	86
Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	0,76	0,76	0,74	0,75	0,75	0,77	0,75	0,76
Vægt i kg ved forsøgets slutning	2,76	2,83	2,53	2,53	2,67	2,64	2,69	2,67
g daglig tilvækst	33,9	39,3	35,0	35,4	38,0	37,3	38,2	37,5
f.e. pr. kg tilvækst	2,76	2,61	2,79	2,89	2,88	2,94	2,75	3,04
% slagtesvind	41,6	41,0	40,5	40,7	42,4	42,7	41,8	42,0
Points for kødfylde	8,0	8,3	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3

I forsøg nr. 53 er Nordrup B sammenlignet med Nordrup C, og som det ses, har hold F klaret sig betydeligt bedre end normalholdet, der har fået Nordrup B, især hvad daglig tilvækst angår. I forsøg nr. 54 er Nordrup C sammenlignet med Nordrup D, og det ses, at der ikke er nogen nævneværdig forskel på resultaterne. I forsøg nr. 55 er Nordrup E sammenlignet med ØH-piller tilsat 20 procent havreskaller, i forsøg nr. 56 er Nordrup E sammenlignet med ØH-piller, og for begge forsøg gælder, at der heller ikke i disse er fundet særlige forskelle på holdenes resultater.

Disse forsøg giver anledning til at koordinere resultaterne i en fælles opstilling, hvor foderets procentiske indhold af ford. råprotein og især indholdet af træstof sammenholdes med procenttallet for døde og udsatte dyr. En sådan opstilling er foretaget i tabel 13, hvori er medtaget samtlige forsøgshold, der har fået fuldfoder, og som ikke har været i andre forsøg end vedrørende foderets indhold af protein og træstof. Materialet er delt i tre grupper efter stigende procent ford. råprotein, og disse er igen opdelt i grupper efter stigende træstofindhold. Da procenttallet for døde og udsatte dyr varierer fra tid til anden, er tillige anført kontrolstationens gennemsnit for pågældende periode, og i forhold hertil er forsøgets resultat vurderet. En positiv forskel er altså ensbetydende med, at pågældende forsøgshold har klaret sig så meget bedre end samtlige dyr på stationen i samme tidsrum, medens en negativ forskel udtrykker det modsatte.

Tabel 13.

Gruppe	Procent ford. råprotein i gns.	Procent træstof i gns.	Antal dyr i forsøg	Procent døde og udsatte dyr		
				For- søget	Stations- gns.	Forskel
Ia	11,86	9,78	330	35,1	26,7	÷ 8,4
Ib	11,21	12,72	186	18,3	13,2	÷ 5,1
Ic	11,27	13,78	348	23,0	15,3	÷ 7,7
IIa	12,37	9,10	418	33,3	22,1	÷ 11,2
IIb	12,60	12,05	504	13,5	20,5	+ 7,0
IIC	12,47	14,84	419	10,0	20,9	+ 10,9
IIIa	14,16	12,04	338	26,3	27,0	+ 0,7
IIIb	13,59	12,96	351	23,6	23,0	÷ 0,6

Ses først på grupperne IIa, IIb og IIC, vil man finde, at foderets indhold af ford. råprotein er meget nær ens for alle tre grupper, omkring 12,5 procent. For gruppe IIa, hvor der kun er 9,10 procent træstof i foderet, er der 33,3 procent døde og udsatte, hvilket er 11,2 procentenheder dårligere end stationsgennemsnittet. For gruppe IIb, hvor træstofindholdet er 12,05 procent, er der 13,5 procent døde og udsatte, 7,0 procentenheder bedre end

stationsgennemsnittet. For gruppe IIc, hvor træstofindholdet er 14,84 procent, er der 10,0 procent døde og udsatte dyr, mindre end det halve af stationsgennemsnittet.

I grupperne Ia, Ib og Ic er procenttallet for døde og udsatte dyr højere end stationsgennemsnittet. Der er ikke noget egentlig udslag i retning af færre døde og udsatte ved en forøgelse af træstofindholdet, hvilket formentlig må tilskrives et for lavt proteinindhold.

I grupperne IIIa og IIIb, hvor der er ca. 14 procent ford. råprotein og 12–13 procent træstof i foderet, er procenttallet for døde og udsatte dyr af samme størrelse som stationsgennemsnittet.

Foderet med ca. 12,5 procent ford. råprotein og ca. 15 procent træstof har altså givet det bedste resultat. De 12,5 procent ford. råprotein svarer i pågældende fodersammensætning til 10,9 procent ford. renprotein.

Foretages en tilsvarende opstilling efter pillernes art, fås følgende bilde, der dog kun omfatter de til kontrolstationen komponerede blandinger.

Tabel 14.

	Procent ford. råprotein	Procent træstof	Antal dyr i forsøg	Procent døde og udsatte dyr		
				For- søget	Stations- gns.	Forskel
Nordrup A	14,46	11,54	128	25,0	25,8	+ 0,8
Nordrup B	11,21	13,31	399	20,6	13,3	÷ 7,0
Nordrup C	12,49	14,89	293	9,6	18,2	+ 8,6
Nordrup D	12,39	14,77	126	11,1	25,4	+ 14,3
Nordrup E	12,38	12,60	239	16,7	19,7	+ 3,0
ØH-20	12,25	12,27	400	15,3	22,5	+ 7,2

Som det ses, har Nordrup C og Nordrup D givet de bedste resultater, begge ca. 12,5 procent ford. råprotein og op mod 15 procent træstof. Sammensætningen af disse og de øvrige blandinger fremgår af tabel 7. Det vil bemærkes, at indholdet af ford. råprotein og træstof ikke i alle tilfælde er identiske med de efter tabel 7 anførte analysetal. Grunden hertil er, at der i det sidste tilfælde er tale om gennemsnitstal, når der er tale om to eller flere analyser, hvorimod tallene i tabel 14 afhænger af den vægt, hvormed det enkelte parti indgår i forsøgene.

2. Forsøg med antibiotica og coccidiostater.

Herunder er omtalt tre forsøg med antibiotika og coccidiostatisk midler.

I forsøg nr. 33 fik hold F et tilskud af Terramycin svarende til 10 mg pr. kg foder. Antallet af døde og udsatte dyr var lidt mindre i hold F end

i normalholdet, hvorimod den daglige tilvækst var en smule bedre for hold N end for det andet hold. Begge hold fik ØA-piller og hør.

I forsøg nr. 46 fik hold F et tilskud af Cunistress, et præparat, der benyttes en del i Frankrig, og som virker både som antibiotikum og coccidio-stat. Midlet var særdeles effektivt, idet der kun var 4,1 procent døde og udsatte dyr i hold F mod 44,6 i normalholdet.

Tabel 15. Forsøg med Terramycin, Cunistress og Valsyn.

Forsøg nr.	33		46		49	
	N	F	N	F	N	F
Hold						
Terramycin	0	+				
Cunistress			0	+		
Valsyn					0	+
Kraftfoderets og høets værdi:						
f.e. i 100 kg	81,8	81,8	77,2	73,1	69,0	69,0
% ford. råprotein	13,5	13,5	11,8	12,5	12,7	12,7
% træstof	10,2	10,2	11,2	14,7	11,6	11,6
Antal dyr ved forsøgets begyndelse	152	156	222	264	88	107
Antal dyr ved forsøgets slutning	124	135	157	255	78	90
Antal døde	22	17	34	0	3	5
Antal udsatte	6	4	31	9	7	12
% døde og udsatte	18,4	13,5	29,3	3,4	11,4	15,9
Alder i dage ved forsøgets begyndelse ..	36	36	36	36	36	35
Alder i dage ved forsøgets slutning	86	87	95	95	90	90
Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	0,79	0,80	0,74	0,72	0,81	0,77
Vægt i kg ved forsøgets slutning	2,78	2,74	2,75	2,71	2,82	2,77
g daglig tilvækst	38,9	38,1	33,4	34,1	36,5	35,0
% slagtesvind	41,2	41,5	41,3	41,5	40,9	41,2
Points for kødfylde	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

I forsøg nr. 49 blev dyrene i hold F behandlet med Valsyn i en kort periode efter fravæning i stedet for Sulkanin, der normalt benyttes som coccidiostat. Forsøget viste, at hold F havde lidt flere døde og udsatte dyr end normalholdet, der fik Sulkanin. Begge hold fik ØH-piller tilsat 20 procent havreskaller.

I lighed med den sidst udsendte beretning fra forsøgene på kaninkontrolstationen (10. meddelelse) er der også i denne beretning givet en opstilling, hvor de døde dyr er anført efter formodede eller konstaterede dødsårsag samt efter, om dyrene er døde i forsøgstidens 1., 2. eller 3. periode. Hver af disse perioder er på 20 dage, idet 1. periode omfatter tiden 1.-20. dag, 2. periode tiden 21.-40. dag og 3. periode tiden 41.-60. dag. Som det ses, er forstoppelse og/eller diarré langt den hyppigste dødsårsag.

Tabel 16. Antal døde dyr givet anførte bemærkning ved dødens indtræden i forsøgstidens 1., 2. og 3. periode.

Forsøg	Hold	Coccidiose			Forstoppelse og/eller diarré			Lunge- betændelse			Anden eller ukendt årsag		
		1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
30	N	4	0	0	4	12	2	0	4	0	1	1	0
	F	6	0	0	10	18	5	3	5	0	2	2	0
33	N	2	0	0	2	16	3	0	1	0	0	0	0
	F	2	0	0	2	10	3	1	1	0	0	0	0
34	N	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
35	N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
36	N	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
37	N	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
38	N	5	0	0	4	18	13	0	0	0	0	1	1
	F	3	0	0	5	18	6	0	0	0	0	0	0
39	N	4	0	0	4	7	7	0	2	0	0	1	0
	F	3	1	0	2	9	8	3	12	2	0	0	1
41	N	6	0	0	5	16	14	0	1	0	0	0	0
	F	4	0	0	5	14	13	0	0	0	0	0	1
43	N	1	0	0	3	6	4	0	0	0	0	1	0
	F	1	0	0	2	7	3	0	0	0	0	0	0
45	N	5	0	0	7	13	11	0	2	0	0	2	0
	F	5	0	0	8	10	13	0	0	0	0	2	1
46	N	3	0	0	4	8	9	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	N	5	0	0	6	14	8	0	0	0	0	1	0
	F	2	0	0	3	3	3	0	0	0	0	1	0
48	N	0	0	0	2	4	3	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	N	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0
50	N	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0
	F	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0
51	N	1	0	0	2	6	5	0	0	0	0	0	0
	F	2	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
53	N	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	N	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
	F	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
55	N	3	0	0	4	10	7	0	0	0	1	2	0
	F	2	0	0	5	7	8	0	0	0	0	1	0
56	N	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	2	0
	F	0	0	0	2	6	3	0	0	0	0	1	0
I alt		74	2	0	103	257	172	7	28	3	5	22	5

Hovedtabel 1. Kødkaniner 1969-70.

Avler	Han nr.		Hold nr.	Antal kuld	Antal dyr v. kontrollens	
	v. øre	h. øre			beg.	slut.
Hvid Land:						
S. Andersen, Smedestræde 2, Nysted	162		703	2	15	15
Egon Carstens, Aalborgvej 113, Viborg	18	9R55	592	2	13	9
do.	3	8R64	598	2	16	11
do.	048	49X2	670	3	18	16
do.	36	N027	689	1	4	4
do.	17	5H01	688	2	12	11
Harry Christensen, Egedev. 43 A, Fakse ..	7044	T620	678	3	15	13
Niels E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	8-24	0A42	603	4	27	19
do.	8-65	0A43	604	4	26	26
do.	8-50	Y811	621	3	12	11
do.	8-34	Y809	620	2	12	12
Flemming K. Hansen, Okslund, Brørup	08-9	4X46	643	3	15	15
do.	08-6	4X47	642	2	15	14
Hans E. Hansen, Ladby, Næstved	926	4T41	692	1	6	6
do.	873	1A75	693	3	10	10
do.	422	15T0	704	1	4	4
do.	916		705	2	14	14
Knud E. Hansen, Frøslev, St. Heddinge	8100		613	2	10	7
do.	861		614	1	8	5
Verner Hansen, P. Skramsgade 11, Horsens	62		596	3	16	9
do.	75		597	3	14	8
Chresten Jensen, Overeven, Snese	6216	618A	634	4	17	15
do.	8681	0A97	645	3	18	14
do.	1-4	0A98	646	3	18	15
do.	8773	0A96	644	3	18	15
do.	8820	3T51	675	2	13	13
do.	8-164	0A95	676	3	13	13
Herluf Jensen, »Trekroner«, Bindslev	657	5R82	589	2	12	8
do.	2-4		590	3	13	6
Knud Jørgensen, Varpelev, Klippinge	404	N021	672	2	13	10
do.	367		673	2	14	12
do.	380		696	2	13	13
do.	418		697	1	8	8
Charles Klüver, Valløesgade 33, Vejle	1208	175D	683	2	15	15
do.	1009		684	2	16	16
do.	505		685	2	16	15
Poul A. Larsen, Skottemarke, Holeby	41	Y960	606	3	22	22
Poul Kølbæk Larsen, Højvang, Asnæs	460	1A65	635	3	12	12
do.	461	1A66	636	3	19	19
Eira P. Nielsen, Valby, Helsingør	38-8	T521	617	3	16	16
do.	41-8	T522	618	1	8	8
Johannes Nielsen, Højrup, Taulov	42-8	T523	663	4	19	11
do.	22		686	3	17	16

Alder i dage v. kontrollens		Vægt i kg v. kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesværd	Kroplængde cm	Points for kødfylde	Fodningsgrad antal dyr i kl.			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
33	87	0,72	2,68	36,4	3,17	40	37	8,2			15	
44	97	1,03	2,61	29,9	3,73	39	37	8,3			8	1
41	98	0,88	2,59	28,8	3,40	40	38	8,5		1	4	3
36	90	0,76	2,64	34,9	3,29	41	38	8,2			12	4
33	80	0,97	2,92	41,4	2,84	43	38	8,3			4	
36	88	0,72	2,69	37,6	3,30	41	37	8,1			9	2
35	80	0,90	2,53	35,0	3,21	42	38	8,1			8	1
39	87	0,85	2,60	34,9	3,30	40	37	8,5		2	11	4
39	91	0,87	2,73	36,2	3,22	39	38	8,6		1	23	2
37	88	0,91	2,62	33,6	3,45	42	37	8,1			10	1
37	89	0,86	2,70	35,4	3,38	42	38	8,2			11	1
40	85	0,85	2,66	39,2	3,02	41	38	8,4			14	
43	100	0,85	2,64	31,3	3,20	41	38	8,1			12	2
36	81	0,83	2,62	40,0	3,17	40	37	8,2			6	
36	85	0,74	2,63	37,9	3,15	41	37	8,2		1	8	1
27	80	0,60	2,81	42,1	3,08	43	37	8,1		1	3	
36	85	0,84	2,65	36,9	3,16	40	37	8,2		2	11	1
42	95	0,80	2,51	32,8	3,43	41	37	8,5			6	
46	99	0,80	2,56	29,3	3,53	41	36	8,4		1	4	
40	80	0,83	2,66	33,5	3,31	39	38	8,2			9	
38	88	0,93	2,61	33,2	3,27	39	37	8,3			7	1
38	89	0,85	2,57	33,5	3,03	41	37	8,0			12	3
40	88	0,89	2,64	33,3	3,22	43	38	8,1			11	2
39	92	0,84	2,64	33,6	3,24	42	37	8,5			14	
40	91	0,88	2,59	33,3	3,18	40	37	8,1		1	12	1
35	83	0,75	2,66	39,7	3,14	41	37	8,3			12	1
35	89	0,81	2,64	34,3	3,43	40	37	8,3			12	1
37	86	0,87	2,62	35,4	3,22	40	37	8,4			8	
35	95	0,83	2,51	33,7	3,39	45	37	7,4			4	1
37	89	0,74	2,63	35,2	3,38	42	37	8,2			9	
36	85	0,77	2,72	38,7	2,98	42	37	8,3			12	
37	78	0,96	2,71	43,2	3,36	40	37	8,1		2	11	
39	81	0,80	2,60	42,6	3,17	43	36	8,1			8	
35	80	0,73	2,52	40,3	3,04	43	37	8,1			13	2
36	77	0,93	2,70	42,4	3,06	40	37	8,3		5	11	
36	87	0,85	2,71	35,0	3,41	41	37	8,3			15	
41	88	0,88	2,66	37,5	3,29	41	37	8,2		3	18	1
36	83	0,88	2,67	38,0	2,97	41	38	8,2			8	3
39	94	0,87	2,60	31,6	3,33	40	37	8,2		1	15	2
37	82	0,89	2,64	38,7	3,02	41	38	8,7			15	1
38	87	0,84	2,58	35,7	3,11	42	38	8,5			8	
40	88	0,82	2,61	33,7	3,11	42	37	8,1			9	1
35	89	0,73	2,57	34,0	3,56	41	37	8,2		7	6	1

Avler	Han nr.		Hold nr.	Antal kuld	Antal dyr v. kontrollens	
	v. øre	h. øre			beg.	slut.
E. Hedegaard Pedersen, Søstrup, Holbæk ..	28	Y831	622	4	29	28
do.	106		655	2	10	8
do.	140		656	3	9	9
Henry Petersen, Marbjerg, Hedehusene	103	0Y78	628	2	13	13
do.	128	0A12	629	1	6	5
do.	132		719	3	18	16
do.	157	842K	720	2	16	15
Werner Petersen, Uldgade 8, Tønder	863	13X1	633	3	14	13
do.	820		632	2	11	11
Erik L. Piühl, Jordrup	138-8		650	2	15	13
do.	136-8	209D	651	2	14	12
B. O. Poulsen, Ll. Bissinge, Stege	848		587	2	14	9
do.	2-3		588	2	16	14
do.	6-1	3T52	677	3	18	14
H. Schou, »Engbo«, Høed, Jyderup	832603	1Y30	666	3	20	19
do.	827001	1Y31	667	3	21	18
do.	835802		668	4	27	22
Ricard Sørensen, Nielstrup, Jerup	26		593	2	10	6
William Sørensen, Snekkerup, Slagelse	43	S379	627	1	4	4
Jens Weggersleff, Skodborg J.	97	Y717	637	2	15	14
Bourgogne:						
Jørgen Larsen, Vridsløsemagle, Tåstrup	41		713	3	16	16
Ricard Nyborg, Harpelunde	362		610	2	13	12
do.	358		611	3	17	14
Jørgen Remien, Stenlille	31		654	4	21	18
Californian:						
Peder Brink, Øster Vedsted, Ribe	200		717	3	14	14
do.	228		718	3	14	14
Blå Wiener:						
A. Stistrup Andersen, Mejlby, Arden	47	790B	640	4	18	15
Hans E. Hansen, Ladby, Næstved	9	812M	706	2	14	14
Erling Johansen, Vesterbølle, Gedsted	45		699	1	6	5
do.	15		698	2	14	14
Ove M. Nielsen, Erritsø, Fredericia	16	T797	657	4	14	13
Willy S. Nielsen, Birketved, Marslev	8-76	779B	661	4	23	13
do.	68	N042	662	4	14	7
Villy Vestergaard, Ørum Sønderlyng	847	6H86	599	2	12	10
do.	866		600	2	15	15
Jens Weggersleff, Skodborg J.	105	Y711	601	3	15	9
do.	836		602	2	13	9

Alder i dage v. kontrollens		Vægt i kg v. kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde	Fedningsgrad antal dyr i kl.			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
39	99	0,95	2,75	30,0	3,53	39	38	8,3		5	22	1
40	88	0,86	2,66	35,2	3,19	44	38	8,2			8	
39	89	0,85	2,58	34,2	3,28	41	38	8,0	1	6	1	
37	90	0,86	2,76	35,9	3,14	41	38	8,1		12	1	
36	99	0,90	2,65	28,2	3,67	41	38	8,1		3	2	
37	81	0,90	2,68	39,2	3,27	41	38	8,0		14	2	
38	84	0,96	2,63	35,4	3,29	42	37	8,0		10	4	
37	89	0,86	2,69	34,5	3,19	40	38	8,1		13		
40	98	0,88	2,65	30,2	3,51	43	37	8,0		8	3	
39	90	0,87	2,67	33,6	3,14	43	38	8,1	1	11	1	
42	87	0,86	2,61	38,2	2,97	42	37	8,1		11	1	
39	91	0,86	2,62	34,0	3,38	41	37	8,2		7	2	
37	89	0,89	2,73	36,5	3,01	41	38	8,4		9	5	
34	80	0,74	2,52	36,9	3,17	42	37	8,2		8		
40	93	0,74	2,69	37,1	3,18	42	37	8,3		13	2	
36	89	0,75	2,65	36,2	3,17	42	37	8,3	3	14	1	
36	87	0,77	2,69	36,8	3,07	41	38	8,4		19	2	
45	88	1,16	2,62	35,3	3,15	40	37	8,2		5		
37	99	0,87	2,68	29,5	3,35	39	38	8,1		4		
42	91	0,90	2,67	35,4	3,02	41	38	8,1	1	12	1	
34	78	0,86	2,58	39,0	3,18	41	38	8,0			14	2
41	86	1,03	2,67	35,7	3,09	42	38	8,2	2	10		
41	91	0,91	2,69	32,8	3,44	40	38	8,3	1	13		
41	90	0,89	2,60	35,6	3,03	41	38	8,3	1	14		
34	79	0,90	2,58	37,4	3,36	42	37	8,0			10	3
35	84	0,94	2,59	33,8	3,54	42	37	7,8			12	2
40	91	0,91	2,77	35,3	3,19	40	39	8,5	1	11	1	
36	88	0,89	2,90	38,8	3,23	40	39	8,3	1	13		
36	90	0,86	2,84	35,7	3,43	40	39	8,6		5		
35	87	0,84	2,96	40,7	2,99	41	38	8,5		14		
40	92	0,98	2,92	37,1	3,01	42	39	8,3		8	5	
39	89	0,87	2,76	36,3	3,09	43	38	8,1		10	3	
36	105	0,73	2,78	31,6	3,33	41	39	8,3		5	2	
43	96	1,00	2,79	33,0	3,31	38	38	8,6		9	1	
41	98	0,95	2,86	33,6	3,14	41	39	8,4		12	2	
40	101	0,92	2,89	34,2	3,41	39	38	8,7	1	7	1	
43	95	0,91	2,75	36,3	3,33	42	38	8,3		5	2	

Avler	Han nr.		Hold nr.	Antal kuld	Antal dyr v. kontrollens	
	v. øre	h. øre			beg.	slut.
Hvid Wiener:						
Arne Christensen, »Bakken«, Ryomgaard ..	68-20	6V46	658	3	17	15
Knud E. Hansen, Frøslev, St. Heddinge	81		615	1	4	4
Stor Chinchilla:						
Ejler Nielsen, Hellestrup, Holbæk	41	Y814	631	4	17	16
Stor sølv:						
H. Krag Jensen, Solbakkevej 29, Frederiksh.	89		591	2	9	9
H. C. Kofoed, Helligkorsvej 8, Roskilde	819		595	2	13	9
Egon Pedersen, Næsby, Glumsø	805	Y920	625	2	12	11
Jørgen Valentin, Svinget 47, Tønder	8313	S361	605	3	17	16
do.	839	81X1	641	2	16	13
Fransk Vædder:						
Victor L. Andersen, Fårdrup, Slagelse	1603	Y846	708	2	15	15
Jørgen Geert, Nørreballe	83-3	552F	679	1	4	4
do.	496	N131	680	5	20	19
do.	486	721F	681	2	13	13
do.	31	924M	682	2	13	13
do.	502	923M	700	2	16	15
Hans E. Hansen, Ladby, Næstved	805	3T44	694	3	18	18
do.	705	18X5	695	3	18	18
do.	707	15X5	707	2	15	15
Holger Hansen, St. Salby, Køge	110	866M	607	4	18	13
do.	38	T469	608	3	18	17
Børge Jensen, Pederstrup, Kjellerup	755	6V42	659	4	19	10
H. G. Jensen, Smerupgaard, Karise	7216	3T43	710	2	15	15
do.	5901		709	2	15	15
Børge Jespersen, Lundby, Skælskør	9320	Y856	665	3	13	13
I. Bjørklund Johansen, Rønnede	920		701	2	16	16
do.	702		702	2	16	16
Henry Larsen, Våbensted, Saksøbing	8326	953M	612	3	18	13
P. Vang Larsen, »Vanggaard«, Højby S. ..	0011	T464	594	3	14	10
do.	9914	562K	630	3	16	16
do.	6702	21X5	716	3	18	18
Ole Nielsen, Ø. Skovby, Dannemare	5		652	3	13	12
do.	54	557F	653	2	10	9
Henry Pedersen, Bedsted, Kværkeby	8-46	0Y99	660	4	20	10
do.	01-9	0Y98	671	3	16	12
U. Petersen, Vangede Byg. 118, Gentofte ..	621		691	3	19	17
Knud Rasmussen, Vesterv. 44, Holeby	500	942M	669	2	8	8
Hans Chr. Skøtt, Vinkelvej 4, Gilleleje	148	N160	687	3	14	14
Hans Stage, Københavnsv. 490, Vordingborg	021	2T31	674	3	16	10

Alder i dage v. kontrollens		Vægt i kg v. kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. c. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde	Fædtningsgrad antal dyr i kl.			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
38	83	0,90	2,70	39,2	2,95	44	38	8,0		3	10	2
33	75	0,96	2,61	39,2	3,28	44	38	8,3			4	
35	85	1,02	2,97	38,7	3,07	41	39	8,5		1	13	2
38	83	0,88	2,77	42,6	2,91	41	39	8,3			7	1
39	85	1,05	2,81	35,7	3,45	40	39	8,3		1	6	1
39	87	0,98	2,91	38,4	3,33	42	39	8,2		1	8	2
38	88	0,93	2,94	39,9	3,08	39	39	8,6			13	3
41	89	0,93	2,87	40,1	2,93	40	39	8,2			11	1
37	83	1,03	3,07	43,8	3,36	41	39	8,2		3	11	
33	84	1,00	3,07	41,1	3,34	41	39	8,3		3	1	
37	89	0,91	3,06	41,7	3,18	41	39	8,7		2	15	1
35	85	0,82	3,06	45,1	2,95	42	38	8,6		1	11	1
37	87	0,93	3,00	41,2	3,26	42	39	8,4		2	9	1
37	83	0,91	3,09	47,2	3,06	42	39	8,6	2	5	7	
37	84	0,89	3,11	46,8	2,92	42	38	8,4		2	15	1
36	89	0,88	3,04	40,8	3,26	40	38	8,6		9	9	
36	83	0,98	3,03	44,6	3,16	40	39	8,6			14	
38	82	1,02	2,95	42,7	3,15	43	38	8,7			10	
44	96	1,12	3,09	37,6	3,16	41	40	8,3		1	15	1
37	87	0,94	3,01	40,7	2,96	42	39	8,5		2	7	1
35	79	0,95	3,17	50,1	2,94	42	39	8,3		2	13	
34	91	0,91	3,00	36,7	3,47	41	40	8,3			12	2
38	105	0,85	3,10	33,4	3,54	41	39	8,4		1	12	
35	88	0,92	3,10	41,0	3,19	40	39	8,5		1	15	
36	94	0,88	3,06	37,8	3,28	41	39	8,2		6	10	
39	85	1,08	3,01	42,5	3,24	41	39	8,5			12	
41	86	1,08	3,14	43,2	2,97	40	39	8,7		1	8	1
40	101	1,02	3,04	33,4	3,24	40	40	8,5		1	15	
35	87	0,87	3,15	43,3	3,16	42	39	8,4		3	14	1
39	86	1,00	3,03	43,4	3,06	42	39	8,5			8	2
40	85	0,98	2,86	39,8	3,18	43	39	8,2		1	6	
41	92	1,02	2,92	36,2	3,00	42	38	8,1			9	1
36	84	0,91	2,95	42,2	3,11	42	39	8,5		1	9	1
38	88	0,95	3,01	38,7	3,55	41	38	8,3		5	11	1
34	78	0,99	3,25	51,8	2,90	44	39	8,8		3	5	
34	85	0,89	3,16	44,5	3,26	42	40	8,5		7	6	
36	90	0,84	3,04	41,0	3,12	41	39	8,6			9	

Avler	Han nr.		Hold nr.	Antal kuld	Antal dyr v. kontrollens	
	v. øre	h. øre			beg.	slut.
Carl Aage Sørensen, Snekker, Slagelse	9323	5V85	623	3	17	17
do.	257		626	3	16	12
do.	6723	5V88	624	3	18	18
do.	3903	0Y97	664	3	14	9

Tysk Kæmpehecke:

Arne P. Johansen, Krogager, Grindsted	935	S727	690	2	10	10
--	-----	------	-----	---	----	----

Belgisk Kæmpe:

Jørn Jensen, Tostrup, Stege	143	T749	609	3	17	13
Mary Larsen, Mannerup, Roskilde	48	0Y71	619	3	12	8
Kaj P. Nielsen, Valby, Helsingør	33-8		616	3	16	13
H. Pedersen, Hovangsvej 53, Hobro	64	0Y61	638	3	12	12
do.	50	7X98	639	4	19	12
Jens E. Thygesen, Møllerup, Randers	1		647	4	18	12
do.	3	7X99	648	2	10	6
do.	22		649	4	15	9
do.	6	57X8	711	2	14	13
do.	29	54X8	712	2	15	15
Børge Toft, Vestergade, Vemb	186		714	3	16	16
do.	187		715	1	8	8

Gennemsnit for Hvid Land	63	hold		2,4	14,5	12,6
» » Bourgogne	4	»		3,0	16,8	15,0
» » Californian	2	»		3,0	14,0	14,0
» » Blå Wiener	11	»		2,7	14,4	11,3
» » Hvid Wiener	2	»		2,0	10,5	9,5
» » Stor Chinchilla	1	»		4,0	17,0	16,0
» » Stor Sølv	5	»		2,2	13,4	11,6
» » Fransk Vædder	33	»		2,8	15,4	13,6
» » Tysk Kæmpeshecke	1	»		2,0	10,0	10,0
» » Belgisk Kæmpe	12	»		2,8	14,3	11,4

Hovedtabel 2. Kødkaniner 1970-71.**Hvid Land:**

Henning Andersen, »Engbo«, Høed, Jyderup	935801	N565	826	4	27	18
do.	239		827	2	15	10
S. Andersen, Smedestræde 2, Nysted	279	07Y48	840	3	15	12
Victor Andersen, Fårdrup, Slagelse	4701		821	2	13	11
Kim Bjerregård, Ravnstrup, Viborg	95-9	3A79	763	2	7	5
Egon Carstens, Aalborgvej 113, Viborg	5	027S	773	4	21	18

Alder i dage v. kontrollens		Vægt i kg v. kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagteevind	Kroplængde cm	Points for kødfyde	Fodningsgrad antal dyr i kl.			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
37	93	1,08	3,12	36,8	3,22	40	40	8,5		1	15	
35	90	1,00	3,05	36,9	3,19	40	39	8,7		2	9	1
40	99	1,05	3,04	33,7	3,54	40	40	8,4		1	15	1
37	90	0,93	3,12	40,7	3,38	43	40	8,6		1	7	
35	90	0,90	3,13	40,8	3,33	41	40	8,4			9	1
40	88	1,10	3,24	44,2	3,39	40	40	8,9		2	11	
39	85	1,10	3,13	40,0	3,29	44	41	8,4			8	
45	95	1,08	3,17	40,3	3,07	41	41	8,6		1	11	1
38	82	1,10	3,11	46,5	2,80	42	41	8,4			8	2
39	85	1,04	3,02	40,3	2,95	41	41	8,2			10	1
40	91	1,06	3,17	42,5	3,02	40	39	8,5			12	
41	92	1,03	3,26	42,5	2,91	41	41	8,6			6	
41	89	1,09	3,07	39,6	3,04	44	40	8,1			5	3
38	83	0,98	3,15	47,1	3,48	41	40	8,3			12	1
37	84	0,98	3,30	49,2	3,10	43	40	8,3			14	1
35	84	1,03	3,20	44,9	3,32	42	40	8,4			16	
34	83	1,03	3,21	44,7	3,45	43	41	8,3		2	6	
38	88	0,85	2,64	35,5	3,24	41,1	37,4	8,2				
39	86	0,92	2,64	35,8	3,19	41,0	38,0	8,2				
35	82	0,92	2,59	35,6	3,45	42,0	37,0	7,9				
39	94	0,90	2,84	35,7	3,22	40,6	38,5	8,4				
36	79	0,93	2,66	39,2	3,12	44,0	38,0	8,2				
35	85	1,02	2,97	38,7	3,07	41,0	39,0	8,5				
39	86	0,95	2,86	39,3	3,14	40,4	39,0	8,3				
37	88	0,96	3,06	41,2	3,19	41,4	39,0	8,5				
35	90	0,90	3,13	40,8	3,33	41,0	40,0	8,4				
39	87	1,05	3,17	43,5	3,15	41,8	40,0	8,4				
36	84	0,70	2,54	37,6	2,84	42	37	8,1			11	4
37	90	0,69	2,55	34,8	3,08	42	37	8,1		1	6	
35	92	0,76	2,67	34,6	3,03	43	36	8,2			12	
35	89	0,70	2,56	35,0	2,87	41	37	8,2		1	4	
36	93	0,75	2,60	31,1	3,25	40	37	8,2			5	
36	89	0,73	2,61	33,9	2,84	41	37	8,3			18	

Avler	Han nr.		Hold nr.	Antal kuld	Antal dyr v. kontrollens	
	v. øre	h. øre			beg.	slut.
N. E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	6	7T17	774	4	19	19
do.	9-140	11H3	775	2	12	11
Flemming K. Hansen, Okslund, Brørup	08-166	335D	735	3	13	8
Hans E. Hansen, Ladby, Næstved	9-133	94X4	784	2	11	7
Knud E. Hansen, Frøslev, St. Heddinge	902	5T71	728	2	16	13
do.	915	5T72	729	2	16	15
do.	920		730	2	13	11
Chresten Jensen, Overeven, Snesere	9083	03T0	766	3	14	14
do.	389	9T98	767	3	13	10
Knud Jørgensen, Varpelev, Klippinge	456		744	3	18	4
do.	454		745	3	16	9
do.	489	13T2	811	2	9	5
do.	038		835	3	15	7
do.	024		836	3	20	13
Charles Klüver, Valløesgade 33, Vejle	605	95X6	748	3	15	13
do.	805		830	3	22	19
do.	442		831	3	19	12
do.	1041		832	3	20	14
do.	1619		833	2	15	14
Jan Larsen, Ørslev, Slagelse	146	6Y80	822	3	23	19
Poul Anker Larsen, Skottemarke, Holeby ..	28	4T36	760	1	2	2
do.	17	4T39	815	2	15	9
do.	76	7Y50	838	3	18	14
Poul Kølbæk Larsen, »Højvang«, Asnæs ..	657	7T08	794	3	15	14
Helge Mortensen, Nagelsti, Nykøbing F. ..	213	737F	776	3	13	11
do.	214	738F	777	2	10	9
Eira P. Nielsen, Valby, Helsingør	33-9	2A84	721	1	7	7
do.	62-9	6Y59	757	1	7	4
do.	27-9	N488	806	2	11	7
Johannes Nielsen, Højrup, Taulov	38	365D	819	3	17	14
do.	39	5Y71	820	3	18	16
E. Hedegård Pedersen, Søstrup, Holbæk	113		738	1	7	5
do.	153		739	3	22	19
do.	210		740	2	12	11
Erlang Pedersen, Vorde, Løgstrup	118	55X4	759	3	15	13
H. Pedersen, Thoustrup Hougårdsv. 3, Hobro	11	841F	746	2	15	8
Henry Petersen, Marbjerg, Hedehusene	33	21T1	795	1	7	4
Erik L. Piühl, Jordrup	230-9		733	2	15	12
do.	202-9	1Y87	734	2	14	11
do.	341-0		842	2	14	11
do.	288-0	329S	843	3	15	7
B. O. Poulsen, Ll. Bissinge, Stege	106	4T33	752	2	14	7
do.	50	4T34	753	1	8	8
do.	8105	4T35	754	4	15	9

Alder i dage v. kontrollens		Vægt i kg v. kontrollens		Gram daglig tilvækst	F.e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfyldte	Fedningsgrad antal dyr i kl.			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
36	90	0,72	2,59	34,8	2,87	41	37	8,2		1	18	
37	87	0,78	2,64	35,2	3,00	41	37	8,2		2	9	
36	90	0,81	2,66	33,2	3,20	40	38	8,2			8	
36	88	0,72	2,61	32,0	2,95	42	37	8,3			5	1
38	89	0,87	2,60	33,2	3,33	43	38	7,9			10	2
37	93	0,86	2,66	32,2	3,50	41	37	8,4	2		13	
36	89	0,80	2,60	33,3	3,41	41	37	8,3			9	2
35	84	0,82	2,57	35,3	2,85	39	38	8,1			12	2
40	88	0,82	2,59	34,2	2,96	41	37	8,2			10	
35	85	0,88	2,73	37,9	3,04	41	38	8,1			4	
36	85	0,84	2,62	36,0	3,17	41	38	8,0			8	1
40	87	0,83	2,51	31,6	3,00	43	36	7,9			4	1
34	86	0,72	2,66	37,1	3,19	42	37	8,2	3		4	
34	86	0,67	2,51	34,7	3,09	43	37	8,0			10	3
34	85	0,85	2,68	36,0	3,09	41	38	8,3			13	
35	77	0,77	2,52	40,9	2,81	44	37	8,0			15	1
35	81	0,80	2,56	36,1	3,36	41	37	8,1	1		6	1
35	81	0,80	2,47	35,0	3,14	41	37	8,3			8	
34	80	0,76	2,54	39,0	2,85	43	37	8,1	1		13	
35	89	0,71	2,60	34,8	3,15	41	37	8,3	3		10	
26	73	0,76	2,40	34,9	2,86	43	37	8,1			2	
39	91	0,64	2,50	34,2	2,94	42	36	8,0			8	1
35	85	0,81	2,59	33,7	3,08	41	37	8,3			14	
32	91	0,62	2,70	34,6	3,14	42	38	8,2			12	1
36	89	0,76	2,49	31,5	3,09	42	37	8,0			11	
35	91	0,79	2,67	33,4	3,22	40	37	8,2	1		7	
36	85	0,84	2,60	36,4	3,56	42	37	8,2			6	1
33	87	0,71	2,51	30,6	3,25	40	37	8,0			4	
35	86	0,89	2,68	33,9	3,41	41	37	8,1			6	
37	87	0,81	2,55	34,7	3,03	42	37	8,1			10	1
37	99	0,66	2,59	31,0	3,33	42	37	8,1	2		11	1
37	84	1,01	2,54	32,9	2,96	44	37	8,0	1		2	1
36	88	0,78	2,64	34,4	3,16	41	37	8,3	3		16	
36	91	0,85	2,68	33,5	3,25	42	37	8,2			11	
39	80	0,83	2,52	40,9	3,01	43	36	8,3			13	
33	90	0,70	2,54	31,0	3,22	39	37	8,2			8	
30	88	0,57	2,50	32,7	3,41	42	37	8,2			2	
34	83	0,79	2,62	36,7	3,27	44	38	7,8	1		8	3
35	85	0,83	2,54	34,8	3,06	41	37	8,0			10	1
35	90	0,75	2,51	31,4	3,17	43	36	8,4	1		9	1
35	91	0,69	2,54	32,1	3,16	43	38	7,8			5	1
37	87	0,86	2,64	31,3	3,51	42	37	8,0			6	1
36	91	0,78	2,63	33,7	3,03	40	37	8,4			8	
39	93	0,86	2,64	35,3	3,09	40	37	8,4			8	1

Avler	Han nr.		Hold nr.	Antal kuld	Antal dyr v. kontrollens	
	v. øre	h. øre			beg.	slut.
Viggo Rasmussen, Energivej 17, Randers ..	56-9	078X4	788	1	4	4
Hans Arly Toftegård, Nørup, Regstrup	83	Y819	724	2	16	15
do.	8-17	N153	725	3	20	15
do.	24-9	03H3	793	2	10	9
Jens Weggersleff, Skodborg J.	9	667K	736	2	16	14
do.	76		737	1	8	7
do.	76	7Y13	829	2	11	10
Bourgogne:						
Richard Nyborg, Gimlinge, Slagelse	458		731	1	3	2
do.	457		732	2	15	15
do.	4		743	1	2	2
Californian:						
Johanne Balle, Mørup, Herning	117	U263	803	2	13	10
do.	117	7Y24	801	2	11	6
do.	64	U274	802	4	15	5
Peder Brink, Ø. Vedsted, Ribe	121	494D	818	4	25	23
Blå Wiener:						
Hans E. Hansen, Ladby, Næstved	91	4A55	796	3	16	11
do.	9614	U417	797	4	32	25
Ove M. Nielsen, Erritsø, Fredericia	42	141S	789	3	19	17
do.	70	724D	790	4	22	22
Willy S. Nielsen, Birketved, Marslev	2	3A21	800	3	15	14
Villy Vestergård, Ørum Sønderlyng	885	68X4	749	1	8	6
do.	890	69X4	750	2	15	11
do.	859	6V65	751	3	18	10
Stor Chinchilla:						
Sv. Aage Hansen, Ll. Grandløse, Holbæk ..	12		727	2	16	13
Ejler Nielsen, Hellestrup, Holbæk	99-68	N152	723	2	12	12
do.	1	N533	828	1	4	3
Stor Sølv:						
H. Jensen, Knud Olsensg. 17, Nørre-Alslev	814	959M	779	3	17	14
H. C. Kofoed, Helligkorsv. 8, Roskilde	933		768	3	17	17
do.	937		769	3	13	12
do.	930	829K	770	1	7	6
Knud Raben, Skovby, Aabenraa	1	45X9	758	2	13	11
do.	17		847	3	23	18
J. Valentin, Svinget 47, Tønder	14	48X9	741	3	15	14
do.	975	49X9	742	2	14	14

Alder i dage v. kontrollens		Vægt i kg v. kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfyldte	Fedningsgrad antal dyr i kl.			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
34	83	0,80	2,59	36,7	2,83	41	37	8,5			4	
36	84	0,86	2,65	36,4	3,35	41	38	8,1			14	1
36	85	0,82	2,61	35,5	3,11	43	38	8,1			11	3
39	100	0,66	2,68	32,2	3,43	40	38	8,3			8	1
36	90	0,82	2,65	33,5	3,29	42	37	8,2		2	10	2
42	110	0,73	2,68	29,0	3,71	40	38	8,2		3	4	
40	82	1,02	2,50	33,1	3,48	42	37	8,0		1	8	
38	82	0,96	2,53	35,8	3,06	43	36	8,3			1	
37	84	0,89	2,65	37,4	2,79	43	38	8,1		1	10	4
29	70	0,83	2,71	45,8	2,66	43	37	8,3			1	
36	80	0,86	2,62	38,5	2,96	43	37	8,1		2	8	
35	85	0,69	2,63	37,1	3,17	42	38	8,0			6	
35	86	0,74	2,49	33,5	3,34	43	37	7,5			4	1
37	90	0,73	2,57	34,1	2,96	42	37	8,3		5	18	
36	90	0,75	2,74	35,2	3,25	41	38	8,4			11	
35	101	0,63	2,76	32,2	3,18	43	37	8,3		2	20	2
36	98	0,72	2,88	34,6	3,05	42	38	8,3			9	1
35	95	0,81	2,91	35,2	3,13	40	39	8,7			16	
35	94	0,74	2,90	35,9	3,12	44	38	8,1		2	9	1
39	103	0,81	2,98	32,6	3,32	40	39	8,5			6	
35	93	0,82	2,96	37,5	2,90	40	39	8,4			11	
36	98	0,84	2,96	34,3	3,27	40	39	8,6		1	9	
34	83	0,85	2,84	41,0	3,14	42	38	8,2		6	7	
36	85	0,96	2,86	38,5	3,52	41	39	8,2		1	9	2
38	87	1,01	2,88	36,7	3,22	43	37	8,4			3	
38	94	0,78	2,72	34,0	3,21	41	38	8,2		1	10	
34	86	0,81	2,98	42,0	2,76	41	39	8,5			17	
38	96	0,72	2,80	34,2	2,73	42	39	8,1			12	
34	95	0,75	2,76	32,7	3,12	40	38	8,1			6	
36	93	0,79	2,88	36,2	3,18	42	39	8,4			11	
36	91	0,81	2,75	35,1	2,94	41	38	8,3		3	13	2
36	88	0,96	2,87	36,5	3,12	42	39	8,3			12	1
35	90	0,75	2,98	40,9	3,05	40	39	8,4		2	12	

Avler	Han nr.		Hold nr.	Antal kuld	Antal dyr v. kontrollens	
	v. øre	h. øre			beg.	slut.
Fransk Vædder:						
Villy Andersen, Errindlev	135		839	3	13	9
Arne Engen, Holtet, Bindslev	540	S996	787	4	24	23
Jørgen Geert, Nørreballe	571	4T01	781	3	14	9
do.	9319	925M	782	4	15	14
Hans E. Hansen, Ladby, Næstved	012	9V13	783	3	17	17
Holger Hansen, St. Tårnby, Vallø	99	51T2	809	2	9	4
do.	100	50T2	810	4	23	11
Sv. Aage Hansen, Ll. Grandløse, Holbæk ..	9038	6T89	726	3	13	8
Børge Jensen, Pederstrup, Kjellerup	263	N277	814	4	19	8
do.	9529	9V59	813	4	28	12
H. Jensen, Knud Olsensg. 17, Nørre-Alslev	6	707F	780	4	20	20
H. G. Jensen, Smerupgård, Karise	59	58T2	834	1	5	4
I. Bjørklund Johansen, Rønnede	928	23T2	792	4	13	12
do.	092	9T83	791	2	14	11
Henry Larsen, Våbensted, Sakskøbing	2	5T77	762	2	14	14
Poul Vang Larsen, »Vanggård«, Højby Sj. ..	9933	19X5	778	3	17	15
Malthe Laursen, Bjødstrup, Hammerum	281	9V62	764	2	9	7
do.	01-2		805	2	15	9
Ole Nielsen, Ø. Skovby, Dannemare	8	703F	761	2	13	13
Ove Nielsen, Balstrupv. 123, Ringsted	004-1		837	3	13	10
Henry Pedersen, Bedsted, Ringsted	9-28	30T2	816	3	22	14
Svend Pedersen, Halling, Randers	081	647D	799	4	26	15
Ulrik Petersen, Spanager, Ll. Skensved	460	8T51	823	2	11	7
do.	66-1		824	3	24	13
do.	461	883K	825	3	18	10
Albert Pietens, St. Linde Mose, Karise	402		808	2	14	6
do.	591	4T13	807	3	22	13
H. Chr. Skøtt, Vinkelvej 4, Gilleleje	30	2A82	804	2	15	6
do.	568	722K	817	3	12	10
Carl Aa. Sørensen, Snekkerup, Slagelse	6732		785	4	14	10
do.	9903	660D	786	3	15	13
do.	8607		844	3	18	12
do.	9350		845	3	18	17
do.	9352		846	3	21	15

Tysk Kæmpeschecke:

A. P. Johansen, Krogager, Grindsted	123		798	3	20	18
---	-----	--	-----	---	----	----

Belgisk Kæmpe:

Poul Eriksen, Frederiksalles, Rødkærsbro ..	7	97X7	772	3	13	11
do.	36	92X7	771	3	14	13
Jørn Jensen, Thostrup, Stege	241	9T62	765	3	16	15
Mary Larsen, Mannerup, Roskilde	75-9		756	3	16	14

Alder i dage v. kontrollens		Vægt i kg v. kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde	Fedningsgrad antal dyr i kl.			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
35	86	0,90	3,05	39,9	3,00	42	38	8,6			9	
35	101	0,75	3,00	34,5	3,18	39	39	8,7	2	21		
36	93	0,90	2,99	36,4	3,07	41	39	8,5	2	7		
36	93	0,86	2,90	36,0	2,96	43	39	8,3	2	11		
38	92	0,84	2,92	38,7	3,12	41	38	8,4	3	14		
35	87	0,91	3,06	37,6	2,98	43	38	8,1		3		1
36	88	0,84	3,02	39,7	3,18	42	39	8,4		10		
35	88	0,91	3,01	39,8	3,10	41	38	8,4	1	6		1
35	82	0,93	2,88	39,7	2,83	43	38	8,3		7		
35	89	0,74	2,61	36,5	2,80	43	39	8,3		10		
37	92	0,84	3,01	39,1	2,97	42	39	8,3		20		
34	78	1,00	3,01	45,2	2,92	42	39	8,2		4		
36	91	0,94	3,04	37,5	3,05	41	39	8,4	1	11		
36	98	0,80	3,05	36,0	3,23	42	38	8,5	2	9		
39	97	0,90	3,09	37,9	2,88	41	39	8,7	2	12		
34	91	0,74	2,88	37,2	3,17	41	38	8,5	5	10		
35	89	0,97	3,08	40,0	2,96	40	39	8,7	1	6		
35	89	0,76	3,00	40,3	2,83	44	38	8,3	1	7		
35	92	0,93	3,18	40,2	2,95	41	39	8,9	1	2	9	1
35	86	0,87	2,96	37,9	3,20	42	39	8,7	2	8		
35	98	0,74	2,94	34,9	3,00	40	39	8,5		13		
35	93	0,75	3,00	36,4	3,11	43	38	8,4	2	10		1
35	81	0,95	2,97	44,8	3,09	44	39	8,5		7		
36	85	0,88	2,95	39,8	2,92	42	39	8,3	1	11		
36	81	0,87	2,99	41,7	2,97	43	39	8,2	1	7		2
33	82	0,71	2,67	36,5	2,73	47	38	7,6		4		
34	91	0,76	2,94	37,3	3,35	43	39	8,3	1	10		1
36	97	0,81	3,03	36,4	3,28	44	39	8,2		5		
38	93	0,81	2,96	38,7	3,07	41	38	8,6	1	9		
37	97	0,87	3,08	36,7	3,08	41	38	8,4	1	9		
37	100	0,75	3,07	36,0	3,27	40	39	8,5		12		1
37	88	0,95	2,78	34,6	3,05	43	38	8,1		9		2
38	81	1,13	2,78	38,0	3,15	42	38	8,1		12		4
37	82	0,98	2,69	36,3	2,94	42	38	8,1		9		1
36	100	0,74	3,11	36,7	3,11	45	40	8,1		15		3
36	86	0,97	3,16	44,3	2,75	42	41	8,5		10		1
36	94	0,86	3,05	37,9	2,97	41	40	8,3		12		1
37	97	0,93	3,19	36,5	3,20	41	41	8,5	1	14		
36	89	0,94	3,13	41,2	2,98	41	40	8,6	2	11		1

Avler	Han nr.		Hold nr.	Antal kuld	kontrollens Antal dyr v.	
	v. øre	h. øre			beg.	slut.
Kaj P. Nielsen, Valby, Helsingør	39-9		722	3	18	18
do.	34-9	6Y44	755	2	12	8
Richardt Nielsen, Nørretoft 8, Ribe	53	7Y02	812	3	12	9
H. Pedersen, Thoustr. Hougårdsv. 3, Hobro	75		747	2	12	6
Gennemsnit for Hvid Land	57	hold		2,4	14,2	10,8
» » Bourgogne	3	»		1,3	6,7	6,3
» » Californian	4	»		3,0	16,0	11,0
» » Blå Wiener	8	»		2,9	18,1	14,5
» » Stor Chinchilla	3	»		1,7	10,7	9,3
» » Stor Sølv	8	»		2,5	14,9	13,3
» » Fransk Vædder	34	»		2,9	16,4	11,5
» » Tysk Kæmpeshecke	1	»		3,0	20,0	18,0
» » Belgisk Kæmpe	8	»		2,8	14,1	11,8

Hovedtabel 3. Kødkaniner 1971-72.

Hvid Land:

Egon Carstens, Aalborgvej 113, Viborg	732	3U48	924	2	13	9
do.	0-223	51H4	925	4	21	19
do.	104		926	3	14	11
Harry Christensen, Egedevej 43 A, Fakse	024	8Y14	878	3	16	14
Niels E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	70-10	9Y70	893	2	11	7
do.	70-34	Æ014	894	2	11	7
do.	70-57	Æ013	895	3	13	12
F. O. Hansen, Gl. Sunds, Sunds	432	U856	887	2	16	8
do.	431	763S	888	1	5	4
Hans E. Hansen, Ladby, Næstved	9110	62T2	906	3	19	16
Knud E. Hansen, Frøslev, St. Heddinge	022	N699	889	2	12	6
do.	130	7A59	944	2	14	11
do.	602	99X5	945	1	6	4
Herluf Jensen, »Trekroner«, Bindslev	121-9	U536	918	3	6	5
do.	012	U958	919	3	11	9
Knud Jørgensen, Varpelev, Klippinge	073		860	3	15	10
do.	084		861	3	19	18
do.	69	22T9	910	2	9	8
do.	0101	23T9	911	4	19	17
do.	100		946	3	10	8
do.	101		947	1	6	6

Alder i dage v. kontrollens		Vægt i kg v. kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfyld	Fedningsgrad antal dyr i kl.			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
35	85	0,86	3,10	45,2	3,13	42	40	8,3			14	4
35	88	0,91	3,18	39,9	3,02	42	40	8,6			8	
34	81	1,05	3,25	44,7	2,87	42	41	8,6		1	7	
35	92	0,83	3,18	40,2	3,10	40	41	8,5			6	
36	88	0,78	2,59	34,3	3,15	41,6	37,1	8,2				
35	79	0,89	2,63	39,7	2,84	43,0	37,0	8,2				
36	85	0,76	2,58	35,8	3,11	42,5	37,2	8,0				
36	97	0,77	2,89	34,7	3,15	41,5	38,4	8,4				
36	85	0,94	2,86	38,7	3,29	42,0	38,0	8,3				
36	92	0,80	2,84	36,5	3,01	41,1	38,6	8,3				
36	90	0,86	2,96	38,2	3,04	42,0	38,6	8,4				
36	100	0,74	3,11	36,7	3,11	45,0	40,0	8,1				
36	89	0,92	3,16	41,2	3,00	41,4	40,5	8,5				
35	89	0,62	2,61	33,7	2,42	42	37	8,1			9	
35	89	0,72	2,55	33,9	2,75	42	36	8,2			17	
37	87	0,61	2,53	35,7	2,66	40	36	8,3			11	
33	95	0,59	2,63	32,5	2,78	40	37	8,1			12	
37	91	0,72	2,60	32,9	2,90	39	37	8,3		2	5	
39	93	0,75	2,49	30,9	2,86	42	37	8,0			6	1
35	88	0,72	2,52	33,3	2,42	40	37	8,1			12	
37	95	0,74	2,50	30,5	2,33	41	38	8,0		1	7	
37	89	0,88	2,45	31,2	2,64	39	37	7,8			2	2
36	99	0,67	2,53	28,8	2,75	41	37	8,2		2	13	
36	92	0,68	2,48	30,4	2,68	42	36	7,8			5	
34	88	0,65	2,60	35,4	2,56	41	37	8,1			10	1
31	89	0,65	2,55	32,0	2,74	39	38	8,1			4	
38	97	0,73	2,69	31,4	2,93	44	38	8,2			5	
34	95	0,72	2,50	28,6	2,72	43	38	7,8			9	
35	83	0,70	2,54	35,1	2,84	41	38	8,2			10	
36	88	0,74	2,54	33,9	2,80	41	38	8,3			15	2
37	97	0,66	2,56	31,6	2,53	42	37	8,4		1	7	
37	100	0,61	2,55	30,9	2,85	42	37	8,2		2	15	
33	83	0,67	2,54	36,0	2,58	39	38	8,0			5	2
36	81	0,83	2,52	37,8	2,65	38	38	8,1			6	

Avler	Han nr.		Hold nr.	Antal kuld	Antal dyr v. kontrollens	
	v. øre	h. øre			beg.	slut.
Charles Klüver, Valløesgade 33, Vejle	307		940	3	16	16
do.	601		941	1	5	5
do.	1077		942	2	9	7
Poul Anker Larsen, Skottemarke, Holeby ..	8	37Y2	869	3	19	17
do.	70	37T9	938	2	12	11
do.	63		939	2	11	9
Kirsten Madsen, Tune Hede, Hedehusene ..	25	0N13	920	2	6	6
Finn S. Mogensen, Valore, Viby Sj.	0915		921	3	10	8
do.	0703		922	4	18	18
Helge Mortensen, Nagelsti, Nykøbing F. ..	349		896	2	10	8
Bent Nielsen, Falkevej 30, Brønderslev	36	036S	951	4	25	18
Eira P. Nielsen, Valby, Helsingør	18-0	N992	864	3	14	10
do.	12-0	N998	865	3	18	14
Michael Olsen, Alholmsp. 6, Hillerød	6		848	3	18	14
do.	470	8Y47	852	2	8	6
E. Hedegård Pedersen, Søstrup, Holbæk ..	268	9Y55	879	2	10	10
do.	366		880	2	11	10
do.	8		950	1	6	6
Kirsten Petersen, Spanager, Ll. Skensved ..	123	N690	933	3	19	19
Erik L. Piühl, Jordrup	345-0	944D	900	2	15	5
do.	385-0		901	4	15	9
do.	431-1		948	2	11	7
B. O. Poulsen, Ll. Bissinge, Stege	7140	7A30	871	1	7	5
do.	7116	39T4	872	2	12	12
Richard Sørensen, Nielstrup, Jerup	076	687S	881	4	18	17
Jens Weggersleff, Skodborg J.	82	959S	915	4	18	17
do.	127	4U23	916	2	9	6
Bourgogne:						
Jørgen Larsen, Vridsløsemagle, Tåstrup ..	90	8Y34	885	1	7	6
Richard Nyborg, Gimlinge, Slagelse	509	30Y0	855	3	21	13
do.	530		867	3	18	16
do.	531		868	3	18	16
Søren H. Olsen, Ndr. Banevej 15, Hillerød ..	70-9	27K0	851	4	16	8
Californian:						
Peder Brink, Ø. Vedsted, Ribe	291		954	4	16	11
do.	310	5U44	955	4	15	9
do.	506		956	4	17	12
do.	507		957	3	19	15
Blå Wiener:						
Hans E. Hansen, Ladby, Næstved	672	7Y87	908	3	17	14
Erling Johansen, Vesterbølle, Gedsted	42	534S	858	4	20	13
do.	73		859	3	16	16

Alder i dage v. kontrollens		Vægt i kg v. kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfyde	Fodningsgrad antal dyr i kl.			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
36	80	0,85	2,60	39,1	2,63	40	37	8,4		2	14	
38	79	0,90	2,59	40,7	2,61	39	37	8,0		1	4	
36	84	0,85	2,59	34,8	2,90	40	37	8,3			7	
35	83	0,74	2,56	36,6	2,64	42	37	8,4			17	
37	82	0,85	2,66	37,6	2,57	40	37	8,3			11	
34	87	0,62	2,59	37,5	2,64	41	37	8,1			9	
39	103	0,64	2,53	29,9	3,01	42	36	8,2			6	
37	98	0,55	2,59	32,8	2,56	42	37	8,1			7	1
39	101	0,66	2,52	30,3	3,09	39	37	8,0		1	16	1
37	95	0,61	2,51	33,4	2,66	42	36	8,1		1	7	
37	83	0,80	2,55	37,9	2,82	42	37	8,3		2	14	1
37	89	0,65	2,61	34,8	2,69	42	37	8,3			10	
36	88	0,75	2,59	33,9	2,80	41	37	8,3			14	
36	85	0,73	2,50	34,3	2,88	41	36	8,3		2	9	1
37	82	0,92	2,55	35,2	2,90	42	36	8,4			6	
35	94	0,86	2,81	33,6	2,56	41	37	8,4		2	8	
36	96	0,70	2,67	32,5	2,61	42	37	8,3		2	7	
35	80	0,76	2,39	36,6	2,61	40	36	8,1			6	
36	87	0,69	2,58	36,9	2,86	41	37	8,0			18	1
41	96	0,75	2,53	30,6	2,64	42	37	8,4		2	3	
38	102	0,61	2,55	29,7	2,67	41	37	8,3			9	
36	81	0,78	2,56	36,2	2,80	40	38	8,1			6	
42	99	0,63	2,51	29,8	3,10	42	37	7,9			4	1
37	89	0,67	2,61	37,5	2,73	42	37	8,2			11	1
35	94	0,85	2,72	31,2	2,84	43	38	7,9		1	8	7
35	96	0,74	2,56	29,3	3,00	42	37	8,2		1	16	
40	110	0,62	2,57	28,3	3,18	43	37	8,2			6	
31	93	0,59	2,59	31,3	2,44	39	38	8,0		1	5	
36	89	0,73	2,48	33,4	2,87	41	37	8,1			10	3
38	87	0,80	2,62	36,9	2,71	39	37	8,5		2	14	
38	85	0,80	2,65	37,6	2,51	40	37	8,3		2	14	
44	95	0,77	2,48	31,2	3,15	42	37	8,2			7	1
35	80	0,78	2,58	39,2	2,73	44	37	8,2			10	
35	77	0,88	2,58	40,2	2,87	43	37	8,2			9	
35	85	0,80	2,60	35,8	3,11	44	37	8,0			11	1
35	87	0,72	2,55	35,0	2,85	43	37	8,2			15	
36	104	0,67	2,80	31,9	2,62	42	38	8,4		1	13	
35	88	0,84	2,79	35,9	2,97	42	38	8,4			13	
37	92	0,71	2,73	36,6	3,04	39	37	8,5		1	14	

Avler	Han nr.		Hold nr.	Antal kuld	Antal dyr v. kntrollens	
	v. øre	h. øre			beg.	slut.
Erik Nielsen, Viemose Skov, Kalvehave	1		928	3	19	18
do.	19		929	2	16	15
Jens Peter Skovsgaard, Hørby, Sæby	2	8V42	923	4	20	18
Villy Vestergård, Ørum Sønderlyng	17	286V	856	4	27	17
do.	38	284V	857	3	23	19

Stor Sølv:

Knud Raben, Skovby, Aabenraa	39	50H6	899	3	10	6
J. Valentin, Svinget 47, Tønder	26	888S	873	2	15	13
do.	35	890S	874	2	15	14
do.	42	891S	875	4	23	20

Fransk Vædder:

Villy Andersen, Errindlev	142		902	3	11	9
Steen Bom, Vivede, Fakse	25		952	4	19	13
Arne Engen, Bindslev	1	10S1	937	2	13	11
Jørgen Geert, Nørreballe	013	N678	927	3	17	16
Hans E. Hansen, Ladby, Næstved	7148	7A17	907	4	24	22
Holger Hansen, St. Tårnby, Vallø	05	8Y86	862	4	20	19
do.	0405	7A22	863	2	12	11
Knud E. Hansen, Frøslev, St. Heddinge	703	7A36	890	2	8	6
do.	10	7A51	943	3	16	12
Henry Larsen, Våbensted, Sakskøbing	184	N674	870	3	23	21
Poul Vang Larsen, Vanggård, Højby Sj. ..	0104	N909	930	3	16	16
do.	0101	N910	931	4	25	25
do.	699	68Y1	932	4	27	27
Ole Nielsen, Ø. Skovby, Dannemare	46	432S	882	2	7	5
do.	86	20T6	883	2	9	7
do.	29	7Y37	884	1	7	6
Bjarne Olsen, Alholmsparken 6, Hillerød ..	767	84K0	849	3	20	12
do.	7024	1U20	850	2	15	11
do.	767	84K0	898	4	16	12
do.	7027		914	2	11	11
Ingolf Pedersen, Resen, Struer	302	U771	897	3	9	5
Svend Pedersen, Halling, Randers	28	489V	892	2	14	9
U. Petersen, Spanager, Lille-Skensved	021	9Y31	934	2	7	7

Belgisk Kæmpe:

Ingelise Asferg, Jennum, Spentrup	10-70	0U08	886	2	11	8
P. Eriksen, Frederiks Allé 11, Rødkærsgade ..	041		853	4	27	20
do.	051		854	4	27	22
do.	038	55H5	917	3	19	19
do.	0902		953	4	14	8

Al-ler i dage v. kontrollens		Vægt i kg v. kontrollens		Gram daglig tilvækst	F.e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde	Fodningsgrad antal dyr i kl.			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
38	89	0,85	2,78	38,0	2,57	42	38	8,2			18	
38	91	0,82	2,85	37,9	2,48	41	39	8,4		1	13	1
36	102	0,63	2,86	32,8	3,02	42	38	8,4		2	16	
36	89	0,66	2,72	37,2	2,72	41	38	8,1			16	1
36	92	0,75	2,69	34,6	2,94	40	38	8,3		1	18	
36	94	0,73	2,84	34,3	2,57	41	38	8,4	2	2	2	
35	92	0,80	2,83	34,2	2,67	41	39	8,2		2	10	1
35	86	0,79	2,87	40,6	2,44	42	39	8,2			14	
36	88	0,81	2,86	37,8	2,67	40	39	8,4		1	19	
41	102	0,75	2,88	35,9	2,56	42	39	8,3		3	6	
35	87	0,81	2,96	41,2	2,89	42	39	8,4			12	
34	86	0,75	2,85	39,0	2,65	41	38	8,3			11	
36	89	0,77	3,01	42,0	2,60	42	38	8,4	1	5	10	
37	102	0,78	2,97	33,5	2,78	41	39	8,4		7	14	1
38	89	0,87	3,01	42,0	2,77	41	39	8,5	1	5	13	
39	95	0,85	3,02	38,2	2,70	41	40	8,6		1	10	
40	102	0,68	2,77	33,9	3,08	42	39	8,1		1	5	
33	83	0,73	3,04	44,7	2,61	40	39	8,5		1	11	
35	84	0,90	3,07	44,2	2,63	41	39	8,7		2	19	
36	87	0,88	2,95	41,0	2,64	42	38	8,3			16	
37	91	0,85	3,04	40,6	2,56	41	39	8,6		4	21	
36	99	0,76	2,97	35,5	3,06	40	38	8,3		3	24	
34	94	0,87	2,89	32,6	2,34	40	40	8,4			5	
37	94	0,93	3,00	35,4	2,47	42	39	8,3			6	
36	92	1,01	3,04	35,9	2,46	43	40	8,3			6	
37	85	0,94	2,80	36,9	2,89	40	38	8,5		2	9	
36	91	0,76	2,85	37,9	2,97	41	39	8,4			10	
35	99	0,72	2,90	33,8	2,67	39	40	8,5		4	8	
35	98	0,72	3,06	36,9	2,45	39	40	8,7		6	4	
35	109	0,60	2,99	32,3	2,65	42	39	8,4			5	
36	108	0,63	2,90	32,2	3,07	42	39	8,4		1	7	
34	84	0,94	3,09	42,8	2,90	41	38	8,5			7	
36	101	0,60	2,95	35,6	2,52	41	39	8,1			7	1
36	86	0,81	2,90	41,2	2,65	42	40	8,1			18	2
36	93	0,85	3,01	36,4	3,06	41	40	8,3		1	21	
34	97	0,78	3,06	36,7	2,54	42	40	8,5		2	17	
36	88	0,91	3,20	44,9	2,90	42	40	8,7			8	

Avler	Han nr.		Hold nr.	Antal kuld	Antal dyr v. kontrollens	
	v. øre	h. øre			beg.	slut.
Edmund Hansen, »Egelund«, Rødby	415		909	2	10	10
Mary Larsen, Mannerup, Roskilde	18		935	3	12	11
do.	7050	9A25	936	3	16	12
Kaj P. Nielsen, Valby, Helsingør	0419	266V	912	4	21	20
do.	16-0	981K	913	4	26	26
Richardt Nielsen, Nørretoft, Ribe	148	2F03	866	3	14	14
do.	12	824D	891	2	8	7
H. Pedersen, Thoustrup, Hougårdsvej, Hobro	112	485S	876	3	16	16
do.	15	479V	877	3	16	15
Jens Thygesen, Møllerup, Randers	261	0N27	903	3	10	6
do.	240	0N26	904	4	14	11
do.	221	0U04	905	4	15	9
Gennemsnit for Hvid Land	48	hold		2,5	12,8	10,4
» » Bourgogne	5	»		2,8	16,0	11,8
» » Californian	4	»		3,8	16,8	11,8
» » Blå Wiener	8	»		3,3	19,8	16,3
» » Stor Sølv	4	»		2,8	15,8	13,3
» » Fransk Vædder	23	»		2,8	15,0	12,7
» » Belgisk Kæmpe	17	»		3,2	16,2	13,8

Alder i dage v. kontrollens		Vægt i kg v. kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde	Fædtningsgrad antal dyr i kl.			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
37	99	0,87	3,00	34,1	2,77	41	40	8,5			10	
36	82	1,00	3,01	43,9	2,49	42	40	8,1			8	3
36	82	1,03	3,09	42,9	2,48	42	40	8,3			10	1
36	93	0,75	3,10	40,6	2,50	42	41	8,3		2	18	
35	99	0,80	3,10	36,0	2,79	42	41	8,4		10	16	
37	92	0,87	3,11	40,8	2,91	40	40	8,6			13	
33	87	0,83	3,06	40,3	2,32	41	40	8,3			7	
36	81	1,09	3,03	43,9	2,51	42	40	8,4			16	
36	88	0,95	3,02	39,6	2,70	42	40	8,3			15	
37	96	0,83	3,07	38,7	2,60	41	40	8,5		1	4	1
37	90	0,89	3,01	38,5	2,69	41	40	8,3			11	
39	96	0,81	3,02	37,8	2,69	41	40	8,5			9	
36	91	0,72	2,56	33,5	2,74	40,5	37,0	8,2				
37	90	0,74	2,56	34,1	2,74	40,2	37,2	8,2				
35	82	0,80	2,58	37,6	2,89	43,5	37,0	8,2				
37	93	0,74	2,78	35,6	2,80	41,1	38,0	8,3				
36	90	0,78	2,85	36,7	2,59	41,0	38,7	8,3				
36	93	0,80	2,96	37,8	2,71	41,1	39,0	8,4				
36	91	0,86	3,04	39,5	2,65	41,5	40,1	8,4				

Tidligere udsendte beretninger om afkomsprøver og forsøg med kaniner.

- 1942. 203. ber. Fodringsforsøg med kaniner. (75 øre).
- 1946. 221. – Kaninkontrollen på Favrholt, I, 1944–45. (75 øre).
- 1946. 223. – Kaninkontrollen på Favrholt, II, 1945–46. (Udsolgt).
- 1948. 230. – Kaninkontrollen på Favrholt, III, 1946–47, samt Kaninforsøg (75 øre).
- 1948. 232. – Kaninkontrollen på Favrholt, IV, 1947–48. (75 øre).
- 1949. 244. – Kaninkontrollen på Favrholt, V, 1948–49. (75 øre).
- 1956. 290. – 6. meddelelse fra Kaninkontrolstationen på Favrholt for årene 1949/50–1954/55. (3,50 kr.).
- 1958. 307. – 7. meddelelse fra Kaninkontrolstationen på Favrholt for årene 1955/56 og 1956/57. (2,50 kr.).
- 1964. 346. – 8. meddelelse fra Kaninkontrolstationen for årene 1958/59 til 1963/64. (4,00 kr.).
- 1967. 362. – 9. meddelelse fra Kaninkontrolstationen for årene 1964–67. (4,00 kr.).
- 1970. 380. – 10. meddelelse fra Kaninkontrolstationen for årene 1967–68 og 1968–69. (6,00 kr.).