

64de Beretning

fra

den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning.

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

København.

I Kommission hos Aug. Bang.

Trykt hos J. H. Schultz A/S

1908.

Indhold.

	Side.
Indledning	1—8
Sammenligning mellem Svin af Yorkshire-, Landrace og Krydsning	8—28
Sammenligning mellem Krydsningssvin og Svin af Landrace	28—32
Sammenligning mellem Afkom fra forskellige Slægter af Landracen	32—37
Slægten Adam (Stambog 1).....	37—39
— Rasmus	39—46
— Triddelfitz.....	46—47
— Mikkel.....	47—54
— Adam (Stambog 16).....	54—56
— Midskov	56—58
— Jumbo.....	58—62
— Klovn.....	63—64
— Aasgaard.....	65—66
— Havrebjærg.....	67—69
— Robert Hygind	70—73
— Annette	73—77
— Oldemor.....	77—78
— Nr. 21	78—80
— Slynge	80—82
Samlet Oversigt over Slægtleddene m. m.....	82—92
Kort Overblik	93—94

Derefter følger Hovedtabellerne i et særligt Afsnit.

For at støtte de Bestræbelser, som fra de ledendes Side i 1896 blev iværksatte med at føre Svineavlen ind i et mere rationelt Spor, og samtidig at virke for Tilvejebringelse af en god Kvalitet af Flæsk, besluttede Forsøgslaboratoriet sig i 1899 til at anstille nogle Fodringsforsøg med Grise tillagte paa kaarede Stamdyr i de anerkendte Avlscentre for Svin af Yorkshirerace, Svin af dansk Landrace samt Krydsninger, i første Led faldne efter Orne af Yorkshire og So af Landrace, for der igennem at konstatere, hvilke af disse Racer der hurtigst naaede Slagterivægt og udnyttede Foderet bedst, og ligeledes ved paafølgende Kontrolslagtninger at søge oplyst, hvorledes Dyrenes Kropbygning, Flæskets Aflejring og dettes Kvalitet som Eksportvare stillede sig for de nævnte Racer.

Efter at have udført nogle enkelte Forsøg traadte Laboratoriet i 1901 i nærmere Forbindelse med Statskonsulent *P. A. Mørkeberg* og dennes Medhjælpere. Dette Samarbejde førte til, at det fra den Tid af blev disse Mænds Opgave at udpege de Stamdyr i Centrene, hvis Afkom det for Ledelsen vilde være af størst Betydning at faa anstillet Forsøg med, og hvorfra der kunde stilles Materiale til Raadighed paa de Tider, da Laboratoriet af Hensyn til Arbejdskraft og Midler kunde sætte saadanne Forsøg i Gang.

Forsøgsdyrene, der som Regel blev indkøbte i 8 Ugers Alderen, har været opstaldede og fordrede under saadanne Forhold, der kommer et i Praksis veldrevet Svinehold saa nær som muligt, og Holdene har paa enkelte Undtagelser nær været dannede af Grise fra samme Kuld.

Inden for samme Forsøgsrække har Holdene været fodrede med Foder af samme Blanding, men da Grisene paa det enkelte Hold ifølge Planen skulde være fra samme Kuld, har det haft

sine Vanskeligheder at faa alle Hold i samme Række ens i Alder og Størrelse, og dette havde til Følge, at Foderets Mængde ikke kunde være ens til alle sammenhørende Hold, men har maatte lempes efter Dyrenes Størrelse og Trivsel.

Forsøgsværten eller dennes Stedfortræder har haft en væsentlig Indflydelse paa Fastsættelsen af Foderstoffernes Blandingsforhold og Foderets Størrelse, og naar Bestemmelsen af Foderblandingen og Foderets Mængde desuagtet i mange Tilfælde er truffen af Laboratoriets Assistent, saa er dette kun sket efter Overenskomst med vedkommende Forsøgsvært.

Paa hver Forsøgsgaard var ansat en Fodermester, hvis Gerning var under Forsøgsværtens og Assistentens Tilsyn at afveje det ved Forsøgsplanen fastsatte Foder til hvert Hold Svin og fordele det i rette Mængder til de forskellige Givter m. m. En Gang i hver Periode kom Assistenten til Forsøgsgaarden for at veje Dyrene og for i Forening med Forsøgsværten paa ny at træffe Aftale om Foderets Mængde for den følgende Periode. Ved saadanne Tilsyn udtog Assistenten samtidig Prøver af Foderstofferne til kemisk Analyse.

Foderet er udvejet hver Dag, som oftest om Formiddagen, for et Døgn ad Gangen, og da fordelt i 3 Givter: Middag, Aften og den paafølgende Morgen, dog er Foderet, begrundet i lokale Forhold, ved enkelte Forsøg udvejet til andre Tider af Dagen.

Af de ved Forsøgene benyttede Foderstoffer har Kornet og Majsens været gruttet, Oljekagerne knuste, og Roerne raspede. Det faste Foder blev efter Udvejningen blandet med den ligeledes udvejede Mælk og Valle, og det hele syrnet til hvert enkelt Hold.

Dyrene er fodrede til bestemte Tider, og de har i Almindelighed faaet alt det Foder, de kunde fortære; men paa den anden Side blev der heller ikke givet større Foder, end at Dyrene hver Gang aad op, idet vi har holdt os den for god Svinefodring givne Regel efterrettelig, at naar Dyrene var mætte, skulde Trugene være tømte.

Temperaturen i Luften, Stalden og Foderet er observeret 3 Gange daglig og for de sammenhørende Hold har Temperaturen saa vidt muligt været ens.

Da Dyrene havde naaet en for Slagterisvin passende Vægt blev de førte til Slagteriet, og foruden de Vejninger og Maalinger, Laboratoriet som sædvanlig lod foretage, og som nær-

mere skal omtales senere, blev ved disse Forsøg hver enkelt Krop underkastet en sagkyndig og kritisk Bedømmelse med Hensyn til Kroppens Form og Bygning, Flæskets Aflejring og Kvalitet, Knoklernes Finhed o. s. v.; i det hele taget blev alle de Forhold, som har Betydning for Flæsket, som Eksportvare, nøje gennemgaaede.

Bedømmelsen foretoges af 2 à 3 Dommerhold, bestaaende af Slagteridirektører, Slagteriernes daværende Konsulent samt Laboratoriets Assistent; i hvert Dommerhold fungerede som Regel mindst én Direktør.

Nærværende Beretning omhandler Forsøg med 1,083 Dyr, fordelt paa 202 Hold og samlede i 33 Forsøgsrækker, der i Tilslutning til Laboratoriets tidligere Beretninger om Fodringsforsøg med Svin er betegnede med Løbenumre 138—170.

Dyrene af de forskellige Racer fordeler sig efter Antal saaledes:

109 Stkr.	Dyr af ren Yorkshirerace	fordelt paa	21 Hold
308	— af første Krydsning	—	56 —
644	— af ren Landrace	—	121 —
22	— af blandet Race	—	4 —

De 21 Hold Yorkshiregrise er indkøbte fra anerkendte Avlscentre med Svin af ren Yorkshirerace.

De 56 Hold Krydsningsgrise er indkøbte fra forskellige Opdrættere; men som det fremgaar af Stamtavlerne, er Forældrene til Grisene som Regel anskaffede fra Avlscentrene.

De 121 Hold Landracegrise er indkøbte fra anerkendte Avlscentre med Svin af dansk Landrace.

De 4 Hold af blandet Race er af vedkommende Forsøgs- gaards eget Tillæg.

I de enkelte Rækker er Yorkshireholdene betegnede ved A, A₁, osv.

—	Krydsningsholdene	—	B, B ₁ , —
—	Landraceholdene	—	C, C ₁ , —
—	Holdene af bl. Race	—	D, D ₁ , —

For Rækkerne 138—143 har vi ligesom ved de tidligere Forsøg med Svin benyttet 10 daglige Vejningsperioder, men fra 1901 har vi forandret Perioderne saaledes, at vi med Række 144 og videre frem i Tiden benytter 14 Dage til hver Periode.

I Tab. I er givet en Fortegnelse over de forskellige Forsøgsrækker med Angivelse af, paa hvilke Gaarde de er udførte, naar

Forsøget er begyndt, samt hvor mange Hold og hvor mange Dyr af hver Race den enkelte Række omfatter.

Tab. I. Fortegnelse over Forsøgsrækkerne.

Forsøgssted	Rækken			York-schire-svin		Kryds-ninger		Landrace		Blandet Race	
	Nr.	begyndt		Hold	Dyr	Hold	Dyr	Hold	Dyr	Hold	Dyr
Rosvang	138	Juli	1899	1	6	2	12	1	6	1	6
Rosenfeldt	139	Juli	1899	1	5	1	5	1	5	1	5
Tybrind	140	Juli	1899	1	6	2	12	1	6	1	6
Karlsbøj	141	Juni	1900	1	5	2	9	3	15	—	—
Tybrind	142	Avgust	1900	1	6	1	6	4	24	—	—
Rosvang	143	Septbr.	1900	1	6	2	12	2	12	—	—
Constantinsborg ..	144	Oktbr.	1900	1	4	2	10	1	5	—	—
Rosvang	145	Maj	1901	1	5	3	18	3	16	—	—
Constantinsborg ..	146	Juni	1901	1	5	1	5	3	16	—	—
Bregentved	147	Juli	1901	1	5	3	15	2	10	1	5
Tybrind	148	Juni	1901	1	6	1	6	5	30	—	—
Duelund	149	Avgust	1901	1	4	2	12	3	17	—	—
Rosvang	150	April	1902	1	6	2	12	3	17	—	—
Tybrind	151	Maj	1902	1	6	3	17	3	18	—	—
Duelund	152	Maj	1902	1	4	2	12	3	17	—	—
Alslevgaarden	153	Juni	1902	1	5	2	10	2	10	—	—
Constantinsborg ..	154	Juni	1902	—	—	2	12	3	16	—	—
Rosenfeldt	155	Juli	1902	1	4	3	14	3	15	—	—
Duelund	156	Maj	1903	—	—	2	12	4	23	—	—
Tybrind	157	Juni	1903	2	12	2	12	4	22	—	—
Rosvang	158	Juni	1903	1	4	2	12	3	17	—	—
Rosenfeldt	159	Juni	1903	1	5	2	10	4	20	—	—
Rosvang	160	Januar	1904	—	—	—	—	7	35	—	—
do.	161	Maj	1904	—	—	1	5	5	23	—	—
Tybrind	162	Maj	1904	—	—	2	12	4	24	—	—
Rosenfeldt	163	Juni	1904	—	—	4	20	4	20	—	—
Duelund	164	Juni	1904	—	—	—	—	6	30	—	—
Rosenfeldt	165	Maj	1905	—	—	2	11	6	29	—	—
Duelund	166	Juni	1905	—	—	1	5	5	22	—	—
Rosvang	167	Juni	1905	—	—	—	—	7	35	—	—
Tybrind	168	Juni	1905	—	—	—	—	6	35	—	—
Sanderumgaard ..	169	Novbr.	1905	—	—	—	—	6	36	—	—
Duelund	170	Deebr.	1905	—	—	2	10	4	18	—	—

Hovedtabellerne,

som findes trykt sidst i Beretningen, indeholder de ved Forsøgene fundne Tal. De falder i følgende Afsnit:

- A. Første Afsnit (Side 1—39) indeholder Oversigt over, hvad Slags Foder Dyrene har faaet, dettes Mængde, samt hvor stor Tilvæksten har været. Tallene for Foder og Tilvækst svarer saaledes til hinanden, og begge er beregnede og opførte for ét Dyr i én Periode (10—14 Dage) for hvert Hold.

Endvidere er i Kolonnerne for Tilvækst opført Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse, samt hvor mange Dyr der fandtes paa Holdet; er der kun opført ét Tal for Antal Dyr, betegner dette, hvor mange Dyr der fandtes paa Holdet fra Forsøgets Begyndelse til dets Slutning; er der derimod opført to Tal, angives hermed, at der under Forsøgets Udførelse af en eller anden Aarsag, har maattet sættes et eller flere Dyr ud af Holdet. Det første Tal betegner da Dyrenes Antal ved Forsøgets Begyndelse, det sidste Antallet ved Slutningen. Naar et Dyr paa Grund af Sygelighed, Utrivelihood eller lignende Grunde har maattet udgaa, er Foderet til de øvrige Dyr paa Holdet selvfølgelig blevet sat ned med det udgaaede Dyrs Part, og Forsøget har kunnet fortsættes, naar det skønnedes, at den skete Forandring i Holdets Sammensætning ingen væsentlig Indflydelse vilde faa paa Resultatet. Har Afgangen derimod grebet mere forstyrrende ind, er enten det paagældende Hold eller hele Forsøget blevet kasseret.

- B. Andet Afsnit (Side 40—51) indeholder de fra Undersøgelserne paa Slagterierne hidrørende Tal, som angiver Dyrenes Vægt før og efter Slagtningen, Vægt af Affald, Hoved, Ben, Fedt og Ryg, pCt Svind ved Slagtning, samt hvor mange pCt tilskaaret Eksportflæsk der gennemsnitlig er blevet pr Dyr pr Hold, beregnet efter Dyrets levende Vægt paa Slagteriet og Pund tilskaaret Flæsk. Tillige findes opført Maal for Flæskets Tykkelse paa Ryg og Bug samt forskellige Længdemaal af Kroppen. Endvidere Tal for Flæskets Fasthed; men da der ved disse Forsøg er benyttet

andre Tal til Betegnelse af Flæskets Fasthed end ved de Forsøg, som er omtalt i tidligere Beretninger, skal den nu anvendte Skala omtales lidt nærmere.

Det Flæsk, som efter almindelig anvendt Afkøling er saa fast, at man ikke kan vente det bedre, faar Karakteren »udmærket godt« og betegnes ved Tallet 15, og med dette som Udgangspunkt bliver Karaktererne angivne med lavere og lavere Tal, efter som Flæsket bliver mindre og mindre fast, og vi faar derved følgende Skala:

$$\begin{array}{rcl} \text{ug} & = & 15 \quad \text{g} = 9 \quad \text{mdl} = 3 \\ \text{mg} & = & 12 \quad \text{tg} = 6 \quad \text{slet} = 0 \end{array}$$

De mellemliggende Tal svarer til Hovedkarakterernes Variering med et tilføjet + eller ÷, f Eks $\text{ug} \div = 14$ $\text{mg} + = 13$ o. s. v.; men allerede naar Flæsket faar Karakteren 9, er det, alle andre Forhold lige, af en saadan Konsistens, at det ikke kan betragtes som god Eksportvare, og daarligere har det selvfølgelig været, naar Karakteren er gaaet endnu længere ned.

Samme Pointsystem er ogsaa benyttet ved Bedømmelsen af Bovpartiets Bygning, Rygflæskets Tykkelse og Fordeling, Bugpartiets Form og Fylde, Skinkens Form og Størrelse, Knokkelbygningens Finhed, samt ved Karakteren for Totalindtryk, og jo højere de Tal er, som er anført for disse Forhold, desto bedre har disse været.

- C. Tredje Afsnit (Side 52—83) indeholder Forbrugstabellerne. Dyrenes Foder og Tilvækst er her sammendraget i Vækstperioder, hver omfattende 40 Pd Tilvækst, saaledes at Vækstperiode I omfatter Tilvæksten fra 35—75 Pd, Vækstperiode II fra 75 til 115, og Vækstperiode III fra 115 til 155 Pd; men da Vejningen af Dyrene falder hver 14. Dag, kan det ikke altid passe, at der netop inddrages 40 Pd's Tilvækst i hver Vækstperiode; nogle Hold kan faa en lidt for kort Vækstperiode I, og en noget længere Vækstperiode II; men ved andre Hold kan det modsatte blive Tilfældet, da den Vejning, som giver den nærmest de anførte Grænser liggende Vægt, maa benyttes som Vækstperiodernes Begyndelses- og Slutningsvægt.

I Forbrugstabellerne er opført, hvor mange Perioder (Antal Dage) der er medregnet til hver Vækstperiode, samt Dyrenes Begyndelses- og Slutningsvægt. Alle de anvendte Foderstoffer er omregnet til »Pd Korn«, beregnet efter de af Laboratoriet ved tidligere Forsøg fremgaaede Erstatningstal, og efter at have sammendraget de paa den Maade beregnede Pd Korn, og deri divideret de til samme Vækstperiode svarende Pd Tilvækst, faas Pd Korn til et Pd Tilvækst for den paagældende Periode.

- D. Fjerde Afsnit (Side 84—99) indeholder Resultaterne fra de kemiske Analyser af de Prøver, som blev udtaget af Foderstofferne paa Gaardene og indsendte til Laboratoriet til Undersøgelse. Udtagning af Prøver gaar for sig paa den Maade, at Fodermesteren hver eller hveranden Dag i en nærmere angiven Periode tager Prøver af Mælkeriaffaldsprodukterne og stiller dem til Afkøling; naar saa Assistenten ved Periodens Afslutning kommer til Stede, bliver de udtagne og afkølede Prøver blandet sammen til en stor Fællesprøve, og der ud af tages saa Prøven til kemisk Analyse. En saadan Prøve gælder jo strengt taget kun den Periode, hvorfra den hidrører, men det maa dog antages, at den noget nær er Udtryk for Produkternes kemiske Sammensætning for længere Tid, forudsat at Mejeriet har været i normal Drift; i modsat Tilfælde gentages Prøveudtagningen. Af Korn, Majs, Kager o. s. v. bliver der henlagt et Parti, som er tilstrækkeligt for hele Forsøget, og heraf bliver saa Prøven udtaget, eller, hvis der benyttes flere Partier, bliver der udtaget Prøve flere Gange, hvoraf der saa enten paa Gaarden eller i Laboratoriet dannes en Fællesprøve. Noget tilsvarende har ogsaa fundet Sted for Roernes og Grøntfoderets Vedkommende.
- E. Femte Afsnit (Side 90—103) indeholder Temperaturiagttagelser. Hver Morgen, Middag og Aften er Temperaturen iagttaget i Luften, Stalden og Foderet, og af de herved observerede Tal er der for hver Vækstperiode udregnet et Gennemsnitstal, og det er dette Tal, der for hvert Hold findes opført i Hovedtabellerne.
- F. Endelig indeholder sjette Afsnit (Side 104—141) Oplysninger om de enkelte Holds Afstamning, som i de fleste Tilfælde er ført to Slægtled tilbage. En fortrinlig Støtte

ved Affattelsen af dette Afsnit har Laboratoriet haft i den af Statskonsulent *P. A. Mørkeberg* udarbejdede Stam-bog over Orner af Landrace, til hvilken der ogsaa i de fleste Tilfælde er henvist.

Naar der i Stamtavlerne er anført, at dette eller hint Dyr har virket paa dette eller hint Avlscenter, da er dette ensbetydende med, at vedkommende Dyr i alt Fald en Tid, har virket paa denne Plads; selv om det ogsaa tidligere eller senere har været Stamdyr paa et andet Center. Flere af de Avlscentre, som der er henvist til i Stamtavlerne, eksisterer ikke mere som saadanne, men paa det Tidspunkt, da et eller andet Dyr henvises dertil, var det anerkendt som Avlscenter.

Sammenligning

mellem

Svin af Yorkshirerace, Svin af Landrace, samt Krydsninger efter Orner af Yorkshirerace og Søer af Landrace.

I sin Beretning om Svineavlen for Aaret 1899 gør Statskonsulent *Mørkeberg* gældende, at saafremt Danmark vedblivende

Tabel

Række	Hold	Vækstperiode I.			Vækstperiode II.			Vækstperiode III.			Alle Vækstperioder		
		omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst
		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst	
138	A.	40	31.1	3.43	40	38.7	4.14	40	45.0	4.67	120	114.8	4.15
139	A.	—	—	—	40	36.6	4.26	40	41.2	4.68	—	—	—
140	A.	40	30.1	3.55	50	41.0	4.39	30	34.0	4.43	120	105.1	4.16
141	A.	60	36.6	5.52	50	37.4	4.63	40	45.5	3.69	150	119.5	4.54
142	A.	—	—	—	40	37.5	3.70	40	45.3	4.56	—	—	—
143	A.	50	43.3	3.01	40	39.0	4.27	30	35.0	4.92	120	117.3	4.00
144	A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	A.	56	41.6	3.29	42	43.0	3.83	42	48.8	4.59	140	133.4	3.94

vil bevare sin gunstige Stilling paa Englands Flæskemarked, er det en absolut Nødvendighed, at vor Svineavl ledes saaledes, at vi bliver i Stand til at kunne fremstille en fin Kvalitet af Flæsk; men Statskonsulenten tilføjer, at der ved Avlens Ledelse selvfølgelig ogsaa maa tages de tilbørlige Hensyn til Landbrugets Tarv, saa at Svineholdet kan blive en lønnende Forretning. Det meddeles endvidere, at Landracesvinene i sig selv besidder mange for Landbruget gode Egenskaber, men de afgiver ikke et tilstrækkelig godt Baconprodukt, hvorfor Statskonsulenten tilraader Landmændene at drive Renavl med Landracen i Avlscentrene for derigennem at forbedre og forædle Racen; men i den almindelige Avl til Produktion af Slagterisvin at benytte Orner af Yorkshirerace til Sør af Landrace. Til at belyse, i alt Fald en Del af disse Forhold, vil de nu afsluttede Forsøg sikkert kunne tjene.

Ved 20 af de i Hovedtabellerne anførte Rækker, nemlig Nr 138—153, 155, 157, 158 og 159, har baade Yorkshiresvin, Krydsninger og Landracesvin været repræsenterede med et eller flere Hold i hver Række, og for hver af disse Hold er fra Hovedtabellerne uddraget de vigtigste Resultater og opført i Tabel II, hvor Yorkshirerne er betegnet ved A, Krydsningerne ved B, og Landracen ved C.

II.

Vægt ved		Vægt paa Slagteriet		pCt. Svind		pCt. Eksporthæsk	Tal for Flæskets Fasthed	Kropp us Længde fra Hofeskaal til Sultet ved Halsen	Points for						
Begyndelsen	Slutningen	levende	slagtet afkølet	ved Slagtning	som Affald				Bovpartiets Bygning	Ryg-flæskets		Bovpartiets Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Finhed	Total Indtryk
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.				Tm.		Tykkelse	Fordeling					
42.7	157.5	166.7	131.5	21.1	—	—	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	171.8	127.6	25.7	—	—	11.4	33.5	—	—	—	—	—	—	—
48.2	153.3	169.7	125.2	26.2	—	—	13.4	34.3	—	—	—	—	—	—	—
36.6	156.1	—	—	—	—	—	13.0	34.1	—	—	—	12.8	14.3	—	—
—	—	179.7	134.7	25.0	—	—	13.8	36.6	—	—	—	10.7	11.7	11.0	—
32.0	149.3	158.8	124.2	21.8	—	—	13.4	34.9	—	—	—	11.6	11.0	—	—
—	—	167.8	127.5	24.0	—	—	14.0	34.5	—	—	—	11.5	11.5	—	—
30.2	163.6	—	—	—	—	—	13.2	32.4	11.8	12.4	12.4	12.4	12.9	12.8	—

Tabel II

Række	Hold	Vækstperiode I.			Vækstperiode II.			Vækstperiode III.			Alle Vækstperioder		
		omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst
		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst	
146	A.	42	34.8	2.61	42	43.8	3.36	—	—	—	—	—	—
147	A.	70	36.6	4.97	42	49.0	3.19	28	37.8	3.63	140	123.4	3.85
148	A.	56	41.8	3.23	42	45.0	3.80	28	32.0	4.99	126	118.8	3.93
149	A.	56	43.8	3.70	28	30.5	3.98	42	47.5	4.57	126	121.8	4.11
150	A.	56	37.2	3.35	42	46.1	3.64	28	40.5	3.80	126	123.8	3.61
151	A.	56	43.6	3.62	42	42.4	4.32	28	34.6	4.05	126	120.6	3.99
152	A.	56	46.5	3.66	28	37.8	3.37	42	45.7	5.21	126	130.0	4.12
153	A.	42	39.0	2.55	42	39.4	3.64	28	33.2	3.70	112	116.6	3.28
155	A.	42	35.8	3.15	42	50.5	3.53	28	37.7	4.23	112	124.0	3.64
157	A 1.	42	33.2	3.10	42	45.2	3.66	42	47.0	4.56	126	125.4	3.85
	A 2.	56	35.5	3.65	42	40.3	3.62	42	46.7	4.16	140	122.5	3.83
158	A.	42	38.5	2.88	28	32.3	3.33	42	55.3	3.86	112	126.1	3.42
159	A.	42	40.4	3.39	42	39.7	4.33	28	30.5	4.50	112	110.6	4.09
Gns. 138—159*)		50.2	38.3	3.48	40.3	40.8	3.85	35.2	41.2	4.36	125.5	120.5	3.91
138	B 1.	40	31.3	3.41	40	38.9	4.12	40	42.8	4.91	120	113	4.22
	B 2.	50	40.9	3.06	40	41.1	3.90	40	45.5	4.62	130	127.5	3.88
139	B.	—	—	—	40	40.2	3.97	30	41.7	3.71	—	—	—
140	B 1.	60	41.4	3.70	40	34.0	4.00	40	47.3	4.12	140	122.7	3.94
	B 2.	50	39.3	3.14	50	44.7	4.01	30	36.3	4.30	130	120.3	3.82
141	B 1.	60	41.2	4.94	40	31.4	4.48	40	48.0	3.53	140	120.6	4.26
	B 2.	40	30.7	4.49	40	34.5	3.99	40	50.4	3.99	120	115.6	4.12
142	B.	60	39.5	3.22	40	39.2	3.93	30	37.1	4.61	130	115.8	3.91
143	B 1.	50	41.1	3.17	40	41.4	4.02	30	36.6	4.71	120	119.1	3.94
	B 2.	40	36.2	3.27	40	41.0	4.46	30	36.0	5.19	110	113.2	4.31
144	B 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	B 2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	B 1.	42	31.7	3.42	42	46.2	3.63	28	32.6	4.37	112	110.5	3.79
	B 2.	42	33.9	3.20	42	48.6	3.45	28	32.8	4.34	112	115.3	3.63
	B 3.	56	43.6	3.66	42	39.7	4.56	28	30.3	4.85	126	113.6	4.21
146	B.	—	—	—	42	52.2	2.95	28	28.4	4.76	—	—	—
147	B 1.	70	42.8	4.36	28	36.4	3.11	28	35.4	3.88	126	114.6	3.82
	B 2.	—	—	—	56	47.0	4.62	28	45.0	3.39	—	—	—
	B 3.	70	40.0	4.68	28	36.6	3.10	42	44.2	4.77	140	120.8	4.24
148	B.	56	33.9	4.00	42	46.6	3.74	28	34.0	4.81	126	114.5	4.13
149	B 1.	56	43.7	3.63	28	35.8	3.54	28	38.6	4.09	112	118.1	3.75

*) Gennemsnitstallene er allevegne udregnede efter de i de forskellige Kollonner sammenhørende Tal.

(fortsat).

Vægt ved		Vægt paa Slagteriet		pCt. Svind		pCt. Eksportflæsk	Tal for Flæskets Fasthed	Kroppens Længde fra Hofteskaal til Smitet ved Halsen	Points for									
Begyndelsen	Slutningen	levende	slagtet afkolet	ved Slagtaing	som Affald				Bovpartiets Bygning	Ryg-flæskets		Bovpartiets Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Finhed	Total Indtryk			
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.				Tm.		Tykkelse	Fordeling								
—	—	158.2	124.8	21.1	14.0	64.9	13.6	31.9	12.3	12.3	12.3	13.0	12.2	12.8	—			
39.6	163.0	158.2	127.4	19.5	14.6	65.9	9.4	33.6	11.2	11.0	11.0	12.1	12.2	11.9	—			
33.0	151.8	171.7	134.8	21.5	14.8	63.7	14.0	34.9	10.9	10.2	10.2	10.9	10.1	10.8	—			
37.2	159.0	165.2	132.0	20.1	14.2	65.7	14.5	33.2	11.4	12.1	12.1	11.1	13.6	13.6	—			
40.0	163.8	174.2	137.5	21.1	13.5	65.4	13.3	34.7	11.3	11.3	10.8	10.7	12.3	12.0	—			
35.5	156.1	170.0	137.4	19.2	13.6	67.2	13.6	34.0	11.5	12.3	11.0	12.2	12.5	13.3	—			
34.2	164.2	178.0	144.2	19.0	13.6	67.4	12.0	33.8	11.4	11.1	13.0	12.1	12.3	12.8	—			
34.4	146.0	160.6	128.2	20.2	13.2	66.6	13.4	33.6	11.3	11.7	11.7	13.1	12.5	12.7	—			
37.0	161.0	178.0	145.5	18.3	14.4	67.3	13.5	34.7	10.4	11.9	12.0	11.7	12.1	10.8	—			
41.3	166.7	165.5	133.3	19.4	15.3	65.3	11.7	33.8	11.3	10.0	10.1	11.9	11.9	12.2	—			
32.5	155.0	173.8	137.0	21.2	15.7	63.1	8.3	35.5	10.7	7.6	9.0	10.2	10.2	8.8	—			
36.5	162.6	167.0	132.5	20.6	13.5	65.9	13.5	34.6	11.7	12.2	12.6	12.1	11.9	12.6	—			
40.6	151.2	165.8	133.5	19.5	14.2	66.3	13.5	33.7	11.6	11.9	11.2	13.6	13.3	13.5	—			
37.1	157.7	168.2	134.5	20.1	14.2	65.7	12.9	34.2	11.3	11.3	11.4	11.9	12.2	12.1	—			
45.2	158.2	165.8	130.4	21.4	—	—	14.2	33.7	—	—	—	—	—	—	—			
32.3	159.8	163.7	126.8	22.5	—	—	10.2	34.8	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	175.0	131.5	24.9	—	—	10.6	34.9	—	—	—	—	—	—	—			
35.5	168.2	164.8	120.4	26.9	—	—	13.0	34.3	—	—	—	—	—	—	—			
35.5	155.8	172.3	127.0	26.3	—	—	14.0	35.2	—	—	—	—	—	—	—			
38.6	159.2	162.0	—	—	—	—	15.0	34.5	—	—	—	10.5	9.8	—	—			
47.8	163.4	175.3	—	—	—	—	15.0	35.8	—	—	—	11.0	12.0	—	—			
36.5	152.3	172.0	131.8	23.4	—	—	13.4	35.3	—	10.2	10.2	11.0	12.2	11.5	—			
33.7	152.8	155.2	122.5	21.1	—	—	13.0	35.1	—	—	—	11.2	11.0	—	—			
37.5	150.7	164.0	130.2	20.6	—	—	14.2	34.7	—	—	—	10.8	11.0	—	—			
—	—	170.0	128.0	24.7	—	—	12.6	34.4	—	—	—	10.8	10.6	—	—			
—	—	174.0	131.4	24.7	—	—	11.8	34.2	—	—	—	12.0	11.8	—	—			
38.8	149.3	—	141.1	—	—	—	13.2	34.5	12.5	12.8	12.8	12.5	12.3	13.0	—			
35.3	150.6	—	142.2	—	—	—	12.3	35.2	11.2	11.2	11.2	11.8	12.3	11.2	—			
32.7	146.3	—	128.7	—	—	—	13.5	32.6	11.7	11.0	11.0	12.4	13.3	14.0	—			
—	—	—	138.6	—	—	—	13.2	35.0	11.4	11.0	11.0	12.2	11.4	12.0	—			
35.8	150.4	168.4	136.0	19.2	15.2	65.6	11.2	34.2	11.1	12.5	12.5	11.9	11.8	12.1	—			
—	—	177.6	137.0	22.9	—	—	13.8	33.9	10.0	10.8	10.8	12.3	12.3	13.3	—			
37.6	158.4	170.2	139.0	18.3	14.7	67.0	13.2	34.4	11.5	11.9	11.9	12.8	12.5	12.4	—			
36.3	150.8	163.0	128.5	21.2	14.5	64.3	14.3	33.8	12.0	12.3	12.3	11.8	11.8	12.3	—			
31.0	149.1	170.4	133.8	21.5	14.3	64.2	14.2	35.0	12.2	13.0	13.0	12.5	12.0	12.6	—			

Tabel II

Række	Hold	Vækstperiode I.			Vækstperiode II.			Vækstperiode III.			Alle Vækst-perioder		
		omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst
		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst	
150	B 2.	56	40.0	4.12	28	31.3	3.65	28	38.1	3.86	112	109.4	3.88
	B 1.	42	38.7	2.74	28	36.6	3.16	28	42.9	3.64	98	118.2	3.20
151	B 2.	42	36.2	2.93	28	36.3	3.18	28	42.2	3.70	98	114.7	3.30
	B 1.	56	46.3	3.03	42	40.7	4.25	28	33.6	4.31	126	120.6	3.79
152	B 2.	56	45.2	3.10	28	29.0	3.79	42	46.0	4.49	126	120.2	3.80
	B 3.	56	39.8	4.21	42	41.4	4.29	42	44.2	4.82	140	125.4	4.45
153	B 1.	42	41.2	3.14	28	33.0	3.54	42	48.5	4.47	112	122.7	3.78
	B 2.	42	35.7	3.07	42	45.8	3.64	42	47.7	4.55	126	129.2	3.82
155	B 1.	—	—	—	42	44.2	3.38	28	37.6	3.70	—	—	—
	B 2.	42	37.2	2.88	28	35.2	3.12	28	35.0	3.84	98	107.4	3.27
157	B 1.	56	39.0	3.69	42	47.4	3.70	28	26.6	5.59	126	113.0	4.14
	B 2.	42	31.0	3.36	42	46.7	3.89	28	34.3	4.17	112	112.0	3.83
158	B 3.	42	33.0	2.97	42	43.4	4.00	28	33.2	4.32	112	109.6	3.78
	B 1.	56	41.9	3.09	42	41.1	3.94	42	49.2	4.35	140	132.2	3.82
159	B 2.	42	39.7	2.80	42	46.8	3.50	28	34.1	3.98	112	120.6	3.41
	B 1.	42	38.3	2.80	28	37.4	3.16	42	48.5	4.47	112	124.2	3.56
161	B 2.	42	35.6	3.01	42	50.2	3.70	28	36.7	4.07	112	122.5	3.61
	B 1.	—	—	—	42	49.6	3.46	28	35.6	4.09	—	—	—
162	B 2.	42	43.8	2.92	28	34.8	3.22	42	48.1	4.21	112	126.7	3.49
163	B 1.	42	37.0	2.43	56	38.8	5.28	42	43.6	4.41	140	119.4	4.08
	B 2.	56	44.8	2.55	42	35.0	3.70	42	44.9	3.85	140	124.7	3.34
165	B 1.	56	36.8	3.87	42	43.2	3.89	42	45.3	5.10	140	125.3	4.32
	B 2.	56	32.3	4.22	42	43.8	3.49	42	46.9	4.68	140	123.0	4.14
166	B.	56	50.2	3.02	28	36.2	3.66	28	33.0	4.52	112	119.4	3.63
	B 1.	56	37.8	3.85	42	45.5	3.14	28	34.3	3.51	126	117.6	3.48
167	B 2.	70	42.7	4.44	42	37.0	3.92	28	36.0	3.26	140	115.7	3.91
	B 1.	28	28.6	3.23	42	45.0	4.09	28	33.2	4.72	98	106.8	4.06
168	B 2.	42	35.2	3.78	42	46.6	3.67	28	32.4	4.01	112	114.2	3.77
	B 3.	42	38.6	3.61	42	41.0	4.30	42	44.9	4.77	126	124.5	4.26
169	B 4.	42	42.2	3.32	42	35.0	5.12	42	34.0	5.99	126	111.2	4.70
	B 1.	42	39.5	3.46	28	29.3	4.12	56	44.2	6.09	126	113.0	4.66
170	B 2.	42	35.2	3.88	28	28.6	4.21	42	50.6	4.47	112	114.4	4.22
	B 1.	42	38.2	2.60	42	49.6	3.47	28	39.6	3.63	112	127.4	3.26
171	B 1.	—	—	—	56	48.2	3.89	28	32.2	4.11	—	—	—
	B 2.	56	46.4	3.03	28	31.6	3.42	42	40.4	4.85	126	118.4	3.76
Gns, 138—159		49.7	38.6	3.43	38.1	40.7	3.74	32.8	39.6	4.30	120.2	118.3	3.85
Gns, 138—170		49.3	38.7	3.42	38.7	40.4	3.81	34.0	39.6	4.35	121.7	118.3	3.88

(fortsat).

Vægt ved		Vægt paa Slagteriet		pCt. Svind		pCt. Eksporthæsk	Tal for Flæskest Fasthed	Kroppens Længde fra Hofteskaal til Snittet ved Halsen	Points for									
Begyndelsen	Slutningen	levende	slagtet afkolet	ved Slagtning	som Affald				Bovpartiets Bygning	Ryg-flæskets		Bugpartiets Form og Fylde	Skinns Form og Størrelse	Hoved, Ben og SværmsFinhed	Total Indtryk			
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.				Tm.		Tykkelse	Fordeling								
34.2	143.6	165.2	129.8	21.4	15.5	63.1	12.8	34.2	12.1	12.2	12.2	11.2	12.5	12.3	—			
37.5	155.7	174.7	137.7	21.2	14.8	64.0	11.3	35.8	11.1	11.4	12.2	9.7	11.1	10.1	—			
35.8	150.5	163.8	130.8	20.1	13.2	66.7	14.0	34.4	11.6	12.2	12.7	12.0	12.2	12.2	—			
30.7	151.3	177.0	141.0	20.3	14.4	65.3	13.2	35.0	11.3	12.7	13.3	11.7	12.0	12.8	—			
35.5	155.7	180.2	142.2	21.1	14.4	64.5	13.0	35.0	12.9	10.6	12.1	10.5	11.5	10.3	—			
36.6	162.0	161.6	125.0	22.6	14.4	63.0	11.4	33.8	11.1	11.7	11.5	8.3	9.1	11.1	—			
39.3	162.0	170.0	132.8	21.9	13.7	64.4	14.7	34.4	11.3	12.2	11.9	11.5	10.7	12.0	—			
31.8	161.0	167.5	131.2	21.7	14.0	64.3	12.8	34.0	11.6	12.5	12.1	10.7	10.8	10.8	—			
—	—	169.0	132.0	21.9	13.4	64.7	12.2	34.2	11.7	11.8	11.4	12.9	9.7	12.7	—			
38.2	145.6	162.4	127.2	21.7	13.2	65.1	12.4	34.3	11.9	11.7	12.8	12.1	11.1	12.4	—			
31.8	144.8	165.3	131.4	20.4	14.5	65.1	12.2	34.1	11.1	11.9	12.5	9.5	11.1	11.2	—			
36.8	148.8	155.2	122.5	21.1	15.0	63.9	11.0	33.3	11.4	10.8	11.3	10.5	12.5	11.8	—			
37.2	146.8	157.0	123.8	21.1	14.8	64.1	11.8	34.0	10.7	9.7	12.0	11.6	11.3	11.2	—			
29.8	162.0	182.2	144.5	20.7	15.4	63.9	13.8	35.1	11.1	11.1	11.3	11.4	11.5	11.9	—			
38.3	158.9	179.7	140.2	22.0	15.4	62.6	12.0	34.2	11.1	11.0	10.9	10.3	11.1	11.2	—			
33.5	157.7	172.3	136.5	20.8	14.0	65.2	13.5	33.6	10.3	12.2	11.6	11.5	11.5	11.7	—			
38.2	160.7	170.0	134.2	21.1	14.3	64.6	12.7	33.8	11.9	12.7	12.4	12.3	11.9	11.5	—			
—	—	175.2	141.2	19.4	14.2	66.4	12.2	33.8	10.9	11.6	12.3	12.7	11.8	12.2	—			
28.6	155.3	168.0	133.8	20.3	14.9	64.8	12.4	34.8	11.8	12.1	12.1	12.1	12.3	12.3	—			
39.7	159.1	165.8	131.8	20.5	14.2	65.3	8.8	33.9	10.8	12.0	11.7	10.8	9.6	9.6	—			
32.7	157.4	—	126.0	—	—	—	12.5	36.2	12.1	12.4	12.5	12.0	12.7	12.8	—			
36.5	161.8	166.5	129.8	22.0	14.9	63.1	12.5	33.6	11.1	11.2	11.5	10.8	11.3	12.3	—			
37.2	160.2	164.8	126.2	23.4	14.8	61.8	11.7	33.8	10.7	11.1	11.6	10.0	10.8	11.3	—			
29.6	149.0	174.2	139.6	19.8	16.1	64.1	13.4	33.4	11.3	13.0	13.5	13.7	12.1	12.1	—			
32.2	149.8	166.3	130.0	21.3	—	—	11.0	34.0	11.6	12.0	12.3	11.3	11.7	11.7	—			
33.8	149.5	167.0	132.0	21.0	—	—	12.2	33.5	11.9	12.3	11.9	12.1	12.7	12.0	—			
41.6	148.4	164.6	133.0	19.2	—	—	13.8	32.9	11.6	11.5	12.5	12.2	12.0	12.8	—			
33.6	147.8	171.3	137.5	19.7	—	—	13.0	33.3	11.3	13.3	13.1	12.4	11.8	11.7	—			
34.2	158.7	163.0	129.8	20.4	—	—	12.6	33.8	11.8	12.1	12.4	12.3	12.4	12.9	—			
36.2	147.4	156.3	126.5	19.1	—	—	14.3	33.2	12.2	12.4	12.8	11.9	12.4	12.3	—			
42.2	155.2	176.7	131.3	25.7	13.9	60.4	12.8	35.6	11.9	12.6	12.1	10.4	11.2	12.0	—			
45.2	159.6	175.4	131.0	25.3	13.8	60.9	12.2	35.0	12.6	13.8	13.2	11.4	12.2	13.6	—			
30.0	157.4	175.2	134.6	23.2	13.3	63.5	11.4	33.7	11.5	12.8	13.1	12.6	12.2	12.2	—			
—	—	177.6	137.4	22.6	16.1	61.3	12.8	32.9	11.8	12.4	12.8	13.4	12.4	13.2	—			
37.0	155.4	168.3	129.0	23.3	16.2	60.5	13.8	33.2	11.5	12.0	12.0	12.5	12.8	12.8	—			
35.9	154.2	169.0	133.7	20.9	14.4	64.7	13.0	34.4	11.5	11.6	11.9	11.4	11.5	11.9	—			
36.0	154.2	169.8	133.3	21.5	14.5	64.0	12.8	34.3	11.5	11.9	12.1	11.5	11.6	12.0	—			

Tabel II

Række	Hold	Vækstperiode I.			Vækstperiode II.			Vækstperiode III.			Alle Vækstperioder		
		omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst
		Dage	Pd. Tilvækst	Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	Dage	Pd. Tilvækst	Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	Dage	Pd. Tilvækst	Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	Dage	Pd. Tilvækst	Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst
138	C.	30	31.5	2.49	40	45.0	3.56	30	39.8	3.89	100	116.3	3.38
139	C.	—	—	—	30	28.4	4.37	30	35.2	4.43	—	—	—
140	C.	60	38.4	3.98	40	34.6	3.93	40	47.8	4.26	140	120.8	4.08
141	C 1.	50	29.5	5.21	40	36.5	3.96	40	50.6	4.23	130	116.6	4.39
	C 2.	—	—	—	40	36.0	3.87	40	44.8	3.60	—	—	—
	C 3.	50	38.0	5.40	40	44.5	4.13	30	37.0	4.41	120	119.5	4.62
142	C 1.	70	37.5	4.49	40	33.4	4.70	40	44.0	4.45	150	114.9	4.92
	C 2.	60	40.1	3.46	40	43.5	3.38	40	41.0	5.61	140	124.6	4.14
	C 3.	70	44.6	3.39	40	38.7	4.06	30	36.8	4.65	140	120.1	3.99
	C 4.	60	37.2	2.98	40	40.3	3.75	30	38.0	4.50	130	115.5	3.75
143	C 1.	50	43.8	2.97	40	40.5	4.11	30	35.0	4.92	120	119.3	3.93
	C 2.	40	39.0	3.04	40	42.7	4.29	30	38.4	4.86	110	120.1	4.06
144	C 1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	C 1.	42	32.8	3.31	42	41.4	4.06	42	48.4	4.58	126	122.6	4.06
	C 2.	56	43.1	3.74	28	35.7	3.53	28	34.0	4.66	112	112.8	3.95
	C 3.	42	35.8	3.13	42	45.8	3.77	28	35.5	4.47	112	117.1	3.61
146	C 1.	42	40.0	2.56	42	43.8	3.42	—	—	—	—	—	—
	C 2.	—	—	—	42	46.4	3.26	42	43.8	4.57	—	—	—
	C 3.	28	29.3	2.75	42	45.0	3.83	28	33.7	4.01	98	108.0	3.59
147	C 1.	70	42.2	4.42	28	36.6	3.10	42	54.5	3.91	140	133.3	3.85
	C 2.	42	31.8	3.63	42	30.0	5.35	28	45.4	3.21	112	107.2	3.94
148	C 1.	42	33.0	3.33	42	43.8	3.83	42	48.3	5.22	126	125.1	4.23
	C 2.	56	39.0	3.70	42	43.7	3.91	28	30.8	5.19	126	113.5	4.18
	C 3.	56	40.0	3.32	42	39.7	3.94	42	45.2	5.33	140	124.9	4.33
	C 4.	42	34.5	3.55	42	45.5	3.96	28	32.8	5.04	112	112.8	4.17
	C 5.	56	35.0	4.39	28	36.5	3.36	56	53.5	5.91	140	125.0	4.93
149	C 1.	56	43.8	3.76	28	32.2	3.55	28	44.3	3.53	112	120.3	3.62
	C 2.	56	39.2	4.20	28	29.2	3.91	28	38.8	3.79	112	107.2	3.97
	C 3.	42	39.0	2.93	28	37.7	3.34	28	41.6	3.93	98	118.3	3.41
150	C 1.	56	43.8	3.41	28	33.5	3.59	28	41.2	3.74	112	118.5	3.57
	C 2.	56	43.2	2.97	28	32.8	3.52	28	40.2	3.89	112	116.2	3.44
	C 3.	42	38.4	2.75	28	40.2	2.91	28	41.8	3.73	98	120.4	3.14
151	C 1.	56	45.7	3.32	42	42.1	4.10	28	36.7	3.78	126	124.5	3.72
	C 2.	56	39.9	3.33	42	40.9	4.13	28	33.7	4.19	126	114.5	3.87
	C 3.	56	45.5	3.41	42	42.1	4.10	28	36.2	3.96	126	123.8	3.81
152	C 1.	42	32.9	3.58	42	48.5	3.56	28	28.8	5.31	112	110.2	4.02
	C 2.	42	36.3	2.96	42	43.5	3.90	28	41.4	3.77	112	121.2	3.57
	C 3.	42	40.2	2.82	42	53.4	3.29	28	39.8	4.14	112	133.4	3.40

(fortsat).

Vægt ved		Vægt paa Slagteriet		pCt. Svind		pCt. Eksportflask	Tal for Flaskets Fasthed	Kroppens Længde fra Hofteskaal til Snittet ved Halsen	Points for						
Begyndelsen	Slutningen	levende	slagtet afkolet	ved Slagtning	som Affald				Bovpartiets Bygning	Rygflæskets Tykkelse	Rygflæskets Fordeling	Bugpartiets Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Finhed	Total Indtryk
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.					Tm.							
42.3	158.6	172.3	130.3	24.4	—	—	9.8	36.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	179.8	136.4	24.1	—	—	10.2	35.5	—	—	—	—	—	—	—
35.7	156.5	177.6	133.2	25.0	—	—	13.4	35.4	—	—	—	—	—	—	—
47.2	163.8	172.3	—	—	—	—	15.0	35.7	—	—	—	8.4	10.2	—	—
—	—	173.4	—	—	—	—	14.6	35.9	—	—	—	7.8	9.6	—	—
36.3	155.8	179.8	—	—	—	—	13.8	36.6	—	—	—	6.8	7.5	—	—
39.2	154.1	166.0	127.4	23.3	—	—	14.6	34.4	—	8.2	8.2	9.8	10.4	10.6	—
31.7	156.3	183.3	140.8	23.2	—	—	14.6	36.5	—	11.3	11.3	10.5	11.3	10.2	—
33.2	153.3	177.3	132.8	25.1	—	—	15.0	36.6	—	13.0	13.0	9.7	11.2	11.4	—
34.0	149.5	172.5	130.7	24.2	—	—	14.0	36.5	—	11.8	11.8	11.0	11.8	11.0	—
35.7	155.0	163.0	129.6	20.5	—	—	14.2	36.3	—	—	—	9.2	9.4	—	—
38.5	158.6	162.5	127.7	21.4	—	—	12.6	35.6	—	—	—	7.0	6.7	—	—
—	—	160.8	122.0	24.1	—	—	8.6	34.7	—	—	—	10.0	9.6	—	—
36.0	158.6	—	133.5	—	—	—	10.6	34.6	11.6	12.6	12.6	10.2	10.2	10.0	11.2
34.0	146.8	—	128.8	—	—	—	11.3	32.6	12.3	11.7	11.7	11.0	11.0	11.2	11.8
35.7	152.8	—	132.1	—	—	—	8.7	33.9	11.7	9.8	9.8	10.5	10.8	10.4	10.1
33.4	117.2	173.8	132.0	24.0	15.4	60.6	12.5	34.1	11.5	11.1	11.1	10.8	10.5	11.1	11.3
66.2	156.4	—	129.9	—	—	—	11.5	34.5	11.0	10.5	10.5	11.0	10.8	11.0	10.5
43.8	151.8	—	133.0	—	—	—	13.2	35.5	11.8	10.8	10.8	11.8	9.8	11.3	10.0
31.2	164.5	158.8	125.0	21.3	16.5	62.2	9.8	34.4	11.2	10.8	10.8	10.6	10.0	10.7	10.3
42.0	149.2	165.8	129.2	22.1	—	—	11.6	34.4	11.9	12.3	12.3	12.3	11.5	12.3	12.6
35.7	160.8	167.0	128.3	23.2	15.1	61.7	12.0	34.7	11.8	11.5	11.5	10.3	10.6	11.5	10.9
36.0	149.5	170.2	133.5	21.6	15.7	62.7	13.0	34.5	11.7	11.5	11.5	11.4	11.0	11.1	11.2
30.5	155.4	172.5	133.7	22.5	15.2	62.3	13.5	34.8	11.5	12.3	12.3	11.0	11.0	10.9	11.4
43.5	156.3	163.7	124.8	23.8	15.6	60.6	12.5	33.5	12.3	11.4	11.4	11.3	10.5	11.7	11.3
36.8	161.8	156.7	120.7	23.0	15.4	61.6	13.7	34.2	11.4	11.8	11.8	10.7	10.7	11.2	11.1
36.2	156.5	168.5	132.2	21.5	14.4	64.1	12.5	33.8	11.9	11.3	11.3	11.6	11.4	11.5	11.8
36.8	144.0	165.7	130.3	21.4	14.2	64.4	11.3	33.2	11.6	11.2	11.2	11.6	11.4	11.5	11.3
34.5	152.8	163.3	124.0	24.1	13.5	62.4	13.3	33.7	11.7	11.6	11.6	10.8	11.3	10.7	10.9
36.5	155.0	169.8	133.6	21.3	13.3	65.4	8.6	33.1	11.3	12.1	12.7	11.7	10.6	11.3	—
30.8	147.0	158.0	124.8	21.0	13.8	65.2	11.7	34.3	11.2	10.9	11.7	11.9	10.4	11.3	—
35.0	155.4	184.0	142.0	22.8	14.9	62.3	12.4	36.6	10.1	11.1	12.1	10.9	8.8	9.2	—
34.5	159.0	170.7	132.0	22.7	15.2	62.1	13.5	34.1	11.0	11.1	11.2	10.9	10.9	11.4	—
33.8	148.3	179.0	137.3	23.3	14.7	62.0	12.5	35.3	11.1	12.0	11.7	10.6	10.4	11.2	—
36.2	160.0	174.7	134.2	23.2	14.2	62.6	13.0	34.5	11.2	12.3	12.2	10.0	10.9	11.1	—
38.3	148.5	165.2	127.8	22.6	14.9	62.5	9.0	33.4	10.3	11.4	11.8	9.4	10.4	8.6	—
40.7	161.9	—	133.4	—	—	—	8.6	34.6	11.7	12.3	12.9	11.4	9.2	10.9	—
31.2	164.6	—	144.6	—	—	—	9.8	35.3	10.6	11.7	12.2	10.3	10.5	10.9	—

Tabel II

Række	Hold	Vækstperiode I.			Vækstperiode II.			Vækstperiode III.			Alle Vækstperioder		
		omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst
		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst	
153	C 1.	42	36.6	3.03	42	44.6	3.60	28	38.0	3.73	112	119.2	3.47
	C 2.	42	36.0	3.28	42	47.8	3.55	28	38.7	3.82	112	122.5	3.56
155	C 1.	56	34.3	4.14	42	43.2	4.44	42	49.8	4.85	140	127.3	4.54
	C 2.	56	41.2	3.93	42	45.2	4.15	28	27.8	5.62	126	114.2	4.43
157	C 3.	56	38.4	3.41	42	51.6	3.71	28	37.5	4.08	126	127.5	3.73
	C 1.	42	34.5	2.74	42	43.0	3.42	28	39.3	3.63	112	116.8	3.29
158	C 2.	70	46.5	3.83	42	36.3	4.21	42	47.2	4.24	154	130.0	4.08
	C 3.	56	41.6	3.22	42	44.0	3.33	42	43.8	4.55	140	129.4	3.71
159	C 4.	56	43.4	3.07	42	41.5	3.56	28	36.0	3.54	126	120.9	3.38
	C 1.	56	42.6	3.07	28	38.0	3.15	28	36.2	4.04	112	116.8	3.40
161	C 2.	42	37.3	2.88	28	38.2	3.09	42	50.6	4.33	112	126.1	3.53
	C 3.	42	35.0	3.10	28	37.8	3.12	28	33.9	4.27	98	106.7	3.48
162	C 1.	28	31.5	2.93	28	33.2	3.46	28	35.8	4.01	84	100.5	3.49
	C 2.	42	45.2	2.99	28	35.6	3.34	28	35.2	4.12	98	116.0	3.43
163	C 3.	28	29.2	3.16	28	32.0	3.65	28	37.6	3.69	84	98.8	3.52
	C 4.	42	42.2	3.29	28	33.8	3.56	28	34.2	4.26	98	110.2	3.68
164	C 1.	42	37.6	2.23	28	28.4	2.89	42	52.0	3.35	112	118.0	2.88
	C 2.	56	39.4	2.42	28	38.0	2.94	28	40.4	4.04	112	117.8	3.14
165	C 3.	56	40.4	2.48	42	47.8	2.98	28	36.1	3.68	126	124.3	3.02
	C 1.	56	44.5	3.63	28	38.6	3.45	28	29.4	5.24	112	112.5	3.10
166	C 2.	56	35.5	4.12	42	51.0	3.30	42	41.4	5.75	140	127.9	4.32
	C 3.	42	41.5	3.08	28	34.5	3.46	42	48.2	5.01	112	124.2	3.93
167	C 4.	56	37.8	3.76	42	46.8	3.60	42	49.5	4.88	140	134.1	4.12
	C 1.	56	48.8	2.68	28	32.6	3.72	28	46.0	3.55	112	127.4	3.25
168	C 2.	56	46.2	2.83	28	35.0	3.47	28	44.0	3.71	112	125.2	3.32
	C 3.	56	43.0	3.04	28	33.4	3.63	28	46.2	3.53	112	122.6	3.39
169	C 4.	42	39.2	2.64	28	32.4	3.40	28	38.6	4.01	98	110.2	3.34
	C 5.	42	36.6	3.02	28	36.7	3.31	28	48.6	3.42	98	121.9	3.26
170	C 1.	70	42.7	4.57	42	41.0	4.20	28	32.0	4.86	140	115.7	4.53
	C 2.	70	44.6	4.47	28	24.7	5.02	42	49.2	4.41	140	118.5	4.56
171	C 3.	56	36.0	4.12	42	4.55	3.48	28	28.5	4.92	126	110.0	4.06
	C 4.	56	37.0	3.97	42	40.0	3.54	28	33.1	3.68	126	110.1	3.72
172	C 1.	28	26.8	3.45	28	32.6	3.54	28	40.0	3.62	84	99.4	3.65
	C 2.	28	28.8	3.21	42	46.4	3.89	42	49.7	4.68	112	124.9	4.05
173	C 3.	28	30.6	3.02	42	48.4	3.80	28	42.7	3.92	98	121.7	3.65
	C 4.	42	39.6	3.39	42	49.6	3.68	28	35.4	4.35	112	124.6	3.78
174	C 1.	28	26.0	3.43	42	49.0	3.75	28	32.3	4.71	98	107.3	3.96

(fortsat).

Vægt ved		Vægt paa Slagteriet		pCt. Svind		pCt. Eksportflæsk	Tal for Flæskest Fæsthed	Kroppens Længde fra Hovestkna til Sittet ved Halsen	Points for							
Begyndelsen	Slutningen	levende	slagtet afkølet	ved Slagtning	som Affald				Borpartiets Bygning	Ryg-flæskestets		Borpartiets Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Finhed	Total Indtryk	
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	ved	som	pCt.	Tal	Tm.		Tykkelse	Fordeling					
32.4	151.6	178.0	139.0	21.9	14.5	63.6	11.6	35.4	10.9	11.7	11.2	10.2	9.9	11.5	—	
40.6	163.1	174.6	136.4	21.9	14.3	63.8	11.0	35.0	10.7	10.9	11.9	12.1	9.1	11.6	—	
36.6	163.9	169.3	135.3	20.1	14.9	65.0	13.3	34.5	10.7	12.2	11.9	11.5	10.8	11.7	—	
37.2	151.4	177.2	141.6	20.1	15.3	64.6	11.6	35.0	10.0	11.0	11.1	11.2	8.9	10.3	—	
32.0	159.5	160.8	124.8	22.4	13.9	63.7	12.0	34.8	10.9	9.8	11.1	9.3	10.8	10.2	—	
34.8	151.6	169.7	129.3	23.8	15.7	60.5	12.0	34.7	10.8	9.8	10.5	9.7	8.9	11.1	8.3	
31.7	161.7	174.7	133.3	23.7	15.9	60.4	12.0	35.2	11.8	12.6	12.4	10.8	11.4	11.8	11.8	
33.5	162.9	175.8	134.8	23.3	15.7	61.0	13.0	34.1	11.2	10.3	11.2	10.6	10.3	10.7	10.8	
30.3	151.2	178.5	136.7	23.4	15.9	60.7	12.3	34.9	11.9	13.2	13.4	12.2	11.0	11.6	11.8	
35.0	151.8	177.8	140.4	21.0	14.2	64.8	10.2	33.5	11.3	11.3	12.3	10.5	11.4	12.0	11.7	
32.7	158.8	168.5	132.0	21.7	15.6	62.7	12.2	34.5	11.6	12.2	12.2	11.3	10.2	10.2	10.6	
36.3	143.0	183.2	143.7	21.6	14.7	63.7	12.8	34.8	11.2	12.2	12.3	12.0	10.2	10.9	11.7	
45.5	146.0	178.8	141.8	20.7	15.4	63.9	11.3	34.5	10.6	10.5	10.6	12.4	11.2	10.2	10.2	
38.0	154.0	180.8	141.2	21.9	14.9	63.2	11.8	35.5	11.2	12.8	13.1	12.5	10.6	11.3	11.7	
50.4	149.2	173.4	134.2	22.6	15.0	62.4	13.4	34.1	11.1	11.9	12.9	11.1	11.4	12.3	11.9	
38.8	149.0	165.0	125.0	24.2	15.6	60.2	12.0	34.7	13.0	13.3	13.7	12.0	12.3	12.7	12.0	
40.2	158.2	184.5	146.3	20.7	15.2	64.1	12.8	34.5	10.9	11.7	12.1	10.3	10.3	10.5	—	
37.0	154.8	157.3	125.0	20.5	15.1	64.4	12.7	33.8	11.4	12.8	12.9	11.1	11.0	11.2	—	
32.3	156.6	—	136.8	—	—	—	12.3	34.5	10.9	10.7	11.2	11.3	10.1	11.0	—	
36.0	148.5	159.0	119.5	24.8	14.5	60.7	9.0	33.0	9.8	9.2	11.3	9.3	8.0	8.5	7.3	
34.8	162.7	162.0	121.8	24.8	15.9	59.3	9.3	33.7	10.8	8.8	11.3	9.2	9.2	10.3	9.3	
37.3	161.5	167.8	130.0	22.5	15.3	62.2	11.5	33.1	11.1	12.3	12.8	11.3	10.7	12.3	11.8	
33.6	167.7	161.8	120.5	25.5	14.2	60.3	9.3	32.7	11.3	12.1	11.9	10.8	10.6	12.5	11.8	
32.0	159.4	171.6	138.0	19.6	15.1	65.3	12.6	34.1	11.8	12.2	12.6	12.5	11.5	12.0	12.0	
34.2	159.4	167.2	132.4	20.8	16.2	63.0	14.2	34.0	11.8	12.6	12.5	11.3	10.5	11.5	11.3	
36.0	158.6	167.4	134.4	19.7	16.6	63.7	12.4	34.6	12.3	12.8	13.1	10.9	10.6	12.0	11.3	
40.6	150.8	178.0	140.4	21.1	15.5	63.4	12.7	34.3	12.2	12.5	13.2	11.9	12.5	12.0	12.3	
34.7	156.6	168.3	137.0	18.6	15.6	65.8	13.0	32.8	11.8	11.8	12.1	11.9	12.2	11.9	11.7	
35.0	150.7	171.8	130.8	23.9	—	—	10.2	3.31	11.3	10.6	11.1	11.4	10.8	11.0	10.6	
36.7	155.2	171.0	135.0	21.1	—	—	12.5	34.1	11.4	12.4	12.3	12.0	12.0	11.1	11.7	
37.3	147.3	171.2	129.8	24.0	—	—	10.3	33.7	11.4	11.5	11.5	11.4	10.6	10.6	10.4	
37.7	147.8	159.2	127.5	19.9	19.7	60.4	10.2	34.1	11.4	11.4	11.5	11.0	11.0	11.1	10.8	
45.6	145.0	174.0	136.8	21.4	16.0	62.6	12.5	33.6	11.8	11.6	12.8	11.8	11.3	11.9	12.0	
39.2	164.1	169.3	132.8	21.6	17.1	61.3	11.3	33.6	11.6	11.1	11.8	11.7	11.5	11.8	11.3	
44.0	165.7	170.0	136.8	19.5	17.1	63.4	10.8	34.7	11.8	12.7	12.1	12.5	11.3	11.6	12.1	
31.0	155.6	164.5	132.8	19.3	—	—	13.5	34.1	11.7	12.5	12.6	11.9	12.2	11.8	11.7	
44.5	151.8	182.5	133.5	26.9	13.8	59.3	13.3	35.5	12.3	12.5	13.3	11.0	11.0	13.8	12.5	

Tabel II

Række	Hold	Vækstperiode I.			Vækstperiode II.			Vækstperiode III.			Alle Vækstperioder		
		omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst
		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst	
166	C 2.	56	42.2	3.83	42	40.0	3.85	28	34.4	3.89	126	116.6	3.86
	C 3.	28	27.4	3.22	42	51.0	3.52	28	32.0	4.99	98	110.4	3.87
	C 4.	28	31.0	3.01	28	30.2	3.98	42	43.2	5.36	98	104.4	4.27
	C 5.	42	42.0	3.00	42	36.6	4.97	28	33.2	4.27	112	111.8	4.02
	C 6.	28	31.3	2.93	28	31.7	3.73	42	55.1	4.11	98	118.1	3.69
	C 1.	28	22.0	3.19	42	41.8	3.85	42	41.8	4.92	112	105.6	4.14
	C 2.	28	21.5	3.27	28	37.0	3.09	28	34.2	4.16	84	92.7	3.53
	C 3.	42	42.6	3.02	28	29.0	4.09	28	36.0	3.99	98	107.6	3.63
170	C 4.	42	46.3	2.52	28	29.3	3.58	28	36.4	3.59	98	112.0	3.15
	C 5.	42	37.2	2.67	42	45.4	3.79	28	30.6	4.70	112	113.2	3.67
	C 1.	56	41.0	2.99	28	34.6	3.13	28	35.0	3.79	112	110.6	3.28
	C 2.	56	30.0	3.78	42	43.0	3.90	42	31.8	6.96	140	104.8	4.79
	C 3.	42	36.4	3.13	28	33.0	3.28	42	44.0	4.45	112	113.4	3.69
160	C 4.	42	31.6	2.87	42	45.3	3.76	42	43.7	5.20	126	120.6	4.05
	C 1.	42	33.8	3.13	28	33.4	3.55	28	39.4	4.03	98	1.066	3.59
	C 2.	56	41.8	3.45	28	37.4	3.44	28	37.0	4.44	112	116.2	3.76
	C 3.	56	41.2	3.50	28	35.6	3.62	42	49.4	5.21	126	126.2	4.20
	C 4.	56	47.6	3.00	28	32.2	4.06	28	38.2	4.41	112	118.0	3.75
	C 5.	42	41.6	2.88	28	35.8	3.65	28	35.0	4.81	98	112.4	3.73
	C 6.	42	38.2	3.10	42	52.6	3.86	28	33.0	5.32	112	123.8	4.01
	C 7.	42	37.2	3.0	42	46.8	4.19	28	33.2	5.03	112	117.2	4.05
164	C 1.	42	37.2	2.56	28	36.6	3.12	42	50.6	4.90	112	124.4	3.67
	C 2.	42	43.8	2.81	28	37.8	3.62	28	32.8	5.23	98	114.4	3.77
	C 3.	42	44.6	2.76	28	38.2	3.58	28	29.0	5.92	98	111.8	3.86
	C 4.	42	33.6	3.67	42	48.4	3.88	28	32.2	5.33	112	114.2	4.22
	C 5.	28	30.2	3.23	28	41.0	3.40	28	35.2	4.83	84	106.4	3.84
167	C 6.	28	32.4	2.71	28	39.6	3.56	28	37.0	4.57	84	109.6	3.65
	C 1.	28	29.4	2.61	42	53.6	3.50	28	38.2	4.31	98	121.2	3.54
	C 2.	42	37.0	2.80	42	50.0	3.75	28	37.0	4.45	112	124.0	3.68
	C 3.	42	41.2	2.83	42	46.0	4.20	28	39.4	4.43	112	126.6	3.82
	C 4.	42	31.8	3.26	42	49.8	3.77	28	37.8	4.36	112	119.4	3.81
	C 5.	42	32.4	3.20	42	50.8	3.69	28	36.2	4.55	112	119.4	3.81
168	C 6.	42	42.2	3.13	28	32.2	4.11	28	37.0	4.45	98	111.4	3.85
	C 7.	42	41.8	2.99	28	32.8	4.13	28	40.0	4.36	98	114.6	3.71
	C 1.	42	24.4	5.42	42	35.8	4.91	42	45.0	5.37	126	105.2	4.27
	C 2.	56	32.0	4.59	42	34.8	4.91	42	53.7	4.43	140	120.5	4.61
	C 3.	70	43.8	3.50	42	36.5	3.64	42	42.8	4.17	154	123.1	3.77

(fortsat).

Vægt ved		Vægt paa Slagteriet		pCt. Svind		pCt. Eksporthæsk	Tal for Flæskets Faasthed	Kroppens Længde fra Hofteskaal til Snittet ved Halsen	Points for						
Begyndelsen	Slutningen	levende	slagtet afkølet	ved Slagtning	som Affald				Bovpartiets Bygning	Ryg-flæskets		Bovpartiets Form og Fylde	Skinkeens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Færdighed	Total Indtryk
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.				Tm.		Tykkelse	Fordeling					
35.5	152.1	190.0	143.0	24.7	—	61.2	13.7	35.0	11.0	11.8	12.2	12.2	11.3	11.8	11.7
48.4	158.8	176.2	127.8	27.5	13.7	58.8	12.8	35.0	11.8	12.4	12.7	10.2	11.5	12.5	12.0
47.4	151.8	177.8	133.5	24.9	15.5	59.6	13.3	34.9	11.6	12.5	12.6	12.8	11.4	12.4	12.3
38.2	150.0	172.2	126.2	26.7	—	58.8	10.2	34.4	11.6	8.6	10.6	7.1	10.9	9.8	10.3
43.5	161.6	172.0	129.8	24.5	16.2	59.3	13.5	35.0	12.3	13.4	12.9	12.3	11.9	12.1	12.8
51.0	156.6	174.3	131.0	24.8	13.9	61.3	11.8	34.1	11.1	12.0	11.6	10.8	10.1	11.6	11.6
53.5	146.2	187.5	141.5	24.5	14.0	61.5	12.0	34.8	11.5	11.3	12.3	10.3	10.9	11.6	11.9
37.6	145.2	177.0	131.8	25.5	14.7	5.98	9.0	32.9	10.4	9.6	10.4	9.0	10.4	10.2	10.2
32.7	144.7	170.3	127.0	25.4	14.1	60.5	12.3	33.0	11.2	12.3	12.2	10.8	10.7	11.7	11.8
31.4	144.6	171.4	126.0	26.5	15.0	58.5	8.0	34.3	10.8	10.6	11.8	10.0	9.7	10.5	10.6
34.2	144.8	181.4	136.4	24.8	15.3	59.9	12.6	33.9	12.0	11.8	12.0	11.6	11.6	12.0	11.8
41.0	145.8	174.7	132.0	24.4	16.6	59.0	12.0	33.9	11.7	11.0	12.3	12.3	11.3	11.3	11.3
36.0	149.4	189.7	141.3	25.5	15.8	58.7	12.3	34.1	11.3	10.7	11.7	11.7	10.7	10.7	10.7
37.7	158.3	180.7	137.3	24.0	16.2	59.8	12.3	33.3	11.7	12.7	12.3	13.0	12.7	11.0	11.7
42.2	148.8	180.4	133.0	26.3	12.1	61.6	12.6	34.8	11.2	11.8	12.7	11.1	11.3	11.2	11.9
38.2	154.4	171.5	127.8	25.5	11.2	63.3	12.3	34.4	10.8	10.8	11.5	11.6	12.5	11.9	11.3
35.4	161.6	179.5	136.5	23.9	12.0	64.1	11.5	34.3	10.4	11.8	11.8	11.6	10.8	11.1	11.9
32.0	150.0	171.6	128.4	25.2	12.6	62.2	10.4	33.8	10.4	11.7	12.0	11.5	10.6	11.1	11.4
36.4	148.8	185.4	139.0	25.0	11.9	63.1	11.2	35.4	10.3	10.6	10.3	11.9	10.4	9.9	11.2
33.4	157.2	174.4	128.0	26.6	12.3	61.1	10.4	34.5	10.4	10.5	10.6	10.4	10.9	9.7	10.7
33.4	150.6	164.0	121.3	26.0	12.0	62.0	12.7	34.1	10.7	11.3	11.8	10.0	10.0	11.3	11.5
34.2	158.6	166.8	127.4	23.6	16.0	60.4	7.6	33.7	11.6	10.9	12.3	9.4	10.2	10.8	10.2
37.6	152.0	163.0	125.8	22.8	—	—	11.8	33.8	11.6	12.6	13.0	11.2	10.8	10.7	10.9
35.6	147.4	166.0	128.8	22.4	—	—	11.4	32.9	11.5	12.0	11.8	10.1	10.3	11.7	11.4
38.0	152.2	163.4	126.8	22.4	—	—	10.6	32.1	11.4	11.6	11.9	10.5	10.9	11.7	11.0
39.2	145.6	161.3	125.3	22.3	—	—	13.8	33.3	11.7	12.0	12.9	11.0	10.9	11.4	11.4
50.4	160.0	170.8	132.0	22.7	—	—	14.0	33.5	11.5	12.1	12.6	11.5	11.2	12.1	11.8
37.0	158.2	176.8	133.2	24.7	14.8	60.5	7.8	34.7	10.3	10.0	11.9	9.6	9.9	10.5	10.1
31.2	155.2	177.6	136.2	23.3	13.6	63.1	11.6	34.6	11.0	11.7	12.5	11.5	11.3	11.9	12.3
34.2	160.8	168.6	124.4	26.2	14.6	59.2	12.8	33.5	11.3	12.9	13.1	11.6	11.5	12.1	12.0
33.6	153.0	178.6	134.8	24.5	14.6	60.9	12.0	33.9	11.0	12.3	12.5	11.1	10.7	11.6	11.6
34.0	153.4	177.6	133.8	24.7	15.1	60.2	13.2	33.5	11.3	12.1	12.5	11.5	11.3	11.8	11.9
36.6	148.0	172.4	128.4	25.5	14.5	60.0	13.0	33.3	11.3	12.6	12.8	11.4	11.4	11.7	11.8
33.6	148.2	179.8	134.6	25.1	16.0	58.9	13.2	34.2	11.8	12.9	13.2	12.1	11.3	12.4	12.6
53.3	158.5	183.7	135.8	26.1	14.8	59.1	10.8	34.2	12.1	12.4	12.4	11.7	11.8	12.1	12.3
41.0	161.5	181.8	135.0	25.7	15.0	59.3	12.0	33.8	12.1	12.3	12.7	12.4	10.9	11.8	12.2
36.9	160.0	178.5	133.3	25.3	16.1	58.6	12.8	34.0	11.8	11.5	11.8	12.8	13.3	13.0	11.9

Tabel II

Række	Hold	Vækstperiode I.			Vækstperiode II.			Vækstperiode III.			Alle Vækstperioder		
		omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst	omfatter Antal		Beregnet Korn pr. Pd. Tilvækst
		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst		Dage	Pd. Tilvækst	
169	C 4.	70	41.8	4.35	42	43.5	4.22	28	32.2	4.80	140	117.5	4.42
	C 5.	70	46.5	4.00	28	30.5	4.11	42	47.8	4.89	140	124.8	4.36
	C 6.	56	32.4	4.15	42	48.8	3.50	28	35.8	4.17	126	117.0	3.88
	C 1.	28	21.4	3.80	56	47.3	4.57	28	34.8	4.28	112	103.5	4.31
	C 2.	56	39.2	3.65	42	38.3	4.31	28	30.7	4.96	126	108.2	4.25
	C 3.	84	34.5	6.00	42	44.2	4.18	28	34.5	4.46	154	113.2	4.82
	C 4.	42	32.0	3.67	42	38.0	4.39	28	33.3	4.30	112	103.3	4.13
	C 5.	42	30.0	3.62	56	49.4	4.35	42	31.9	6.34	140	111.3	4.72
	C 6.	56	39.2	3.78	42	44.3	3.95	28	29.1	5.31	126	112.6	4.24
Gns. 138—159		49.5	38.4	3.41	37.1	40.0	3.74	32.4	40.1	4.33	118.7	118.4	3.84
Gns. 138—170		47.7	37.7	3.34	36.2	39.5	3.70	32.6	39.9	4.34	116.2	117.2	3.82
Gns. 138—169		47.6	37.5	3.36	36.5	40.0	3.76	32.2	39.3	4.44	116.0	116.7	3.86

Ved nu i Tab. III at sammenstille Gennemsnitstallene fra nævnte Rækker faar vi at se, hvorledes de 3 Afdelinger stiller sig over for hinanden; men det er jo en given Sag, hvad ogsaa fremgaar af Tabellen, at der er en ikke ringe Variation mellem A-Holdene indbyrdes, baade i Retning af Trivsel og Kvalitet, og det samme gælder tillige for B- og C-Holdenes Vedkommende, saa der kunde maaske ved en Sammenstilling som denne være Grund til at udelade de Hold, der har en særlig dyr eller en særlig billig Produktion, eller som har givet en Kvalitet, der i en eller anden Retning afviger fra det almindelige; men da saadanne Afvigelser findes inden for alle Afdelinger, og det tilmed, naar man skal skyde ud, altid bliver vilkaarligt, hvad der skal tages med, og hvad der skal udelades, og vi endvidere er af den Mening, at Materialet er saa omfattende, at det giver et noget nær paa-lideligt Billede af Forholdene, som de er i Praxis, har vi fore-

(fortsat).

Vægt ved		Vægt paa Slagteriet		pCt. Svind		pCt. Eksportflæsk	Tal for Flæskets Fasthed	Kroppens Længde fra Hoftekaal til Snittet ved Halsen	Points for						
Begyndelsen	Slutningen	levende	slagtet afkolet	ved Slagtning	som Affald				Bovpartiels Bygning	Ryg-flæskets		Bugpartiets Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Finhed	Total Indtryk
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.				Tm.		Tykkelse	Fordeling					
38.0	155.5	181.7	133.7	26.4	16.0	57.6	11.3	34.5	12.0	12.3	12.9	12.0	10.6	11.7	11.3
33.7	158.5	180.3	136.7	24.2	15.6	60.2	13.2	34.1	12.3	12.2	12.4	12.5	12.1	11.6	12.1
37.2	154.2	173.5	125.3	27.8	15.0	57.2	11.3	35.0	11.6	11.4	12.1	10.9	11.1	12.1	10.9
50.3	153.8	181.8	136.0	25.2	16.1	58.7	12.2	35.4	11.7	12.7	12.3	12.0	11.2	12.5	12.2
37.0	145.2	182.4	140.2	23.1	16.6	60.3	11.4	34.3	11.2	12.6	12.8	11.8	12.0	11.8	12.2
41.8	155.0	176.8	130.0	26.5	16.2	57.3	11.0	34.6	11.4	10.0	11.2	10.2	10.0	10.6	9.8
46.0	149.3	178.2	136.2	23.6	16.3	60.1	12.7	34.6	11.0	11.7	12.3	11.7	11.8	12.7	11.8
41.3	152.6	171.3	127.3	25.7	16.4	57.9	10.8	33.9	11.8	11.7	12.5	11.3	10.7	11.2	10.8
39.0	151.6	170.0	126.8	25.4	15.9	58.7	11.5	34.8	11.8	10.8	11.8	12.0	10.8	12.3	10.8
36.5	154.9	171.1	132.9	22.3	15.0	62.7	12.2	34.8	11.3	11.4	11.7	10.7	10.4	11.1	11.1
37.3	154.5	171.1	132.7	22.8	15.2	62.0	12.0	34.5	11.4	11.5	11.9	10.9	10.6	11.2	11.2
37.6	154.3	173.2	132.5	23.5	15.0	61.5	11.9	34.4	11.3	11.5	12.0	11.0	10.8	11.3	11.3

trukket at medtage alle Hold inden for hver Afdeling, og anstille Betragtninger paa Materialet, som det foreligger.

I Tab III er opført de Tal, som vedrører Dyrenes Udvikling og Trivsel, og af Kolonnerne 1—9, som omhandler hver af de 3 Vækstperioder enkeltvis, fremgaar, at selv om der ikke er store Udslag i nogen Retning, viser der sig dog en Antydning af, at Yorkshiresvinene ikke alene i hver Periode bruger længere Tid til at producere samme Tilvækst som de to andre Afdelinger, men at de tilmed ogsaa bruger lidt mere Foder til et Pd. Tilvækst. Krydsningerne og Landracesvinene staar hinanden nær i alle Forhold.

I Kolonnerne 10, 11, 12 er Tallene fra alle 3 Vækstperioder samlede under ét. At Tallene her ikke stemmer

Tabel III. Uddrag af Tabel II for Rækkerne 138—153, 155, 157, 158, 159. (Trivsel.)

Afdeling	Vækstperiode									Vækstperioderne samlet		
	I			II			III					
	Antal Dage	Pd Tilvækst	F-E pr Pd Tilvækst	Antal Dage	Pd Tilvækst	F-E pr Pd Tilvækst	Antal Dage	Pd Tilvækst	F-E pr Pd Tilvækst	Antal Dage	Pd Tilvækst	F-E pr Pd Tilvækst
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	50.2	38.3	3.48	40.3	40.8	3.85	35.2	41.2	4.36	125.5	120.5	3.91
B	49.7	38.6	3.43	38.1	40.7	3.74	32.8	39.6	4.30	120.2	118.3	3.85
C	49.5	38.4	3.41	37.1	40.0	3.74	32.1	40.1	4.33	118.7	118.4	3.84

ganske overens med Summerne fra de enkelte Vækstperioder, har sin Grund i, at ved et Par af Rækkerne har Dyrene ved Forsøgets Begyndelse været saa store, at de har været ude over Vægten for Vækstperiode I, hvorfor de jo godt kan indgaa i Perioderne II og III enkeltvis, men maa udelades i den Sammenstilling, der omfatter samtlige 3 Vækstperioder.

Det fremgaar nu af Tallene for de samlede Vækstperioder, at A har brugt 125,5 Dage for at producere 120,5 Pd Tilvækst, og at der til hvert Pd er medgaaet 3,91 F-E. B har til 118,3 Pd Tilvækst brugt 120,2 Dage og udviser et Forbrug af 3,85 F-E til 1 Pd Tilvækst, og endelig har C til Produktion af 118,4 Pd Tilvækst brugt 118,7 Dage med 3,84 F-E til hvert Pd Tilvækst.

Omregnet pr 120 Pd Tilvækst skulde der derefter for hver af de 3 Afdelinger medgaa følgende Antal Dage og Foderenheder:

A	producerer 120 Pd Tilvækst i 125	Dage for 469 F-E
B	— 120	— i 122 — - 462 —
C	— 120	— i 120 — - 461 —

Forskellen bliver da, at A bruger 5 Dage og 8 F-E; og B 2 Dage og 1 F-E mere til Produktion af 120 Pd Tilvækst end C.

Vi vil dernæst paa lignende Maade betragte de vigtigste af de Tal, som hidrører fra Observationerne ved Dyrenes Slagting paa Slagteriet, og samler i nedenstaaende Tabel IV de Gennemsnitstal fra Tab II, som vedrører disse Forhold.

Tabel IV. Uddrag af Tabel II for Rækkerne 138—153. 155, 157, 158 og 159. (Kvalitet af Flæsk.)

Af- deling	Vægt pr Slagtning		pCt Svind		pCt Eksport Flæsk	Tal for Flæskets Fasthed	Kroppens Længde fra Hofteskaal til Snit ved Halsen	Points for					
	levende	slagtet afkølet	ved Slagtning	som Affald				Bovparti	Rygflæskets		Bugpartiets Form og Fylde	Skinke's Form og Størrelse	Hoved, Ben og Svarenes Finhed
									Tykkelse	Fordeling			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	168.2	134.5	20.1	14.2	65.7	12.9	34.2	11.3	11.3	11.4	11.9	12.2	12.1
B	169.0	133.7	20.9	14.4	64.7	13.0	34.4	11.5	11.6	11.9	11.4	11.5	11.9
C	171.1	132.9	22.3	15.0	62.7	12.2	34.8	11.3	11.4	11.7	10.7	10.4	11.1

Ved de første Forsøgsrækker er der ikke foretaget saa mange Vejninger eller Karaktergivninger som ved de senere Rækker — se Tab II —; thi medens saaledes Tal for Flæskets Fasthed gælder for alle Hold uden Undtagelse, er Tildeling af Points for Bug og Skinke først begyndt ved Række 141, og for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling gives der fra Række 142 en Fælleskarakter; men fra Række 150 faar hver af disse for Kvaliteten saa betydningsfulde Egenskaber hver sin Karakter. Fælleskarakteren fra Række 142 til 149 er af Hensyn til senere Sammenligninger i Tab II opført baade for Rygflæskets Tykkelse og Rygflæskets Fordeling. Vejning af de til Eksport tilskaarne Sider er ikke begyndt før ved Række 147, men da de samme Observationer dog — paa et Par Undtagelser nær — er foretaget ved alle Hold fra samme Forsøg, betragter vi Sammenstillingen, som den er foretaget, for at være berettiget, selv om saa ogsaa Tallene for Flæskets Fasthed hidrører fra flere Forsøgsrækker end Tallene for Flæskets Fordeling, for Eksportflæsk o. s. v.

Efter Ankomsten til Slagteriet vejes Dyrene først levende, og af Kolonne 1 fremgaar, at da vejede B ($169,0 \div 168,2$) 0,8 Pd og C ($171,1 \div 168,2$) 2,9 Pd mere end A. Efter Slagtningen vejes de straks, medens de endnu ere varme, og igen den følgende Dag, efter at de er afkølede, og det er denne sidste Vægt, som opført i Kol 2 viser, at nu er Forholdet omvendt, idet B nu vejer ($134,5 \div 133,7$) 0,8 Pd og C ($134,5 \div 132,9$) 1,6 Pd mindre end A; men naar B og C har haft større

levende Vægt og mindre Slagtevægt end A, maa de selvfølgelig have haft større Svind ved Slagtningen, hvilket ogsaa fremgaar af Kol 3, hvor Slagtesvindet, udregnet i pCt, viser, at A har 20,1, B 20,9 og C 22,3 pCt. Svind.

Inden den slagtede Krop er færdig til Saltning, maa den først beskæres for det saakaldte Affald, som er en mindre værdifuld Vare, og hvortil hører Hoved, Fedt, Ben m. m. Disse Dele er vejede hver for sig, og Vægten heraf saavel som hvor stor en Procentdel de tilsammen udgør af Svinets levende Vægt, er opført i Hovedtabellerne, og det er denne sidste procentvise Mængde, der opført i ovenstaaende Kol 4 viser, at medens Affaldet for A udgør 14,2, er det for B 14,4 og for C 15,0 pCt.

Naar Slagterisvindet er fraregnet, Affaldet fravejet, og Kroppen tilskaaret og afpudset, bliver tilbage det egentlige Bacon, hvilket i Hovedtabellerne er opført som det slagtede Dyrs tilskaarne Vægt; af denne og levende Vægt paa Slagteriet er udregnet pCt Eksportflæsk, som er opført i Kol 5 med 65,7 for A, 64,7 for B, men kun 62,7 for C. Altsaa har B givet 1,0, men C 3,0 pCt mindre salgbart Flæsk end A; hvilket maa betragtes som en ret betydelig Forskel.

I Kol 6 er opført Gennemsnitspoints for Flæskets Fasthedsgrad, men nogen synderlig Forskel mellem de tre Afdelinger er her ikke at spore. A og B staar hinanden nær med henholdsvis 12,9 og 13,0 Points, hvorimod C kun har opnaaet 12,2 Points.

Kol 7, som angiver Kroppens Længde fra Snittet ved Halsen til Hofteskaalen, viser, at B er 0,2 og C 0,6 Tomme længere end A, men det er jo en forsvindende Forskel, naar Længden i sin Helhed er ca. 34 Tommer.

Hvad dernæst Pointstildelingen for Dyrenes Kropbygning og Flæskets Aflejring angaar, da findes Tallene herfor opført i Kolonnerne 8—13.

For Bovpartiets Bygning er Tallene for A, B, C henholdsvis 11,3, 11,5, 11,3, for Rygflæskets Tykkelse 11,3, 11,6, 11,4, og for Rygflæskets Fordeling 11,4, 11,9, 11,7. Afvigelseerne inden for Afdelingerne er kun smaa, men de giver dog alle Udslag til Fordel for B.

Større er Afvigelseerne for de for en Eksportvare saa betydningsfulde Partier som Bugen, Skinkerne, samt Knokkelbygningens Finhed.

Af Kol 11, som angaar Karaktererne for Bugens Form og Fylde, fremgaar, at A har 11,9, B 11,4, men C kun 10,7 Points. C har altsaa 1,2 Points mindre end A, og 0,7 mindre end B, hvilket maa betragtes som en væsentlig Forskel, men endnu større er Afvigelserne i Kol 12, hvor Points for Skinkens Form og Fylde er opført; thi der har A 12,2, B 11,5, og C kun 10,4; her er B 0,7, men C 1,8 lavere i Points end A.

Endvidere er i Kol 13 opført Karakterer for Hoved, Ben og Sværens Finhed, hvor A og B har henholdsvis 12,1 og 11,9, men C kun 11,1 Points, saa ogsaa i dette Forhold er C lavere, end baade A og B.

Naar vi nu af det foregaaende vil sammendrage de Forskelle, som har Betydning for det slagtede Dyrs Værd som Handelsvare, og vi betragter A som en Standard, med hvilken vi sammenligner B og C, kommer vi i nedenstaaende Sammenstilling til det Resultat, som er opført i Tabel V.

Tabel V.

	Eksportflæsk pCt	Points for			Bugens Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Finhed
		Flæskets Fæstethed	Rygflæskets				
			Tykkelse	Fordeling			
B.mere eller mindre end A.	÷ 1.0	+ 0.1	+ 0.6	+ 0.5	÷ 0.5	÷ 0.9	÷ 0.2
C.mere eller mindre end A.	÷ 3.0	+ 0.7	+ 0.1	+ 0.3	÷ 1.2	÷ 1.8	÷ 1.0

Heraf fremgaar, at der vel er nogen Forskel fra A til B, men at Forskellen er betydeligt større fra A til C, og her er det særlig den bedre Bug og de fyldigere Skinker, der taler til Fordel for A, og ved en virkelig Kvalitetsbetaling maatte denne Forskel betinge en højere Pris. Dertil kommer jo saa, at A har 3 pCt Eksportflæsk mere end C, hvilket — alle andre Forhold lige — er ensbetydende med, at A-Holdene bringer bedre Priser hjem end C-Holdene, som har det større Svind.

Tilbage staar at omtale de forskellige Maal, som i Hovedtabellerne er opført for Flæskets Tykkelse, samt et Par Længdemaal af Kroppen, og endelig en Pointtildeling for Totalindtryk

af de slagtede Dyr, hvoraf dog kun de, som er opført »med Hoved«, skal benyttes her.

Tabel VI.

	Flæskets Tykkelse						Kroppens Længde fra Hofteskaal til		Total- indtryk
	foran Bov	over				Bug- flæsket	forreste Ribben	bagerste Ribben	med Hoved
		Bov	Ryg	Lænd	Kryds				
		Tm.	Tm.	Tm.	Tm.				
	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	
A	1.3	2.1	1.3	1.2	1.4	1.4	27.2	10.7	11.6
B	1.3	2.0	1.4	1.2	1.4	1.4	27.4	10.8	12.2
C	1.3	2.0	1.3	1.3	1.4	1.3	27.2	10.7	11.2

Gennemsnitstallene fra disse lagttagelser, som er opført i Tab VI, viser sig i alle Maader saa overensstemmende, at det vil være vanskeligt at paavise nogen Forskel af Betydning; kun skal der peges paa Tallene for Totalindtryk i sidste Kolonne, hvor der er tildelt A 11,6, B 12,2 og C 11,2 Points. Altsaa har ved et almindeligt Skøn B faaet højeste, og C laveste Karakter.

Side 27 er givet en Oversigt over, hvordan Holdene fra de nu omtalte 20 Forsøgsrækker stiller sig med Hensyn til Trivsel, pCt Eksportflæsk, Flæskets Fasthed, Bugens Godhed, Skinkernes Størrelse samt Knoklernes og Sværens Finhed; de er opstillet dels efter Antal Hold og dels procentvis, og selv om der nu ogsaa er en Del Variation til Stede, vil man dog af Rubriceringen se, at de under hver Afdeling opførte og tidligere omtalte Gennemsnitstal giver et ganske godt Billede af vedkommende Afdelings Godhed.

I det foregaaende har vi kun beskæftiget os med Gennemsnitstallene for der ud af at drage almindelige Sammenligninger mellem de tre Afdelinger; men det er en given Sag, at de forskellige Hold inden for samme Afdeling kan afvige en Del her fra, saaledes at der er Hold inden for Landracen, som er bedre end Gennemsnittet for Yorkshire- og Krydsningssvinene, ligesom der omvendt kan være Hold af disse, der er ringere end Gennemsnittet for Landracesvinene; men med det foreliggende store Materiale vilde det blive for vidtløftigt at behandle hvert af de enkelte Hold; og da der tilmed i Hovedtabellerne findes

opført alt, hvad der angaar de enkelte Hold baade vedrørende Afstamning, Foder, Trivsel og Kvalitet, kan enhver, som har Lyst til og Interesse for at gøre yderligere Sammenstillinger, benytte det fuldstændige Materiale hertil.

Tabel VII. Sammenstilling af Holdene efter disses Trivsel og Kvalitet.

Afdeling	A		B		C	
	Antal Hold		Antal Hold		Antal Hold	
	ialt	pCt	ialt	pCt	ialt	pCt
F. E. pr Pd Tilvækst:						
fra 3.00 til 3.25	—	—	1	3	1	2
— 3.26 — 3.50	2	12	4	12	11	23
— 3.51 — 3.75	2	12	4	12	13	27
— 3.76 — 4.00	7	41	15	46	9	18
— 4.01 — 4.25	5	29	6	18	9	18
— 4.25 — 4.50	1	6	3	9	3	6
over 4.50	—	—	—	—	3	6
Gennemsnitsforbrug pr Pd Tilvækst..	3.91		3.85		3.84	
pCt. Eksportflæsk:						
66 pCt. og derover	5	39	3	13	—	—
fra 65.0 til 65.9	5	39	5	22	3	9
— 64.0 — 64.9	1	7	10	44	4	12
— 63.0 — 63.9	2	15	4	17	6	18
— 62.0 — 62.9	—	—	1	4	11	34
— 61.0 og derunder	—	—	—	—	9	27
pCt. Eksportflæsk i Gennemsnit...	65.7		64.7		62.7	
Tal for Flæskets Fasthed:						
15.0	1	5	2	5	2	4
fra 14.0 til 14.9	3	14	7	17	5	9
.. 13.0 — 13.9	12	56	12	30	12	22
— 12.0 — 12.9	1	5	11	28	14	26
— 11.0 — 11.9	2	10	6	15	10	18
— 10.0 — 10.9	—	—	2	5	3	6
— 10.0 og derunder	2	10	—	—	8	15
Tal for Flæskets Fasthed i Gennemsnit	12.9		13.0		12.2	

Tabel VII (fortsat).

Afdeling	A		B		C	
	Antal Hold		Antal Hold		Antal Hold	
	ialt	pCt	ialt	pCt	ialt	pCt
Points for Bugpartiets Form og Fylde:						
over 13.0	3	18	—	—	—	—
fra 12.0 til 12.0	6	36	13	27	7	14
— 11.0 — 11.9	4	23	12	34	16	31
— 10.0 — 10.9	4	23	7	20	18	35
— 10.0 og derunder	—	—	3	9	10	20
Gnspoints for Bugens Form og Fylde.	11.9		11.4		10.7	
Points for Skinkens Form og Størrelse:						
over 13.0	3	18	1	3	—	—
fra 12.0 til 12.9	8	47	12	34	1	2
— 11.0 — 11.9	4	23	16	45	16	31
— 10.0 — 10.9	2	12	3	9	22	43
10.0 og derunder	—	—	3	9	12	24
Gnspoints f. Skinkens Form og Størrelse	12.2		11.3		10.4	
Points f. Hoved, Ben og Sværens Finhed:						
over 13.0	3	20	3	10	—	—
fra 12.0 til 12.9	7	47	13	45	4	9
— 11.0 — 11.9	2	13	10	35	24	53
— 10.0 — 10.9	2	13	3	10	15	33
— 10.0 og derunder	1	7	—	—	2	5
Gnspoints f. Hoved, Ben o. Svær. Finh.	12.1		11.9		11.1	

Sammenligning mellem Krydsningssvin og Svin af Landrace.

Da der foruden de omtalte 20 Forsøgsrækker, hvor baade Yorkshire, Krydsninger og Landrace har været medtaget, er udført en Del andre Forsøg, hvor der ingen Yorkshire har været med, men kun Krydsninger og Landrace,

vil vi nu sammenligne disse indbyrdes; men for at faa denne Sammenligning saa fyldig som muligt, vil vi deri inddrage samtlige B-Hold — altsaa ogsaa de tidligere omtalte — og de til samme Rækker (138—159, 161, 162, 163, 165, 166 og 170) hørende C-Hold.

Inden vi gaar videre, maa det dog i denne Forbindelse bemærkes, at ved alle Forsøgsrækker har Sundhedstilstanden mellem Dyrene været tilfredsstillende, og naar det undertiden bliver gjort gældende, at Landracesvinene er mere livskraftige og mindre udsat for Sygdom end Krydsningssvinene, saa kan dette i alt Fald ikke siges om de Dyr, vi har haft med at gøre, og iblandt dem skulde dog Afkom fra nogle af de mest udprægede Stamdyr i Centrene være repræsenterede.

Nu har Forsøgene jo ganske vist først medtaget Grisene i en Alder af 7 à 8 Uger, og paa det Tidspunkt er den værste Periode for Dødelighed selvfølgelig overstaaet, men af de Dyr, som har været med i ovennævnte 27 Forsøgsrækker, er der under Forsøgenes Udførelse af forskellige Aarsager afgaaet 3,2 pCt af Krydsningsgrisene, men 7,0 pCt af Landracegrisene, og dette tyder da i alt Fald ikke paa at Krydsningsgrisene er mindst modstandskraftige.

Ligesom i forrige Afsnit vil vi ogsaa her samle Gennemsnitstallene for nævnte Rækker fra Tab II og sammenstille dem i Tab VIII.

Tabel VIII. Sammendrag af Rækkerne 138—159, 161, 162, 163, 165, 166 og 170.

Afdeling	Vækstperiode									Vækstperioderne		
	I			II			III			I	II	III
	Antal Dage	Pd Tilvækst	F-E pr Pd Tilvækst	Antal Dage	Pd Tilvækst	F-E pr Pd Tilvækst	Antal Dage	Pd Tilvækst	F-E pr Pd Tilvækst	Antal Dage	Pd Tilvækst	F-E pr Pd Tilvækst
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	49.3	38.7	3.42	38.7	40.4	3.81	34.0	39.6	4.35	121.7	118.3	3.88
C	47.7	37.7	3.34	36.2	39.5	3.70	32.6	39.9	4.34	116.2	117.2	3.82

Tallene for de samlede Vækstperioder stemmer heller ikke her ganske overens med Summerne fra de enkelte Perioder,

idet der ogsaa her findes nogle enkelte Hold, som kun har været med i to Vækstperioder og derfor nok kan opføres i disse enkeltvis, men maa udelades, hvor alle Vækstperioder sammen-
drages. Tallene i Kol 10, 11, 12 omfatter 48 B-Hold og 84 C-Hold.

Ved i Kol 1—9 at sammenligne Vækstperioderne enkeltvis vil man lægge Mærke til, at Tilvæksten, som findes opført i Kol 2, 5, 8, paa det nærmeste har været ens for begge Afdelinger; i Vækstperiode I har den saaledes for B- og C-Holdene været henholdsvis 38,7 og 37,7, i Vækstperiode II 40,4, 39,5, og i Vækstperiode III 39,6, 39,9. Derimod har B-Holdene i alle Perioder maattet bruge lidt længere Tid, (Kol 1, 4, 7) og lidt mere Foder, (Kol 3, 6, 9) end C-Holdene for at tilvejebringe denne Tilvækst.

Det samme gør sig selvfølgelig gældende, naar vi holder os til samtlige Vækstperioder, (Kol 10, 11, 12), hvoraf fremgaar, at medens B-Holdene i 121,7 Dage har produceret 118,3 Pd Tilvækst for 3,88 F-E pr Pd Tilvækst, har C-Holdene i 116,2 Dage produceret 117,2 Pd for 3,82 F-E pr Pd; omregner vi nu Grundlag af disse Tal Antal Dage og Antal F-E pr 120 Pd Tilvækst, faar vi følgende:

For B-Holdene	120 Pd Tilvækst i	123 Dage for	466 F-E
— C-Holdene	120 — — —	119 — —	458 F-E

Forskellen bliver da at B-Holdene bruger 4 Dage og 8 F-E mere end C-Holdene til Produktion af 120 Pd Tilvækst.

At B-Holdene i forrige Afsnit kun brugte 2 Dage og 1 à 2 F-E mere til Frembringelse af 120 Pd Tilvækst end C-Holdene, medens de her bruger 4 Dage og 8 F-E mere, ligger selvfølgelig i, at her er medtaget flere Rækker, og at B-Holdene i disse stiller sig mindre gunstigt i Forhold til C-Holdene.

Ligesom der i Udviklingsperioden er bleven større Forskel mellem B- og C-Holdene, saaledes ogsaa naar det gælder Kvaliteten. For at belyse dette nærmere har vi fra Tab II uddraget de Gennemsnitstal, som vedrører disse Forhold, og sammenstillet dem i Tab IX.

Af Tab IX, Kol 3, 4, 5, fremgaar, at B-Holdene har 1,3 pCt Slagtesvind og 0,7 pCt Affald mindre, men 2 pCt Eksportflæsk mere end C-Holdene, og navnlig det sidste maa betragtes som en væsentlig Forskel til Gunst for B-Holdene.

Tabel IX. Sammendrag af Rækkerne 138—159, 161, 162, 163, 165, 166, 170. (Kvalitet af Flæsk).

Af- deling	Vægt p. Slagteriet		pCt Svind		pCt Eksport Flæsk	Tal for Flæskets Fasthed	Kroppens Længde fra Hofteskaal til Snit ved Halsen	Points for					
	levende	slagtet afkølet	ved Slagting	som Affald				Bovparti	Rygflæskets		Bugpartiets Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær
									Tykkelse	Fordeling			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	169.8	133.3	21.5	14.5	64.0	12.8	34.3	11.5	11.0	12.1	11.5	11.6	12.0
C	171.8	132.7	22.8	15.2	62.0	12.0	34.5	11.4	11.5	11.9	10.3	10.6	11.2

I Tal for Flæskets Fasthed, har B 0,8 mere end C, hvor imod Maalene for Kroppens Længde, Kol 7, Tallene for Bovpartiet samt for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling, (Kol 8, 9, 10), er meget nær ens for begge Afdelinger.

I Tallene for Bugflæsk, Skinker og Finhed, (Kol 11, 12, 13), har B-Holdene henholdsvis 1,2, 1,0, 0,8 Points mere end C-Holdene, hvilket kvalitativt set giver B-Holdene en betydelig Overvægt.

Endelig skal vi i Tab X opføre nogle Gennemsnitstal for en Del Maal vedrørende Flæskets Tykkelse paa Ryg og Bug, nogle Længdemaal af Kroppen samt en Bedømmelse af Dyrene i slagtet Tilstand, ved hvilken der er givet Points for Totalindtryk.

Tabel X.

Holdene	Flæskets Tykkelse						Kroppens Længde fra Hofteskaal til		Total- indtryk
	foran Bov	over				Rug- flæsket	forreste Ribben	bageste Ribben	med Hoved
		Bov	Ryg	Lænd	Kryds				
Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.		
B	1.3	2.0	1.4	1.2	1.4	1.3	27.3	10.8	12.1
C	1.3	2.0	1.3	1.2	1.4	1.2	27.6	10.7	11.4

I de første 8 Kol er de samhørende Tal lige store for begge Afdelinger, hvor imod B for Totalindtryk har faaet $12,1 \div 11,4 = 0,7$ Points mere end C.

Ved Sammenligning mellem et stort Antal Hold Svin af Krydsninger og Landrace bliver Hovedresultatet, at til Produktion af 120 Pd Tilvækst har Krydsningerne brugt 4 Dage og 8 F-E mere end Landracesvinene, hvorimod disse har 1,3 pCt Slagtesvind og 0,7 pCt Affald mere, men 2,0 pCt Eksportflæsk mindre end Krydsningerne; tilmed har Landracesvinene ved Bedømmelsen af de slagtede Kroppe beholdt 1,2 og 1,0 mindre Points i Karakter for saa værdifulde Partier som Bug og Skinke, og tillige 0,8 Points mindre i Finhed.

I øvrigt gælder ogsaa her, hvad der i sidste Stykke, Side 26, er sagt angaaende Afvigelserne mellem Holdene inden for de to Afdelinger.

Sammenligning mellem Afkom fra forskellige Slægter af Landracen.

Foruden at belyse Forholdet mellem Yorkshireracen, Landracen og Krydsningernes Trivsel og Kvalitet som Slagterisvin var det Hensigten ved disse Forsøg tillige at søge belyst, hvorledes de forskellige Stammer eller Slægter inden for Landracen staar over for hinanden med Hensyn til Trivsel og Godhed, samt om man gennem de Hold, vi fra forskellige Generationer af samme Slægt har haft inde til Forsøg, kunde spore Frem- eller Tilbagegang i Slægten i nogen Retning; thi da det er Landracen, som danner Grundlaget for Landets Svineavl, vil det være af ikke ringe Betydning at faa Slægternes Dyder og Lyder belyst i saa stor en Udstrækning som muligt.

Ifølge Planen var det navnlig fra de bedste og mest lovende Stamdyr i de anerkendte Avlscentre, at Forsøgene skulde have sit Materiale, og det maatte jo ogsaa være disses Afkom, som Lederne af Avlen havde størst Interesse af gennem Fodrings- og Slagtningsforsøg at faa noget at vide om; men som før nævnt har det for en stor Del været Statskonsulent *Mørkeberg* og hans Medarbejdere ved Svineavlens Ledelse, der har bestemt, hvilke af de i Centrene værende Stamdyrs Afkom der ønskedes prøvede, og disse Mænd faar altsaa til Dels Æren og Ansvar for, at det netop har været disse bestemte Stamdyrs Afkom, vi har faaet

draget ind under Forsøgene, som Tilfældet har været. Dog skal det bemærkes, at der har været Tider, hvor d'Hrr. Avlsledere kunde have ønsket Afkom prøvede efter andre Stamdyr, men Laboratoriet har under de givne Forhold ikke hidtil kunnet optage Svineforsøgene i større Omfang, end sket er.

Det vil gennem Forsøg altid have sin Vanskelighed at kunne fælde nogen afgørende Dom over det enkelte Avlsdyrs Evne til at levere Afkom, der egner sig godt som Slagterisvin — Trivsel og Kvalitet —, thi det kan jo være, ja er saadan, at en So giver godt Afkom ved Parring med en bestemt Orne og mindre godt ved Parring med en anden Orne, og ligesaa kan Afkommet efter visse Stamorner blive bedre paa en Plads, hvor der er Søer af en bestemt Type, end paa en anden Plads med Søer af en anden Type, og med dette for Øje vil Dommen jo væsentlig blive afhængig af, om der til Forsøgene er benyttet Grise efter Forældre, der giver godt Afkom sammen, eller om det modsatte har været Tilfældet, Forhold som absolut ikke maa lades ude af Betragtning ved Forsøg af den Art, hvorfor ogsaa de ved nærværende Forsøg indvundne Resultater maa benyttes med megen Varsomhed, naar det gælder derigennem at ville værdsætte de enkelte Avlsdyrs Værdi til at levere triveligt og godt Afkom; men da Opgaven ved Udtagelsen af Grise til Forsøgene har været, at erhverve Afkom efter de bedste Dyr, som danner Stambestanden i Avlscentrene, og hvis dette blot er lykkedes nogenlunde, vil Resultaterne af Forsøgene dog nok kunne give Vink, som kan være af Betydning for dem, der har med Svineavlens Ledelse at gøre.

Sammenstillingen af de indvundne Forsøgsresultater vil nu kunne ske paa flere Maader, men da det vil blive for vidtløftigt at omtale hvert enkelt Hold, og disse derfor paa en eller anden Maade maa samles i Grupper, har vi foretrukket at vælge som Udgangspunkt nogle af de i den officielle Stambog over Orner af Landrace opførte Dyr, som har vist sig at være af nogen Betydning for Avlen, og efter dem dele Forsøgsmaterialet i Slægter, hvorefter de til samme Slægt hørende Hold stilles sammen i Slægtled, efter som de hører til den ene eller anden Generation; men da der mellem Avlscentrene hyppigt byttes og udveksles Avlsdyr, bliver Slægterne blandede, og det kan ved Sammenstillingen derfor ikke undgaas, at enkelte Hold

Tabel XI. Slægtstavle 1. Adam Stbg Nr 1.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport-flask	Tal for Fæstet	Kroppens Længde	Points for			
						Begyn- delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til- vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflask	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Adam: Leif	84	—	—	Adolfine Mikkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Søren	1	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abel	6	149	C 3.		—	34.5	152.8	98	118.3	3.41	24.1	13.5	62.4	13.3	33.7	11.6	10.8	11.3	10.7
Martha	35	149	C 2.		4	36.8	144.0	112	107.2	3.88	21.4	14.2	64.4	11.3	33.2	11.2	11.6	11.4	11.5
Mette	100	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gennemsnit. . .						35.7	148.4	105	112.7	3.65	22.8	13.8	63.4	12.3	33.5	11.4	11.2	11.4	11.1
<i>Børn af 3. Slægtled.</i>																			
Leif: Bruno	—	141	C 1.	Bengt	—	47.2	163.8	130	116.6	4.39	—	—	—	15.0	35.7	—	8.4	10.2	—
Bravo	—	149	C 1.	Dan	14	36.2	156.5	112	120.3	3.62	21.5	14.4	64.1	12.5	33.8	11.3	11.6	11.4	11.5
Søren: Nr. 8.	—	160	C 6.	Krættstrup	14	33.4	157.2	112	123.8	4.01	26.6	12.3	61.1	10.4	34.5	10.5	10.4	10.9	9.7
Abel: Wolmer	27	150	C 3.	Frigga	2	35.0	155.4	98	120.4	3.14	22.8	14.9	62.3	12.4	36.6	11.1	10.9	8.8	9.2
do.	27	160	C 5.	Omega	2	36.4	148.8	98	112.4	3.73	25.0	11.9	63.1	11.5	35.4	10.6	11.9	10.4	9.9
Orne	—	158	C 2.	So Nr. 3	—	32.7	158.8	112	126.1	3.53	21.7	15.6	62.7	12.2	34.5	12.2	11.3	10.2	10.2
Gine	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Martha: David	35	146	C 2.	Nr. 3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	34.5	10.5	11.0	10.8	11.0
do.	35	156	C 1.	Nr. 6	2	36.0	148.5	112	112.5	3.10	24.8	14.5	60.7	9.0	33.0	9.2	9.3	8.0	8.5
Axel	36	154	C 3.	Annine	13	32.3	156.6	126	124.3	3.02	—	—	—	12.3	34.5	10.7	11.3	10.1	11.0
Mette: Mogens	113	146	C 1.	Andrea	4	—	—	—	—	—	24.0	15.4	60.6	12.5	34.1	11.1	10.8	10.5	11.1
do.	113	150	C 2.	Metha	3	30.8	147.0	112	116.2	3.44	21.0	13.8	65.2	11.7	34.3	10.9	11.9	10.4	11.3

Mikkel II.	100	157	C 4.	Nr. 180	21	30.3	151.2	126	120.9	3.38	23.4	15.9	60.7	12.3	34.9	13.2	12.2	11.0	11.6
do.	100	162	C 3.	Nr. 179	21	37.3	147.3	126	110.0	4.06	(24.2)	—	—	10.3	33.7	11.5	11.4	10.6	10.6
So Nr. 1	29	167	C 6.	Mads	21	36.6	148.0	98	111.4	3.85	25.5	14.5	60.0	13.0	33.3	12.6	11.4	11.4	11.7
Gennemsnit. ...						35.4	153.3	113.5	117.9	3.61	23.6	14.3	62.1	11.9	34.5	11.2	11.0	10.3	10.6
<i>Børn af 4. Slægtled.</i>																			
Wolmer: Tulle 6	—	161	C 2.	Gorm	3	34.2	159.4	112	125.2	3.32	20.8	16.2	63.0	14.2	34.0	12.6	11.3	10.5	11.5
David: Dam	35	156	C 2.	Mary	3	34.8	162.7	140	127.9	4.32	24.8	15.9	59.3	9.3	33.7	8.8	9.2	9.2	10.3
do.	35	164	C 1.	Grethe	3	34.2	158.6	112	124.4	3.67	23.6	16.0	60.4	7.6	33.7	10.9	9.4	10.2	10.8
do.	35	150	C 1.	Gram	3	36.5	155.0	112	118.5	3.57	21.3	13.3	65.4	8.6	33.1	12.1	11.7	10.6	11.3
Woldum	—	170	C 2.	Kornumgaard	4	41.0	145.8	140	104.8	4.79	24.4	16.6	59.0	12.0	33.9	11.0	12.3	11.3	11.3
Axel: Stefania	—	164	C 3.	Svend	14	35.6	147.4	98	111.8	3.86	22.4	—	—	11.4	32.9	12.0	10.1	10.3	11.7
Gennemsnit. ...						36.0	154.8	119.0	118.8	3.92	23.0	15.6	61.4	10.5	33.6	11.2	10.7	10.4	11.2
<i>Børn af 5. Slægtled.</i>																			
Dam: Nogi	38	166	C 5	Nikoline	1	31.4	144.6	112	113.2	3.67	26.5	15.0	58.5	8.0	34.3	10.6	10.0	9.7	10.5
Sigurd	—	167	C 1.	Susse	3	37.0	158.2	98	121.2	3.54	24.7	14.8	60.5	7.8	34.7	10.0	9.6	9.9	10.5
Gine: Alvina.	—	160	C 3.	Ali	13	35.4	161.6	126	126.2	4.20	23.9	12.0	64.1	11.5	34.3	11.8	11.6	10.8	11.1
Gennemsnit. ...						34.6	154.8	112	120.2	3.80	25.1	13.9	61.0	9.1	34.4	10.8	10.4	10.1	10.7
<i>Søer bedækkede af York-orne.</i>																			
Abel: Gertrud	—	152	B 1.	Y.-Orne	—	39.3	162.0	112	122.7	3.78	21.9	13.7	64.4	14.7	34.4	12.2	11.5	10.7	12.0
Nr. 2	—	154	B 1.	do.	—	39.7	159.1	140	119.4	4.08	20.5	14.2	65.3	8.8	33.9	12.0	10.8	9.6	9.6
Martha So	—	145	B 1.	do.	—	38.8	149.3	112	110.5	3.79	—	—	—	13.2	34.5	12.8	12.5	12.3	13.0
Axel: So	—	161	B.	do.	—	29.6	149.0	112	119.4	3.63	19.8	16.1	64.1	13.4	33.4	13.0	13.7	12.1	12.1
Dam: So	—	170	B 2.	do.	—	37.0	155.4	126	118.4	3.76	23.3	16.2	60.5	13.8	33.2	12.0	12.5	12.8	12.8
Gennemsnit. ...						36.9	155.0	120	118.1	3.81	21.4	15.0	63.6	12.8	33.9	12.4	12.2	11.5	11.9

kommer til at optræde i flere Slægtstavler, idet de med lige fuld Ret hører hjemme i hvilken som helst af dem, de har deres Udspring fra.

For dog at begrænse Materialet er intet Hold indgaaet mere end én Gang i hver Slægtstavle, selv om det maaske nok i Henhold til sin Afstamning undtagelsesvis kunde være optaget der 2 à 3 Gange.

Ved denne Ordning er det dog en given Sag, at kun de Hold er medtaget, hvor alle Dyrene er fra samme Læg, men hvert af disse Hold er da ogsaa mindst én Gang indgaaet i denne Sammenstilling efter Slægtskabsforhold.

Det nødvendige Talmateriale til Belysning af Slægternes Trivsel og Godhed er uddraget af Tab II.

I Slægtstavlernes første Afsnit, Kol. 1, er opført Navn og Nummer paa de af Stamfaderens eller Sammoderens Børn, hvis Afkom har været med ved Forsøgene, og i andet Afsnit igen deres Børn o. s. fr. I Kol 2 er opført, under hvilket Nummer de optræder i den officielle Stambog over Orner, og dernæst følger i Kol 3 og 4 Nummeret paa den Forsøgsrække og Betegnelsen for det Hold, under hvilket det findes i Hovedtabellerne; men da de under de forskellige Slægtled anførte Dyr kun er den ene Parthaver i Afkommet, er tillige i Kol 5 anført, hvilken Orne eller So af samme eller anden Slægt der er den anden Parthaver, med Henvisning til i Kol 6 i hvilken anden Slægtstavle vedkommende Hold ogsaa findes.

I Kol 7 og 8 er opført Dyrenes Vægt ved Begyndelsen af Vækstperiode I og ved Slutningen af Vækstperiode III, dernæst er i Kol 9 opført, hvor mange Dage Dyrene har været om at producere den i Kol 10 anførte Tilvækst, og i Kol 11, hvor mange F-E der er medgaaet til Produktionen heraf. Kol 12 og 13 angaar pCt Svind henholdsvis Slagtesvind og Affald, og Kol 14, hvor mange pCt Eksportflæsk der er bleven af de paa Slagteriet leverede Pd levende Svin; men da disse tre Kolonner skal svare til hinanden, og de ikke alle er fuldstændige, har vi de Steder, hvor et af Tallene mangler, heller ikke regnet de andre med.

I Kol 15 og 16 er opført Tal for Flæskets Fasthed og Kroppens Længde (i Tommer) fra Hofteskaal til Snittet ved Halsen, og endelig er i Kol 17, 18, 19 og 20 opført Points for de vigtigste Bygningstræk som Rygflæskets Tykkelse, Bugens

Form og Fylde, Skinkernes Form og Størrelse samt Knoklernes og Sværens Finhed.

Under Behandlingen af Slægtstavlerne vil vi nærmest beskæftige os med Gennemsnitstallene fra de forskellige Slægtled; men tillige gøre opmærksom paa, naar der ligger noget særligt til Grund for, at et eller andet Hold afviger stærkt derfra.

Det ligger nær, at vi som Udgangspunkt for den første Slægttavle vælger Stbg 1, Adam, som har været Stamorne i flere af Centrene i Hjørring Amt.

Slægten Adam, Stbg 1.

Tabel XII. Uddrag af Slægtstavle 1.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskets Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	2	35.7	148.4	105	112.7	3.65	22.8	13.8	63.4	12.3	33.5	11.4	11.2	11.4	11.1
3.	14	35.4	153.3	113.5	117.9	3.61	23.6	14.3	62.1	11.9	34.5	11.2	11.0	10.3	10.6
4.	6	36.0	154.8	119	118.8	3.92	23.0	15.6	61.4	10.5	33.6	11.2	10.7	10.4	11.2
5.	3	34.6	154.8	112	120.2	3.80	25.1	13.9	61.0	9.1	34.4	10.8	10.4	10.1	10.7
Krydsning.	5	36.9	155.0	120	118.1	3.81	21.4	15.0	63.6	12.8	33.9	12.4	12.2	11.5	11.9

Af ovenstaaende Uddrag af Slægtstavle 1, som omfatter 4 Slægtled, vil vi ikke dvæle ved de første 6 Kolonner, men derimod pege paa, at efter Tallene i Kol 7 er Slægten ikke gaaet frem i Trivelighed, idet de fire efter hinanden følgende Slægtled har brugt henholdsvis 3,65, 3,61, 3,92, 3,80 F-E til et Pd Tilvækst. Forbruget af Foder er vel ikke regelmæssigt stigende fra Led til Led, men sammenligner man de to første Slægtled med de to sidste, bliver det henholdsvis 3,63 og 3,86 Pd Korn pr Pd Tilvækst. Slagtesvindet, Kol 8, er — 4de Led undtaget — stigende, og ligesaa gaar det med pCt Affald i de 3 første Led; men denne Stigning af pCt Svind i sin Helhed

bevirker, at Mængden af det til Saltning tilskaarne Flæsk er nedadgaaende fra det ene Slægtled til det følgende, hvad ogsaa fremgaar af Kol 10, hvor Tallene for pCt Eksportflæsk er 63,4, 62,1, 61,4, 61,0.

Tallene for Flæskets Fasthed er ifølge Kol 11 bleven lavere, efterhaanden som Generationerne skrider frem; Aarsagen hertil skal senere berøres. Kroppens Længde, Kol 12, er paa det nærmeste ens, men Tallene for Rygflæsk, Bugflæsk og Skinker, (Kol 13, 14, 15), er temmelig regelmæssig dalende fra fra det ene Slægtled til det næste, derimod kunde Tallene i Kol 16 tyde paa en lille Fremgang i Finhed.

Tallene for de til denne Slægt hørende 5 Krydsningshold, som er opført i sidste Linje, viser, at der til hvert Pd Tilvækst (Kol 7) er medgaaet 3,81 F-E, hvilket i alt Fald er lavere end Middeltallet for ovenstaaende 4 Slægtled, samt at det samlede Svind, Slagtesvind og Affald er mindre, og at pCt Eksportflæsk (Kol 10) er højere end for de to første Slægtled, og endog et Par pCt højere end for de to sidste. Flæsket har en bedre Konsistens, Rygflæsket er bedre, Bugen tykkere, Skinkerne fyldigere, og Knokler og Svær finere, hvilket altsammen fremgaar af de anførte Points.

Af Enkeltheder inden for Slægten kan anføres, at i 3. Slægtled, Række 156, har Hold C,1 givet lave Points for Kvaliteten af Flæsk, og at Hold C,5 i Række 160 har et meget lille Tal for pCt Affald, nemlig kun 11,9, samt at C,2 i Række 150 har givet en stor Mængde Eksportflæsk, nemlig 65,2 pCt.

I 4. Slægtled har Hold C,2 i Række 170 haft et stort Forbrug af Pd Korn til et Pd Tilvækst, nemlig 4,79, og har tilmed kun ydet 59,0 pCt Eksportflæsk.

Som Eksempel paa, hvor forskelligt Afkommet kan falde ud efter samme Orne med forskellige Søer, kan anføres, at Ornen Dam i 4 Slægtled, Række 150 C,1, ved Soen Gram, har avlet Afkom, der har givet 65,4 pCt Eksportflæsk, medens Afkommet ved Søerne Grethe (Række 164 C,1) og Mary (156 C,2) kun har givet henholdsvis 60,4 og 59,3 pCt, og i sidste Tilfælde var Kvaliteten tilmed ikke god.

I det følgende Slægtled har samme Orne gennem Sønnen Nogi givet Afkom med kun 58,5 pCt, og mellem Krydsningsholdene staar Hold B, 2 i Række 170, som er nærbeslægtet med Dam, med det laveste Tal for pCt Eksportflæsk.

Heraf kan vel udledes at Ornen Dam har haft Tilbøjelighed til at give Afkom med en ringe Mængde Eksportflæsk, men at Soen Gram har haft den modsatte Egenskab i endnu højere Grad, saa den har haft den dominerende Indflydelse paa Afkommet i saa Henseende.

Afkommet efter Dam har tillige haft en anden uheldig Egenskab, som senere vil blive omtalt.

Anførte Bemærkninger angaaende Slægtledene inden for Slægtstavle 1 er altsaa, hvad der fremgaar af de for hvert Slægtled gældende Gennemsnitstal, men man maa selvfølgelig ikke se bort fra, at Holdene inden for de enkelte Slægtled ikke er saa lidt forskellige, og hvis man udelader et eller andet Hold, som afviger mest fra Gennemsnittet, er det jo en given Sag, at dette vilde blive et andet; men skal vi først til at skyde ud, vil det blive rent vilkaarligt, hvad der i et Tilfælde tages med, og hvad der i et andet skydes ud, hvorfor vi har valgt at medtage alle de Hold, som hører til Slægten.

Slægten Rasmus, Stbg 2.

Rasmus var først Stamorne i Vendsyssel, senere i Randers-egnen og til sidst paa Fyn; den blev stærkt benyttet, og ved at den er flyttet fra et Distrikt til et andet, er den bleven blandet med mange Slægter, hvorved Ensartetheden i Afkommet taber sig en Del.

Et Uddrag af Slægtstavle 2, Tab XIII, er opført i Tab XIV, og heraf fremgaar, at denne Slægt ogsaa har været repræsenteret ved fire Slægtled, og at Tallene for Pd Korn pr Pd Tilvækst, (Kol 7), har været 3,61, 3,76, 3,71, 3,81, altsaa stigende, eller med andre Ord Produktionen er bleven dyrere ved de yngre Generationer. pCt Svind ved Slagtning (Kol 8), er dalende fra 3. til 5. Slægtled, men til Gengæld er pCt Affald (Kol 9), forøget. Mængden af det færdige Eksportflæsk (Kol 10), gaar ned fra 2. til 4. Slægtled, men er i 5. Slægtled næsten lig med, hvad den var for 2. Slægtled. Angaaende Tallene for Flæskets Fasthed, Kroppens Længde og Rygflæskets Kvalitet, da kan det af Tallene i Kol 11, 12, 13 næppe udledes noget, som peger paa Slægtens Frem- eller Tilbagegang.

De i Kol 14 opførte Tal viser, at 3. Slægtled har den laveste

Tabel XIII. Slægtstavle 2. Rasmus Stbg 2.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet														
						Vægt ved		Alle Vækstperioder				pCt Svind		pCt Eksport-flæsk	Tal for Fæthed	Kroppens Længde	Points for			
						Begyn-delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til-vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald	Rygflæsk				Bug	Skinker	Finhed	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																				
Rasmus; Per	30	154	C 1.	Eva	16	40.2	158.2	112	118.0	2.88	20.7	15.2	64.1	12.8	34.5	11.7	10.3	10.3	10.5	
do.	30	158	C 1.	Bine	3	35.0	151.8	112	116.8	3.40	21.0	14.2	64.8	10.2	33.5	11.3	10.5	11.4	12.0	
Mulvad	—	159	C 4.	Nr. 28	7	38.8	149.0	98	110.2	3.68	24.2	15.6	60.2	12.0	34.7	13.3	12.0	12.3	12.7	
Ali	28	160	C 3.	Alvina	13	35.4	161.6	126	126.2	4.20	23.9	12.0	64.1	11.5	34.3	11.8	11.6	10.8	11.1	
do.	28	165	C 2.	Nr. 61	13	35.5	152.1	126	116.6	3.86	—	—	61.2	13.7	35.0	11.8	12.2	11.3	11.8	
Negus	31	161	C 1.	Ninka	—	32.0	159.4	112	127.4	3.25	19.6	15.1	65.3	12.6	34.1	12.2	12.5	11.5	12.0	
Mouritz	29	156	C 3.	Mine	15	37.3	161.5	112	124.2	3.93	22.5	15.3	62.2	11.5	33.1	12.3	11.3	10.7	11.3	
Aben	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Torben	54	166	C 4.	Theodora	—	32.7	144.7	98	112.0	3.15	25.4	14.1	60.5	12.3	33.0	12.3	10.8	10.7	11.7	
Rud	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Astrid	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Anna	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Damgaard 6 ..	—	156	C 1.	David	4	36.0	148.5	112	112.5	3.10	24.8	14.5	60.7	9.0	33.0	9.2	9.3	8.0	8.5	
Damgaard 3 ..	2	146	C 2.	David	4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	34.5	10.5	11.0	10.8	11.0	
Betzy	2	146	C 3.	Baldur	3	43.8	151.8	98	108.0	3.59	—	—	—	13.2	35.5	10.8	11.8	9.8	11.3	
Thola	—	153	C 2.	Vollerup	8	40.6	163.1	112	122.5	3.56	21.9	14.3	63.8	11.0	35.0	10.9	12.1	9.1	11.6	
Nr. 172	—	155	C 3.	Isak	15	32.0	159.5	126	127.5	3.73	22.4	13.9	63.7	12.0	34.8	9.8	9.3	10.8	10.2	
Nr. 176	—	162	C 2.	Klovn	9	36.7	155.2	140	118.5	4.56	—	—	—	12.5	34.1	12.4	12.0	12.0	11.1	
Gennemsnit. ..						36.6	155.5	114	118.5	3.61	22.6	14.5	62.9	11.8	34.2	11.5	11.2	10.7	11.2	

Børn af 3. Slægtled.																			
Per: Max	30	156	C 4.	Ternen	14	33.6	167.7	140	134.1	4.12	25.5	14.2	60.3	9.3	32.7	12.1	10.8	10.6	12.5
do.	30	160	C 4.	Gine	14	32.0	150.0	112	118.0	3.75	25.2	12.6	62.0	10.4	33.8	11.7	11.5	10.6	11.1
Ole	—	160	C 1.	Sidse	3	42.2	148.8	98	106.6	3.59	26.3	12.1	61.6	12.6	34.8	11.8	11.1	11.3	11.2
Palle	—	164	C 4.	Mette	16	38.0	152.2	112	114.2	4.22	22.4	—	—	10.6	32.1	11.6	10.5	10.9	11.7
Mads	33	167	C 6.	Nr. 1	15	36.6	148.0	98	114.1	3.85	25.5	14.5	60.0	13.0	33.3	12.6	11.4	11.4	11.7
Ali: Kornung Gadeby ..	—	163	C 2.	Nr. 69	16	39.2	164.1	112	124.9	4.05	21.6	17.1	61.3	11.3	33.6	11.1	11.7	11.5	11.8
Emmy	—	164	C 2.	Erik	13	37.6	152.0	98	114.4	3.77	22.8	—	—	11.8	33.8	12.6	11.2	10.8	10.7
Alvilda	—	164	C 5.	Damgaard	13	39.2	145.6	84	106.4	3.84	22.3	—	—	13.8	33.3	12.0	11.0	10.9	11.4
Negus: Nero	32	167	C 4.	Gine II.	14	33.6	153.0	112	119.4	3.81	24.5	14.6	60.9	12.0	33.9	12.3	11.1	10.7	11.6
Nicoline	—	166	C 5.	Nogi	4	31.4	144.6	112	113.2	3.67	26.5	15.0	58.5	8.0	34.3	10.6	10.0	9.7	10.5
Mauritz: Mads	29	166	C 2.	Maren	15	53.5	146.2	84	92.7	3.53	24.5	14.0	61.5	12.0	34.8	11.3	10.5	10.9	11.6
Aben: Svend Høve	—	163	C 1.	Nr. 45	11	45.6	145.0	84	99.4	3.65	21.4	16.0	62.6	12.5	33.6	11.6	11.8	11.3	11.9
do.	—	165	C 3.	Nr. 43	11	48.4	158.8	98	110.4	3.87	27.5	13.7	58.8	12.8	35.0	12.4	10.2	11.5	12.2
Trustrup	47	165	C 5.	Holmgaard	—	38.2	150.0	112	111.8	4.02	26.7	14.5	58.8	10.2	34.4	8.6	7.1	10.9	9.8
Rud: Maglebrænde Fore-				So fra															
ningen	—	165	C 6.	Slangerup	—	43.5	161.6	98	118.1	3.70	24.5	16.2	59.3	13.5	35.0	13.4	12.3	11.9	12.1
Gram: Nr. 6	—	168	C 1.	Nr. 265	—	53.3	158.5	126	105.2	4.27	26.1	14.8	59.1	10.8	34.2	12.4	11.7	11.1	12.1
Astrid: Wolmer	27	160	C 5.	Omega	—	36.4	148.8	98	112.4	3.73	25.0	11.9	63.1	11.2	35.4	10.6	11.9	10.4	9.9
do.	27	150	C 3.	Frigga	—	35.0	155.4	98	120.4	3.14	22.8	14.9	62.3	12.4	36.6	11.1	10.9	8.8	9.2
En Orne	—	158	C 2.	Nr. 3	3	32.7	158.8	112	126.1	3.53	21.7	15.6	62.7	12.2	34.5	12.2	11.3	10.2	10.2
Asta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anna: Herodes	—	141	C 2.	So	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	35.9	—	7.8	9.6	—
Anine	—	154	C 3.	Aksel	—	32.3	156.6	126	124.3	3.02	—	—	—	12.3	34.5	10.7	11.3	10.1	11.0
Tolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gennemsnit. ...						39.1	153.3	106	114.2	3.76	24.7	14.5	60.8	11.8	34.3	11.6	10.8	10.7	11.3
Børn af 4. Slægtled.																			
Max: Tummelumsen ...	—	166	C 3.	Major	14	37.6	145.2	98	107.6	3.63	25.5	14.7	59.8	9.0	32.9	9.6	9.0	10.4	10.2
Mads: Orne	—	170	C 4.	Thyra	—	37.7	158.3	126	120.6	4.05	24.0	16.2	59.8	12.3	33.3	12.7	13.0	12.7	11.1
Wolmer: Tulle	—	161	C 2.	Gorm	3	34.2	159.4	112	125.2	3.32	20.8	16.2	63.0	14.2	34.0	12.6	11.3	10.5	11.5
Asta: Nr. 241	—	169	C 2.	Torpe	7	37.0	145.2	126	108.2	4.25	23.1	16.6	60.3	11.4	34.3	12.6	11.8	12.0	11.8

Tabel XIII (fortsat).

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport- flæsk	Tal for Fasthed	Kroppens Længde	Points for			
						Begyn- delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til- vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tolne: Tuk	—	145	C 3.	Enggaard	4	35.7	152.8	112	117.1	3.61	—	—	—	8.7	33.9	9.8	10.5	10.8	10.4
do.	—	152	C 3.	do.	4	31.2	164.6	112	133.4	3.40	—	—	—	9.8	35.3	11.7	10.3	10.5	10.9
Gennemsnit. ...						35.6	154.3	114	118.7	3.71	23.4	15.9	60.7	10.9	34.0	11.5	11.0	11.2	11.0
<i>Børn af 5. Slægtled.</i>																			
Tuk: Ternen	—	156	C 2.	Max	13	34.8	162.7	140	127.9	4.32	24.8	15.9	59.3	9.3	33.7	8.8	9.2	9.2	10.3
Holmgaard	112	159	C 1.	Dora	13	45.5	146.0	84	100.1	3.49	20.7	15.4	63.9	11.3	34.5	10.5	12.4	11.2	10.8
do.	112	163	C 3.	Thekla	13	44.0	165.7	98	121.7	3.65	19.5	17.1	63.4	10.8	34.7	12.7	12.5	11.3	11.6
do.	112	163	C 4.	Malle	13	31.0	155.6	112	124.6	3.78	19.3	—	—	13.5	34.1	12.5	11.9	12.2	11.8
Gennemsnit. ...						38.8	157.5	109	118.6	3.81	21.7	16.1	62.2	11.2	34.3	11.1	11.5	11.0	11.1
<i>Søer bedækkede af York- shireorne.</i>																			
Per: Thyra	—	156	B 1.	Wille	—	36.5	161.8	140	125.3	4.32	22.0	14.9	63.1	12.5	33.6	11.2	10.8	11.3	12.3
Astrid: So	—	145	B 2.	Y.-Orne	—	35.3	150.6	112	115.3	3.63	—	—	—	12.3	35.3	11.2	11.8	12.3	11.2
Anna So	—	147	B 3.	Y.-Orne	—	37.6	158.4	140	120.8	4.24	18.3	14.7	67.0	13.2	34.4	11.9	12.8	12.5	12.4
do. So	—	153	B 2.	Y.-Orne	—	31.8	161.0	126	129.2	3.82	21.7	14.0	64.3	12.8	34.0	12.5	10.7	10.8	10.8
Asta So	—	161	B.	Rank	—	29.6	149.0	112	119.4	3.63	19.8	16.1	64.1	13.4	33.4	13.0	13.7	12.1	12.1
Anini: Nr. 2	—	154	B 1.	Y.-Orne	—	39.7	159.1	140	119.4	4.08	20.5	14.2	65.3	8.8	33.9	12.0	10.8	9.6	9.6
Gennemsnit. ...						35.1	156.7	127	121.6	3.95	20.5	14.8	64.7	12.2	34.1	12.0	11.8	11.4	11.4

Tabel XIV. Uddrag af Slægtstavle 2.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskest Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	14	36.6	155.1	114	118.5	3.61	22.6	14.5	62.9	11.8	34.2	11.5	11.2	10.7	11.2
3.	21	39.1	153.3	106	114.2	3.76	24.6	14.5	60.9	11.8	34.3	11.6	10.8	10.7	11.3
4.	6	35.6	154.3	114	118.7	3.71	23.4	15.9	60.7	10.9	34.0	11.5	11.0	11.2	11.0
5.	4	38.8	157.5	109	118.6	3.81	21.7	16.1	62.2	11.2	34.3	11.1	11.5	11.0	11.1
Krydsning.	6	35.1	156.7	127	121.6	3.95	20.5	14.8	64.7	12.2	34.1	12.0	11.8	11.4	11.4

Karakter for Bugflæsk, nemlig 10,8, men at Tallene stiger i de følgende Led til 11,0 og 11,5; ligesaa viser de i Kol 15 opførte Points, at Skinkernes Form og Størrelse har været bedre i de to sidste end i de to første Led, hvorimod Finheden af Knokler og Svær (Kol 16), er ens for alle 4 Generationer.

De hertil knyttede 6 Krydsningshold har noget højere Forbrug af Pd Korn til et Pd Tilvækst, nemlig 3,95, men pCt Slagtesvind og Affald er en Del mindre, saa de giver $64,7 \div 62,2 = 2,5$ pCt Eksportflæsk mere end 5. Slægtled af Landracen; Flæsket har faaet et højere Tal for Fasthed, og Rygflæsk, Bug og Skinker har ved de anførte højere Points vist sig at være af en noget bedre Kvalitet.

Som nogle inden for Slægten fra det normale temmelig stærkt afvigende Eksempler kunde anføres, at Afkom efter Aben, 3. Slægtled, Række 165 C,3 og C,5 giver et lille Tal for pCt Eksportflæsk, nemlig 58,8, 58,8, hvorimod den i Række 163 C,1 gennem Svend Høve med So Nr. 45 giver et normalt Tal for Eksportflæsk

Det samme kunde siges om Nicoline, hvis Afkom i 3. Slægtled, Række 166 C,5, kun giver 58,5 pCt Eksportflæsk, hvilket lave Tal dog nærmest maa falde paa Grisenes Fader »Nogi«; thi Nicolines Fader Negus giver med Soen Ninca, i Slægtled 2, Række 161 C,1, et Afkom med et højt Tal for Eksportflæsk, nemlig 65,3.

Tabel XV. Slægtstavle 3. Triddelfitz Stbg. 3.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkomet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder				pCt Svind		pCt Eksport-flæsk	Tal for Fæstet	Kroppens Længde	Point for		
						Begyn-delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til-vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald	Rygflæsk				Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Triddelfitz: Thor	39	—	—	Bravo Betzy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jonas	41	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dan	—	149	C 1.		1	36.2	156.5	112	120.3	3.62	21.5	14.4	64.1	12.5	33.8	11.3	11.6	11.4	11.5
Baldur	44	146	C 3.		2	43.8	151.8	98	108.0	3.59	—	—	—	13.2	35.5	10.8	11.8	9.8	11.3
Damgaard 7	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gennemsnit. ...						40.0	154.2	105	114.2	3.61	21.5	14.4	64.1	12.9	34.7	11.1	11.7	10.6	11.4
<i>Børn af 3. Slægtled.</i>																			
Thor: Jens	—	145	C 1.	Klara	—	36.0	158.6	126	122.6	4.06	—	—	—	10.6	34.6	12.6	10.2	10.2	10.0
Gine II.	—	167	C 4.	Nero	—	33.6	153.0	112	119.4	3.81	24.5	14.6	60.9	12.0	33.9	12.3	11.1	10.7	11.6
Ole	40	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jonas: Herodes	41	141	C 2.	Anna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	35.9	—	7.8	9.6	—
Annine	28	154	C 3.	Axel	1	32.3	156.6	126	124.3	3.02	—	—	—	12.3	34.5	10.7	11.3	10.1	11.0
Dan: Meta 51	—	150	C 2.	Mogens	1	30.8	147.0	112	116.2	3.44	21.0	13.8	65.2	11.7	34.3	10.9	11.9	10.4	11.3
Bine 106	—	158	C 1.	Per	2	35.0	151.8	112	116.8	3.40	21.0	14.2	64.8	10.2	33.5	11.3	10.5	11.4	12.0
Sidse 107	—	160	C 1.	Ole	2	42.2	148.8	98	106.6	3.59	26.3	12.1	61.6	12.6	34.8	11.8	11.1	11.3	11.2
Damgaard 7: Nr. 3	—	158	C 2.	L. Orne	2	32.7	158.8	112	126.1	3.53	21.7	15.6	62.7	12.2	34.5	12.2	11.3	10.2	10.2
Dam	35	150	C 1.	Gram	4	36.5	155.0	112	118.5	3.57	21.3	13.3	65.4	8.6	33.1	12.1	11.7	10.6	11.3
do.	35	156	C 2.	Mary	4	34.8	162.7	140	127.9	4.32	24.8	15.9	59.3	9.3	33.7	8.8	9.2	9.2	10.3
do.	35	164	C 1.	Grethe	4	34.2	158.6	112	124.4	3.67	23.6	16.0	60.4	7.6	33.7	10.9	9.4	10.2	10.8
Gennemsnit. ...						34.8	155.1	116	120.3	3.64	23.0	14.5	62.5	11.1	34.2	11.4	10.5	10.4	11.0

Endvidere kan anføres, at Afkom efter Herodes, Slægtled 3, Række 141 C2, har en lav Karakter for Bugflæsk og Skinker, og at Afkommet efter So Nr. 176, Slægtled 2, Række 162 C2, har et meget stort Forbrug af Korn til et Pd Tilvækst.

Slægten Triddelfitz Stbg 3.

Triddelfitz var Stamorne paa Avlscentret Bøgsted i Vendsyssel.

Tabel XVI. Uddrag af Slægtstavle 3.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæsks Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	2	40.0	154.2	105	114.2	3.61	21.5	14.4	64.1	12.9	34.7	11.1	11.7	10.6	11.4
3.	11	34.8	155.1	116	120.3	3.64	23.0	14.5	62.5	11.1	34.2	11.4	10.5	10.4	11.0
4.	7	37.3	154.3	106.0	117.0	3.74	24.2	13.6	62.2	11.9	34.6	11.6	10.9	10.6	11.1
5.	3	35.6	148.7	112	113.1	3.97	23.9	15.8	60.3	12.0	33.6	12.2	11.1	11.2	11.8
Krydsning.	6	37.1	155.0	121	117.9	3.78	19.8	14.3	65.8	12.0	34.3	12.1	11.9	11.7	11.5

For de fire Slægtled, der som Uddrag af Slægtstavle 3, Tab XV, er opført i Tab XVI, viser Tallene i Kol 7, at der fra 2. til 5. Slægtled er en regelmæssig og ret betydelig Forøgelse af Pd Korn til et Pd Tilvækst, nemlig 3,61, 3,64, 3,74, 3,97, og i lige Maade finder vi i Kol 8 fra Led til Led en Stigning i Slagtesvind, og naar undtages 4. Slægtled i Kol 9, tillige i pCt Affald. Endvidere et stadigt dalende Tal for pCt Eksportflæsk, som for de fire Generationer er 64,1, 62,5, 62,2, 60,3. Kol 11 viser, at 2. Slægtled har et højt Tal, 12,9, for Flæskets Fasthed; dette daler i 3. Led ned til 11,1, for i de følgende atter at stige til 11,9 og 12,0. Karaktererne for Rygflæsk (Kol 13,) er stadig stigende fra 11,1 i 2. til 12,2 i 5. Slægtled.

For Bugflæskets, Skinkernes og Finhedens Vedkommende, Kol 14, 15, 16, har 2. Slægtled i alle Tilfælde faaet gode

Karakterer; disse er lavere for 3. Led, men stiger igen for 4. og 5. Slægtled.

De 6 Krydsningshold, som knytter sig til Slægten, har ifølge Kol 7 et Forbrug af Korn til hvert Pd Tilvækst, som staar lige med 4. Slægtled, nemlig 3,78. De har et meget lille pCt Slægtesvind, nemlig 19,8 og 14,3 pCt Affald; til Gengæld et højt Tal for pCt Eksportflæsk, 65,8, hvorimod Kvaliteten af Ryg, Bug, Skinker og Finhed kun staar paa Højde med Holdene i 1. Slægtled af den rene Race.

Af Enkeltheder inden for Slægten kan peges paa, at Afkommet efter Ornen Dan i Slægtled 2, Række 149 C,1, har givet 64,1 pCt Eksportflæsk, hvilket maa regnes at være et forholdsvis højt Tal, og at den gennem Døtrene Meta og Bine i 3 Slægtled har givet henholdsvis 65,2 og 64,8 pCt, hvorimod Afkommet efter Datteren Sidse i samme Slægtled kun har givet 61,6 pCt.

Noget lignende gør sig gældende med Ornen Ali i 4. Slægtled, hvor dens Afkom med Soen Alvina gav 64,1 pCt, men med So Nr. 61 kun 58,8 pCt.

Da Eksportflæsket jo er den virkelige Bacon Salgsvarer, vil man indse, hvilken Forskel der økonomisk set kan være mellem disse Hold.

Slægten Mikkel Stbg 5.

Mikkel var i længere Tid Stamorne paa Avlscentret Enggaarden ved Aalborg.

Til Tab XVIII, som er Uddrag af Slægtstavle 4, Tab XVII, maa først anføres, at det nærmest er for Fuldstændigheds Skyld at 1. Slægtled er taget med; thi da det kun omfatter ét Hold, vilde det være for ensidigt derpaa at bygge noget vedrørende Slægtens Godhed, hvorfor vi heller ikke vil drage det med ind i Sammenligningen.

Forbrug af Pd Korn pr Pd Tilvækst har for 2.—3.—4. Slægtled ifølge Kol 7 været 3,50, 3,94, 3,67. At Produktionen i 3 Slægtled har været saa meget højere end for de to andre, ligger i, at der indgaar nogle Hold, som har haft et meget højt Forbrug, f. Eks. Afkom efter Voldum, Række 170 C, 2, som har et Forbrug af 4,79, og efter Holmgaard Matbæk, Række 162 C,1, som har 4,53, samt efter Dan, Række 156 C,2, som har 4,32 o. s. v.

Tabel XVII. Slægtstavle 4. Mikkel Stbg 5.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkomet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport-flæsk	Tal for Fasthed	Kroppens Længde	Points for			
						Begyn- delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til- vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 1. Slægtled.</i>																			
Mikkel	5	149	C 2.	Martha	14	36.8	144.0	112	107.2	3.88	21.4	14.2	64.4	11.3	33.2	11.2	11.6	11.4	11.5
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Mikkel: Enggaard	34	145	C 2.	Gaardbo	14	34.0	146.8	112	112.8	3.95	—	—	—	11.3	32.6	11.7	11.0	11.0	11.2
do.	34	145	C 3.	Tuk	13	35.7	152.8	112	117.1	3.61	—	—	—	8.7	33.9	9.8	10.5	10.8	10.4
do.	34	152	C 3.	Tuk	13	31.2	164.6	112	133.4	3.40	—	—	—	9.8	35.3	11.7	10.3	10.5	10.9
David	35	146	C 2.	Nr. 3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	34.5	10.5	11.0	10.8	11.0
do.	35	156	C 1.	Nr. 6	2	36.0	148.5	112	112.5	3.10	24.8	14.5	60.7	9.0	33.0	9.2	9.3	8.0	8.5
Mikkel II.	100	157	C 4.	Nr. 180	15	30.3	151.2	126	120.9	3.38	23.4	15.9	60.7	12.3	34.9	13.2	12.2	11.0	11.6
do.	100	162	C 3.	Nr. 179	15	37.3	147.3	126	110.0	4.06	24.0	—	—	10.3	33.7	11.5	11.4	10.6	10.6
Axel	36	154	C 3.	Anine	14	32.3	156.6	126	124.3	3.02	—	—	—	12.3	34.5	10.7	11.3	10.1	11.0
Mogens	113	146	C 1.	Andrea	1	—	—	—	—	—	24.0	15.4	60.6	12.5	34.1	11.1	10.8	10.5	11.1
do.	113	150	C 2.	Metha	3	30.8	147.0	112	116.2	3.44	21.0	13.8	65.2	11.7	34.3	10.9	11.9	10.4	11.3
Mary 18.		152	C 2.	Taarupgaard	14	40.7	161.9	112	121.2	3.57	—	—	—	8.6	34.6	12.3	11.4	9.2	10.9
Gennemsnit. . .	—					34.3	153.0	117	118.7	3.50	23.3	14.9	61.8	10.7	34.1	11.1	11.0	10.3	10.8

<i>Børn af 3. Slægtled.</i>																			
Enggaard; Holmgaard ..	112	159	C 1.	Dora 3.	13	45.5	146.0	84	100.5	3.49	20.7	15.4	63.9	11.3	34.5	10.5	13.4	11.2	10.3
do. ..	112	163	C 3.	Thekla 2	13	44.0	165.7	98	121.7	3.65	19.5	17.1	63.4	10.8	34.7	12.7	12.5	11.3	11.6
do. ..	112	163	C 4.	Malle	13	31.0	155.6	112	124.6	3.78	19.3	—	—	13.5	34.1	12.5	11.9	12.2	11.8
Holmgaard																			
Maltbæk	—	162	C 1.	Musse 2	14	35.0	150.7	140	115.7	4.53	23.9	—	—	10.2	33.1	10.6	11.4	10.8	11.0
Major	37	166	C 3.	Tummelumsen	2	37.6	145.2	98	107.6	3.63	25.5	14.7	59.8	9.0	32.9	9.6	9.0	10.4	10.2
Gine 8 b	52	160	C 4.	Max	2	32.0	150.0	112	118.0	3.75	25.2	12.6	62.2	10.4	33.8	11.7	11.5	10.6	11.1
Ternen	—	156	C 4.	Max	14	33.6	167.7	140	134.1	4.12	25.5	14.2	60.3	9.3	32.7	12.1	10.8	10.6	12.5
David; Dam	35	150	C 1.	Gram	3	36.5	155.0	112	118.5	3.57	21.3	13.3	65.4	8.6	33.1	12.1	11.7	10.6	11.3
do.	35	156	C 2.	Mary	3	34.8	162.7	140	127.9	4.32	24.8	15.9	59.3	9.3	33.7	8.8	9.2	9.2	10.3
do.	35	164	C 1.	Grethe	3	34.2	158.6	112	124.4	3.67	23.6	16.0	60.4	7.6	33.7	10.9	9.4	10.2	10.8
So	—	158	C 2.	Orne	14	32.7	158.8	112	126.1	3.53	21.7	15.6	62.7	12.2	34.5	12.2	11.3	10.2	10.2
Woldum	—	170	C 2.	Kornumgaard	1	41.0	145.8	140	104.8	4.79	24.4	16.6	59.0	12.0	33.9	11.0	12.3	11.3	11.3
Mikkel; Nr. 11.	100	168	C 6.	Sludegaard	6	37.2	154.2	126	117.0	3.88	27.8	15.0	57.2	11.3	35.0	11.4	10.9	11.1	12.1
Axel; Alvine	—	160	C 3.	Ali	1	35.4	161.6	126	126.2	4.20	23.9	12.0	64.1	11.5	34.3	11.8	11.6	10.8	11.1
Stefania	—	164	C 3.	Svend	14	35.6	147.4	98	111.8	3.86	22.4	—	—	11.4	32.9	12.0	10.1	10.3	11.7
Nr. 241	—	169	C 2.	Torpe	7	37.0	145.2	126	108.2	4.25	23.1	16.6	60.3	11.4	34.3	12.6	11.8	12.0	11.8
Alvine	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gennemsnit.						36.4	154.4	117	118.0	3.94	23.6	15.0	61.4	10.6	33.8	11.4	11.1	10.8	11.2
<i>Børn af 4. Slægtled.</i>																			
Holmgaard; Føns Rud ..	—	165	C 1.	Orne	11	44.5	151.8	98	107.3	3.96	26.9	13.8	59.3	13.3	35.5	12.5	11.0	11.0	13.8
Dam; Nogi	38	166	C 5.	Nikoline	2	31.4	144.6	112	113.2	3.67	26.5	15.0	58.5	8.0	34.3	10.6	10.0	9.7	10.5
Sigurd	—	167	C 1.	Susse	3	37.0	158.2	98	121.2	3.54	24.7	14.8	60.5	7.8	34.7	10.0	9.6	9.9	10.5
Alvine; Alice	—	170	C 1.	Burholt	9	34.2	144.8	112	110.6	3.28	24.8	15.3	59.9	12.6	33.9	11.8	11.6	11.6	12.0

Tabel XVII (fortsat).

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkomet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport-flæsk	Tal for Fasted	Kroppens Længde	Points for			
						Begyn-delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til-vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Alaine: Alvilda	—	164	C 5.	Damgaard	—	39.2	145.6	84	106.4	3.84	22.3	—	—	13.8	33.3	12.0	11.0	10.9	11.4
Støssel	43	167	C 7.	Salone	9	33.6	148.2	98	114.6	3.71	25.1	16.0	58.9	13.2	34.2	12.9	12.1	11.3	12.8
do.	43	170	C 3.	Sørine	9	36.0	149.4	112	113.4	3.69	25.5	15.8	58.7	12.3	34.1	10.7	11.7	10.7	10.7
Gennemsnit. ...						36.5	148.9	102	112.4	3.67	25.6	15.1	59.3	11.6	34.3	11.5	11.0	10.7	11.7
Søer bedækkede ved York-shireorne.																			
Mikkel So	—	145	B 1.	Y.-Orne	—	38.8	149.3	112	110.5	3.79	—	—	—	13.2	34.5	12.8	12.5	12.3	13.0
Axel: So	—	161	B	do.	—	29.6	149.0	112	119.4	3.63	19.8	16.1	64.1	13.4	33.4	13.0	13.7	12.1	12.1
Dam: So	—	170	B 2.	do.	—	37.0	155.4	126	118.4	3.76	23.3	16.2	60.5	13.8	33.2	12.0	12.5	12.8	12.8
Gennemsnit. ...						35.1	151.2	117	116.1	3.73	21.6	16.1	62.3	13.5	33.7	12.6	12.9	12.4	12.6

Tabel XVIII. Uddrag af Slægtstavle 4.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskets Fasthed	Kroppens Længde	Points for			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slægtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	1	36.8	144.0	112	107.2	3.88	21.4	14.2	64.4	11.3	33.2	11.2	11.6	11.4	11.5
2.	11	34.3	153.0	117	118.7	3.50	23.3	14.9	61.8	10.7	34.1	11.1	11.0	10.3	10.8
3.	16	36.4	154.4	117	118.0	3.94	23.6	15.0	61.4	10.6	33.8	11.4	11.1	10.8	11.2
4.	7	36.5	148.9	102	112.4	3.67	25.6	15.1	59.3	11.6	34.3	11.5	11.0	10.7	11.7
Krydsning.	3	35.1	151.2	117	116.1	3.73	21.6	16.1	62.3	13.5	33.7	12.6	12.9	12.4	12.6

Kol 8 og 9 viser, at pCt Slagtesvind og Affald er stigende fra Slægtled til Slægtled, at Mængden af pCt Eksportflæsk efter Tallene i Kol 10 er i samme Grad dalende, de er nemlig 61,8, 61,4, 59,3; men medens Kvaliteten for Bugflæsk ifølge Kol 14 er forbleven uforandret, er der for Rygflæsk, Skinker og Finhed (Kol 13, 15, 16) en kendelig Forbedring fra 2. til 3. Slægtled.

De 3 Krydsningshold, som har et lille Slagtesvind, 21,6 pCt, og et højt Tal for pCt Affald, nemlig 16,1, har 3 pCt Eksportflæsk mere end 4. Slægtled. Med Hensyn til Flæskets Fasthed, Rygflæskets, Bugens og Skinkernes Godhed samt Knoklernes og Sværens Finhed, staar Krydsningsholdene 1 à 2 Points over ethvert af Slægtledene af den rene Race.

Af Enkeltheder kan anføres, at Afkommet efter Ornen Holmgaard, Række 163 C,3 og C,4 samt til Dels Række 159 C,1, har et forholdsvis lille Slagtesvind, henholdsvis 19,5, 19,3 og 20,7 pCt.

Alle Hold i 4. Slægtled har, paa ét nær, givet mindre end 60 pCt Eksportflæsk, men lavest i saa Henseende staar dog So Nr 11 i 3. Slægtled, Række 168 C,3, der ved Ornen Sludegaard har leveret Afkom, som kun har givet 57,2 pCt Eksportflæsk og et Slagtesvind af 27,8 pCt.

Angaaende Flæskets Fasthed skal her anføres, at naar der derfor gives en Karakter under 10, da anses Konsistensen at være saadan, at Flæskets Kvalitet lider derved, og det bliver

da en daarlig Vare til Eksport. Det har imidlertid været en almindelig Opfattelse, at det bløde Flæsk maatte tilskrives visse Foderstoffer, som har Tilbøjelighed til at give Flæsket en daarlig Konsistens, f. Eks. Majs, Klid, Solsikkekager o. s. v.

At det dog ikke altid behøver at skyldes Foderstofferne, men ogsaa kan være en Egenskab hos selve Dyrene, synes at fremgaa af, at enkelte Grene af nærværende Slægt i mange Tilfælde har givet blødt Flæsk, endda det Foder, der har været benyttet, ikke skulde give Anledning dertil, og Hold fra andre Slægter paa samme Forsøg har givet Flæsk af passende Fasthed.

Tabel XIX.

Slægtled	Række	Hold	Tal for Flæskets Fasthed	Foderet bestod af
<i>Afkom af 2. Slægtled.</i>				
Mikkel: Mary	152	C. 2	8.6	Majs—Byg—Mælk
Enggaard	145	C. 2	11.3	Byg—Mælk
do.	145	C. 3	8.7	do.
do.	152	C. 3	9.8	Majs—Byg—Mælk
David	146	C. 2	11.5	Majs—Rug—Mælk
do.	156	C. 1	9.0	Byg—Mælk
<i>Afkom af 3. Slægtled.</i>				
Enggaard: Major	166	C. 3	9.0	Byg—Mælk
Ternen	156	C. 4	9.3	do.
Dam	150	C. 1	8.6	Majs—Byg—Mælk
do.	156	C. 2	9.3	Byg—Mælk
do.	164	C. 1	7.6	do.
<i>Afkom af 4. Slægtled.</i>				
Dam: Nogi	166	C. 5	8.0	Byg—Mælk
Sigurd	167	C. 1	7.8	do.

For at belyse dette nærmere er der i Tab XIX, efter Ornen Mikkel, opført 3 Børn, nemlig Mary, Enggaard og David, hvis Afkom i de fleste Tilfælde har vist sig at give blødt Flæsk; thi af de 6 Hold Grise, de har leveret til Forsøgene, har kun 2 Hold

Tabel XX. Slægtstavle 5. Adam Stbg 16.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport-flæsk	Tal for Fasthed	Kroppens Længde	Points for			
						Begyn-delsen	Slutning	Dage Antal	Pd Til-vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Adam: Nr. 72	—	142	C 2.	Job	7	31.7	156.3	140	124.6	4.14	23.2	—	—	14.6	36.5	11.3	10.5	11.3	10.2
Isak	92	151	C 1.	Nr. 78	6	34.5	159.0	126	124.5	3.72	22.7	15.2	62.1	13.5	34.1	11.1	10.9	10.9	11.4
do.	92	155	C 3.	Nr. 172	15	32.0	159.5	126	127.5	3.73	22.4	13.9	63.7	12.0	34.8	9.8	9.3	10.8	10.2
Nr. 93	—	151	C 2.	Job	7	33.8	148.3	126	114.5	3.87	23.3	14.7	62.0	12.5	35.3	12.0	10.6	10.4	11.2
Nr. 96	—	151	C 3.	Job	7	36.2	160.0	126	123.8	3.81	23.2	14.2	62.6	13.0	34.5	12.3	10.0	10.9	11.1
Gennemsnit. .						33.6	156.6	129	123.0	3.85	22.9	14.5	62.6	13.1	35.0	11.3	10.3	10.9	10.8
<i>Børn af 3. Slægtled.</i>																			
Isak: Nr. 182	—	169	C 1.	Hesselbjerg	6	50.3	153.8	112	103.5	4.31	25.2	16.1	58.7	12.2	35.4	12.7	12.0	11.2	12.5
Frigaard	101	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Børn af 4. Slægtled.</i>																			
Frigaard: Nr. 290	101	168	C 4.	Nr. 261	—	38.0	155.5	140	117.5	4.43	24.5	14.6	60.9	12.0	33.9	12.3	11.1	10.7	11.6
<i>Spær bedækkede ved York-shireorne.</i>																			
Isak: Nr. 2 a	—	151	B 2.	Y.-Orne	—	35.5	155.7	126	120.0	3.80	21.1	14.4	64.5	13.0	35.0	10.6	10.5	11.5	10.3
So	—	157	B 1.	do.	—	29.8	162.0	140	132.2	3.82	20.7	15.4	63.9	13.8	35.1	11.1	11.4	11.5	11.9
So	—	162	B 1.	Nordmand	—	32.2	149.8	126	11.76	3.48	(21.3)	—	—	11.0	34.2	12.0	11.3	11.7	11.7
So	—	162	B 2.	Fanneruf Tip	—	33.8	149.5	140	115.7	3.91	(21.0)	—	—	12.2	33.5	12.3	12.1	12.7	12.0
Gennemsnit. .						32.9	154.3	133.0	121.4	3.75	20.9	14.9	64.2	12.5	34.4	11.5	11.3	11.9	11.5

givet Flæsk af passende Fasthed, hvorimod det hos de øvrige 4 Hold har været af en mere eller mindre daarlig Konsistens. I 3. Slægtled er der 5 Hold Børnebørn efter Enggaard og David, som alle har givet blødt Flæsk, og ligeledes er der i 4. Generation 2 Hold efter Dams Sønner Nogi og Sigurd, som ogsaa har leveret Flæsk med denne uheldige Egenskab.

Hvad der hos selve Dyrene er Aarsag til, at Flæsket bliver blødt, er vanskeligt at afgøre; thi som Tabellen viser, er der et Hold efter Enggaard og et efter David, hvor Flæsket har faaet henholdsvis 11,3 og 11,5 i Karakter, og hvor der altsaa intet har været i Vejen med Konsistensen, og ligeledes er der andre af deres Børn, hvis Afkom heller ikke har givet blødt Flæsk, men at der i saa Henseende har været en Fare inden for den Gren af Slægten, er klart nok, og specielt har denne Fare været til Stede hos Afkommet efter Ornen Dam.

Flere af de i Tab XIX opførte Hold findes ogsaa i andre Slægtstavler og bidrager der til at nedsætte Tallene for Flæskets Fasthed, men dette kan efter Planen for Stoffets Ordning ikke undgaas.

Slægten Adam Stbg 16.

Adam var Stamorne paa Avlscentret Landkilde ved Odense.

Tabel XXI. Uddrag af Slægtstavle 5.

Slægtled]	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksporthæsk	Tal for Flæskets Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	5	33.6	156.6	129	123.0	3.85	22.9	14.5	62.6	13.1	35.0	11.3	10.3	10.9	10.8
3.	1	50.3	153.8	112	103.5	4.31	25.2	16.1	58.7	12.2	35.4	12.7	12.0	11.2	12.5
4.	1	38.0	155.5	140	117.5	4.43	24.5	14.6	60.9	12.0	33.9	12.3	11.1	10.7	11.6
Krydsning.	4	32.9	154.3	133	121.4	3.75	20.9	14.9	64.2	12.5	34.4	11.5	11.3	11.9	11.5

Da der af denne Slægt kun har været et enkelt Hold inde til Forsøg baade af 3. og 4. Slægtled, er Materialet for ringe til, at der deraf kan drages fyldestgørende Sammenligninger;

Tabel XXII. Slægtstavle 6. Midskov Stbg 17.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkomet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport-flask	Tal for Fasthed	Kroppens Lænke	Points for			
						Begyn-delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til-vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflask	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Midskov: Nr. 78	17	151	C 1.	Isak	5	34.5	159.0	126	124.5	3.72	22.7	15.2	62.1	13.5	34.1	11.1	10.9	10.9	11.4
Nr. 252	17	162	C 4.	Hjadstrup	—	37.2	147.8	126	110.1	3.72	19.9	19.7	60.4	10.2	34.1	11.4	11.0	11.0	11.1
Sludegaard ...	103	168	C 6.	Nr. 11	14	37.7	154.2	126	117.0	3.88	27.8	15.0	57.2	11.3	35.0	11.4	10.9	11.1	12.1
Hesselbjerg ...	—	168	C 3.	Nr. 79	—	36.9	160.0	154	123.1	3.77	25.3	16.1	58.6	12.8	34.0	11.5	12.8	13.3	13.0
Hesselbjerg ...	104	169	C 1.	Nr. 182	5	50.3	153.8	112	103.5	4.31	25.2	16.1	58.7	12.2	35.4	12.7	12.0	11.2	12.5
Nr. 292	—	169	C 4.	Nr. 1	—	46.0	149.3	112	103.3	4.13	23.6	16.3	60.1	12.7	34.6	11.7	11.7	11.8	12.7
Gennemsnit. ...						40.4	154.0	126.0	113.6	3.91	24.1	16.4	59.5	12.6	34.5	11.6	11.6	11.6	12.1
Søer bedækkede ved York-shireorne.																			
Midskov: So	—	151	B 1.	Y.-Orne	—	30.7	151.3	126	120.6	3.79	20.3	14.4	65.3	13.2	35.0	12.7	11.7	12.0	12.8

men det bør maaske dog paapeges, at disse enkelte Hold ifølge Kol 7 har haft et større Forbrug af Pd Korn pr Pd Tilvækst, et lavere Tal for pCt Eksportflæsk og for Flæskets Fasthed end Slægtled 2; til Gengæld synes derimod Kvaliteten at have været noget bedre.

De 5 Hold af 2. Slægtled, som, naar undtages Karaktererne for Ryg- og Bugflæsk for Hold C, 3. Række 155, er meget ensartede, kan derimod sammenlignes med de samme Slægt nærtstaaende 4 Krydsningshold, hvilken Sammenligning absolut falder ud til Fordel for Krydsningerne, idet disse ifølge Kol 7 har et lavere Foderbrug, et mindre Slagtesvind, og efter Kol 10 1,6 pCt Eksportflæsk mere; Karaktererne for Rygflæsk, Bug, Skinker og Finhed er tilmed i alle Tilfælde (Kol 13, 14, 15, 16) omkring 1 Point højere for Krydsningerne end de tilsvarende Tal for 2. Slægtled af den rene Race.

Slægten Midskov Stbg 17.

Ornen Midskov var i en længere Periode Stamorne paa Avlscentrene Lykkesborg og Sludegaard paa Fyn.

Af denne Slægt har der desværre kun været Grise til Forsøg fra 2. Slægtled, saa noget Billede af Slægtens Frem- eller Tilbagegang kan ikke gives, men af Gennemsnitstallene ses dog, at Foderforbruget pr Pd Tilvækst ikke er blandt de laveste, at Slagtesvind og pCt Affald er over og pCt Eksportflæsk en Del under Gennemsnit for Landracen i Almindelighed. Kvaliteten har derimod ifølge de givne Points været meget god.

Det enkelte Krydsningshold, som hører hertil, har et noget lavere Tal for Foderforbrug, tillige har det 4 pCt Slagtesvind og 2 pCt Affald mindre, men 6 pCt Eksportflæsk mere end Gennemsnit af de 6 Hold af den rene Race, ligesom ogsaa Tallene for Kvaliteten er bedre. Det er dog en Selvfølge, at da der kun er ét Hold Krydsninger, maa denne Sammenligning tages med alt Forbehold.

Af Enkeltheder inden for denne Slægt kan anføres, at Hold C, 4. Række 162, har et lille Slagtesvind, nemlig kun 19,9 pCt, men til Gengæld har det ikke mindre end 19,7 pCt Affald.

Hold C,3 og C,6 i Række 168 samt C,1 i 169 har alle et lavt Tal for pCt Eksportflæsk, idet det henholdsvis har været 58,6 57,2 og 58,7 pCt.

Tabel XXIII. Slægtstavle 7. Greve.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport-flesh	Tal for Fasthed	Kroppens Længde	Points for			
						Begyn-delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til-vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 2. Slægtil.</i>																			
Greve: Taarupg. Vardeg.	18	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lykkesb. Vardeg.	19	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Børn af 3. Slægtil.</i>																			
Taarupg. Vardeg.: Job ..	90	142	C 2.	Nr. 72	5	31.7	156.3	140	124.6	4.14	23.2	—	—	14.6	36.5	11.3	10.5	11.3	10.2
do. ..	90	151	C 2.	Nr. 93	5	33.8	148.3	126	114.5	3.87	23.3	14.7	62.0	12.5	35.3	12.0	10.6	10.4	11.2
do. ..	90	151	C 3.	Nr. 96	5	36.2	160.0	126	123.8	3.81	23.2	14.2	62.6	13.0	34.5	12.3	10.0	10.9	11.1
Nr. 102	102	148	C 3.	Rasmus	15	30.5	155.4	140	124.9	4.33	22.5	15.2	62.3	13.5	34.8	12.3	11.0	11.0	10.9
Nr. 112	18	157	C 2.	Klovn	9	31.7	161.7	154	130.0	4.08	23.7	15.9	60.4	12.0	35.2	12.6	10.8	11.4	11.8
Lykkesb. Vardeg: Torpe	94	169	C 2.	Nr. 241	10	37.0	145.2	126	108.2	4.25	23.1	16.6	60.3	11.4	34.3	12.6	11.8	12.0	11.8
Lykkesb.	93	169	C 5.	Nr. 13	9	41.3	152.6	140	111.3	4.72	25.7	16.4	57.9	10.8	33.9	11.7	11.3	10.7	11.2
Gennemsnit. ..						34.6	154.2	136	119.6	4.17	23.6	15.5	60.9	12.5	34.9	12.5	10.9	11.1	11.2
<i>Børn af 4. Slægtil.</i>																			
Job: Nr. 180.	90	157	C 4.	Mikkel II.	15	30.3	151.2	126	120.9	3.38	23.4	15.9	60.7	12.3	34.9	13.2	12.2	11.0	11.6
Nr. 179.	90	162	C 3.	do.	15	37.3	147.3	126	110.0	4.06	24.0	—	—	10.3	33.7	11.5	11.4	10.6	10.6
Nr. 102: Mulvad	—	159	C 4.	Nr. 28	15	38.8	149.0	98	110.2	3.68	24.2	15.6	60.2	12.0	34.7	13.3	12.0	12.3	12.7
Taarupgaard ..	102	168	C 5.	Nr. 232	15	33.7	158.5	140	124.8	4.36	24.2	15.6	60.2	13.2	34.1	12.2	12.5	12.1	11.6
do.	—	169	C 6.	Nr. 236	15	39.0	151.6	126	112.6	4.24	25.4	15.9	58.7	11.5	34.8	10.8	12.0	10.8	12.3
Nr. 176	—	162	C 2.	Klovn	9	36.7	155.2	140	118.5	4.56	21.1	—	—	12.5	34.1	12.4	12.0	12.0	11.1
Torpe: Dalum	—	168	C 1.	Nr. 6	—	53.3	158.5	126	105.2	4.27	26.1	14.8	59.1	10.8	34.2	12.4	11.7	11.8	12.1
Lykkesb.: Nr. 1 Bregør.	—	169	C 4.	Nr. 292	—	46.0	149.3	112	103.3	4.13	23.6	16.3	60.1	12.7	34.6	11.7	11.7	11.8	12.7
Gennemsnit.						39.4	152.6	124	113.2	4.08	24.5	15.7	59.8	11.9	34.1	12.2	11.9	11.6	11.8

Slægten Greve.

Ornen Greve, som var Stamorne paa Avlscentret Vardegaard paa Sjælland, er Fader til Ornerne Taarupgaard-Vardegaard, Stbg 18, og Lykkesborg-Vardegaard, Stbg. 19, paa Fyn, og det er Afkom efter disse to Orner, der har været draget ind under Forsøgene.

Tabel XXIV. Uddrag af Slægtstavle 7.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskest Fasthed	Kroppens Længde	Points for			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	7	34.6	154.2	136	119.6	4.17	23.6	15.5	60.9	12.5	34.9	12.5	10.9	11.1	11.2
4.	8	39.4	152.6	124	113.2	4.08	24.5	15.7	59.8	11.9	34.1	12.2	11.9	11.6	11.8

Et Uddrag af Resultaterne for det fra denne Slægt indtagne Forsøgsmateriale er opført i Tab XXIV, hvor det af Kol 7 fremgaar, at Forbruget af Pd Korn pr Pd Tilvækst for de to Slægtled har været 4,17 og 4,08, altsaa lavest for 4. Slægtled, derimod er pCt Slagtesvind og Affald større, men pCt Eksportflæsk lavere for dette end for 3. Slægtled. Kvaliteten, navnlig for Bugflæskest Vedkommende, er ogsaa bedst, for 4. Slægtled.

Af Enkeltheder inden for Holdene kan anføres, at Afkommet efter Ornen Lykkesborg i 3. Slægtled, Række 169 C,5, har et Forbrug af ikke mindre end 4,72 Pd Korn pr Pd Tilvækst og har dernæst kun haft 57,9 pCt Eksportflæsk; i øvrigt har 6 af de 8 Hold i 4. Slægtled ogsaa brugt mere end 4 Pd Korn pr Pd Tilvækst, og samtlige Hold har mindre end 61 pCt Eksportflæsk.

Slægten Jumbo Stbg 23.

Jumbo har ikke været Stamorne i noget Avlscenter; men da den ikke desto mindre har haft Betydning for Svineavl, idet en Del af dens Afkom er gaaet ind i Centrene som Stamdyr, har vi anset det for rigtigst at samle de med denne beslægtede Hold i en særskilt Slægtstavle.

Tabel XXV. Slægtstavle 8. Jumbo Stbg 23.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport- flæsk	Tal for Fæthed	Kroppens Længde	Points for			
						Begyn- delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til- vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Jumbo: Torstenæs	23	141	C 3.	Gine II.	10	36.3	155.8	120	119.5	4.62	—	—	—	13.8	36.6	—	6.8	7.5	—
do.	23	147	C 2.	Snog	10	42.0	149.2	112	107.2	3.94	22.1	—	—	11.6	34.4	12.3	12.3	11.5	12.3
Rolf	—	147	C 1.	Fanny	—	31.2	164.5	140	133.3	3.85	21.3	16.5	62.2	9.8	34.4	10.8	10.6	10.0	10.7
Vollerup	109	153	C 2.	Thola	2	40.6	163.1	112	122.5	3.56	21.9	14.3	63.8	11.0	35.0	10.9	12.1	9.1	11.6
Bismark	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gennemsnit. . .						37.5	158.1	121.0	120.6	3.99	21.6	15.4	63.0	11.6	35.1	11.3	10.5	9.5	11.5
<i>Børn af 3. Slægtled.</i>																			
Torstenæs: Torstenæs II.	—	155	C 1.	Lundbytorp	—	36.6	163.9	140	127.3	4.54	20.1	14.9	65.0	13.3	34.0	12.2	11.5	10.8	11.7
Ondløse	23	161	C 3.	Nr. 10	—	36.0	158.6	112	122.6	3.39	19.7	16.6	63.7	12.4	34.6	12.8	10.9	10.6	12.0
Torstenæs Rud	97	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vollerup: Malle	—	163	C 4.	Holmgaard	—	31.0	155.6	112	124.6	3.78	19.3	—	—	13.5	34.1	12.5	11.9	12.2	11.8
Gennemsnit. . .						34.5	159.3	121.0	124.8	3.90	19.9	15.7	64.4	13.1	34.2	12.5	11.4	11.2	11.8

Tabel XXV (fortsat)

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Alkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport- flæsk	Tal for Fasted	Kroppens Længde	Points for			
						Begyndelsen	Slutning	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Bygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 4. Slægtled.</i>																			
Ondløse; Nr. 16	—	167	C 2.	Ulfkjær III.	12	31.2	155.2	112	124.0	3.68	23.3	13.6	63.1	11.6	34.6	11.7	11.5	11.3	11.9
Torstenæs Rud Nr. 1 ..	—	169	C 3.	Nr. 7	—	41.8	155.0	154	113.2	4.82	26.5	16.2	57.3	11.0	34.6	10.0	10.2	10.0	10.6
Gennemsnit . . .						36.5	155.1	133	118.6	4.25	24.9	14.9	60.2	11.3	34.6	10.9	10.9	10.7	11.3
<i>Søer bedækkede ved York-shireorne.</i>																			
Torstenæs; So	—	155	B 3.	Y.-Orne	—	37.2	146.8	112	109.6	3.78	21.1	14.8	64.1	11.8	34.0	9.7	11.6	11.3	11.2
Vollerup; Malle	—	163	B 4.	Balkjær	—	36.2	147.4	126	111.2	4.70	19.1	—	—	14.3	33.2	12.4	11.9	12.4	12.3
Bismark; So	—	159	B 2.	Frits	—	28.6	155.3	112	126.7	3.49	20.3	14.9	64.8	12.4	34.8	12.1	12.1	12.3	12.3
Gennemsnit . . .						34.0	149.8	117	115.8	3.97	20.7	14.8	64.5	12.8	34.0	11.4	11.9	12.0	11.9

Tabel XXVI. Uddrag af Slægtstavle 8.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskets Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	4	37.5	158.1	121	120.6	3.99	21.6	15.4	63.0	11.6	35.1	11.3	10.5	9.5	11.5
3.	3	34.5	159.3	121	124.8	3.90	19.9	15.7	64.4	13.1	34.2	12.5	11.4	11.2	11.8
4.	2	36.5	155.1	133	118.6	4.25	24.9	14.9	60.2	11.3	34.6	10.9	10.9	10.7	11.3
Krydsning.	3	34.0	149.8	117	115.8	3.97	20.7	14.8	64.5	12.8	34.0	11.4	11.9	12.0	11.9

Ved Sammenligning af de Slægtled, som i Uddrag af Slægts-tavle 8 er opført i Tab XXVI, vil man se, at Holdene i 3. Slægtled har været 2. og 4. Slægtled langt overlegne baade i Trivelighed og Kvalitet. Mængden af Korn til et Pd Tilvækst har for de tre Slægtled ifølge Kol 7 været henholdsvis 3,99, 3,90 og 4,25 Pd, og paa samme Maade er Tallene for pCt Eksportflæsk (Kol 10): 63,0, 64,4, 60,2, hvoraf fremgaar at 3. Slægtled har brugt 0,09 Pd Korn mindre, til et Pd Tilvækst, end 2. Slægtled, og 0,35 mindre end 4. Slægtled; endvidere har det haft 1,4 pCt Eksportflæsk mere end 2., og 4,2 mere end 4. Slægtled.

Af Tallene for Flæskets Fasthed, Rygflæsket, Bugen, Skinkerne og Finheden, vil det ogsaa ses, at 3. Slægtled har givet den bedste Kvalitet.

Af samtlige Kolonner vil det imidlertid fremgaa, at de her henhørende 3 Krydsningshold staar Holdene fra 3die Slægtled meget nær baade i Trivelighed og Kvalitet.

Afkommet efter Ornen Torstenæs i 2. Slægtled Række 141 C,3 har brugt 4,62 Pd Korn til hvert Pd Tilvækst og haft lave Points for Bugflæsk og Skinker, nemlig henholdsvis 6,8 og 7,5, men i Række 147 C,2 er Afkommet efter samme Orne meget godt i alle Maader. Afkommet efter Sønnen Torstenæs II i 3. Slægtled Række 155 C,1 har brugt 4,54 Pd Korn pr Pd Tilvækst, og So Nr 1 i 4. Slægtled, en Sønnedatter af Torstenæs, var Moder til Hold C,3 i Række 169, der brugte 4,86 Pd Korn til hvert Pd Tilvækst; tilmed har samme Hold kun haft 57,3 pCt Exportflæsk.

Tabel XXVII. Slægtstavle 9. Klovn, Stb 99.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkomet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport- flæsk	Tal for Fasted	Kroppens Længde	Points for			
						Begyndelsen	Slutning	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Afald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 1. Slægtled.</i>																			
Klovn.	99	157	C 2.	Nr. 112	7	31.7	161.7	154	130.0	4.08	23.7	15.9	60.4	12.0	35.2	12.6	10.8	11.4	11.8
do.	99	162	C 2.	Nr. 176	7	36.7	155.2	140	118.5	4.56	21.1	—	—	12.5	34.1	12.4	12.0	12.0	11.1
Gennemsnit. ..						34.2	158.5	147.0	124.3	4.32	23.7	15.9	60.4	12.3	34.7	12.5	11.4	11.7	11.5
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Klovn: Nr. 13	—	169	C 5.	Lykkesborg	7	41.3	152.6	140	111.3	4.72	25.7	16.4	57.9	10.8	33.9	11.7	11.3	10.7	11.2
Taarupg. Kornumg.	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Børn af 3. Slægtled.</i>																			
Taarupg. Kornumg Støssel	43	167	C 7.	Salone	12	33.6	148.2	98	114.6	3.71	25.1	16.0	58.9	13.2	34.2	12.9	12.1	11.3	12.8
do.	—	170	C 3.	Sørine	12	36.0	149.4	112	113.4	3.69	25.5	15.8	58.7	12.3	34.1	10.7	11.7	10.7	10.7
Alice ..	—	170	C 1.	Burholt	4	34.2	144.8	112	110.6	3.28	24.8	15.3	59.9	12.6	33.9	11.8	11.6	11.6	12.0
Gennemsnit. ...						34.6	147.5	107.0	112.9	3.56	25.1	15.7	59.2	12.7	34.1	11.8	11.8	11.2	11.8

Slægten Klovn, Stbg 99.

Klovn var Stamorne paa Taarupgaard paa Fyn.

Tabel XXVIII. Uddrag af Slægtstavle 9.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæsks Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	2	34.2	158.5	147	124.3	4.32	23.7	15.9	60.4	12.3	34.7	12.5	11.4	11.7	11.5
2.	1	41.3	152.6	140	111.3	4.72	25.7	16.4	57.9	10.8	33.9	11.7	11.3	10.7	11.2
3.	3	34.6	147.5	107	112.9	3.56	25.1	15.7	59.2	12.7	34.1	11.8	11.8	11.2	11.8

Af det begrænsede Materiale, Slægten efter Ornen Klovn har leveret til Forsøgene, fremgaar af det i Tab XXVIII opførte Uddrag af Slægtstavle 9 at 1., men navnlig 2. Slægtleds enkelte Hold har haft en dyr Produktion, idet de ifølge Kol 7 har brugt henholdsvis 4,32 og 4, 72 Pd Korn pr Pd Tilvækst; men medens Svindet (Kol 8 og 9) og pCt Eksportflæsk har været normalt, og Kvaliteten tilmed meget god for 1. Slægtled, har 2. Slægtledeneste Hold haft et meget stort Svind baade ved Slagtning og som Affald, hvoraf følger, at Mængden af Eksportflæsk har været tilsvarende lav, nemlig kun 57,9 pCt, og Kvaliteten tilmed noget ringere end for 1. Slægtled. Sammenlignet med 1. Slægtled har 3. Slægtled et lavere Forbrug pr Pd Tilvækst, et noget større Slagtesvind og lidt lavere Tal for pCt Eksportflæsk, men ifølge Tallene for Kvalitet har denne omtrent været ens for begge Slægtled.

Naar vi under Omtalen af Slægtstavle 1. har taget Forbehold med Hensyn til, at Gennemsnitstallene skulde være et absolut Udtryk for Slægtens eller de forskellige Slægtleds Godhed, maa vi yderligere pointere dette over for de Slægter, som f. Eks. denne, der kun har haft faa Hold inde til Forsøg. Resultaterne kan i saa Henseende oplyse os om, hvorledes Afkommet efter to bestemte Dyr arter sig, og tillige kan Gennemsnitstallene allerhøjest give os et Fingerpeg om vedkommende Slægts Trivsel og Godhed gennem de forskellige Generationer, men heller ikke mere.

Tabel XXIX. Slægtstavle 10. Aasgaard, Stbg 94.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport- flask	Tal for Fæsthold	Kroppens Længde	Points for			
																Rygflask	Bug	Skinker	Finhed
						Begyndelsen	Slutning	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Børn af 2. Slægtled.																			
Aasgaard: Gine II.	—	141	C 3.	Torstenæs	8	36.3	155.8	120	119.5	4.62	—	—	—	13.8	36.6	—	6.8	7.5	—
Snog	—	147	C 2.	do.	8	42.0	149.2	112	107.2	3.94	22.1	—	—	11.6	34.4	12.3	12.3	11.5	12.3
Gennemsnit. ...						39.2	152.5	116	113.3	4.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Børn af 3. Slægtled.																			
Nr. 90: Nr. 182	192	169	C 1.	Hesselbjerg	5	50.3	153.8	112	103.5	4.31	25.2	16.1	58.7	12.2	35.4	12.7	12.0	11.2	12.5
Torpe	94	169	C 2.	Nr. 241	7	37.0	145.2	126	108.2	4.25	23.1	16.6	60.3	11.4	34.3	12.6	11.8	12.0	11.8
Gennemsnit. ...						43.7	149.5	119	105.8	4.28	24.2	16.3	59.5	11.8	34.9	12.7	11.9	11.6	12.2

Slægten Aasgaard, Stbg 94.

Aasgaard var Stamorne paa Avlscentret i Høve paa Sjælland.

Tabel XXX. Uddrag af Slægtstavle 10.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskets Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagting	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	2	39.2	152.5	116	113.3	4.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	2	43.7	149.5	119	105.8	4.28	24.2	16.3	59.5	11.8	34.9	12.7	11.9	11.6	12.2

Da der som tidligere nævnt ikke blev foretaget saa fyldige Undersøgelser ved de første som ved de senere Forsøg, bliver som Følge heraf Slægtstavlerne for de Slægter, der har leveret Afkom til de første Forsøg, noget mangelfulde, og dette virker yderligere forstyrrende ved Sammenligning af Tallene ved Slægter som Aasgaards, der kun har været repræsenteret ved Forsøgene med faa Hold.

Af Tab XXX, som indeholder Uddrag fra Slægtstavle 10, viser Kol 7, at Pd Korn til et Pd Tilvækst er ens for begge Slægtled, nemlig 4,28, hvilket er noget højere end for Landracen i Almindelighed; ligesaa ligger Tallene for pCt Slagtesvind og Affald (Kol 8 og 9) noget over, men pCt Eksportflæsk (Kol 10) under Gennemsnittet. Da Tallene mangler fra 2. Slægtled, kan der imidlertid ikke foretages nogen Sammenligning.

Afkommet efter Gine II, Række 141 C, 3 har givet et højt Forbrug af Korn til 1 Pd Tilvækst, nemlig 4,62, samt haft meget lave Points for Bug og Skinker, henholdsvis 6,8 og 7,5, hvorimod det andet Hold i samme Slægtled har et Forbrug, der kun er lidt over Gennemsnit, og meget gode Points for Kvalitet. Dette Forhold er saa meget mærkeligere, som disse Hold er faldne efter samme Orne, og deres Mødre er Halvsøstre. Da Tallene er saa faa og uensartede, vil et Gennemsnit her være uden Betydning, hvorfor vi undlader at uddrage et saadant.

Kvaliteten af Holdene i 3. Slægtled har været ensartet og meget tilfredsstillende.

Tabel XXXI. Slægtstavle 11. Havrebjærg, Stbg 26.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder				pCt Svind		pCt Eksporthæsk	Tal for Fasthed	Kroppens Længde	Points for		
						Begyn- delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til- vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald	Rygflask				Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Havrebjærg: Landbogrd.	126	155	C 2.	Nr. 80	—	37.2	151.4	126	114.2	4.43	20.1	15.3	64.6	11.6	35.0	11.0	11.2	8.9	10.3
Nr. 45.	26	163	C 1.	Svend Høve	2	45.6	145.0	84	99.4	3.65	21.4	16.0	62.6	12.5	33.6	11.6	11.8	11.3	11.9
Nr. 2.	—	164	C 6.	Robert	—	50.4	160.0	84	109.6	3.65	22.7	—	—	14.0	33.5	12.1	11.5	11.2	12.1
Nr. 43.	26	153	C 1.	Daastrup	—	32.4	151.6	112	119.2	3.47	21.9	14.5	63.6	11.6	35.4	11.7	10.2	9.9	11.5
do.	26	165	C 3.	Svend Høve	2	48.4	158.8	98	110.4	3.87	27.5	13.7	58.8	12.8	35.0	12.4	10.2	11.5	12.5
Orne	—	165	C 1.	Føns Rud	4	44.5	151.8	98	107.3	3.96	26.9	13.8	59.3	13.3	35.5	12.5	11.0	11.0	13.8
Gennemsnit ...						43.1	153.1	100.3	110.0	3.84	23.5	14.7	61.8	12.6	34.7	11.9	11.0	10.6	12.0
<i>Søer bedækkede ved Orner af Yorkshirerace.</i>																			
Havrebjærg: 37 a	—	153	B 2.	Goliath	—	38.2	145.6	98	107.4	3.27	21.7	13.2	65.1	12.4	34.3	11.7	12.1	11.1	12.4

Slægten Havrebjærg, Stbg 26.

Havrebjærg har været Stamorne i Centrene Raagelunde paa Lolland og Havrebjærg ved Slagelse.

Tabel XXXII. Uddrag af Slægtstavle 11.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskest Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	6	43.1	153.1	100	110	3.84	23.5	14.7	61.8	12.6	34.7	11.9	11.0	10.6	12.0
Krydsning.	1	38.2	145.6	98	107.4	3.27	21.7	13.2	65.1	12.4	34.3	11.7	12.1	11.1	12.4

Alle Hold af Slægten efter Havrebjærg hører til samme Slægtled, men de enkelte Hold er en Del forskellige i flere Retninger, og i saa Henseende maa bemærkes, at efter Ornen Landbogaard Række 155 C, 2 har Afkommet (Kol 7) brugt 4,43 Pd Korn pr Pd Tilvækst, men har et højt Tal for pCt Eksportflæsk, nemlig 64,6; endvidere har samme Hold kun erholdt 8,9 Points for Skinker.

So Nr 43 er Moder til 2 Hold Grise, nemlig Hold C 1 Række 153 ved Ornen Daastrup og C 3 Række 165 ved Svend Høve. I første Tilfælde har Afkommet et lavt Forbrug af Korn pr Pd Tilvækst, nemlig 3,47 Pd, et lille Slagtesvind 21,9 og et ret højt Tal for pCt Eksportflæsk 63,6, samt jævnt gode Karakterer for Kvalitet. I sidste Tilfælde er Forbruget lig med Slægtens Gennemsnitsforbrug pr Pd Tilvækst 3,87, men Slagtesvindet er betydeligt større, nemlig 27,5 pCt, hvorimod Mængden af Eksportflæsk kun er 58,8 pCt. De givne Points viser, at Rygflæsket, Skinkerne og Finheden har været bedre end ved det første Hold.

Til Slægten knytter sig kun ét Hold Krydsninger, men det staar over selv det bedste Hold af den rene Race; det har saaledes kun brugt 3,27 Pd Korn pr Pd Tilvækst, har givet 65,1 pCt Eksportflæsk og har gennemgaaende højere Points for Kvalitet.

Tabel XXXIII. Slægtstavle 12. Robert Hygind, Stbg 8.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport- flæsk	Tal for Fæstede	Kroppens Længde	Points for			
						Begyn- delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til- vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagting	som Affald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Robert Hygind: Rob. III.	91	148	C 5.	Nr. 125	—	36.8	161.8	140	125.0	4.93	23.0	15.4	61.6	13.7	34.2	11.8	10.7	10.7	11.2
Gylling Rud.	12	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kristian	10	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Robert Saxild	13	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Børn af 3. Slægtled.</i>																			
Robert III.: Robert ...	—	164	C 6.	Nr. 2	—	50.4	160.0	84	109.6	3.65	22.7	—	—	14.0	33.5	12.1	11.5	11.2	12.1
Gylling Rud: Nr. 127 ..	—	161	C 4.	Smidstrup	—	40.6	150.8	98	110.0	3.34	21.1	15.5	63.4	12.7	34.3	12.5	11.9	12.5	12.0
Gylling Norring	78	161	C 5.	Taastrup	—	34.7	156.6	98	122.0	3.26	18.6	15.6	65.8	13.0	32.8	11.8	11.9	12.2	11.9
Nr. 56 ...	—	167	C 3.	Smidstrup	—	34.2	160.8	112	126.6	3.82	26.2	14.6	59.2	12.8	33.5	12.9	11.6	11.5	12.1
Nr. 2	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kristian: B. L. 3	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				Gylling															
Robert Saxild So	—	160	C 2.	Boulstrup	—	38.2	154.4	112	116.2	3.76	25.5	11.2	63.3	12.3	34.4	10.8	11.6	12.5	11.9
So Rathlousdal	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gennemsnit, ...						39.6	156.5	101.0	116.9	3.57	22.8	14.2	63.0	12.9	33.7	12.0	11.7	12.0	12.0

<i>Børn af 4. Slægtled.</i>																			
Nr. 2: Gyll. Boulstrup ..	—	—	—																
B. I. 3: Skrødder	42	—	—																
So p. Rathlousdal: Rath-																			
lousdal	13	—	—																
<i>Børn af 5. Slægtled.</i>																			
Gyll. Boulstrup: Ulfkær																			
III. ..	87	167	C 2.	Nr. 16	8	34.2	160.8	112	126.6	3.82	26.2	14.6	59.2	12.8	33.5	12.9	11.6	11.5	12.1
Skrødder: Nr. 109	—	167	C 7.	Støssel	9	33.6	148.2	98	114.6	3.71	25.1	16.0	58.9	13.2	34.2	12.9	12.1	11.3	12.8
Nr. 108	—	170	C 3.	Støssel	9	36.0	149.4	112	113.4	3.69	25.5	15.8	58.7	12.3	34.1	10.7	11.7	10.7	10.7
Rathlousdal: Orne	—	168	C 2.	Nr. 174	15	41.0	161.5	140	120.5	4.61	25.7	15.0	59.3	12.0	33.8	12.3	12.4	10.9	11.8
Gennemsnit. ..						36.2	155.0	116	118.8	3.98	25.6	15.4	59.0	12.6	33.9	12.2	12.0	11.1	11.9

Slægten Robert Hygind, Stbg 8.

Robert Hygind har været Stamorne i Avlscentrene Rud og Pejrup paa Fyn.

Tabel XXXIV. Uddrag af Slægtstavle 12.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskest Fæsthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	1	36.8	161.8	140	125	4.93	23.0	15.4	61.6	13.7	34.2	11.8	10.7	10.7	11.2
3.	5	39.6	156.5	101	116.9	3.57	22.8	14.2	63.0	12.9	33.7	12.0	11.7	12.0	12.0
4.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	4	36.2	155.0	116	118.8	3.98	25.6	15.4	59.0	12.6	33.9	12.2	12.0	11.1	11.9

Da der af Robertslægten ikke har været Afkom inde til Forsøg fra 4. Slægtled, og andet Slægtled kun har haft ét Hold, som iøvrigt har brugt 4,93 Pd Korn til hvert Pd Tilvækst, men i andre Retninger erholdt Karakterer omkring Gennemsnit, maa Sammenligningen for denne Slægt ske mellem 3. og 5. Slægtled.

Af Tallene i Tab XXXIV fremgaar da, at Forbrug af Pd Korn til et Pd Tilvækst (Kol 7) er henholdsvis 3,57 og 3,98; pCt Svind ved Slagtning 22,8 og 25,6, og for Affald 14,2 og 15,4, hvorimod Mængden af Eksportflæsk er 63,0 og 59,0 pCt.

Hvad Kvaliteten angaar, da har den ifølge Tallene i Kol 13, 14, 16 været paa det nærmeste ens for Rygflæskest, Bugens og Finhedens Vedkommende, men Skinkerne (Kol 15) har faaet laveste Points for 5. Slægtled.

Efter dette er altsaa Forbrug af Pd Korn pr Pd Tilvækst, pCt Slagtesvind og Affald steget, men pCt Eksportflæsk dalet fra 3. til 5. Slægtled. Det maa dog bemærkes, at Holdene inden for Slægtleddene er en Del forskellige, saaledes har f. Eks. Hold C 5, Række 161, Slægtled 3, 65,8 pCt Eksportflæsk, men Hold C 3 i Række 167 kun 59,2 pCt. I 5. Slægtled har derimod ingen af Holdene naaet 60 pCt Eksportflæsk, og Hold C 2, Række 164, har brugt 4,61 Pd Korn pr Pd Tilvækst.

Tabel XXXV. Slægtstavle 13. Annette, Stbg 27.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport-flesh	Tal for Fasthed	Kroppens Længde	Point for			
						Begyn- delsen	Slutning	Dage Antal	Pd Til- vækt	Pd Korn til 1 Pd Tilvækt	ved Slagning	som Affald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Annette: Anna	28	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Astrid	27	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Børn af 3. Slægtled.</i>																			
Anna: Annine	28	154	C 3.	Axel	1	32.3	156.6	126	124.3	3.02	—	—	—	12.3	34.5	10.7	11.3	10.1	11.0
Tolne	53	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Astrid: Wolmer	27	150	C 3.	Frigga	—	35.0	155.4	98	120.4	3.14	22.8	14.9	62.3	12.4	36.6	11.1	10.9	8.8	9.2
do.	27	160	C 5.	Omega	—	36.4	148.8	98	112.4	3.73	25.0	11.9	63.1	11.2	35.4	10.6	11.9	10.4	9.9
Orne	—	158	C 2.	Nr. 3.	—	32.7	158.8	112	126.1	3.53	21.7	15.6	62.7	12.2	34.5	12.2	11.3	10.2	10.2
Asta	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gennemsnit. ...						34.1	154.9	108.5	120.8	3.36	23.2	14.1	62.7	12.0	35.3	11.2	11.4	9.9	10.1
<i>Børn af 4. Slægtled.</i>																			
Annine: Ali	28	160	C 3.	Alvina	1	35.4	161.6	126	126.2	4.20	23.9	12.0	64.1	11.5	34.3	11.8	11.6	10.8	11.1
do.	28	165	C 2.	Nr. 61	2	35.5	152.1	126	116.6	3.86	24.7	14.1	61.2	13.7	35.0	11.8	12.2	11.3	11.8
Tolne: Tuk	53	145	C 3.	Enggaard	4	35.7	152.8	112	117.1	3.61	—	—	—	8.7	33.9	—	—	—	—
do.	53	152	C 3.	do.	4	31.2	164.6	112	133.4	3.40	—	—	—	9.8	35.3	11.7	10.3	10.5	10.9
Wolmer: Tulle	—	161	C 2.	Gorm	3	34.2	159.4	112	125.2	3.32	20.8	16.2	63.0	14.2	34.0	12.6	11.3	10.5	11.5
Asta: Nr. 241	—	169	C 2.	Torpe	7	37.0	145.2	126	108.2	4.25	23.1	16.6	60.3	11.4	34.3	12.6	11.8	12.0	11.8
Gennemsnit. ...						34.8	155.9	119	121.1	3.77	23.1	14.7	62.2	11.6	34.4	11.7	11.3	11.0	11.4

Tabel XXXV (fortsat).

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkomet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Fæshed	Kroppens Længde	Points for			
						Begyn- delsen	Slutning	Dage Antal	Pd Til- vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 5. Slægtled.</i>																			
Ali: Kornung. Gadeby .	—	163	C 2.	Nr. 69	16	39.2	164.1	112	124.9	4.05	21.6	17.1	61.3	11.3	33.6	11.1	11.7	11.5	11.8
Alvilda	—	164	C 5.	Damgaard	2	39.2	145.6	84	106.4	3.84	(22.3)	—	—	13.8	33.3	12.0	11.0	10.9	11.4
Emmy	—	164	C 2.	Erik	2	37.6	152.0	98	114.4	3.77	(22.8)	—	—	11.8	33.8	12.6	11.2	10.8	10.7
Tuk: Ternen	—	156	C 2.	Max	2	34.8	162.7	140	127.9	4.32	24.8	15.9	59.3	9.3	33.7	8.8	9.2	9.2	10.3
Holmgaard	112	159	C 1.	Dora	2	45.5	146.0	84	100.5	3.49	20.7	15.4	63.9	11.3	34.5	10.5	12.4	11.2	10.8
do.	112	163	C 3.	Thekla	2	44.0	165.7	98	121.7	3.65	19.5	17.1	63.4	10.8	34.7	12.7	12.5	11.3	11.6
do.	112	163	C 4.	Malle	2	31.0	155.6	112	124.6	3.78	(19.3)	—	—	13.5	34.1	12.5	11.9	12.2	11.8
Gennemsnit. . .						38.8	156.0	104	117.2	3.84	21.6	16.4	62.0	11.7	34.0	11.5	11.4	11.0	11.2
<i>Søer bedækkede af York- shireorne.</i>																			
Anna: So	—	147	B 3.	Yorkshireorne	—	37.6	158.4	104	120.8	4.24	18.3	14.7	67.0	13.2	34.4	11.9	12.8	12.5	12.4
So	—	152	B 2.	do.	—	31.8	161.0	126	129.2	3.82	21.7	14.0	64.3	12.8	34.0	12.5	10.7	10.8	10.8
Astrid: So	—	145	B 2.	do.	—	35.3	150.6	112	115.3	3.63	—	—	—	12.3	35.2	11.2	11.8	12.3	11.2
Anine: So	—	154	B 1.	do.	—	39.7	159.1	140	119.4	4.08	20.5	14.2	65.3	8.8	33.9	12.0	10.8	9.6	9.6
Asta: So	—	161	B.	do.	—	29.6	149.0	112	119.4	3.63	19.8	16.1	64.1	13.4	33.4	13.0	13.7	12.1	12.1
Gennemsnit. . .						34.8	155.6	126	120.8	3.88	20.1	14.7	65.2	12.1	34.2	12.1	12.0	11.5	11.2

Som Udgangspunkt for de hidtil omtalte Slægtstavler har vi udelukkende holdt os til Orner, som har haft stor Betydning for Landraceavl, og saa til hvert enkelt af disse samlet de Hold, som ifølge Afstamningen er knyttet til vedkommende Slægt. Vi vil nu i det følgende opføre nogle Slægtstavler, til hvilke der som Grundlag benyttes nogle af de Stamsøer, der har spillet den største Rolle i Avlen, og saa under hver af disse samle de herhen hørende Hold.

Slægten Annette (se Stbg 27).

Annette var Stamso paa Avlscentret Kornumgaard i Vendsyssel og har saavel paa dette Sted som gennem sit Afkom paa flere andre Centre omkring i Landet øvet en betydelig Indflydelse paa Avlen.

Tabel XXXVI. Uddrag af Slægtstavle 13.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksportflask	Tal for Flaskets Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflasket	Bug	Skinden	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	4	34.1	154.9	108	120.8	3.36	23.2	14.1	62.7	12.0	35.3	11.2	11.4	9.9	10.1
4.	6	34.8	155.9	119	121.1	3.77	23.1	14.7	62.2	11.6	34.4	11.7	11.3	11.0	11.4
5.	7	38.8	156	104	117.2	3.84	21.6	16.4	62.0	11.7	34.0	11.5	11.4	11.0	11.2
Krydsning.	5	34.8	155.6	126	120.8	3.88	20.1	14.7	65.2	12.1	34.2	12.1	12.0	11.5	11.2

I Tab XXXVI er opført Gennemsnitstallene for de 3 Led af Annetteslægten, der har været draget ind under Forsøgene, og vi vil nu her som ved de før omtalte Slægtstavler dvæle lidt ved de Kolonner, hvis Tal angiver Dyrenes Trivsel og Kvalitet, og da begynde med Tallene i Kolonne 7, som viser, at 3., 4., og 5. Slægtled har brugt henholdsvis 3,36, 3,77 og 3,84 Pd Korn pr Pd Tilvækst, hvilket vil sige, at Forbruget er stærkt stigende særlig fra 3. til 4. Slægtled.

Tallene for pCt Slagtesvind (Kol 8) er dalende, men for pCt Affald (Kol 9) stigende fra Led til Led, hvoraf Følgen bliver, at Mængden af Eksportflask, som i Kol 10 er opført med henholds-

Tabel XXXVII. Slægtstavle 14, Oldemor.

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport-flesh	Tal for Fasted	Kroppens Længde	Points for			
						Begyn-delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til-vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtnng	som Affald				Rygflask	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Oldemor: Martha	35	149	C 2.	Mikkel	4	36,8	144.0	112	107.2	3.97	21.4	14.2	64.4	11.3	33.2	11.2	11.6	11.4	11.5
Mette	32	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thor	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta	34	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malle	35	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salle	46	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mine	—	156	C 3.	Maurits	2	37,3	161,5	112	124.2	3.93	22.5	15,3	62.2	11.5	33,1	12.3	11,3	10,7	12.3
Gennemsnit. . .						37,1	152.8	112	115.7	3.95	22.0	14,7	63.3	11.4	33.2	11.8	11,5	11,1	11.9
<i>Børn af 3. Slægtled.</i>																			
Martha: Axel	36	154	C 3.	Annine	4	32.3	156.6	126	124.3	3.02	—	—	—	12.3	34.5	10.7	11.3	10.1	11.0
David	35	146	C 2.	Nr. 3	2	66.2	156.4	—	—	—	—	—	—	11.5	34.5	10.5	11.0	10.8	11.0
do.	35	156	C 1.	Nr. 6	2	36.0	148.5	112	112.5	3.10	24.8	14.5	60.7	9.0	33.0	9.2	9.3	8.0	8.5
Mette Mogens	113	146	C 1.	Andrea	1	—	—	—	—	—	24.0	15.4	60.6	12.5	34.1	11.1	10.8	10.5	11.1
do.	113	150	C 2.	Meta	3	30.8	147.0	112	116.2	3.44	21.0	13.8	65.2	11.7	34.3	10.9	11.9	10.4	11.3

Mikkel II.	100	157	C 4.	Nr. 180	15	30.3	151.2	126	120.9	3.38	23.4	15.9	60.7	12.3	34.9	13.2	12.2	11.0	11.6
do.	100	162	C 3.	Nr. 179	15	37.3	147.3	126	110.0	4.06	24.0	—	—	10.3	33.7	11.5	11.4	10.6	10.6
Nr. 1	29	167	C 6.	Mads	—	36.6	148.0	98	111.4	3.85	25.5	14.5	60.0	13.0	33.3	12.6	11.4	11.4	11.7
Thor Klara	—	145	C 1.	Jens	—	36.0	158.6	126	122.6	4.06	—	—	—	10.6	34.6	12.6	10.2	10.2	10.0
Gine II.	—	167	C 4.	Nero	2	33.6	153.0	112	119.4	3.81	24.5	14.6	60.9	12.0	33.9	12.3	11.1	10.7	11.6
Meta Enggaard	34	145	C 2.	Unge Gaardbo	4	34.0	146.8	112	112.8	3.95	—	—	—	11.3	32.6	11.7	11.0	11.0	11.2
do.	34	145	C 3.	Tuk	4	35.7	152.8	112	117.1	3.61	—	—	—	8.7	33.9	9.8	10.5	10.8	10.4
do.	34	152	C 3.	do.	4	31.2	164.6	112	133.4	3.40	—	—	—	9.8	35.3	11.7	10.3	10.5	10.9
Mary	—	152	C 2.	Taarupgaard	4	40.7	161.9	112	121.2	3.57	—	—	—	8.6	34.6	12.3	11.4	9.2	10.9
Malle Nr. 8	—	160	C 6.	Krættstrup	1	33.4	157.2	112	123.8	4.01	26.6	12.3	61.1	10.4	34.5	10.5	10.4	10.9	9.7
Salle; Dan.	—	149	C 1.	Bravo	1	36.2	156.5	112	120.3	3.62	21.5	14.4	64.1	12.5	33.8	11.3	11.6	11.4	11.5
Gennemsnit. ...						34.6	153.6	115	119.0	3.63	23.7	14.6	61.7	11.0	34.1	11.4	11.0	10.5	10.8
<i>Børn af 4. Slægtled.</i>																			
Axel; Alvine	—	160	C 3.	Ali	1	35.4	161.6	126	126.2	4.20	23.9	12.0	64.1	11.5	34.3	11.8	11.6	10.8	11.1
Stefanie	—	164	C 3.	Svend	1	35.6	147.4	98	111.8	3.86	22.4	—	—	11.4	32.9	12.0	10.1	10.3	11.7
David; Dam	35	150	C 1.	Gram 17	3	36.5	155.0	112	118.5	3.57	21.3	13.3	65.4	8.6	33.1	12.1	11.7	10.6	11.3
do.	35	156	C 2.	Mary 13	3	34.8	162.7	140	127.9	4.32	24.8	15.9	59.3	9.3	33.7	8.8	9.2	9.2	10.3
do.	35	164	C 1.	Grethe	3	34.2	158.6	112	124.4	3.67	23.6	16.0	60.4	7.6	33.7	10.9	9.4	10.2	10.8
So Nr. 3	—	158	C 2.	L. Orne	3	32.7	158.8	112	126.1	3.53	21.7	15.6	62.7	12.2	34.5	12.2	11.3	10.2	10.2
So	—	170	C 2.	Kornumgaard	—	41.0	145.8	140	104.8	4.79	24.4	16.6	59.0	12.0	33.9	11.0	12.3	11.3	11.3
Mikkel II.; Nr. 11	100	168	C 6.	Sludegaard	6	37.2	154.2	126	117.0	3.88	27.8	15.0	57.2	11.3	35.0	11.4	10.9	11.1	12.1
Ole; Gorm.	40	158	C 3.	Annette	—	36.3	143.0	98	106.7	3.48	21.6	14.7	63.7	12.8	34.8	12.2	12.0	11.2	10.9
do.	40	160	C 7.	Gine	—	33.4	150.6	112	117.2	4.05	26.0	12.0	62.0	12.7	34.1	11.3	10.0	10.0	11.3
do.	40	161	C 2.	Tulle	—	34.2	159.4	112	125.2	3.32	20.8	16.2	63.0	14.2	34.0	12.6	11.3	10.5	11.5
Nr. 93.	—	160	C 5.	Wolmer	—	36.4	148.8	98	112.4	3.73	25.0	11.9	63.1	11.2	35.4	10.6	11.9	10.4	9.9

Tabel XXXVII (fortsat).

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet														
						Vægt ved		Alle Vækstperioder				pCt Svind		pCt Eksport-flæsk	Tal for Fasted	Kroppens Længde	Points for			
						Begyndelsen	Slutning	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald	Rygflæsk				Bug	Skinker	Finhed	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Enggaard Ternen	—	156	C 4.	Max	2	33.6	167.7	140	134.1	4.12	25.5	14.2	60.3	9.3	32.7	12.1	10.8	10.6	12.5	
Holmgrd. Havrebj.	112	159	C 1.	Dora	13	45.5	146.0	84	100.5	3.49	20.7	15.4	63.9	11.3	34.5	10.5	12.4	11.2	10.8	
do.	112	163	C 3.	Thekla	13	44.0	165.7	98	121.7	3.65	19.5	17.1	63.4	10.8	34.7	12.7	12.5	11.3	11.6	
do.	112	163	C 4.	Malle	13	31.0	155.6	112	124.6	3.78	19.3	—	—	13.5	34.1	12.5	11.9	12.2	11.8	
Gine 8	52	160	C 4.	Max	2	32.0	150.0	112	118.0	3.75	25.2	12.6	62.2	10.4	33.8	11.7	11.5	10.6	11.1	
Holmgrd. Maltbtk.	—	162	C 1.	Musse	4	35.0	150.7	140	115.7	4.53	—	—	—	10.2	33.1	10.6	11.4	10.8	11.0	
Major	37	166	C 3.	Tummelumsen	2	37.6	145.2	98	107.6	3.63	25.5	14.7	59.8	9.0	32.9	9.7	9.6	9.0	10.4	
Dan Bine 106	—	158	C 1.	Per	16	35.0	151.8	112	116.8	3.40	21.0	14.2	64.8	10.2	33.5	11.3	10.5	11.4	12.0	
Sidse 107	—	160	C 1.	Olc	16	42.2	148.8	98	106.6	3.59	26.3	12.1	61.6	12.6	34.8	11.8	11.1	11.3	11.2	
Gennemsnit. ...						36.4	153.7	113.0	117.3	3.83	23.6	14.4	62.0	11.1	34.0	11.4	11.2	10.7	11.2	
Søer bedækkede ved York-shireorne.																				
Martha: So	—	145	B 1.	Y.-Orne	—	38.8	149.3	112	110.5	3.79	—	—	—	13.2	34.5	12.8	12.5	12.3	13.0	
Thor: So	—	149	B 1.	do.	—	31.0	149.1	112	118.1	3.75	21.5	14.3	64.2	14.2	35.0	13.0	12.5	12.0	12.6	
So	—	150	B 2.	do.	—	35.8	150.5	98	114.7	3.30	20.1	13.2	66.7	14.0	34.4	12.2	12.0	12.2	12.2	
So	—	158	B 2.	do.	—	38.2	160.7	112	122.5	3.61	21.1	14.3	64.6	12.7	33.8	12.7	12.3	11.9	11.5	
Axel: So	—	161	B 2.	do.	—	29.6	149.0	112	119.4	3.63	19.8	16.1	64.1	13.4	33.4	13.0	13.7	12.1	12.1	
Dam: So	—	170	B 2.	do.	—	37.0	155.4	126	118.4	3.76	23.3	16.2	60.5	13.8	33.2	12.0	12.5	12.8	12.8	
Gennemsnit. ...						35.0	152.3	112.0	112.3	3.62	21.2	14.8	64.0	13.6	34.1	12.6	12.6	12.2	12.4	

vis 62,7, 62,2, 62,0 pCt, altsaa er lidt nedadgaaende fra det ene Slægtled til det næste.

Efter Tallene i Kol 11, 13, 14 er Flæskets Fasthed samt Rygflæskets og Bugens Kvalitet uforandret, hvorimod Tallene i Kol 15 og 16 viser en Kvalitetsforbedring for Skinker og Finhed.

De Slægten nærstaaende 5 Krydsningshold har større Forbrug end de enkelte Slægtled, et lavt Tal for pCt Svind, hvorved Tallet for pCt Eksportflæsk bliver 65,2, eller 3 pCt højere end Holdene af den rene Race, ligesom det ogsaa fremgaar af de givne Karakterer, at Kvaliteten har været noget bedre.

Af Hold, hvis Resultater falder noget uden for Gennemsnittet, kan for 3. Slægtled nævnes C 3, Række 150, hvor Ornen Wolmer med Soen Frigga har givet Afkom med en lav Karakter for Skinker, nemlig 8,8, og for Finhed 9,2; til Gengæld har Forbruget pr Pd Tilvækst kun været 3,14, og Kroplængden fra Snittet ved Halsen til Hofteskaalen har maalt 36,6 Tom, hvilket er noget mere end det almindelige. I Række 160, Hold C, 5 har Afkom efter samme Orne og Soen Omega staaet Middeltallene betydeligt nærmere, Skinkerne er bedre, og Dyrene har været noget finere.

I samme Slægtled har Hold C 3, Række 154 kun brugt 3,02 Pd Korn til et Pd Tilvækst.

For 5. Slægtled kan anføres, at Hold C, 2, Række 156, har givet et lavt Tal for Eksportflæsk samt lave Karakterer for Kvalitet, men at andre Hold af samme Slægt har givet en passende Mængde Eksportflæsk af god Kvalitet.

I samme Forbindelse skal nævnes, at af Krydsningsholdene har Hold B, 3, Række 147, givet 67 pCt Eksportflæsk, hvilket er den største Mængde, vi ved disse Forsøg har observeret blandt Krydsningsholdene.

Slægten Oldemor (se Stbg 5).

Oldemor var først Stamso paa Avlscentret Bøgsted i Hjørring Amt og senere paa Svenstrupgaard i Aalborg Amt. Den har ved sit talrige Afkom øvet en stor Indflydelse paa Svineavlens navnlig i Aalborg Amt.

Tabel XXXVIII. Uddrag af Slægtstavle 14.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskest Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	2	37.1	152.8	112	115.7	3.95	22.0	14.7	63.3	11.4	33.2	11.8	11.5	11.1	11.9
3.	16	34.6	153.6	115	119.0	3.63	23.7	14.6	61.7	11.0	34.1	11.4	11.0	10.5	10.8
4.	21	36.4	153.7	113	117.3	3.83	23.6	14.4	62.0	11.1	34.0	11.4	11.2	10.7	11.2
Krydsning.	6	35.0	152.3	112	117.3	3.62	21.2	14.8	64.0	13.6	34.1	12.6	12.6	12.2	12.4

Af ovenanførte Tab XXXVIII, som er et Uddrag af Slægtstavle 14 fremgaar af Kol 7, at Forbruget af Pd Korn til et Pd Tilvækst har været højest, nemlig 3,95, for de to Hold i 2. Slægtled, lavest i 3. Slægtled med 3,63 for atter i 4. Led at stige til 3,83. Noget tilsvarende gør sig gældende med Mængden af Eksportflæsk (Kol 10), hvor Tallene for alle 3 Slægtled har været henholdsvis 63,3, 61,7, 62,0. I alle andre Forhold er der god Overensstemmelse, dog er der ogsaa i Tallene for Kvalitet Antydning af en Nedgang fra 2. til 3. Slægtled og igen en lille Stigning derfra til 4. Led.

De herhen hørende 6 Krydsningshold har lavere Tal for Pd Korn til et Pd Tilvækst, nemlig 3,62, lavere Tal for pCt Svind 21,2, men til Gengæld 64,0 pCt Eksportflæsk, hvilket er 2 pCt mere end for 4. Slægtled. Ifølge Kol 11, 13, 14, 15, 16 er Gennemsnittallene for Kvalitet en Del højere for Krydsningsholdene end for Slægtleddene af den rene Landrace.

De Bemærkninger, der kunde være Anledning til at gøre ved enkelte Hold i denne Slægtstavle, er allerede anført i andre Slægtstavler, hvor vedkommende Hold ogsaa findes opført.

Slægten Nr 21 (se Stbg 21).

So Nr 21 var Stamso paa Taarupgaard pr Aarup. Den har foruden ved sit Afkom at have øvet Indflydelse paa Svineavlen

Tabel XXXIX. Slægtstavle 15. Nr 21 Taarupgaard (So).

	Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet													
						Vægt ved		Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport- flæsk	Tal for Fasted	Kroppens Længde	Point for			
						Begyn- delsen	Slutning	Antal Dage	Pd Til- vækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Nr. 21: Job	90	142	C 2.	Nr. 72	5	31.7	156.3	140	124.6	4.14	23.2	—	—	14.6	36.5	11.3	10.5	11.3	10.2
do.	90	151	C 2.	Nr. 73	5	33.8	148.3	126	114.5	3.87	23.3	14.7	62.0	12.5	35.3	12.0	10.6	10.4	11.2
do.	90	151	C 3.	Nr. 96	5	36.2	160.0	126	123.8	3.81	23.2	14.2	62.6	13.0	34.5	12.3	10.0	10.9	11.1
Maurits	29	156	C 3.	Mine	2	37.3	161.5	112	124.2	3.93	22.5	15.3	62.2	11.5	33.1	12.3	11.3	10.7	11.3
Nr. 102	102	148	C 3.	Rasmus	7	30.5	155.4	140	124.9	4.33	22.5	15.2	62.3	13.5	34.8	12.3	11.0	11.0	10.9
Nr. 172	—	155	C 3.	Isak	5	32.0	159.5	126	127.5	3.73	22.4	13.9	63.7	12.0	34.8	9.8	9.3	10.8	10.2
Nr. 112	18	157	C 2.	Klovn	9	31.7	161.7	154	130.0	4.08	23.7	15.9	60.4	12.0	35.2	12.6	10.8	11.4	11.8
Gennemsnit. .						33.3	157.5	132.0	124.2	3.97	22.9	14.9	62.2	12.7	34.9	11.8	10.5	10.9	11.1
<i>Børn af 3. Slægtled.</i>																			
Job Nr. 180	90	157	C 4.	Mikkel II.	7	30.3	151.2	126	120.9	3.38	23.4	15.9	60.7	12.3	34.9	13.2	12.2	11.0	11.6
Nr. 179	90	162	C 3.	do.	7	37.3	147.3	126	110.0	40.6	24.0	—	—	10.3	33.7	11.5	11.4	10.6	10.6
Maurits: Mads	29	166	C 2.	Maren	2	53.5	146.2	84	92.7	3.53	24.5	14.0	61.5	12.0	34.8	11.3	10.3	10.9	11.6
Nr. 1.	29	167	C 6.	Mads	2	34.2	160.8	112	126.6	3.82	26.2	14.6	59.2	12.8	33.5	12.9	11.6	11.5	12.1
Nr. 102 Mulvad	—	159	C 4.	Nr. 28	7	38.8	149.0	98	110.2	3.68	24.2	15.6	60.2	12.0	34.7	13.3	12.0	12.3	12.7
Taarupgaard ..	102	168	C 5.	Nr. 232	7	33.7	158.5	140	124.8	4.36	24.2	15.6	60.2	13.2	34.1	12.2	12.5	12.1	11.6
do. ..	—	169	C 6.	Nr. 236	7	39.0	151.6	126	112.6	4.24	25.4	15.9	58.7	11.5	34.8	10.8	12.0	10.8	12.3
Nr. 176.	—	162	C 2.	Klovn	9	36.7	155.2	140	118.5	4.56	21.1	—	—	12.5	34.1	12.4	12.0	12.0	11.1
Nr. 174.	79	168	C 2.	Orne	12	41.0	161.5	140	120.5	4.61	25.7	15.0	59.3	12.0	33.8	12.3	12.4	10.9	11.8
Gennemsnit. .						38.3	153.5	121.0	115.2	4.03	24.8	15.2	60.0	12.1	34.3	12.2	11.8	11.3	11.7

paa Fyn tillige ydet et væsentlig Bidrag til Forsøgsmaterialet samme Steds.

Tabel XL. Uddrag af Slægtstavle 15.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskest Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til l Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	7	33.3	157.5	132	124.2	3.97	22.9	14.9	62.2	12.7	34.9	11.8	10.5	10.9	11.1
3.	9	38.3	153.5	121	115.2	4.03	24.8	15.2	60.0	12.1	34.3	12.2	11.8	11.3	11.7

For de to Slægtled, der fra Slægten Nr 21 har været inde til Forsøg, er et Uddrag opført i Tab XL, og af denne fremgaar i Kol 7, at der er brugt henholdsvis 3,97 og 4,03 Pd Korn pr Pd Tilvækst henholdsvis for 2. og 3. Slægtled.

Slagtesvindet har udgjort 22,9 og 24,8, Affaldet 14,9 og 15,2 pCt., det færdige Eksportflæsk derimod 62,2 og 60,0 pCt.

Dette viser, at Forbruget af Korn og pCt Svind er steget, og Mængden af Eksportflæsk er dalet fra 2. til 3. Slægtled.

Kvaliteten af Rygflæsk, Bug, Skinker og Finhed er efter de anførte Points i Kol 13, 14, 15, 16 i Fremgang.

Af Enkeltheder skal kun peges paa, at Afkommet efter So 102 i 2 Slægtled, Række 148, Hold C, 3 har brugt 4,33 Pd Korn pr Pd Tilvækst, og at Afkommet efter Børn af samme So i den følgende Generation i 4 af 5 Tilfælde ogsaa har haft et stort Forbrug, nemlig 4,36, 4,24, 4,56, 4,61 Pd Korn pr Pd Tilvækst.

Slægten Slynge.

For denne Slægt er ikke benyttet et enkelt Dyr som Udgangspunkt, men da de i Slægtled 2 opførte Dyr: Langholt, Eva, Gine og Albert er tillagte paa samme Sted og er meget nær beslægtede, maaske endog Helsøskende, har vi anset det for rigtigt ogsaa at sammenstille de herhen hørende Hold.

Tabel XLI. Slægtstavle 16. Slyngestammen.

Under Stbg Nr	Række	Hold	Parret med	Se Slægtstavle	Afkommet														
					Vægt ved			Alle Vækstperioder			pCt Svind		pCt Eksport-fleesk	Tal for Fasted	Kroppens Længde	Points for			
					Begyndelsen	Slutning		Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsk	Bug	Skinker	Finbed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Børn af 2. Slægtled.</i>																			
Langholt	15	154	C 2.	Hulda	—	37.0	154.8	112	117.8	3.14	20.5	15.1	64.4	12.7	33.8	12.8	11.1	11.0	11.2
Eva 102	—	154	C 1.	Per	2	40.2	158.2	112	118.0	2.88	20.7	15.2	64.1	12.8	34.5	11.7	10.3	10.3	10.5
Gine 103	33	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Albert	191	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gennemsnit. ...						38.6	156.5	112	117.9	3.01	20.6	15.2	64.3	12.8	34.2	12.3	10.7	10.7	10.9
<i>Børn af 3. Slægtled.</i>																			
Langholt Unge Gaardbo	52	145	C 2.	Enggaard	—	34.0	146.8	112	112.8	3.95	—	—	—	11.3	32.6	11.7	11.0	11.0	11.2
Tuk	53	145	C 2.	do.	—	35.7	152.8	112	117.1	3.61	—	—	—	8.7	33.9	9.8	10.5	10.8	10.4
do.	53	152	C 3.	do	—	31.2	164.6	112	133.4	3.40	—	—	—	9.8	35.3	11.7	10.3	10.5	10.9
Nero	—	152	C 1.	Elise	—	38.3	148.5	112	110.2	4.02	22.6	14.9	62.5	9.0	33.4	11.4	9.4	10.4	8.6
Gine 103 Bine	—	158	C 1.	Per	14	35.0	151.8	112	116.8	3.40	21.0	14.2	64.8	10.2	33.5	11.3	10.5	11.4	12.0
Sidse	—	160	C 1.	Ole	14	42.2	148.8	98	106.6	3.59	26.3	12.1	61.6	12.6	34.8	11.8	11.1	11.3	11.2
Maren	—	166	C 2.	Mads	15	53.5	146.2	84	92.7	3.53	24.5	14.0	61.5	12.0	34.8	11.3	10.3	10.9	11.6
Nr. 2	—	167	C 6.	Mads	—	36.6	148.0	98	111.4	3.85	25.5	14.5	60.0	13.0	33.3	12.6	11.4	11.4	11.7
Mette	—	164	C 4.	Palle	2	38.0	152.2	112	114.2	4.22	(22.4)	—	—	10.6	32.1	11.6	10.5	10.9	11.7
Albert; Gadeby 69 ...	—	163	C 2.	Kornumgrd	2	39.2	164.1	112	124.9	4.05	21.6	17.1	61.3	11.3	43.6	11.1	11.7	11.5	11.8
Gennemsnit. ...						38.4	152.4	106	114.0	3.76	23.5	14.5	62.0	10.9	33.7	11.4	10.7	11.0	11.1

Tabel XLII. Uddrag af Slægtstavle 16.

Slægtled	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskets Fasthed	Kroppens Længde	Points			
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst	ved Slagtning	som Affald				Rygflæsket	Bug	Skinken	Finhed
1	2	8	4	5	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	2	38.6	156.5	112	117.9	3.01	20.6	15.2	64.3	12.8	34.2	12.3	10.7	10.7	10.9
3.	10	38.4	152.4	106	114.0	3.76	23.5	14.5	62.0	10.9	33.7	11.4	10.7	11.0	11.1

Slægten omfatter kun to Slægtled, og Tallene i Kol 7 i Tab XLII viser, at medens 2. Slægtled kun har brugt 3,01 Pd Korn til 1 Pd Tilvækst, er Gennemsnitstallene for 3. Slægtled 3,76. Tallene for pCt Slagtesvind (Kol 8) har været henholdsvis 20,6 og 23,5, og Mængden af Eksportflæsk er i Kol 10 opført med 64,3 og 62,0. Denne Slægt har altsaa ligesom flere af de tidligere omtalte et stigende Tal for Forbrug af Korn til 1 Pd Tilvækst, samt for pCt Svind, men et fra Generation til Generation dalende Tal for Eksportflæsk.

Flæskets Fasthed (Kol 11) og Rygflæskets Kvalitet (Kol 13) har i Henhold til de opførte Points været bedst for 2. Slægtled, hvorimod Bug, Skinker og Finhed (Kol 14, 15, 16) har været ens for begge Slægtled.

Efter i foranstaaende 16 Slægtstavler at have omtalt, hvorledes de forskellige Generationer inden for Slægterne har stillet sig med Hensyn til Trivelihood og Kvalitet, vil vi i Tab XLIII foretage en Sammenstilling fra alle Slægtstavlerne ved der at opføre Gennemsnitstallene for hvert enkelt Slægtled. I denne Sammenstilling er dog ikke medtaget de Slægtled, fra hvilke der kun har været ét Hold med under Forsøg; thi ganske vist kan Resultaterne af et enkelt Hold være af Betydning for der igennem at vurdere Afkommet efter en bestemt Orne og So, men Materialet er for enkelt og for ensidigt til derpaa at kunne bygge noget om vedkommende Slægts Godhed.

Foruden de Slægtled, der kun har haft ét Forsøgshold, medtages heller ikke de Slægter, som efter denne Reduktion kun har ét brugeligt Slægtled, da de jo i saa Tilfælde ikke kan yde noget Bidrag til Besvarelse af Slægtens Frem- eller Tilbagegang.

Af disse Aarsager udelukkes 1. Slægtled af Slægtstavle Nr 4, 2. og 4. af Nr 12, samt Slægterne Nr 5, 6, 10 og 11.

Under Kol a er opført Resultaterne for det første af de Slægtled, som er benyttet fra hver Slægt, uafhængig af om dette saa er Slægtens 1., 2. eller 3. Generation, under Kol b det næste Slægtled og saaledes fremdeles.

Forneden i Tabellen er opført 4 Rækker Gennemsnitstal, af hvilke det første omfatter de tre øverste Rækker Tal, som indeholder Resultaterne fra de 3 Slægter, der hver har 4 Slægtled, den næste omfatter 7 Slægter hver med 3 Slægtled, det tredje 12 Slægter med 2 Slægtled, og endelig er i sidste Linje til Sammenligning opført Gennemsnitstallene for samtlige Hold af Landracen.

Af Kol 1—4 fremgaar, at Pd Korn pr Pd Tilvækst er stigende fra a til b og c og videre til d, hvilket gælder ikke alene hver af de tre Rækker Gennemsnitstal, men det samme gør sig paa et Par Undtagelser nær gældende i hver enkelt Slægt. Selv om Udslaget fra Slægtled til Slægtled kun er ca 0,1 Pd, er det dog en ret karakteristisk Antydning af, at Forbruget pr Pd Tilvækst er stigende fra Generation til Generation.

I de følgende 8 Kollonner fra 5 til 12, som omfatter pCt Svind, dels ved Slagtning og dels som Affald, gør i begge Tilfælde det samme sig gældende, at Gennemsnitstallene i alle tre Rækker er stigende fra det første Slægtled til det sidste. Men da Svindet i sin Helhed er stigende, maa som en nødvendig Følge heraf Mængden af Eksportflæsk være dalende fra Slægtled til Slægtled, og som det vil fremgaa af Tallene i Kol 13—16, finder dette ogsaa Sted for hver enkelt Slægt. I den øverste Række Gennemsnitstal er Forskellen paa første og sidste 2,3 pCt, og i de to følgende Rækker er den 1,9 og 1,4 pCt.

Tallene for Flæskets Fasthed (Kol 17—20) er ligeledes lidt dalende fra a til b, c og d.

Gennemsnitstallene for Rygflæskets Kvalitet (Kol 21—24) er nærmest ens, hvorimod der for Bugpartiets Form og Fylde (Kol 27—31), naar et enkelt Tal undtages, er en lille Fremgang

Tabel XLIII. Samlet Oversigt over de

Slægtsled	Pd Korn til 1 Pd Tilvækst				pCt Svind								pCt Eksport- flæsk				
					ved Slagtning				som Affald								
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
<i>Slægtstavle:</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Nr. 1 Adam	1	3.65	3.61	3.92	3.80	22.8	23.6	23.0	25.1	13.8	14.3	15.6	13.9	63.4	62.1	61.4	61.0
Nr. 2 Rasmus. . .	2	3.61	3.76	3.71	3.81	22.6	24.6	23.4	21.7	14.5	14.5	15.9	16.1	62.9	60.9	60.7	62.2
Nr. 3 Trittefitz .	3	3.61	3.64	3.74	3.97	21.5	23.0	24.2	23.9	14.4	14.5	13.6	15.8	64.1	62.5	62.2	60.3
Nr. 4 Mikkel . . .	4	3.50	3.94	3.67	—	23.3	23.6	25.6	—	14.9	15.0	15.1	—	61.8	61.4	59.3	—
Nr. 8 Jumbo . . .	5	3.99	3.90	4.25	—	21.6	19.9	24.9	—	15.4	15.7	14.9	—	63.0	64.4	60.2	—
Nr. 13 Annette So	6	3.36	3.77	3.84	—	23.2	22.6	21.6	—	14.1	14.9	16.4	—	62.7	62.5	62.0	—
Nr. 14 Oldemor So	7	3.95	3.63	3.83	—	22.0	23.7	23.6	—	14.7	14.6	14.4	—	63.3	61.7	62.0	—
Nr. 12 Hygind ..	8	3.57	3.98	—	—	22.8	25.6	—	—	14.2	15.4	—	—	63.0	59.0	—	—
Nr. 9 Kløvn . . .	9	4.32	3.56	—	—	23.7	25.1	—	—	15.9	15.7	—	—	60.4	59.2	—	—
Nr. 7 Greve . . .	10	4.17	4.08	—	—	23.6	24.5	—	—	15.5	15.7	—	—	60.9	59.8	—	—
Nr. 15 Thaarupgrd.																	
21, So	11	3.97	4.03	—	—	22.9	24.8	—	—	14.9	15.2	—	—	62.2	60.0	—	—
Nr. 16 Slynge . .	12	3.01	3.76	—	—	20.6	23.5	—	—	15.2	14.5	—	—	64.3	62.0	—	—
Gen. af 3 Slægter.		3.62	3.67	3.79	3.86	22.3	23.7	23.5	23.6	14.2	14.5	15.1	15.2	63.5	61.8	61.4	61.2
— 7 —		3.67	3.75	3.85	—	22.4	23.0	23.8	—	14.5	14.8	15.1	—	63.0	62.2	61.1	—
— 12 —		3.73	3.81	—	—	22.5	23.7	—	—	14.8	15.0	—	—	62.7	61.3	—	—
Gen. af alle Land- racehold		3.86	—	—	—	23.5	—	—	—	15.0	—	—	—	61.5	—	—	—

at spore; noget tilsvarende gør sig gældende i Tallene for Skinkens Form og Størrelse, samt for Hoved, Ben og Sværens Finhed.

Hovedresultatet af Tabellen bliver da, at Tallene for Forbrug af Korn pr Pd Tilvækst, pCt Slagtesvind og Affald er lidt stigende, at Mængden af Eksportflæsk samt Tallene for Flæskestens Fasthed er noget dalende, og endvidere at Tallene for Rygflæsk, Bug, Skinker og Finhed viser en lille Fremgang i Kvalitet fra Generation til Generation.

Med Hensyn til de hver Slægt nærstaaende Krydsningshold, da viser det sig af de gjorte Sammenstillinger, at de uden

forskellige Slægtsleds Trivsel og Kvalitet.

Tal for Flæskets Fasthed				Points for															
				Rygflæsk				Bugpartiets Form og Fylde				Skinkens Form og Størrelse				Hoved, Ben og Sværens Finhed			
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
12.3	11.9	10.5	9.1	11.4	11.2	11.2	10.8	11.2	11.0	10.7	10.4	11.4	10.3	10.4	10.1	11.1	10.6	11.2	10.7
11.8	11.8	10.9	11.2	11.5	11.6	11.5	11.1	11.2	10.8	11.0	11.5	10.7	10.7	11.2	11.0	11.2	11.3	11.0	11.1
12.9	11.1	11.9	12.0	11.1	11.4	11.6	12.2	11.7	10.5	10.9	11.1	10.6	10.4	10.6	11.2	11.4	11.0	11.1	11.8
10.7	10.6	11.6	—	11.1	11.4	11.5	—	11.0	11.1	11.0	—	10.3	10.8	10.7	—	10.8	11.2	11.7	—
11.6	13.1	11.3	—	11.3	12.5	10.9	—	10.5	11.4	10.9	—	9.5	11.2	10.7	—	11.5	11.8	11.3	—
12.0	11.6	11.7	—	11.2	11.7	11.5	—	11.4	11.3	11.4	—	9.9	11.0	11.0	—	10.1	11.4	11.2	—
11.4	11.0	11.1	—	11.8	11.4	11.4	—	11.5	11.0	11.2	—	11.1	10.5	10.7	—	11.9	10.8	11.2	—
12.9	12.6	—	—	12.0	12.2	—	—	11.7	12.0	—	—	12.0	11.1	—	—	12.0	11.9	—	—
12.3	12.7	—	—	12.5	11.8	—	—	11.4	11.8	—	—	11.7	11.2	—	—	11.5	11.8	—	—
12.5	11.9	—	—	12.5	12.2	—	—	10.9	11.9	—	—	11.1	11.6	—	—	11.2	11.8	—	—
12.7	12.1	—	—	11.8	12.2	—	—	10.5	11.8	—	—	10.9	11.3	—	—	11.1	11.7	—	—
12.8	10.9	—	—	12.3	11.4	—	—	10.7	10.7	—	—	10.7	11.0	—	—	10.9	11.1	—	—
12.3	11.6	11.1	10.8	11.3	11.4	11.4	11.4	11.4	10.8	10.9	11.0	10.9	10.5	10.7	10.8	11.2	11.0	11.1	11.2
11.8	11.6	11.3	—	11.3	11.6	11.4	—	11.2	11.0	11.0	—	10.5	10.7	10.8	—	11.1	11.2	11.2	—
12.2	11.8	—	—	11.7	11.8	—	—	11.1	11.3	—	—	10.8	10.9	—	—	11.2	11.4	—	—
11.9	—	—	—	11.5	—	—	—	11.0	—	—	—	10.8	—	—	—	11.3	—	—	—

Undtagelse er de dermed sammenhørende Slægtled overlegne i Kvalitet, men at de ofte, dog ikke altid, har et lidt større Forbrug af Pd Korn pr Pd Tilvækst.

Angaaende det, at Forbruget af Pd Korn pr Pd Tilvækst inden for Landracen gennemgaaende er steget fra Generation til Generation, da kan i denne Forbindelse anføres, at det er en almindelig Mening, at Dyr med hurtig Vækst giver den billigste Produktion, men da man i Landraceavlen i de senere Aar har arbejdet hen til at faa Landracesvinene mere fine og ædle, er der stor Sandsynlighed for, at dette Forædlingsarbejde til dels er gaaet ud over den hurtige Vækst og haft en lidt dyrere Produktion til Følge.

Tabel XLIV. Sammenligning af Landraceholdene efter Distrikter.

Distrikt	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst-perioder			Antal Dage beregnet paa 120 Pd Tilvækst	pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskets Fashed	Kroppens Længde	Bovpartiet	Points for					
		Begyndelsen	Slutningen	Pd Tilvækst	Pd Korn pr Pd Tilvækst	Antal Dage		ved Slagtning	som Affald					Ryg-flæskets		Bugens Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Finhed af Knogler og Svær	Totalindtægt
														Tykkelse	Fordeling				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Sjælland	14	40.3	154.9	114.6	3.88	108	113	22.8	15.2	62.0	12.2	34.8	11.5	11.8	12.2	11.0	10.9	11.8	11.6
2. Lolland-Falster	6	42.9	154.7	111.8	3.79	100	107	23.1	15.1	61.8	12.7	34.6	11.4	12.0	12.2	11.2	10.8	11.7	12.1
3. Bornholm	2	37.3	158.1	120.8	3.95	119	118	23.3	15.4	61.3	12.5	34.3	11.3	11.5	12.0	12.0	11.4	11.8	11.5
4. Fyn	33	37.3	154.9	117.6	4.12	132	134	24.1	15.6	60.3	12.4	34.7	11.6	11.7	11.8	11.1	11.0	11.4	11.2
5. Aalborg, Hjørring, Thisted Amt	38	36.3	153.9	118.5	3.71	110	111	23.6	14.6	61.8	11.7	34.3	11.2	11.3	12.0	10.8	10.5	11.1	11.3
6 Viborg, Ringkøbing, Ribe Amt	14	36.1	153.7	117.6	3.73	112	114	23.1	14.7	62.2	10.7	33.8	11.3	11.6	12.0	10.7	10.7	10.3	10.3
7. Randers, Aarhus, Vejle Amt	10	39.1	152.2	113.1	3.75	109	116	23.9	14.5	61.6	12.0	33.8	11.3	11.5	11.9	11.3	10.9	11.3	11.0
Gennemsnit af alle Landracehold	117	57.6	154.3	116.7	3.86	116	119	23.5	15.0	61.5	11.9	34.4	11.3	11.5	12.0	11.0	10.8	11.3	11.3

Det vil dernæst have sin Interesse at foretage en Sammenstilling af Holdene efter deres Hjemstavn uden Hensyn til Slægtskabsforhold o. lign., hvorfor vi i Tab XLIV har opført dem distriktvis efter den Inddeling, som bliver benyttet ved Avlens Ledelse og Avlscentrenes Bedømmelse.

Af de 121 Hold Landracesvin, der har været inddraget under Forsøg, har 117 Hold kunnet indgaa i denne Sammenstilling, og som det ses, har samtlige Distrikter været repræsenterede om end med et meget forskellig Antal Hold.

Ifølge Kol 6 har Holdene fra fjerde Distrikt haft den dyreste Produktion og brugt 4,12 Pd Korn pr Pd Tilvækst, derefter følger tredje Distrikt med 3,95, fjerde med 3,88 og de øvrige Distrikter varierende fra 3,71 til 3,79.

Til at producere de i Kol 5 opførte Pd Tilvækst er medgaaet det i Kol 7 opførte Antal Dage, men da Tallene for Tilvækst er lidt forskellige, har vi for at faa Sammenligningen mere overskuelig beregnet, hvormange Dage der paa det givne Grundlag skulde medgaa, hvis Dyrene fra hvert Distrikt havde haft en Tilvækst af netop 120 Pd, og det er dette Tidsrum, som er opført i Kol 8. Efter dette vilde andet Distrikt bruge 107 Dage til at producere 120 Pd Tilvækst, fjerde Distrikt 134 Dage og de øvrige mellem 111—116 Dage.

For pCt Svind ved Slagtning er der mellem Tallene i Kol 9 kun ringe Forskel, lavest staar første Distrikt med 22,8 pCt. og højest fjerde Distrikt med 24,1 pCt.; derimod har de fire første Distrikter haft den største Mængde Affald varierende fra 15,1 til 15,6 pCt, hvorimod de tre sidste kun har haft fra 14,5 til 14,7.

Hvad dernæst Mængden af Eksportflæsk angaar, da har sjette Distrikt 62,2 pCt, første 62,0 og fjerde derimod kun 60,3; de øvrige fra 61,3 til 61,8 pCt.

I Tal for Flæskets Fasthed staar sjette Distrikt lavest med 10,7, hvorefter følge femte med 11,7; at netop disse to Distrikter i saa Henseende staar lavest, er i god Overensstemmelse med, at de Hold med blødt Flæsk, som er omtalt Side 52, netop hidrører fra disse Distrikter.

I Kroplængde fra Hofteskaal til Snit ved Halsen har Dyrene fra sjette og syvende Distrikt maalt 33,8 Tommer, for de øvrige har det varieret fra 34,3 til 34,8 Tommer.

De i Kol 14, 15 og 16 opførte Points for Bovparti, Rygflæskets Tykkelse og Fordeling er i saa god Overensstemmelse,

Tabel XLV. Sammenstilling af Landraceholdene efter Forsøgsstedet.

Gaard	Antal Hold	Vægt ved		Alle Vækst- perioder			Antal Dage beregnet paa 120 Pd Tilvækst	pCt Svind		pCt Eksportflæsk	Tal for Flæskest Fæsthed	Kroppens Længde	Bovpartiet	Points for					
		Begyndelsen	Slutningen	Pd Tilvækst	Pd Korn pr Pd Tilvækst	Antal Dage		ved Slagtning	som Affald					Tykkelse	Ryg- flæskest Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Finhed af Knogler og Svær	Totalindtryk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rosvang	31	35.4	154.0	118.6	3.67	109	110	23.4	14.0	62.6	11.8	34.4	11.2	11.7	12.2	11.1	10.7	11.2	11.5
Duelund	25	38.0	152.8	114.8	3.81	110	115	24.3	14.9	60.8	11.0	33.6	11.3	11.4	12.0	10.7	10.6	11.1	11.1
Tybrind.	27	36.2	155.5	119.3	4.09	134	135	23.9	15.6	60.5	12.4	34.6	11.6	11.6	11.8	11.1	11.0	11.3	11.2
Rosenfeldt	18	40.9	154.7	113.8	3.86	105	111	23.8	14.6	61.6	12.2	34.7	11.5	11.8	12.2	11.4	11.2	11.7	11.8
Andre Gaarde	16	39.9	154.8	114.9	3.92	121	126	23.4	15.6	61.0	12.2	34.8	11.3	11.4	11.7	10.7	10.4	11.4	11.1

at vi ikke finder Anledning til at omtale dem nærmere, derimod er Forskellene større ved et saa vigtigt Bygningstræk som Bugens Form og Fylde (Kol 17), thi der har Svinene fra tredie Distrikt erholdt 12,0 Points, og fra femte og sjette kun henholdsvis 10,8 og 10,7 Points. Noget tilsvarende gør sig gældende i Tallene for Skinkens Form og Størrelse i Kol 18, hvor Dyrene fra tredie Distrikt opnaaet 11,4, medens Tallene for de øvrige Distrikter varierer fra 10,5 til 11,0.

I Points for Finhed af Knokler og Svær i Kol 19 og for Totalindtryk i Kol 20 har Dyrene fra sjette Distrikt kun erholdt 10,3, hvorimod de fra samtlige andre Distrikter i begge Tilfælde har faaet fra 11,1 til 11,8, dog har de fra andet Distrikt for Totalindtryk opnaaet 12,1 Points.

Endvidere har vi paa samme Vis i Tab XLV sammenstillet Forsøgsresultaterne for Landracesvinene efter de Gaarde, hvor Forsøgene har været udført; men da Dyrene hovedsagelig er indkøbte i den Landsdel, hvor Forsøgsgaarden er beliggende, vil Tallene her for en stor Del vise samme Udslag som ved Sammenstillingen efter Distrikter.

»Andre Gaarde« i sidste Linje omfatter flere forskellige Forsøgssteder, paa hvilke der i de senere Aar har været installeret enkelte Forsøg.

Ifølge Kol 6 har Rosvang haft det laveste og Tybrind det højeste Forbrug af Pd Korn pr Pd Tilvækst, henholdsvis 3,67 og 4,09, hvorimod Tallene for de andre Gaarde varierer fra 3,81 til 3,92.

Ligesom i forrige Afsnit har vi ogsaa her paa Grundlag af Tallene i Kol 5 og 7 beregnet, hvor mange Dage Svinene paa de forskellige Gaarde skulde bruge til at producere 120 Pd Tilvækst, og af Antallet paa Dagene, som er opført i Kol 8, fremgaar, at Tybrind har brugt 135, »andre Gaarde« 126 og Resten fra 110 til 115 Dage.

I Tallene for pCt Svind, er Forskellene ikke store, men naar baade Slagtesvind og Affald tages under ét, staar Svinene fra Rosvang lavest, hvilket foranlediger, at de i Kol 11 møder op med 62,6 pCt Eksportflæsk, medens de øvrige Gaarde har fra 60,5 til 61,6 pCt.

Medens Flæskets Fasthed hos Dyrene fra Duelund i Kol 12 kun har opnaaet 11,0 Points, og Kroppens Længde fra Hofdeskaal til Snittet ved Halsen kun har maalt 33,6 Tom, har samme

Forhold hos Dyrene fra de andre Forsøgsgaarde svinget henholdsvis fra 11,8 til 12,4 Points og fra 34,4 til 34,8 Tom.

For Bugens Form og Fylde har Svinene fra Rosenfeldt faaet 11,4 Points, de øvrige har derimod kun opnaaet fra 10,7 til 11,1. Noget tilsvarende gør sig gældende for Skinkernes Form og Størrelse, hvor Rosenfeldtsvinene fik 11,2, Tybrindsvinene 11,0, og de øvrige fra 10,4 til 10,7 Points; og endelig staar Rosenfeldtsvinene med højeste Points baade for Finhed og Totalindtryk.

De fleste af Svinene er afgaaet til Slagteriet med en Vægt af 175 à 185 Pd, men der er dog enkelte Hold imellem, som først er afsendt, efter at Dyrene havde naaet en Vægt af 190 Pd og derover, og medens de førstnævnte ikke har kunnet indgaa i fjerde Vækstperiode, der omfatter Vægtgrænsen fra 155 til 195 Pd, har sidstnævnte, som det ogsaa fremgaar af Hovedtabellerne, kunnet danne en saadan.

At Forskellen i Vægt imidlertid ikke har været saa særlig stor, viser Tallene for Dyrenes levende Vægt ved Ankomsten til Slagteriet; thi medens f. Eks. 88 Hold af Landracen opnaaede en Vægt af 173,2 Pd, var den tilsvarende Vægt for de 17 Hold, som af denne Race indgik i Vækstperiode IV, kun 176,3 Pd, og de tilsvarende Tal for Krydsningssvinene var henholdsvis 169,8 mod 173,4.

For nu at belyse, hvordan Produktionen stiller sig for Vækstperiode IV, er i Tab XLVI opført Resultaterne for de Hold, som for hver af de tre Racer har været inde til Forsøg.

Tabel XLVI.

Afdeling	Antal Hold	Vækstperiode															
		I				II				III				IV			
		Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd	Flæsk	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd	Flæsk	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd	Flæsk	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn til 1 Pd	Flæsk
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Yorkshire	1	42	35,8	3,15	42	50,5	3,53	28	37,7	4,23	28	32,8	5,02				
Krydsninger . .	6	45	36,7	3,23	40	45,8	3,44	28	34,2	4,16	28	40,3	4,01				
Landrace	17	41	38,7	3,14	32	35,6	3,70	30	38,6	4,05	28	43,0	4,11				

Af ovenstaaende Tabel er det navnlig Kol 4, 7, 10, 13, i hvilke findes opført Pd Korn til hvert Pd Tilvækst, der i denne Forbindelse har sin Interesse, og heraf fremgaar da, at Tallene for de fire Vækstperioder er henholdsvis:

for 1 Hold Svin af Yorkshirerace	3,15, 3,53, 4,23, 5,02
- 6 — Krydsninge	3,23, 3,44, 4,14, 4,01
- 17 — Landrace	3,14, 3,70, 4,05, 4,11

altsaa er Fodermængden til hvert Pd Tilvækst paa en enkelt Undtagelse nær stadig stigende med Dyrenes Vækst.

Hvad iøvrigt Pd Korn pr Pd Tilvækst angaar, da kommer vi ved at sammenligne Tallene med de tilsvarende fra 30. og 42. Beretninger til følgende Resultat.

Pd. Korn pr Tilvækst: 30. Beretning	Vækstperiode		
	I	II	III
— — — 42. —	3,6	4,2	4,9
— — — 42. —	3,6	4,2	4,9
saamlige Hold fra nærværende Beretning.....	3,4	3,8	4,4

At Tallene for de sidste Forsøg i alle Perioder er lavere end ved de Forsøg, der findes omtalt i 30. og 42. Beretning, har for en Del sin Grund i den Omstændighed, at de væsentligst har været udført om Sommeren, og i Almindelighed er Produktionen lidt billigere i Sommerhalvaaret end om Vinteren. Endvidere har Materialet i sin Helhed betragtet ved de sidste Forsøg gennemgaaende været af noget bedre Kvalitet, end det, der er benyttet ved de tidligere Forsøg.

Tilbage staar endnu at omtale de Hold af Forsøgsgaardenes egne Svin, som har været inddraget i Rækkerne 138, 139, 140, 147 under Betegnelsen D, og da det vel kan forudsættes, at de er af blandet Herkomst, vil vi sammenligne dem med de paa samme Forsøgsrækker værende Krydsningshold.

At Tallene i de samlede Vækstperiode (Kol 13, 14 og 15) ikke fuldt ud stemmer med Summen af de 3 enkelte Vækstperioder har sin Grund i, at der var et Hold Grise i hver Afdeling, som ved Forsøgets Begyndelse var saa store, at de straks

Tabel XLVII.

	Antal Hold	Vægt ved		Vækstperiode I			Vækstperiode II			Vækstperiode III			Vækstperioderne I, II, III			pCt Svind ved Slagting	Tal for Flæskets Fasthed
		Begyndelsen	Slutningen	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn for Pd Tilvækst	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn for Pd Tilvækst	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn for Pd Tilvækst	Antal Dage	Pd Tilvækst	Pd Korn for Pd Tilvækst		
	1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Blandet Race.	7	37.0	156.8	57	39.3	3.73	38	38.8	3.74	36	41.9	4.33	131	119.8	3.99	22.8	12.3
Krydsninger..	4	37.0	158.5	53	56.9	3.81	40	42.4	3.78	35	39.3	4.48	130	121.5	3.99	23.8	13.0

kunde gaa ind i Vækstperiode II, men da de ikke var med i Vækstperiode I, maa de ogsaa udelades af de samlede Vækstperioder. Dette har imidlertid forrykket Forholdet noget; thi medens D Holdene ved hver af de enkelte Vækstperioder har et højere Forbrug af Pd Korn pr Pd Tilvækst end Krydsningerne, saa er dette for de samlede Vækstperioder ens.

Da Observationerne ved de Forsøgsrækker, til hvilke disse Hold hører ikke var videre omfattende, kan vi kun sammenligne pCt Slagtesvind og Tal for Flæskets Fasthed. Tallene her er ikke meget afvigende, dog har D Holdene større pCt Svind og 0,7 Point højere for Fasthed end Krydsningsholdene.

De heromhandlede Forsøg vil nu ved en Samvirken mellem Slagterierne, Avlscentrene, Fællesforeningerne og Forsøgslaboratoriet blive fortsat efter en betydelig udvidet Maalestok paa dertil indrettede faste Forsøgsstationer paa Sjælland, Fyn og Jylland, og Forsøgene kommer paa disse Steder til at virke kontinuerligt, saa at der til enhver Tid vil kunne tages mod Grise fra de Stamdyr i Centrene, som Ledelsen og Centerejerne ønsker inddraget under Forsøg.

Kort Overblik.

Ved Sammenligning mellem et stort Antal Hold Svin af Yorkshirerace, Svin af Landrace og Krydsninger mellem So af Landrace og Orne af Yorkshirerace har Yorkshiresvinene brugt lidt mere Foder til Produktion af et Pd. Flæsk end Krydsningerne, og disse atter en Ubetydelighed mere end Landracesvinene.

Hvad Kvaliteten angaar, da har Yorkshiresvinene af samme Antal Pd. levende Vægt givet en større Mængde Eksportflæsk og mindre Svind ved Slagtning, samt erholdt højere Points ved Bedømmelsen af Flæskets Fordeling, Bugens Fylde, Skinkernes Form samt Finhed af Knokler og Svær end Landracesvinene, og Krydsningerne staar i saa Henseende Yorkshirerne nærmest.

Inden for Landracen er der baade i Trivsel og Kvalitet en ikke ringe Forskel mellem Holdene indbyrdes, men ved at samle disse i Slægter viser det sig, at for de Slægter, hvor der har været saa mange Hold inde til Forsøg fra hver Generation, at man har kunnet faa et lille Begreb om det enkelte Slægtleds Trivsel og Kvalitet, har der næsten overalt været en Antydning af, at Forbruget af Pd. Korn pr. Pd. Tilvækst er stigende fra Generation til Generation

Ligeledes er pCt. Svind ved Slagtning stigende, men pCt. Eksportflæsk i samme Grad dalende fra Slægtled til Slægtled.

I Tildelingen af Points for Flæskets Kvalitet, Bugens Fylde, Skinkernes Form og Knoklernes Finhed er der derimod nærmest en Fremgang at spore fra den ene Generation til den følgende.

Sammenlignet med tidligere Forsøg stiller Forbruget af Pd. Korn pr. Pd. Tilvækst for de i denne Beretning omtalte Forsøg sig saaledes:

	Vækstperiode		
	I. 35-75 Pd.	II. 75-115 Pd.	III. 115-155 Pd.
Pd. Korn pr. Pd. Tilvækst (30. Beretning)	3.6	4.2	4.9
Do. Vinterforsøg	3.7	4.5	5.2
Do. Sommerforsøg	3.5	4.0	4.6
Pd. Korn pr. Pd. Tilvækst (42. Beretning)	3.6	4.2	4.9
Samtlige Hold i nærværende Beretning	3.4	3.8	4.4

At Forbruget har været lavere ved sidste end ved tidligere Forsøg, kan dels ligge i, at saa godt som alle Raceforsøgene har været udført om Sommeren, og dels i, at det til samme benyttede Materiale gennemgaaende har været bedre.

Oversigt

over de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg udgaaede
Beretninger.

1. (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre.)
- Tillæg hertil.*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
2. (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre.)
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tanderup, Ravnholt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre.)
4. 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
5. (21de fra N. J. Fjord). 1885. a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre.)
- 6*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Ostendstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jærnbane og Dampskibe. (50 Øre.)
- 9*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter „Forskel i pCt. Fløde“ (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig
- Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre.)
11. 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre.)

12. 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)
13. (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre.)
14. 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof. Dr. med. Bang). (50 Øre.)
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
16. 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof. Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 18*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 21*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof. Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.)
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre.)
- 24*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof. Dr. med. Bang).
25. 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof. Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkefroer (og Sukkerfroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre.)
28. 1893. Samlet Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.)
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre.)
30. 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvæxt, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.)
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre.)
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyreækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre.)

33. 1895. Anden samlede Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ (Fortsættelse af 28de). (50 Øre.)
34. 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre.)
35. 1896. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre.)
36. 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mækekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—96. (1 Kr.)
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygge hos Hesten, II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen.) (50 Øre.)
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.)
40. 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
42. 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1895—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.)
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfodring (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen.) (50 Øre.)
45. 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.)
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningssevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer (1 Kr.)
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning) (1 Kr.)
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftning af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre)
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre.)
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jærnbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre.)
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.)
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
53. 1902. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre.)
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.)
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup. (50 Øre.)
55. 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre.)
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre.)
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre.)

58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.)
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.)
61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.)
62. 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.)
64. 1908. (Nærværende Beretning). (2 Kr.)

Forud for de ovenfor opførte 64 Beretninger fra Laboratoriet gaar følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1*) (1867). Varmegrad i det Indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
- 2 (1868). Kogning i Hø (50 Øre).
- 3*) (1870). Kogning i Dampkogekedler.
- 4*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler
- 5*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
- 6*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
- 7*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
- 8*) (1876). do. do. (særlig Sneforsøg).
- 9*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
- 10*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
- 11 (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug (50 Øre)
- 12*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger
- 13*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jærnbanevogne. Varme i Dampskibsrør.
- 14 (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge af Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning — den søde Mælk (50 Øre).
- 15*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
- 16 (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jysk Race. B. Korthorns og jysk Race (50 Øre).
- 17*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burneister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedelev: Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem

De foran med * mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).

Hovedtabeller.

Række 138 Rosvang. 1899		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til			
			Fælles for alle Hold Kjærnemælk	A og B ₁		
				Skummet Mælk	Majs	Byg
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt						
Fra 3. Juli til 12. Juli		1	10	50	11.7	—
— 13. — - 22. —		2	10	60	13.3	—
— 23. — - 1. Avg.		3	10	60	16.7	—
— 2. Avg. - 11. —		4	10	60	20.0	—
— 12. — - 21. —		5	10	70	21.7	—
— 22. — - 31. —		6	10	70	25.0	—
— 1. Sept. - 10. Sept.		7	10	70	14.2	14.2
— 11. — - 20. —		8	10	80	—	30.0
— 21. — - 30. —		9	10	80	—	33.3
— 1. Okt. - 10. Okt.		10	10	80	—	36.7
— 11. — - 20. —		11	10	80	—	40.0
— 21. — - 30. —		12	10	80	—	40.0
— 31. — - 9. Nov.		13	10	80	—	40.0
— 10. Nov. - 19. —		14	10	80	—	40.0

Række 139 Rosenfeldt. 1899		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til				
			Fælles for alle Hold Kjærnemælk	A			B
				Valle	Majs	Byg	Valle
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.			
Begyndelsesvægt d. 11. Juli.....							
Fra 11. Juli til 20. Juli.....		1	10	89.6	22.4	—	89.6
— 21. — - 30. —		2	10	100.0	25.0	—	100.0
— 31. — - 9. Avg.		3	10	108.0	27.0	—	108.0
— 10. Avg. - 19. —		4	10	116.0	29.0	—	120.0
— 20. — - 29. —		5	10	124.0	31.0	—	130.4
— 30. — - 8. Sept.		6	10	134.4	—	33.6	140.0
— 9. Sept. - 18. —		7	10	115.8	—	38.6	120.0
— 19. — - 28. —		8	10	121.8	—	40.6	127.5
— 29. — - 8. Okt.		9	10	102.0	—	34.0	133.5
— 9. Okt. - 18. —		10	10	125.0	—	43.0	135.0

1 Dyr i 10 Dage						Tilvæxt for 1 Dyr i 10 Dage				
B ₂ og D			C			A	B ₁	B ₂	C	D
Skummet Mælk	Majs	Byg	Skummet Mælk	Majs	Byg	6 Dyr	6-5 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
40	10.0	—	—	—	—	42.7	45.2	32.3	42.3	36.0
50	11.7	—	50	11.7	—	6.3	4.0	6.0	—	4.7
60	13.3	—	60	13.3	—	8.0	11.3	9.9	13.5	9.0
60	16.7	—	60	20.0	—	7.2	8.7	7.6	7.5	8.3
60	20.0	—	70	21.7	—	9.6	7.3	9.0	10.5	9.0
70	21.7	—	70	25.0	—	9.3	9.3	8.4	11.5	9.5
70	12.5	12.5	70	14.2	14.2	9.2	9.2	10.3	10.7	9.8
80	—	26.7	80	—	30.0	8.5	8.4	7.5	8.5	8.2
80	—	30.0	80	—	33.3	11.7	12.0	13.3	14.3	11.3
80	—	33.3	80	—	36.7	10.5	9.4	10.0	9.2	10.8
80	—	36.7	80	—	40.0	15.3	16.4	15.3	16.6	14.2
80	—	40.0	80	—	40.0	12.7	9.6	11.2	14.0	11.3
80	—	40.0	80	—	40.0	6.5	7.4	6.7	6.5	7.9
80	—	40.0	80	—	40.0	10.0	15.0	12.3	11.7	9.0
80	—	40.0	100	—	46.7	10.0	11.5	11.0	13.4	11.7

1 Dyr i 10 Dage								Tilvæxt for 1 Dyr i 10 Dage			
B		C			D			A	B	C	D
Majs	Byg	Valle	Majs	Byg	Valle	Majs	Byg	5 Dyr	5-4 Dyr	5 Dyr	5 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
22.4	—	109.6	27.4	—	96.0	24.0	—	67.6	70.4	90.4	79.2
25.0	—	120.0	30.0	—	106.4	26.6	—	7.8	8.0	9.0	8.0
27.0	—	128.0	32.0	—	114.4	28.6	—	9.2	9.8	10.0	8.4
30.0	—	140.0	—	35.0	128.0	32.0	—	9.2	11.0	9.4	11.0
32.6	—	121.2	—	40.4	138.4	—	34.6	8.6	9.8	12.0	10.6
—	35.0	129.0	—	43.0	120.0	—	40.0	9.6	9.6	13.0	12.4
—	40.0	135.0	—	45.0	127.8	—	42.6	13.0	15.4	10.2	11.8
—	42.5	138.8	—	46.3	133.8	—	44.6	9.8	13.3	12.2	11.0
—	44.5	135.0	—	45.0	133.9	—	44.6	12.4	13.0	12.7	11.3
—	45.0	—	—	—	135.0	—	45.0	6.0	10.8	11.7	8.0
								14.4	13.0	—	11.3

[illegible]

i 10 Dage												Tilvæxt for 1 Dyr i 10 Dage				
B ₂				C				D				A	B ₁	B ₂	C	D
Skummet Mælk	Valle	Byg	Majs	Skummet Mælk	Valle	Byg	Skummet Mælk	Valle	Byg	Majs		6 Dyr	6—5 Dyr	6 Dyr	6—5 Dyr	6 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.		Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
....												48.2	35.5	35.5	35.7	42.7
26.5	21.0	14.0	—	26.5	21.0	14.0	31.0	24.0	16.0	—		6.3	6.3	7.0	4.5	7.1
29.5	23.0	15.3	—	29.5	23.0	15.3	35.5	27.0	18.0	—		8.3	8.4	7.7	7.0	9.0
26.8	24.5	—	16.3	26.8	24.5	—	32.8	28.5	—	19.0		7.9	6.3	7.0	7.0	8.4
29.7	26.5	—	17.7	29.7	26.5	—	35.7	30.5	—	20.3		7.6	6.3	8.5	8.1	8.5
32.8	28.5	—	19.0	32.8	28.5	—	38.8	32.5	—	21.7		8.7	6.0	9.1	4.2	8.3
35.7	30.5	—	20.3	34.2	29.5	—	41.7	34.5	—	23.0		7.2	8.2	7.7	7.6	9.7
38.8	32.5	—	21.7	36.5	31.0	—	44.8	36.5	—	24.3		6.6	7.6	8.2	7.2	9.5
42.9	35.3	—	23.5	38.0	32.0	—	48.9	39.3	—	26.2		9.9	8.2	7.6	8.2	11.0
47.4	38.2	—	25.5	41.4	34.3	—	53.4	42.2	—	28.2		8.6	7.2	7.5	7.6	8.1
54.1	42.8	—	28.5	48.1	38.7	—	60.1	46.8	—	31.2		10.7	11.0	13.7	11.6	12.2
60.5	47.0	—	31.3	54.5	43.0	—	66.5	51.0	34.0	—		11.5	10.6	12.2	12.8	11.8
67.6	51.7	34.5	—	61.6	47.8	31.8	73.6	55.8	37.2	—		11.8	14.6	12.1	11.2	13.2
76.3	57.5	38.3	—	70.3	53.5	35.7	82.2	61.5	41.0	—		12.5	11.4	12.0	11.0	13.3
71.8	54.5	36.3	—	79.2	59.5	39.7	—	—	—	—		9.0	10.7	8.2	12.8	—
84.5	63.0	42.0	—	93.5	69.0	46.0	—	—	—	—		11.5	14.0	10.3	11.4	—
91.3	67.5	45.0	—	100.3	73.8	49.0	—	—	—	—		10.0	8.0	11.5	18.6	—

i 10 Dage												Tilvæxt for 1 Dyr i 10 Dage					
C ₁				C ₂				C ₃				A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃
Valle	Grut	Grønt-foder	Roer	Valle	Grut	Grønt-foder	Kjærne-mælk	Valle	Grut	Grønt-foder	Roer	5 Dyr	5 Dyr	4 Dyr	6 Dyr	5 Dyr	4 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
....												36.6	38.6	47.8	47.2	69.2	36.3
50	25	13.3	—	60	30.0	16.0	—	—	—	—	—	4.6	5.0	5.5	2.1	6.2	—
60	25	15.0	—	70	24.0	18.0	—	—	—	—	—	4.8	5.8	6.7	7.0	7.6	—
60	20	15.0	—	72	24.0	18.0	—	—	—	—	—	7.0	5.8	8.0	6.7	9.2	—
60	20	15.0	—	72	24.0	21.6	—	—	—	—	—	7.0	8.4	10.5	6.2	11.6	—
60	22	20.0	—	72	24.0	30.0	—	—	—	—	—	6.8	7.2	9.0	7.5	7.6	—
60	25	20.0	—	72	24.0	30.0	—	—	—	—	—	6.4	9.0	8.8	9.3	10.2	—
60	25	20.0	—	72	24.0	30.0	60	—	30.0	—	—	6.8	9.0	10.0	8.5	7.0	6.5
60	25	20.0	—	72	26.4	30.0	60	—	30.0	—	—	5.0	5.0	6.7	7.8	13.6	6.5
70	30	25.0	—	72	36.0	32.0	60	—	30.0	—	—	8.2	10.2	8.8	10.9	14.0	8.5
70	35	25.0	—	72	40.0	32.0	60	—	30.0	15	—	7.0	7.2	8.5	9.5	6.2	8.7
70	40	25.0	—	72	50.0	—	—	75	30.0	25	—	10.4	12.0	16.7	15.5	14.0	7.8
70	45	18.0	12	77	50.0	—	—	75	32.5	18	12	11.0	10.6	16.4	11.3	19.0	10.0
70	50	—	35	—	—	—	—	75	35.0	—	40	9.0	8.2	14.0	14.3	—	10.2
80	50	—	30	—	—	—	—	75	32.5	—	60	10.2	17.2	15.0	17.5	—	12.0
80	50	—	30	—	—	—	—	80	32.5	—	80	15.3	14.8	17.0	16.0	—	12.3
80	50	—	30	—	—	—	—	80	35.0	—	90	7.7	—	—	16.0	—	8.7
80	50	—	30	—	—	—	—	100	35.0	—	90	8.3	—	—	14.0	—	11.8
—	—	—	—	—	—	—	—	100	37.5	—	100	16.5	—	—	—	—	16.5
—	—	—	—	—	—	—	—	100	47.0	—	73	10.0	—	—	—	—	15.0
—	—	—	—	—	—	—	—	100	66.0	—	70	12.0	—	—	—	—	18.0
—	—	—	—	—	—	—	—	100	70.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0

Række 142 Tybrind. 1900—01		Foder til 1 Dyr													
		Periodernes Løbe-Nr.	Føllest. alleHold Kjærmælk	A				B				C ₁			
				Skummet Mælk	Rug	Majs	Byg	Skummet Mælk	Rug	Majs	Byg	Skummet Mælk	Rug	Majs	Byg
Begyndelsesvægt	17. Avg.	1	20	55.0	12.5	—	—	28.0	8.0	—	—	40.0	10.0	—	—
Fra 17. Avg. til	26. Avg.	2	20	61.0	13.5	—	—	31.0	8.5	—	—	44.5	10.8	—	—
— 27. —	5. Sept.	3	20	67.0	7.2	7.2	—	34.0	4.5	4.5	—	49.0	5.7	5.8	—
— 6. Sept.	15. —	4	20	54.0	10.7	10.7	—	40.0	5.0	5.0	—	55.0	6.3	6.2	—
— 16. —	25. —	5	10	62.0	12.0	12.0	—	42.8	6.6	6.6	—	50.0	7.5	7.5	—
— 26. —	5. Okt.	6	10	70.0	13.3	13.3	—	47.6	7.2	7.2	—	52.4	7.8	7.8	—
— 6. Okt.	15. —	7	10	78.0	—	—	29.3	52.4	—	—	15.6	57.2	—	—	16.8
— 16. —	25. —	8	10	90.0	—	—	33.3	50.0	—	—	20.0	54.0	—	—	21.3
— 26. —	4. Nov.	9	10	100.0	—	—	36.7	62.0	—	—	24.0	64.0	—	—	24.7
— 5. Nov.	14. —	10	10	104.9	—	—	38.4	74.0	—	—	28.0	74.0	—	—	28.0
— 15. —	24. —	11	10	110.0	—	—	40.0	81.8	—	—	30.7	81.8	—	—	30.7
— 25. —	4. Dec.	12	10	122.0	—	—	44.0	92.0	—	—	34.0	92.0	—	—	34.0
— 5. Dec.	14. —	13	10	121.4	—	—	43.8	104.0	—	—	38.0	104.0	—	—	38.0
— 15. —	24. —	14	10	128.0	—	—	46.0	116.0	—	—	42.0	116.0	—	—	42.0
— 25. —	3. Jan.	15	10	140.0	—	—	50.0	128.0	—	—	46.0	128.0	—	—	46.0
— 4. Jan.	13. —	16	10	—	—	—	—	135.2	—	—	48.4	125.6	—	—	45.2
— 14. —	23. —	17	10	—	—	—	—	146.0	—	—	52.0	134.0	—	—	48.0
— 24. —	2. Feb.														

Række 143 Rosvang. 1900-01		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til		
			Følles for alle Hold Kjærmælks	A B ₁ C ₁	
				Skummet Mælk	Byg
			Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt	d. 16. Sept.	1	10	40	11.7
Fra 16. Sept. til	25. Sept.	2	10	40	15.0
— 26. —	5. Okt.	3	10	40	18.3
— 6. Okt.	15. —	4	10	50	20.0
— 16. —	25. —	5	10	50	16.7
— 26. —	4. Nov.	6	10	50	20.0
— 5. Nov.	14. —	7	10	60	23.3
— 15. —	24. —	8	10	60	26.7
— 25. —	4. Dec.	9	10	60	30.0
— 5. Dec.	14. —	10	10	60	33.3
— 15. —	24. —	11	10	60	36.7
— 25. —	3. Jan.	12	10	70	41.7
— 4. Jan.	13. —				

i 10 Dage												Tilvæxt for 1 Dyr i 10 Dage					
C ₃				C ₃				C ₄				A	B	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
Skummet Mælk	Rug	Majs	Byg	Skummet Mælk	Rug	Majs	Byg	Skummet Mælk	Rug	Majs	Byg	6 Dyr	6 Dyr	6—5 Dyr	6—4 Dyr	6 Dyr	6 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
31.0	8.5	—	—	34.0	9.0	—	—	22.0	7.0	—	—	56.0	29.8	39.2	31.7	33.2	25.3
34.0	9.0	—	—	34.0	9.0	—	—	22.0	7.0	—	—	8.3	6.7	6.1	5.5	5.0	5.0
37.0	4.7	4.7	—	37.0	4.7	4.7	—	25.0	3.7	3.7	—	9.4	4.5	3.0	6.1	5.3	3.7
58.0	6.5	6.5	—	43.0	5.3	5.3	—	31.0	4.3	4.3	—	10.8	8.3	6.0	9.5	6.5	4.0
67.2	8.4	8.4	—	45.2	6.9	6.9	—	30.8	5.1	5.1	—	8.0	6.0	4.4	7.0	6.0	5.0
59.6	8.7	8.7	—	50.0	7.5	7.5	—	33.2	5.4	5.4	—	11.9	8.2	6.0	8.0	7.5	5.7
50.0	—	—	20.0	54.8	—	—	16.2	38.0	—	—	12.0	9.5	8.0	7.2	8.0	9.1	8.5
57.8	—	—	22.7	54.0	—	—	21.3	47.6	—	—	14.4	12.8	9.3	9.0	11.0	10.2	10.0
68.0	—	—	26.0	64.0	—	—	24.7	50.0	—	—	20.0	10.8	9.5	8.0	11.7	9.8	7.8
78.2	—	—	29.3	74.0	—	—	28.0	62.0	—	—	24.0	12.2	10.7	12.2	12.8	9.5	11.5
87.8	—	—	32.7	81.8	—	—	30.7	69.8	—	—	26.7	12.4	9.7	4.2	10.5	9.2	9.8
100.0	—	—	36.7	92.0	—	—	34.0	80.0	—	—	30.0	13.2	11.3	11.0	12.5	11.0	11.2
110.0	—	—	40.0	104.0	—	—	38.0	92.0	—	—	34.0	14.5	11.8	10.4	8.2	11.3	11.7
122.0	—	—	44.0	116.0	—	—	42.0	104.0	—	—	38.0	9.0	14.0	10.0	9.8	14.5	12.0
134.0	—	—	48.0	128.0	—	—	46.0	116.0	—	—	42.0	11.5	14.9	12.6	14.2	14.0	14.3
141.2	—	—	50.4	135.2	—	—	48.4	128.0	—	—	46.0	—	13.7	13.3	14.0	13.3	14.3
152.0	—	—	54.0	146.0	—	—	52.0	140.0	—	—	50.0	—	18.0	16.0	15.0	16.3	16.9

1 Dyr i 10 Dage				Tilvæxt for 1 Dyr i 10 Dage				
A B ₁ C ₁	B ₂ C ₂			A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂
Elve- tham- Roer	Skummet Mælk	Byg	Elve- tham- Roer	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
—	40	15.0	—	32.0	33.7	37.5	35.7	38.5
—	40	18.3	—	7.2	7.5	8.7	8.3	9.7
—	50	21.7	—	9.0	9.1	9.3	9.7	8.3
—	50	26.7	—	7.1	6.3	9.5	6.3	10.5
33.3	50	23.3	46.7	10.8	9.7	8.7	11.2	10.5
40.0	50	26.7	53.3	9.2	8.5	10.5	8.3	10.8
46.7	60	30.0	60.0	7.5	9.3	11.0	8.3	10.7
53.3	60	35.0	70.0	10.5	9.6	8.5	8.4	10.0
60.0	60	38.3	76.7	9.2	10.3	11.0	11.3	11.2
66.7	60	41.7	83.3	11.8	12.2	13.0	12.5	14.6
73.3	60	45.0	90.0	11.0	9.6	10.3	9.8	10.2
83.3	70	46.7	93.3	11.7	12.5	12.7	11.2	13.6
				12.3	14.5	15.1	14.0	14.8

Række 145*) Rosvang. 1901	Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr					
		A B ₃	A	B ₃	B ₁ B ₂ C ₁		
		Skummet Mælk	Byg	Byg	Skummet Mælk	Byg	
		Pd.	Pd.	Pd.			Pd.
Begyndelsesvægt.....							
Fra 15. Maj til 28. Maj.....	1	77	11.2	11.2	84		15.2
— 29. — - 11. Juni.....	2	112	14.0	14.0	112		18.7
— 12. Juni - 25. —.....	3	112	19.6	19.6	112		23.3
— 26. — - 9. Juli.....	4	112	23.3	23.3	112		30.3
— 10. Juli - 23. —.....	5	112	28.0	28.0	112		37.3
— 24. — - 6. Avg.....	6	112	36.4	36.4	112		44.3
— 7. Avg. - 20. —.....	7	112	44.4	42.0	112		49.0
— 21. — - 3. Sept.....	8	112	50.4	46.6	112		56.0
— 4. Sept. - 17. —.....	9	112	56.0	53.7	112		60.7
— 18. — - 1. Okt.....	10	112	61.6	56.0	112		65.3

*) Af Række 144 foreligger kun Tal ved Slagtning.

Række 146 Constantinsborg. 1901	Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr			
		A C ₁	B C ₂ C ₃	A	
		Skummet Mælk	Skummet Mælk	Majs	Rug
		Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt d. 13. Juni.....					
Fra 14. Juni til 27. Juni.....	1	56	70	11.2	—
— 28. — - 11. Juli.....	2	70	70	11.2	—
— 12. Juli - 25. —.....	3	70	70	19.6	—
— 26. — - 8. Avg.....	4	70	70	25.2	—
— 9. Avg. - 22. —.....	5	70	70	—	33.6
— 23. — - 5. Sept.....	6	70	70	—	36.4
— 6. Sept. - 19. —.....	7	70	70	—	42.0
— 20. — - 3. Okt.....	8	70	70	—	47.6

i 14 Dage			Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage						
C ₂ C ₃	C ₂	C ₃	A	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	C ₃
Skummet Mælk	Byg	Byg	5 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	5 Dyr	5—3 Dyr	6 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
.....			30.2	38.8	35.3	24.7	36.0	25.6	27.2
—	—	—	8.4	10.0	9.7	8.0	11.8	—	—
84	10.5	10.5	9.0	9.9	12.0	8.0	9.8	8.4	8.5
112	14.0	14.0	11.6	11.8	12.2	12.6	11.2	9.6	10.3
112	18.2	18.2	12.6	15.7	16.3	13.0	14.8	12.8	15.2
112	23.8	23.8	12.8	14.0	15.0	10.0	11.2	7.5	10.3
112	30.3	30.3	14.2	16.5	17.3	12.2	15.4	13.2	15.3
112	39.7	39.7	16.0	17.3	17.0	13.0	15.4	16.7	15.8
112	49.0	46.6	15.4	15.3	15.8	14.5	16.4	19.0	14.7
112	56.0	56.0	16.4	15.5	17.2	16.3	16.6	16.0	17.8
112	65.3	65.3	17.0	21.3	17.8	14.0	16.2	18.0	17.7

i 14 Dage						Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage				
B		C ₁		C ₂ C ₃		A	B	C ₁	C ₂	C ₃
Majs	Rug	Majs	Rug	Majs	Rug	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5—4 Dyr	6—4 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
.....						21.6	55.8	24.4	54.0	43.8
25.2	—	11.2	—	25.2	—	9.8	13.0	9.0	12.2	13.0
32.2	—	16.8	—	32.2	—	9.4	17.8	13.4	16.4	16.3
39.2	—	22.4	—	39.2	—	14.4	16.8	14.0	16.4	17.0
47.6	—	28.0	—	44.8	—	11.0	17.6	12.6	13.6	15.7
—	56.0	—	36.4	—	53.2	16.0	15.6	14.8	13.8	12.3
—	56.0	—	36.4	—	56.0	11.0	12.8	13.6	13.0	13.2
—	56.0	—	42.0	—	56.0	16.8	17.6	15.4	17.0	20.5
—	56.0	—	47.6	—	56.0	18.6	17.8	17.6	16.3	15.3

Række 147 Bregentved. 1901—02			Periodernes Løbe-Nr.	Foder til							
				A					B ₁		
				Mælk Pd.	Valle Pd.	Korn Pd.	Majs Pd.	Grønt- foder eller Roer Pd.	Mælk Pd.	Valle Pd.	
Begyndelsesvægt d. 15. Juli											
Fra 15. Juli til 28. Juli...			1	—	98.0	3.6	19.3	5.0	—	—	—
— 29. — - 11. Avg...			2	—	111.0	—	23.5	2.8	70.0	—	—
— 12. Avg. - 25. — ..			3	—	148.4	—	25.0	0.2	30.0	84.0	—
— 26. — - 8. Sept. ..			4	—	147.6	—	24.6	—	—	151.2	—
— 9. Sept. - 22. — ..			5	—	127.8	—	31.1	4.8	—	127.8	—
— 23. — - 6. Okt. ..			6	—	129.0	27.8	4.5	1.0	—	129.0	—
— 7. Okt. - 20. — ..			7	74.0	9.6	39.4	—	—	74.0	9.6	—
— 21. — - 3. Nov...			8	91.2	—	45.6	—	—	91.2	—	—
— 4. Nov. - 17. — ..			9	131.4	—	44.8	—	—	129.6	—	—
— 18. — - 1. Dec. ..			10	194.2	—	38.0	—	—	193.6	—	—
— 2. Dec. - 15. — ..			11	213.9	—	41.7	—	—	198.8	—	—
— 16. — - 29. — ..			12	—	—	—	—	—	225.8	—	—
— 30. — - 12. Jan. ..			13	—	—	—	—	—	210.0	—	—

Række 147 Bregentved. 1901—02		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr								
			C ₁					C ₂			
			Mælk	Valle	Korn	Majs	Grønt- foder eller Roer	Mælk	Valle	Korn	
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt d. 15. Juli	...										
Fra 15. Juli til 28. Juli ..	1	—	—	—	—	—	—	—	98.0	3.6	—
— 29. — - 11. Avg. ...	2	70.0	—	—	16.0	2.8	—	—	111.0	—	—
— 12. Avg. - 25. — ..	3	30.0	84.0	—	23.0	0.2	—	—	174.9	—	—
— 26. — - 8. Sept. ..	4	—	151.2	—	25.2	—	—	—	179.8	—	—
— 9. Sept. - 22. — ..	5	—	127.8	—	31.1	4.8	—	—	169.8	—	—
— 23. — - 6. Okt. ...	6	—	129.0	27.8	4.5	1.0	—	—	178.4	38.4	—
— 7. Okt. - 20. — ..	7	74.0	9.6	39.4	—	—	—	97.6	12.8	52.0	—
— 21. — - 3. Nov. ..	8	91.2	—	45.6	—	—	—	114.5	—	57.3	—
— 4. Nov. - 17. — ..	9	99.6	—	49.8	—	—	—	120.1	—	60.6	—
— 18. — - 1. Dec. ...	10	105.2	—	52.6	—	—	—	120.9	—	60.6	—
— 2. Dec. - 15. — ..	11	115.1	—	57.5	—	—	—	192.8	—	41.8	—
— 16. — - 29. — ..	12	107.5	—	58.1	—	—	—	225.8	—	47.2	—
— 30. — - 12. Jan. ...	13	116.0	—	66.9	—	—	—	—	—	—	—

Mælken var 29. Juli til 25. Avgust Kjærnemælk, og fra 7. Oktober Kornet var halvt Byg og halvt Rug undtagen fra 21. Oktober til 17. Grøntfoderet fra 15. Juli til 25. Avgust var mest Vikkehavre og lidt

1 Dyr i 14 Dage

B ₁			B ₂					B ₃				
Korn	Majs	Grønt-foder eller Roer	Mælk	Valle	Korn	Majs	Grønt-foder eller Roer	Mælk	Valle	Korn	Majs	Grønt-foder eller Roer
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
—	—	—	—	98.0	5.0	26.3	7.8	—	—	—	—	—
—	16.0	2.8	—	111.0	—	35.4	9.6	70.0	—	—	16.5	2.8
—	23.0	0.2	—	199.8	—	34.6	0.6	30.0	84.0	—	23.2	0.2
—	25.2	—	—	229.6	—	38.3	—	—	151.2	—	25.2	—
—	31.1	4.8	—	188.4	—	45.7	4.8	—	127.8	—	31.1	4.8
27.8	4.5	1.0	—	204.4	44.2	6.9	1.0	—	129.0	27.8	4.5	1.0
39.4	—	—	118.8	15.2	63.2	—	—	74.0	9.6	39.4	—	—
45.6	—	—	140.0	—	70.0	—	—	91.2	—	45.6	—	—
44.8	—	—	157.0	—	58.5	—	—	129.6	—	44.8	—	—
38.6	—	—	—	—	—	—	—	193.6	—	38.6	—	—
40.6	—	—	—	—	—	—	—	198.8	—	40.6	—	—
47.2	—	—	—	—	—	—	—	225.8	—	47.4	—	—
54.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

i 14 Dage

Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage

C ₂		D					A	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	D
Majs	Grønt-foder eller Roer	Mælk	Valle	Korn	Majs	Grønt-foder eller Roer	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5—4 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
—	—	—	—	—	—	—	39.6	35.8	62.2	37.6	31.2	42.0	32.4
19.6	7.0	—	—	—	—	—	8.8	—	11.4	—	—	10.6	—
27.1	9.5	70.0	—	—	16.0	2.8	8.4	10.4	12.6	9.6	9.8	12.8	8.4
29.8	0.6	30.0	84.0	—	23.0	0.2	4.2	8.0	10.2	7.4	9.2	8.4	7.2
30.0	—	—	151.2	—	25.2	—	9.2	6.6	12.6	6.2	7.2	9.2	6.6
41.3	4.8	—	127.8	—	31.1	4.8	6.0	5.6	11.6	5.8	6.8	9.8	7.0
6.2	1.0	—	129.0	27.8	4.5	1.0	8.6	12.2	14.6	11.0	9.2	11.0	8.0
—	—	74.0	9.6	39.4	—	—	22.0	20.2	30.4	21.4	21.0	26.4	17.6
—	—	89.2	—	44.6	—	—	18.4	16.2	19.0	15.2	15.6	19.0	14.8
—	—	96.7	—	48.3	—	—	23.0	20.0	19.5	20.0	17.8	21.0	20.4
—	—	105.2	—	52.3	—	—	14.8	15.4	—	12.0	16.7	13.7	16.6
—	—	114.4	—	57.2	—	—	19.3	14.0	—	12.2	20.0	13.0	17.6
—	—	107.2	—	58.0	—	—	—	19.5	—	17.3	18.0	21.0	17.3
—	—	116.0	—	66.9	—	—	—	14.0	—	—	17.0	—	14.5

til 12. Januar skummet Mælk.

November, da det hovedsagelig var Byg. I første Periode udelukkende Byg. Lucerne. Roer blev der fodret med fra 9. September til 6. Oktober.

Række 148 Tybrind. 1901—02			Periodernes Løbe-Nr.	Foder til							
				A					B		
				Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Korn	Majs	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle
				Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt				1	46.2	—	—	7.7	7.7	43.4	—
Fra 22. Juni til 5. Juli			2	51.8	—	—	8.6	8.6	49.0	—	—
— 6. Juli - 19. —			3	61.6	—	—	10.3	10.3	56.0	—	—
— 20. — - 2. Avg.			4	72.8	—	—	12.1	12.1	63.0	—	—
— 3. Avg. - 16. —			5	62.1	21.5	—	14.0	14.0	70.7	—	—
— 17. — - 30. —			6	48.3	48.3	—	16.1	16.1	81.2	—	—
— 31. — - 13. Sept.			7	34.3	53.2	51.8	18.9	18.9	48.3	48.3	—
— 14. Sept. - 27. —			8	14.0	58.8	117.6	33.4	10.5	34.3	53.9	53.2
— 28. — - 11. Okt.			9	14.0	68.6	137.2	50.4	—	14.0	61.6	123.2
— 12. Okt. - 25. —			10	14.0	73.5	147.0	57.2	—	14.0	66.5	133.0
— 26. — - 8. Nov.			11	14.0	84.0	168.0	61.8	—	14.0	80.5	161.0
— 9. Nov. - 22. —			12	14.0	84.0	168.0	68.3	—	14.0	84.0	168.0
— 23. — - 6. Dec.			13	—	—	—	—	—	—	—	—
— 7. Dec. - 3. Jan.			14	—	—	—	—	—	—	—	—

Række 148 Tybrind. 1901—02			Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr							
				C ₃					C ₄		
				Valle	Korn	Majs	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Korn	Majs
				Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt			1	—	9.1	9.1	70.0	—	—	11.7	11.7
Fra 22. Juni til 5. Juli			2	—	10.0	10.0	81.2	—	—	13.5	13.5
— 6. Juli — 19. —			3	—	11.7	11.7	93.8	—	—	15.6	15.6
— 20. — — 2. Avg.			4	—	13.5	13.5	53.2	53.2	—	17.7	17.7
— 3. Avg. — 16. —			5	—	15.1	15.1	36.0	83.7	—	20.0	20.0
— 17. — — 30. —			6	—	17.0	17.0	14.0	88.9	63.0	22.4	22.4
— 31. — — 13. Sept.			7	56.0	20.1	20.1	14.0	70.0	140.0	25.7	25.7
— 14. Sept. — 27. —			8	126.0	46.7	—	14.0	81.2	162.4	58.8	—
— 28. — — 11. Okt.			9	148.4	54.1	—	14.0	92.4	184.8	66.3	—
— 12. Okt. — 25. —			10	154.0	61.8	—	—	—	—	—	—
— 26. — — 8. Nov.			11	168.0	65.3	—	—	—	—	—	—
— 9. Nov. — 22. —			12	168.0	70.0	—	—	—	—	—	—
— 23. — — 6. Dec.			13	—	—	—	—	—	—	—	—
— 7. Dec. — 3. Jan.			14	—	—	—	—	—	—	—	—

Kornet var de 3 første Perioder (22. Juni til 2. Avgust) Hvede; Resten

1 Dyr i 14 Dage

B		C ₁					C ₂					C ₃		
Korn	Majs	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Korn	Majs	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Korn	Majs	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	
7.2	7.2	61.6	—	—	10.3	10.3	51.8	—	—	8.6	8.6	54.6	—	
8.2	8.2	72.8	—	—	12.1	12.1	57.4	—	—	9.6	9.6	60.2	—	
9.3	9.3	85.4	—	—	14.2	14.2	67.2	—	—	11.2	11.2	70.0	—	
10.5	10.5	49.0	49.0	—	16.3	16.3	78.4	—	—	13.1	13.1	81.2	—	
11.8	11.8	55.7	55.7	—	18.6	18.6	63.5	21.5	—	14.2	14.2	45.2	45.2	
13.5	13.5	14.0	82.6	58.8	21.0	21.0	48.3	48.3	—	16.1	16.1	51.1	51.1	
16.1	16.1	14.0	65.2	131.6	24.3	24.3	34.3	53.2	51.8	18.9	18.9	35.7	56.7	
19.1	19.1	14.0	77.0	154.0	56.0	—	14.0	58.8	117.6	33.4	10.5	14.0	63.0	
45.7	—	14.0	88.2	176.4	63.4	—	14.0	68.6	137.2	50.4	—	14.0	74.2	
52.5	—	14.0	73.5	147.0	57.2	—	14.0	73.5	147.0	57.2	—	14.0	77.0	
57.2	—	14.0	84.0	168.0	61.8	—	14.0	84.0	168.0	61.8	—	14.0	84.0	
61.8	—	—	—	—	—	—	14.0	84.0	168.0	68.3	—	14.0	84.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

i 14 Dage

Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage

C ₅					A	B	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅
Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Korn	Majs	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
—	—	—	—	—	25.2	21.7	35.7	28.0	30.5	43.5	29.3
—	—	—	—	—	7.8	7.0	11.2	8.0	9.7	10.5	—
—	—	—	—	—	9.7	7.6	11.0	7.7	8.8	11.5	—
—	—	—	—	—	10.0	5.2	10.8	8.3	10.2	12.5	—
51.8	—	—	8.6	8.6	11.6	8.8	15.8	11.8	11.3	15.7	7.5
57.4	—	—	9.6	9.6	13.5	9.4	12.5	11.2	9.7	14.1	8.4
67.2	—	—	11.2	11.2	14.2	10.5	15.5	14.2	13.3	15.7	6.3
82.6	—	—	13.8	13.8	17.3	16.5	15.5	16.8	16.7	18.3	11.0
73.5	25.9	—	16.6	16.6	13.5	16.0	13.7	12.7	12.8	14.5	9.3
58.1	58.1	—	19.4	19.4	15.5	14.1	19.1	15.6	16.7	20.5	16.7
14.0	57.2	114.3	43.2	—	16.5	16.5	28.0	15.2	15.7	—	19.8
14.0	66.5	133.0	47.8	—	14.0	17.5	15.0	15.0	18.0	—	16.3
14.0	80.5	161.0	51.3	—	21.6	15.6	—	19.7	17.0	—	12.7
14.0	84.0	168.0	51.3	—	—	—	—	—	—	—	12.2

af Tiden Byg.

Række 149 Duelund. 1901—02				Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr								
					A B ₁		B ₂ C ₁		C ₃	A		B ₁	
					Skummet Mælk	Pd.	Skummet Mælk	Pd.		Majs	Byg	Majs	Byg
Begyndelsesvægt.....				1	56	70	—	14.0	—	14.0	—		
Fra 2. Avg. til 15. Avg.				2	70	70	56	21.0	—	18.7	—		
— 16. — - 29. —				3	70	70	70	24.5	—	23.3	—		
— 30. — - 12. Sept.				4	70	70	70	31.5	—	31.5	—		
— 13. Sept. - 26. —				5	70	70	70	—	38.5	—	38.5		
— 27. — - 10. Okt.				6	70	70	70	—	45.5	—	47.6		
— 11. Okt. - 24. —				7	70	70	70	—	52.5	—	56.0		
— 25. — - 7. Nov.				8	70	70	70	—	56.0	—	64.4		
— 8. Nov. - 21. —				9	70	70	70	—	63.0	—	70.0		
— 22. — - 5. Dec.				10	70	70	70	—	63.0	—	70.0		
— 6. Dec. - 19. —				11	70	—	70	—	70.0	—	70.0		
— 20. — - 2. Jan.				12	70	—	70	—	70.0	—	70.0		
— 3. Jan. - 16. —													

Række 150 Rosvang. 1902				Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr								
					A B ₂ C ₁ Skummet Mælk Pd.	A		B ₁ Byg Pd.	B ₁ B ₂ Majs Pd.	B ₂ Byg Pd.	C ₁		
						Byg Pd.	Majs Pd.				Byg Pd.	Byg Pd.	Majs Pd.
Begyndelsesvægt d. 29. April													
Fra 29. April til 12. Maj				1	70	11.7	—	7.0	—	7.0	9.3	—	—
— 13. Maj — 26. —				2	84	12.8	—	8.2	—	8.2	12.8	—	—
— 27. — — 9. Juni				3	84	19.8	—	12.8	—	12.8	19.8	—	—
— 10. Juni — 23. —				4	98	24.5	—	18.7	—	18.7	24.5	—	—
— 24. — — 7. Juli				5	112	29.2	—	25.7	—	25.7	29.2	—	—
— 8. Juli — 21. —				6	112	36.2	—	33.8	—	33.8	36.2	—	—
— 22. — — 4. Avg.				7	112	23.3	23.3	22.2	22.2	22.2	23.3	23.3	23.3
— 5. Avg. — 18. —				8	112	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
— 19. — — 1. Sept.				9	112	31.5	31.5	32.7	32.7	32.7	31.5	31.5	31.5
— 2. Sept. — 15. —				10	112	32.7	32.7	35.0	35.0	35.0	33.6	33.6	33.6

i 14 Dage						Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage					
B ₂ C ₁ C ₂	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃		A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃
Majs	Byg	Byg	Byg	Majs	Byg	4 Dyr	6-5 Dyr	6 Dyr	5-4 Dyr	6 Dyr	6 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
.....						29.7	24.7	34.2	36.2	36.8	19.5
22.4	—	—	—	—	—	7.5	6.3	9.0	8.4	9.7	—
25.7	—	—	—	10.5	—	8.0	9.0	9.1	12.4	8.3	4.7
32.7	—	—	—	11.6	—	8.8	8.2	10.5	10.8	11.2	4.8
37.3	—	—	—	14.0	—	10.0	8.1	11.4	12.4	10.0	5.5
—	42.0	42.0	42.0	—	18.7	17.0	18.4	17.1	17.8	16.0	11.7
—	49.0	49.0	49.0	—	25.7	15.5	12.4	14.2	14.4	13.2	10.3
—	58.3	63.0	58.3	—	35.0	15.0	23.4	20.3	22.0	21.1	17.0
—	65.3	70.0	65.3	—	46.7	15.5	16.2	17.8	22.3	17.7	15.7
—	70.0	80.5	74.7	—	56.0	15.5	22.4	23.0	25.0	26.0	22.0
—	75.6	84.0	75.6	—	70.0	16.5	19.0	22.6	25.5	30.6	17.1
—	—	—	—	—	70.0	27.5	29.0	—	—	—	24.5
—	—	—	—	—	74.7	11.0	13.0	—	—	—	14.2

i 14 Dage							Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage					
C ₂			C ₃				A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃
Skummet Mælk	Byg	Majs	Sødmælk	Skummet Mælk	Byg	Majs	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6-5 Dyr	6 Dyr	5 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
.....							40.0	23.5	22.2	29.0	25.2	19.2
56	7.0	—	28	42	5.6	—	7.5	6.7	6.5	7.5	5.6	8.0
84	8.2	—	7	70	7.7	—	7.8	7.3	7.1	8.0	8.0	7.8
84	12.8	—	—	84	12.6	—	10.2	9.7	9.9	11.5	9.9	10.6
98	18.7	—	—	98	18.2	—	11.7	13.0	12.0	11.7	11.3	12.6
112	25.7	—	—	112	25.9	—	14.5	16.0	14.3	12.6	14.0	15.2
112	33.8	—	—	112	35.0	—	11.0	14.5	15.0	15.2	15.0	17.4
112	22.2	22.2	—	112	22.4	22.4	20.6	22.1	21.3	18.3	17.8	22.8
112	26.8	26.8	—	112	26.6	26.6	16.5	17.0	18.3	19.4	17.0	18.6
112	32.7	32.7	—	112	32.7	32.7	24.0	25.9	23.9	21.8	23.2	23.2
112	37.3	37.3	—	112	37.3	37.3	18.2	24.6	19.8	16.8	18.0	26.2

Række 151 Tybrind. 1902		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til						
			A C ₁	A B ₂	A B ₃	A			B ₁ B ₂
			Kjerne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Byg	Majs	Rug	Skummet Mælk
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt									
Fra 4. Maj til 17. Maj ..	1	56	—	—	—	8.2	—	—	—
— 18. — - 31. — ..	2	63	—	—	—	9.3	—	—	—
— 1. Juni - 14. Juni ..	3	70	—	—	—	12.8	—	—	—
— 15. — - 28. — ..	4	84	—	—	—	15.2	—	—	—
— 29. — - 12. Juli ..	5	84	—	—	—	19.8	—	—	42.0
— 13. Juli - 26. — ..	6	42	42.0	—	—	26.8	—	—	42.0
— 27. — - 9. Avg. ..	7	14	42.0	84.0	—	37.8	—	—	42.0
— 10. Avg. - 23. — ..	8	14	50.4	100.8	—	19.6	19.6	—	52.5
— 24. — - 6. Sept. ..	9	14	56.0	112.0	—	19.6	19.6	—	56.0
— 7. Sept. - 20. — ..	10	14	56.0	112.0	—	21.7	4.5	17.2	56.0
— 21. — - 4. Okt. ..	11	14	56.0	112.0	—	23.5	—	23.5	56.0
— 5. Okt. - 18. — ..	12	14	56.0	112.0	—	25.6	—	25.6	56.0
— 19. — - 1. Nov. ..	13	14	56.0	112.0	—	27.2	—	27.2	56.0

Række 151 Tybrind. 1902		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr							
			C ₁		C ₂ C ₃	C ₂				
			Majs	Rug	Skummet Mælk	Kjerne- mælk	Valle	Byg	Majs	Rug
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt										
Fra 4. Maj til 17. Maj ..	1	—	—	—	—	63	—	9.3	—	—
— 18. — - 31. — ..	2	—	—	—	—	70	—	12.8	—	—
— 1. Juni - 14. Juni ..	3	—	—	—	—	70	—	18.7	—	—
— 15. — - 28. — ..	4	—	—	—	—	84	—	22.2	—	—
— 29. — - 12. Juli ..	5	—	—	—	42.0	28	42	26.8	—	—
— 13. Juli - 26. — ..	6	—	—	—	42.0	14	84	33.8	—	—
— 27. — - 9. Avg. ..	7	—	—	—	42.0	14	84	40.8	—	—
— 10. Avg. - 23. — ..	8	16.3	—	—	52.5	14	105	21.0	21.0	—
— 24. — - 6. Sept. ..	9	18.7	—	—	56.0	14	112	23.3	23.3	—
— 7. Sept. - 20. — ..	10	4.3	16.2	56.0	14	112	26.3	5.5	20.8	—
— 21. — - 4. Okt. ..	11	—	23.3	56.0	14	112	28.6	—	28.6	—
— 5. Okt. - 18. — ..	12	—	25.1	56.0	14	112	32.1	—	32.1	—
— 19. — - 1. Nov. ..	13	—	27.8	—	—	—	—	—	—	—

1 Dyr i 14 Dage

B ₁ B ₂		B ₁ B ₂ C ₃	B ₁			B ₂			B ₃				C ₁		
Valle	Majs		Kjærne- mælk	Byg	Rug	Kjærne- mælk	Byg	Rug	Kjærne- mælk	Byg	Majs	Rug	Skummet Mælk	Valle	Byg
Pd.	Pd.		Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
—	—	—	56	8.2	—	63	9.3	—	—	—	—	—	—	—	8.2
—	—	—	70	10.5	—	70	10.5	—	—	—	—	—	—	—	9.3
—	—	—	70	15.2	—	70	15.2	—	58.4	10.5	—	—	—	—	12.8
—	—	—	84	17.5	—	84	17.5	—	84.0	15.4	—	—	—	—	15.2
—	—	—	42	22.2	—	42	22.2	—	84.0	21.0	—	—	—	—	19.8
84	—	—	14	29.2	—	14	29.2	—	42.0	26.6	—	—	42.0	—	26.8
84	—	—	14	36.2	—	14	36.2	—	14.0	46.2	—	—	42.0	84	31.5
105	18.7	14	14	18.7	—	14	18.7	—	14.0	16.8	16.8	—	52.5	105	16.3
112	21.0	14	14	21.0	—	14	21.0	—	14.0	19.6	19.6	—	56.0	112	18.7
112	5.0	14	14	23.9	18.9	14	23.9	18.9	14.0	21.7	4.5	17.2	56.0	112	20.4
112	—	14	14	27.4	27.4	14	26.8	26.8	14.0	24.5	—	24.5	56.0	112	23.3
112	—	14	14	31.5	31.5	14	28.6	28.6	14.0	24.5	—	24.5	56.0	112	25.1
112	—	14	14	32.0	32.0	14	29.7	29.7	14.0	26.0	—	26.0	56.0	112	27.8

i 14 Dage				Tilvæxt til 1 Dyr i 14 Dage						
C ₃				A	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	C ₃
Kjærne- mælk	Valle	Byg	Rug	6 - 5 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	5 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
.....				18.5	18.5	25.7	28.0	16.8	28.2	23.0
63	—	9.3	—	4.0	5.2	3.5	—	3.5	5.6	4.7
70	—	12.8	—	5.0	7.0	6.3	—	7.0	8.2	8.5
70	—	18.7	—	8.0	10.3	10.8	8.6	7.2	10.3	10.3
84	—	22.2	—	11.3	11.2	10.4	7.6	12.2	10.9	10.0
42	—	26.8	—	7.3	9.5	8.5	7.8	8.5	10.5	9.5
14	84	31.5	—	12.0	15.3	15.5	9.8	11.6	13.5	15.7
14	84	36.2	—	13.0	11.8	14.0	14.6	13.4	11.6	11.6
14	105	18.7	—	13.2	14.8	15.0	14.6	13.3	15.8	12.5
14	112	21.0	—	14.4	14.1	14.1	14.0	11.8	17.1	18.0
14	112	23.9	18.9	14.8	17.0	16.5	12.8	17.0	16.6	13.5
14	112	26.8	26.8	20.8	16.6	15.4	11.2	17.7	18.2	22.7
14	112	29.8	29.8	13.8	18.7	20.5	18.8	19.0	21.0	19.8
—	—	—	—	13.3	17.5	19.0	14.2	15.0	—	—

Række 152 Duelund. 1902		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr i								
			A B ₁ B ₂		A		B ₁ B ₂		C ₁		
			Skummet Mælk	Pd.	Byg Pd.	Majs Pd.	Byg Pd.	Majs Pd.	Skummet Mælk	Byg Pd.	Majs Pd.
Begyndelsesvægt		1	—	—	—	—	—	—	56	14.0	—
Fra 16. Maj til 29. Maj	...	2	70	14.0	—	14.0	—	—	70	18.7	—
— 30. — - 12. Juni	...	3	70	21.0	—	18.7	—	—	70	23.3	—
— 13. Juni - 26. —	...	4	70	28.0	—	25.7	—	—	70	28.0	—
— 27. — - 10. Juli	...	5	70	33.3	—	30.3	—	—	70	31.5	—
— 11. Juli - 24. —	...	6	98	36.7	—	33.8	—	—	98	35.0	—
— 25. — - 7. Avg.	...	7	98	21.0	22.8	18.7	19.8	—	98	19.8	21.0
— 8. Avg. - 21. —	...	8	98	—	50.7	—	45.5	—	98	—	47.8
— 22. — - 4. Sept.	...	9	42	35.0	35.0	31.5	31.5	42	33.8	33.8	—
— 5. Sept. - 18. —	...	10	63	50.8	19.3	45.5	17.5	63	49.0	18.7	—
— 19. — - 2. Okt.	...	11	84	66.5	—	59.5	—	84	64.2	—	—
— 3. Okt. - 16. —	...	12	84	70.0	—	63.0	—	84	67.7	—	—
— 17. — - 30. —	...										

Række 153 Alslevgaard. 1902		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr								
			A				B ₁			B ₂	
			Skummet Mælk	Valle	Korn	Lucerne	Valle	Korn	Lucerne	Skummet Mælk	Valle
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt	1	—	—	—	—	140.0	28.0	5.6	—	—	
Fra 12. Juni til 25. Juni	2	70	—	16.8	—	140.0	28.0	5.6	70	—	
— 26. — - 9. Juli	3	70	—	20.6	—	172.0	34.4	5.6	70	—	
— 10. Juli - 23. —	4	5	130.0	26.2	5.2	201.0	40.2	8.2	76	—	
— 24. — - 6. Avg.	5	—	172.0	28.0	5.6	229.0	45.8	8.4	6	136.0	
— 7. Avg. - 20. —	6	—	145.0	33.2	8.2	212.8	53.0	8.4	—	145.4	
— 21. — - 3. Sept.	7	—	166.8	37.4	8.4	197.2	59.8	8.4	—	140.8	
— 4. Sept. - 17. —	8	—	168.0	43.0	8.4	166.8	64.4	8.4	—	166.4	
— 18. — - 1. Okt.	9	—	168.0	48.6	8.4	168.0	68.2	8.4	—	168.0	
— 2. Okt. - 15. —	10	—	187.2	50.4	8.4	—	—	—	—	168.0	
— 16. — - 29. —	11	—	201.6	54.2	—	—	—	—	—	168.0	
— 30. — - 12. Nov.											

Indtil Dyrene havde naaet en Vægt af lidt over 50 Pd., bestod Kornet og halvt Majs.

14 Dage						Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage					
C ₂			C ₃			A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃
Skummet Mælk	Byg	Majs	Skummet Mælk	Byg	Majs	4 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6—5 Dyr	5 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
.....						25.5	22.0	23.8	24.3	40.7	23.4
56	21.0	—	56	14.0	—	—	—	—	5.7	7.6	7.8
70	23.3	—	70	19.6	—	8.7	6.8	8.0	8.3	13.4	11.4
70	30.3	—	70	25.2	—	12.0	10.5	10.8	12.7	15.3	14.6
70	37.3	—	70	33.6	—	7.5	13.2	11.7	7.7	11.3	14.2
70	44.3	—	70	37.8	—	11.0	12.7	13.2	12.5	16.2	16.2
98	48.3	—	98	42.0	—	16.0	15.3	13.2	14.6	16.0	16.4
98	28.0	29.4	98	25.2	26.6	20.5	15.7	15.3	18.2	20.0	20.8
98	—	65.8	98	—	60.2	17.3	17.3	17.3	15.7	21.4	18.2
42	40.6	40.6	42	40.6	40.6	15.0	15.7	14.9	16.1	18.0	21.6
—	—	—	63	56.0	21.0	12.2	14.5	14.8	12.7	—	19.4
—	—	—	84	79.3	—	18.5	18.3	18.0	20.7	—	27.6
—	—	—	—	—	—	32.5	27.5	25.0	14.0	—	—

i 14 Dage									Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage				
B ₂		C ₁			C ₁ C ₂	C ₂			A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂
Korn	Lucerne	Skummet Mælk	Valle	Korn	Lucerne	Skummet Mælk	Valle	Korn	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
.....		70		22.4	5.6	70			34.4	58.4	26.8	32.4	40.6
—	—	70	—	22.4	5.6	—	140.0	22.4	11.8	13.8	11.4	14.0	12.6
14.0	—	5	130.0	27.6	5.6	—	146.0	28.8	16.2	13.2	11.2	12.8	11.4
17.8	—	—	159.0	31.8	8.2	—	160.0	32.0	11.0	17.2	13.6	13.6	12.8
22.8	—	—	187.0	37.4	8.4	—	200.0	40.0	13.0	17.8	12.4	15.6	15.2
28.9	5.6	—	174.8	43.0	8.4	—	145.0	50.6	12.4	19.8	19.6	15.4	19.8
37.2	8.2	—	163.2	51.2	8.4	—	140.0	57.0	14.0	18.2	15.6	16.2	21.2
45.6	8.4	—	168.0	59.6	8.4	—	157.6	62.6	17.8	19.0	21.2	21.8	17.5
48.8	8.4	—	168.0	68.0	8.4	—	168.0	68.2	15.4	16.0	13.8	20.2	18.2
54.2	8.4	—	168.0	62.0	8.4	—	187.2	58.8	22.5	—	25.7	27.5	19.0
57.0	8.4	—	168.0	59.8	—	—	201.6	54.2	17.0	—	22.0	18.5	14.0
59.8	—	—	168.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

af Byg (samtidig med at der gaves skummet Mælk), derefter af halvt Rug

Række 154 Constantinsborg. 1902		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr							
			B ₁ B ₂ C ₁		B ₁		B ₂		C ₁	
			Skummet Mælk	Pd.	Korn Pd.	Majs Pd.	Korn Pd.	Majs Pd.	Korn Pd.	Majs Pd.
Begyndelsesvægt.....										
Fra 14. Juni til 27. Juni....	1	56	12.8	—	11.7	—	11.2	—		
— 28. — - 11. Juli....	2	56	15.2	—	14.0	—	14.0	—		
— 12. Juli - 25. —	3	56	—	19.8	—	17.5	—	18.2		
— 26. — - 8. Avg.	4	56	—	26.8	—	22.2	—	23.8		
— 9. Avg. - 22. —	5	28	—	35.0	—	28.0	—	32.2		
— 23. — - 5. Sept.	6	28	—	42.0	—	33.8	—	40.6		
— 6. Sept. - 19. —	7	28	—	53.2	—	37.3	—	44.8		
— 20. — - 3. Okt.	8	28	28.0	28.0	22.2	22.2	26.3	26.3		
— 4. Okt. - 17. —	9	28	28.0	28.0	25.7	25.7	31.5	31.5		
— 18. — - 31. —	10	42	28.0	28.0	25.7	25.7	38.5	38.5		
— 1. Nov. - 14. Nov.	11	42	30.8	30.8	25.7	25.7	42.0	42.0		
— 15. — - 28. —	12	42	37.3	37.3	35.0	35.0	42.0	42.0		

Kornet var de første Perioder Byg, de sidste 5 Perioder Rug.

Række 155 • Rosenfeldt. 1902		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til						
			A					B ₁ C ₂	
			Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Majs	Hvede- strømel eller Byg	Hvede	Kjærne- mælk	Pd.
Begyndelsesvægt.....									
Fra 8. Juli til 21. Juli....	1	14	70.0	9.3	9.3	—	14		
— 22. — - 4. Avg.	2	14	70.0	10.9	7.6	3.3	14		
— 5. Avg. - 18. —	3	14	92.5	13.3	—	13.3	14		
— 19. — - 1. Sept.	4	14	127.0	14.3	—	14.3	14		
— 2. Sept. - 15. —	5	14	141.0	16.3	—	16.3	14		
— 16. — - 29. —	6	14	159.3	19.5	—	19.5	14		
— 30. — - 13. Okt.	7	14	168.0	23.6	18.8	4.9	14		
— 14. Okt. - 27. —	8	14	168.0	25.8	25.8	—	14		
— 28. — - 10. Nov.	9	14	168.0	26.3	26.3	—	14		
— 11. Nov. - 24. —	10	14	168.0	25.7	25.7	—	14		
— 25. — - 8. Dec.	11	—	—	—	—	—	14		

i 14 Dage					Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage				
C ₂ C ₃	C ₂		C ₃		B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃
Skummet Mælk	Korn	Majs	Korn	Majs	6—5 Dyr	6 Dyr	5—4 Dyr	5—3 Dyr	6 Dyr
	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
—	—	—	—	—	26.5	23.5	29.0	21.0	23.5
—	—	—	—	—	13.2	9.2	11.2	—	—
56	8.4	—	11.7	—	10.1	8.1	10.2	7.0	8.8
56	—	9.5	—	11.7	15.7	14.0	15.6	7.0	8.5
56	—	10.5	—	12.8	11.2	10.0	11.8	2.7	9.2
28	—	14.0	—	19.8	12.3	12.7	15.2	7.3	10.3
28	—	21.7	—	28.0	6.5	11.0	13.2	12.0	12.4
28	—	25.7	—	32.7	10.2	12.8	21.8	17.4	12.1
28	21.0	21.0	21.0	21.0	9.8	11.2	15.2	17.0	16.5
28	30.3	30.3	26.8	26.8	14.6	15.5	15.0	21.0	19.2
42	37.3	37.3	29.2	29.2	15.0	14.5	22.0	20.6	16.2
42	37.3	37.3	30.3	30.3	14.0	14.9	19.7	19.8	19.9
42	35.0	35.0	36.4	36.4	14.9	19.1	27.1	19.6	27.3

1 Dyr i 14 Dage													
B ₁				B ₂ B ₃	B ₂				B ₃				
Skummet Mælk	Majs	Hvede- strømel eller Byg	Hvede	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Majs	Hvede- strømel eller Byg	Hvede	Skummet Mælk	Majs	Hvede- strømel eller Byg	Hvede	
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
56.0	9.1	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69.0	11.7	8.1	3.6	14	56.0	8.4	6.0	2.4	56.0	8.4	6.0	2.4	
98.6	9.5	—	9.5	14	69.0	0.6	—	15.6	56.0	0.6	—	14.4	
94.0	10.6	—	10.6	14	70.0	—	—	18.0	72.6	—	—	17.2	
109.4	13.4	—	13.4	14	95.5	11.3	—	12.6	91.0	10.4	—	11.7	
123.6	18.2	—	18.2	14	116.0	15.8	—	15.9	108.2	14.0	—	14.0	
126.0	22.8	18.1	4.7	14	126.0	19.4	15.5	4.0	126.0	18.2	14.6	3.6	
126.0	24.8	24.8	—	14	126.0	21.4	21.4	—	126.0	21.0	21.0	—	
126.0	26.2	26.2	—	14	126.0	23.2	23.2	—	126.0	23.0	23.0	—	
126.0	28.1	28.1	—	14	126.0	24.9	24.9	—	126.0	25.3	25.3	—	
126.0	29.4	29.4	—	14	126.0	26.6	26.6	—	126.0	27.5	27.5	—	

Række 155 Rosenfeldt. 1902		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr						
			C ₁					C ₂	
			Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Majs	Hvede- strømel eller Byg	Hvede	Skummet Mælk	Majs
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt									
Fra 8. Juli til 21. Juli	1	14.0	56.0	9.1	9.1	—	56.0	9.1	
— 22. — - 4. Avg.	2	14.0	70.0	10.4	7.2	3.2	82.0	13.0	
— 5. Avg. - 18. —	3	14.0	72.6	10.5	—	10.5	97.0	13.5	
— 19. — - 1. Sept.	4	15.0	99.2	11.5	—	11.5	106.8	12.2	
— 2. Sept. - 15. —	5	14.3	137.1	15.3	—	15.3	124.6	14.8	
— 16. — - 29. —	6	14.0	128.2	19.4	—	19.4	130.0	19.6	
— 30. — - 13. Okt.	7	14.0	126.0	25.0	19.9	5.1	126.0	24.2	
— 14. Okt. - 27. —	8	14.0	126.0	27.5	27.5	—	126.0	26.2	
— 28. — - 10. Nov.	9	14.0	126.0	28.5	28.5	—	126.0	28.5	
— 11. Nov. - 24. —	10	14.0	126.0	29.7	29.7	—	126.0	30.7	
— 25. — - 8. Dec.	11	—	—	—	—	—	126.0	31.2	

Hvedestrømel fra 8. Juli til 4. Avg. Byg fra 30. Sept. til 8. Decb.

Række 156 Duelund. 1903		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr							
			Alle Hold	B ₁ C ₂ C ₃	B ₁ C ₁	B ₁	B ₂ C ₂	B ₂		
			Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Majs	Byg	Majs	Skummet Mælk	Byg	
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	
Begyndelsesvægt d. 14. Maj	..									
Fra 14. Maj til 27. Maj	1	42	28	16.3	—	16.3	28	—	—	
— 28. — - 10. Juni	2	42	28	8.2	9.3	9.3	28	28	10.5	
— 11. Juni - 24. —	3	42	49	—	19.8	—	49	22.2	—	
— 25. — - 8. Juli	4	35	35	—	25.7	—	35	28.0	—	
— 9. Juli - 22. —	5	—	56	—	31.5	—	56	33.8	—	
— 23. — - 5. Avg.	6	—	42	—	42.0	—	42	44.3	—	
— 6. Avg. - 19. —	7	—	42	—	49.0	—	42	51.3	—	
— 20. — - 2. Septb.	8	—	56	—	53.7	—	56	56.0	—	
— 3. Septb. - 16. —	9	—	56	—	70.0	—	56	72.3	—	
— 17. — - 30. —	10	—	—	—	70.0	—	—	72.3	—	
— 1. Oktb. - 14. Oktb.	11	—	28	—	77.0	—	28	79.3	—	
— 15. — - 28. —	12	—	28	—	86.3	—	28	98.0	—	
— 29. — - 11. Novb.	13	—	28	—	98.0	—	—	—	—	

i 14 Dage							Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage						
C ₂		C ₃					A	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	C ₃
Hvede- strømel eller Byg	Hvede	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Majs	Hvede- strømel eller Byg	Hvede	4 Dyr	5 Dyr	4 Dyr	5 Dyr	5—4 Dyr	5 Dyr	5—4 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
.....							37.0	31.8	25.4	28.8	36.6	37.2	32.0
9.1	—	—	—	—	—	—	10.5	10.2	—	—	5.8	7.4	—
9.0	4.0	14	56.0	9.0	6.2	2.8	12.0	10.8	10.3	8.4	8.8	15.2	9.8
—	13.5	14	71.6	0.7	—	15.3	13.3	7.0	7.0	7.4	6.4	9.4	7.0
—	12.2	14	76.2	—	—	16.8	17.0	11.0	11.2	12.8	13.3	9.2	8.4
—	14.8	14	89.0	10.4	—	11.7	15.5	13.8	12.8	12.8	14.0	14.4	13.2
—	19.6	14	107.1	17.5	—	17.5	18.0	15.0	17.7	12.8	15.0	14.0	17.3
19.2	5.0	14	126.0	21.2	16.8	4.4	19.0	18.6	15.8	15.6	14.2	16.8	18.8
26.2	—	14	126.0	23.5	23.5	—	18.7	15.2	13.2	15.0	18.8	17.0	15.5
28.5	—	14	126.0	25.7	25.7	—	9.5	11.4	11.0	10.6	9.0	10.8	8.7
30.7	—	14	126.0	27.5	27.5	—	23.3	23.8	23.3	22.6	22.0	24.4	28.8
31.2	—	14	126.0	29.6	29.6	—	—	13.0	16.3	20.5	—	20.5	12.0

i 14 Dage							Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage						
C ₁		C ₂	C ₃ C ₄	C ₃	C ₄		B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	
Skummet Mælk	Byg	Byg	Majs	Byg	Skummet Mælk	Byg	6 Dyr	6 Dyr	6—2 Dyr	5—4 Dyr	6—4 Dyr	6—4 Dyr	
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	
....							30.8	37.2	28.3	30.0	20.0	25.8	
28	—	—	14.0	—	28	—	5.7	7.1	3.5	4.8	5.7	7.8	
28	9.3	10.5	8.2	9.3	28	9.3	6.5	4.7	4.2	4.7	4.1	4.9	
49	18.7	21.0	—	19.8	49	19.8	8.3	8.8	6.8	7.0	7.5	8.5	
35	26.3	26.3	—	26.3	35	25.7	11.7	11.7	12.2	10.8	12.2	10.7	
56	31.5	31.5	—	31.5	56	31.5	10.3	13.7	12.3	13.0	12.5	13.7	
42	42.0	42.0	—	42.0	42	42.0	14.0	14.0	13.2	16.2	16.8	11.8	
42	56.0	49.0	—	49.0	42	49.0	12.0	16.1	19.3	14.0	15.0	17.2	
56	60.7	54.2	—	54.2	56	54.3	17.2	17.5	19.3	20.8	19.5	17.8	
56	74.7	70.0	—	70.0	56	70.0	14.0	19.9	21.4	13.5	18.5	19.5	
—	70.0	77.0	—	77.0	—	77.0	9.2	9.5	8.0	9.2	6.5	7.0	
—	—	77.0	—	80.5	28	80.5	22.1	29.5	—	18.7	23.2	23.0	
—	—	84.0	—	91.0	—	—	23.3	22.0	—	16.0	15.0	—	
—	—	98.0	—	98.0	—	—	20.0	—	—	18.0	21.0	—	

Række 157 Tybrind. 1903		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr												
			A ₁					A ₂							
			Kjærnemælk	Skummet Mælk	Valle	Byg	Rug	Kjærnemælk	Skummet Mælk	Valle	Byg	Rug			
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.		
Begyndelsesvægt den 4. Juni.....			1	28.7	28.7	—	—	6.4	12.8	24.5	24.5	—	—	5.5	10.9
Fra 4. Juni til 17. Juni.			2	33.6	33.6	—	—	7.5	14.9	29.4	29.4	—	—	6.5	13.1
— 18. — - 1. Juli.			3	40.6	30.1	21.0	—	9.0	18.0	35.0	25.9	18.2	7.8	15.6	15.6
— 2. Juli - 15. —			4	30.1	30.1	73.5	—	10.7	21.5	40.6	20.3	40.6	9.0	18.0	18.0
— 16. — - 29. —			5	14.0	36.4	100.8	—	13.3	26.6	46.2	23.1	46.2	10.3	20.5	20.5
— 30. — - 12. Avg.			6	14.0	36.4	100.8	—	14.5	28.9	47.6	23.8	47.6	10.6	21.2	21.2
— 13. Avg. - 26. —			7	14.0	36.4	100.8	—	16.3	32.7	14.0	36.4	100.8	11.7	23.3	23.3
— 27. — - 9. Sept.			8	14.0	36.4	100.8	—	18.2	36.4	14.0	36.4	100.8	14.0	28.0	28.0
— 10. Sept. - 23. —			9	14.0	36.4	100.8	—	—	60.2	14.0	36.4	98.0	—	47.6	47.6
— 24. — - 7. Okt.			10	14.0	36.4	100.8	—	—	61.6	14.0	36.4	100.8	—	54.6	54.6
— 8. Okt. - 21. —			11	14.0	36.4	100.8	—	—	63.0	14.0	36.4	100.8	—	60.2	60.2
— 22. — - 4. Nov.			12	—	—	—	—	—	—	14.0	36.4	100.8	—	61.6	61.6
— 5. Nov. - 18. —			13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 19. — - 2. Dec.															

Række 157 Tybrind. 1903			Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr										
				C ₂					C ₃					
				Kjærnemælk	Skummet Mælk	Valle	Byg	Rug	Kjærnemælk	Skummet Mælk	Valle	Byg	Rug	
				Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt den 4. Juni														
Fra 4. Juni til 17. Juni	1	24.5	24.5	—	5.5	10.9	21.7	21.7	—	4.8	9.6			
— 18. — - 1. Juli	2	29.4	29.4	—	6.5	13.1	26.2	26.2	—	5.8	11.7			
— 2. Juli - 15. —	3	36.4	26.9	18.9	8.1	16.2	30.8	22.8	16.1	6.8	13.7			
— 16. — - 29. —	4	41.3	20.7	41.3	9.2	18.3	35.7	17.9	35.7	7.9	15.9			
— 30. — - 12. Avg.	5	46.2	23.1	46.2	10.3	20.5	41.3	20.6	41.3	9.2	18.4			
— 13. Avg. - 26. —	6	47.6	23.8	47.6	10.6	21.2	45.5	22.8	45.5	10.1	20.2			
— 27. — - 9. Sept.	7	14.0	36.4	100.8	11.2	22.4	14.0	36.4	100.8	10.3	20.6			
— 10. Sept. - 23. —	8	14.0	36.4	100.8	12.6	25.2	14.0	36.4	100.8	12.1	24.3			
— 24. — - 7. Okt.	9	14.0	36.4	100.8	—	43.4	14.0	36.4	100.8	—	42.7			
— 8. Okt. - 21. —	10	14.0	36.4	100.8	—	50.4	14.0	36.4	100.8	—	50.4			
— 22. — - 4. Nov.	11	14.0	36.4	100.8	—	56.0	14.0	36.4	100.8	—	56.0			
— 5. Nov. - 18. —	12	14.0	36.4	100.8	—	60.2	14.0	36.4	100.8	—	54.6			
— 19. — - 2. Dec.	13	14.0	36.4	100.8	64.4	—	14.0	36.4	100.8	58.8	—			

i 14 Dage

B ₁					B ₂					C ₁				
Kjærnemælk	Skummet Mælk	Valle	Byg	Rug	Kjærnemælk	Skummet Mælk	Valle	Byg	Rug	Kjærnemælk	Skummet Mælk	Valle	Byg	Rug
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
23.1	23.1	—	5.1	10.3	20.3	20.3	—	4.5	9.0	25.9	25.9	—	5.8	11.5
28.0	28.0	—	6.2	12.4	23.4	23.4	—	5.2	10.4	30.8	30.8	—	6.8	13.7
36.4	26.9	18.9	8.1	16.2	30.8	22.8	16.1	6.9	13.7	37.8	28.0	19.6	8.4	16.8
42.0	21.0	42.0	9.3	18.7	37.0	18.5	37.0	8.2	16.5	43.4	21.7	43.4	9.7	19.3
48.3	24.2	48.3	10.7	21.5	43.4	21.7	43.4	9.6	19.2	30.8	31.5	77.0	11.2	22.4
32.9	31.1	76.3	12.1	24.1	49.0	24.5	49.0	10.9	21.8	14.0	36.4	100.8	12.1	24.3
14.0	36.4	100.8	14.5	28.9	14.0	36.4	100.8	12.6	25.2	14.0	36.4	100.8	17.3	34.5
14.0	36.4	100.8	16.3	32.7	14.0	36.4	100.8	14.5	28.9	14.0	36.4	100.8	19.1	38.3
14.0	36.4	100.8	—	54.6	14.0	36.4	100.8	—	49.0	14.0	36.4	100.8	—	62.3
14.0	36.4	100.8	—	60.2	14.0	36.4	100.8	—	53.2	—	—	—	—	—
14.0	36.4	100.8	—	65.8	14.0	36.4	100.8	—	58.8	—	—	—	—	—
14.0	36.4	100.8	—	63.0	14.0	36.4	100.8	—	63.0	—	—	—	—	—
14.0	36.4	100.8	65.8	—	14.0	36.4	100.8	56.0	—	—	—	—	—	—

i 14 Dage

Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage

C ₄					A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
Kjærnemælk	Skummet Mælk	Valle	Byg	Rug	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	4—3 Dyr	6 Dyr	6—5 Dyr	6 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
.....					41.3	32.5	29.8	20.5	34.8	31.7	24.8	24.2
21.7	21.7	—	4.8	9.6	11.2	7.8	11.0	8.5	11.2	8.1	8.7	6.1
24.9	24.9	—	5.5	11.0	9.5	7.4	10.2	9.3	8.3	8.9	5.8	7.0
30.8	22.8	16.1	6.8	13.7	12.5	10.5	11.2	13.2	15.0	9.0	10.6	12.4
36.4	18.2	36.4	8.1	16.2	11.7	9.8	9.5	12.5	15.2	10.6	13.6	10.3
41.3	20.7	41.3	9.2	18.4	19.0	14.8	15.0	14.0	13.8	9.9	11.6	13.7
44.1	22.1	44.1	9.8	19.6	14.5	13.4	15.1	16.2	14.0	13.3	14.8	15.0
14.0	36.4	100.8	10.7	21.5	12.8	12.1	11.0	14.6	14.0	7.7	11.0	11.3
14.0	36.4	100.8	12.6	25.2	16.2	15.0	16.4	16.0	25.3	15.3	18.2	15.2
14.0	36.4	100.8	—	43.4	18.0	13.2	15.1	15.5	14.5	13.2	13.8	15.1
14.0	36.4	100.8	—	50.4	13.3	18.5	17.7	18.6	—	17.0	14.4	20.9
14.0	36.4	100.8	—	58.8	10.3	18.2	17.3	19.4	—	17.0	15.6	20.3
14.0	36.4	100.8	—	61.6	—	19.5	20.7	18.8	—	22.8	18.3	24.8
—	—	—	—	—	—	—	20.5	20.0	—	20.5	18.0	—

Række 158 Rosvang. 1903		Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr									
			A C ₂ C ₃	B ₁ C ₃	A			B ₁ C ₂ C ₃	B ₁	B ₁ B ₂	B ₂	
					Kjærne- mælk	Byg	Majs					
												Kjærne- mælk
		Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	
Begyndelsesvægt.....		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Fra 9. Juni til 22. Juni..		1	—	—	—	—	56	14.0	—	14.0	—	
— 23. — - 6. Juli ..		2	—	56	7.6	—	84	14.0	—	14.0	—	
— 7. Juli - 20. — ..		3	—	84	14.0	—	84	21.0	—	21.0	—	
— 21. — - 3. Avg. .		4	—	112	8.8	8.8	112	12.8	12.8	12.8	—	
— 4. Avg. - 17. — .		5	56	56	14.0	14.0	56	18.1	18.1	18.1	—	
— 18. — - 31. — .		6	56	56	15.7	15.7	56	22.2	22.2	22.2	—	
— 1. Sept. - 14. Sept. .		7	56	56	19.3	19.3	56	24.5	24.5	24.5	—	
— 15. — - 23. — .		8	56	56	35.0	14.0	56	38.8	14.8	38.8	—	
— 29. — - 12. Okt. .		9	56	56	52.5	—	56	58.3	—	58.3	—	
— 13. Okt. - 26. — .		10	56	56	56.0	—	56	63.0	—	65.3	—	
— 27. — - 9. Nov. .		11	56	56	56.0	—	56	77.0	—	—	—	

[illegible]

i 14 Dage									Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage						
B ₂ C ₁	B ₂ C ₁	C ₁		C ₂		C ₃			A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃	
Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	Majs	Byg	Majs	Byg	Majs		4 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	5 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.		Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	
.....									25.7	25.1	31.0	35.0	25.5	27.5	
56	—	14.0	—	7.0	—	14.0	—		—	8.4	7.2	8.8	7.2	8.8	
84	—	14.0	—	14.0	—	14.0	—		10.8	11.8	9.3	8.0	11.3	9.7	
84	—	21.0	—	21.0	—	21.0	—		6.7	10.4	9.7	10.2	10.0	9.0	
112	—	12.8	12.8	12.8	12.8	13.4	13.4		12.3	16.1	16.6	15.6	16.0	16.3	
56	56	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1		19.5	19.2	16.7	18.0	19.0	20.0	
56	56	23.1	23.1	22.2	22.2	22.2	22.2		16.8	18.2	18.0	20.0	19.2	17.8	
56	56	25.2	25.2	24.5	24.5	24.5	24.5		15.5	13.8	15.5	17.2	14.8	15.6	
56	56	42.2	16.2	40.0	16.0	42.2	16.2		18.7	14.5	18.7	19.0	17.8	18.3	
56	56	67.9	—	58.3	—	67.7	—		20.0	20.2	18.0	20.0	18.0	24.7	
56	56	70.0	—	65.3	—	74.7	—		16.6	16.0	20.0	26.0	18.7	24.0	
—	—	—	—	77.0	—	77.0	—		18.5	13.0	—	—	12.0	24.0	

i 14 Dage									Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage							
C ₂			C ₃			C ₄			A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	
Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	5-4 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	6 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	4 Dyr	
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	
.....									40.6	53.0	28.6	45.5	38.0	50.4	38.8	
84	—	25.9	—	—	—	—	—	—	—	14.2	14.6	14.8	14.6	—	—	
14	70	30.8	—	—	—	—	—	—	13.2	16.4	12.4	16.7	15.8	—	—	
14	70	36.4	—	—	—	—	—	—	16.0	11.6	16.8	13.8	14.8	—	—	
14	70	42.0	14	70	30.8	—	—	—	11.2	21.6	16.0	19.4	16.4	13.6	—	
14	70	49.0	14	70	33.6	84	—	26.3	14.0	19.6	18.8	20.0	19.2	15.6	12.7	
14	70	54.6	14	70	40.6	14	70	31.8	11.5	16.0	15.6	15.8	16.2	14.4	15.5	
14	70	62.3	14	70	48.3	14	70	38.9	14.2	18.8	16.0	19.0	19.0	17.6	14.0	
14	70	65.8	14	70	53.2	14	70	43.4	15.0	20.0	16.5	22.3	17.4	20.0	15.8	
14	70	71.4	14	70	57.4	14	70	49.0	15.5	—	17.7	—	20.0	17.6	18.0	
—	—	—	14	70	63.7	14	70	55.3	19.0	—	25.0	—	—	19.4	18.5	
—	—	—	14	70	70.0	14	70	62.3	—	—	—	—	—	26.0	15.7	

[illegible]

Række 161 Rosvang. 1904	Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr							
		B				C ₁ C ₂ C ₃			
		Kjærne- mælk Pd.	Skummet Mælk Pd.	Byg Pd.	Majs Pd.	Kjærne- mælk Pd.	Skummet Mælk Pd.	Byg Pd.	Majs Pd.
Begyndelsesvægt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fra 10. Maj til 23. Maj...	1	28	28	8.4	—	35	35	8.4	—
— 24. — - 6. Juni ..	2	42	42	14.0	—	42	42	15.4	—
— 7. Juni - 20. — ..	3	49	49	18.2	—	49	49	21.0	—
— 21. — - 4. Juli ..	4	56	56	10.5	10.5	56	56	12.6	12.6
— 5. Juli - 18. — ..	5	56	56	15.4	15.4	56	56	18.2	18.2
— 19. — - 1. Avg. ...	6	56	56	21.0	21.0	56	56	23.8	23.8
— 2. Avg. - 15. — ..	7	56	56	26.6	26.6	56	56	29.4	29.4
— 16. — - 29. — ..	8	56	56	28.0	28.0	56	56	33.6	33.6
— 30. — - 12. Septb. .	9	56	56	28.0	28.0	56	56	36.4	36.4
— 13. Sept. - 26. — .	10	56	56	28.0	28.0	56	56	28.0	28.0
— 27. — - 10. Oktb. .	11	56	56	28.0	28.0	—	—	—	—

i 14 Dage						Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage						
C ₅ C ₆	C ₅	C ₆	C ₇			C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇
Kjærne- mælk	Byg	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	5 Dyr	5-4 Dyr	5-4 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
....						42.2	38.2	35.4	26.8	26.2	25.2	20.6
—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.4	5.2	—	—	—
35	11.2	11.2	28	28	5.6	12.2	10.4	11.2	9.6	10.2	8.2	5.4
42	15.4	15.4	35	35	8.4	15.0	11.2	10.0	9.4	11.0	8.4	7.4
56	21.0	21.0	42	42	14.0	14.0	13.6	13.6	11.8	12.0	12.6	7.2
56	32.2	30.8	56	56	19.6	19.4	19.4	17.2	16.8	18.6	17.2	15.6
70	37.8	35.0	56	56	26.6	20.2	18.0	18.4	17.4	18.6	18.6	14.4
70	46.2	43.4	70	70	32.2	19.2	17.6	16.8	14.8	17.2	14.8	14.0
70	57.4	54.6	70	70	43.4	20.0	19.4	17.8	20.4	17.4	19.2	17.2
70	64.4	61.6	70	70	50.4	19.0	16.4	14.8	17.8	17.6	17.6	15.6
70	67.2	67.2	70	70	56.0	—	4.0	10.7	27.3	19.0	15.4	17.0
70	70.0	70.0	70	70	64.4	—	19.0	19.0	12.3	18.6	16.0	16.2

i 14 Dage								Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage					
C ₄				C ₅				B	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅
Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	Majs	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	Majs	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
....								20.0	32.0	34.2	36.0	40.6	34.7
35	35	14.0	—	—	—	—	—	9.6	10.4	8.8	8.2	11.6	—
42	42	21.0	—	42	42	15.4	—	11.2	10.0	9.6	8.8	12.4	9.6
49	49	26.6	—	49	49	21.0	—	11.4	14.2	13.4	13.0	15.2	11.0
56	56	15.4	15.4	56	56	12.6	12.6	14.0	14.2	14.4	13.0	14.8	16.0
56	56	21.0	21.0	56	56	18.2	18.2	13.6	15.4	17.2	15.4	17.6	17.3
56	56	26.6	26.6	56	56	23.8	23.8	17.2	17.2	17.8	18.0	18.0	19.4
56	56	32.2	32.2	56	56	30.8	30.8	19.0	23.0	22.2	21.2	20.6	24.3
56	56	33.6	33.6	56	56	33.6	33.6	15.2	23.0	21.8	25.0	24.4	24.3
56	56	36.4	36.4	56	56	36.4	36.4	17.8	23.4	20.6	21.2	19.4	20.7
—	—	—	—	56	56	28.0	28.0	15.8	16.6	16.0	19.0	—	17.0
—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—

Række 162**Tybrind.**

1904.

	Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr											
		B ₁				B ₂				C ₁			
		Kjærne- mælk	Valle	Korn	Blodfoder	Kjærne- mælk	Valle	Korn	Blodfoder	Kjærne- mælk	Valle	Korn	Blodfoder
		Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt d. 28. Maj										35.7			
Fra 28. Maj til 10. Juni...	1	33.6	—	16.8	—	37.8	—	18.9	—	45.2	—	17.9	—
— 11. Juni - 24. — ..	2	38.9	—	19.4	—	45.2	—	22.6	—	26.2	—	22.6	—
— 25. — - 8. Juli...	3	22.0	44.1	22.1	—	25.2	52.5	26.3	—	30.5	52.5	26.2	—
— 9. Juli - 22. — ...	4	25.7	51.5	25.7	—	29.9	59.9	29.9	—	32.0	60.9	30.5	—
— 23. — - 5. Avg. ...	5	26.8	53.5	26.8	—	31.0	61.9	31.0	—	28.6	64.1	32.0	—
— 6. Avg. - 19. — ...	6	23.5	47.0	38.4	—	26.0	52.1	34.7	—	31.9	57.1	38.1	—
— 20. — - 2. Sept. ...	7	26.0	52.1	34.7	—	27.7	55.4	34.7	—	14.0	63.8	42.6	—
— 3. Sept. - 16. — ..	8	14.0	86.2	25.4	12.7	14.0	89.6	26.1	13.1	14.0	109.8	30.6	15.3
— 17. — - 30. — ...	9	14.0	96.3	27.6	13.8	14.0	96.3	27.6	13.8	14.0	119.8	32.9	16.4
— 1. Okt. - 14. Okt. ...	10	14.0	109.8	30.6	15.3	14.0	106.4	29.9	14.9	14.0	136.6	36.6	18.3
— 15. — - 28. — ...	11	14.0	123.2	33.6	16.8	14.0	119.8	32.9	16.4	14.0	150.1	39.6	19.8
— 29. — - 11. Nov. ...	12	14.0	137.1	36.7	18.3	14.0	133.8	36.0	18.0	14.0	160.2	41.8	20.9
— 12. Nov. - 25. — ..	13	14.0	145.0	38.5	19.2	14.0	141.7	37.7	18.9	14.0	156.8	41.1	20.5

De 6 første Perioder (²³/₅ til ¹⁰/₈) bestod Kornet**Række 163****Rosenfeldt.**

1904.

Række 163 Rosenfeldt. 1904.			Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr											
				B ₁			B ₂			B ₃ —B ₄		B ₃	B ₄	C ₁	
				Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	Kjærne- mælk.	Skummet Mælk	Byg	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk
				Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt d. 6. Juni	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
Fra 6. Juni til 19. Juni..	1	28	56	29.4	63	21	28.0	—	—	—	—	28	56		
— 20. — - 3. Juli ..	2	14	70	35.0	42	42	29.4	84	—	28.0	28.0	14	70		
— 4. Juli - 17. — ..	3	14	70	40.6	14	70	33.6	42	42	32.2	32.2	14	70		
— 18. — - 31. — ...	4	14	70	46.9	14	70	37.8	14	70	37.1	37.8	14	70		
— 1. Avg. - 14. Avg. ...	5	14	70	54.6	14	70	43.4	14	70	40.6	42.7	14	70		
— 15. — - 28. — ...	6	14	70	60.9	14	70	47.6	14	70	44.8	45.5	14	70		
— 29. — - 11. Sept. ...	7	14	70	67.9	14	70	51.8	14	70	49.0	49.0	14	70		
— 12. Sept. - 25. — ...	8	14	70	74.9	14	70	50.1	14	70	54.6	53.9	14	70		
— 26. — - 9. Okt. ...	9	14	70	67.2	14	70	62.3	14	70	56.7	53.2	—	—		
— 10. Okt. - 23. — ...	10	14	70	70.0	14	70	67.2	14	70	60.9	54.6	—	—		
— 24. — - 6. Nov. ...	11	—	—	—	—	—	—	14	70	63.0	50.0	—	—		
— 7. Nov. - 20. — ...	12	—	—	—	—	—	—	14	70	63.0	38.5	—	—		
— 21. — - 4. Dec. ...	13	—	—	—	—	—	—	14	70	64.4	47.3	—	—		

Fra 6. Juni til 28. August russisk

i 14 Dage												Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage.					
C ₂				C ₃				C ₄				B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
Kjærne- mælk	Valle	Korn	Blodfoder	Kjærne- mælk	Valle	Korn	Blodfoder	Kjærne- mælk	Valle	Korn	Blodfoder	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
42.0	—	21.0	—	35.7	—	17.9	—	—	—	—	—	19.7	24.8	28.2	36.7	30.2	23.5
45.2	—	22.6	—	45.2	—	22.6	—	32.6	—	16.3	—	7.1	9.0	6.8	5.5	7.1	—
29.4	58.8	29.4	—	26.2	52.5	26.2	—	21.0	42.0	21.0	—	5.4	6.2	5.2	8.0	5.2	6.5
37.3	74.6	37.3	—	30.5	60.9	30.5	—	24.7	49.4	24.7	—	7.1	8.3	6.8	9.6	6.7	7.7
39.4	78.7	39.4	—	32.0	64.1	32.0	—	25.7	51.5	25.7	—	7.4	7.7	7.8	8.5	10.0	7.3
34.4	68.9	45.9	—	28.6	57.1	38.1	—	22.7	45.4	30.2	—	13.0	11.2	10.7	13.0	14.1	10.5
37.8	75.6	50.4	—	31.9	63.8	42.6	—	25.2	50.4	33.6	—	10.3	9.3	12.2	12.5	12.0	9.7
14.0	133.3	35.8	17.9	14.0	109.8	30.6	15.3	14.0	76.2	23.2	11.6	11.8	9.9	11.0	12.2	13.2	9.5
14.0	143.4	38.1	19.0	14.0	119.8	32.9	16.4	14.0	82.9	24.6	12.3	20.2	15.2	14.1	18.3	20.3	13.6
14.0	160.2	41.8	20.9	14.0	136.6	36.6	18.3	14.0	96.3	27.6	13.8	13.5	12.3	15.9	14.5	15.0	13.2
14.0	173.6	44.8	22.4	14.0	150.1	39.6	19.8	14.0	109.8	30.6	15.3	16.2	15.0	14.0	16.4	13.5	13.2
14.0	183.7	47.0	23.5	14.0	148.6	39.3	19.6	14.0	127.0	34.5	17.2	18.1	21.0	18.0	16.8	23.7	18.0
—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	140.0	37.3	18.7	20.0	18.6	18.6	18.7	23.0	15.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	18.0	16.0	—	—	20.4

af Blandsæd, derefter halvt Byg og halvt Majs.

i 14 Dage.										Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage.							
C ₁	C ₂			C ₃			C ₄			B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
Byg.	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Byg	5 Dyr	5—4 Dyr	5 Dyr	5—4 Dyr	5 Dyr	5—4 Dyr	5—4 Dyr	5—4 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
29.4	28	56	29.4	28	56	29.4	—	—	—	41.6	33.6	34.2	36.2	45.6	39.2	44.0	31.0
35.0	14	70	35.0	14	70	35.0	—	—	—	13.6	9.0	—	—	12.0	11.6	12.4	—
40.6	14	70	40.6	14	70	40.6	—	—	—	15.0	14.4	12.4	13.0	14.8	17.2	18.2	—
46.9	14	70	46.2	14	70	46.9	84	—	28.0	14.6	11.8	10.2	11.6	14.6	14.4	13.0	—
54.6	14	70	51.8	14	70	54.6	42	42	29.4	17.2	14.6	16.0	17.6	18.0	16.4	17.6	11.2
62.3	14	70	57.4	14	70	62.3	14	70	35.0	13.2	15.8	13.4	10.4	18.4	15.6	17.8	14.4
70.7	14	70	63.0	14	70	77.0	14	70	40.6	17.6	16.2	14.2	13.6	21.6	16.0	19.2	14.0
79.1	14	70	70.0	14	70	79.1	14	70	46.9	15.6	15.6	13.4	11.0	20.8	15.2	23.5	12.2
—	14	70	70.0	—	—	—	14	70	53.2	20.3	16.8	15.6	9.4	19.6	18.5	18.0	18.4
—	—	—	—	—	—	—	14	70	60.9	13.7	19.2	14.0	15.0	—	20.0	—	19.0
—	—	—	—	—	—	—	14	70	65.1	19.0	13.3	15.3	9.6	—	—	—	21.4
—	—	—	—	—	—	—	14	70	67.2	—	—	11.3	2.3	—	—	—	14.0
—	—	—	—	—	—	—	14	70	68.6	—	—	12.0	9.0	—	—	—	18.7
—	—	—	—	—	—	—	14	70	—	—	—	16.0	15.5	—	—	—	15.0

Byg, Resten af Tiden dansk Byg.

Række 164 Duelund. 1904	Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr				
		C ₁		C ₂ C ₃		C ₄ C ₅
		Skummet Mælk Pd.	Byg Pd.	Skummet Mælk Pd.	Byg Pd.	Skummet Mælk Pd.
Begyndelsesvægt						
Fra 9. Juni til 22. Juni	1	70	14.0	70	14.0	—
— 23 — 6. Juli	2	70	16.8	70	16.8	70
— 7. Juli - 20. —	3	70	29.4	70	29.4	70
— 21. — - 3. Avg.	4	70	42.0	70	42.0	70
— 4. Avg. - 17. —	5	70	49.0	70	49.0	70
— 18. — - 31. —	6	70	64.4	70	64.4	70
— 1. Sept. - 14. Sept.	7	70	72.8	70	72.8	70
— 15. — - 28. —	8	70	75.6	70	75.6	70
— 29. — - 12. Okt.	9	70	80.5	70	80.5	70
— 13. Okt. - 26. —	10	—	—	70	84.0	70

[illegible]

i 14 Dage				Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage					
C ₄	C ₅	C ₆		C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
Byg	Byg	Skummet Mælk	Byg	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
.....				34.2	29.6	28.6	38.0	22.0	50.4
—	—	—	—	10.0	8.0	7.0	—	—	—
16.8	11.2	—	—	11.6	11.4	11.4	10.8	7.2	—
29.4	16.8	—	—	15.6	14.2	14.8	11.4	10.0	—
42.0	35.0	70	28.0	20.6	18.2	18.4	11.4	16.6	16.6
44.8	39.2	70	36.4	16.0	16.2	16.2	11.6	13.6	15.8
47.6	53.2	70	53.2	21.6	21.6	22.0	16.0	21.8	19.2
60.2	63.0	70	64.4	15.8	17.2	16.0	20.8	19.2	20.4
72.8	72.8	70	72.8	13.2	15.6	13.0	13.8	17.0	17.0
75.6	75.6	70	75.6	18.0	15.7	20.7	18.4	18.2	20.6
81.2	81.2	70	84.7	—	20.0	17.5	25.5	20.0	26.7

i 14 Dage												Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage								
C ₃		C ₄			C ₅			C ₆			B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆		
Kokuskager	Kjærnemælk	Skummet Mælk	Byg	Kokuskager	Kjærnemælk	Skummet Mælk	Byg	Kokuskager	Kjærnemælk	Skummet Mælk	Byg	Kokuskager	6 Dyr	5 Dyr	6—5 Dyr	4—3 Dyr	5 Dyr	5—4 Dyr	5 Dyr	4 Dyr
g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	42.2	45.2	44.5	35.5	48.4	47.4	38.2	43.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	10.2	12.5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	13.8	13.5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	11.2	15.7	10.3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	12.4	20.3	10.7	12.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	16.2	13.0	10.5	15.0	15.8	—	—
1.8	42	42	29.4	1.8	42	42	18.9	1.8	—	—	—	—	10.8	17.2	17.3	10.7	12.4	15.2	9.2	—
3.5	14	70	37.8	3.5	42	42	23.8	3.5	42	42	24.5	3.5	5.0	19.0	15.0	10.7	17.2	13.2	13.6	14.5
8.7	14	70	39.2	8.0	42	42	26.6	5.9	42	42	26.6	6.0	14.2	14.4	16.8	13.0	21.4	17.0	19.2	16.8
16.1	—	42	45.5	14.7	14	70	26.6	11.2	14	70	26.6	11.2	14.2	16.2	16.3	16.3	14.0	13.4	11.0	12.7
17.5	33	9	49.0	16.8	33	9	38.5	11.9	33	9	39.9	11.9	19.2	—	6.0	15.7	18.0	16.4	12.8	19.0
18.9	42	—	51.8	16.8	42	—	39.2	14.0	42	—	43.4	14.0	22.0	—	—	18.7	17.3	13.4	12.8	19.3
19.6	42	—	53.9	18.2	42	—	41.3	14.0	42	—	47.6	16.1	—	—	—	23.3	24.0	16.0	16.6	18.3
—	42	—	55.3	18.2	42	—	46.2	16.1	42	—	51.8	16.8	—	—	—	—	—	19.0	16.6	17.5
—	—	—	—	—	42	—	51.8	16.8	42	—	56.0	17.5	—	—	—	—	—	—	22.8	16.7
—	—	—	—	—	42	—	56.0	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—

Række 166 Duelund. 1905.	Periodernes Løbe-Nr.	Foder til 1 Dyr		
		Alle Hold	B ₁	C ₁
		Skummet Mælk	Byg	Byg
		Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt d. 9. Juni.....				
Fra 10. Juni til 23. Juni.....	1	70	12.6	18.9
— 24. — - 7. Juli.....	2	70	22.4	28.0
— 8. Juli - 21. —.....	3	70	29.4	36.4
— 22. — - 4. Avg.....	4	70	42.0	44.8
— 5. Avg. - 18. —.....	5	70	44.8	44.8
— 19. — - 1. Sept.....	6	70	50.4	50.4
— 2. Sept. - 15. —.....	7	70	58.8	58.8
— 16. — - 29. —.....	8	70	61.6	61.6
— 30. — - 13. Oktb.....	9	70	70.0	68.1
— 14. Oktb. - 27. —.....	10	70	77.0	74.7

Række 167 Rosvang. 1905.			Periodernes Løbe Nr.	Foder til 1 Dyr									
				C ₁ C ₄	C ₂ C ₅	C ₃ C ₆	C ₁ C ₂	C ₁	C ₂	C ₃ C ₅	C ₄ C ₆	C ₃	C ₄ C ₅
				Kjerne- mælk	Skummet Mælk	Byg	Byg	Skummet Mælk	Byg	Byg	Byg	Byg	
				Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	
Begyndelsesvægt			1	38.5	38.5	8.4	12.6	38.5	8.4	12.6			
Fra 20. Juni til 3. Juli ..			2	52.5	52.5	15.4	16.8	52.5	11.2	16.8			
— 4. Juli - 17. — ..			3	—	112.0	25.2	25.2	112.0	19.6	25.2			
— 18. — - 31. — ..			4	—	112.0	36.4	36.4	112.0	30.8	36.4			
— 1. Avg. - 14. Avg...			5	—	112.0	42.0	42.0	112.0	36.4	42.0			
— 15. — - 28. — ..			6	—	112.0	53.2	53.2	112.0	47.6	53.2			
— 29. — - 11. Sep...			7	—	112.0	58.8	58.8	112.0	53.6	58.8			
— 12. Sept. - 25. — ..			8	—	112.0	68.6	68.6	112.0	64.4	68.6			
— 26. — - 9. Oktb...			9	—	112.0	75.6	75.6	112.0	72.8	75.6			
— 10. Oktb. - 23. — ..			10	—	—	—	—	112.0	72.4	72.4			
— 24. — - 6. Nov...			11	—	—	—	—	—	—	—			
— 7. Nov. - 20. — ..													

i 14 Dage				Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage					
C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	B ₁	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅
Byg	Byg	Byg	Byg	5 Dyr	5-4 Dyr	4 Dyr	5 Dyr	3 Dyr	5 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
18.9	12.6	12.6	12.6	30.0	51.0	53.5	28.8	26.0	31.4
28.0	22.4	21.0	22.4	9.0	10.8	10.8	8.8	6.7	9.6
38.5	29.4	25.7	29.4	12.0	11.2	10.7	11.8	10.0	11.0
52.5	42.0	35.0	42.0	17.2	15.8	16.5	15.6	17.0	16.6
56.0	44.8	39.7	44.8	17.4	12.4	20.5	15.2	19.3	14.2
63.0	50.4	42.0	50.4	16.0	13.6	16.2	12.6	15.0	15.0
68.3	58.8	51.3	58.8	16.2	13.8	18.0	16.4	14.3	16.2
70.0	61.6	56.0	61.6	19.4	14.4	22.8	18.6	20.0	16.0
—	65.8	68.6	65.8	20.2	13.6	21.0	17.4	16.4	14.6
—	75.6	77.0	77.0	28.0	11.3	—	20.6	21.5	20.5
				22.5	17.0	—	18.6	27.5	23.5

i 14 Dage				Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage						
C ₆	C ₇			C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇
Byg	Kjærnemælk	Skummet Mælk	Byg	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
11.2	—	—	—	27.0	31.2	24.4	33.6	34.0	28.4	22.8
15.4	38.5	38.5	9.8	10.0	11.6	9.8	11.4	10.0	8.2	—
25.2	—	105.0	14.0	13.2	10.6	9.4	8.2	9.4	12.2	10.8
36.4	—	112.0	22.4	16.2	14.8	12.2	12.2	13.0	13.8	11.6
42.0	—	112.0	33.6	20.8	20.6	19.6	22.0	21.2	16.2	16.4
53.2	—	112.0	44.8	14.2	12.8	13.0	11.0	12.4	15.0	13.8
58.8	—	112.0	53.2	18.6	16.6	16.4	16.8	17.2	17.2	17.0
68.6	—	112.0	64.4	20.4	17.0	16.6	17.4	17.0	19.0	15.8
75.6	—	112.0	72.8	17.8	20.0	20.0	20.4	19.2	18.0	21.4
72.4	—	112.0	77.0	19.2	20.8	19.4	18.8	17.4	17.4	18.6
—	—	147.0	73.5	—	—	15.0	22.0	17.5	22.5	19.4
				—	—	—	—	—	—	18.4

Række 168

Tybrind.

1905.

		Periodernes Løbe Nr.	Foder til 1 Dyr											
			C ₁				C ₂				C ₃			
			Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Blandsæd	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Blandsæd	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Blandsæd
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt den 22. Juni.														
Fra 22. Juni til 5. Juli		1	21	58.8	—	26.6	21	42.0	—	21.0	21	25.2	—	15.4
— 6. Juli - 19. —		2	21	65.8	—	28.9	21	47.6	—	22.9	21	29.4	—	16.8
— 20. — - 2. Avg.		3	21	77.0	—	32.7	21	54.6	—	25.2	21	26.6	—	15.9
— 3. Avg. - 16. —		4	21	85.4	—	35.5	21	65.8	—	28.9	21	33.6	—	18.2
— 17. — - 30. —		5	14	36.1	72.1	43.1	21	77.0	—	32.7	21	39.2	—	20.2
— 31. — - 13. Sept.		6	14	41.8	83.7	48.8	14	35.5	71.1	42.5	21	49.0	—	23.3
— 14. Sept. - 27. —		7	14	48.1	96.3	55.1	14	41.8	83.7	48.8	21	53.2	—	24.7
— 28. — - 11. Okt.		8	14	53.4	106.7	60.4	14	47.1	94.1	54.1	14	23.1	46.9	30.5
— 12. Okt. - 25. —		9	14	58.6	117.2	65.7	14	52.3	104.7	59.3	14	25.6	51.1	32.5
— 26. — - 8. Nov.		10	14	64.9	129.8	72.0	14	58.0	116.2	65.2	14	29.7	59.5	36.8
— 9. Nov. - 22. —		11	14	65.9	132.0	73.0	14	62.3	124.6	69.3	14	35.0	70.0	42.0
— 23. — - 6. Dec.		12	—	—	—	—	14	61.7	123.6	68.8	14	36.5	73.2	43.6
— 7. Dec. - 20. —		13	—	—	—	—	14	62.3	124.6	69.3	14	41.3	82.6	48.3

Række 169
Sanderumgaard.

1905—06.

Række 169 Sanderungaard. 1905—06.		Periodernes Løbe Nr.	Foder til 1 Dyr															
			C ₁					C ₂					C ₃					
			Skummet Mælk	Valle	Roer	Korn	Blodfoder	Skummet Mælk	Valle	Roer	Korn	Blodfoder	Skummet Mælk	Valle	Roer	Korn	Blodfoder	
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
Begyndelsesvægt d. 1. Novbr.	..	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Fra 1. Nov. til 14. Nov.	1	68.0	—	56.7	14.2	4.7	50.4	—	42.0	10.5	3.5	55.4	—	46.2	11.6	3.8	...	
— 15. — - 28. —	2	78.1	—	65.1	16.3	5.4	60.5	—	50.4	12.6	4.2	65.5	—	54.6	13.6	4.6	...	
— 29. — - 12. Dec.	3	41.6	83.2	69.3	17.3	5.8	33.4	66.8	55.7	13.9	4.6	27.7	55.4	46.2	11.6	3.8	...	
— 13. Dec. - 26. —	4	70.9	47.3	78.8	19.7	6.6	59.5	39.7	66.1	16.5	5.5	43.5	29.0	48.3	12.1	4.0	...	
— 27. — - 9. Jan.	5	74.7	49.8	82.9	20.7	6.9	63.3	42.2	70.4	17.6	5.9	46.3	30.9	51.5	12.9	4.3	...	
— 10. Jan. - 23. —	6	83.2	55.4	92.4	23.1	7.7	72.8	48.5	80.8	20.2	6.7	56.7	37.8	63.0	15.7	5.3	...	
— 24. — - 6. Feb.	7	94.5	63.0	105.0	27.3	9.1	85.9	57.3	95.6	23.9	8.0	64.3	42.8	71.4	17.9	5.9	...	
— 7. Feb. - 20. —	8	126.0	—	105.0	31.5	10.5	126.0	—	105.0	26.3	8.8	115.9	—	96.6	24.1	8.1	...	
— 21. — - 6. Marts	9	126.0	—	105.0	34.1	11.4	126.0	—	105.0	35.2	11.7	126.0	—	105.0	27.8	9.1	...	
— 7. Marts - 20. —	10	126.0	—	105.0	41.3	13.8	126.0	—	105.0	43.0	14.3	126.0	—	105.0	31.5	10.2	...	
— 21. — - 3. April	11	—	—	—	—	—	126.0	—	105.0	40.4	13.5	126.0	—	105.0	31.0	10.1	...	
— 4. April - 17. —	12	—	—	—	—	—	126.0	—	105.0	38.9	13.0	126.0	—	105.0	30.5	10.1	...	
— 18. — - 1. Maj	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	—	105.0	30.4	10.2	...	
— 2. Maj - 15. —	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	—	105.0	30.5	10.1	...	

Kornet var de første 9 Perioder halvt Rug og halvt

i 14 Dage												Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage					
C ₄				C ₅				C ₆				C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Blandseed	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Blandseed	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	Blandseed	6 Dyr	6 Dyr	6—4 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	5—4 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	53.3	41.0	25.3	38.0	28.0	30.2
21	36.4	—	19.1	21	28.0	—	16.3	21	28.0	—	16.3	8.7	7.5	6.2	10.0	5.7	7.0
21	42.0	—	21.0	21	33.6	—	18.2	21	33.6	—	18.2	8.7	6.7	5.4	3.8	6.8	4.6
21	49.0	—	23.3	21	40.6	—	20.5	21	40.6	—	20.5	7.0	6.8	2.2	4.7	4.2	4.8
21	60.2	—	27.1	21	51.8	—	24.2	21	50.4	—	23.8	11.5	11.0	6.2	9.7	10.0	9.0
21	71.4	—	30.8	21	63.0	—	28.0	21	60.2	—	27.1	12.0	11.3	8.4	13.6	10.8	14.0
14	33.4	66.9	40.4	21	78.4	—	33.1	21	75.6	—	32.2	12.3	10.7	15.0	13.2	14.7	15.8
14	39.7	79.5	46.7	14	37.6	75.3	44.6	14	36.6	73.1	43.6	13.3	12.8	12.0	11.5	15.8	14.8
14	43.4	86.8	50.4	14	42.4	84.7	49.4	14	41.3	82.6	48.3	19.2	18.7	11.8	18.8	14.7	18.2
14	48.1	96.3	55.1	14	46.0	92.1	53.0	14	46.0	92.1	53.0	12.5	13.7	7.0	15.9	15.5	15.0
14	53.9	107.8	60.9	14	51.8	103.6	58.8	14	51.8	103.6	58.8	21.2	21.3	17.7	16.3	18.8	20.8
14	58.6	117.2	65.7	14	56.5	113.0	63.6	14	56.0	112.0	63.0	22.5	23.8	13.5	15.3	13.5	18.3
14	57.5	115.2	64.6	14	55.4	111.0	62.5	14	54.9	109.9	62.0	—	11.9	12.8	17.0	16.4	7.0
14	58.1	116.2	65.1	14	57.0	114.1	64.0	—	—	—	—	—	18.0	16.5	10.5	18.8	—

i 14 Dage															Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage					
C ₄					C ₅					C ₆					C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
Skummet Mælk	Valle	Roer	Korn	Blodfoder	Skummet Mælk	Valle	Roer	Korn	Blodfoder	Skummet Mælk	Valle	Roer	Korn	Blodfoder	6 Dyr	6—5 Dyr	6—5 Dyr	6 Dyr	6 Dyr	6—4 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.3	37.0	41.8	46.0	41.3	39.0
60.5	—	50.4	12.6	4.2	55.4	—	46.2	11.6	3.8	52.9	—	44.1	11.0	3.7	9.2	8.3	7.3	11.2	10.5	9.0
71.8	—	59.9	15.0	5.0	66.8	—	55.7	13.9	4.6	64.3	—	53.6	13.4	4.5	12.2	10.9	8.4	11.1	11.5	10.7
39.1	78.1	65.1	16.3	5.4	36.5	73.1	60.9	15.2	5.1	34.7	69.3	57.7	14.4	4.8	8.6	7.5	2.5	9.7	8.0	6.5
69.0	46.0	76.6	19.2	6.4	63.3	42.2	70.3	17.6	5.9	59.5	39.7	66.2	16.5	5.5	13.5	12.5	4.7	12.0	12.9	13.0
72.8	48.5	80.9	20.2	6.7	67.1	44.7	74.6	18.6	6.2	63.3	42.2	70.3	17.6	5.9	10.0	9.1	4.5	10.2	8.1	10.3
83.2	55.4	92.4	23.1	7.7	75.6	50.4	84.0	21.0	7.0	79.4	52.9	88.2	22.1	7.3	15.2	11.9	7.1	15.8	12.7	15.7
92.6	61.7	102.9	25.7	8.6	83.2	55.4	92.4	23.1	7.7	92.6	61.7	102.9	25.7	8.6	19.8	17.3	17.0	18.3	15.7	18.3
126.0	—	105.0	29.4	9.8	110.9	—	92.4	23.1	7.7	126.0	—	105.0	29.4	9.8	15.0	11.5	12.8	15.0	12.1	13.3
126.0	—	105.0	32.0	10.7	126.0	—	105.0	26.3	8.7	126.0	—	105.0	33.6	11.2	18.9	19.2	14.4	17.4	5.2	15.8
126.0	—	105.0	40.3	13.4	126.0	—	105.0	26.2	8.8	126.0	—	105.0	40.9	13.7	17.7	23.2	15.2	18.7	14.6	16.7
—	—	—	—	—	126.0	—	105.0	26.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.3	—	11.5
—	—	—	—	—	126.0	—	105.0	26.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	16.5	14.2	—	6.0
—	—	—	—	—	126.0	—	105.0	26.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	21.5	—
—	—	—	—	—	126.0	—	105.0	26.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	16.0	—

Hvede, den øvrige Tid halvt Rug og halvt Byg.

Række 170. Duelund. 1905—06.			Periodernes Løbe Nr.	Foder til 1 Dyr									
				Alle Hold Skummet Mælk Pd.	B ₁			B ₂			C ₁		
					Byg Pd.	Majs Pd.	Kokuskager Pd.	Byg Pd.	Majs Pd.	Kokuskager Pd.	Byg Pd.	Majs Pd.	Kokuskager Pd.
Begyndelsesvægt													
Fra 9. Decb. til 22. Decb.	1	70	12.6	—	4.2	6.3	—	2.1	8.4	—	2.8	—	
— 23. — - 5. Jan.	2	70	16.8	—	5.6	8.4	—	2.8	12.6	—	4.2	—	
— 6. Jan. - 19. —	3	70	16.8	—	5.6	8.4	—	2.8	14.7	—	4.9	—	
— 20. — - 2. Feb.	4	70	21.9	—	7.3	12.6	—	4.2	16.8	—	5.6	—	
— 3. Feb. - 16. —	5	70	27.3	—	9.1	18.9	—	6.3	27.3	—	9.1	—	
— 17. — - 2. Marts	6	70	15.8	15.7	10.5	12.6	12.6	8.4	15.8	15.7	10.5	—	
— 3. Marts - 16. —	7	70	18.9	18.9	12.6	14.7	14.7	9.8	18.9	18.9	12.6	—	
— 17. — - 30. —	8	70	18.9	18.9	12.6	14.7	14.7	9.8	18.9	18.9	12.6	—	
— 31. — - 13. April	9	70	22.0	22.1	14.7	17.9	17.8	11.9	22.0	22.1	14.7	—	
— 14. April - 27. —	10	70	—	—	—	18.9	18.9	12.6	23.1	23.1	15.4	—	
— 28. — - 11. Maj	11	70	—	—	—	18.9	18.9	12.6	23.1	23.1	15.4	—	

i 14 Dage									Tilvæxt for 1 Dyr i 14 Dage					
C ₂			C ₃			C ₄			B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
Byg	Majs	Kokuskager	Byg	Majs	Kokuskager	Byg	Majs	Kokuskager	5 Dyr	5 Dyr	5 Dyr	5—4 Dyr	5 Dyr	3 Dyr
Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
8.4	—	2.8	—	—	—	10.5	—	3.5	56.6	21.4	34.2	41.0	22.0	37.7
12.6	—	4.2	8.4	—	2.8	14.0	—	4.7	7.4	6.4	8.0	6.0	—	8.6
12.6	—	4.2	8.4	—	2.8	14.0	—	4.7	10.2	9.2	11.0	6.8	5.8	13.7
12.6	—	4.2	10.5	—	3.5	23.8	—	7.9	4.8	6.8	9.2	10.0	8.2	9.3
23.6	—	7.9	18.9	—	6.3	31.5	—	10.5	14.0	9.0	12.8	7.2	8.6	14.0
15.8	15.7	10.5	12.6	12.6	8.4	19.3	19.2	12.8	11.0	13.0	16.0	11.3	12.4	15.0
18.4	18.4	12.3	14.7	14.7	9.8	21.0	21.0	14.0	18.4	17.6	18.6	16.0	15.4	16.3
18.4	18.4	12.2	14.7	14.7	9.8	21.0	21.0	14.0	16.8	16.0	21.4	15.7	18.4	12.0
22.3	22.3	14.9	17.9	17.8	11.9	24.5	24.5	16.3	15.4	15.6	13.6	12.5	14.6	15.7
—	—	—	18.9	18.9	12.6	24.5	24.5	16.3	21.0	19.8	24.6	10.3	20.4	16.0
—	—	—	18.9	18.9	12.6	24.5	24.5	16.3	—	6.6	10.0	—	11.8	12.0
—	—	—	18.9	18.9	12.6	18.9	18.9	12.6	—	14.0	18.8	—	11.8	15.5

Forsøg	Hold	Antal Dyr	1 Dyrs Vægt					Affald					pCt. Svind	
			paa Gaarden	i Slagteriet				Hoved	Ben	Fedt	Ryg	andet	ved Slagtning	som Affald
				levende	slagtet									
					varm	kold	til-skaaren							
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.			
Række 138 Rosvang	A	6	174.2	166.7	133.5	131.5	—	—	—	—	—	—	21.1	—
	B ₁	5	172.6	165.8	132.6	130.4	—	—	—	—	—	—	21.4	—
	B ₂	6	170.8	163.7	128.8	126.8	—	—	—	—	—	—	22.5	—
	C	6	177.7	172.3	132.7	130.3	—	—	—	—	—	—	24.4	—
	D	6	170.7	164.7	130.5	128.5	—	—	—	—	—	—	22.0	—
Række 139 Rosenfeldt	A	5	176.2	171.8	132.0	127.6	—	—	—	—	—	—	25.7	—
	B	4	178.5	175.0	135.5	131.5	—	—	—	—	—	—	24.9	—
	C	5	183.0	179.8	140.2	136.4	—	—	—	—	—	—	24.1	—
	D	5	180.6	175.4	135.2	130.6	—	—	—	—	—	—	25.5	—
Række 140 Tybrind	A	6	176.0	169.7	128.2	125.2	—	—	—	—	—	—	26.2	—
	B ₁	5	168.8	164.8	124.0	120.4	—	—	—	—	—	—	26.9	—
	B ₂	6	175.8	172.3	130.5	127.0	—	—	—	—	—	—	26.3	—
	C	5	190.2	177.6	137.0	133.2	—	—	—	—	—	—	25.0	—
	D	6	172.8	166.5	126.3	122.8	—	—	—	—	—	—	26.2	—
Række 141 Karshøj	A	4	175.8	169.0	133.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	B ₁	4	168.5	162.0	123.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	B ₂	3	180.7	175.3	136.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C ₁	5	178.8	(172.3)	135.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C ₂	5	180.2	173.4	131.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C ₃	4	185.0	179.8	136.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Række 142 Tybrind	A	6	188.3	179.7	138.5	134.7	—	—	—	—	—	—	25.0	—
	B	6	183.0	172.0	135.8	131.8	—	—	—	—	—	—	23.4	—
	C ₁	5	172.6	166.0	130.8	127.4	—	—	—	—	—	—	23.3	—
	C ₂	4	193.0	183.3	144.8	140.8	—	—	—	—	—	—	23.2	—
	C ₃	6	187.0	177.3	137.2	132.8	—	—	—	—	—	—	25.1	—
	C ₄	6	180.7	172.5	134.3	130.7	—	—	—	—	—	—	24.2	—
Række 143 Rosvang	A	5	171.0	158.8	127.2	124.2	—	—	—	—	—	—	21.8	—
	B ₁	6	168.2	155.2	125.2	122.5	—	—	—	—	—	—	21.1	—
	B ₂	6	174.5	164.0	132.8	130.2	—	—	—	—	—	—	20.6	—
	C ₁	5	177.0	163.0	132.6	129.6	—	—	—	—	—	—	20.5	—
	C ₂	6	175.2	162.5	130.5	127.7	—	—	—	—	—	—	21.4	—
Række 144 Constantins- borg	A	4	169.2	167.8	129.2	127.5	—	—	—	—	—	—	24.0	—
	B ₁	5	173.8	170.0	129.8	128.0	—	—	—	—	—	—	24.7	—
	B ₂	5	178.0	174.0	133.0	131.4	—	—	—	—	—	—	24.5	—
	C	5	164.4	160.8	124.2	122.0	—	—	—	—	—	—	24.1	—

pCt. Exportflæsk	Tal for Fasthed	Flæskest Tykkelse						Kroppens Længde fra Hofsteskaal til				Points for							
		foran Bov	over				Bugflæskest	Snittet ved Halsen	forreste Ribben	bageste Ribben	Bovpartiets Bygning	Ryg-flæskest		Bugpartiets Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Finhed	Total-indtryk		
			Bov	Ryg	Lænd	Kryds						Tykkelse	Fordeling				med Hoved	uden Hoved	
								Tm.	Tm.	Tm.	Tm.								Tm.
—	15.0	1.2	1.9	1.2	1.3	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	14.2	1.3	1.9	1.2	1.1	—	—	33.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10.2	1.1	1.8	1.1	1.1	—	—	34.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	9.8	1.1	1.4	0.8	0.7	—	—	36.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	11.0	1.3	1.9	1.2	1.1	—	—	34.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	11.4	1.1	1.9	1.0	1.1	—	—	33.5	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10.6	1.4	2.0	1.1	1.3	—	—	34.9	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10.2	1.2	1.8	1.2	1.4	—	—	35.5	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	14.2	1.2	2.1	1.3	1.5	—	—	34.1	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	13.4	1.4	2.1	1.1	1.3	1.4	—	34.3	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	13.0	1.3	1.7	1.0	1.2	1.2	—	34.3	27.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	14.0	1.3	1.7	1.1	1.3	1.3	—	35.2	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	13.4	1.6	2.1	1.2	1.4	1.5	—	35.4	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	14.6	1.3	2.0	1.2	1.4	1.3	—	34.2	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	13.0	1.3	2.1	1.1	1.2	—	—	34.1	26.4	—	—	—	—	12.8	14.3	—	—	—	
—	15.0	1.3	2.1	1.2	1.5	—	—	34.5	27.0	—	—	—	—	10.5	9.8	—	—	—	
—	15.0	1.4	2.2	1.1	1.4	—	—	35.8	27.5	—	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	
—	15.0	1.2	1.9	1.1	1.3	—	—	35.7	27.5	—	—	—	—	8.4	10.2	—	—	—	
—	14.6	1.1	1.9	1.0	1.2	—	—	35.9	27.5	—	—	—	—	7.8	9.6	—	—	—	
—	13.8	1.2	1.9	1.1	1.3	—	—	36.6	28.4	—	—	—	—	6.8	7.5	—	—	—	
—	13.8	1.4	2.0	1.1	1.4	1.4	—	36.6	29.4	—	—	10.7	10.7	11.7	11.0	—	—	—	
—	13.4	1.4	2.1	1.4	1.5	1.4	—	35.3	28.4	—	—	10.2	11.0	12.2	11.5	—	—	—	
—	14.6	1.5	2.2	1.3	1.5	1.6	—	34.4	28.0	—	—	8.2	9.8	10.4	10.6	—	—	—	
—	14.6	1.4	1.9	1.2	1.3	1.4	—	36.5	29.9	—	—	11.3	10.5	11.3	10.2	—	—	—	
—	15.0	1.3	1.7	1.1	1.2	1.2	—	36.6	29.8	—	—	13.0	9.7	11.2	11.4	—	—	—	
—	14.0	1.3	1.7	1.2	1.3	1.4	—	36.5	30.6	—	—	11.8	11.0	11.8	11.0	—	—	—	
—	13.4	1.1	1.7	1.0	1.1	—	—	34.9	27.9	—	—	—	—	11.6	11.0	—	—	—	
—	13.0	1.2	1.8	1.2	1.2	—	—	35.1	28.0	—	—	—	—	11.2	11.0	—	—	—	
—	14.2	1.4	2.0	1.3	1.3	—	—	34.7	28.2	—	—	—	—	10.8	11.0	—	—	—	
—	14.2	1.1	1.7	1.0	1.0	—	—	36.3	28.6	—	—	—	—	9.2	9.4	—	—	—	
—	12.6	0.9	1.4	0.8	0.8	—	—	35.6	28.9	—	—	—	—	7.0	6.7	—	—	—	
—	14.0	1.3	1.8	1.2	1.5	—	—	34.5	27.6	—	—	—	—	11.5	11.5	—	—	—	
—	12.6	1.4	1.9	1.3	1.6	—	—	34.4	27.3	—	—	—	—	10.8	10.6	—	—	—	
—	11.8	1.5	2.0	1.3	1.7	—	—	34.2	27.2	—	—	—	—	12.0	11.8	—	—	—	
—	8.6	1.3	1.6	1.1	1.2	—	—	34.7	27.7	—	—	—	—	10.0	9.6	—	—	—	

Forsøg	Hold	Antal Dyr	1 Dyr's Vægt					Affald					pCt. Svind	
			paa Gaarden	i Slagteriet				Hoved	Ben	Fedt	Ryg	andet	ved Slagtning	som Affald
				levende	slagtet									
					varm	kold	til-skaaren							
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.		
Række 145 Rosvang	A	5	177.0	—	137.4	134.2	109.3	9.8	3.5	2.6	—	—	—	—
	B ₁	6	186.2	—	145.3	141.1	115.0	10.6	3.4	2.8	—	—	—	—
	B ₂	6	185.7	—	146.2	142.2	116.0	10.1	3.9	3.7	—	—	—	—
	B ₃	6	168.7	—	131.4	128.7	105.8	9.1	3.0	3.8	—	—	—	—
	C ₁	5	174.8	—	137.7	133.5	106.9	10.3	3.7	2.8	—	—	—	—
	C ₂	3	170.7	—	131.8	128.8	103.5	10.0	3.7	3.3	—	—	—	—
	C ₃	6	175.8	—	134.8	132.1	106.1	10.4	4.3	2.7	—	—	—	—
Række 146 Constantins- borg	A	5	—	158.2	127.2	124.8	102.6	9.4	3.2	2.5	1.8	5.3	21.1	14.0
	B ₁	5	—	—	142.8	138.6	113.1	10.0	3.5	3.9	—	—	—	—
	C ₁	4	—	173.8	135.0	132.0	105.3	9.5	3.5	4.2	2.0	7.5	24.0	15.4
	C ₂	4	—	—	134.1	129.9	104.5	9.4	3.6	3.6	—	—	—	—
	C ₃	4	—	—	137.0	133.0	106.6	10.4	3.3	4.0	—	—	—	—
Række 147 Bregentved	A	5	—	158.2	130.0	127.4	104.2	9.5	3.6	2.0	2.1	6.0	19.5	14.6
	B ₁	5	—	168.4	139.2	136.0	110.4	10.2	3.7	3.5	2.0	6.2	19.2	15.2
	B ₂	5	—	177.6	140.4	137.0	—	10.0	3.3	—	—	—	22.9	—
	B ₃	4	185.5	170.2	142.2	139.0	114.0	9.0	3.3	3.7	2.1	6.9	18.3	14.7
	C ₁	5	—	158.8	128.2	125.0	98.8	10.4	3.6	3.2	2.1	6.9	21.3	16.5
	C ₂	5	—	165.8	131.8	129.2	—	9.2	3.7	—	—	—	22.1	—
	D	5	—	162.8	130.6	127.6	102.6	10.1	3.7	3.5	2.2	5.5	21.6	15.4
Række 148 Tybrind	A	6	—	171.7	137.7	134.8	109.3	9.6	3.6	3.6	2.2	6.5	21.5	14.8
	B	6	—	163.0	131.2	128.5	104.8	9.2	3.4	3.4	2.0	5.7	21.2	14.5
	C ₁	6	—	167.0	131.2	128.2	103.0	10.4	3.7	2.9	2.2	6.0	23.2	15.1
	C ₂	6	—	170.2	136.5	133.5	106.7	10.5	3.7	3.4	2.4	6.8	21.6	15.7
	C ₃	6	—	172.5	137.0	133.7	107.5	10.6	3.6	3.8	2.0	6.2	22.5	15.2
	C ₄	6	—	163.7	127.2	124.8	99.2	10.3	4.0	2.8	1.9	6.6	23.8	15.6
	C ₅	6	—	156.7	124.0	120.7	96.5	10.0	3.9	2.5	1.9	5.9	23.0	15.4
Række 149 Duelund	A	4	182.3	165.2	135.2	132.0	108.5	9.2	3.2	3.3	2.0	5.8	20.1	14.2
	B ₁	5	186.2	170.4	136.8	133.8	109.4	9.4	3.4	3.0	2.1	6.5	21.5	14.3
	B ₂	6	184.7	165.2	132.2	129.8	104.3	9.5	3.6	3.0	2.3	7.1	21.4	15.5
	C ₁	4	196.5	168.5	136.2	132.2	108.0	10.0	3.9	3.0	2.2	5.1	21.5	14.4
	C ₂	6	193.8	165.7	133.2	130.3	106.7	9.3	3.7	3.3	2.2	5.1	21.4	14.2
	C ₃	6	177.8	163.3	128.5	124.0	101.9	9.5	3.5	3.2	2.0	3.9	24.1	13.5

pCt. Exportflask	Tal for Fasthed	Flæskestes Tykkelse						Kroppens Længde fra Hofteskaal til				Points for						
		foran Bov	over				Bugflæskest	Snittet ved Halsen	forreste Ribben	bageste Ribben	Bovpartiets Bygning	Rygflæskestes		Bagpartiets Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Finhed	Totalindtryk	
			Bov	Byg	Lænd	Kryds						Tykkelse	Fordeling				med Hoved	uden Hoved
Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.								
—	13.2	1.2	2.1	1.4	1.3	1.5	1.5	32.4	25.9	11.1	11.8	12.4		12.4	12.9	12.8	12.4	—
—	13.2	1.1	1.9	1.4	1.1	1.4	1.5	34.5	27.9	12.2	12.5	12.8		12.5	12.3	13.0	13.2	—
—	12.3	1.1	2.1	1.5	1.2	1.5	1.5	35.2	27.9	10.9	11.2	11.2		11.8	12.3	11.2	12.2	—
—	13.5	1.2	2.3	1.6	1.3	1.5	1.5	32.6	25.5	10.7	11.7	11.0		12.4	13.3	14.0	12.3	—
—	10.6	1.1	1.9	1.3	1.1	1.4	1.4	34.6	27.6	11.4	11.6	12.6		10.2	10.2	10.0	11.2	—
—	11.3	1.1	1.8	1.3	1.1	1.3	1.3	32.6	26.5	11.0	12.3	11.7		11.0	11.0	11.2	11.8	—
—	8.7	1.2	1.7	1.1	0.9	1.1	1.3	33.9	27.2	10.7	11.7	9.8		10.5	10.8	10.4	10.1	—
64.9	13.6	1.4	2.1	1.6	1.3	1.5	1.5	31.9	25.5	10.0	12.3	12.3		13.0	12.2	12.8	12.1	—
—	13.2	1.1	2.3	1.5	1.3	1.5	1.6	35.0	27.8	11.9	11.4	11.0		12.2	11.4	12.0	11.4	—
60.6	12.5	1.4	2.1	1.6	1.2	1.5	1.3	34.1	25.9	10.6	11.5	11.1		10.8	10.5	11.1	11.3	—
—	11.5	1.1	1.9	1.2	1.0	1.4	1.4	34.5	27.2	11.0	11.0	10.5		11.0	10.8	11.0	10.5	—
—	13.2	1.2	2.0	1.4	1.2	1.4	1.5	35.5	28.8	11.3	11.8	10.8		11.8	9.8	11.3	10.0	—
65.9	9.4	1.3	1.8	1.2	1.1	1.2	1.5	33.6	26.8	10.6	11.2	11.0		12.1	12.2	11.9	11.3	—
65.6	11.2	1.5	2.1	1.3	1.4	1.5	1.6	34.2	27.2	11.1	11.8	12.5		11.9	11.8	12.1	12.0	—
—	13.8	1.4	2.4	1.5	1.4	1.6	1.6	33.9	26.9	11.0	10.0	10.8		12.3	12.3	13.3	11.5	—
67.0	13.2	1.4	2.3	1.3	1.4	1.3	1.8	34.4	27.2	11.0	11.5	11.9		12.8	12.5	12.4	12.3	—
62.2	9.8	1.3	2.0	1.4	1.2	1.4	1.4	34.4	27.6	11.0	11.2	10.8		10.6	10.0	10.7	10.3	—
—	11.6	1.4	2.0	1.3	1.2	1.3	1.6	34.4	27.6	11.1	11.9	12.3		12.3	11.5	12.3	12.6	—
63.0	12.4	1.4	1.9	1.3	1.1	1.3	1.6	34.4	27.6	10.5	10.8	10.7		11.4	10.2	11.0	10.5	—
63.7	14.0	1.3	2.1	1.4	1.1	1.3	1.3	34.9	28.1	10.6	10.9	10.2		10.9	10.1	10.8	10.4	—
64.3	14.3	1.2	2.0	1.5	1.2	1.3	1.4	33.8	27.1	10.8	12.0	12.3		11.8	11.8	12.3	12.0	—
61.7	12.0	1.2	2.1	1.4	1.1	1.3	1.2	34.7	27.6	10.9	11.8	11.5		10.3	10.6	11.5	10.9	—
62.7	13.0	1.2	2.0	1.5	1.2	1.4	1.3	34.5	27.8	10.5	11.7	11.5		11.4	11.0	11.1	11.2	—
62.3	13.5	1.2	1.9	1.4	1.2	1.4	1.3	34.8	27.8	10.4	11.5	12.3		11.0	11.0	10.9	11.4	—
60.6	12.5	1.2	1.8	1.3	1.1	1.3	1.3	33.5	26.8	10.7	12.3	11.4		11.3	10.5	11.7	11.3	—
61.6	13.7	1.5	2.1	1.2	1.4	1.5	1.3	34.2	27.3	10.8	11.4	11.8		10.7	10.7	11.2	11.1	—
65.7	14.5	1.3	2.1	1.5	1.2	1.3	1.4	33.2	26.5	10.6	11.4	12.1		11.1	13.6	13.6	12.3	—
64.2	14.2	1.4	2.0	1.3	1.1	1.4	1.4	35.0	28.0	10.8	12.2	13.0		12.5	12.0	12.6	12.7	—
63.1	12.8	1.3	1.9	1.3	1.1	1.3	1.2	34.2	27.6	10.4	12.1	12.2		11.2	12.5	12.3	11.7	—
64.1	12.5	1.3	1.8	1.1	1.0	1.1	1.3	33.8	27.1	9.9	11.9	11.3		11.6	11.4	11.5	11.8	—
64.4	11.3	1.3	2.1	1.5	1.1	1.4	1.3	33.2	26.5	9.9	11.6	11.2		11.6	11.4	11.5	11.3	—
62.4	13.3	1.5	2.0	1.4	1.2	1.4	1.3	33.7	27.2	10.3	11.7	11.6		10.8	11.3	10.7	10.9	—

Forsøg	Hold	Antal Dyr	1 Dyrs Vægt					Affald					pCt. Svind	
			paa Gaarden	i Slagteriet				Hoved	Ben	Fedt	Ryg	andet	ved Slagning	som Affald
				levende	slagtet									
					varm	kold	til-skaaren							
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.		
Række 150 Rosvang	A	6	190.3	174.2	141.3	137.5	114.0	9.3	3.7	3.6	1.9	5.0	21.1	13.5
	B ₁	6	191.2	174.7	141.5	137.7	111.8	10.6	3.9	3.4	2.3	5.7	21.2	14.8
	B ₂	6	180.2	163.8	134.8	130.8	109.2	8.3	3.6	3.2	1.9	4.6	20.1	13.2
	C ₁	5	186.0	169.8	137.4	133.6	111.0	8.6	3.8	3.4	2.0	4.8	21.3	13.3
	C ₂	6	175.2	158.0	128.3	124.8	103.0	8.8	3.5	2.8	1.9	4.8	21.0	13.8
	C ₃	5	201.0	184.0	146.0	142.0	114.6	10.8	4.2	4.3	2.3	5.8	22.8	14.9
Række 151 Tybrind	A	5	—	170.0	140.2	137.4	114.2	10.3	3.2	2.8	2.0	4.9	19.2	13.6
	B ₁	6	—	177.0	144.2	141.0	115.5	10.7	3.4	3.7	2.0	5.7	20.3	14.4
	B ₂	6	—	180.2	145.3	142.2	116.3	11.4	3.8	3.2	2.3	5.2	21.1	14.4
	B ₃	5	—	161.6	127.8	125.0	101.8	10.7	3.7	2.8	1.9	4.1	22.6	14.4
	C ₁	6	—	170.7	135.2	132.0	106.0	11.2	3.5	4.3	2.1	4.9	22.7	15.2
	C ₂	6	194.2	179.0	141.0	137.3	111.0	11.4	3.9	3.3	2.1	5.6	23.3	14.7
	C ₃	6	188.3	174.7	137.5	134.2	109.3	11.2	3.8	3.7	1.9	4.3	23.2	14.2
Række 152 Duelund	A	4	—	178.0	147.0	144.2	120.0	9.6	3.0	4.2	2.1	5.3	19.0	13.6
	B ₁	6	—	170.0	136.0	132.8	109.5	9.2	3.3	3.8	1.9	5.1	21.9	13.7
	B ₂	6	—	167.5	134.7	131.2	107.7	10.0	3.6	3.2	2.0	4.7	21.7	14.0
	C ₁	6	—	165.2	129.8	127.8	103.2	11.0	3.6	3.3	2.1	4.6	22.6	14.9
	C ₂	5	186.8	—	137.0	133.4	109.2	9.3	3.8	3.9	2.2	5.0	—	—
	C ₃	5	200.8	—	147.6	144.6	117.0	11.0	3.8	4.6	2.3	5.9	—	—
Række 153 Alslevgaard	A	5	—	160.6	131.4	128.2	107.0	9.1	2.8	3.9	1.9	3.5	20.2	13.2
	B ₁	5	—	169.0	135.8	132.0	109.4	9.4	3.4	4.3	1.8	3.7	21.9	13.4
	B ₂	5	—	162.4	129.8	127.2	105.8	9.0	3.1	4.0	1.8	3.5	21.7	13.2
	C ₁	5	—	178.0	142.2	139.0	113.2	11.0	3.7	4.8	2.0	4.3	21.9	14.5
	C ₂	5	—	174.6	139.6	136.4	111.4	10.4	3.4	4.7	2.1	4.4	21.9	14.3
Række 154 Constantins- borg	B ₁	4	181.8	165.8	135.0	131.8	108.3	10.8	3.9	3.1	2.1	3.6	20.5	14.2
	B ₂	6	172.2	—	129.3	126.0	104.2	9.7	2.7	3.4	1.8	4.2	—	—
	C ₁	4	198.5	184.5	149.8	146.3	118.3	11.4	4.0	5.9	2.2	4.5	20.7	15.2
	C ₂	3	179.0	157.3	128.0	125.0	101.3	10.7	3.5	3.3	3.1	3.1	20.5	15.1
	C ₃	6	187.3	—	140.0	136.8	114.0	10.3	3.6	3.9	2.1	2.9	—	—
Række 155 Rosenfeldt	A	4	192.0	178.0	148.3	145.5	119.8	11.9	4.1	3.2	2.4	4.1	18.3	14.4
	B ₁	5	177.2	165.0	134.4	131.4	107.4	10.5	3.5	3.5	2.1	4.4	20.4	14.5
	B ₂	4	167.8	155.2	126.0	122.5	99.2	10.2	g.6	3.1	2.4	4.0	21.1	15.0
	B ₃	5	172.8	157.0	126.2	123.8	100.6	10.0	3.6	3.7	2.4	3.5	21.1	14.8
	C ₁	3	188.0	169.3	138.0	135.3	110.0	10.5	3.5	4.6	2.3	4.4	20.1	14.9
	C ₂	5	192.4	177.2	144.2	141.6	114.4	11.6	4.0	4.3	2.5	4.8	20.1	15.3
	C ₃	4	176.3	160.8	127.8	124.8	102.5	10.9	3.8	2.7	2.2	2.7	22.4	13.9

pCt. Exportflæsk	Tal for Fasthed	Flæskestes Tykkelse						Kroppens Længde fra Hofteskaal til				Points for						
		foran Bov	over				Bugflæskestet	Snittet ved Halsen	forreste Ribben	bageste Ribben	Bovpartiets Bygning	Rygflæskestes		Bugpartiets Form og Fyde	Skinkens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Finhed	Total-indtryk	
			Bov	Ryg	Lænd	Kryds						Tykkelse	Fordeling				med Hoved	uden Hoved
65.4	13.3	1.4	2.5	1.8	1.3	1.6	1.4	34.7	27.8	11.2	11.3	11.3	10.8	10.7	12.3	12.0	—	—
64.0	11.3	1.2	2.2	1.4	1.2	1.4	1.3	35.8	29.2	11.4	11.1	11.4	12.2	9.7	11.1	10.1	—	—
66.7	14.0	1.2	2.1	1.6	1.3	1.5	1.6	34.4	27.5	10.9	11.6	12.2	12.7	12.0	12.2	12.2	—	—
65.4	8.6	1.3	2.1	1.5	1.4	1.5	1.5	33.1	26.6	10.0	11.3	12.1	12.7	11.7	10.6	11.3	—	—
65.2	11.7	1.3	2.1	1.4	1.1	1.2	1.5	34.3	27.4	10.1	11.2	10.9	11.7	11.9	10.4	11.3	—	—
62.3	12.4	1.2	2.1	1.4	1.1	1.3	1.4	36.6	29.2	11.2	10.1	11.1	12.1	10.9	8.8	9.2	—	—
67.2	13.6	1.3	2.0	1.3	1.0	1.3	1.4	34.0	27.2	10.8	11.5	12.3	11.0	12.2	12.5	13.3	—	—
65.3	13.2	1.4	2.1	1.6	1.2	1.4	1.4	35.0	28.1	10.6	11.3	12.7	13.3	11.7	12.0	12.8	—	—
64.5	13.0	1.2	1.9	1.4	1.1	1.2	1.3	35.0	27.6	11.6	12.9	10.6	12.1	10.5	11.5	10.3	—	—
63.0	11.4	1.4	2.0	1.3	1.0	1.1	1.0	33.8	27.1	10.9	11.1	11.7	11.5	8.3	9.1	11.1	—	—
62.1	13.5	1.4	2.1	1.4	1.1	1.4	1.2	34.1	27.4	10.4	11.0	11.1	11.2	10.9	10.9	11.4	—	—
62.0	12.5	1.2	2.0	1.0	1.2	1.1	1.3	35.3	28.2	11.8	11.1	12.0	11.7	10.6	10.4	11.2	—	—
62.6	13.0	1.3	1.9	1.3	1.5	1.4	1.3	34.5	27.6	11.2	11.2	12.3	12.2	10.0	10.9	11.1	—	—
67.4	12.0	1.3	2.1	1.7	1.4	1.5	1.4	33.8	26.9	11.2	11.4	11.1	13.0	12.1	12.3	12.8	—	—
64.4	14.7	1.3	2.0	1.5	1.2	1.4	1.3	34.4	27.7	10.7	11.3	12.2	11.9	11.5	10.7	12.0	—	—
64.3	12.8	1.3	2.1	1.3	1.1	1.4	1.2	34.0	27.0	10.7	11.6	12.5	12.1	10.7	10.8	10.8	—	—
62.5	9.0	1.4	1.9	1.2	1.2	1.3	1.3	33.4	26.5	10.6	10.3	11.4	11.8	9.4	10.4	8.6	—	—
—	8.6	1.2	1.9	1.6	1.2	1.3	1.5	34.6	28.0	10.9	11.7	12.3	12.9	11.4	9.2	10.9	—	—
—	9.8	1.1	1.9	1.2	1.0	1.2	1.3	35.3	28.2	10.5	10.6	11.7	12.2	10.3	10.5	10.9	—	—
66.6	13.4	1.3	2.1	1.6	1.1	1.3	1.5	33.6	26.9	10.4	11.3	11.7	11.7	13.1	12.5	12.7	—	—
64.7	12.2	1.2	1.9	1.5	1.2	1.4	1.6	34.2	27.1	10.4	11.7	11.8	11.4	12.9	9.7	12.7	—	—
65.1	12.4	1.3	2.1	1.6	1.3	1.5	1.4	34.3	27.5	10.7	11.9	11.7	12.8	12.1	11.1	12.4	—	—
63.6	11.6	1.4	2.1	1.3	1.3	1.3	1.3	35.4	28.2	11.2	10.9	11.7	11.2	10.2	9.9	11.5	—	—
63.8	11.0	1.3	2.1	1.4	1.5	1.6	1.4	35.0	26.5	11.0	10.7	10.9	11.9	12.1	9.1	11.6	—	—
65.3	8.8	1.4	2.2	1.4	1.2	1.4	1.2	33.9	27.2	11.1	10.8	12.0	11.7	10.8	9.6	9.6	—	—
—	12.5	1.4	2.1	1.5	1.1	1.3	1.3	36.2	26.3	10.8	12.1	12.4	12.5	12.0	12.7	12.8	—	—
64.1	12.8	1.4	2.2	1.6	1.3	1.5	1.2	34.5	27.6	11.0	10.9	11.7	12.1	10.3	10.3	10.5	—	—
64.4	12.7	1.4	2.2	1.5	1.2	1.6	1.2	33.8	27.4	10.6	11.4	12.8	12.9	11.1	11.0	11.2	—	—
—	12.3	1.6	2.4	1.8	1.4	1.7	1.2	34.5	27.8	10.6	10.9	10.7	11.2	11.3	10.1	11.0	—	—
67.3	13.5	1.3	2.1	1.2	1.1	1.3	1.2	34.7	27.9	11.1	10.4	11.9	12.0	11.7	12.1	10.8	—	—
65.1	12.2	1.3	1.9	1.5	1.2	1.5	1.1	34.1	27.6	11.0	11.1	11.9	12.5	9.5	11.1	11.2	—	—
63.9	11.0	1.2	2.0	1.3	1.0	1.3	1.2	33.3	26.8	10.6	11.4	10.8	11.3	10.5	12.5	11.8	—	—
64.1	11.8	1.2	1.9	1.2	1.0	1.1	1.1	34.0	27.0	10.6	10.7	9.7	12.0	11.6	11.3	11.2	—	—
65.0	13.3	1.5	2.3	1.6	1.3	1.5	1.2	34.0	27.5	10.8	10.7	12.2	11.9	11.5	10.8	11.7	—	—
64.6	11.6	1.2	2.2	1.3	1.1	1.4	1.2	35.0	28.2	11.2	10.0	11.0	11.1	11.2	8.9	10.3	—	—
63.7	12.0	1.3	2.1	1.3	1.0	1.3	1.1	34.8	27.5	10.7	10.9	9.8	11.1	9.3	10.8	10.2	—	—

Forsøg	Hold	Antal Dyr	1 Dyr's Vægt					Affald					pCt. Svind	
			paa Gaarden	i Slagteriet				Hoved	Ben	Fedt	Ryg	andet	ved Slagtning	som Affald
				levende	slagtet									
					varm	kold	til-skaaren							
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.		
Række 156 Duelund	B ₁	6	—	166.5	133.0	129.8	105.0	10.2	3.7	4.6	2.1	4.7	22.0	14.9
	B ₂	6	180.8	164.8	129.3	126.2	101.8	10.3	3.7	3.0	2.2	5.2	23.4	14.8
	C ₁	2	175.0	159.0	122.0	119.5	96.5	10.0	4.1	2.4	2.2	4.3	24.8	14.5
	C ₂	4	—	162.0	125.0	121.8	96.0	11.0	4.0	2.7	2.4	5.7	24.8	15.9
	C ₃	4	—	167.8	133.0	130.0	104.3	10.1	3.5	4.7	2.2	5.2	22.5	15.3
	C ₄	4	169.2	161.8	123.8	120.5	97.5	9.6	3.5	3.7	2.2	4.0	25.5	14.2
Række 157 Tybrind	A ₁	6	178.5	165.5	136.3	133.3	108.0	10.3	3.3	3.1	2.3	6.3	19.4	15.3
	A ₂	6	186.2	173.8	140.1	137.0	109.7	12.2	4.6	2.4	2.8	5.3	21.2	15.7
	B ₁	6	196.5	182.2	148.0	144.5	116.5	11.1	3.6	4.8	2.4	6.1	20.7	15.4
	B ₂	6	191.0	179.7	143.8	140.2	112.5	11.5	3.9	3.3	2.4	6.6	22.0	15.4
	C ₁	3	181.3	169.7	132.3	129.3	102.7	10.2	3.7	4.1	2.3	6.3	23.8	5.71
	C ₂	6	187.5	174.7	136.8	133.3	105.5	11.9	4.0	3.2	2.5	6.2	23.7	15.9
	C ₃	5	187.8	175.8	138.2	134.8	107.2	11.9	3.9	4.2	2.2	5.4	23.3	15.7
	C ₄	6	192.2	178.5	139.3	136.7	108.3	11.2	4.0	3.7	2.3	7.2	23.4	15.9
Række 158 Rosvang	A	4	179.0	167.0	135.8	132.5	110.0	10.1	2.9	3.1	2.0	4.4	20.6	13.5
	B ₁	4	187.3	172.3	140.8	136.5	112.3	10.4	3.3	3.7	2.2	4.6	20.8	14.0
	B ₂	6	181.7	170.0	138.0	134.2	109.8	10.3	3.6	3.3	2.2	5.0	21.1	14.3
	C ₁	5	191.2	177.8	143.8	140.4	115.2	11.0	3.8	3.7	2.3	4.4	21.0	14.2
	C ₂	6	180.8	168.5	135.8	132.0	105.7	10.8	4.2	3.1	2.3	5.9	21.7	15.6
	C ₃	6	196.0	183.2	147.2	143.7	116.8	11.8	4.1	3.2	2.6	5.2	21.6	14.7
Række 159 Rosenfeldt	A	4	179.3	165.8	137.0	133.5	110.0	9.4	2.9	3.7	2.1	5.4	19.5	14.2
	B ₁	5	192.8	175.2	144.8	141.2	116.4	10.2	3.5	3.5	2.1	5.5	19.4	14.2
	B ₂	5	183.8	168.0	137.6	133.8	108.8	10.3	3.4	3.3	2.2	5.8	20.3	14.9
	C ₁	6	193.7	178.8	145.2	141.8	114.2	12.1	4.0	3.6	2.5	5.4	20.7	15.4
	C ₂	5	193.8	180.8	144.4	141.2	114.2	11.0	3.9	4.0	2.2	5.9	21.9	14.9
	C ₃	5	189.8	173.4	137.8	134.2	108.2	11.3	3.6	3.1	2.2	5.8	22.6	15.0
	C ₄	3	175.0	165.0	128.7	125.0	99.3	10.0	3.5	4.1	2.2	5.9	24.2	15.6
Række 160 Rosvang	C ₁	5	194.6	180.4	136.8	133.0	111.2	11.1	3.2	3.0	2.1	2.4	26.3	12.1
	C ₂	4	187.0	171.5	131.3	127.8	108.5	10.1	2.9	3.2	1.8	1.3	25.5	11.2
	C ₃	4	194.3	179.5	140.0	136.5	115.0	11.1	3.5	3.8	1.9	1.2	23.9	12.0
	C ₄	5	182.8	171.6	132.0	128.4	106.8	11.2	3.4	3.1	2.0	1.9	25.2	12.6
	C ₅	5	199.0	185.4	142.6	139.0	117.0	10.9	3.5	3.8	2.2	1.6	25.0	11.9
	C ₆	5	185.2	174.4	131.6	128.0	106.6	10.5	3.5	3.2	2.0	2.2	26.6	12.3
	C ₇	3	173.7	164.0	125.3	121.3	101.7	10.3	3.6	2.7	2.2	0.8	26.0	12.0

pCt. Exportflæsk	Tal for Fasthed	Flæskestes Tykkelse						Kroppens Længde fra Hofteskaal til			Points for							
		foran Bov	over				Bugflæskest	Snittet ved Halsen	forreste Ribben	bageste Ribben	Bovpartiets Bygning	Ryg-flæskestes		Bugpartiets Form og Fylde	Skinkestes Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sverens Finhed	Total-indtryk	
			Bov	Ryg	Lænd	Kryds						Tykkelse	Fordeling				med Hoved	uden Hoved
63.1	12.5	1.3	2.1	1.7	1.3	1.3	1.2	33.6	26.5	10.3	11.1	11.2	11.5	10.8	11.3	12.3	12.0	11.4
61.8	11.7	1.2	1.9	1.3	1.1	1.2	1.1	33.8	27.0	10.9	10.7	11.1	11.6	10.0	10.8	11.3	10.4	10.0
60.7	9.0	1.2	1.9	1.3	1.1	1.2	1.0	33.0	26.0	10.0	9.8	9.2	11.3	9.3	8.0	8.5	7.3	8.2
59.3	9.3	1.3	1.9	1.1	0.9	1.0	1.0	33.7	27.0	10.3	10.8	8.8	11.3	9.2	9.2	10.3	9.3	9.0
62.2	11.5	1.2	1.9	1.4	1.2	1.3	1.1	33.1	26.4	10.0	11.1	12.3	12.8	11.3	10.7	12.3	11.8	11.7
60.3	9.3	1.1	1.8	1.3	1.1	1.2	1.0	32.7	26.0	9.9	11.3	12.1	11.9	10.8	10.6	12.5	11.8	11.2
65.3	11.7	1.3	2.1	1.6	1.0	1.2	1.3	33.8	27.0	10.7	11.3	10.0	10.1	11.9	11.7	12.2	11.7	11.1
63.1	8.3	1.3	2.0	1.1	0.7	1.1	1.2	35.5	28.5	10.8	10.7	7.6	9.0	10.2	10.2	8.8	8.7	8.6
63.9	13.8	1.5	2.5	1.7	1.3	1.6	1.3	35.1	28.2	10.8	11.1	11.1	11.3	11.4	11.5	11.9	11.4	11.8
62.6	12.0	1.5	2.3	1.5	1.1	1.3	1.2	34.2	26.9	10.6	11.1	11.0	10.9	10.3	11.1	11.2	11.1	11.2
60.5	12.0	1.4	2.1	1.3	1.2	1.4	1.2	34.7	27.9	10.8	10.8	9.8	10.5	9.7	8.9	11.1	8.3	8.8
60.4	12.0	1.4	2.1	1.4	1.1	1.3	1.2	35.2	28.2	10.9	11.8	12.6	12.4	10.8	11.4	11.8	11.8	11.6
61.0	13.0	1.4	2.2	1.5	1.2	1.4	1.2	34.1	27.1	10.7	11.2	10.3	11.2	10.6	10.3	10.7	10.8	10.8
60.7	12.3	1.3	2.0	1.3	1.2	1.3	1.2	34.9	27.9	10.6	11.9	13.2	13.4	12.2	11.0	11.6	11.8	12.1
65.9	13.5	1.2	2.1	1.4	1.3	1.4	1.3	34.6	27.8	11.0	11.7	12.2	12.6	12.1	11.9	12.6	12.6	12.1
65.2	13.5	1.1	1.9	1.4	1.2	1.2	1.2	33.6	27.1	10.6	10.3	12.2	11.6	11.5	11.5	11.7	11.5	10.8
64.6	12.7	1.2	2.0	1.4	1.2	1.3	1.3	33.8	26.8	10.7	11.9	12.7	12.4	12.3	11.9	11.5	12.1	12.1
64.8	10.2	1.3	2.1	1.6	1.6	1.5	1.1	33.5	26.6	10.6	11.3	11.3	12.3	10.5	11.4	12.0	11.7	11.3
62.7	12.2	1.3	2.0	1.4	1.4	1.4	1.2	34.5	27.3	10.3	11.6	12.2	13.2	11.3	10.2	10.2	10.6	11.0
63.7	12.8	1.3	2.1	1.3	1.2	1.3	1.2	34.8	28.1	10.5	11.2	12.2	12.3	12.0	11.2	10.9	11.7	11.6
66.3	13.5	1.5	2.2	1.5	1.1	1.4	1.5	33.7	26.7	10.1	11.6	11.9	11.2	13.6	13.3	13.5	13.4	12.9
66.4	12.2	1.3	2.0	1.4	1.2	1.3	1.3	33.8	27.0	10.1	10.9	11.6	12.3	12.7	11.8	12.2	12.8	12.3
64.8	12.4	1.3	2.0	1.2	1.1	1.3	1.3	34.8	27.5	10.5	11.8	12.1	12.1	12.1	12.3	12.3	12.9	12.2
63.9	11.3	1.3	2.1	1.2	1.0	1.1	1.3	34.5	27.4	10.4	10.6	10.5	10.6	12.4	11.2	10.8	10.2	10.9
63.2	11.8	1.3	2.1	1.4	1.3	1.3	1.2	35.5	28.5	10.9	11.2	12.8	13.1	12.5	10.6	11.3	11.7	11.7
62.4	13.4	1.4	1.9	1.4	1.3	1.4	1.2	34.1	27.0	10.6	11.1	11.9	12.9	11.1	11.4	12.3	11.9	11.9
60.2	12.0	1.2	2.0	1.4	1.2	1.3	1.2	34.7	28.0	11.5	13.0	13.3	13.7	12.0	12.3	12.7	12.0	13.0
61.6	12.6	1.4	1.9	1.3	1.3	1.3	1.1	34.8	28.0	11.5	11.2	11.8	12.7	11.1	11.3	11.2	11.9	12.0
63.3	12.3	1.3	2.0	1.5	1.2	1.4	1.3	34.4	27.6	11.5	10.8	10.8	11.5	11.6	12.5	11.9	11.3	11.9
64.1	11.5	1.4	2.0	1.5	1.2	1.4	1.3	34.3	27.3	10.2	10.4	11.8	11.8	11.6	10.8	11.1	11.9	11.6
62.2	10.4	1.4	1.9	1.3	1.1	1.4	1.2	33.8	27.4	10.3	10.4	11.7	12.0	11.5	10.6	11.1	11.4	11.5
63.1	11.2	1.4	2.0	1.5	1.1	1.5	1.5	35.4	28.7	11.2	10.3	10.6	10.3	11.9	10.4	9.9	11.2	10.7
61.1	10.4	1.3	1.8	1.5	1.1	1.3	1.2	34.5	27.6	10.7	10.4	10.5	10.6	10.4	10.9	9.7	10.7	10.6
62.0	12.7	1.6	2.2	1.5	1.3	1.5	1.1	34.1	26.9	10.1	10.7	11.3	11.8	10.0	10.0	11.3	11.5	11.0

Forsøg	Hold	Antal Dyr	1 Dyrs Vægt					Affald					pCt. Svind	
			paa Gaarden	i Slagteriet				Hoved	Ben	Fedt	Ryg	andet	ved Slagtning	som Affald
				levende	slagtet									
					varm	kold	til-skaaren							
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.		
Række 161 Rosvang	B	5	189.6	174.2	143.6	139.6	111.6	11.0	3.8	4.7	2.3	6.2	19.8	16.1
	C ₁	5	189.6	171.6	142.8	138.0	112.0	10.2	3.7	4.2	2.0	5.9	19.6	15.1
	C ₂	5	186.0	167.2	136.6	132.4	105.4	10.9	3.9	3.4	2.1	6.7	20.8	16.2
	C ₃	5	186.0	167.4	138.6	134.4	106.6	10.9	3.7	4.3	2.1	6.8	19.7	16.6
	C ₄	5	198.0	178.0	144.8	140.4	112.8	11.0	3.7	4.1	2.1	6.7	21.1	15.5
	C ₅	3	186.7	168.3	140.7	137.0	110.7	11.1	3.6	3.6	1.9	6.1	18.6	15.6
Række 162 Tybrind	B ₁	6	185.3	166.3	134.0	130.8	—	11.3	—	3.5	2.4	—	21.3	—
	B ₂	6	183.0	167.0	134.7	132.0	—	10.5	—	3.8	2.2	—	21.0	—
	C ₁	6	185.7	171.8	133.7	130.8	—	11.8	—	3.5	2.4	—	23.9	—
	C ₂	6	187.7	171.5	137.7	135.0	—	12.0	—	3.4	2.3	—	21.1	—
	C ₃	6	186.7	171.2	132.8	129.3	—	11.5	—	2.3	2.4	—	24.2	—
	C ₄	6	177.8	159.2	131.2	127.5	96.2	10.9	3.8	3.2	2.4	11.0	19.9	19.7
Række 163 Rosenfeldt	B ₁	5	181.2	164.6	136.0	133.0	—	9.8	—	4.9	2.1	—	19.2	—
	B ₂	4	191.5	171.3	140.8	137.5	—	11.1	—	2.8	2.3	—	19.7	—
	B ₃	5	180.0	163.0	132.8	129.8	—	10.1	—	4.3	2.1	—	20.4	—
	B ₄	4	173.8	156.3	129.3	126.5	—	10.8	—	3.1	2.0	—	19.1	—
	C ₁	4	189.0	174.0	140.3	136.8	109.0	11.0	4.0	4.8	2.2	5.8	21.4	16.0
	C ₂	4	183.0	169.3	136.0	132.8	103.8	11.2	3.7	4.4	2.1	7.6	21.6	17.1
	C ₃	4	188.3	170.0	140.0	136.8	107.8	11.9	4.0	3.5	2.4	7.2	19.5	17.1
	C ₄	4	183.8	164.5	136.0	132.8	—	11.4	—	3.5	2.4	—	19.3	—
Række 164 Duelund	C ₁	5	182.2	166.8	131.0	127.4	100.8	10.4	4.2	2.9	2.2	6.9	23.6	16.0
	C ₂	5	179.8	163.0	129.2	125.8	—	10.1	—	3.7	2.1	—	22.8	—
	C ₃	5	182.0	166.0	131.8	128.8	—	10.6	—	2.9	2.2	—	22.4	—
	C ₄	5	182.4	163.4	129.8	126.8	—	10.8	—	3.0	2.2	—	22.4	—
	C ₅	4	179.5	161.3	128.3	125.3	—	10.2	—	3.9	1.9	—	22.3	—
	C ₆	5	189.8	170.8	135.0	132.0	—	11.2	—	4.2	2.3	—	22.7	—
Række 165 Rosenfeldt	B ₁	6	186.7	176.7	133.8	131.3	106.7	9.5	4.1	2.1	2.5	6.4	25.7	13.9
	B ₂	5	185.8	175.4	133.2	131.0	106.8	8.9	4.0	2.6	2.5	6.2	25.3	13.8
	C ₁	4	193.3	182.5	135.8	133.5	108.3	9.2	3.8	3.3	2.5	6.4	26.9	13.8
	C ₂	3	202.0	190.0	148.3	143.0	116.3	10.7	3.9	—	—	—	24.7	—
	C ₃	5	184.4	176.2	130.6	127.8	103.6	8.9	3.7	3.1	2.1	6.4	27.5	13.7
	C ₄	4	186.3	177.8	136.5	133.5	106.0	11.3	3.7	2.6	2.1	7.8	24.9	15.5
	C ₅	5	181.0	172.2	130.6	126.2	101.2	10.7	4.2	—	—	—	26.7	—
	C ₆	4	185.0	172.0	133.5	129.8	102.0	10.5	3.3	4.2	1.9	7.9	24.5	16.2

pCt. Exportflæsk	Tal for Fæstet	Flæskets Tykkelse						Kroppens Længde fra Hofteskaal til			Points for							
		foran Bov	over				Bugflæsket	Snittet ved Halsen	forreste Ribben	bageste Ribben	Bovpartiets Bygning	Ryg-flæskets		Bugpartiets Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Finhed	Total indtryk	
			Bov	Ryg	Lænd	Kryds						Tykkelse	Fordeling				med Hoved	uden Hoved
Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.	Tm.								
64.1	13.4	1.6	2.1	1.5	1.2	1.4	1.4	33.4	26.8	10.7	11.3	13.0	13.5	13.7	12.1	12.1	12.9	12.6
65.3	12.6	1.4	2.2	1.4	1.3	1.5	1.2	34.1	27.8	11.1	11.8	12.2	12.6	12.5	11.5	12.0	12.0	12.2
63.0	14.2	1.4	2.1	1.5	1.2	1.4	1.2	34.0	27.8	10.9	11.8	12.6	12.5	11.3	10.5	11.5	11.3	11.4
63.7	12.4	1.3	2.0	1.4	1.2	1.4	1.1	34.6	27.9	11.4	12.3	12.8	13.1	10.9	10.6	12.0	11.3	11.5
63.4	12.7	1.3	2.0	1.4	1.3	1.5	1.1	34.3	27.9	11.0	12.2	12.5	13.2	11.9	12.5	12.0	12.3	12.6
65.8	13.0	1.5	2.1	1.6	1.2	1.4	1.2	32.8	26.3	10.7	11.8	11.8	12.1	11.9	12.2	11.9	11.7	12.2
—	11.0	1.6	2.1	1.4	1.1	1.4	1.1	34.0	27.1	11.2	11.6	12.0	12.3	11.3	11.7	11.7	11.7	11.7
—	12.2	1.4	2.0	1.5	1.1	1.3	1.2	33.5	27.2	10.8	11.9	12.3	11.9	12.1	12.7	12.0	12.3	12.4
—	10.2	1.3	1.9	1.2	0.9	1.1	1.1	33.1	26.8	10.9	11.3	10.6	11.1	11.4	10.8	11.0	10.6	10.7
—	12.5	1.4	2.1	1.4	1.2	1.3	1.2	34.1	27.8	10.5	11.4	12.4	12.3	12.0	12.0	11.1	11.7	12.0
—	10.3	1.6	2.1	1.3	1.0	1.2	1.1	33.7	27.3	10.3	11.4	11.5	11.5	11.4	10.6	10.6	10.4	10.9
60.4	10.2	1.5	2.1	1.4	1.2	1.4	1.1	34.1	27.1	10.6	11.4	11.4	11.5	11.0	11.0	11.1	10.8	10.9
—	13.8	1.5	2.2	1.7	1.4	1.6	1.2	32.9	26.7	10.4	11.6	11.5	12.5	12.2	12.0	12.8	11.8	12.0
—	13.0	1.6	2.2	1.4	1.2	1.3	1.3	33.3	27.4	10.2	11.3	13.3	13.1	12.4	11.8	11.7	12.2	12.6
—	12.6	1.3	2.0	1.4	1.0	1.3	1.2	33.8	27.3	11.3	11.8	12.1	12.4	12.3	12.4	12.9	12.0	12.2
—	14.3	1.3	1.9	1.7	1.1	1.3	1.3	33.2	27.0	10.1	12.2	12.4	12.8	11.9	12.4	12.3	12.0	12.1
62.6	12.5	1.4	2.1	1.7	1.3	1.6	1.2	33.6	27.4	11.0	11.8	11.6	12.8	11.8	11.3	11.9	12.0	12.1
61.3	11.3	1.5	2.1	1.5	1.2	1.4	1.2	33.6	27.1	10.2	11.6	11.1	11.8	11.7	11.5	11.8	11.3	11.2
63.4	10.8	1.6	2.1	1.5	1.0	1.3	1.2	34.7	27.7	10.7	11.8	12.7	12.1	12.5	11.3	11.6	12.1	12.3
—	13.5	1.5	2.2	1.4	1.2	1.3	1.2	34.1	27.8	10.9	11.7	12.5	12.6	11.9	12.2	11.8	11.7	11.9
60.4	7.6	1.3	1.8	1.2	0.9	1.1	1.0	33.7	27.1	10.7	11.6	10.9	12.3	9.4	10.2	10.8	10.2	10.5
—	11.8	1.5	2.1	1.3	1.2	1.4	1.1	33.8	27.7	10.6	11.6	12.6	13.0	11.2	10.8	10.7	10.9	11.3
—	11.4	1.4	2.1	1.4	1.1	1.3	1.0	32.9	26.8	10.7	11.5	12.0	11.8	10.1	10.3	11.7	11.4	11.0
—	10.6	1.5	2.2	1.5	1.2	1.5	1.0	32.1	25.8	11.1	11.4	11.6	11.9	10.5	10.9	11.7	11.0	11.1
—	13.8	1.4	2.2	1.6	1.2	1.4	1.1	33.3	27.1	10.6	11.7	12.0	12.9	11.0	10.9	11.4	11.4	11.5
—	14.0	1.5	2.2	1.5	1.3	1.6	1.3	33.5	26.9	11.0	11.5	12.1	12.6	11.5	11.2	12.1	11.8	11.6
60.4	12.8	1.3	2.0	1.3	1.0	1.2	1.1	35.6	27.6	10.6	11.9	12.6	12.1	10.4	11.2	12.0	11.9	11.8
60.9	12.2	1.3	2.0	1.4	1.1	1.3	1.2	35.0	27.2	10.4	12.6	13.8	13.2	11.4	12.2	13.6	13.2	12.8
59.3	13.3	1.3	1.9	1.4	1.0	1.3	1.1	35.5	27.4	11.0	12.3	12.5	13.3	11.0	11.0	13.8	12.5	12.8
61.2	13.7	1.3	1.9	1.2	1.0	1.3	1.2	35.0	27.8	10.6	11.0	11.8	12.2	12.2	11.3	11.8	11.7	11.5
58.8	12.8	1.2	1.7	1.4	1.1	1.3	1.0	35.0	27.6	11.0	11.8	12.4	12.7	10.2	11.5	12.5	12.0	12.0
59.6	13.3	1.3	2.0	1.4	1.0	1.4	1.3	34.9	28.3	10.9	11.6	12.5	12.6	12.8	11.4	12.4	12.3	12.3
58.8	10.2	1.3	2.0	1.0	0.9	1.1	1.0	34.4	26.6	10.3	11.6	8.6	10.6	7.1	10.9	9.8	10.3	8.9
59.3	13.5	1.4	1.7	1.3	1.1	1.3	1.2	35.0	28.7	11.3	12.3	13.4	12.9	12.3	11.9	12.1	12.8	12.6

Forsøg	Hold	Antal Dyr	1 Dyrs Vægt						Affald					pCt. Svind	
			paa Gaarden	i Slagteriet				Hoved	Ben	Fedt	Ryg	andet	ved Slagtning	som Affald	
				levende	slagtet										
					varm	kold	til-skaaren								
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.			
Række 166 Duelund	B ₁	5	186.4	175.2	138.2	134.6	111.2	8.9	3.3	2.8	1.9	6.5	23.2	13.3	
	C ₁	4	184.0	174.3	135.0	131.0	106.8	9.8	3.7	2.7	1.8	6.2	24.8	13.9	
	C ₂	4	197.8	187.5	145.5	141.5	115.3	9.9	3.8	3.7	2.2	6.6	24.5	14.0	
	C ₃	5	184.4	177.0	136.0	131.8	105.8	10.5	4.2	2.8	2.3	6.2	25.5	14.7	
	C ₄	3	181.3	170.3	130.7	127.0	103.0	9.8	3.5	2.4	1.9	6.4	25.4	14.1	
	C ₅	5	181.4	171.4	129.0	126.0	100.2	9.4	4.0	3.2	2.2	7.0	26.5	15.0	
Række 167 Rosvang	C ₁	5	185.0	176.8	136.6	133.2	107.0	9.7	3.8	2.5	2.3	7.9	24.7	14.8	
	C ₂	5	184.4	177.6	140.2	136.2	112.0	9.3	3.4	3.4	2.1	6.0	23.3	13.6	
	C ₃	5	177.2	168.6	128.0	124.4	99.8	9.6	3.3	3.1	1.9	6.7	26.2	14.6	
	C ₄	5	185.2	178.6	138.2	134.8	108.8	10.1	3.8	3.1	2.0	7.0	24.5	14.6	
	C ₅	5	182.6	177.6	137.6	133.8	107.0	10.7	4.0	2.8	2.1	7.2	24.7	15.1	
	C ₆	5	179.4	172.4	132.6	128.4	103.4	10.4	3.4	3.1	1.9	6.2	25.5	14.5	
	C ₇	5	180.2	179.8	137.8	134.6	105.8	11.0	3.8	3.5	1.6	8.9	25.1	16.0	
Række 168 Tybrind	C ₁	6	187.2	183.7	138.7	135.8	108.5	10.6	3.6	2.8	2.1	8.2	26.1	14.8	
	C ₂	6	187.0	181.8	138.0	135.0	107.8	10.7	3.7	3.1	1.8	7.9	25.7	15.0	
	C ₃	4	188.5	178.5	136.3	133.3	104.5	10.7	3.2	4.3	1.9	8.7	25.3	16.1	
	C ₄	6	185.3	181.7	136.7	133.7	104.7	11.2	3.9	3.2	1.9	8.8	26.4	16.0	
	C ₅	6	187.8	180.3	141.0	136.7	108.5	11.5	3.8	3.3	2.1	7.5	24.2	15.6	
	C ₆	4	181.0	173.5	128.5	125.3	99.3	10.8	3.4	2.4	1.7	7.7	27.8	15.0	
Række 169 Sanderum- gaard	C ₁	6	188.8	181.8	139.5	136.0	106.8	11.3	3.3	3.9	2.4	8.3	25.2	16.1	
	C ₂	5	192.2	182.4	143.8	140.2	110.0	11.3	3.8	3.7	2.5	8.9	23.1	16.6	
	C ₃	5	184.4	176.8	133.2	130.0	101.4	10.8	3.9	3.2	2.4	8.3	26.5	16.2	
	C ₄	6	188.5	178.2	139.8	136.2	107.2	10.7	3.5	4.0	2.1	8.7	23.6	16.3	
	C ₅	6	177.2	171.3	130.7	127.3	99.2	10.5	3.8	3.2	2.4	8.2	25.7	16.4	
	C ₆	4	175.8	170.0	129.5	126.8	99.8	10.8	3.6	3.3	2.3	7.0	25.4	15.9	
Række 170 Duelund	B ₁	5	185.6	177.6	141.4	137.4	108.8	10.8	3.6	3.2	2.0	9.0	22.6	16.1	
	B ₂	4	180.5	168.3	132.3	129.0	101.8	9.9	3.5	2.5	1.9	9.4	23.3	16.2	
	C ₁	5	190.2	181.4	140.4	136.4	108.6	10.0	3.3	3.1	2.2	9.2	24.8	15.3	
	C ₂	3	185.3	174.7	135.7	132.0	103.0	11.5	4.0	2.4	2.2	8.9	24.4	16.6	
	C ₃	3	199.3	189.7	144.3	141.3	111.3	11.2	4.1	3.2	1.7	9.8	25.5	15.8	
	C ₄	3	189.3	180.7	141.3	137.3	108.0	10.4	4.3	2.8	2.2	9.6	24.0	16.2	

pCt. Exportflæsk	Tal for Fasthed	Flæskets Tykkelse						Kroppens Længde fra Hofteskaal til			Points for							
		foran Bov	over				Bugflæsket	Snittet ved Halsen	forreste Ribben	bageste Ribben	Bovpartiets Bygning	Ryg-flæskets		Bugpartiets Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Hoved, Ben og Sværens Fimled	Total-indtryk	
			Bov	Ryg	Lænd	Kryds						Tykkelse	Fordeling				med Hoved	uden Hoved
63.5	11.4	1.4	2.0	1.5	1.2	1.5	1.3	33.7	27.0	10.5	11.5	12.8	13.1	12.6	12.2	12.2	12.9	12.7
61.3	11.8	1.6	2.1	1.4	1.2	1.4	1.3	34.1	27.4	10.1	11.1	12.0	11.6	10.8	10.1	11.6	11.6	11.1
61.5	12.0	1.4	2.2	1.6	1.3	1.6	1.2	34.8	28.0	11.8	11.5	11.3	12.3	10.3	10.9	11.6	11.9	11.1
59.8	9.0	1.4	2.1	1.3	0.9	1.3	1.1	32.9	26.9	9.7	10.4	9.6	10.4	9.0	10.4	10.2	10.2	9.4
60.5	12.3	1.5	2.1	1.5	1.2	1.3	1.2	33.0	26.7	9.8	11.2	12.3	12.2	10.8	10.7	11.7	11.8	11.5
58.5	8.0	1.4	2.0	1.4	1.2	1.3	1.1	34.3	27.4	10.5	10.8	10.6	11.8	10.0	9.7	10.5	10.6	10.3
60.5	7.8	1.5	1.9	1.3	1.0	1.2	1.2	34.7	28.2	10.7	10.8	10.0	11.9	9.6	9.9	10.5	10.1	9.7
63.1	11.6	1.5	2.1	1.7	1.3	1.6	1.3	34.6	27.9	11.1	11.0	11.7	12.5	11.5	11.3	11.9	12.3	11.9
59.2	12.8	1.3	2.0	1.5	1.3	1.5	1.2	33.5	27.5	10.7	11.3	12.9	13.1	11.6	11.5	12.1	12.0	12.1
60.9	12.0	1.4	2.0	1.5	1.2	1.4	1.2	33.9	27.5	10.9	11.0	12.3	12.5	11.1	10.7	11.6	11.6	11.6
60.2	13.2	1.5	2.1	1.6	1.2	1.5	1.2	33.5	26.9	10.7	11.3	12.1	12.5	11.5	11.3	11.8	11.9	11.8
60.0	13.0	1.5	2.1	1.5	1.3	1.5	1.2	33.3	26.8	10.5	11.3	12.6	12.8	11.4	11.4	11.7	11.8	12.2
58.9	13.2	1.3	2.0	1.3	1.2	1.4	1.1	34.2	28.0	10.7	11.8	12.9	13.2	12.1	11.3	12.8	12.6	12.2
59.1	10.8	1.3	1.9	1.7	1.2	1.4	1.2	34.2	27.7	10.6	12.1	12.4	12.4	11.7	11.8	12.1	12.3	12.2
59.3	12.0	1.4	2.0	1.6	1.3	1.5	1.2	33.8	27.1	10.5	12.1	12.3	12.7	12.4	10.9	11.8	12.2	12.1
58.6	12.8	1.5	2.4	1.5	1.4	1.6	1.3	34.0	27.7	10.8	11.8	11.5	11.8	12.8	13.3	13.0	11.9	12.5
57.6	11.3	1.5	2.1	1.4	1.4	1.5	1.1	34.5	27.9	11.1	12.0	12.3	12.9	12.0	10.6	11.7	11.3	11.7
60.2	13.2	1.4	2.1	1.4	1.3	1.4	1.1	34.1	27.6	10.2	12.3	12.2	12.4	12.5	12.1	11.6	12.1	12.5
57.2	11.3	1.6	2.1	1.5	1.1	1.4	1.1	35.0	28.3	10.7	11.6	11.4	12.1	10.9	11.1	12.1	10.9	11.4
58.7	12.2	1.5	2.0	1.5	1.1	1.5	1.2	35.4	28.4	10.8	11.7	12.7	12.3	12.0	11.2	12.5	12.2	12.1
60.3	11.4	1.4	1.9	1.4	1.2	1.4	1.1	34.3	28.3	10.6	11.2	12.6	12.8	11.8	12.0	11.8	12.2	12.0
57.3	11.0	1.3	1.8	1.2	1.0	1.2	1.0	34.6	27.5	10.3	11.4	10.0	11.2	10.2	10.0	10.6	9.8	9.8
60.1	12.7	1.5	2.1	1.6	1.3	1.5	1.2	34.6	27.6	10.7	11.0	11.7	12.3	11.7	11.8	12.7	11.8	11.8
57.9	10.8	1.3	1.7	1.2	1.0	1.1	1.1	33.9	27.4	10.0	11.8	11.7	12.5	11.3	10.7	11.2	10.8	11.5
58.7	11.5	1.5	2.1	1.5	1.1	1.4	1.1	34.8	28.2	10.0	11.8	10.8	11.8	12.0	10.8	12.3	10.8	11.3
61.3	12.8	1.6	2.1	1.4	1.3	1.5	1.1	32.9	26.0	10.5	11.8	12.4	12.8	12.4	12.4	13.2	12.6	12.2
60.5	13.8	1.4	2.1	1.4	1.2	1.5	1.1	33.2	25.9	10.1	11.5	12.0	12.0	12.5	12.8	12.8	12.3	12.5
59.9	12.6	1.5	2.1	1.5	1.4	1.5	1.1	33.9	26.7	10.8	12.0	11.8	12.0	11.6	11.6	12.0	11.8	12.0
59.0	12.0	1.3	1.7	1.0	1.0	1.1	1.2	33.9	26.9	10.2	11.7	11.0	12.3	12.3	11.3	11.3	11.3	11.3
58.7	12.3	1.5	2.1	1.5	1.2	1.5	1.2	34.1	28.6	10.8	11.3	10.7	11.7	11.7	10.7	10.7	10.7	10.7
59.8	12.3	1.5	2.0	1.4	1.2	1.4	1.2	33.3	26.3	9.7	11.7	12.7	12.3	13.0	12.7	11.0	11.7	12.3

Forbrugstabel til 138. Række. Rosvang. 1899.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr				Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Majs	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.							
A	I	1— 4 (40 Dage)	42.7	73.8	31.1	61.7	—	40	230	106.7	3.43
	II	5— 8 (40 —)	73.8	112.5	38.7	60.9	44.2	40	290	160.1	4.14
	III	9—12 (40 —)	112.5	157.5	45.0	—	150.0	40	320	210.0	4.67
B ₁	I	1— 4 (40 Dage)	45.2	76.5	31.3	61.7	—	40	230	106.7	3.41
	II	5— 8 (40 —)	76.5	115.4	38.9	60.9	44.2	40	290	160.1	4.12
	III	9—12 (40 —)	115.4	158.2	42.8	—	150.0	40	320	210.0	4.91
B ₂	I	1— 5 (50 Dage)	32.3	73.2	40.9	71.7	—	50	270	125.0	3.06
	II	6— 9 (40 —)	73.2	114.3	41.1	34.2	69.2	40	300	160.1	3.90
	III	10—13 (40 —)	114.3	159.8	45.5	—	150.0	40	320	210.0	4.62
C	I	2— 4 (30 Dage)	42.3	73.8	31.5	45.0	—	30	170	78.3	2.49
	II	5— 8 (40 —)	73.8	118.8	45.0	60.9	44.2	40	290	160.1	3.56
	III	9—11 (30 —)	118.8	158.6	39.8	—	110.0	30	240	155.0	3.89
D	I	1— 5 (50 Dage)	36.0	76.5	40.5	71.7	—	50	270	125.0	3.09
	II	6— 9 (40 —)	76.5	116.6	40.1	34.2	69.2	40	300	160.1	3.99
	III	10—13 (40 —)	116.6	159.0	42.4	—	150.0	40	320	210.0	4.95

Forbrugstabel til 139. Række. Rosenfeldt. 1899.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr				Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Majs	Byg	Kjærne- mælk	Valle	ialt	Til1Pd. Tilvæxt
			begyndt	sluttet							
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
A	II	2—5 (40 Dage)	75.4	112.0	36.6	112.0	—	40	448.0	156.0	4.26
	III	6—9 (40 —)	112.0	153.2	41.2	—	146.8	40	474.0	193.0	4.68
B	II	2—5 (40 Dage)	78.4	118.6	40.2	114.6	—	40	458.4	159.5	3.97
	III	6—8 (30 —)	118.6	160.3	41.7	—	117.5	30	387.5	154.8	3.71
C	II	1—3 (30 Dage)	90.4	118.8	28.4	89.4	—	30	357.6	124.2	4.37
	III	4—6 (30 —)	118.8	154.0	35.2	—	118.4	30	390.2	155.9	4.43
	IV	7—9 (30 —)	154.0	190.6	36.6	—	136.3	30	408.8	175.4	4.79
D	II	1—4 (40 Dage)	79.2	117.2	38.0	111.2	—	40	444.8	155.0	4.08
	III	5—7 (30 —)	117.2	152.4	35.2	—	117.2	30	386.2	154.4	4.39

Forbrugstabel til 140. Række. Tybrind. 1899.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr					Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Majs	Kjerne- mælk	Skummet Mælk	Valle	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.								
A	I	1— 4 (40 Dage)	48.2	78.3	30.1	33.3	38.0	30	130.5	107.0	107.0	3.55
	II	5— 9 (50 —)	78.3	119.3	41.0	—	120.0	50	220.1	180.0	180.0	4.39
	III	10—12 (30 —)	119.3	153.3	34.0	69.8	30.5	30	195.7	150.5	150.5	4.43
B ₁	I	1— 6 (60 Dage)	35.5	76.9	41.4	29.3	72.7	50	179.5	153.0	153.0	3.70
	II	7—10 (40 —)	76.9	110.9	34.0	—	90.6	40	164.0	136.0	136.0	4.00
	III	11—14 (40 —)	110.9	158.2	47.3	101.2	28.7	40	252.1	194.8	194.8	4.12
B ₂	I	1— 5 (50 Dage)	35.5	74.8	39.3	29.3	53.0	40	145.3	123.5	123.5	3.14
	II	6—10 (50 —)	74.8	119.5	44.7	—	119.5	50	218.9	179.3	179.3	4.01
	III	11—13 (30 —)	119.5	155.8	36.3	72.8	31.3	30	204.4	156.2	156.2	4.30
C	I	1— 6 (60 Dage)	35.7	74.1	38.4	29.3	72.7	50	179.5	153.0	153.0	3.98
	II	7—10 (40 —)	74.1	108.7	34.6	—	90.6	40	164.0	136.0	136.0	3.93
	III	11—14 (40 —)	108.7	156.5	47.8	107.2	28.7	40	265.6	203.8	203.8	4.26
D	I	1— 4 (40 Dage)	42.7	75.7	33.0	34.0	39.3	30	135.0	110.0	110.0	3.33
	II	5— 8 (40 —)	75.7	114.2	38.5	—	95.2	40	174.2	142.8	142.8	3.71
	III	9—12 (40 —)	114.2	159.5	45.3	71.2	59.4	40	253.6	195.8	195.8	4.32

Forbrugstabel til 141. Række. Karlshøj. 1900.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr					Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Grut	Grønt-foder	Roer	Kjerne-mælk	Valle	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt	sluttet								
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
A	I	1— 6 (60 Dage)	36.6	73.2	36.6	150.0	78.0	—	88	240.0	202.0	5.52
	II	7—11 (50 —)	73.2	110.6	37.4	121.0	108.0	—	—	336.0	173.0	4.63
	III	12—15 (40 —)	110.6	156.1	45.5	123.0	14.4	139.6	—	304.0	167.7	3.69
B ₁	I	1— 6 (60 Dage)	38.6	79.8	41.2	150.0	106.0	—	—	360.0	203.6	4.94
	II	7—10 (40 —)	79.8	111.2	31.4	100.0	84.0	—	—	264.0	140.7	4.48
	III	11—14 (40 —)	111.2	159.2	48.0	126.0	38.4	89.6	—	296.0	169.6	3.53
B ₂	I	1— 4 (40 Dage)	47.8	78.5	30.7	105.0	60.0	—	—	232.5	137.8	4.49
	II	5— 8 (40 —)	78.5	113.0	34.5	100.0	80.0	—	—	240.0	137.8	3.99
	III	9—12 (40 —)	113.0	163.4	50.4	154.8	99.0	8.0	—	280.0	201.0	3.99
C ₁	I	1— 5 (50 Dage)	47.2	76.7	29.5	112.0	78.3	—	—	290.0	153.6	5.21
	II	6— 9 (40 —)	76.7	113.2	36.5	105.0	85.0	—	—	250.0	144.7	3.96
	III	10—13 (40 —)	113.2	163.8	50.6	170.0	68.0	47.0	—	280.0	213.8	4.23
C ₂	II	2— 5 (40 Dage)	75.4	111.4	36.0	96.0	87.6	—	—	286.0	139.3	3.87
	III	6— 9 (40 —)	111.4	156.2	44.8	110.4	122.0	—	—	288.0	161.5	3.60
C ₃	I	7—11 (50 Dage)	36.3	74.3	38.0	150.0	40.0	—	240	75.0	205.2	5.40
	II	12—15 (40 —)	74.3	118.8	44.5	132.5	18.0	192.0	—	305.0	184.0	4.13
	III	16—18 (30 —)	118.8	155.8	37.0	107.5	—	280.0	—	280.0	163.0	4.41

Forbrugstabel til 142. Række. Tybrind. 1900—01.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr					Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Rug	Majs	Byg	Kjæne- mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.								
A	II	3— 6 (40 Dage)	73.7	111.2	37.5	43.2	43.2	—	60	253.0	138.6	3.70
	III	7—10 (40 —)	111.2	156.5	45.3	—	—	137.7	40	372.9	206.5	4.56
B	I	2— 7 (60 Dage)	36.5	76.0	39.5	31.8	23.3	15.6	90	247.8	127.0	3.22
	II	8—11 (40 —)	76.0	115.2	39.2	—	—	102.7	40	267.8	154.0	3.93
	III	12—14 (30 —)	115.2	152.3	37.1	—	—	114.0	30	312.0	171.0	4.61
C ₁	I	1— 7 (70 Dage)	39.2	76.7	37.5	48.1	27.3	16.8	110	348.1	168.5	4.49
	II	8—11 (40 —)	76.7	110.1	33.4	—	—	104.7	40	273.8	157.0	4.70
	III	12—15 (40 —)	110.1	154.1	44.0	—	—	160.0	40	440.0	240.0	5.45
C ₂	I	1— 6 (60 Dage)	31.7	71.8	40.1	45.8	28.3	—	100	286.8	138.6	3.46
	II	7—10 (40 —)	71.8	115.3	43.5	—	—	98.0	40	254.0	147.0	3.38
	III	11—14 (40 —)	115.3	156.3	41.0	—	—	153.4	40	419.8	230.1	5.61
C ₃	I	1— 7 (70 Dage)	33.2	77.8	44.6	42.4	24.4	16.2	110	298.0	151.0	3.39
	II	8—11 (40 —)	77.8	116.5	38.7	—	—	104.7	40	273.8	157.0	4.06
	III	12—14 (30 —)	116.5	153.3	36.8	—	—	114.0	30	312.0	171.0	4.65
C ₄	I	3— 8 (60 Dage)	34.0	71.2	37.2	18.5	18.5	26.4	80	205.6	111.0	2.98
	II	9—12 (40 —)	71.2	111.5	40.3	—	—	100.7	40	261.8	151.0	3.75
	III	13—15 (30 —)	111.5	149.5	38.0	—	—	114.0	30	312.0	171.0	4.50

Forbrugstabel til 143. Række. Rosvang. 1900 -01.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr				Beregnet Korn	
			1 Dyr's Vægt		Tilvæxt	Byg	Elve- tham- Roer	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.							
A	I	1— 5 (50 Dage)	32.0	75.3	43.3	81.7	33.3	50	220	130.3	3.01
	II	6— 9 (40 —)	75.3	114.3	39.0	100.0	200.0	40	230	166.4	4.27
	III	10—12 (30 —)	114.3	149.3	35.0	111.7	223.3	30	190	172.3	4.92
B ₁	I	1— 5 (50 Dage)	33.7	74.8	41.1	81.7	33.3	50	220	130.3	3.17
	II	6— 9 (40 —)	74.8	116.2	41.4	100.0	200.0	40	230	166.4	4.02
	III	10—12 (30 —)	116.2	152.8	36.6	111.7	223.3	30	190	172.3	4.71
B ₂	I	1— 4 (40 Dage)	37.5	73.7	36.2	81.7	—	40	180	118.4	3.27
	II	5— 8 (40 —)	73.7	114.7	41.0	115.0	230.0	40	220	133.0	4.46
	III	9—11 (30 —)	114.7	150.7	36.0	125.0	250.0	30	180	186.7	5.19
C ₁	I	1— 5 (50 Dage)	35.7	79.5	43.8	81.7	33.3	50	220	130.3	2.97
	II	6— 9 (40 —)	79.5	120.0	40.5	100.0	200.0	40	230	166.4	4.11
	III	10—12 (30 —)	120.0	155.0	35.0	111.7	223.3	30	190	172.3	4.92
C ₂	I	1— 4 (40 Dage)	38.5	77.5	39.0	81.7	—	40	180	118.4	3.04
	II	5— 8 (40 —)	77.5	120.2	42.7	115.0	230.0	40	220	133.0	4.29
	III	9—11 (30 —)	120.2	158.6	38.4	125.0	250.0	30	180	186.7	4.86

Forbrugstabel til 145. Række. Rosvang. 1901.

Hold	Væxt- periode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr		Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.					
A	I	1— 4 (56 Dage)	30.2	71.8	41.6	68.1	413	136.9	3.29
	II	5— 7 (42 —)	71.8	114.8	43.0	108.8	336	164.8	3.83
	III	8—10 (42 —)	114.8	163.6	48.8	168.0	336	224.0	4.59
B ₁	I	1— 3 (42 Dage)	38.8	70.5	31.7	57.2	308	108.5	3.42
	II	4— 6 (42 —)	70.5	116.7	46.2	111.9	336	167.9	3.63
	III	7— 8 (28 —)	116.7	149.3	32.6	105.0	224	142.3	4.37
	IV	9—10 (28 —)	149.3	186.1	36.8	126.0	224	163.3	4.44
B ₂	I	1— 3 (42 Dage)	35.3	69.2	33.9	57.2	308	108.5	3.20
	II	4— 6 (42 —)	69.2	117.8	48.6	111.9	336	167.9	3.45
	III	7— 8 (28 —)	117.8	150.6	32.8	105.0	224	142.3	4.34
	IV	9—10 (28 —)	150.6	185.6	35.0	126.0	224	163.3	4.67
B ₃	I	2— 5 (56 Dage)	32.7	76.3	43.6	84.9	448	159.6	3.66
	II	6— 8 (42 —)	76.3	116.0	39.7	125.0	336	181.0	4.56
	III	9—10 (28 —)	116.0	146.3	30.3	109.7	224	147.0	4.85
C ₁	I	1— 3 (42 Dage)	36.0	68.8	32.8	57.2	308	108.5	3.31
	II	4— 6 (42 —)	68.8	110.2	41.4	111.9	336	167.9	4.06
	III	7— 9 (42 —)	110.2	158.6	48.4	165.7	336	221.7	4.58
C ₂	I	3— 6 (56 Dage)	34.0	77.1	43.1	86.3	448	161.0	3.74
	II	7— 8 (28 —)	77.1	112.8	35.7	88.7	224	126.0	3.53
	III	9—10 (28 —)	112.8	146.8	34.0	121.3	224	158.6	4.66
C ₃	I	3— 5 (42 Dage)	35.7	71.5	35.8	56.0	336	112.0	3.13
	II	6— 8 (42 —)	71.5	117.3	45.8	116.6	336	172.6	3.77
	III	9—10 (28 —)	117.3	152.8	35.5	121.3	224	158.6	4.47

Forbrugstabel til 146. Række. Constantinsborg. 1901.

Hold	Væxt- periode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr			Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Majs	Rug	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.						
A	I	2—4 (42 Dage)	31.4	66.2	34.8	56.0	—	210	91.0	2.61
	II	5—7 (42 —)	66.2	110.0	43.8	—	112.0	210	147.0	3.36
B	II	2—4 (42 Dage)	68.8	121.0	52.2	119.0	—	210	154.0	2.95
	III	5—6 (28 —)	121.0	149.4	28.4	—	112.0	140	135.3	4.76
	IV	7—8 (28 —)	149.4	184.8	35.4	—	112.0	140	135.3	3.82
C ₁	I	2—4 (42 Dage)	33.4	73.4	40.0	67.2	—	210	102.2	2.56
	II	5 7 (42 —)	73.4	117.2	43.8	—	114.8	210	149.8	3.42
C ₂	II	2—4 (42 Dage)	66.2	112.6	46.4	116.2	—	210	151.2	3.26
	III	5—7 (42 —)	112.6	156.4	43.8	—	165.2	210	200.2	4.57
C ₃	I	1—2 (28 Dage)	43.8	73.1	29.3	57.4	—	140	80.7	2.75
	II	3—5 (42 —)	73.1	118.1	45.0	84.0	53.2	210	172.2	3.83
	III	6—7 (28 —)	118.1	151.8	33.7	—	112.0	140	135.3	4.01

Forbrugstabel til 147. Række. Bregentved. 1901—02.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr								Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Til- væxt	Byg	Rug	Majs	Grønt- foder	Roer	Kjær- ne- mælk	Skum- met Mælk	Valle	ialt	Til 1 Pd. Til- væxt Pd.
			begyndt	sluttet											
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
A	I	1— 5 (70 Dage)	39.6	76.2	36.6	3.6	—	123.5	8.0	4.8	—	—	632.8	182.0	4.97
	II	6— 8 (42 —)	76.2	125.2	49.0	72.9	39.9	4.5	—	1.0	—	165.2	138.6	156.5	3.19
	III	9—10 (28 —)	125.2	163.0	37.8	61.2	21.6	—	—	—	—	325.6	—	137.1	3.63
B ₁	I	2— 6 (70 Dage)	35.8	78.6	42.8	13.9	13.9	99.8	3.0	5.8	100.0	—	492.0	186.6	4.36
	II	7— 8 (28 —)	78.6	115.0	36.4	59.0	26.0	—	—	—	—	165.2	9.6	113.3	3.11
	III	9—10 (28 —)	115.0	150.4	35.4	61.5	21.9	—	—	—	—	323.2	—	137.3	3.88
B ₂	II	2— 5 (56 Dage)	73.6	120.6	47.0	—	—	154.0	10.2	4.8	—	—	728.8	217.3	4.62
	III	6— 7 (28 —)	120.6	165.6	45.0	53.7	53.7	6.9	—	1.0	—	118.8	219.6	152.5	3.39
B ₃	I	2— 6 (70 Dage)	37.6	77.6	40.0	13.9	13.9	100.5	3.0	5.8	100.0	—	492.0	187.3	4.68
	II	7— 8 (28 —)	77.6	114.2	36.6	59.0	26.0	—	—	—	—	165.2	9.6	113.3	3.10
	III	9—11 (42 —)	114.2	158.4	44.2	81.8	42.2	—	—	—	—	522.0	—	211.0	4.77
C ₁	I	2— 6 (70 Dage)	31.2	73.4	42.2	13.9	13.9	99.8	3.0	5.8	100.0	—	492.0	186.6	4.42
	II	7— 8 (28 —)	73.4	110.0	36.6	59.0	26.0	—	—	—	—	165.2	9.6	113.3	3.10
	III	9—11 (42 —)	110.0	164.5	54.5	101.2	58.6	—	—	—	—	319.9	—	213.1	3.91
C ₂	I	1— 3 (42 Dage)	42.0	73.8	31.8	3.6	—	76.5	17.1	—	—	—	383.9	115.5	3.63
	II	4— 6 (42 —)	73.8	103.8	30.0	19.2	19.2	77.5	—	5.8	—	—	528.0	160.6	5.35
	III	7— 8 (28 —)	103.8	149.2	45.4	75.3	34.0	—	—	—	—	212.1	12.8	145.8	3.21
D	I	2— 6 (70 Dage)	32.4	69.6	37.2	13.9	13.9	99.8	3.0	5.8	100.0	—	492.0	186.6	5.02
	II	7— 9 (42 —)	69.6	122.4	52.8	102.8	29.5	—	—	—	—	259.9	9.6	176.4	3.34
	III	10—11 (28 —)	122.4	156.6	34.2	54.8	54.8	—	—	—	—	219.6	—	146.2	4.27

Forbrugstabel til 148. Række. Tybrind. 1901-02.

Hold	Væxperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr						Beregnet Korn	
			1 Dyr's Vægt		Tilvæxt	Hvede	Byg	Majs	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.									
A	I	2— 5 (56 Dage)	33.0	74.8	41.8	18.9	26.1	45.0	248.3	21.5	—	135.0	3.23
	II	6— 8 (42 —)	74.8	119.8	45.0	—	68.4	45.5	96.6	160.3	169.4	170.8	3.80
	III	9—10 (28 —)	119.8	151.8	32.0	—	107.6	—	28.0	142.1	284.2	159.7	4.99
B	I	3— 6 (56 Dage)	36.3	70.2	33.9	9.3	35.8	45.1	270.9	—	—	135.4	4.00
	II	7— 9 (42 —)	70.2	116.8	46.6	—	80.9	35.2	96.6	163.8	176.4	174.2	3.74
	III	10—11 (28 —)	116.8	150.8	34.0	—	109.7	—	28.0	147.0	294.0	163.4	4.81
C ₁	I	1— 3 (42 Dage)	35.7	68.7	33.0	36.6	—	36.6	219.8	—	—	109.8	3.33
	II	4— 6 (42 —)	68.7	112.5	43.8	—	55.9	55.9	118.7	187.3	58.8	167.7	3.83
	III	7— 9 (42 —)	112.5	160.8	48.3	—	143.7	24.3	42.0	231.0	462.0	252.0	5.22
C ₂	I	2— 5 (56 Dage)	36.0	75.0	39.0	20.8	27.3	48.1	266.5	21.5	—	144.2	3.70
	II	6— 8 (42 —)	75.0	118.7	43.7	—	68.4	45.5	96.6	160.3	169.4	170.8	3.91
	III	9—10 (28 —)	118.7	149.5	30.8	—	107.6	—	28.0	142.1	284.2	159.7	5.19
C ₃	I	1— 4 (56 Dage)	30.5	70.5	40.0	30.8	13.5	44.3	266.0	—	—	132.9	3.32
	II	5— 7 (42 —)	70.5	110.2	39.7	—	52.2	52.2	132.0	153.0	56.0	156.6	3.94
	III	8—10 (42 —)	110.2	155.4	45.2	—	162.6	—	42.0	214.2	428.4	241.0	5.33
C ₄	I	1— 3 (42 Dage)	43.5	78.0	34.5	40.8	—	40.8	245.0	—	—	122.4	3.55
	II	4— 6 (42 —)	78.0	123.5	45.5	—	60.1	60.1	103.2	225.8	63.0	180.3	3.96
	III	7— 8 (28 —)	123.5	156.3	32.8	—	84.5	25.7	28.0	151.2	302.4	165.3	5.04
C ₅	I	5— 8 (56 Dage)	36.8	71.8	35.0	—	51.2	51.2	280.7	25.9	—	153.5	4.39
	II	9—10 (28 —)	71.8	108.3	36.5	—	62.6	19.4	72.1	115.3	114.3	122.7	3.36
	III	11—14 (56 —)	108.3	161.8	53.5	—	201.7	—	56.0	315.0	630.0	316.0	5.91

Forbrugstabel til 149. Række. Duelund. 1901—02.

Hold	Væxt- periode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr			Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Majs	Byg	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.						
A	I	2— 5 (56 Dage)	37.2	81.0	43.8	77.0	38.5	280	162.2	3.70
	II	6— 7 (28 —)	81.0	111.5	30.5	—	98.0	140	121.3	3.98
	III	8—10 (42 —)	111.5	159.0	47.5	—	182.0	210	217.0	4.57
B ₁	I	2— 5 (56 Dage)	31.0	74.7	43.7	73.5	38.5	280	158.7	3.63
	II	6— 7 (28 —)	74.7	110.5	35.8	—	103.6	140	126.9	3.54
	III	8— 9 (28 —)	110.5	149.1	38.6	—	134.4	140	157.7	4.09
B ₂	I	1— 4 (56 Dage)	34.2	74.2	40.0	118.1	—	280	164.8	4.12
	II	5— 6 (28 —)	74.2	105.5	31.3	—	91.0	140	114.3	3.65
	III	7— 8 (28 —)	105.5	143.6	38.1	—	123.6	140	146.9	3.86
	IV	9—10 (28 —)	143.6	189.2	45.6	—	145.6	140	168.9	3.70
C ₁	I	1— 4 (56 Dage)	36.2	80.0	43.8	118.1	—	280	164.8	3.76
	II	5— 6 (28 —)	80.0	112.2	32.2	—	91.0	140	114.3	3.55
	III	7— 8 (28 —)	112.2	156.5	44.3	—	133.0	140	156.3	3.53
	IV	9—10 (28 —)	156.5	207.0	50.5	—	164.5	140	187.8	3.72
C ₂	I	1— 4 (56 Dage)	36.8	76.0	39.2	118.1	—	280	164.8	4.20
	II	5— 6 (28 —)	76.0	105.2	29.2	—	91.0	140	114.3	3.91
	III	7— 8 (28 —)	105.2	144.0	38.8	—	123.6	140	146.9	3.79
	IV	9—10 (28 —)	144.0	200.6	56.6	—	150.3	140	173.6	3.07
C ₃	I	5— 7 (42 Dage)	34.5	73.5	39.0	—	79.4	210	114.4	2.93
	II	8— 9 (28 —)	73.5	111.2	37.7	—	102.7	140	126.0	3.34
	III	10—11 (28 —)	111.2	152.8	41.6	—	140.0	140	163.3	3.93

Forbrugstabel til 150. Række. Rosvang. 1902.

Hold	Væxt- periode	Periode Nr.	Gennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr			Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Majs	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.						
A	I	1—4 (56 Dage)	40.0	77.2	37.2	68.8	—	336	124.8	3.35
	II	5—7 (42 —)	77.2	123.3	46.1	88.7	23.3	336	168.0	3.64
	III	8—9 (28 —)	123.3	163.8	40.5	58.3	58.3	224	153.9	3.80
B ₁	I	3—5 (42 Dage)	37.5	76.2	38.7	57.2	—	294	106.2	2.74
	II	6—7 (28 —)	76.2	112.8	36.6	56.0	22.2	224	115.5	3.16
	III	8—9 (28 —)	112.8	155.7	42.9	59.5	59.5	224	156.3	3.64
B ₂	I	3—5 (42 Dage)	35.8	72.0	36.2	57.2	—	294	106.2	2.98
	II	6—7 (28 —)	72.0	108.3	36.3	56.0	22.2	224	115.5	3.18
	III	8—9 (28 —)	108.3	150.5	42.2	59.5	59.5	224	156.3	3.70
C ₁	I	2—5 (56 Dage)	36.5	80.3	43.8	86.3	—	378	149.3	3.41
	II	6—7 (28 —)	80.3	113.8	33.5	59.5	23.3	224	120.1	3.59
	III	8—9 (28 —)	113.8	155.0	41.2	58.3	58.3	224	153.9	3.74
C ₂	I	2—5 (56 Dage)	30.8	74.0	43.2	65.4	—	378	128.4	2.97
	II	6—7 (28 —)	74.0	106.8	32.8	56.0	22.2	224	115.5	3.52
	III	8—9 (28 —)	106.8	147.0	40.2	59.5	59.5	224	156.3	3.89
C ₃	I	3—5 (42 Dage)	35.0	73.4	38.4	56.7	—	294	105.7	2.75
	II	6—7 (28 —)	73.4	113.6	40.2	57.4	22.4	224	117.1	2.91
	III	8—9 (28 —)	113.6	155.4	41.8	59.3	59.3	224	155.9	3.73

Forbrugstabel til 151. Række Tybrind. 1902.

Hold	Væxperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr						Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Majs	Rug	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt	sluttet									
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
A	I	4— 7 (56 Dage)	35.5	79.1	43.6	99.6	—	—	224.0	84.0	84.0	157.9	3.62
	II	8—10 (42 —)	79.1	121.5	42.4	60.9	43.7	17.2	42.0	162.4	324.8	183.0	4.32
	III	11—12 (28 —)	121.5	156.1	34.6	49.1	—	49.1	28.0	112.0	224.0	140.1	4.05
B ₁	I	3— 6 (56 Dage)	30.7	77.0	46.3	84.1	—	—	210.0	84.0	84.0	140.1	3.03
	II	7— 9 (42 —)	77.0	117.7	40.7	75.9	39.7	—	42.0	150.5	301.0	172.8	4.25
	III	10—11 (28 —)	117.7	151.3	33.6	51.3	5.0	46.3	28.0	112.0	224.0	144.7	4.31
B ₂	I	3— 6 (56 Dage)	35.5	80.7	45.2	84.1	—	—	210.0	84.0	84.0	140.1	3.10
	II	7— 8 (28 —)	80.7	109.7	29.0	54.9	18.7	—	28.0	94.5	189.0	109.8	3.79
	III	9—11 (42 —)	109.7	155.7	46.0	71.7	26.0	45.7	42.0	168.0	336.0	206.4	4.49
B ₃	I	4— 7 (56 Dage)	36.6	76.4	39.8	109.2	—	—	224.0	84.0	84.0	167.5	4.21
	II	8—10 (42 —)	76.4	117.8	41.4	58.1	40.9	17.2	42.0	162.4	324.8	177.4	4.29
	III	11—13 (42 —)	117.8	162.0	44.2	75.0	—	75.0	42.0	168.0	336.0	213.0	4.82
C ₁	I	4— 7 (56 Dage)	34.5	80.2	45.7	93.3	—	—	224.0	84.0	84.0	151.6	3.32
	II	8—10 (42 —)	80.2	122.3	42.1	55.4	39.3	16.2	42.0	164.5	329.0	172.7	4.10
	III	11—12 (28 —)	122.3	159.0	36.7	48.4	—	48.4	28.0	112.0	224.0	138.9	3.78
C ₂	I	2— 5 (56 Dage)	33.8	73.7	39.9	80.5	—	—	252.0	42.0	42.0	133.0	3.33
	II	6— 8 (42 —)	73.7	114.6	40.9	95.6	21.0	—	42.0	136.5	273.0	169.1	4.13
	III	9—10 (28 —)	114.6	148.3	33.7	49.6	28.8	20.8	28.0	112.0	224.0	141.3	4.19
	IV	11—12 (28 —)	148.3	187.5	39.2	60.7	—	60.7	28.0	112.0	224.0	163.5	4.17
C ₃	I	3— 6 (56 Dage)	36.2	81.7	45.5	99.2	—	—	210.0	84.0	84.0	155.2	3.41
	II	7— 9 (42 —)	81.7	123.8	42.1	75.9	39.7	—	42.0	150.5	301.0	172.8	4.10
	III	10—11 (28 —)	123.8	160.0	36.2	50.7	5.0	45.7	28.0	112.0	224.0	143.5	3.96

Forbrugstabel til 152. Række. Duelund. 1902.

Hold	Væxt- periode	Periode Nr.	Gennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr			Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Majs	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.						
A	I	3— 6 (56 Dage)	34.2	80.7	46.5	119.0	—	308	170.3	3.66
	II	7— 8 (28 —)	80.7	118.5	37.8	21.0	73.5	196	127.2	3.37
	III	9—11 (42 —)	118.5	164.2	45.7	152.3	54.3	189	238.1	5.21
B ₁	I	4— 6 (42 Dage)	39.3	80.5	41.2	89.8	—	238	129.5	3.14
	II	7— 8 (28 —)	80.5	113.5	33.0	18.7	65.3	196	116.7	3.54
	III	9—11 (42 —)	113.5	162.0	48.5	136.5	49.0	189	217.0	4.47
B ₂	I	3— 5 (42 Dage)	31.8	67.5	35.7	74.7	—	210	109.7	3.07
	II	6— 8 (42 —)	67.5	113.3	45.8	52.5	65.3	294	166.8	3.64
	III	9—11 (42 —)	113.3	161.0	47.7	136.5	49.0	189	217.0	4.55
C ₁	I	3— 5 (42 Dage)	38.3	71.2	32.9	82.8	—	210	117.8	3.58
	II	6— 8 (42 —)	71.2	119.7	48.5	54.8	68.8	294	172.6	3.56
	III	9—10 (28 —)	119.7	148.5	28.8	82.8	52.5	105	152.8	5.31
C ₂	I	1— 3 (42 Dage)	40.7	77.0	36.3	74.6	—	196	107.3	2.96
	II	4— 6 (42 —)	77.0	120.5	43.5	129.9	—	238	169.6	3.90
	III	7— 8 (28 —)	120.5	161.9	41.4	28.0	95.2	196	155.9	3.77
C ₃	I	2— 4 (42 Dage)	31.2	71.4	40.2	78.4	—	210	113.4	2.82
	II	5— 7 (42 —)	71.4	124.8	53.4	105.0	26.6	266	175.9	3.29
	III	8— 9 (28 —)	124.8	164.6	39.8	40.6	100.8	140	164.7	4.14
	IV	10—11 (28 —)	164.6	211.6	47.0	135.3	21.0	147	180.8	3.85

Forbrugstabel til 153. Række. Alslevgaard. 1902.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr						Beregnet Korn	
			1 Dyr's Vægt		Tilvæxt	Byg	Majs	Rug	Lucerne	Skummet Mælk	Valle	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.									
A	I	2—4 (42 Dage)	34.4	73.4	39.0	39.0	12.3	12.3	5.2	145	130.0	99.6	2.55
	II	5—7 (42 —)	73.4	112.8	39.4	—	49.3	49.3	22.2	—	483.8	143.3	3.64
	III	8—9 (28 —)	112.8	146.0	33.2	—	45.8	45.8	16.8	—	336.0	123.0	3.70
B ₁	II	2—4 (42 Dage)	71.2	115.4	44.2	—	51.3	51.3	19.4	—	513.0	149.3	3.38
	III	5—6 (28 —)	115.4	153.0	37.6	—	49.4	49.4	16.8	—	441.8	139.0	3.70
B ₂	I	3—5 (42 Dage)	38.2	75.4	37.2	42.3	13.6	13.6	5.6	152	136.0	107.2	2.88
	II	6—7 (28 —)	75.4	110.6	35.2	—	41.4	41.4	16.6	—	286.2	110.0	3.12
	III	8—9 (28 —)	110.6	145.6	35.0	—	51.5	51.5	16.8	—	334.4	134.3	3.84
C ₁	I	1—3 (42 Dage)	32.4	69.0	36.6	46.4	13.0	13.0	16.8	145	130.0	110.8	3.03
	II	4—6 (42 —)	69.0	113.6	44.6	—	56.1	56.1	25.0	—	520.8	160.6	3.60
	III	7—8 (28 —)	113.6	151.6	38.0	—	55.4	55.4	16.8	—	331.2	141.8	3.73
	IV	9—10 (28 —)	151.6	199.3	47.7	—	65.0	65.0	16.8	—	336.0	161.4	3.38
C ₂	I	1—3 (42 Dage)	40.6	76.6	36.0	28.0	25.6	25.6	16.8	70	286.0	118.1	3.28
	II	4—6 (42 —)	76.6	124.4	47.8	—	61.3	61.3	25.0	—	505.0	169.7	3.55
	III	7—8 (28 —)	124.4	163.1	38.7	—	59.8	59.8	16.8	—	297.6	147.8	3.82

Forbrugstabel til 154. Række. Constantinsborg. 1902.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr				Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Majs	Rug	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt	sluttet							
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
B ₁	I	2 - 4 (42 Dage)	39.7	76.7	37.0	15.2	46.6	—	168	89.8	2.43
	II	5 - 8 (56 —)	76.7	115.5	38.8	—	158.2	28.0	112	204.9	5.28
	III	9 - 11 (42 —)	115.5	159.1	43.6	—	86.8	86.8	112	192.3	4.41
B ₂	I	2 - 5 (56 Dage)	32.7	77.5	44.8	14.0	67.7	—	196	114.4	2.55
	II	6 - 8 (42 —)	77.5	112.5	35.0	—	93.3	22.2	84	129.5	3.70
	III	9 - 11 (42 —)	112.5	157.4	44.9	—	77.1	77.1	112	172.9	3.85
C ₁	I	2 - 4 (42 Dage)	40.2	77.8	37.6	14.0	42.0	—	168	84.0	2.23
	II	5 - 6 (28 —)	77.8	106.2	28.4	—	72.8	—	56	82.1	2.89
	III	7 - 9 (42 —)	106.2	158.2	52.0	—	102.6	57.8	84	174.4	3.35
	IV	10 - 11 (28 —)	158.2	199.9	41.7	—	80.5	80.5	84	175.0	4.20
C ₂	I	4 - 7 (56 Dage)	37.0	76.4	39.4	—	71.9	—	140	95.2	2.42
	II	8 - 9 (28 —)	76.4	114.4	38.0	—	51.3	51.3	56	111.9	2.94
	III	10 - 11 (28 —)	114.4	154.8	40.4	—	74.6	74.6	84	163.2	4.04
C ₃	I	3 - 6 (56 Dage)	32.3	72.7	40.4	—	72.3	—	168	100.3	2.48
	II	7 - 9 (42 —)	72.7	120.5	47.8	—	80.5	47.8	84	142.3	2.98
	III	10 - 11 (28 —)	120.5	156.6	36.1	—	59.5	59.5	84	133.0	3.68

Forbrugstabel til 155. Række. Rosenfeldt. 1902.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gennemsnit af		Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr							Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Majs	Hvede- strømel	Hvede	Byg	Kjær- ne- mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.									
A	I	1— 3 (42 Dage)	37.0	72.8	35.8	33.5	16.9	16.6	—	42.0	232.5	112.8	3.15
	II	4— 6 (42 —)	72.8	123.3	50.5	50.1	—	50.1	—	42.0	427.3	178.4	3.53
	III	7— 8 (28 —)	123.3	161.0	37.7	49.4	—	4.9	44.6	28.0	336.0	159.6	4.23
	IV	9—10 (28 —)	161.0	193.8	32.8	52.0	—	—	52.0	28.0	336.0	164.7	5.02
B ₁	I	1— 4 (56 Dage)	31.8	70.8	39.0	40.9	17.2	23.7	—	56.0	317.6	144.0	3.69
	II	5— 7 (42 —)	70.8	118.2	47.4	54.4	—	36.3	18.1	42.0	359.0	175.6	3.70
	III	8— 9 (28 —)	118.2	144.8	26.6	51.0	—	—	51.0	28.0	252.0	148.7	5.59
B ₂	I	3— 5 (42 Dage)	36.8	67.8	31.0	11.9	—	46.2	—	42.0	234.5	104.2	3.36
	II	6— 8 (42 —)	67.8	114.5	46.7	56.6	—	19.9	36.9	42.0	368.0	181.7	3.89
	III	9—10 (28 —)	114.5	148.8	34.3	48.1	—	—	48.1	28.0	252.0	142.9	4.17
B ₃	I	3— 5 (42 Dage)	37.2	70.2	33.0	11.0	—	43.3	—	42.0	219.6	97.9	2.97
	II	6— 8 (42 —)	70.2	113.6	43.4	53.2	—	17.6	35.6	42.0	360.2	173.4	4.00
	III	9—10 (28 —)	113.6	146.8	33.2	48.3	—	—	48.3	28.0	252.0	143.3	4.32
C ₁	I	1— 4 (56 Dage)	36.6	70.9	34.3	41.5	16.3	25.2	—	57.0	297.8	142.1	4.14
	II	5— 7 (42 —)	70.9	114.1	43.2	59.7	—	39.8	19.9	42.3	391.3	191.7	4.44
	III	8—10 (42 —)	114.1	163.9	49.8	85.7	—	—	85.7	42.0	378.0	241.4	4.85
C ₂	I	1— 4 (56 Dage)	37.2	78.4	41.2	47.8	18.1	29.7	—	56.0	341.8	161.9	3.93
	II	5— 7 (42 —)	78.4	123.6	45.2	58.6	—	39.4	19.2	42.0	380.6	187.6	4.15
	III	8— 9 (28 —)	123.6	151.4	27.8	54.7	—	—	54.7	28.0	252.0	156.1	5.62
C ₃	I	2— 5 (56 Dage)	32.0	70.4	38.4	20.1	6.2	46.6	—	56.0	292.8	131.0	3.41
	II	6— 8 (42 —)	70.4	122.0	51.6	62.2	—	21.9	40.3	42.0	359.1	191.3	3.71
	III	9—10 (28 —)	122.0	159.5	37.5	53.2	—	—	53.2	28.0	252.0	153.1	4.08

Forbrugstabel til 156. Række. Duelund. 1903.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr				Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Majs	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.							
B ₁	I	2— 5 (56 Dage)	36.5	73.3	36.8	8.2	86.3	119	168	142.3	3.87
	II	6— 8 (42 —)	73.3	116.5	43.2	—	144.7	—	140	168.0	3.89
	III	9—11 (42 —)	116.5	161.8	45.3	—	217.0	—	84	231.0	5.10
B ₂	I	1— 4 (56 Dage)	37.2	69.5	32.3	25.6	60.7	161	140	136.4	4.22
	II	5— 7 (42 —)	69.5	113.3	43.8	—	129.4	—	140	152.7	3.49
	III	8—10 (42 —)	113.3	160.2	46.9	—	200.6	—	112	219.3	4.68
C ₁	I	3— 6 (56 Dage)	36.0	80.5	44.5	—	118.5	77	182	161.6	3.63
	II	7— 8 (28 —)	80.5	119.1	38.6	—	116.7	—	98	133.0	3.45
	III	9—10 (28 —)	119.1	148.5	29.4	—	144.7	—	56	154.0	5.24
C ₂	I	2— 5 (56 Dage)	34.8	70.3	35.5	9.3	89.3	119	168	146.4	4.12
	II	6— 8 (42 —)	70.3	121.3	51.0	—	145.2	—	140	168.5	3.30
	III	9—11 (42 —)	121.3	162.7	41.4	—	224.0	—	84	238.0	5.75
C ₃	I	4— 6 (42 Dage)	37.3	78.8	41.5	—	99.8	35	133	127.8	3.08
	II	7— 8 (28 —)	78.8	113.3	34.5	—	103.2	—	98	119.5	3.46
	III	9—11 (42 —)	113.3	161.5	48.2	—	227.5	—	84	241.5	5.01
C ₄	I	2— 5 (56 Dage)	33.6	71.4	37.8	8.2	86.3	119	168	142.3	3.76
	II	6— 8 (42 —)	71.4	118.2	46.8	—	145.3	—	140	168.6	3.60
	III	9—11 (42 —)	118.2	167.7	49.5	—	227.5	—	84	241.5	4.88

Forbrugstabel til 157. Række. Tybrind. 1903.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr					Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Rug	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	Valle	ialt	Til 1 Pd. Til- væxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.								
A ₁	I	1— 3 (42 Dage)	41.3	74.5	33.2	22.9	45.7	102.9	92.4	21.0	102.9	3.10
	II	4— 6 (42 —)	74.5	119.7	45.2	38.5	77.0	58.1	102.9	275.1	165.3	3.66
	III	7— 9 (42 —)	119.7	166.7	47.0	34.5	129.3	42.0	109.2	302.4	214.2	4.56
A ₂	I	1— 4 (56 Dage)	32.5	68.0	35.5	28.8	57.6	129.5	100.1	58.8	129.6	3.65
	II	5— 7 (42 —)	68.0	108.3	40.3	32.6	65.0	107.8	83.3	194.6	145.7	3.62
	III	8—10 (42 —)	108.3	155.0	46.7	14.0	130.2	42.0	109.2	299.6	194.4	4.16
B ₁	I	1— 4 (56 Dage)	29.8	71.7	41.9	28.7	57.6	129.5	99.0	60.9	129.5	3.09
	II	5— 7 (42 —)	71.7	112.8	41.1	37.3	74.5	95.2	91.7	225.4	161.8	3.94
	III	8—10 (42 —)	112.8	162.0	49.2	16.3	147.5	42.0	109.2	302.4	214.2	4.35
B ₂	I	3— 5 (42 Dage)	38.3	78.0	39.7	24.7	49.4	111.2	63.0	96.5	111.1	2.80
	II	6— 8 (42 —)	78.0	124.8	46.8	38.0	75.9	77.0	97.3	250.6	163.8	3.50
	III	9—10 (28 —)	124.8	158.9	34.1	—	102.2	28.0	72.8	201.6	135.8	3.98
	IV	11—12 (28 —)	158.9	197.1	38.2	—	121.8	28.0	72.8	201.6	155.4	4.07
C ₁	I	1— 3 (42 Dage)	34.8	69.3	34.5	21.0	42.0	94.5	84.7	19.6	94.5	2.74
	II	4— 6 (42 —)	69.3	112.3	43.0	33.0	66.0	88.2	89.6	221.2	147.0	3.42
	III	7— 8 (28 —)	112.3	151.6	39.3	36.4	72.8	28.0	72.8	201.6	142.8	3.63
C ₂	I	1— 5 (70 Dage)	31.7	78.2	46.5	39.6	79.0	177.8	124.6	106.4	177.9	3.83
	II	6— 8 (42 —)	78.2	114.5	36.3	34.4	68.8	75.6	96.6	249.2	152.7	4.21
	III	9—11 (42 —)	114.5	161.7	47.2	—	149.8	42.0	109.2	302.4	200.2	4.24
C ₃	I	2— 5 (56 Dage)	33.5	75.1	41.6	29.7	59.7	134.0	87.5	93.1	134.1	3.22
	II	6— 8 (42 —)	75.1	119.1	44.0	32.5	65.1	73.5	95.6	247.1	146.4	3.33
	III	9—11 (42 —)	119.1	162.9	43.8	—	149.1	42.0	109.2	302.4	199.5	4.55
C ₄	I	2— 5 (56 Dage)	30.3	73.7	43.4	29.6	59.3	133.4	86.6	93.8	133.4	3.07
	II	6— 8 (42 —)	73.7	115.2	41.5	33.1	66.3	72.1	94.9	245.7	147.7	3.56
	III	9—10 (28 —)	115.2	161.2	36.0	—	93.8	28.0	72.8	201.6	127.4	3.54
	IV	11—12 (28 —)	151.2	196.3	45.1	—	120.4	28.0	72.8	201.6	154.0	3.41

Forbrugstabel til 158. Række. Rosvang. 1903.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr				Beregnet Korn	
			1 Dyr's Vægt		Tilvæxt	Byg	Majs	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.							
A	I	3— 5 (42 Dage)	36.5	75.0	38.5	36.8	22.8	252	56	110.9	2.88
	II	6— 7 (28 —)	75.0	107.3	32.3	35.0	35.0	112	112	107.4	3.33
	III	8—10 (42 —)	107.3	162.6	55.3	143.5	14.0	168	168	213.5	3.86
B ₁	I	2— 4 (42 Dage)	33.5	71.8	38.3	47.8	12.8	280	—	107.3	2.80
	II	5— 6 (28 —)	71.8	109.2	37.4	40.3	40.3	112	112	118.0	3.16
	III	7— 9 (42 —)	109.2	157.7	48.5	121.6	39.3	168	168	216.9	4.47
B ₂	I	2— 4 (42 Dage)	38.2	73.8	35.6	47.8	12.8	280	—	107.3	3.01
	II	5— 7 (42 —)	73.8	124.0	50.2	64.8	64.8	168	168	185.6	3.70
	III	8— 9 (28 —)	124.0	160.7	36.7	97.1	14.8	112	112	149.3	4.07
C ₁	I	1— 4 (56 Dage)	35.0	77.6	42.6	61.8	12.8	336	—	130.6	3.07
	II	5— 6 (28 —)	77.6	115.6	38.0	41.2	41.2	112	112	119.8	3.15
	III	7— 8 (28 —)	115.6	151.8	36.2	67.4	41.4	112	112	146.2	4.04
C ₂	I	2— 4 (42 Dage)	32.7	70.0	37.3	47.8	12.8	280	—	107.3	2.88
	II	5— 6 (28 —)	70.0	108.2	38.2	40.3	40.3	112	112	118.0	3.09
	III	7— 9 (42 —)	108.2	158.8	50.6	122.8	40.5	168	168	219.3	4.33
C ₃	I	2— 4 (42 Dage)	36.3	71.3	35.0	48.4	13.4	280	—	108.5	3.10
	II	5— 6 (28 —)	71.3	109.1	37.8	40.3	40.3	112	112	118.0	3.12
	III	7— 8 (28 —)	109.1	143.0	33.9	66.7	40.7	112	112	144.8	4.27

Forbrugstabel til 159. Række. Rosenfeldt. 1903.

Hold	Væxt- periode	Periode Nr.	Gennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr			Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.						
A	I	2— 4 (42 Dage)	40.6	81.0	40.4	95.1	112	140	137.1	3.39
	II	5— 7 (42 —)	81.0	120.7	39.7	129.9	42	210	171.9	4.33
	III	8— 9 (28 —)	120.7	151.2	30.5	109.2	28	140	137.2	4.50
B ₁	II	2— 4 (42 Dage)	67.2	116.8	49.6	129.5	42	210	171.5	3.46
	III	5— 6 (28 —)	116.8	152.4	35.6	117.6	28	140	145.6	4.09
B ₂	I	1— 3 (42 Dage)	28.6	72.4	43.8	86.1	182	70	128.1	2.92
	II	4— 5 (28 —)	72.4	107.2	34.8	84.0	28	140	112.0	3.22
	III	6— 8 (42 —)	107.2	155.3	48.1	160.7	42	210	202.7	4.21
C ₁	I	1— 2 (28 Dage)	45.5	77.0	31.5	59.5	28	168	92.2	2.93
	II	3— 4 (28 —)	77.0	110.2	33.2	86.8	28	140	114.8	3.46
	III	5— 6 (28 —)	110.2	146.0	35.8	115.5	28	140	143.5	4.01
C ₂	I	1— 3 (42 Dage)	38.0	83.2	45.2	93.1	112	140	135.1	2.99
	II	4— 5 (28 —)	83.2	118.8	35.6	91.0	28	140	119.0	3.34
	III	6— 7 (28 —)	118.8	154.0	35.2	116.9	28	140	144.9	4.12
C ₃	I	4— 5 (28 Dage)	50.4	79.6	29.2	64.4	28	140	92.4	3.16
	II	6— 7 (28 —)	79.6	111.6	32.0	88.9	28	140	116.9	3.65
	III	8— 9 (28 —)	111.6	149.2	37.6	110.6	28	140	138.6	3.69
C ₄	I	5— 7 (42 Dage)	38.8	81.0	42.2	97.0	112	140	139.0	3.29
	II	8— 9 (28 —)	81.0	114.8	33.8	92.4	28	140	120.4	3.56
	III	10— 11 (28 —)	114.8	149.0	34.2	117.6	28	140	145.6	4.26

Forbrugstabel til 160. Række. Rosvang. 1904.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr			Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Kjærnc-mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd Tilvæxt.
			begyndt	sluttet						
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
C ₁	I	1— 3 (42 Dage)	42.2	76.0	33.8	61.6	168	98	105.9	3.13
	II	4— 5 (28 —)	76.0	109.4	33.4	81.2	112	112	118.5	3.55
	III	6— 7 (28 —)	109.4	148.8	39.4	112.0	140	140	158.7	4.03
	IV	8— 9 (28 —)	148.8	187.8	39.0	144.2	140	140	190.9	4.89
C ₂	I	1— 4 (56 Dage)	38.2	80.0	41.8	81.2	224	154	144.2	3.45
	II	5— 6 (28 —)	80.0	117.4	37.4	86.8	126	126	128.8	3.44
	III	7— 8 (28 —)	117.4	154.4	37.0	117.6	140	140	164.3	4.44
C ₃	I	1— 4 (56 Dage)	35.4	76.6	41.2	81.2	224	154	144.2	3.50
	II	5— 6 (28 —)	76.6	112.2	35.6	86.8	126	126	128.8	3.62
	III	7— 9 (42 —)	112.2	161.6	49.4	187.6	210	210	257.6	5.21
C ₄	I	2— 5 (56 Dage)	32.0	79.6	47.6	79.8	189	189	142.8	3.00
	II	6— 7 (28 —)	79.6	111.8	32.2	84.0	140	140	130.7	4.06
	III	8— 9 (28 —)	111.8	150.0	38.2	121.8	140	140	168.5	4.41
C ₅	I	3— 5 (42 Dage)	36.4	78.0	41.6	68.6	154	154	119.9	2.88
	II	6— 7 (28 —)	78.0	113.8	35.8	84.0	140	140	130.7	3.65
	III	8— 9 (28 —)	113.8	148.8	35.0	121.8	140	140	168.5	4.81
	IV	10—11 (28 —)	148.8	186.4	37.6	137.2	140	140	183.9	4.89
C ₆	I	3— 5 (42 Dage)	33.4	71.6	38.2	67.2	154	154	118.5	3.10
	II	6— 8 (42 —)	71.6	124.2	52.6	133.0	210	210	203.0	3.86
	III	9—10 (28 —)	124.2	157.2	33.0	128.8	140	140	175.5	5.32
C ₇	I	4— 6 (42 Dage)	33.4	70.6	37.2	60.2	154	154	111.5	3.00
	II	7— 9 (42 —)	70.6	117.4	46.8	126.0	210	210	196.0	4.19
	III	10—11 (28 —)	117.4	150.6	33.2	120.4	140	140	167.1	5.03

Forbrugstabel til 161. Række. Rosvang. 1904.

Hold	Vægtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr				Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Majs	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt	sluttet							
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
B	I	2—5 (56 Dage)	29.6	79.8	50.2	58.1	25.9	203	203	151.7	3.02
	II	6—7 (28 —)	79.8	116.0	36.2	47.6	47.6	112	112	132.5	3.66
	III	8—9 (28 —)	116.0	149.0	33.0	56.0	56.0	112	112	149.3	4.52
C ₁	I	1—4 (56 Dage)	32.0	80.8	48.8	57.4	12.6	182	182	130.7	2.68
	II	5—6 (28 —)	80.8	113.4	32.6	42.0	42.0	112	112	121.3	3.72
	III	7—8 (28 —)	113.4	159.4	46.0	63.0	63.0	112	112	163.3	3.55
C ₂	I	1—4 (56 Dage)	34.2	80.4	46.2	57.4	12.6	182	182	130.7	2.83
	II	5—6 (28 —)	80.4	115.4	35.0	42.0	42.0	112	112	121.3	3.47
	III	7—8 (28 —)	115.4	159.4	44.0	63.0	63.0	112	112	163.3	3.71
C ₃	I	1—4 (56 Dage)	36.0	79.0	43.0	57.4	12.6	182	182	130.7	3.04
	II	5—6 (28 —)	79.0	112.4	33.4	42.0	42.0	112	112	121.3	3.63
	III	7—8 (28 —)	112.4	158.6	46.2	63.0	63.0	112	112	163.3	3.53
C ₄	I	1—3 (42 Dage)	40.6	79.8	39.2	61.6	—	126	126	103.6	2.64
	II	4—5 (28 —)	79.8	112.2	32.4	36.4	36.4	112	112	110.1	3.40
	III	6—7 (28 —)	112.2	150.8	38.6	58.8	58.8	112	112	154.9	4.01
	IV	8—9 (28 —)	150.8	194.6	43.8	70.0	70.0	112	112	177.3	4.05
C ₅	I	2—4 (42 Dage)	34.7	71.3	36.6	49.0	12.6	147	147	110.6	3.02
	II	5—6 (28 —)	71.3	108.0	36.7	42.0	42.0	112	112	121.3	3.31
	III	7—8 (28 —)	108.0	156.6	48.6	64.4	64.4	112	112	166.1	3.42

Forbrugstabel til 162. Række. Tybrind. 1904.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr						Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Bland-sød	Byg	Majs	Blod-foder	Kjærne-mælk	Valle	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt	sluttet									
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
B ₁	I	3— 6 (56 Dage)	32.2	70.0	37.8	113.0	—	—	—	98.0	196.1	145.6	3.85
	II	7— 9 (42 —)	70.0	115.5	45.5	—	43.9	43.9	26.5	54.0	234.6	142.9	3.14
	III	10—11 (28 —)	115.5	149.8	34.3	—	32.1	32.1	32.1	28.0	233.0	120.4	3.51
B ₂	I	2— 6 (70 Dage)	33.8	76.5	42.7	144.5	—	—	—	157.3	226.4	189.6	4.44
	II	7— 9 (42 —)	76.5	113.5	37.0	—	44.3	44.3	26.9	55.7	241.3	144.9	3.92
	III	10—11 (28 —)	113.5	149.5	36.0	—	31.3	31.3	31.3	28.0	226.2	117.5	3.26
C ₁	I	2— 6 (70 Dage)	35.0	77.7	42.7	149.4	—	—	—	162.5	234.6	196.1	4.57
	II	7— 9 (42 —)	77.7	118.7	41.0	—	53.0	53.0	31.7	59.9	293.4	172.2	4.20
	III	10—11 (28 —)	118.7	150.7	32.0	—	38.1	38.1	38.1	28.0	286.7	155.4	4.86
C ₂	I	1— 5 (70 Dage)	36.7	81.3	44.6	149.7	—	—	—	193.3	212.1	199.5	4.47
	II	6— 7 (28 —)	81.3	106.0	24.7	45.9	25.2	25.2	—	72.2	144.5	123.9	5.02
	III	8—10 (42 —)	106.0	155.2	49.2	—	57.8	57.8	57.8	42.0	436.9	216.8	4.41
C ₃	I	2— 5 (56 Dage)	37.3	73.3	36.0	111.3	—	—	—	133.9	177.5	148.4	4.12
	II	6— 8 (42 —)	73.3	118.8	45.5	38.1	36.6	36.6	15.3	74.5	230.7	158.2	3.48
	III	9—10 (28 —)	118.8	147.3	28.5	—	34.7	34.7	34.7	28.0	256.4	140.2	4.92
C ₄	I	4— 7 (56 Dage)	37.7	74.7	37.0	80.6	16.8	16.8	—	98.3	196.6	147.0	3.97
	II	8—10 (42 —)	74.7	114.7	40.0	—	37.7	37.7	37.7	42.0	255.4	141.4	3.54
	III	11—12 (28 —)	114.7	147.8	33.1	—	32.5	32.5	32.5	28.0	236.8	121.9	3.68

Forbrugstabel til 163. Række. Rosenfeldt. 1904.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr			Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.						
B ₁	I	1— 2 (28 Dage)	41.6	70.2	28.6	64.4	42	126	92.4	3.23
	II	3— 5 (42 —)	70.2	115.2	45.0	142.1	42	210	184.1	4.09
	III	6— 7 (28 —)	115.2	148.4	33.2	128.8	28	140	156.8	4.72
B ₂	I	1— 3 (42 Dage)	33.6	68.8	35.2	91.0	119	133	133.0	3.78
	II	4— 6 (42 —)	68.8	115.4	46.6	128.8	42	210	170.8	3.67
	III	7— 8 (28 —)	115.4	147.8	32.4	101.9	28	140	126.6	4.01
B ₃	I	2— 4 (42 Dage)	34.2	72.8	38.6	97.3	140	112	139.3	3.61
	II	5— 7 (42 —)	72.8	113.8	41.0	134.4	42	210	176.4	4.30
	III	8—10 (42 —)	113.8	158.7	44.9	172.2	42	210	214.2	4.77
B ₄	I	2— 4 (42 Dage)	36.2	78.4	42.2	98.0	140	112	140.0	3.32
	II	5— 7 (42 —)	78.4	113.4	35.0	137.2	42	210	179.2	5.12
	III	8—10 (42 —)	113.4	147.4	34.0	161.7	42	210	203.7	5.99
C ₁	I	1— 2 (28 Dage)	45.6	72.4	26.8	64.4	42	126	92.4	3.45
	II	3— 4 (28 —)	72.4	105.0	32.6	87.5	28	140	115.5	3.54
	III	5— 6 (28 —)	105.0	145.0	40.0	116.9	28	140	144.9	3.62
	IV	7— 8 (28 —)	145.0	185.4	40.4	149.8	28	140	177.8	4.40
C ₂	I	1— 2 (28 Dage)	39.2	68.0	28.8	64.4	42	126	92.4	3.21
	II	3— 5 (42 —)	68.0	114.4	46.4	138.6	42	210	180.6	3.89
	III	6— 8 (42 —)	114.4	164.1	49.7	190.4	42	210	232.4	4.68
C ₃	I	1— 2 (28 Dage)	44.0	74.6	30.6	64.4	42	126	92.4	3.02
	II	3— 5 (42 —)	74.6	123.0	48.4	142.1	42	210	184.1	3.80
	III	6— 7 (28 —)	123.0	165.7	42.7	139.3	28	140	167.3	3.92
C ₄	I	4— 6 (42 Dage)	31.0	70.6	39.6	92.4	140	112	134.4	3.39
	II	7— 9 (42 —)	70.6	120.2	49.6	140.7	42	210	182.7	3.68
	III	10—11 (28 —)	120.2	155.6	35.4	126.0	28	140	154.0	4.35

Forbrugstabel til 164. Række. Duelund. 1904.

Hold	Væxt- periode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr.		Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt	sluttet					
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
C ₁	I	1—3 (42 Dage)	34.2	71.4	37.2	60.2	210	95.2	2.56
	II	4—5 (28 —)	71.4	108.0	36.6	91.0	140	114.3	3.12
	III	6—8 (42 —)	108.0	158.6	50.6	212.8	210	247.8	4.90
C ₂	I	2—4 (42 Dage)	37.6	81.4	43.8	88.2	210	123.2	2.81
	II	5—6 (28 —)	81.4	119.2	37.8	113.4	140	136.7	3.62
	III	7—8 (28 —)	119.2	152.0	32.8	148.4	140	171.7	5.23
C ₃	I	2—4 (42 Dage)	35.6	80.2	44.6	88.2	210	123.2	2.76
	II	5—6 (28 —)	80.2	118.4	38.2	113.4	140	136.7	3.58
	III	7—8 (28 —)	118.4	147.4	29.0	148.4	140	171.7	5.92
C ₄	I	2—4 (42 Dage)	38.0	71.6	33.6	88.2	210	123.2	3.67
	II	5—7 (42 —)	71.6	120.0	48.4	152.6	210	187.6	3.88
	III	8—9 (28 —)	120.0	152.2	32.2	148.4	140	171.7	5.33
C ₅	I	4—5 (28 Dage)	39.2	69.4	30.2	74.2	140	97.5	3.23
	II	6—7 (28 —)	69.4	110.4	41.0	116.2	140	139.5	3.40
	III	8—9 (28 —)	110.4	145.6	35.2	148.4	140	171.7	4.88
C ₆	I	4—5 (28 Dage)	50.4	82.8	32.4	64.4	140	87.7	2.71
	II	6—7 (28 —)	82.8	122.4	39.6	117.6	140	140.9	3.56
	III	8—9 (28 —)	122.4	160.0	37.6	148.4	140	171.7	4.57

Forbrugstabel til 165. Række. Rosenfeldt. 1905.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr				Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Kokus- kager	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.							
B ₁	I	1— 3 (42 Dage)	42.2	81.7	39.5	94.5	—	84	168	136.5	3.46
	II	4— 5 (28 —)	81.7	111.0	29.3	92.8	—	28	140	120.8	4.12
	III	6— 9 (56 —)	111.0	155.2	44.2	196.0	28.7	14	196	269.3	6.09
B ₂	I	1— 3 (42 Dage)	45.2	80.4	35.2	94.5	—	84	168	136.5	3.88
	II	4— 5 (28 —)	80.4	109.0	28.6	92.4	—	28	140	120.4	4.21
	III	6— 8 (42 —)	109.0	159.6	50.6	177.1	15.8	14	154	226.2	4.47
C ₁	I	1— 2 (28 Dage)	44.5	70.5	26.0	61.3	—	70	98	89.3	3.43
	II	3— 5 (42 —)	70.5	119.5	49.0	141.7	—	42	210	183.7	3.75
	III	6— 7 (28 —)	119.5	151.8	32.3	124.3	5.2	14	112	152.2	4.71
C ₂	I	3— 6 (56 Dage)	35.5	77.7	42.2	103.3	1.8	154	182	161.7	3.83
	II	7— 9 (42 —)	77.7	117.7	40.0	103.6	22.0	—	126	153.9	3.85
	III	10—11 (28 —)	117.7	152.1	34.4	82.6	28.0	75	9	133.9	3.89
C ₃	I	4— 5 (28 Dage)	48.4	75.8	27.4	60.2	—	56	112	88.2	3.22
	II	6— 8 (42 —)	75.8	126.8	51.0	126.0	14.0	28	182	179.7	3.52
	III	9—10 (28 —)	126.8	158.8	32.0	100.8	33.6	33	51	159.6	4.99
C ₄	I	5— 6 (28 Dage)	47.4	78.4	31.0	63.0	1.8	56	112	93.4	3.01
	II	7— 8 (28 —)	78.4	108.6	30.2	77.0	11.5	28	140	120.3	3.98
	III	9—11 (42 —)	108.6	151.8	43.2	146.3	48.3	75	51	231.7	5.36
C ₅	I	6— 8 (42 Dage)	38.2	80.2	42.0	69.3	11.2	126	126	126.2	3.00
	II	9—11 (42 —)	80.2	116.8	36.6	104.3	37.1	89	79	181.8	4.97
	III	12—13 (28 —)	116.8	150.0	33.2	87.5	30.1	84	—	141.6	4.27
C ₆	I	7— 8 (28 Dage)	43.5	74.8	31.3	51.1	9.5	84	84	91.8	2.93
	II	9—10 (28 —)	74.8	106.5	31.7	66.5	23.1	47	79	118.3	3.73
	III	11—13 (42 —)	106.5	161.6	55.1	142.8	46.9	126	—	226.3	4.11

Forbrugstabel til 166. Række. Duelund. 1905.

Hold	Væxt- periode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr		Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt	sluttet					
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
B ₁	I	1— 3 (42 Dage)	30.0	68.2	38.2	64.4	210	99.4	2.60
	II	4— 6 (42 —)	68.2	117.8	49.6	137.2	210	172.2	3.47
	III	7— 8 (28 —)	117.8	157.4	39.6	120.4	140	143.7	3.63
	IV	9—10 (28 —)	157.4	207.9	50.5	147.0	140	170.3	3.37
C ₁	I	1— 2 (28 Dage)	51.0	73.0	22.0	46.9	140	70.2	3.19
	II	3— 5 (42 —)	73.0	114.8	41.8	126.0	210	161.0	3.85
	III	6— 8 (42 —)	114.8	156.6	41.8	170.8	210	205.8	4.92
C ₂	I	1— 2 (28 Dage)	53.5	75.0	21.5	46.9	140	70.2	3.27
	II	3— 4 (28 —)	75.0	112.0	37.0	91.0	140	114.3	3.09
	III	5— 6 (28 —)	112.0	146.2	34.2	119.0	140	142.3	4.16
	IV	7— 8 (28 —)	146.2	190.0	43.8	138.3	140	161.6	3.69
C ₃	I	2— 4 (42 Dage)	37.6	80.2	42.6	93.8	210	128.8	3.02
	II	5— 6 (28 —)	80.2	109.2	29.0	95.2	140	118.5	4.09
	III	7— 8 (28 —)	109.2	145.2	36.0	120.4	140	143.7	3.99
	IV	9—10 (28 —)	145.2	184.4	39.2	141.4	140	164.7	4.20
C ₄	I	2— 4 (42 Dage)	32.7	79.0	46.3	81.7	210	116.7	2.52
	II	5— 6 (28 —)	79.0	108.3	29.3	81.7	140	105.0	3.58
	III	7— 8 (28 —)	108.3	144.7	36.4	107.3	140	130.6	3.59
	IV	9—10 (28 —)	144.7	193.7	49.0	145.6	140	168.9	3.45
C ₅	I	1— 3 (42 Dage)	31.4	68.6	37.2	64.4	210	99.4	2.67
	II	4— 6 (42 —)	68.6	114.0	45.4	137.2	210	172.2	3.79
	III	7— 8 (28 —)	114.0	144.6	30.6	120.4	140	143.7	4.70
	IV	9—10 (28 —)	144.6	188.6	44.0	142.8	140	166.1	3.78

Forbrugstabel til 167. Række. Rosvang. 1905.

Hold	Væxt- periode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr			Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Kjærne- mælk	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt	sluttet						
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
C ₁	I	2— 3 (28 Dage)	37.0	66.4	29.4	40.6	52.5	164.5	76.8	2.61
	II	4— 6 (42 —)	66.4	120.0	53.6	131.6	—	336.0	187.6	3.50
	III	7— 8 (28 —)	120.0	158.2	38.2	127.4	—	224.0	164.7	4.31
C ₂	I	1— 3 (42 Dage)	31.2	68.2	37.0	54.6	91.0	203.0	103.6	2.80
	II	4— 6 (42 —)	68.2	118.2	50.0	131.6	—	336.0	187.6	3.75
	III	7— 8 (28 —)	118.2	155.2	37.0	127.4	—	224.0	164.7	4.45
C ₃	I	2— 4 (42 Dage)	34.2	75.4	41.2	61.6	52.5	276.5	116.5	2.83
	II	5— 7 (42 —)	75.4	121.4	46.0	137.2	—	336.0	193.2	4.20
	III	8— 9 (28 —)	121.4	160.8	39.4	137.2	—	224.0	174.5	4.43
C ₄	I	1— 3 (42 Dage)	33.6	65.4	31.8	54.6	91.0	203.0	103.6	3.26
	II	4— 6 (42 —)	65.4	115.2	49.8	131.6	—	336.0	187.6	3.77
	III	7— 8 (28 —)	115.2	153.0	37.8	127.4	—	224.0	164.7	4.36
C ₅	I	1— 3 (42 Dage)	34.0	66.4	32.4	54.6	91.0	203.0	103.6	3.20
	II	4— 6 (42 —)	66.4	117.2	50.8	131.6	—	336.0	187.6	3.69
	III	7— 8 (28 —)	117.2	153.4	36.2	127.4	—	224.0	164.7	4.55
C ₆	I	2— 4 (42 Dage)	36.6	78.8	42.2	77.0	52.5	276.5	131.9	3.13
	II	5— 6 (28 —)	78.8	111.0	32.2	95.2	—	224.0	132.5	4.11
	III	7— 8 (28 —)	111.0	148.0	37.0	127.4	—	224.0	164.7	4.45
C ₇	I	3— 5 (42 Dage)	33.6	75.4	41.8	70.0	—	329.0	124.8	2.99
	II	6— 7 (28 —)	75.4	108.2	32.8	98.0	—	224.0	135.3	4.13
	III	8— 9 (28 —)	108.2	148.2	40.0	137.2	—	224.0	174.5	4.36
	IV	10—11 (28 —)	148.2	186.0	37.8	150.5	—	259.0	193.7	5.12

Forbrugstabel til 168. Række. Tybrind. 1905.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr				Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Bland-sæd	Kjærne-mælk	Skummet Mælk	Valle	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt	sluttet							
			Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.	Pd.
C ₁	I	1— 3 (42 Dage)	53.3	77.7	24.4	88.2	63.0	201.6	—	132.3	5.42
	II	4— 6 (42 —)	77.7	113.5	35.8	127.4	49.0	163.3	155.8	175.8	4.91
	III	7— 9 (42 —)	113.5	158.5	45.0	181.2	42.0	160.1	320.2	241.6	5.37
C ₂	I	1— 4 (56 Dage)	41.0	73.0	32.0	98.0	84.0	210.0	—	147.0	4.59
	II	5— 7 (42 —)	73.0	107.8	34.8	124.0	49.0	154.3	154.8	170.8	4.91
	III	8—10 (42 —)	107.8	161.5	53.7	178.6	42.0	157.4	315.0	238.1	4.43
C ₃	I	3— 7 (70 Dage)	36.9	80.7	43.8	102.3	105.0	201.6	—	153.4	3.50
	II	8—10 (42 —)	80.7	117.2	36.5	99.8	42.0	78.4	157.5	133.0	3.64
	III	11—13 (42 —)	117.2	160.0	42.8	133.9	42.0	112.8	225.8	178.5	4.17
C ₄	I	1— 5 (70 Dage)	38.0	79.8	41.8	121.3	105.0	259.0	—	182.0	4.35
	II	6— 8 (42 —)	79.8	123.3	43.5	137.5	42.0	116.5	233.2	183.4	4.22
	III	9—10 (28 —)	123.3	155.5	32.2	116.0	28.0	102.0	204.1	154.7	4.80
C ₅	I	2— 6 (70 Dage)	33.7	80.2	46.5	124.0	105.0	267.4	—	185.1	4.00
	II	7— 8 (28 —)	80.2	110.7	30.5	94.0	28.0	80.0	160.0	125.3	4.11
	III	9—11 (42 —)	110.7	158.5	47.8	175.4	42.0	154.3	308.7	233.8	4.89
	IV	12—13 (28 —)	158.5	193.7	35.2	126.5	28.0	112.4	225.1	168.7	4.79
C ₆	I	2— 5 (56 Dage)	37.2	69.6	32.4	89.6	84.0	184.8	—	134.4	4.15
	II	6— 8 (42 —)	69.6	118.4	48.8	124.1	49.0	153.5	155.7	170.9	3.50
	III	9—10 (28 —)	118.4	154.2	35.8	111.8	28.0	97.8	195.7	149.1	4.17

Forbrugstabel til 169. Række. Sanderumgaard. 1905—06.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr					Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Korn	Blod-foder	Roer	Skummet Mælk	Valle	ialt	Til1Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.								
C ₁	I	1— 2 (28 Dage)	50.3	71.7	21.4	30.5	10.1	121.8	146.1	—	81.4	3.80
	II	3— 6 (56 —)	71.7	119.0	47.3	80.8	27.0	323.4	270.4	235.7	216.2	4.57
	III	7— 8 (28 —)	119.0	153.8	34.8	58.8	19.6	210.0	220.5	63.0	148.8	4.28
C ₂	I	1— 4 (56 Dage)	37.0	76.2	39.2	53.5	17.8	214.2	203.8	106.5	143.1	3.65
	II	5— 7 (42 —)	76.2	114.5	38.3	61.7	20.6	246.8	222.0	148.0	164.9	4.31
	III	8— 9 (28 —)	114.5	145.2	30.7	61.5	20.5	210.0	252.0	—	152.4	4.96
C ₃	I	1— 6 (84 Dage)	41.8	76.3	34.5	77.5	25.8	309.8	295.1	153.1	207.1	6.00
	II	7— 9 (42 —)	76.3	120.5	44.2	69.8	23.3	273.0	306.2	42.8	184.6	4.18
	III	10— 11 (28 —)	120.5	155.0	34.5	62.5	20.8	210.0	252.0	—	153.7	4.46
C ₄	I	1— 3 (42 Dage)	46.0	78.0	32.0	43.9	14.6	175.4	171.4	78.1	117.3	3.67
	II	4— 6 (42 —)	78.0	116.0	38.0	62.5	20.8	249.9	225.0	149.9	167.0	4.39
	III	7— 8 (28 —)	116.0	149.3	33.3	55.1	18.4	207.9	218.6	61.7	143.1	4.30
C ₅	I	1— 3 (42 Dage)	41.3	71.3	30.0	40.7	13.5	162.8	158.7	73.1	108.7	3.62
	II	4— 7 (56 —)	71.3	120.7	49.4	80.3	26.8	321.3	289.2	192.7	214.8	4.35
	III	8— 10 (42 —)	120.7	152.6	31.9	75.6	25.2	302.4	362.9	—	202.1	6.34
C ₆	I	1— 4 (56 Dage)	39.0	78.2	39.2	55.3	18.5	221.6	211.4	109.0	148.0	3.78
	II	5— 7 (42 —)	78.2	122.5	44.3	65.4	21.8	261.4	235.3	156.8	174.8	3.95
	III	8— 9 (28 —)	122.5	151.6	29.1	63.0	21.0	210.0	252.0	—	154.4	5.31

Forbrugstabel til 170. Række. Duelund. 1905—06.

Hold	Væxtperiode	Periode Nr.	Gjennemsnit af			Forbrugt Foder ialt til 1 Dyr				Beregnet Korn	
			1 Dyrs Vægt		Tilvæxt	Byg	Majs	Kokus- kager	Skummet Mælk	ialt	Til 1 Pd. Tilvæxt
			begyndt Pd.	sluttet Pd.							
B ₁	II	3— 6 (56 Dage)	74.2	122.4	48.2	81.8	15.7	32.5	280	187.5	3.89
	III	7— 8 (28 —)	122.4	154.6	32.2	37.8	37.8	25.2	140	132.5	4.11
B ₂	I	3— 6 (56 Dage)	37.0	83.4	46.4	52.5	12.6	21.7	280	140.7	3.03
	II	7— 8 (28 —)	83.4	115.0	31.6	29.4	29.4	19.6	140	108.2	3.42
	III	9—11 (42 —)	115.0	155.4	40.4	55.7	55.6	37.1	210	195.8	4.85
C ₁	I	1— 4 (56 Dage)	34.2	75.2	41.0	52.5	—	17.5	280	122.5	2.99
	II	5— 6 (28 —)	75.2	109.8	34.6	43.1	15.7	19.6	140	108.2	3.13
	III	7— 8 (28 —)	109.8	144.8	35.0	37.8	37.8	25.2	140	132.5	3.79
C ₂	I	1— 4 (56 Dage)	41.0	71.0	30.0	46.2	—	15.4	280	113.4	3.78
	II	5— 7 (42 —)	71.0	114.0	43.0	57.8	34.1	30.7	210	167.8	3.90
	III	8—10 (42 —)	114.0	145.8	31.8	64.5	64.5	43.0	210	221.3	6.96
C ₃	I	4— 6 (42 Dage)	36.0	72.4	36.4	42.0	12.6	18.2	210	113.9	3.13
	II	7— 8 (28 —)	72.4	105.4	33.0	29.4	29.4	19.6	140	108.2	3.28
	III	9—11 (42 —)	105.4	149.4	44.0	55.7	55.6	37.1	210	195.8	4.45
C ₄	I	1— 3 (42 Dage)	37.7	69.3	31.6	38.5	—	12.9	210	90.7	2.87
	II	4— 6 (42 —)	69.3	114.6	45.3	74.6	19.2	31.2	210	170.4	3.76
	III	7— 9 (42 —)	114.6	158.3	43.7	66.5	66.5	44.3	210	227.1	5.20

Kemiske Analyser af skummet Mælk, Kjærnemælk og Valle.

Forsøgs- række Nr.		Fedt	Ægge- hvide- stoffer	Mælke- sukker m m.	Aske	Vand
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
A. Skummet Mælk.						
138	Rosvang $27/9$ 99	0.09	3.68	4.76	0.78	90.69
140	Tybrind $14/10$ 99	0.12	3.30	4.83	0.82	90.93
142	do. $15/11$ 00	0.11	3.15	4.83	0.79	91.12
143	Rosvang $15/12$ 00	0.13	3.46	4.83	0.77	90.81
145	do. $3/9$ 01	0.14	3.61	4.69	0.81	90.75
146	Constantinsborg $19/9$ 01	0.12	3.37	4.60	0.83	91.08
147	Bregentved $3/12$ 01	0.12	3.43	4.87	0.74	90.84
148	Tybrind $14/9$ 01	0.12	3.28	4.61	0.82	91.17
149	Duelund $5/12$ 01	0.10	3.27	4.75	0.80	91.08
150	Rosvang $1/9$ 02	0.12	3.53	4.95	0.80	90.60
151	Tybrind { $23/8$ 02 $15/11$ 02	0.15 0.12	3.24 3.22	4.91 5.04	0.81 0.72	90.89 90.90
152	Duelund $21/8$ 02	0.08	3.30	4.75	0.80	91.07
153	Alslevgaard $24/7$ 02	0.09	3.16	5.00	0.76	90.99
154	Constantinsborg $15/8$ 02	0.17	3.34	4.71	0.78	91.00
155	Rosenfeldt $29/9$ 02	0.16	3.32	4.64	0.72	91.16
156	Duelund $11/11$ 03	0.08	3.25	4.76	0.78	91.13
157	Tybrind { $13/8$ 03 $19/11$ 03	0.11 0.14	3.21 3.29	4.77 4.95	0.79 0.78	91.12 90.84
158	Rosvang $23/9$ 03	0.14	3.68	4.92	0.81	90.45
159	Rosenfeldt $31/8$ 03	0.08	3.26	4.93	0.81	90.92
160	Rosvang $23/8$ 04	0.11	3.28	5.02	0.80	90.79
161	do. $26/9$ 04	0.17	3.89	4.56	0.81	90.57
163	Rosenfeldt $12/9$ 04	0.13	3.17	4.44	0.79	91.47
164	Duelund $23/9$ 04	0.12	3.38	4.70	0.88	90.92
165	Rosenfeldt $16/8$ 05	0.09	3.24	4.66	0.83	91.18
166	Duelund $23/9$ 05	0.08	3.55	4.43	0.78	91.16
167	Rosvang $9/10$ 05	0.15	3.83	4.71	0.81	90.50
168	Tybrind $26/12$ 05	0.09	3.21	4.85	0.83	91.02
169	Sanderumgaard $15/12$ 05	0.17	3.32	4.96	0.79	90.76
170	Duelund $18/4$ 06	0.11	3.00	4.76	0.79	91.34
	Gjennemsnit...	0.12	3.36	4.78	0.79	90.95
B. Kjærnemælk.						
140	Tybrind $14/10$ 99	0.52	2.80	3.73	0.73	92.22
141	Karlshøj $23/8$ 00	0.20	2.35	3.42	0.60	93.43
142	Tybrind $15/11$ 00	0.44	2.97	4.13	0.71	91.75
148	do. $14/9$ 01	0.31	2.34	3.37	0.72	93.26
151	do. { $23/8$ 02	0.28	1.29	1.91	0.44	96.08
	$15/11$ 02	0.29	2.07	3.03	0.61	94.00
155	Rosenfeldt $29/9$ 02	0.41	2.44	3.43	0.67	93.05
157	Tybrind { $13/8$ 03	0.31	1.33	1.88	0.39	96.09
	$19/11$ 03	0.30	2.66	3.77	0.65	92.62
158	Rosvang $28/9$ 03	0.54	2.86	3.62	0.61	92.37
159	Rosenfeldt $31/8$ 03	0.40	2.36	3.40	0.63	93.21

Forsøgs- række Nr.		Fedt pCt.	Ægge- hvide- stoffer pCt.	Mælke- sukker m. m. pCt.	Aske pCt.	Vand pCt.
	(Kjærnemælk.)					
160	Rosvang $\frac{28}{3}$ 04	0.39	2.49	3.79	0.63	92.70
161	do. $\frac{28}{9}$ 04	0.62	3.00	3.62	0.62	92.14
162	Tybrind $\frac{8}{11}$ 04	0.39	2.70	3.83	0.69	92.39
163	Rosenfeldt $\frac{12}{9}$ 04	0.35	2.10	2.65	0.58	94.32
165	do. $\frac{16}{8}$ 05	0.38	2.25	3.03	0.66	93.68
168	Tybrind $\frac{26}{12}$ 05	0.54	2.84	3.91	0.66	92.05
	Gjennemsnit...	0.39	2.40	3.33	0.62	93.26
	C. Valle.					
139	Rosenfeldt { 99.....	0.07	0.86	4.33	0.60	94.14
	{ 99.....	0.08	0.75	4.20	0.82	94.15
	{ 99.....	0.32	0.87	4.25	0.57	93.99
140	Tybrind $\frac{14}{10}$ 00	0.09	0.85	4.85	0.55	93.66
141	Karlshøj { $\frac{2}{7}$ 00	0.07	0.70	4.32	0.66	94.25
	{ $\frac{23}{8}$ 00	0.16	0.84	3.94	0.73	94.33
147	Bregentved $\frac{9}{9}$ 01	0.10	0.65	2.94	0.45	95.86
148	Tybrind $\frac{14}{9}$ 01	0.06	0.76	4.08	0.58	94.52
151	do. { $\frac{28}{8}$ 02	0.04	0.99	2.90	0.64	95.43
	{ $\frac{15}{11}$ 02	0.32	1.21	4.09	0.62	93.76
153	Alslevsgaard $\frac{13}{9}$ 02 ..	0.07	0.72	3.20	0.57	95.44
157	Tybrind { $\frac{13}{8}$ 03	0.27	0.74	3.43	0.65	94.91
	{ $\frac{19}{11}$ 03	0.17	0.74	4.07	0.60	94.42
162	do. $\frac{8}{11}$ 04	0.06	0.79	3.95	0.67	94.53
168	do. $\frac{26}{12}$ 05	0.06	0.80	4.27	0.67	94.20
169	Sanderumgaard $\frac{13}{12}$ 05	0.03	0.79	4.21	0.62	94.35
	Gjennemsnit...	0.12	0.82	3.94	0.62	94.50

Kemiske Analyser af Byg, Majs, Rug, Hvede, Blandsæd, Blodfoder og Kokuskager.

Forsøgs- række Nr.		Fedt	Ægge- hvide- stoffer	Suk- ker	Sti- velse	Pen- tosan o. s. v.	Rest andre org Stoffer	Celle- stof	Aske	Vand
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
A. Dansk Byg.										
138	Rosvang ²⁷ / ₉ 99.....	2.09	11.29	—	45.09	13.91		6.08	2.78	18.76
139	Rosenfeldt ³⁰ / ₈ 99....	2.43	12.69	—	42.35	18.52		7.32	2.62	14.07
140	Tybrind ² / ₁ 00.....	2.10	9.75	—	53.01	13.95		5.62	2.49	13.08
141	Karlshøj { ¹⁸ / ₇ 00....	1.88	7.19	—	49.31	14.51		6.50	2.63	17.98
	¹⁸ / ₁₂ 00....	2.45	9.63	—	49.39	14.78		5.16	2.18	16.41
142	Tybrind ¹⁵ / ₁₁ 00.....	2.01	8.38	—	48.36	13.66		5.12	2.55	19.92
143	Rosvang ¹⁵ / ₁₃ 00.....	1.70	13.48	—	39.35	15.07		8.11	2.94	19.35
145	do. ³ / ₉ 01.....	2.46	14.13	—	43.97	15.21		6.70	3.13	14.40
147	Bregentved { ² / ₁₂ 01..	2.33	10.78	—	47.25	15.57		6.82	2.48	14.77
	³ / ₁ 02..	2.00	9.79	—	45.21	8.09 10.43		4.84	2.34	17.30
148	Tybrind ¹⁴ / ₉ 01.....	2.52	10.21	—	48.90	16.84		5.22	2.51	13.80
149	Duelund ⁵ / ₁₂ 01.....	2.42	9.56	—	50.09	15.33		5.60	2.55	14.45
150	Rosvang ¹ / ₈ 02.....	2.16	13.15	—	46.93	9.65 4.00		5.35	2.64	16.12
151	Tybrind ²³ / ₈ 02.....	2.43	9.07	—	53.06	9.42 3.96		3.51	2.28	16.27
153	Alslevgaard ²⁴ / ₇ 02....	2.60	8.75	—	53.60	9.39 4.46		4.16	2.40	14.64
155	Rosenfeldt ²³ / ₁₀ 02...	2.45	10.45	—	43.20	10.39 8.16		4.81	3.09	17.45
156	Duelund ¹¹ / ₁₁ 03.....	2.03	8.35	—	49.33	9.14 3.47		4.68	2.12	20.88
157	Tybrind ¹³ / ₈ 03.....	2.29	8.58	—	50.64	9.54 4.93		4.47	2.45	17.10
158	Rosvang ²³ / ₉ 03.....	2.20	11.28	—	45.28	9.92 5.43		5.39	2.70	17.80
159	Rosenfeldt ²³ / ₉ 03....	2.09	8.35	—	63.11			3.64	1.98	20.83
160	Rosvang ²⁶ / ₃ 04.....	2.19	11.99	—	45.09	10.07 2.53		5.97	2.51	19.65
161	do. ²⁶ / ₉ 04.....	2.54	12.16	—	50.40	9.79 2.12		4.34	2.32	16.33
163	Rosenfeldt ¹⁰ / ₁₂ 04....	2.15	9.10	—	47.20	11.09 6.09		5.13	2.15	17.09
165	do. ²³ / ₁₀ 05....	2.02	10.93	—	62.49			3.95	2.28	18.33
166	Duelund ²³ / ₉ 05.....	2.69	8.25	—	50.99 9.53	2.43		4.76	2.09	19.26
167	Rosvang { ⁹ / ₁₀ 05....	2.30	11.56	—	46.17	11.20 4.01		5.34	2.96	16.46
	⁹ / ₁₀ 05....	2.64	9.63	—	48.24	10.85 3.82		4.53	2.38	17.91
	Gjennemsnit...	2.27	10.31	—	47.94	9.91 4.72		5.30	2.50	17.05
B. Russisk Byg.										
152	Duelund ²¹ / ₈ 02.....	2.39	12.24	—	46.65	10.40 4.97		5.55	3.18	14.62
159	Rosenfeldt ³ / ₈ 03....	2.42	12.38	—	47.84	10.15 6.04		4.94	2.83	13.40
162	Tybrind (¹ / ₂ d + ¹ / ₄ r) ⁸ / ₁₁ 04	2.48	12.09	—	49.09	10.89 3.55		5.42	2.75	13.73
163	Rosenfeldt ¹⁸ / ₇ 04....	2.39	12.59	—	49.27	10.95 2.82		5.14	3.11	13.73
164	Duelund ²³ / ₉ 04.....	2.56	12.13	—	50.09	10.85 2.43		5.92	2.83	13.19
165	Rosenfeldt ⁹ / ₇ 05....	2.23	12.17	—	63.81			4.55	2.73	14.51
166	Duelund ²³ / ₉ 05.....	2.52	12.50	—	43.97 11.11	8.68		5.12	2.58	13.52
170	do. ¹⁸ / ₄ 06.....	2.51	12.08	—	60.54			5.69	2.98	16.20
	Gjennemsnit...	2.44	12.27	—	47.62	10.67 4.73		5.29	2.87	14.11

Forsøgs- række Nr.		Fedt	Ægge- hvide- stoffer	Suk- ker	Sti- velse	Pen- tosan osv.	Rest andre org. Stoffer	Celle- stof	Aske	Vand
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
C. Majs.										
138	Rosvang $\frac{27}{9}$ 99.....	3.84	9.36	—	54.65	14.20		2.14	1.29	14.52
139	Rosenfeldt $\frac{30}{8}$ 99....	3.81	9.50	—	56.14	13.06		2.11	1.31	14.07
140	Tybrind $\frac{2}{1}$ 00.....	3.72	9.29	—	57.03	10.57		2.05	1.24	16.10
141	Karlshøj $\frac{16}{7}$ 00.....	3.77	8.75	—	58.20	9.89		2.08	1.11	16.20
147	Bregentved $\frac{9}{9}$ 01....	3.93	8.82	—	59.60	5.84	4.70	1.66	1.23	14.22
148	Tybrind $\frac{14}{9}$ 01.....	4.14	8.97	—	58.02	11.69		2.13	1.31	13.74
150	Rosvang $\frac{1}{9}$ 02.....	3.72	9.00	—	60.52	5.41	4.40	1.44	1.23	14.28
151	Tybrind $\frac{23}{8}$ 02.....	4.63	9.63	—	58.61	9.76		1.70	1.32	14.35
152	Duelund $\frac{21}{8}$ 02.....	4.13	10.10	—	54.73	5.53	7.23	1.50	1.35	15.43
153	Alslevgaard $\frac{24}{7}$ 02...	4.04	8.39	—	60.37	8.85		1.60	1.26	15.49
155	Rosenfeldt $\frac{16}{9}$ 02....	3.80	9.01	—	61.35	4.05	4.47	1.30	1.30	14.72
158	Rosvang $\frac{28}{9}$ 03.....	3.42	8.23	—	55.54	5.76	6.67	2.03	1.26	17.09
161	do. $\frac{26}{9}$ 04.....	3.86	9.63	—	53.60	6.17	8.84	1.57	1.27	15.06
162	Tybrind $\frac{8}{11}$ 04.....	3.75	9.12	—	58.85	6.29	4.00	1.56	1.19	15.24
170	Duelund $\frac{18}{4}$ 06.....	3.94	7.90	—	66.02			1.72	1.20	19.22
	Gjennemsnit...	3.90	9.05	—	57.41	5.56	5.73	1.77	1.26	15.32
D. Rug.										
146	Constantinsborg $\frac{19}{9}$ 01	1.94	8.13	—	56.77	11.42		5.08	1.68	14.98
147	Bregentved $\frac{11}{11}$ 01 ..	1.98	7.88	—	54.50	11.93		4.21	1.67	17.83
151	Tybrind $\frac{15}{11}$ 02.....	1.78	7.48	—	55.76	9.59	3.79	2.11	1.57	17.92
153	Alslevgaard $\frac{24}{7}$ 02 ..	2.32	10.42	—	53.41	10.58	2.64	2.13	1.89	16.61
157	Tybrind $\frac{13}{8}$ 03.....	1.53	8.10	—	54.43	9.98	5.50	2.14	1.49	16.83
169	Sanderumgaard $\frac{27}{12}$ 05	1.75	8.89	—	67.56			2.63	1.80	17.37
	Gjennemsnit...	1.88	8.48	—	54.17	9.90	3.92	3.05	1.68	16.92
E. Hvede.										
141	Karlshøj $\frac{16}{7}$ 00.....	1.79	9.69	—	57.17	9.95		3.34	1.67	16.39
155	Rosenfeldt $\frac{16}{9}$ 02....	1.78	11.00	—	53.17	7.53	6.19	2.44	2.01	15.88
169	Sanderumgaard $\frac{27}{12}$ 05	2.15	10.16	—	65.33			2.47	1.48	18.41
	Gjennemsnit...	1.91	10.28	—	53.22	7.26	5.97	2.75	1.72	16.89
F. Blandsød.										
168	Tybrind $\frac{26}{12}$ 05.....	2.24	8.81	—	68.87			3.08	2.30	14.70

Forsøgs- række Nr.		Fedt pCt.	Ægge- hvide- stoffer pCt.	Suk- ker pCt.	Sti- velse pCt.	Pen- tosan osv. pCt.	Rest andre org. Stoffer pCt.	Celle- stof pCt.	Aske pCt.	Vand pCt.
	G. Blodfoder.									
162	Tybrind ⁸ / ₁₁ 04	2.59	13.25	10.47	22.64	6.52	10.53	4.21	6.91	22.88
169	Sanderumgaard 06	2.84	12.74	54.97				3.98	6.29	20.18
	Gjennemsnit...	2.72	13.00	10.97	23.72	6.83	11.03	4.10	6.10	21.53
	H. Kokuskager.									
165	Rosenfeldt ²³ / ₁₀ 05 . . .	7.63	20.24	—	—	3.08	33.93	14.81	6.12	14.19
170	Duelund ¹⁸ / ₄ 06	8.84	22.13	—	—	38.08		15.62	7.10	8.23
	Gjennemsnit...	8.24	21.19	—	—	3.12	34.41	15.22	6.61	11.21

Kemiske Analyser af Roer og Grøntfoder.

Forsøgs- række Nr.		Fedt pCt.	Ægge- hvide- stoffer pCt.	Suk- ker pCt.	Pen- tosa- n osv. pCt.	Rest andre org. Stoffer pCt.	Celle- stof pCt.	Aske pCt.	Vand pCt.
A. Barresroer.									
141	Karlshøj { $\frac{17}{10}$ 00	—	—	6.72	—	—	—	—	88.54
169	Sanderumgaard { $\frac{21}{11}$ 00	—	0.39	6.79	2.48	—	0.80	1.14	88.40
	05	—	—	—	—	—	—	—	86.50
	Gjennemsnit...	—	0.39	6.76	3.10	—	0.80	1.14	87.81
B. Elvethamroer.									
143	Rosvang $\frac{16}{11}$ 00	—	—	5.76	—	—	—	—	89.31
C. Grøn Hvede- hakkelse.									
141	Karlshøj $\frac{27}{6}$ 00	0.68	2.00	—	12.98	—	8.70	1.91	73.73
D. Grøn Vikkehavre.									
141	Karlshøj $\frac{30}{7}$ 00	0.78	2.40	—	15.02	—	2.31	2.97	76.52
E. Grøntfoderprøve af gul Sennop.									
141	Karlshøj $\frac{14}{9}$ 00	0.59	1.92	—	7.29	—	4.73	2.47	83.00
F. Lúcerne.									
153	Alslevgaard { $\frac{26}{6}$ 02	—	3.09	—	2.85	6.73	6.05	2.04	79.24
	$\frac{18}{9}$ 02	—	3.26	—	2.14	7.55	4.20	2.27	80.58
	Gjennemsnit...	—	3.17	—	2.50	7.14	5.12	2.16	79.91

Gjennemsnittstal fra Temperaturiagttagelser.

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C°		
			Nr.	Maaned	i Luften	i Stalden	i Foderet
138	Rosvang 3 Juli—19 Novb. 1899 (140 Dage)	A—B ₁	I	Juli—Avg.	17.1	19.5	17.4
			II	Avg.—Septbr.	12.9	17.8	15.5
			III	Oktober	8.6	14.6	13.1
		B ₂ —D	I	Juli—Avg.	16.5	19.2	17.1
			II	September	11.6	17.0	14.8
			III	Oktober	8.3	14.5	13.2
		C	I	Juli—Avg.	16.7	19.5	17.2
			II	Avg.—Septbr.	12.9	17.8	15.5
			III	Oktober	8.9	14.7	13.3
139	Rosenfeldt 11 Juli—18 Oktb. 1899 (100 Dage)	A	II	Juli—Avg.	19.5	20.2	22.3
			III	September	13.4	17.3	21.3
		B	II	Juli—Avg.	19.5	20.2	22.3
			III	September	14.3	17.8	21.6
		C	II	Juli	22.3	22.5	23.8
			III	August	17.7	19.3	22.0
		D	IV	September	12.0	16.4	20.6
			II	Juli—Avg.	21.4	21.6	23.2
			III	Avg.—Septbr.	16.1	18.9	22.2
140	Tybrind 26 Juli—1 Jan. 1899—1900 (160 Dage)	A	I	August	19.2	19.2	18.7
			II	Septbr.—Okt.	11.9	15.9	15.8
			III	November	8.3	14.7	14.3
		B ₁ —C	I	Avg.—Septbr.	17.7	18.6	18.2
			II	Oktober	9.9	14.8	14.5
			III	Novb.—Decb.	5.8	13.4	13.0
		B ₂	I	Avg.—Septb.	18.7	19.1	18.6
			II	Septb.—Oktb.	10.4	15.1	14.8
			III	November	7.9	14.5	14.5
		D	I	August	19.2	19.2	18.7
			II	Septb.—Oktb.	12.9	16.4	16.4
			III	Oktb.—Novb.	8.3	14.6	14.1

Gjennemsnitstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C°		
			Nr.	Maaned	i Luften	i Stalden	i Foderet
141	Karlshøj 2 Juni—28 Decb. 1900 (210 Dage)	A	I	Juni—Juli	18.9	20.2	21.2
			II	Avg.—Septb.	17.0	19.5	20.6
			III	Septb.—Oktb.	11.0	16.4	16.0
		B ₁	I	Juni—Juli	18.9	20.2	21.2
			II	August	17.5	19.8	21.4
			III	Septb.—Oktb.	13.0	17.4	17.2
		B ₂	I	Juni—Juli	16.7	18.3	19.7
			II	Juli—Avg.	20.1	21.5	22.2
			III	Avg.—Septb.	15.3	18.5	19.6
		C ₁	I	Juni—Juli	18.5	19.8	20.5
			II	Juli—Avg.	19.1	21.0	22.2
			III	September	14.2	17.8	18.6
		C ₂	II	Juni—Juli	18.5	19.8	20.5
			III	Juli—Avg.	19.1	21.0	22.2
		C ₃	I	Avg.—Septb.	17.0	19.5	20.6
			II	Septb.—Oktb.	11.0	16.4	16.0
			III	November	6.0	11.7	13.6
142	Tybrind 17 Avg.—2 Febr. 1900—01 (170 Dage)	A	II	Septb.—Oktb.	12.9	16.3	16.3
			III	Oktb.—Novb.	6.4	14.5	13.9
		B	I	Septb.—Oktb.	12.2	15.8	15.6
			II	November	5.5	14.4	14.3
			III	December	3.5	13.9	13.9
		C ₁	I	Avg.-Sept.-Okt.	13.2	16.5	16.3
			II	November	5.5	14.4	14.3
			III	Decb.—Jan.	2.1	13.4	13.2
		C ₂	I	Avg.-Sept.-Okt.	14.2	16.9	16.8
			II	Oktb.—Novb.	6.4	14.5	13.9
			III	December	3.6	13.9	14.0
		C ₃	I	Avg.-Sept.-Okt.	13.2	16.5	16.3
			II	November	5.5	14.4	14.3
			III	December	3.5	13.9	13.9
		C ₄	I	Septb.—Oktb.	11.0	15.7	15.4
			II	Novb.—Decb.	4.8	14.3	14.2
			III	Decb.—Jan.	1.4	13.0	12.8
143	Rosvang 16 Septb.—13 Jan. 1900—01 (120 Dage)	A—B ₁ C ₁	I	Septb.—Oktb.	9.7	12.8	13.6
			II	Novb.—Decb.	4.1	9.1	13.4
			III	Decb.—Jan.	2.4	10.1	10.6
		B ₂ —C ₂	I	Septb.—Oktb.	10.5	13.4	13.9
			II	November	4.6	9.4	13.6
			III	December	4.1	10.0	11.3

Gjennemsnittstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C ^o		
			Nr.	Maaned	i Luften	i Stalden	i Foderet
145	Rosvang 15 Maj—1 Oktb. 1901 (140 Dage)	A	I	Maj—Juni	14.3	15.8	17.5
			II	Juli—Avg.	18.5	19.8	22.2
			III	September	13.1	16.1	19.2
		B ₁ —B ₂	I	Maj—Juni	13.3	15.1	16.5
			II	Juli	18.1	19.2	21.6
			III	Avgust	16.0	18.2	20.3
			IV	September	13.0	15.9	19.6
		B ₃	I	Juni—Juli	16.0	17.4	19.4
			II	Avgust	16.7	18.6	21.0
			III	September	13.0	15.9	19.6
		C ₁	I	Maj—Juni	13.3	15.1	16.5
			II	Juli	18.1	19.2	21.6
			III	Avg.—Septb.	14.6	17.1	19.6
		C ₂	I	Juni—Juli	17.2	18.3	20.6
			II	Avgust	16.0	18.2	20.3
			III	September	13.0	15.9	19.6
		C ₃	I	Juni—Juli	16.9	17.9	20.1
			II	Avgust	16.7	18.6	21.0
			III	September	13.0	15.9	19.6
146	Constantinsborg 14 Juni—3 Oktb. 1901 (112 Dage)	A—C ₁	I	Juli	20.0	21.4	22.3
			II	Avg.—Septb.	17.0	17.7	18.4
		B	II	Juli	20.0	21.4	22.3
			III	Avgust	18.1	18.3	19.2
			IV	September	14.9	16.4	16.9
		C ₂	II	Juli	20.0	21.4	22.3
			III	Avg.—Septb.	17.0	17.7	18.4
		C ₃	I	Juni—Juli	15.9	19.0	19.3
			II	Juli—Avg.	21.0	21.4	21.9
			III	September	15.3	16.6	17.2
147	Bregentved 15 Juli—12 Jan. 1901—02 (182 Dage)	A	I	Juli—Avg.—Sept.	17.3	18.0	20.9
			II	Oktober	11.1	14.0	19.6
			III	November	4.9	9.9	18.0
		B ₁	I	Avg.—Septb.	16.0	17.2	20.4
			II	Oktober	9.3	12.5	19.2
			III	November	4.9	9.9	18.0
		B ₂	II	Avg.—Septb.	16.3	17.3	20.4
			III	Oktober	12.4	15.4	19.7

Gjennemsnitstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C°		
			Nr.	Maaned	i Luften	i Stalden	i Foderet
147	(Bregentved)	B ₃ —C ₁	I	Avg.—Septb.	16.0	17.2	20.4
			II	Oktober	9.3	12.5	19.2
			III	Novb.—Decb.	4.0	9.2	17.6
		C ₂	I	Juli—Avg.	19.7	19.7	21.7
			II	September	14.0	16.0	19.9
			III	Oktober	9.3	12.5	19.2
		D	I	Avg.—Septb.	16.0	17.2	20.4
			II	Okth.—Novb.	8.1	11.9	18.9
			III	Novb.—Decb.	3.1	8.4	17.2
148	Tybrind 22 Juni—3 Jan. 1901—02 (196 Dage)	A—C ₂	I	Juli—Avg.	20.2	22.1	19.0
			II	Septb.—Okth.	14.7	18.5	14.2
			III	Oktober	9.7	18.2	10.7
		B	I	Avg.—Septb.	18.8	21.2	17.9
			II	Septb.—Okth.	13.8	18.8	13.3
			III	November	5.6	17.0	9.6
		C ₁	I	Juli	20.3	21.3	18.5
			II	Avg.—Septb.	17.6	20.3	16.9
			III	Septb.—Okth.	13.8	18.8	13.3
		C ₃	I	Juli—Avg.	20.4	21.6	18.7
			II	Avg.—Septb.	15.8	18.9	15.2
			III	Oktober	11.2	18.6	11.8
		C ₄	I	Juli	20.3	21.3	18.5
			II	Avg.—Septb.	17.6	20.3	16.9
			III	Septb.—Okth.	14.7	18.9	14.1
		C ₅	I	Avg.—Sept.—Okt.	15.4	19.0	14.9
			II	Oktober	4.9	9.9	18.0
			III	Novb.—Decb.	3.5	15.6	10.1
149	Duelund 2 Avg.—16 Jan. 1901—02 (168 Dage)	A	I	Avg.—Septb.	—	—	—
			II	Oktober	—	—	—
			III	Novb.—Decb.	2.6	10.5	12.8
		B ₁	I	Avg.—Septb.	—	—	—
			II	Oktober	—	—	—
			III	November	2.6	10.5	12.8
		B ₂ —C ₁	I	Avg.—Septb.	—	—	—
			II	Oktober	—	—	—
			III	November	2.8	10.3	12.8
		C ₂	IV	December	2.4	10.7	12.7
			I	Oktober	—	—	—
		C ₃	II	November	2.6	10.5	12.8
			III	December	3.0	9.8	9.4

Gjennemsnittstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C °		
			Nr.	Maaned	i Luft	i Stalden	i Foderet
150	Rosvang 29 April—15 Septb. 1902 (140 Dage)	A	I	Maj—Juni	9.4	12.9	12.4
			II	Juli	14.4	15.7	17.4
			III	Avgust	12.5	15.1	17.3
		B ₁ —B ₂ C ₃	I	Juni	12.9	15.8	15.7
			II	Juli	14.1	15.2	17.1
			III	Avgust	12.5	15.1	17.3
		C ₁ —C ₂	I	Maj—Juni	11.6	14.6	14.5
			II	Juli	14.1	15.2	17.1
			III	Avgust	12.5	15.1	17.3
151	Tybrind 4 Maj—1 Novb. 1902 (182 Dage)	A—C ₁	I	Juni—Juli	17.6	19.9	17.8
			II	Avg.—Septb.	14.7	19.5	18.0
			III	Oktober	11.0	16.0	15.9
		B ₁ —C ₃	I	Juni—Juli	17.7	19.4	17.5
			II	Avgust	15.6	20.2	18.3
			III	September	12.3	17.3	16.7
		B ₂	I	Juni—Juli	17.7	19.4	17.5
			II	Avgust	15.4	19.8	18.1
			III	September	13.6	18.5	17.4
		B ₃	I	Juni—Juli	17.6	19.9	17.8
			II	Avg.—Septb.	14.4	15.7	17.4
			III	Oktober	10.7	15.9	15.8
		C ₂	I	Maj—Juni	16.3	18.4	16.6
			II	Juli—Avg.	16.4	19.9	18.1
			III	September	14.8	19.6	18.0
			IV	Oktober	11.0	16.0	15.9
152	Duelund 16 Maj—30 Oktb. 1902 (168 Dage)	A	I	Juni—Juli	14.8	15.0	19.9
			II	Avgust	13.3	15.4	18.9
			III	Septb.—Oktb.	9.2	12.9	14.6
		B ₁	I	Juli	14.6	14.8	19.4
			II	Avgust	13.3	15.4	18.9
			III	Septb.—Oktb.	9.2	12.9	14.6
		B ₂	I	Juni—Juli	15.1	15.4	20.0
			II	Avgust	13.4	14.8	19.1
			III	Septb.—Oktb.	9.2	12.9	14.6
		C ₁	I	Juni—Juli	15.1	15.4	20.0
			II	Avgust	13.4	14.8	19.1
			III	September	10.0	13.4	13.9

Gjennemsnittstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C°		
			Nr.	Maaned	i Luften	i Stalden	i Foderet
152	(Duelund)	C ₂	I	Maj—Juni	14.9	15.1	20.6
			II	Juli	14.6	14.8	19.4
			III	Avgust	13.3	15.4	18.9
		C ₃	I	Juni—Juli	15.2	15.2	20.1
			II	Juli—Avg.	13.6	14.4	19.1
			III	September	12.7	15.5	16.4
			IV	Oktober	8.1	12.1	15.1
153	Alslevgaard 12 Juni—12 Novb. 1902 (154 Dage)	A	I	Juli—Avg.	15.4	18.0	17.3
			II	September	15.3	19.2	17.8
			III	Oktober	11.0	15.5	12.9
		B ₁	II	Juli	15.4	18.0	17.3
			III	Avgust	15.9	19.1	17.6
		B ₂	I	Juli—Avg.	15.0	17.9	17.6
			II	September	15.9	20.0	17.6
			III	Oktober	11.0	15.5	12.9
		C ₁	I	Juli	16.1	17.9	17.4
			II	Avgust	15.5	18.7	17.4
			III	September	12.5	16.6	15.7
			IV	Oktober	10.3	16.2	13.0
		C ₂	I	Juli	16.1	17.9	17.4
			II	Avgust	15.5	18.7	17.4
			III	September	12.5	16.6	15.7
		B ₁	I	Juli	16.0	17.6	18.0
			II	Avg.—Septb.	12.8	18.2	15.8
			III	Oktober	9.4	16.4	13.0
		B ₂	I	Juli—Avg.	15.4	17.1	17.4
			II	September	12.5	16.4	15.8
			III	Oktober	9.4	16.4	13.0
		C ₁	I	Juli	16.0	17.6	18.0
			II	Avgust	12.9	16.1	15.9
			III	Septb.—Oktb.	11.7	16.2	14.9
			IV	Oktb.—Novb.	9.3	16.7	12.9
		C ₂	I	Avg.—Septb.	13.9	16.6	16.5
			II	Oktober	9.8	15.3	13.5
			III	Oktb.—Novb.	9.3	16.7	12.9
		C ₃	I	Juli—Avg.	14.1	16.5	16.5
			II	Septb.—Oktb.	11.7	16.2	14.9
			III	Oktb.—Novb.	9.3	16.7	12.9

Gjennemsnitstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C°		
			Nr.	Maaned	i Luften	i Stalden	i Foderet
155	Rosenfeldt 8 Juli - 8 Decbr. 1902 (154 Dage)	A	I	Juli—Avg.	15.7	16.0	15.4
			II	September	13.0	15.0	15.0
			III	Oktober	8.1	12.4	13.0
			IV	November	4.1	10.0	12.3
		B ₁ —C ₂	I	Juli—Avg.	15.6	16.2	15.6
			II	September	10.5	13.3	13.8
			III	Oktober	7.4	12.9	13.4
		B ₂ —B ₃	I	Avg.—Septb.	14.4	15.7	15.5
			II	Septb.—Oktb.	8.7	12.4	13.1
			III	November	4.1	10.0	12.3
		C ₁	I	Juli—Avg.	15.6	16.2	15.6
			II	September	10.5	13.3	13.8
			III	Oktb.—Novb.	5.7	11.0	12.7
		C ₃	I	Avg.—Septb.	14.8	15.9	15.6
			II	Septb.—Oktb.	8.7	12.4	13.1
			III	November	4.1	10.0	12.3
156	Duelund 14 Maj—11 Novb. 1903 (182 Dage)	B ₁ —C ₂ C ₄	I	Juni—Juli	15.4	16.3	17.0
			II	Avgust	15.3	16.9	18.4
			III	Septb.—Oktb.	11.1	14.1	12.9
		B ₂	I	Maj—Juni	14.7	15.9	16.0
			II	Juli—Avg.	15.7	16.8	18.5
			III	September	13.0	15.4	14.9
		C ₁	I	Juni—Juli	15.4	16.2	17.9
			II	Avgust	14.7	16.5	17.3
			III	September	12.3	14.9	13.3
		C ₃	I	Juli	16.2	17.0	19.0
			II	Avgust	14.7	16.5	17.3
			III	Septb.—Oktb.	11.1	14.1	12.9
157	Tybrind 4 Juni—2 Decb. 1903 (182 Dage)	A ₁	I	Juni—Juli	18.4	18.5	17.4
			II	Juli—Avg.	17.5	18.5	17.1
			III	September	14.7	18.7	15.9
		A ₂ —B ₁	I	Juni—Juli	18.4	18.5	17.3
			II	Avgust	16.8	19.0	17.3
			III	Septb.—Oktb.	12.1	17.5	14.6
		B ₂	I	Juli	17.6	18.0	17.1
			II	Avg.—Septb.	15.8	18.8	16.7
			III	Oktober	11.4	17.7	14.4
			IV	November	8.1	16.6	13.8

Gjennemsnittstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C ^o		
			Nr.	Maaned	i Luften	i Stalden	i Foderet
157	(Tybrind)	C ₁	I	Juni—Juli	18.4	18.5	17.4
			II	Juli—Avg.	17.5	18.5	17.1
			III	September	15.1	18.5	16.3
		C ₂	I	Juni—Juli	18.0	18.3	17.2
			II	Avg.—Septb.	15.8	18.8	16.7
			III	Oktober	10.7	17.6	14.4
		C ₃	I	Juli	18.0	18.3	17.2
			II	Avg.—Septb.	15.8	18.8	16.7
			III	Oktober	10.7	17.6	14.4
		C ₄	I	Juli	18.0	18.3	17.2
			II	Avg.—Septb.	15.8	18.8	16.7
			III	Oktober	11.4	17.7	14.4
			IV	November	8.1	16.6	13.8
158	Rosvang 9 Juni—9 Novb. 1903 (154 Dage)	A	I	Juli—Avg.	14.5	18.5	15.5
			II	Avg.—Septb.	12.9	18.8	15.8
			III	Septb.—Oktb.	9.2	15.9	13.1
		B ₁ —C ₂	I	Juli	14.5	18.5	14.9
			II	August	13.7	18.4	16.1
			III	Septb.—Oktb.	10.9	17.7	14.3
		B ₂	I	Juli	14.5	18.5	14.9
			II	Avg. Septb.	13.3	18.7	15.9
			III	Septb.—Oktb.	10.1	16.9	13.7
		C ₁	I	Juni—Juli	14.1	18.0	14.7
			II	August	13.7	18.4	16.1
			III	September	12.0	19.0	14.9
		C ₃	I	Juli	14.5	18.5	14.9
			II	August	13.7	18.4	16.1
			III	September	12.0	19.0	14.9
159	Rosenfeldt 22 Juni—22 Novb. 1903 (154 Dage)	A	I	Juli—Avg.	16.4	17.6	18.6
			II	Avg.—Septb.	13.3	15.3	17.6
			III	Oktober	9.6	12.5	15.1
		B ₁	II	Juli—Avg.	16.4	17.6	18.6
			III	Avg.—Septb.	14.2	15.8	18.2
		B ₂	I	Juli	17.2	18.4	18.6
			II	August	15.2	16.4	17.7
			III	September	12.4	14.8	17.0
		C ₁	I	Juli	17.2	18.5	18.3
			II	August	16.6	17.5	18.2
			III	Avg.—Septb.	14.2	15.8	18.2

Gjennemsnittstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C°		
			Nr.	Maaned	i Luften	i Stalden	i Foderet
159	(Rosenfeldt)	C ₂	I	Juli	17.2	18.4	18.6
			II	Avgust	15.2	16.4	17.7
			III	September	12.8	15.0	17.3
		C ₃	I	Avgust	15.2	16.4	17.7
			II	September	12.8	15.0	17.3
			III	Oktober	9.6	12.5	15.1
		C ₄	I	Avg.—Septb.	13.3	15.3	17.6
			II	Oktober	9.6	12.5	15.1
			III	November	6.2	11.1	13.6
160	Rosvang 5 Jan.—6 Juni 1904 (154 Dage)	C ₁	I	Jan.—Febr.	1.4	10.1	9.2
			II	Febr.—Marts	÷-0.7	10.8	9.5
			III	Marts—April	3.8	12.5	12.3
			IV	April	7.3	13.6	12.3
		C ₂	I	Jan.—Febr.	0.7	10.3	9.4
			II	Marts	1.5	11.2	10.2
			III	April	6.0	13.7	12.7
		C ₃	I	Jan.—Febr.	0.7	10.3	9.4
			II	Marts	1.5	11.2	10.2
			III	April	6.4	13.5	12.5
		C ₄	I	Februar	0.4	10.7	9.8
			II	Marts—April	3.8	12.5	12.3
			III	April	7.3	13.6	12.3
		C ₅	I	Febr.—Marts	÷-0.3	10.8	9.6
			II	Marts—April	3.8	12.5	12.3
			III	April	7.3	13.6	12.3
			IV	Maj	9.9	15.4	14.1
		C ₆	I	Febr.—Marts	÷-0.3	10.8	9.6
			II	Marts—April	5.0	13.0	12.3
			III	Maj	7.5	13.4	12.5
		C ₇	I	Febr.—Marts	0.9	11.1	10.1
			II	April	6.4	13.5	12.5
			III	Maj	9.9	15.4	14.1
161	Rosvang 10 Maj—10 Oktb. 1904 (154 Dage)	B	I	Juni—Juli	12.5	17.4	16.0
			II	Juli—Avg.	15.5	20.5	18.8
			III	Avg.—Septb.	13.7	22.5	17.7
		C ₁ —C ₂ C ₃	I	Maj—Juni	10.8	16.0	14.7
			II	Juli	14.3	19.9	18.0
			III	Avgust	15.2	20.9	18.3

Gjennemsnittstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C °		
			Nr.	Maaned	i Luften	i Stalden	i Foderet
161	(Rosvang)	C ₄	I	Maj - Juni	10.5	16.1	14.7
			II	Juni—Juli	13.0	17.5	16.3
			III	Juli—Avg.	15.5	20.5	18.8
			IV	Avg.—Septb.	13.7	22.5	17.7
		C ₅	I	Juni	11.8	16.8	15.4
			II	Juli	14.3	19.9	18.0
			III	Augst	15.2	20.9	18.3
162	Tybrind 28 Maj—25 Novb. 1904 (182 Dage)	B ₁	I	Juli—Avg.	18.9	19.6	18.3
			II	Avg.—Septb.	14.8	18.5	15.7
			III	Oktober	10.2	15.5	13.6
		B ₂ —C ₁	I	Juni—Juli	18.1	18.7	17.6
			II	Avg.—Septb.	14.8	18.5	15.7
			III	Oktober	10.2	15.5	13.6
		C ₂	I	Juni—Juli	17.9	18.4	17.4
			II	Augst	16.1	20.0	16.2
			III	Septb.—Okth.	12.7	17.1	15.0
		C ₃	I	Juni—Juli	18.1	18.7	17.6
			II	Avg.—Septb.	15.4	19.2	15.9
			III	Septb.—Okth.	11.8	16.5	14.8
		C ₄	I	Juli—Avg.	19.0	21.1	18.6
			II	Septb.—Okth.	12.7	17.1	15.0
			III	Okth.—Novb.	8.9	15.2	12.6
163	Rosenfeldt 6 Juni—4 Decb. 1904 (182 Dage)	B ₁ —C ₃	I	Juni	15.6	17.2	18.6
			II	Juli—Avg.	18.5	20.3	21.2
			III	Avg.—Septb.	16.6	18.3	19.6
		B ₂	I	Juni—Juli	16.3	18.0	19.1
			II	Juli—Avg.	17.9	19.9	21.0
			III	September	14.4	17.6	19.3
		B ₃ —B ₄	I	Juli	16.9	18.8	19.9
			II	Avg.—Septb.	17.6	19.2	10.4
			III	Septb.—Okth.	10.3	14.4	18.3
		C ₁	I	Juni	15.6	17.2	18.6
			II	Juli	18.2	20.1	20.9
			III	Augst	17.6	19.5	20.8
			IV	September	14.4	17.6	19.3
		C ₂	I	Juni	15.6	17.2	18.6
			II	Juli—Avg.	18.5	20.3	21.2
			III	Avg.—Septb.	15.0	17.8	19.3
		C ₄	I	Juli—Avg.	17.9	19.9	21.0
			II	September	13.5	16.8	19.2
			III	Oktober	7.5	11.6	15.9

Gjennemsnitstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C°		
			Nr.	Maaned	i Luften	i Stalden	i Foderet
164	Duelund 9 Juni—26 Oktb. 1904 (140 Dage)	C ₁	I	Juni—Juli	15.5	16.2	18.9
			II	Juli—Avg.	17.5	18.1	20.4
			III	Avg.—Septb.	13.1	15.7	15.9
		C ₂ —C ₃	I	Juli	16.7	17.4	19.9
			II	Avgust	15.3	16.4	17.1
			III	September	12.4	15.4	16.3
		C ₄	I	Juli	16.7	17.4	19.9
			II	Avg.—Septb.	14.8	16.4	16.9
			III	Septb.—Oktb.	10.1	13.7	15.6
		C ₅ —C ₆	I	Juli—Avg.	17.5	18.1	20.4
			II	Avg.—Septb.	14.3	16.5	15.9
			III	Septb.—Oktb.	10.1	13.7	15.6
165	Rosenfeldt 22 Maj—17 Decb. 1905 (210 Dage)	B ₁	I	Juni	18.5	19.5	20.0
			II	Juli	18.5	20.0	21.6
			III	Avg.—Septb.	16.0	18.0	21.3
		B ₂	I	Juni	18.5	19.5	20.0
			II	Juli	18.5	20.0	21.6
			III	Avg.—Septb.	17.0	18.7	21.5
		C ₁	I	Juni	17.4	19.2	18.6
			II	Juli	19.2	20.1	22.0
			III	Avgust	17.9	19.6	21.6
		C ₂	I	Juli—Avg.	19.1	20.0	21.7
			II	Avg.—Septb.	15.1	17.4	21.6
			III	Oktober	7.2	11.6	15.2
		C ₃	I	Juli	18.5	20.0	21.6
			II	Avg.—Septb.	17.0	18.7	21.5
			III	Septb.—Oktb.	10.8	14.2	19.1
		C ₄	I	Juli—Avg.	18.4	19.8	21.1
			II	Avg.—Septb.	16.2	18.1	22.0
			III	Septb.—Oktb.	9.1	13.0	17.0
		C ₅	I	Avg.—Septb.	17.0	18.7	21.5
			II	Septb.—Oktb.	9.1	13.0	17.0
			III	November	4.2	11.2	12.3
		C ₆	I	Avg.—Septb.	16.2	18.1	22.0
			II	Septb.—Oktb.	10.8	14.2	19.1
			III	Oktb.—Novb.	4.6	11.1	12.5

Gjennemsnitstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C°		
			Nr.	Maaned	i Luften	i Stalden	i Foderet
166	Duelund 10 Juni—27 Oktb. 1905 (140 Dage)	B ₁ —C ₅	I	Juni—Juli	18.4	18.4	22.6
			II	Avgust	15.9	16.2	18.2
			III	September	12.3	13.9	16.1
			IV	Oktober	—	—	14.0
		C ₁	I	Juni	18.6	18.7	23.4
			II	Juli—Avg.	17.1	17.0	19.5
			III	Avg.—Septb.	13.0	14.4	16.5
		C ₂	I	Juni	18.6	18.7	23.4
			II	Juli	17.6	17.5	19.8
			III	Avgust	15.4	15.7	18.2
			IV	September	12.3	13.9	16.1
		C ₃ —C ₄	I	Juli	18.4	18.4	21.1
			II	Avgust	15.4	15.7	18.2
			III	September	12.3	13.9	16.1
			IV	Oktober	—	—	14.0
167	Rosvang 20 Juni—20 Novb. 1905 (154 Dage)	C ₁	I	Juli	15.1	19.9	17.7
			II	Avgust	14.5	18.7	17.4
			III	September	10.2	16.5	14.8
		C ₂ —C ₄	I	Juli	15.8	20.2	17.6
			II	Avgust	14.5	18.7	17.4
			III	September	10.2	16.5	14.8
		C ₃	I	Juli—Avg.	15.1	19.6	18.0
			II	Avg.—Septb.	13.3	18.2	16.3
			III	Oktober	6.9	14.4	13.8
		C ₆	I	Juli—Avg.	15.1	19.6	18.0
			II	Avg.—Septb.	14.2	18.5	16.7
			III	September	10.2	16.5	14.8
		C ₇	I	Juli—Avg.	15.0	19.1	17.5
			II	September	12.6	18.2	16.6
			III	Oktober	6.9	14.4	13.8
			IV	November	6.1	12.4	12.8
168	Tybrind 22 Juni—20 Decb. 1905 (182 Dage)	C ₁	I	Juli	20.0	—	22.0
			II	Avg.—Septb.	19.5	—	23.7
			III	Septb.—Oktb.	10.4	15.7	17.9
		C ₂	I	Juli—Avg.	20.3	—	23.5
			II	Avg.—Septb.	16.8	18.0	21.3
			III	Oktober	8.1	15.2	17.2

Gjennemsnittstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C°		
			Nr.	Maaned.	i Luften	i Stalden	i Foderet
168	(Tybrind)	C ₃	I	Avg.—Septb.	18.2	18.0	22.7
			II	Oktober	8.1	15.2	17.2
			III	Novb.—Decb.	3.7	14.8	15.8
		C ₄	I	Juli—Avg.	20.4	—	23.5
			II	Septb.—Oktb.	13.7	17.2	19.5
			III	Oktb.—Novb.	6.5	14.9	16.9
		C ₅	I	Juli Avg.	19.7	—	23.0
			II	Septb.—Oktb.	12.0	16.5	18.7
			III	Oktb.—Novb.	6.2	15.2	17.0
			IV	December	2.8	14.2	15.1
		C ₆	I	Juli—Avg.	20.4	—	23.5
			II	Septb. Oktb.	13.7	17.2	19.5
			III	Oktb.—Novb.	6.5	14.9	16.9
169	Sanderumgaard 1 Novb.—15 Maj 1905—06 (196 Dage)	C ₁	I	November	3.6	8.5	9.6
			II	Decb.—Jan.	1.4	7.8	8.1
			III	Februar	0.7	8.7	8.9
		C ₂ —C ₆	I	Novb.—Decb.	3.0	8.5	9.3
			II	Januar	0.6	7.5	7.7
			III	Februar	1.2	9.1	9.7
		C ₃	I	Nov.-Dec.-Jan.	2.1	8.0	8.6
			II	Februar	1.2	8.9	9.4
			III	Marts	1.8	8.4	10.6
		C ₄	I	Novb.—Decb.	3.0	8.3	9.2
			II	Decb.—Jan.	1.2	7.9	7.9
			III	Februar	0.7	8.7	8.9
		C ₅	I	Novb. - Decb.	3.0	8.3	9.2
			II	Dec.—Jan.	1.2	8.0	8.2
			III	Febr.—Marts	1.6	9.0	10.2
170	Duelund 9 Decb. - 11 Maj 1905—06 (154 Dage)	B ₁	II	Jan.—Febr.	0.3	7.6	11.6
			III	Marts	1.6	9.2	8.5
		B ₂	I	Jan.—Febr.	0.3	7.6	11.6
			II	Marts	1.6	9.2	8.5
			III	April—Maj	8.3	12.2	9.8
		C ₁	I	Decb.—Jan.	1.0	6.2	12.9
			II	Februar	÷0.3	8.2	10.2
			III	Marts	1.6	9.2	8.5

Gjennemsnittstal fra Temperaturiagttagelser (fortsat).

Række Nr.	Gaard	Hold	Væxtperiode		C °		
			Nr.	Maaned	i Luftten	i Stalden	i Foderet
170	(Duelund)	C ₂	I	Decb.—Jan.	1.0	6.2	12.9
			II	Febr.—Marts	0.7	8.6	9.8
			III	Marts April	4.9	10.8	8.9
		C ₃	I	Februar	÷0.2	7.6	10.4
			II	Marts	1.6	9.2	8.5
			III	April - Maj	8.3	12.2	9.8
		C ₄	I	Decb —Jan.	1.6	6.1	14.0
			II	Februar	÷0.2	7.6	10.4
			III	Marts—April	3.7	10.5	9.0

Forsøgsdyrenes Afstamning.*)

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
138	A	2	14/4 1899	Ac. Gaardbo- gaard pr. Aalbæk.	Johnny, Ac. Gaardbo- gaard, f. 23/4 1897, indf. fra Svaløf.	Kitty 3, Ac. Gaardbo- gaard, f. 19/5 1897, indf. fra Svaløf.				
		4	15/4 1899	do.	do.	Betzy 1, Ac. Gaardbo- gaard, f. 12/5 1897, indf. fra Svaløf.				
	B ₁	6	19/4 1899	Tutein, Boller pr. Hjørring.	Yorkshire- orne. Ac. Gaarbo- gaard.	So af Land- race, Boller, f. 16/6 1898.	Johnny, Ac. Gaardbo- gaard, f. 23/4 1897, indf. fra Svaløf.	Kate 4, Ac. Gaardbo- gaard, f. 19/5 1897, indf. fra Svaløf.	Svend, Ac. Kornum- gaard, f. April 1897, Stbg. 118. *	Agnes, Ac. Kornum- gaard, f. 14/1 1897.
	B ₂	6	13/5 1899	Nielsen, Overvad, Arden.	Yorkshire- orne, tillagt paa Christianslund	So af Landrace, Overvad, fra Ac. Bøgsted.				
	C	6	Maj 1899	Ac. Bøgsted pr. Hjørring, Ac. Kornum- gaard pr. Brønderslev.	Kaarede Orner paa Ac. Bøgsted og Ac. Kornum- gaard.	Kaarede Sør paa Ac. Bøgsted og Ac. Korn- numgaard.				

Rosvang.

139	Rosenfeldt.	A	5	fra $\frac{21}{3}$ til $\frac{9}{4}$ 1899	Ac. Thors- lundegaard pr. Taastrup.	Mr. Barron, Ac. Thors- lundegaard.	5 kaarede Søer. Ac. Thors- lundegaard.				
		B	5	?	Benzonsdal pr. Taastrup.	Orne af York- shirerace.	So af Landrace.				
		C	2	$\frac{28}{2}$ 1899	Ac. Skuldelev pr. Skibby.	Hasej, Ac. Skuldelev.	Gine II., Ac. Skuldelev, f. Januar 1898				
			3	$\frac{27}{3}$ 1899	Ac. Vilhelms- haab pr. Taastrup.	Peter II. Vilhelmsaab.	Else II. Vilhelmsbaab.				
140	Tybrind.	A	1	$\frac{6}{5}$ 1899	Ac. Raundrup- Vænge pr. Kværndrup.	Yorkshire- orne. Ac. Raundrup- Vænge.	Nr. 20. Ac. Raundrup- Vænge.				
			2	$\frac{18}{4}$ 1899	do.	do.	Nr. 18. Ac. Raundrup- Vænge.				
			3	$\frac{29}{4}$ 1899	Ac. Christians- lund pr. Bogense.	Yorkshire- orne. Ac. Christians- lund	Nr. 7. Ac. Christians- lund.				
		B ₁	6	fra $\frac{14}{5}$ til $\frac{25}{5}$ 1899	Wedellsborg pr. Ejby.	Yorkshire- orne paa Wedellsborg.	Landracesøer paa Wedells- borg.				
		B ₂	6	fra $\frac{14}{5}$ til $\frac{25}{5}$ 1899	Som ovenfor.	Som ovenfor.	Som ovenfor.				

*) Se Forklaringen Side 141.

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
140 fortsat	C	6	$\frac{20}{5}$ 1899	Ac. Taarup- gaard pr. Aarup.	Orne af Landrace. Ac. Taarup- gaard.	Nr. 29. Ac. Taarup- gaard, f. Januar 1897.				
141 Karlshej.	A	3	$\frac{13}{8}$ 1900	Ac. Oppe- sundby pr. Frederiks- sund.	Kimberley, f. $\frac{17}{12}$ 1898, indført fra England.	Manør Nr. 15, Ac. Oppe- sundby, f. $\frac{2}{3}$ 1895.				
		2	$\frac{13}{8}$ 1900	do.	do.	Daisy, Ac. Oppe- sundby, f. $\frac{3}{9}$ 1896.		Gyldensten Nr. 26. f. $\frac{13}{2}$ 1895.		Manør Nr. 15, Ac. Oppe- sundby. f. $\frac{2}{3}$ 1895.
	B ₁	5	$\frac{21}{3}$ 1900	Lars Frandsen, Gudum pr. Slagelse.	Yorkshire- orne, f. $\frac{30}{1}$ 1899 i Gudum.	So af Landrace, Gudum.	Holywell Cheerfull, Ac. Raundrup- Vænge, f. $\frac{17}{4}$ 1897, indført fra England.	Borrowfield Rose, f. $\frac{2}{3}$ 1897.	Daastrup X., Ac. Havre- bjærg, f. Decbr. 1896, Stbg. 22.	Homlebi.
	B ₂	4	$\frac{2}{3}$ 1900	Jens Nielsen, Taastrup.	Thor, Avlsforenings- orne i Stevns.	So hos Jens Nielsen, Taastrup, f. $\frac{6}{9}$ 1898.	M. Barron, Ac. Thors- lundegaard, f. 1895.	Alexandra IV. Ac. Thors- lundegaard, f. $\frac{30}{10}$ 1896.	Klippinge- ornen, Avlsforenings- orne i Stevns, f. Januar 1897.	So hos Kr. Pe- dersen, Hellested, født 1895 i Vendsyssel.

141	fortsat	C ₁	6	8/3 1900	Ac. Bøgsted pr. Hjørring.	Bengt, Ac. Bøgsted, f. 8/9 1898.	Bruno, Ac. Bøgsted, f. 19/5 1898.	Svend, Ac. Kornum- gaard, f. April 1897, Stbg. 118. *	Sara 2, Ac. Skinnerup, f. Novbr. 1897.	Leif, Ac. Bøgsted, f. 12/7 1897, Stbg. 84.	Malle 5, Ac. Bøgsted, f. 1895, Stbg. 35. *
		C ₂	5	10/2 1900	Povl Nielsen, Karlsbøj.	Herodes, Havgaard, Rødvig, f. 5/10 1898.	So paa Karlsbøj.	Jonas, Ac. Kornum- gaard, f. 17/9 1897, Stbg. 41.	Anna 13, Ac. Kornum- gaard, f. 14/12 1896, Stbg. 28. *	Dujas, Avlsforenings- orne i Stevns, f. Febr. 1892.	So paa Karlsbøj.
		C ₃	4	9/2 1900	H. Kr. Jensen, Hyllested.	Torstenæs, f. 27/4 1897, Stbg. 23.	Gine II, f. 24/6 1897.	Jumbo, f. August 1895. Stbg. 23. *	So fra Kokseby paa Møen.	Aasgaard, Ac. Høve, f. April 1895. Stbg. 94. *	Gine, Ac. Høve, f. Juni 1896. Stbg. 97. *
142	Tybrind.	A	4	22/5 1900	Ac. Raun- drup Vænge pr. Kværndrup.	Nr. 2, Ac. Raundrup- Vænge, f. 17/4 1897.	Nr. 14, Ac. Raundrup- Vænge, f. 25/12 1896.	Holywell Mulder. Ac. Raundrup- Vænge.	Holywell Jimmy.	Samson.	Rose.
			2	27/4 1900	do.	do.	Nr. 12, Ac. Raundrup- Vænge, f. 7/1 1897.	do.	do.	Duke.	Dame.
		B	3	8/6 1900	Wedellsborg pr. Ejby.	Eskebjærg, f. 3/9 1898. Fra Ac. Flakkebjærg.	Nr. 52, Wedellsborg, f. 28/10 1898.				
			3	5/6 1900	do	Højrup, fra Ac. Højrupgaard.	Nr. 56, Wedellsborg, f. 15/6 1898.				

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
142	C ₁	3	31/5 1900	Ac. Taarup- gaard pr. Aarup.	Nr. 111, Ac. Taarup- gaard, f. 28/1 1899. Stbg. 17. *	Nr. 23, Ac. Taarup- gaard, f. Febr. 1897.	Midskov 34, Ac. Lykkes- borg, f. Maj 1896. Stbg. 17.	Nr. 36, Ac. Lykkes- borg.	Stamfaderen, Ac. Taarup- gaard, f. Juli 1893. Stbg. 9.	So. Ac. Taarup- gaard. Søster til Stamfaderen.
		3	3/6 1900	do.	do.	Nr. 102. Ac. Taarup- gaard, f. 16/11 1898. Stbg. 102. *	do.	do.	Taarupgaard- Vardegaard 51, Ac. Taarup- gaard, f. 9/5 1897. Stbg. 18.	Nr. 21. Ac. Taarup- gaard, f. Juni 1897, Stbg. 29. *
	C ₂	6	17/6 1900	Ac. Landkilde pr. Odense.	Job 100, Ac Landkilde, f. 9/5 1898. Stbg. 90.	Nr. 72, Ac. Landkilde, f. Decbr. 1897.	Taarupgaard- Vardegaard 51, Ac. Taarup- gaard, f. 9/5 1897. Stbg. 18.	Nr. 21, Ac. Taarup- gaard, f. Juni 1897, Stbg. 29. *	Adam, Ac. Landkilde, f. Maj 1895. Stbg. 16.	Næraa 3, Ac. Landkilde.
	C ₃	2	9/6 1900	Ac. Højrup, Fyn.	Højrup- Daastrup 41, Ac. Højrup, f. Maj 1897. Stbg. 89.	Nr. 4, Ac. Højrup, f. 1897.	Daastrup I., Ac. Lundby- torp, f. Juni 1896. Stbg. 21.	So. Ac. Lundby- torp.	—	Nr. 46. Ac. Højrup.
		1	7/6 1900	do.	do.	Nr. 42. Ac. Højrup, f. 1895, Stbg. 9. *	do.	do.	Stamfaderen, Ac. Taarup- gaard, f. Juli 1893. Stbg. 9.	So. Ac. Taarup- gaard.

fortsat

142	fortsat	C ₃	3	9/6 1906	do.	Aarslev, Ac. Højrup, f. 1897.	Nr. 5. Ac. Højrup, f. 1898.	—	—	Højrup- Daastrup 41, Ac. Højrup, f. Maj 1897. Stbg. 89.	
		C ₄	2	16/6 1900	Ac. Lykkes- borg pr. Aarup.	Midskov 34, Ac. Lykkes- borg, f. Maj 1896. Stbg. 17.	Nr. 68, Ac. Lykkes- borg, f. 28/11 1897.	—	—	Greve, Ac. Vardegaard, f. April 1896, Stbg. 18. *	Marie 12, Ac. Vardegaard, f. Juni 1894, Stbg. 18. *
			1	19/6 1900	do.	do.	Nr. 88, Ac. Lykkes- borg, f. 8/11 1898, Stbg. 19. *	—	—	Lykkesborg- Vardegaard 52, Ac. Lykkes- borg, f. 9/5 1897. Stbg. 19.	Nr. 69, Ac. Lykkesborg.
			1	16/6 1900	do.	Lykkesborg- Vardegaard 52, Ac. Lykkes- borg, f. 9/5 1897, Stbg. 19.	Nr. 90, Ac. Lykkes- borg, f. 6/12 1898, Stbg. 94. *	Greve, Ac. Varde- gaard, f. April 1896, Stbg. 18. *	Marie 12, Ac. Varde- gaard, f. Juni 1894, Stbg. 18. *	Aasgaard, Ac. Høve, f. April 1895, Stbg. 94. *	Lundbytorp II, Ac. Høve, f. 19/9 1897, Stbg. 94. *
			2	23/6 1900	do.	do.	Nr. 89, Ac. Lykkes- borg, f. 25/2 1899, Stbg. 93. *	do.	do.	Lundbytorp, Ac. Høve, f. 12/2 1898, Stbg. 25.	Gl. Dame, Ac. Høve, f. 27/4 1897, Stbg. 93. *
143	Rovang.	A	4	22/6 1900	Klastrup pr. Hjørring.	Orne i Klastrup fra Dorthes- minde.	So i Klastrup fra Herschends- gave.				

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
143	A	2	27/7 1900	Ac. Krogsager pr. Uggelhuse.	Stamorne Ac. Krogsager indført fra England.	Stamso Ac. Krogsager indført fra England.				
	B ₁	2	3/7 1900	Ac. Gaardbo- gaard pr. Aalbæk	Johnny, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1896, indført fra Svaløf.	Thora 101, Ac. Gaardbo- gaard, f. 4/9 1898, Stbg. 52.	—	—	Kain, Ac. Donsted, f. 1897, Stbg. 52. *	Signe 22, Ac. Donsted, f. Jan. 1899, Stbg. 52. *
		2	2/7 1900	Klastrup pr. Hjørring.	Orne i Klastrup fra Dortheas- minde.	So i Klastrup fra Ac. Røn- novsholm.				
		2	5/7 1900	Ac. Kornum- gaard pr. Brønderslev,	Orne, Ac. Kornum- gaard.	Annette 11, Ac. Kornum- gaard, f. 1895, Stbg. 27. *	Johnny, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1896, indf. fra Svaløf.	Kate 4, Ac. Gaardbo- gaard, f. 19/5 1897, indf. fra Svaløf.		
	B ₂			Samme Af- stamning som Hold B ₁ .						
	C ₁	1	8/7 1900	Ac. Eng- gaarden pr Aalborg.	Mikkel, Ac. Eng- gaarden f. 8/11 1898, Stbg. 5.	Nr. 11, Ac. Eng- gaarden, f. 6/12 1898.	Thorsted, Ac. Silstrup, f. 1895, Stbg. 4.	Maagen 16, Ac. Silstrup, f. 30/8 1897, Stbg. 5. *	Jacob, Ac. Eng- gaarden, f. 12/7 1897, Stbg. 34. *	Oldemor, Ac. Røgsted, f. 1893, Stbg. 5. *

fortsat

143	C ₁	2	26/8 1900	do.	do.	Martha 8, Ac. Eng- gaarden. f. 19/5 1898. Stbg. 35. *	do.	do.	Adam, f. 1895, Stbg. 1.	Oldemor, som ovenfor.
		3	15/7 1900	Ac. Bøgsted, pr. Hjørring.	Bengt, Ac. Bøgsted, f. 10/5 1898.	Bruno 32 Ac. Bøgsted, f. 10/5 1898.	Svend, Ac. Kornum- gaard, f. April 1897, Stbg. 118 *	Sara 2, Ac. Skinuerup, f. 1897.	Leif, Ac. Bøgsted, f. 12/7 1897, Stbg. 84.	Malle 5 Ac. Bøgsted, f. 1895, Stbg. 35. *
	C ₂			Samme Af- stamning som Hold C ₁ .						
145	A	5	12/3 1901	Ac. Raasted, pr. Randers.	Dippel, Ac. Raasted, indført fra England.	Spencerso Nr. 4, Ac. Raasted, indført fra England.				
	B ₁	6	6/3 1901	Grdr. Uhren- holt, Hennedal, pr. Aalborg.	Orne, f. 6/8 1899.	So paa Hennedal, f. 1/5 1899.	Johnny, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1896, indf. fra Svaløf.	Kate 4, Ac. Gaardbo- gaard, f. 10/5 1897, indf. fra Svaløf	Mikkel, Ac. Eng- gaarden, f. 6/11 1998, Stbg. 5.	Martha 8, Ac. Eng- gaarden, f. 19/5 1898, Stbg. 35. *
	B ₂	6	7/3 1901	Prop. Chr. Pedersen, Burholt, pr Brønderslev.	Orne paa Burholt. fra Dortheas- minde.	So, Burholt, f. 17/10 1898.	—	—	Jonas, Ac. Kornum- gaard, f. 17/9 1897, Stbg. 41.	Astrid 14 Ac. Kornum- gaard, f. 1/7 1897, Stbg. 27. *
	B ₃	6	20/3 1901	Rosvang, pr. Sjørring.	Orne, Rosvang, f. 20/9 1899.	So af Landrace paa Rosvang.	Johnny, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1896, indf. fra Svaløf.	Bertha 6, Ac. Gaardbo- gaard, f. 21/9 1898.		

fortsat

Rosvang.

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
145	C ₁	5	15/8 1901	Ac. Helleriis pr. Uglev.	Jens, Ac. Vilhelms- borg, f. 5/5 1899.	Klara 8, Ac. Helleriis, f. 27/10 1899.	Thor, Ac. Revshøl, f. 19/11 1897, Stbg. 39.	Maren 13, Ac. Revshøl, f. 1896, Stbg. 39. *	Thor, Ac. Revshøl, f. 19/11 1897, Stbg. 39.	Maren 13, Ac. Revshøl, f. 1896, Stbg. 39. *
	C ₂	5	8/4 1901	Ac. Holmgaard pr. Skals.	Enggaard, Ac. Holmgaard, f. 12/1 1900, Stbg. 34.	Unge Gaardbo 8 A, Ac. Holmgaard, f. 1/1 1900, Stbg. 52. *	Mikkell, Ac. Eng- gaarden, f. 6/11 1898, Stbg. 5.	Meta 12, Ac. Eng- gaarden, f. 6/12 1898, Stbg. 34. *	Langholt, Ac. Holmgaard, f. 1899, Stbg. 15.	Gaardbo 8, Ac. Holmgaard, f. 1897, Stbg. 52. *
	C ₃	6	10/4 1901	Ac. Holmgaard pr. Skals.	Enggaard, som ovenfor.	Tuk, Ac. Holmgaard, f. 1/12 1899, Stbg. 53. *	Mikkell, som ovenfor.	Meta 12, som ovenfor.	Langholt, som ovenfor.	Tolne 9, Ac. Holmgaard, f. 17/9 1897, Stbg. 53. *
146	A	5	22/4 1901	Ac. Raasted pr. Randers.	Dippel Ac. Raasted indført fra England.	So Nr. 2 Ac. Raasted indført fra England.				
	B ₁	5	17/3 1901	Ac. Gaardbo- gaard pr. Aalbæk.	Johnny Ac. Gaardbo- gaard f. 1896 indført fra Svaløf.	Gine 103 Ac. Gaardbo- gaard f. 15/1 1899.				

Constantinsborg.

fortsat

146	fortsat	C ₁	5	10/4 1901	Ac. Kornum- gaard pr. Brønderslev.	Mogens Ac. Lerbæk f. 28/12 1899 Stbg. 113.	Andrea 45 Ac. Kornum- gaard f. 10/2 1900 Stbg. 113. *	Mikkel Ac. Eng- gaarden f. 9/11 1898 Stbg. 5.	Mette 7 Ac. Eng- gaardeu f. 19/5 1898 Stbg. 32. *	Abel Ac. Kornum- gaard f. 17/2 1899 Stbg. 6.	Alma 27 Ac. Kornum- gaard f. Juli 1897 Stbg. 113. *
		C ₂	5	31/3 1901	Ac. Damgaard pr. Hadsten.	David Ac. Damgaard f. 23/12 1899 Stbg. 35. *	Nr. 3. Ac. Damgaard Stbg. 2. *	Mikkel som ovenfor.	Martha 8 Ac. Eng- gaarden f. 19/5 1896 Stbg. 35. *	Rasmus f. 1895 Stbg. 2	Nr. 9 Ac. Damgaard.
		C ₃	6	3/4 1901	Ae. Faarup pr. Faarup.	Baldur Ac. Faarup f. 1897 Stbg. 44.	Betzy Ac. Faarup Stbg. 2. *	Triddelfitz Ac. Bøgsteds f. 1895 Stbg. 3.	Amanda Ac. Trustrup f. 1895 Stbg. 44. *	Rasmus som ovenfor.	Astrid 5 Ac. Faarup f. 1894. Stbg. 42. *
147	Bregentved.	A	5	29/4 1901	Ac. Flakke- bjærg.	Jeppe Ac. Flakke- bjærg.	Mette Nr. 2 Ac. Flakke- bjærg.	Orne fra Thorslunde.	Mary Ac. Thorslunde.	Flakkebjærg Ac. Flakke- bjærg indført fra England.	Mette Ac. Flakke- bjærg.
		B ₁	5	29/4 1901	Stenagergaard pr. Taastrup.	Orne i Vridsløse- magle Avlsf. f. 11/5 1897.	So paa Varde- gaard f. 9/7 1898.	Gjeddesdal 4 Ac. Thorslunde. f. 2/8 1895.	Maud Nr. 35 Ac. Thorslunde. f. 2/5 1896.	Greve Ac. Varde- gaard f. April 1896. Stbg. 18. *	Fanny Nr. 14 Ac. Varde- gaard f. 9/12 1896 Stbg. 80. *
		B ₂	5	20/3 1901	Ac. Bregentved pr. Haslev.	—	So Nr. 1 paa Bregent- ved.	—	—	—	—
		B ₃	5	12/5 1901	Ac. Bregentved pr. Haslev.	—	So Nr. 3 paa Bregent- ved.	—	—	Jonas Ac. Kornum- gaard f. 17/9 1897 Stbg. 41.	Anna Nr. 13 Ac. Kornum- gaard f. 14/12 1896 Stbg. 28. *

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
147	C ₁	5	20/5 1901	Ac. Vardegaard. pr. Taastrup.	Rolf fra Dame, Møen f. Juli 1899.	Fanny Nr. 14 Ac. Vardegaard f. 9/12 1896 Stbg. 80. *	Jumbo fra Dame, Møen f. Avgust 1895 Stbg. 24. *	Trine.	Hans Ac. Vardegaard. Stbg. 80. *	Marie 12 Ac. Vardegaard f. Juli 1894 Stbg. 18. *
	C ₂	5	7/5 1901	Ac. Valdemarskilde Slagelse.	Torstenæs Ac. Valdemarskilde f. 27/4 1897 Stbg. 23.	Snog Ac. Valdemarskilde f. 7/4 1897.	Jumbo se ovenfor.	So hos A. Nielsen Kokseby, Møen.	Aasgaard I Ac. Høve f. April 1895 Stbg. 94. *	Stedmoder Ac. Valdemarskilde f. 1894, Stbg. 103. *
148	A	6	27/4 1901	Ac. Raundrup-Vænge Kværndrup.	Nr. 33 Ac. Raundrup-Vænge f. 23/9 1899 indført fra England.	Nr. 40. Ac. Raundrup-Vænge f. 24/4 1899.				
	B	6	8/5 1901	Gaardejer J. Jørgensen Magleby pr. Køge.	Orne fra Dortheasminde f. i December 1898.	So fra Ac. Rud f. 6/11 1899.	—	—	Robert Hygind Nr. 87 Ac. Rud f. Januar 1898 Stbg. 8.	Nr. 62 Ac. Rud f. 17/2 1898 Stbg. 9. *
	C ₁	3	25/4 1901	Ac. Lykkeshborg pr. Aarup.	Isak Nr. 131 Ac. Lykkeshborg f. 4/5 1899 Stbg. 92.	Nr. 90 Ac. Lykkeshborg f. 6/12 1898 Stbg. 94. *	Adam I Ac. Landkilde f. Maj 1895 Stbg. 16.	Føns Nr. 4 Ac. Landkilde f. Sept. 1895 Stbg. 92. *	Aasgaard I, Ac. Høve f. April 1895 Stbg. 94. *	Lundbytorp II Nr. 30. Ac. Høve f. 19/9 1897 Stbg. 94. *

Tybrind.

fortsat

C ₁	3	27/4 1901	Ac. Lykkesborg Aarup.	Isak Nr. 131 (se ovenfor).	Nr. 89 Ac. Lykkesborg f. 15/2 1899 Stbg. 93. *	Adam I (se ovenfor).	Føns Nr. 4 (se ovenfor).	Lundbytorp Ac. Høve f. 10/2 1898 Stbg. 25	Gl. Dame Nr. 31 Ac. Høve f. 27/4 1897 Stbg. 93. *
C ₂	3	7/5 1901	Ac. Lykkesborg Aarup.	Isak Nr. 131 (se ovenfor).	Nr. 88 Ac. Lykkesborg f. 8/11 1898 Stbg. 19. *	Adam I (se ovenfor)	Føns Nr. 4 (se ovenfor).	Lykkesborg 52 Ac. Lykkesborg f. 9/5 1897. Stbg. 19.	Nr. 69 Ac. Lykkesborg f. 28/11 1897.
	3	7/5 1901	Ac. Lykkesborg.	Midskov 34 Ac. Lykkesborg f. Maj 1896 Stbg. 17.	Nr. 68 Ac. Lykkesborg f. 28/11 1897.	Orne fra Kindstrup.	So fra Gjelsted-Taarup.	Greve Ac. Vardegaard f. April 1896 Stbg. 18. *	Marie Nr. 12 Ac. Vardegaard f. Juni 1894 Stbg. 18. *
C ₃	6	2/5 1901	Ac. Taarupgaard pr. Aarup.	Rasmus f. 1895 Stbg. 2.	Nr. 102 Ac. Taarupgaard f. 18/11 1898 Stbg. 102. *	—	—	Taarupgaard-Vardegaard 51 Ac. Taarupgaard f. 9/5 1897 Stbg. 18. *	Nr. 21 Ac. Taarupgaard f. Juni 1897 Stbg. 29. *
C ₄	3	15/4 1901	Ac. Landkilde Odense.	Job 100 Ac. Landkilde f. 9/5 1898 Stbg. 90.	Nr. 71 Ac. Landkilde f. December 1897.	Taarupgaard-Vardegaard 51 Ac. Taarupgaard f. 9/5 1897 Stbg. 18.	Nr. 21 Ac. Taarupf. Juni 1897 Stbg. 29. *	Adam I, Ac. Landkilde f. Maj 1895 Stbg. 16.	Næraa Nr. 3. Ac. Landkilde.
	3	22/4 1901	Ac. Landkilde.	Job 100 (se ovenfor).	Nr. 95 Ac. Landkilde f. 1/11 1897 Stbg. 16. *	Taarupgaard-Vardegaard 51 (se ovenfor).	Nr. 21 (se ovenfor).	Adam I, (se ovenfor).	So paa Landkilde.

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
148 fortsat	C ₅	6	13/5 1901	Ac. Rud N. Aaby.	Robert III 130 Ac. Rud f. 27/6 1899 Stbg. 91.	Nr. 125 Ac. Rud f. 30/1 1900 Stbg. 7. *	Robert Hygind 87 Ac. Rud f. Januar 1898 Stbg. 8.	Nr. 86 Ac. Rud f. 17/2 1898 Stbg. 91. *	Robert II 7 Ac. Rud f. 14/3 1896 Stbg. 7. *	Nr. 11 Ac. Rud f. 20/11 1896 Stbg. 77. *
149 Duelund.	A	4	18/5 1901	Ac. i Holstebro.	Gilbert, Ac. Holstebro, indført fra England.	Ruby II, Ac. Holstebro,			L. Bakon, Ac. Holstebro, indført fra England.	Ruby I, Ac. Holstebro, indført fra England.
	B ₁	6	9/6 1901	Jens Riis, Gammelby, Bedsted.	Yorkschi- orne i Bedsted.	So, Jens Riis, Gammelby, f. 5/5 1899.	Orne fra Ac. Holstebro.	So fra Ac. Holstebro.	Thor, Ac. Revsbøl, f. 19/11 1897, Stbg. 39.	Maren Nr. 13, Ac. Revsbøl, Stbg. 39. *
	B ₂	6	9/6 1901	Rosvang pr. Sjørring.	Orne, Skinnerup, f. 21/9 1898.	So, Rosvang, f. 19/5 1900.	Johnny, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1896.	Beate Nr. 2. Ac. Gaardbo- gaard. f. 12/5 1897.	Wilhelmsborg, Ac. Wilhelms- borg, f. 15/6 1898.	Frigga Nr. 2, Ac. Skinnerup, f. 8/9 1898.
	C ₁	5	29/5 1901	Ac Bøgsted pr. Hjørring.	Dan, Ac. Bøgsted, f. 3/7 1897.	Bravo Nr. 34, Ac. Bøgsted, f. 19/5 1898.	Triddelfitz, Ac. Bøgsted, f. 1895, Stbg. 3.	Salle 15, Ac. Bøgsted, f. 1895, Stbg. 46. *	Leif, Ac. Bøgsted, f. 12/7 1897, Stbg. 84.	Malle Nr. 5, Ac. Bøgsted, f. 1895, Stbg. 35. *

149	C ₂ 6		19/5 1901	Ac Eng- gaarden pr. Aalborg.	Mikkell, Ac. Eng- gaarden, f. 9/11 1898, Stbg. 5.	Martha 8, Ac. Eng- gaarden, f. 19/5 1898, Stbg. 35. *	Thorstedornen, Ac. Silstrup, f. 1895, Stbg. 4.	Maagen 16, Ac. Silstrup, f. 30/8 1897, Stbg. 5. *	Adam, Ac. Lerbæk, f. 1895, Stbg. 1.	Oldemor, Ac. Bøgsted, f. 1893, Stbg. 5. *
			5/8 1901	Ac Kornumgaard, Brønderslev.	Abel, Ac. Kornum- gaard, f. 17/2 1899, Stbg. 6.	Adolfine 29, Ac. Kornum- gaard, f. Avgust 1898, Stbg. 36. *	Adam, Ac. Lerbæk, f. 1895, Stbg. 1.	Mette 10, Ac. Lerbæk, f. 1897, Stbg. 6. *	Orne af Landrace, Stbg. 36. *	So af Landrace, Stbg. 36. *
150	A 6		13/2 1902	Ac Raundrup- Vænge, Kværndrup.	Nr. 47, Ac. Raundrup- Vænge, f. 15/2 1901.	Nr. 36, Ac. Raundrup- Vænge, f. 13/1 1900.	Nr. 33, Ac. Raundrup- Vænge, f. 23/9 1899. indført fra England.	Nr. 37, Ac. Raundrup- Vænge, f. 4/10 1899.	Nr. 2, Ac. Raundrup- Vænge, f. 17/4 1897. indført fra England.	Nr. 3, Ac. Raundrup- Vænge, f. 1/11 1896. indført fra England.
	B ₁ 6		5/3 1902	Rosvang pr. Sjørring.	Orne, Rosvang, f. 26/9 1899.	So, Rosvang, f. 20/10 1900.	Johnny, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1896.	Bertha Nr. 6, Ac. Gaardbo- gaard, f. 21/9 1898,	Wilhelmsborg, Ac. Wilhelms- borg, f. 15/6 1898.	Frigga Nr. 2, Ac. Skinnerup, f. 8/9 1898.
	B ₂ 6		15/3 1902	L. Brænd- gaard, Bedsted.	Orne i Bedsted.	So hos L. Brænd- gaard, f. 18/12 1899.	Gilbert, Ac. Holstebro, indført fra England.	Md. Spencer, Ac. Holstebro, indført fra England.	Thor, Ac. Revsbøl, f. 19/11 1897, Stbg. 39,	Mine Nr. 14, Ac. Revsbøl, f. Decbr. 1897, Stbg. 40 *
	C ₁ 6		27/2 1902	Ac Revsbøl, Hurup.	Dam, Ac. Revsbøl, f. 2/1 1901. Stbg. 35.	Gram Nr. 17, Ac. Revsbøl, f. i Maj 1901.	David, Ac. Damgaard, f. 28/12 1899, Stbg. 35. *	Nr. 7, Ac. Damgaard, f. 15/8 1897, Stbg. 35. *	Goliath, Stbg. 38. *	Gitte Nr. 16, Ac. Revsbøl, f. 29/7 1900, Stbg. 38. *
	C ₂ 6		4/3 1902	Ac Lerbæk, Frederikshavn.	Mogens, Ac. Lerbæk, f. 28/12 1899. Stbg. 113. *	Meta Nr. 51, Ac. Lerbæk, f. 24/4 1900.	Mikkell, Ac. Eng- gaarden, f. 10/11 1898. Stbg. 5.	Mette Nr. 7, Ac. Eng- gaarden, f. 19/5 1898, Stbg. 32. *	Dan, Ac. Bøgsted, f. 3/7 1897.	Marie Nr. 9, Ac. Lerbæk,

fortsat

Rosvang.

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
150 fortsat	C ₃	5	10/3 1902	Ac. Skinnerup, Thisted.	Wolmer, Ac. Skinnerup, f. 18/8 1900, Stbg. 27.	Frigga Nr. 2, Ac. Skinnerup, f. 8/9 1898.	Abel, Ac. Kornum- gaard, f. 17/2 1899. Stbg. 6.	Astrid Nr. 14 Ac Kornum- gaard, f. 1/7 1897. Stbg. 27. *	Svend, Ac. Kornum- gaard, f. April 1897. Stbg. 118. *	Sara, Ac. Skinnerup, f. Novbr. 1897.
151 Tybrind.	A	6	23/3 1902	H. P. Hansen, Ac. Skalbjerger.	Holywell Hull 35, Ac. Skalbjerger, f. 10/1 1899, indført fra England.	Nr. 38, Ac. Skalbjerger, f. 12/8 1900.	—	—	Nr. 22, Ac. Raun- drup V, f. 25/1 1898.	Nr. 17, f. 28/7 1896, indført fra England.
	B ₁	6	19/3 1902	Forp. Madsen, Jerstrup, Jullerup.	Orne, Jerstrup, f. 8/8 1901.	So, Jerstrup, f. 17/10 1900.	Holywell Hull 35, Ac. Skalbjerger, f. 10/1 1899, indført fra England.	Nr. 25, Ac. Skalbjerger, f. 17/5 1898.	Midskov 34 Ac. Lykkes- borg, f. Maj 1896, Stbg. 17.	Nr. 69, Ac. Lykkes- borg, f. 28/11 1897.
	B ₂	6	16/3 1902	Otto Pedersen, Allerup, Højby.	Orne, Ac. Allerup, f. 25/7 1900.	Nr. 11 a, Ac. Allerup, f. 25/9 1899.	Nr. 22, Christianslund f. 25/1 1898	Nr. 27, Christianslund f. 19/4 1899.	Adam I, Ac. Land- kilde, f. Maj 1895. Stbg. 16.	Føns Nr. 4, Ac. Land- kilde, f. Sept. 1895, Stbg. 92. *
	B ₃	5	—	Tybrind pr. Ejby.	Orne af Yorkshire- race.	So af Landrace.				

151	fortsat	C ₁	6	15/3 1902	Ac. Lykkesborg pr. Aarup.	Isak Nr. 131, Ac. Lykkesborg, f. Maj 1899, Stbg. 92.	Nr. 78, Ac. Lykkesborg, f. 8/5 1898, Stbg. 17. *	Adam I, Ac. Landkilde, f. Maj 1895, Stbg. 16.	Føns Nr. 4, Ac. Landkilde, f. Sept. 1895, Stbg. 92. *	Midskov 34, Ac. Lykkesborg, f. Maj 1896, Stbg. 17.	Boholt Nr. 37, f. Marts 1894, Stbg. 77. *
		C ₂	6	9/8 1902	Ac. Landkilde. Odense.	Job 100, Ac. Landkilde, f. 9/5 1898, Stbg. 90.	Nr. 93, Ac. Landkilde, f. Decbr. 1898.	Taarupgaard-Vardegaard 51, Ac. Taarupgaard, f. 9/5 1897, Stbg. 18.	Nr. 21, Ac. Taarupgaard, f. Juni 1897, Stbg. 29. *	Adam I, Ac. Landkilde, f. Maj 1895, Stbg. 16.	Føns Nr. 4, Ac. Landkilde, f. Sept. 1895, Stbg. 92. *
		C ₃	6	13/3 1902	Ac. Landkilde.	Job 100, se ovenfor.	Nr. 96, Ac. Landkilde, f. Januar 1898. Stbg. 16. *	Taarupgaard-Vardegaard 51, se ovenfor.	Nr. 21, se ovenfor.	Adam I, se ovenfor.	So af Landrace.
152	Duelund.	A	4	25/3 1902	Ac. Holstebro.	Sir Gilbert, Ac. Holstebro, indført fra England.	Md. Spencer, Ac. Holstebro, indført fra England.				
		B ₁	6	14/4 1902	Fodermester Jensen Kornumgaard, Brønderslev.	Yorkshire-orne, tillagt paa Herschends-gave.	Gertrud Nr. 50, f. 12/2 1901.	—	—	Abel, Ac. Kornumgaard, f. 17/2 1899, Stbg. 6.	Agnete 30, Ac. Kornumgaard, f. 14/12 1896,
		B ₂	6	1/4 1902	Forp. Friis, Duelund, Kellerup.	Orne, Duelund, f. 15/4 1899.	So, Duelund, f. 15/4 1898.	Johnny, Ac. Gaardbo-gaard, f. 1896.	Betzy, Ac. Gaardbo-gaard, f. 12/7 1897.	Svend, Ac. Kornum-gaard, f. April 1897, Stbg. 118. *	Anna Nr. 13 Ac. Kornum-gaard, f. 14/12 1896, Stbg. 28. *
		C ₁	6	9/4 1902	Ac. Langes-gaard, pr. Jebjerg.	Nero, Ac. Langes-gaard, f. 24/2 1900.	Elise Nr. 6, Ac. Langes-gaard, f. 10/12 1899.	Langholt, Ac. Holm-gaard, f. 1898, Stbg. 15.	Rasmine 13, Ac. Holm-gaard, f. 7/3 1899.	Napoleon, Ac. Langes-gaard, f. 23/7 1898.	Ellen Nr. 1, Ac. Langes-gaard, f. 22/5 1898.

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
152	C ₂	6	11/3 1902	Ac. Enggaarden, Aalborg.	Taarupgaard, Ac. Enggaarden.	Mary 18, Ac. Enggaarden, f. 6/12 1898.	Orne paa Taarupgaard.	So paa Taarupgaard.	Mikkel, Ac. Enggaarden, f. 6/11 1898, Stbg. 5	Meta Nr. 12, Ac. Enggaarden, f. 6/12 1898, Stbg. 34 *
	C ₃	5	1/4 1902	Ac. Holmgaard pr. Skals.	Enggaard, Ac. Holmgaard, f. 12/1 1900. Stbg. 34.	Tuk Nr. 14, Ac. Holmgaard, f. 1/12 1899, Stbg. 53.	Mikkel, Ac. Enggaarden, f. 6/12 1898, Stbg. 5.	Meta Nr. 12, Ac. Enggaarden, f. 6/12 1898, Stbg. 34. *	Langholt, Ac. Holmgaard, f. 1898, Stbg. 15.	Tolne Nr. 9, Ac. Holmgaard, f. 17/9 1897, Stbg. 53. *
153	A	5	3/4 1902	Ac. Nørregaard, Saxkøbing.	Timm Ac. Nørregaard, f. 4/3 1897.	Karen Nr. 40, Ac. Nørregaard, f. 25/11 1899.	Gyldensten, f. 13/2 1895.	Manor, f. 2/8 1895.	Holywell Adonis, f. 7/12 1897	Viktoria Nr. 3, f. 10/10 1896.
	B ₁	5	20/2 1902	Fr. Petersen Gudmundstrup Svinninge.	Yorkshire-orne tillagt paa Ac. Christianslund.	Thola Nr. 30 Gudmundstrup f. 13/8 1899.	—	—	Vollerup, Ac. Højby f. 21/6 1897 Stbg. 109.	Thola, Ac. Højby f. 19/8 1898.
	B ₂	5	24/4 1902	Mosegaard pr. Nakskov.	Goliath II, Gloslunde Avisforening.	Nr. 37 a, Mosegaard f. 12/2 1899.	Goliath, Ac. Thorslundegaard.	Malle Nr. 2, Ac. Thorslundegaard f. 20/10 1896	Havrebjærg, Ac. Raage-lunde f. 18/6 1898 Stbg. 26.	Karleby, Nr. 37, Ac. Raage-lunde f. 1898 Stbg. 123. *

153	fortsat	C ₁	5	29/3 1902	Ac. Raage- lunde pr. Nysted.	Daastrup, Ac. Raage- lunde f. 19/3 1901.	Nr. 43, Ac. Raage- lunde f. 15/10 1900 Stbg. 26. *	Fyn II, Ac. Daastrup.	Daastrup- Svendstrup, Ac. Daastrup	Havrebjærg, (se ovenfor).	Karleby Nr. 37, (se ovenfor).
		C ₂	5	23/2 1902	J. Madsen Højby.	Vollerup Ac. Højby f. 21/6 1897 Stbg. 109.	Thola Ac. Højby f. 19/3 1898.	Jumbo fra Dame, Møen f. Avgust 1895 Stbg. 24.	So fra Dame paa Møen Stbg. 109. *	Rasmus, f. 1895 Stbg. 2.	Amanda, Ac. Trustrup f. 1895 Stbg. 44. *
154	Constantinsborg.	B ₁	6	25/4 1902	P. Gommesen, Grøndalslund, Randers.	Avlsforenings Orne i Horn- bæk, f. 13/3 1901.	Nr. 2, Grøndalslund f. 3/11 1900.	Dippel Ac. Raasted indført fra England.	Gilbert, Ac. Raasted indført fra England.	Abel, Ac. Kornum- gaard f. 14/2 1899 Stbg. 6.	Anine 42, Ac. Kornum- gaard f. 15/4 01 Stbg. 28. *
		B ₂	6	23/4 1902	Nørgaard, Salling.	Orne paa Nørgaard.	So paa Nørgaard, f. 19/2 1900.	Orne, Ac. Holstebro.	So, Ac. Holstebro.	Napoleon, Ac. Langes- gaard f. 23/7 1898.	Else Nr. 3, Ac. Langes- gaard f. 29/5 1898.
		C ₁	5	17/4 1902	Ac. Gaardbo- gaard pr. Aalbæk.	Per, Ac. Gaardbo- gaard f. 1900 Stbg. 30.	Eva 102, Ac. Gaardbo- gaard f. 15/1 1899.	Rasmus, f. 1895 Stbg. 2.	Svendstrup, Lærer Gram i Smidstrup Stbg. 30. *	Landorne fra Slynge.	Landso fra Slynge.
		C ₂	5	16/5 1902	Ac. Hald, pr. Viborg.	Langholt, Ac. Hald f. 1898 Stbg. 15.	Hulda 16, Ac. Hald, f. 3/7 1899.	Landorne fra Slynge	Landso fra Slynge.	Holmgaard, Ac. Hald f. 1896.	Gine 2, Ac. Hald f. 1897.

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	. Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
154 fortsat	C ₈	6	11/5 1902	Ac. Kornum- gaard, pr. Brønders- lev.	Axel, Ac. Kornum- gaard, f. 16/12 1900 Stbg. 36. *	Annine 42, Ac. Kornum- gaard f. 15/4 1901 Stbg. 28. *	Mikkel, Ac. Enggaard f. 6/11 1898 Stbg. 5.	Martha 8, Ac. Enggaard f. 19/5 1898 Stbg. 35. *	Jonas, Ac. Kornum- gaard f. 17/9 1897 Stbg. 41.	Anna 13, Ac. Kornum- gaard f. 14/12 1896 Stbg. 28. *
155 Rosenfelddt.	A	4	23/4 1902	Ac. Sdr. Ørslev, Falster,	Nr. 107, Ac. Sdr. Ørslev, f. 20/6 1901,	Primula, Ac. Sdr. Ørslev, f. 23/6 1901.	Thorslunde III, f. 21/8 1898.	Danegell, f. 25/8 1899.	Holywell Adonis, f. 7/12 1897.	Complet, f. 2/12 1898.
	B ₁	5	15/5 1902	Gaardejer Nic. Jensen, Nørre Aaby.	Avlsforenings- orne i Nørre Aaby, f. 28/3 1900.	So i Nørre Aaby, f. 22/7 1899.	Holywell Cheerful 2, Ac. Raundrup- Vænge, f. 17/4 1897, indført fra England.	Nr. 18, Ac. Raundrup- Vænge, f. 18/5 1896, indført fra England.	Orne af Landrace, Ac. Taarup- gaard.	Nr. 32. Ac. Taarup- gaard, f. 1897.
	B ₂	4	22/5 1902	Fr. Frandsen, Tjørnelunde, Høve,	Yorkshire- orne.	So i Tjørnelunde.	Orne fra Ac. Raundrup- Vænge,	So fra Ac. Raundrup- Vænge,	Dalmose II, Ac. Valdemars- kilde, f. 1896, Stbg. 103. *	Sara, Ac. Valdemars- kilde.
	B ₃	5	23/5 1902	do.	do.	do.	do.	do.	Torstenæs, Ac. Høve, f. 27/4 1897. Stbg. 23.	Lundbytorp II, Ac. Høve, f. 19/9 1897, Stbg. 94. *

155	fortsat		C ₁	5	1/5 1902	Ac. Høve, Dalmose.	Torstenæs II, Ac. Høve. f. 24/5 1899.	Lundbytorp II, Ac. Høve, f. 19/9 1897, Stbg. 94. *	Torstenæs, Ac. Høve, f. 27/4 1897, Stbg. 23.	Gine, Ac. Høve, f. 4/6 1896. Stbg. 97. *	Daastrup, Ac. Lundby- torp, f. Juni 1896, Stbg. 21.	Rosa, Ac. Lundby- torp, Stbg. 94. *
			C ₂	5	24/4 1902	Ac. Baades- gaard, Nakskov.	Landbogaard, Ac. Baades- gaard, f. 12/9 1900. Stbg. 126.	Nr. 80. Ac. Baades- gaard, f. 3/4 1899, Stbg. 123. *	Havrehjærg, Ac. Raage- lunde, f. 18/6 1898, Stbg. 26.	Ane II, Nr. 40, Ac. Baades- gaard, f. 28/9 1898, Stbg. 126. *	Erik, Ac. Baades- gaard, f. 1894, Stbg. 123.	Bedstemoder, Ac. Baades- gaard.
			C ₃	5	25/5 1902	Taarupgaard, Aarup.	Isak 131, Ac. Lykkes- borg, f. 4/5 1899, Stbg. 92.	Nr. 172, Ac. Taarup- gaard, f. 3/11 1900.	Adam I, Ac. Landkilde, f. Maj 1895, Stbg. 16.	Føns Nr. 4, Ac. Landkilde, f. Sept. 1895, Stbg. 92. *	Rasmus, f. 1895, Stbg. 2.	Nr. 21. Ac. Taarup- gaard. f. Juni 1897. Stbg. 29. *
156	Duelund.		B ₁	6	5/3 1903	Ac. Gaardbo- gaard, pr. Aalbæk.	Villo, Ac. Gaarbo- gaard.	Thyra 111, Ac. Gaardbo- gaard.	Holywell Cherfull, Ac. Raundrup- Vænge.	Walton Empress, Ac. Raundrup- Vænge.	Per, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1900 Stbg. 30.	Thora 101, Ac. Gaarbo- gaard. f. 4/9 1898, Stbg. 52. *
			B ₂	6	11/3 1903	Gommesen, Grøndalslund, Randers.	Avlsforenings Orne i Hornbæk.	So, Grøndalslund, f. 11/6 1900.	Dippel, Ac. Raasted, indført fra England.	Gilbert, Ac. Raasted, indført fra England.	Wilhelmsborg, Ac. Wilhelms- borg, f. 15/6 1898.	Jette Nr. 5, Ac. Wilhelms- borg, f. 11/5 1898.
			C ₁	6	6/3 1903	Ac. Damgaard, Hadsten,	David, Ac. Damgaard, f. 28/12 1899, Stbg. 35. *	Nr. 6, Ac. Damgaard, Stbg. 2. *	Mikkel, Ac. Eng- gaarden, f. 6/11 1898, Stbg. 5.	Martha, Ac. Eng- gaarden, f. 19/5 1898. Stbg. 35. *	Rasmus, f. 1895. Stbg. 2.	Nr. 9, Ac. Damgaard,

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
156	C ₂	5	7/3 1903	Ac. Revsbøl, Hurup.	Dam, Ac. Revsbøl, f. 2/1 1901, Stbg. 35.	Mary Nr. 13 a, Ac. Revsbøl, f. 27/10 1899.	David, Ac. Damgaard, f. 28/12 1899, Stbg. 35. *	Nr. 7, Ac. Damgaard, f. 15/8 1897, Stbg. 35. *	Thor, Ac. Revsbøl, f. 19/11 1897, Stbg. 39.	Maren Nr. 13, Ac. Revsbøl, Stbg. 39. *
	C ₃	6	28/3 1903	Ac. Eng- gaarden, Aalborg.	Maurits, Ac. Eng- gaarden, f. 5/4 1901. Stbg. 29.	Mine Nr. 11. Ac Eng- gaarden, f. 6/12 1898.	Rasmus, f. 1895, Stbg. 2.	Nr. 21, Ac. Taarup- gaard, f. Juni 1897, Stbg. 29. *	Jacob, Ac. Svend- strupgaard, f. 12/7 1897, Stbg. 34. *	Oldemor, Ac. Bøgsted, f. 1893, Stbg. 5. *
	C ₄	6	29/3 1903	Ac. Holm- gaard, Skals.	Max, Ac. Holm- gaard. f. 2/5 1902, Stbg. 30. *	Ternen Nr. 9, Ac. Holm- gaard, f. 1901.	Per, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1900. Stbg. 30.	Thora 101, Ac. Gaardbo- gaard, f. 4/9 1898, Stbg. 52. *	Enggaard, Ac. Holm- gaard, f. 12/1 1900, Stbg. 34.	Tuk Nr. 14, Ac. Holm- gaard, f. 1/12 1899, Stbg. 53. *
157	A ₁	6	18/3 1903	Ac. Raundrup Vænge pr. Kværndrup.	Holywell Hull, Ac. Skalbjærg, indført fra England.	Nr. 52, Ac. Raundrup- Vænge.	—	—	Nr. 2, Ac. Raundrup- Vænge, f. 17/4 1897, indført fra England.	Nr. 3, Ac. Raundrup- Vænge, f. 1/11 1896, indført fra England.
	A ₂	6	23/3 1903	H. P. Hansen, Ac. Skalbjærg.	Nr. 60, Ac. Skalbjærg.	Nr. 59, Ac. Skalbjærg.	Holywell Hull, Ac. Skalbjærg, indført fra England.	Nr. 25, Ac. Skalbjærg.	Holywell Hull, Ac. Skalbjærg, indført fra England.	Nr. 34, Ac. Skalbjærg.

157	B ₁	6	12/4 1903	Birkholm Bogense.	Orne, Jerstrup, f. 8/7 1901.	So, Jerstrup, 20/7 1901.	Holywell Hull, se ovenfor.	Nr. 25, se ovenfor.	Isak 131, Ac. Lykkes- borg, f. 4/5 1899, Stbg. 92.	So Nr. 118, Ac. Lykkes- borg, f. 80/3 1899, Stbg. 19. *
	B ₂	6	12/4 1903	Sanderum pr. Odense.	Orne, f. 16/8 1900.	So af Landrace i Sanderum.	Nr. 2, Ac. Raundrup- Vænge, f. 17/4 1897, indført fra England.	Nr. 3, Ac. Raundrup- Vænge, f. 1/11 1896, indført fra England.		
	C ₁	2	29/3 1903	Ac. Lykkes- borg pr. Aarup.	Isak 131, Ac. Lykkes- borg, f. 4/5 1899, Stbg. 92.	Nr. 115, Ac. Lykkes- borg, f. 28/2 1899, Stbg. 101. *	Adam I, Ac. Landkilde, f. Maj 1895, Stbg. 16.	Føns Nr. 4, Ac. Landkilde, f. Septb. 1895, Stbg. 92. *	Lykkesborg- Vardegaard, Ac. Lykkes- borg, f. 9/5 1897, Stbg. 19.	Nr. 39, Ac. Lykkes- borg, f. 1896, Stbg. 101. *
		2	7/4 1903	do.	Thor 170, Ac. Lykkes- borg, f. 8/11 1900, Stbg. 96.	Nr. 118, Ac. Lykkes- borg, f. 30/8 1899, Stbg. 19. *	Rasmus, f. 1895, Stbg. 2.	Nr. 21, Ac. Taarup- gaard, f. Juni 1897, Stbg. 29. *	Lykkesborg- Vardegaard, se ovenfor.	Nr. 78, Ac. Lykkes- borg, f. 8/5 1898, Stbg. 17. *
	C ₂	6	13/4 1903	Ac. Taarup- gaard pr. Aarup.	Klovn, Ac. Taarup- gaard, f. Novb. 1897, Stbg. 99.	Nr. 112, Ac. Taarup- gaard, f. 23/4 1899, Stbg. 18. *	Orne af Landrace, Stbg. 99. *	Signe, So af Land- race, Stbg. 99. *	Taarupgaard- Vardegaard, Ac. Taarup- gaard, f. 9/5 1897, Stbg. 18.	Nr. 21, Ac. Taarup- gaard, f. Jan. 1897, Stbg. 29. *
	C ₃	2	23/4 1903	do	Orne af Landrace.	Nr. 172, Ac. Taarup- gaard.	Rasmus, f. 1895, Stbg. 2.	So fra Lærer Gram, Smidstrup.	Rasmus, f. 1895, Stbg. 2.	Nr. 21, Ac. Taarup- gaard, f. Jan. 1897, Stbg. 29. *

fortsat

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
157	C ₃	4	23/4 1903	Ac. Taarup- gaard pr. Aarup.	Klovn, Ac. Taarup- gaard, f. Novb. 1897, Stbg. 99.	Nr. 58, Ac. Taarup- gaard, f. Juli 1897, Stbg. 43. *	Orne af Landrace, Stbg. 99. *	Signe, So af Land- race, Stbg. 99. *	Stamfaderen, Ac. Taarup- gaard, f. Juli 1893, Stbg. 9.	Søster til ovennævnte Nr. 21.
	C ₄	6	19/4 1903	Ac. Landkilde pr. Odense.	Mikkel II, 202, Ac. Landkilde, f. 2/8 1901, Stbg. 100.	Nr. 180, Ac. Landkilde, f. 15/2 1901, Stbg. 90. *	Mikkel, Ac. Enggaard, f. 1898, Stbg. 5.	Mette 7, Ac. Eng- gaarden, f. 19/5 1898, Stbg. 32. *	Job 100, Ac. Landkilde, f. 9/5 1898, Stbg. 90.	Nr. 97, Ac. Landkilde.
158	A	4	10/5 1903	Svineslagte- riets Ac. i Holstebro.	Sam. Ac. Holstebro indført fra England.	Ruby II. Ac. Holstebro	—	—	L. Bakon. Ac. Holstebro indført fra England.	Ruby I. Ac. Holstebro indført fra England.
	B ₁	6	10/4 1903	Duelund, Kjellerup.	Yorkshire- orne, Duelund.	So af Landrace, Duelund.	Orne, Ac. Skalbjærg.	So, Ac. Skalbjærg,	Lukas, Ac. Mausing Mølle, f. 20/7 1900.	Nr. 3. Ac. Mausing Mølle, f. 28/7 1900.
	B ₂	6	14/4 1903	Gdr. A. C. Eng- gaard, Ulle- rup pr. Hurup.	Yorkshire- orne, Ullerup.	So af Landrace, Ullerup, f. 18/12 1899.	Orne, Langskov Møllegaard.	So, Langskov Møllegaard.	Thor, Ac. Revsbøl, f. 19/11 1897, Stbg. 39.	Mine 14, Ac. Revsbøl, f. Decbr. 1897. Stbg. 40. *

158	fortsat.	C ₁	5	17/4 1903	Ac. Gaardbo- gaard pr. Aalbæk.	Per, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1900, Stbg. 30.	Bine 106, Ac. Gaardbo- gaard, f. 27/8 1901.	Rasmus, f. 1895, Stbg. 2.	Svendstrup Gram i Smidstrup, Stbg. 30. *	Dan, Ac. Lerbæk, f. 3/7 1897.	Gine 103, Ac. Gaardbo- gaard, f. 15/1 1899, Stbg. 33. *
		C ₂	6	2/4 1903	Ac. Halager- gaard, Randers.	Orne, Ac. Halager- gaard.	Nr. 3, Ac. Halager- gaard.	Abel, Ac. Kornum- gaard, f. 27/2 1899, Stbg. 6.	Astrid 14, Ac. Kornum- gaard, f. 1/7 1897, Stbg. 27. *	David, Ac. Damgaard, f. 28/12 1899, Stbg. 35. *	Nr. 7. Ac. Damgaard, f. 15/8 1897, Stbg. 35. *
		C ₃	6	26/4 1903	Ac. Skinnerup, Thisted.	Gorm, Ac. Skinnerup, f. 12/6 1902, Stbg. 40. *	Annette 2, Ac. Skinnerup, f. 9/6 1901.	Ole, Ac. Haubro, f. 27/3 1901, Stbg. 40	Octavia 87, Ac. Haubro, f. 16/4 1901. Stbg. 40. *	Jens, Ac. Wilhelms- borg. f. 5/5 1899.	Gine 3 Ac. Skinnerup, f. 1/12 1899.
159	Rosenfeldt.	A	5	19/4 1903	Ac. Anhof, pr. Øxendrup.	Holyvell Hull, Ac. Skalbjaerg, f. 10/1 1899. indført fra England.	Nr. 56, Ac. Anhof, f. 1/4 1902.	—	—	Nr. 41, Ac. Anhof, f. 13/1 1900.	Nr. 39. Ac. Anhof, f. 12/8 1900.
		B ₁	5	17/3 1903	Kr. Rasmussen, Gislinge.	Jokum, Gislinge f. 18/2 1900.	Emma, Gislinge, f. 3/11 1899.	Sir Gilbert, Ac. Christi- anslund, f. 25/1 1898.	Nr. 25, Ac. Christians- lund.	Daastrup X. A., Ac. Havre- bjærg, f. Decbr. 1896 Stbg. 22.	Karen 26, Ac. Gislinge.
		B ₂	5	10/4 1903	Aasted.	Frits Holywell, Aasted f. 8/3 1901.	So, af Landrace. Aasted. f. 25/8 1901.	Holywell Hull, Ac. Skalbjaerg f. 10/1 1899.	Chatterbox, Ac. Skalbjaerg.	Bismark, Ac. Havre- bjærg, f. Marts 98 Stbg. 24.	Dora 3, Ac. Havre- bjærg, f. 22/12 1898 Stbg. 22. *

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
159	C ₁	6	27/3 1903	Ac. Havre- bjærg, Slagelse.	Holmgaard, Ac. Havre- bjærg, f. 2/4 1902. Stbg. 112.	Dora 3, Ac. Havre- bjærg, f. 22/12 1898 Stbg. 22. *	Enggaard, Ac. Holm- gaard, f. 12/1 1900 Stbg. 34.	Tuk 14 Ac. Holmgaard f. 1/12 1899. Stbg. 53. *	Daastrup X. A., Ac. Havre- bjærg, f. Decbr. 1896 Stbg. 22.	Bedstemoder, Ac. Havre- bjærg, f. 18/6 1898 Stbg. 26. *
	C ₂	2	1/4 1903	Ac. Vig.	Bob, Ac. Vig, f. 20/3 1901.	Bagatelle 35, Ac. Vig, f. 21/4 1900.	Axel, Ac. Vig, f. 1898.	Dame II, Ac. Vig, f. 9/6 1898.	Abel, Ac. Vig, f. 1896 Stbg. 108. *	Agnete 8, Ac. Vig, f. 8/5 1896.
		3	2/4 1903	Ac. Vig.	Bob, som ovenfor.	Britta 33, Ac. Vig, f. 21/4 1900.	Axel, som ovenfor.	Dame II, som ovenfor.	Abel, som ovenfor.	Agnete 8. som ovenfor.
	C ₃	5	5/5 1903	Ac. Gislinge.	Mester, Ac. Gislinge.	Karen 26, Ac. Gislinge.	Orne, Ac. Wilhelms- haab.	St. Sorte, Ac. Havdrup- gaard,		
	C ₄	4	29/5 1903	Ac. Conrads- feldt, Haslev.	Mulvad, Ac. Conrads- feldt.	Nr. 28, Ac. Conrads- feldt.	Rasmus, f. 1895 Stbg. 2.	Nr. 102, Ac. Taarup- gaard. f. 6/11 1898. Stbg. 102. *	Qvade Ac. Conrads- feldt, f. 10/3 1898. Stbg. 20. *	Nr. 12, Ac. Conrads- feldt.
160	C ₁	5	19/10 1903	Ac. Gaardbo- gaard, Aalbæk.	Ole, Ac. Gaardbo- gaard, f. 28/12 1902.	Sidse 107, Ac. Gaardbo- gaard, f. 30/10 1901.	Per, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1900. Stbg. 30	Gine 103, Ac. Gaardbo- gaard, f. 15/1 1899. Stbg. 33. *	Dan, Ac. Bøgsted, f. 3/7 1897.	Thora 101, Ac. Gaardbo- gaard, f. 4/9 1898, Stbg. 52. *

160	C ₂	5	28/10 1903	Ac. Boulstrup.	Gylling-Boulstrup, Ac. Boulstrup, f. 10/5 1902. Stbg. 14.	So, Ac. Boulstrup.	Gylling-Malskær, Ac. Gylling Skov, f. 20/3 1900, Stbg. 14. *	So, Ac. Gylling.	Robert i Saxild, f. 16/7 1899, Stbg. 13. *	So, Ac. Boulstrup,
	C ₃	5	25/10 1903	Ac. Korumgaard, Brønderslev.	Ali, Ac. Korumgaard, f. 15/4 1901, Stbg. 28.	Alvina 32, Ac. Korumgaard, f. 25/12 1901,	Rasmus, f. 1895. Stbg. 2.	Annine 42, Ac. Korumgaard, f. 5/7 1899, Stbg. 28. *	Axel, Ac. Korumgaard, f. 18/5 1902. Stbg. 36. *	Gine 49, Ac. Korumgaard, f. 15/2 1900, Stbg. 36. *
	C ₄	5	13/11 1903	Ac. Holmgaard, Skals.	Max, Ac. Holmgaard, f. 2/5 1902. Stbg. 30. *	Gine 8 b. Ac. Holmgaard, f. 26/9 1901, Stbg. 52. *	Per, Ac. Gaardbo-gaard, f. 1900, Stbg. 30.	Thora 101, Ac. Gaardbo-gaard, f. 4/9 1898, Stbg. 52. *	Enggaard, Ac. Holmgaard, f. 12/1 1900. Stbg. 34.	Gaardbo 8, Ac. Holmgaard, f. 1/1 1900, Stbg. 52. *
	C ₅	5	28/11 1903	Ac. Haubro, Aars.	Wolmer, Ac. Haubro, f. 18/8 1900. Stbg. 27.	Omega 93, Ac. Haubro, f. 29/6 1902.	Abel, Ac. Kornum-gaard, f. 17/2 1899, Stbg. 6.	Astrid 14, Ac. Kornum-gaard, f. 1/7 1897, Stbg. 27. *	Ole, Ac. Haubro, f. 27/3 1901, Stbg. 40.	Odith 86, Ac. Haubro, f. 10/4 1901.
	C ₆	5	20/11 1903	Ac. Bøgsted, Hjørring.	Krætturp, Ac. Bøgsted, f. 22/4 1902.	Nr. 8, Ac. Bøgsted, f. 2/4 1902.	Søren, Ac. Krætturp, f. 17/1 1899. Stbg. 1. *	Signe 70, Ac. Krætturp, f. 1900.	Jafet, Ac. Bøgsted, f. 10/10 1900, Stbg. 6. *	Malle 5, Ac. Bøgsted, f. 1895, Stbg. 35. *
	C ₇	5	27/11 1903	Ac. Skinnerup, Thisted.	Gorm, Ac. Skinnerup, f. 12/6 1902, Stbg. 40. *	Gine 3, Ac. Skinnerup, f. 1/12 1899.	Ole, Ac. Haubro, f. 27/3 1901. Stbg. 40.	Octavia 87, Ac. Haubro, f. 16/4 1901, Stbg. 40. *	Wilhelmsborg, Ac. Wilhelms-borg, f. 15/6 1898.	Frigga 2, Ac. Skinnerup, f. 8/9 1898.

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
161	B	5	18/3 1904	Forp. Wiese, Hjortnæs pr. Vraa.	Rank, Hjortnæs, f. 31/12 1902.	So af Landrace, Hjortnæs, f. 21/3 1902.	Klastrup, Ac. Langskov-Møllegaard.	Maud, Ac. Langskov-Møllegaard.	Axel, Ac. Kornum-gaard, f. 18/12 1900, Stbg. 36. *	Asta 46, Ac. Kornum-gaard, f. 18/8 1900.
	C ₁	5	15/3 1904	Ac. Budum pr. Skelund.	Negus, Ac. Budum, f. 7/3 1901, Stbg. 31.	Ninca 58, Ac. Budum, f. 14/10 1901.	Rasmus, f. 1895, Stbg. 2.	Nr. 104, Ac. Taarup-gaard, f. 16/1 1898, Stbg. 31. *	Nero, Ac. Budum, f. 11/6 1900.	Nelle 52, Ac. Budum, f. 28/12 1899.
	C ₂	5	12/3 1904	Ac. Skinnerup pr. Thisted.	Gorm, Ac. Skinnerup, f. 12/6 1902, Stbg. 40. *	Tulle 6, Ac. Skinnerup, f. 25/10 1902.	Ole, Ac. Haubro, f. 27/3 1901, Stbg. 40.	Octavia 87, Ac. Haubro, f. 16/4 1901, Stbg. 40. *	Wolmer, Ac. Haubro, f. 18/8 1900, Stbg. 27.	Mette I, Ac. Skinnerup, f. 9/6 1901.
	C ₃	5	18/3 1904	Ac. Ulfkjær pr. Ulfborg.	Ondløse, Ac. Ulfkjær, f. 26/3 1900, Stbg. 23. *	Nr. 10, Ac. Ulfkjær.	Torstenæs, f. 27/4 1897, Stbg. 23.	Gine, Ac. Høve, f. Juni 1896, Stbg. 97. *	Thy, Ac. Holmgaard, f. 12/5 1901.	Thott 7, Ac. Holmgaard, f. 25/12 1900.
	C ₄	5	28/2 1904	Ac. Gylling-Skov, Ørting.	Smidstrup, Ac. Gylling-Skov, f. 8/15 1901, Stbg. 66.	Nr. 127, Ac. Gylling-Skov, Stbg. 12. *	Kousted, f. 1900, Stbg. 66. *	Faarup, Ac. Blegind, f. 12/8 1900, Stbg. 66. *	Gylling Rud, Ac. Gylling-Skov, f. 8/1 1899, Stbg. 12.	Nr. 52, Ac. Gylling-Skov.
	C ₅	3	31/3 1904	Ac. Hjortshøj, Norring.	Gylling Norring, Ac. Norring, f. 28/4 1900, Stbg. 78.	Faistrup, Ac. Norring.	Gylling Rud, Ac. Gylling-Skov, f. 8/1 1899, Stbg. 12.	Nr. 39, Ac. Gylling-Skov, f. August 1897, Stbg. 78. *	Svendstrup, Ac. Faistrup.	Nr. 8, Ac. Faistrup.

B ₁	6	15/4 1904	Tybrind pr. Ejby.	Nordmanden, f. 29/1 1902, indført fra Norge.	So, Tybrind, f. 27/10 1901.			Isak 131, Ac. Lykkes- borg, f. 4/5 1899, Stbg. 92.	Nr. 116, Ac. Lykkes- borg, f. 20/3 1899, Stbg. 19. *
B ₂	6	1/4 1904	Fannerup- gaard pr. Kolind.	Fannerup Tip f. 2/9 1902.	Nr. 6, Fannerup- gaard, f. 25/1 1903.	Tip, Ac. Skalbjaerg, f. Marts 1898.	Nr. 53, Ac. Skalbjaerg.	Isak 131, som ovenfor.	Nr. 78, Ac. Lykkes- borg, f. 8/5 1898, Stbg. 17. *
C ₁	6	5/4 1904	Ac. Maltbæk pr. Brørup.	Holmgaard, Ac. Maltbæk, f. 25/6 1901.	Musse II, 22, Ac. Maltbæk, f. 23/2 1902.	Enggaard, Ac. Holm- gaard, f. 1/12 1900, Stbg. 34.	Thora 5, Ac. Holm- gaard, f. 26/2 1900, Stbg. 15. *	Norring, f. 1899.	Musse 18, Ac. Maltbæk, f. 16/2 1899, Stbg. 84. *
C ₂	6	31/3 1904	Ac. Taarup- gaard pr. Aarup.	Klovn, 201, Ac. Taarup- gaard, f. Novbr. 1897, Stbg. 99.	Nr. 176, Ac. Taarup- gaard, f. 20/11 1900.	Orne af Landrace, Nyfæste.	So af Landrace, Nyfæste.	Rasmus, f. 1895, Stbg. 2.	Nr. 102, Ac. Taarup- gaard, f. 16/11 1898, Stbg. 102. *
C ₃	6	1/4 1904	Ac. Landkilde pr. Odense.	Mikkel II, Ac. Landkilde, f. 2/8 1901, Stbg. 100.	Nr. 179, Ac. Landkilde, f. 16/2 1901, Stbg. 90. *	Mikkel, Ac. Eng- gaarden, f. 1898, Stbg. 5.	Mette 7, Ac. Eng- gaarden, f. 19/5 1898, Stbg. 32. *	Job 100, Ac. Landkilde, f. 9/5 1898, Stbg. 90.	Næraa Nr. 3.
C ₄	6	23/4 1904	Ac. Slude- gaard pr. Slude.	Hjadstrup 290, Ac. Slude- gaard, f. 17/4 1903, Stbg. 101. *	Nr. 252, Ac. Slude- gaard, f. 5/6 1902, Stbg. 17. *	Frigaard 211, Ac. Hjadstrup, f. 17/11 1901, Stbg. 101.	So 242, Ac. Hjadstrup, f. 14/6 1902.	Midskov 34, Ac. Lykkes- borg, f. Maj 1896, Stbg. 17.	Nr. 185, Ac. Lykkes- borg.

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
163	B ₁	5	27/8 1904	Brunsvang, Nakskov.	Ornen Big, Yorkshire-race.	So af Landrace, Brunsvang,	Borresej Timm, Ac. Nørregaard, pr. Saxkøbing.	Blenda 32, Ac. Nørregaard.	Daastrup, Ac. Raage-lunde, f. 19/8 1901.	Nr. 45, Ac. Raage-lunde, f. 15/5 1900. Stbg. 26. *
	B ₂	5	30/8 1904	St. Duegaard, Aakirkeby.	Yorkshire-orne fra Ac. Enggaard, pr. Rønne.	So af Landrace, St. Duegaard, f. 4/8 1900.			Lundbytorp, Ac. Savskæregaard, f. 12/2 1898, Stbg. 25.	Nr. 34, Ac. Savskæregaard, f. 30/8 1897. Stbg. 120. *
	B ₃	5	6/4 1904	L. Frandsen, Gudum, Slagelse.	Yorkshire-orne Nr. 15 f. 30/1 1899.	Tekla, Landrace, Gudum.	Holywell Cheerfull, Ac. Raundrup-Vænge, f. 17/4 1897.	Borrowfield Rose 15, Ac. Raundrup-Vænge, f. 2/8 1897.	Orne af Landrace.	Tekla 2, Ac. Havrebjærg, f. 10/8 1898. Stbg. 108. *
	B ₄	5	5/4 1904	L. Petersen, Højby Sj.	Balkjær, Yorkshire orne fra Ac. Svendsbjærg.	Malle, Højby, f. 14/8 1901.			Vollerup, Ac. Højby, f. 21/5 1897, Stbg. 109.	Blenda, Ac. Højby, f. 29/7 1899.
	C ₁	5	20/8 1904	Ac. Raage-lunde, pr. Nysted.	Svend Høve, Ac. Raage-lunde, f. 19/8 1901.	Nr. 45, Ac. Raage-lunde, f. 13/5 1900, Stbg. 26. *	Aben, Ac. Trustrup, f. 15/3 1898. Stbg. 45.	Malle II, Ac. Høve f. 21/5 1897. Stbg. 125. *	Havrebjærg, Ac. Raage-lunde, f. 18/6 1898. Stbg. 26.	Karleby 37, Ac. Raage-lunde, f. 1898. Stbg. 123. *

163	fortsat	C ₂	5	18/3 1904	Ac. Gadeby, pr. Godthaab.	Kornumgaard, Ac. Gadeby, f. 17/2 1903.	Nr. 69, Ac. Gadeby.	Ali, Ac. Kornum- gaard, f. 15/4 1901 Stbg. 28.	Asta 46, Ac. Kornum- gaard, f. 18/8 1900.	Albert, Ac. Glaser- gaard, f. 1898, Stbg. 119.	Nr. 21, Ac. Glaser- gaard,
		C ₃	5	20/3 1904	Ac. Havre- bjærg, Slagelse.	Holmgaard, Ac. Havre- bjærg, f. 2/4 1902. Stbg. 112.	Tekla 2, Ac. Havre- bjærg, f. 10/8 1898. Stbg. 108. *	Enggaard, Ac. Hohn- gaard, f. 12/1 1900, Stbg. 34.	Tuk 14, Ac. Holm- gaard, f. 1/12 1899, Stbg. 53. *	Abel, Ac. Vig, f. 1896, Stbg. 108. *	Alexandrine, Ac. Vig, f. 1896. Stbg. 108. *
		C ₄	5	4/5 1904	Ac. Højby, Sjælland.	Holmgaard, som ovenfor.	Malle, Ac. Højby, f. 13/8 1899.	Enggaard, som ovenfor.	Tuk 14, som ovenfor.	Vollerup, Ac. Højby, f. 21/6 1897, Stbg. 109.	Thola, Ac. Højby, f. 19/3 1898.
164	Duelund.	C ₁	5	9/4 1904	Ac. Revsbøl, pr. Hurup,	Dam, Ac. Revsbøl, f. 2/1 1901, Stbg. 35.	Grethe 19, Ac. Revsbøl, f. 15/7 1901.	David, Ac. Damgaard, f. 28/12 1899. Stbg. 35. *	Nr. 7. Ac. Damgaard, f. 15/8 1897, Stbg. 35. *	Thor, Ac. Revsbøl, f. 19/11 1897, Stbg. 39.	Gine 15, Ac. Revsbøl, f. Decbr. 1899. Stbg. 38. *
		C ₂	5	14/4 1904	Ac. Lundholm, pr. Skive.	Erik, Ac. Lundholm, f. 3/3 1902.	Emmy 9, Ac. Lundholm, f. 31/5 1900.	Taarupgaard, Ac. Eng- gaarden.	Mathilde 19, Ac. Eng- gaarden, f. 17/1 1901.	Ali, Ac. Kornum- gaard, f. 15/4 1901, Stbg. 28.	Adolfine 29, Ac. Kornum- gaard, f. Aug. 1898, Stbg. 36. *
		C ₃	5	13/3 1904	Ac. Krættup, pr. Sæby.	Svend, Ac. Krættup, f. 15/1 1903.	Stefanie 78, Ac. Krættup,	Thy, Ac. Holmgaard, f. 2/5 1901.	Tante 43, Ac. Holmgaard, f. 18/4 1901.	Axel, Ac. Krættup, f. 16/12 1900, Stbg. 36. *	Sidsel 71, Ac. Krættup, f. Septbr. 1900.
		C ₄	5	4/4 1904	Ac. Gaardbo- gaard, pr. Aalbæk.	Palle, Ac. Gaardbo- gaard, f. 13/6 1903.	Mette 115, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1/4 1903.	Per, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1900, Stbg. 30.	Gine 103, Ac. Gaardbo- gaard, f. 15/1 1899, Stbg. 33. *	Per, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1900. Stbg. 30.	Bine 106, Ac. Gaardbo- gaard, f. 27/8 1901.

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
164	C ₅	5	24/4 1904	Ac. Kornum- gaard, pr. Brønders- lev.	Damgaard, Ac. Damgaard, f. 18/3 1904. Stbg. 28. *	Alvilda 34, Ac. Kornum- gaard, f. 24/11 1902.	Ali, Ac. Kornum- gaard, f. 15/4 1901. Stbg. 28.	Asta 46, Ac. Kornum- gaard, f. 18/8 1900.	Ali, Ac. Kornum- gaard, f. 15/4 1901, Stbg. 28.	Algine 31, Ac. Kornum- gaard, f. 25/12 1901. Stbg. 43. *
	C ₆	5	30/4 1904	Ac. Gunslev, pr. N. Alslev.	Robert, Ac. Gunslev, f. 2/12 1902.	Nr. 2, Ac. Gunslev,	Robert III. Ac. Høve. f. 27/6 1899. Stbg. 91.	Dame II. Ac. Høve.	Havrebjærg, Ac. Raage- lunde, f. 18/6 1898, Stbg. 26.	Nr. 10, Ac. Gunslev. f. 1899, Stbg. 122. *
165	B ₁	6	8/3 1905	Kr. Hansen, St. Duegaard, Aakirkeby.	Yorkshire- orne fra Ac. Engegaard,	So af Land- race.			Lundbytorp, Ac. Savskære- gaard, f. 12/2 1898. Stbg. 25-	Nr. 34. Ac. Savskære- gaard, f. 30/8 1897, Stbg. 120. *
	B ₂	5	Marts 1905	Chr. Klausen, Toftegaard, Nakskov.	Yorkshire- ornen Adam,	So af Land- race.	Timm Ac. Nørre- gaard.	Asta 31, Ac. Nørre- gaard,	Daastrup, Ac. Raage- lunde, f. 19/3 1901.	Nr. 45. Ac. Raagelunde, f. 15/5 1900. Stbg. 26. *
	C ₁	6	8/3 1905	Ac. Havre- bjærg, Slagelse.	Orne, Ac. Havre- bjærg.	Føns-Rud II 14, Ac. Havre- bjærg.	Havrebjærg. Ac. Raage- lunde, f. 18/6 1898. Stbg. 26.	Føns-Rud 6, Ac. Havre- bjærg, f. 12/6 1900, Stbg. 115. *	Holmgaard, Ac. Havre- bjærg, f. 2/4 1902. Stbg. 112.	Føns-Rud 6, Ac. Havre- bjærg, f. 12/6 1900, Stbg. 115. *

165	fortsat	C ₂	4	22/8 1905	Ac. Savskæregaard, Aakirkeby.	Ali, Ac. Savskæregaard, f. 15/4 1901. Stbg. 28.	Nr. 61, Ac. Savskæregaard, f. 5/2 1901. Stbg. 25. *	Rasmus, f. 1895. Stbg. 2.	Anine 42, Ac. Kornumgaard, f. 5/7 1899, Stbg. 28. *	Lundbytorp, Ac. Savskæregaard, f. 12/2 1898. Stbg. 25.	Nr. 34, Ac. Savskæregaard, f. 30/8 1897, Stbg. 120. *
		C ₃	5	18/4 1905	Ac. Raage-lunde, pr. Nysted.	Svend Høve, Ac. Raage-lunde, f. 9/8 1901.	Nr. 43, Ac. Raage-lunde, f. 12/12 1899, Stbg. 26. *	Aben, Ac. Høve, f. 15/3 1898. Stbg. 45.	Malle II, Ac. Høve, f. 16/9 1898, Stbg. 125. *	Havrebjærg, Ac. Raage-lunde, f. 13/6 1898. Stbg. 26.	Karleby 37, Ac. Raage-lunde, f. 1898. Stbg. 123. *
		C ₄	5	28/4 1905	Ac. Vindse-bækgaard, Køge.	Herbert Glasøje, Ac. Vindse-bækgaard, f. 17/1 1902. Stbg. 108. *	Bedste Daa-strup, Ac. Vindse-bækgaard.	Herbert, Ac. Valde-marskilde, f. 6/3 1899. Stbg. 108.	Sardin, Ac. Valde-marskilde,	Kornumgaard, Ac. Vindse-bækgaard.	Signe Daa-strup, Ac. Vindse-bækgaard.
		C ₅	5	10/5 1905	Ac. Vallekilde, pr. Hørve.	Trustrup, Ac. Vallekilde, f. 19/1 1900, Stbg. 110.	Holmgaard 84, Ac. Vallekilde.	Aben, Ac. Trustrup, f. 15/3 1898. Stbg. 45.	Alken, Ac. Trustrup, f. 1897. Stbg. 47. *	Trustrup, Ac. Vallekilde, f. 19/1 1900. Stbg. 110.	Gamle Holmgaard, Ac. Vallekilde, f. 2/11 1900.
		C ₆	4	29/5 1905	Hermansen, Stangerup. Stubbekøbing.	Avlsforenings-orne i Magle-brænde.	So af Land-race i Stange-rup.	Rud, Ac. Syvhøj-gaard, f. 13/11 1901. Stbg. 116.	Nr. 5, i Egelykke.	Høve I, Ac. Gunslov, f. 17/7 1899. Stbg. 124.	Nr. 10, Ac. Gunslov, f. 21/4 1899, Stbg. 122. *
166	Duelund.	B	5	11/4 1905	Donneruplund, pr. Give.	Orne af Yorkshire-race.	So af Landrace, Donneruplund.	Palmerston, Ac. Engegaard, Rønne,	Mary II, Ac. Engegaard.	Grarup 3, Ac. Grarup, f. 8/10 1901, Stbg. 71. *	Nr. 3. B. L. Ac. Grarup, f. 1/2 1900. Stbg. 42. *

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
166	C ₁	5	April 1905	Ac. Faistrup, pr. Mundelstrup.	Klaus 5, Ac. Faistrup, f. Maj 1902, Stbg. 70.	Nr. 14, Ac. Faistrup,	Klaus 2, Ac. Faistrup, f. Dcbr. 1898, Stbg. 70. *	So i Toustrup, Stbg. 70. *	Orne Nr. 4, Ac. Faistrup.	Nr. 5, Ac. Faistrup, f. 9/2 1901, Stbg. 51. *
	C ₂	4	5/3 1905	Ac. Thorning, Vestergaard, pr. Kjellerup,	Mads, Ac. Thorning, V. f. 19/10 1903, Stbg. 29. *	Maren, Ac. Thorning, Vestergaard, f. 13/6 1903,	Maurits, Ac. Drastrup, f. 5/4 1901, Stbg. 29.	Marna 14, Ac. Drastrup, f. 13/12 1898, Stbg. 51. *	Per, Ac. Gaardbo-gaard, f. 1900, Stbg. 30.	Gine 103, Ac. Gaardbo-gaard, f. 15/1 1899, Stbg. 33. *
	C ₃	3	10/4 1905	Ac. Holmgaard, pr. Skals,	Major 10, Ac. Holmgaard, f. 18/11 1903, Stbg. 37,	Tummelumsen, Nr. 2, Ac. Holmgaard.	Enggaard, Ac. Holmgaard, f. 12/1 1900, Stbg. 34.	Trine 10, Ac. Holmgaard, f. 24/3 1900, Stbg. 37. *	Max, Ac. Holmgaard, f. 2/5 1902, Stbg. 30. *	Tummelumsen, Ac. Holmgaard, f. 1900.
	C ₄	3	23/4 1905	Ac. Thyrsbæk, pr. Vejle.	Torben, Ac. Thyrsbæk, f. 20/4 1901, Stbg. 54.	Theodora 14, Ac. Thyrsbæk, f. 10/2 1902, Stbg. 47. *	Rasmus, f. 1895, Stbg. 2.	Svendstrup, Lærer Gram, Smidstrup, Stbg. 30. *	Trustrup, Ac. Thyrsbæk, f. 19/1 1900, Stbg. 47.	Tulle 5, Ac. Thyrsbæk.
	C ₅	5	20/4 1905	Ac. Budum, pr. Skelund.	Nogi, Ac. Budum, f. 19/5 1904, Stbg. 38.	Nicoline 61, Ac. Budum, f. 28/2 1904, Stbg. 31. *	Dam, Ac. Revsbøl, f. 2/1 1901, Stbg. 35.	Gam 23, Ac. Revsbøl, f. 13/10 1901, Stbg. 38. *	Negus, Ac. Budum, f. 7/3 1901, Stbg. 31.	Nobel 57, Ac. Budum, f. 23/8 1901.
167	C ₁	5	30/4 1905	Ac. Krættstrup pr. Sæby.	Sigurd, Ac. Krættstrup, f. 9/4 1904.	Susse 77, Ac. Krættstrup, f. 25/4 1902.	Dam, Ac. Revsbøl, f. 2/1 1901, Stbg. 35.	Grethe 19, Ac. Revsbøl, f. 5/7 1901.	Søren, Ac. Krættstrup, f. 17/1 1899, Stbg. 1. *	Susanne 72, Ac. Krættstrup, f. 1899.

fortsat

Røstvalg.

167	fortsat									
	C ₂	5	26/3 1905	Ac. Ulfkjær pr. Ulfborg.	Ulfkjær III, Ac. Ulfkjær, f. 19/9 1903, Stbg. 87.	Nr. 16, Ac. Ulfkjær.	Gylling Boulstrup, f. 10/5 1902, Stbg. 14.	So, Ac. Boulstrup, f. April 1901, Stbg. 87. *	Ondløse, Ac. Ulfkjær, f. 26/3 1900, Stbg. 23. *	Nr. 14, Ac. Ulfkjær, f. 15/10 1902.
	C ₃	5	30/3 1905	Ac. Gylling Skov pr. Ørting.	Smidstrup, Ac. Gylling Skov, f. 8/5 1901, Stbg. 66.	Nr. 56, Ac. Gylling Skov, Stbg. 12. *	Kousted, f. 1900, Stbg. 66. *	Faarup, Ac. Blegind, f. 12/8 1900, Stbg. 66. *	Gylling Rud, Ac. Gylling Skov, f. 8/1 1899, Stbg. 12.	Nr. 52, Ac. Gylling Skov, f. Marts 1897, Stbg. 14. *
	C ₄	5	13/4 1905	Ac. Revsbøl pr. Hurup.	Nero, Ac. Revsbøl, f. 20/12 1903. Stbg. 32.	Gine II, 15, Ac. Revsbøl, f. 23/10 1904.	Negus, Ac. Budum, f. 7/8 1900, Stbg. 31.	Nora 51, Ac. Budum, f. 28/12 1899, Stbg. 32. *	Thor, Ac. Revsbøl, f. 19/11 1897, Stbg. 39.	Gine 15, Ac. Revsbøl, f. Decbr. 1899, Stbg. 38. *
	C ₅	5	11/4 1905	Ac. Skinnerup pr. Thisted.	Thor, Ac. Skinnerup, f. 22/3 1904.	Susanne Nr. 7, Ac. Skinnerup, f. 23/10 1903.	Erik, Ac. Lundholm, f. 8/3 1902.	Nr. 2, Ac. Lundholm, f. 2/5 1902.	Gorm, Ac. Skinnerup, f. 12/6 1902, Stbg. 40. *	Rosa Nr. 5, Ac. Skinnerup, f. 24/11 1902.
	C ₆	5	16/4 1905	Ac. Drastrup pr. Aalborg.	Mads, Ac. Drastrup, f. 13/6 1903, Stbg. 33.	Nr. 1, Ac. Drastrup, f. 20/6 1903. Stbg. 29. *	Per, Ac. Gaardbo- gaard, f. 1900, Stbg. 30.	Gine 103, Ac. Gaardbo- gaard, f. 15/1 1899, Stbg. 33. *	Maurits, Ac. Drastrup, f. 5/4 1901, Stbg. 29.	Mette 7, Ac. Drastrup, f. 19/5 1898, Stbg. 32. *
168	C ₇	5	4/5 1905	Ac. Brorstrup- gaard pr. Nørager.	Støssel, Ac. Brorstrup- gaard, f. 28/6 1904, Stbg. 43.	Salone 109, Ac. Brorstrup- gaard, f. 10/2 1904.	Taarupgaard, Ac. Kornum- gaard, f. 27/7 1903, Stbg. 43. *	Algine 31, Ac. Kornum- gaard, f. 25/12 1901, Stbg. 43. *	Skrødder, Ac. Brorstrup- gaard, f. 5/2 1903, Stbg. 42.	Sara 101, Ac. Brorstrup- gaard, f. 3/5 1903.
	C ₁	6	12/4 1905	Ac. Holstens- hus, pr. Pejrup.	Dalum, Ac. Holstens- hus, f. 17/5 1903.	Nr. 6, Ac. Holstens- hus, f. 27/1 1904, Stbg. 105. *	Torpe 160, Ac. Hjadstrup, f. 18/6 1900, Stbg. 94.	So, Dalum, f. 15/10 1898 i Ac. Trustrup.	Gram 270, Ac. Holstens- hus, f. 13/11 1901, Stbg. 105.	Nr. 265, Ac. Holstens- hus, f. 1902.

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
168	C ₂	6	16/4 1905	Ac. Taarup- gaard, pr. Aarup.	Orne, Ac. Taarup- gaard, f. 2/5 1903.	Nr. 174, Ac. Taarup- gaard, f. 8/11 1900. Stbg. 79. *	Rathlousdal, Ac. Boulstrup, f. April 1901, Stbg. 13.	So, Ac. Hølken, f. 10/9 1900.	Rasmus, f. 1895. Stbg. 2.	Nr. 21, Ac. Taarup- gaard, f. 1897, Stbg. 29. *
	C ₃	6	30/4 1905	Ac. Lykkes- borg, pr. Aarup.	Hesselbjærg, Ac. Lykkes- borg, f. 18/2 1903, Stbg. 104.	Nr. 79, Ac. Lykkes- borg, f. 17/5 1898. Stbg. 17. *	Midskov 34, Ac. Lykkes- borg, f. 1896, Stbg. 17.	Nr. 133. Ac. Sludegaard, f. 15/10 1899. Stbg. 104. *	Midskov 34, Ac. Lykkes- borg, f. 1896, Stbg. 17.	Nr. 38, Ac. Lykkes- borg.
	C ₄	6	22/4 1905	Ac. Hjadstrup, pr. Kappen- drup.	Nr. 290, Ac. Hjadstrup, f. 17/4 1903, Stbg. 101. *	Nr. 261, Ac. Hjadstrup, f. 30/8 1902.	Frigaard, Ac. Hjadstrup, f. 17/11 1901, Stbg. 101.	Nr. 242, Ac. Hjadstrup, f. 14/6 1902.	Rasmus II,	Nr. 213, Ac. Hjadstrup, f. 6/6 1901, Stbg. 7. *
	C ₅	6	1/5 1905	Ac. Torpe, pr. Rudkøbing.	Taarupgaard 240, Ac. Torpe, f. 11/3 1902, Stbg. 102. *	Nr. 232, Ac. Torpe, f. 7/4 1902.	Orne 171, Ac. Taarup- gaard, f. 25/1 1901, Stbg. 102. *	Nr. 102, Ac. Taarup- gaard, f. 16/11 1898. Stbg. 102. *	Torpe 160, Ac. Hjadstrup, f. 16/6 1900, Stbg. 94.	Nr. 156, Ac. Torpe.
	C ₆	5	19/4 1905	Ac. Landkilde, Odense.	Sludegaard 250, Ac. Landkilde, f. 28/2 1903, Stbg. 103.	Nr. 11, Ac. Landkilde, f. 30/3 1904, Stbg. 100. *	Midskov 34, Ac. Lykkes- borg, f. 1896, Stbg. 17.	Nr. 132, Ac. Sludegaard, f. 16/10 1899, Stbg. 103. *	Mikkel 202, Ac. Landkilde, f. 2/8 1901. Stbg. 100.	Nr. 180, Ac. Landkilde, f. 15/2 1901. Stbg. 90. *

fortsat

C ₁	6	23/8 1905	Ac. Lykkesborg, pr. Aarup.	Hesselbjærg, Ac. Lykkesborg, f. 18/2 1903, Stbg. 104.	Nr. 182, Ac. Lykkesborg, f. 25/4 1901, Stbg. 92. *	Midskov 34, Ac. Lykkesborg, f. 1896, Stbg. 17.	Nr. 133, Ac. Sludegaard, f. 18/10 1899, Stbg. 104. *	Isak 131, Ac. Lykkesborg, f. 4/5 1899, Stbg. 92.	Nr. 90. Ac. Lykkesborg, f. 6/12 1898, Stbg. 94. *
C ₂	6	30/8 1905	Ac. Hjadstrup, pr. Kappendrup.	Torpe 160, Ac. Hjadstrup, f. 16/6 1900, Stbg. 94.	Nr. 241, Ac. Hjadstrup, f. 21/3 1902.	Lykkesborg- Vardegaard, Ac. Lykkesborg, f. 9/5 1897, Stbg. 19.	Nr. 90, Ac. Lykkesborg, f. 6/12 1898, Stbg. 94. *	Axel, Ac. Kornumgaard, f. 18/12 1900, Stbg. 36. *	Asta 46, Ac. Kornumgaard, f. 18/8 1900.
C ₃	6	29/8 1905	Ac. Rud, N. Aaby.	Nr. 7, Ac. Rud.	Nr. 1. Ac. Rud. f. 24/12 1902.	Rud. Ac. Nebbe- gaard.	Mie, Ac. Nebbe- gaard.	Torstenæs- Rud, Ac. Rud, f. 27/10 1899, Stbg. 97.	Nr. 64, Ac. Rud. f. 17/12 1898, Stbg. 12. *
C ₄	6	18/8 1905	Ac. Bregnør, pr. Kerteminde.	Nr. 292, Ac. Bregnør, f. 30/5 1903, Stbg. 17. *	Nr. 1, Ac. Bregnør, f. 16/8 1903.	Midskov 34, Ac. Sludegaard, f. 1896, Stbg. 17.	Nr. 134, Ac. Sludegaard.	Lykkesborg 151, Ac. Taarup- gaard, f. 23/6 1900, Stbg. 93.	Nr. 248, Ac. Bregnør.
C ₅	6	17/8 1905	Ac. Taarup- gaard, pr. Aarup.	Lykkesborg 151, Ac. Taarup- gaard, f. 23/6 1900, Stbg. 93.	Nr. 13, Ac. Taarup- gaard, f. 5/8 1904, Stbg. 99. *	Lykkesborg- Vardegaard, Nr. 52, Ac. Lykkes- borg, f. 9/5 1897, Stbg. 19.	Nr. 89, Ac. Lykkes- borg, f. 15/2 1899, Stbg. 93. *	Klovn 201, Ac. Taarup- gaard, f. Novbr. 1897, Stbg. 99.	Nr. 207, Ac. Taarup- gaard.

Række	Hold	Antal Dyr	Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
					Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
169 fortsat	C ₆	6	22/8 1905	Ac. Torpe, pr. Rudkøbing.	Taarupgaard 240, Ac. Torpe, f. 11/8 1902. Stbg. 102.	Nr. 236, Ac. Torpe.	Nr. 171, Ac. Taarup- gaard, f. 25/1 1901, Stbg. 102. *	Nr. 102. Ac. Taarup- gaard, f. 18/11 1898. Stbg. 102. *	Torpe 160. Ac. Torpe, f. 10/6 1900, Stbg. 94.	Nr. 162, Ac. Torpe.
170 Duehund.	B ₁	5	10/9 1905	Kristen Frøs- lev, Vodstrup, Nykøbing M.	Yorkshire- orne, Todsø Mølle, f. 3/4 1904.	So af Landrace, Vodstrup, f. 23/6 1902.	James, Ac. Gaardbo- gaard, f. 8/5 1901,	Fanny 18, Ac. Gaardbo- gaard, f. 8/8 1901.	Hald, Ac. Tødsø Mølle, f. 3/7 1899.	Trine 24, Ac. Tødsø Mølle, f. 20/5 1901.
	B ₂	5	20/10 1905	Kappel Jensen, Hurup.	Yorkshire- orne, Hurup.	So af Landrace, Hurup, f. 27/9 1902.	Yorkshire- orne fra Holstebro.	Yorkshireso fra Holstebro.	Dam, Ac. Revsbøl, f. 2/1 1901, Stbg. 35.	Mine 14, Ac. Revsbøl, f. Decbr. 1897, Stbg. 35. *
	C ₁	5	24/9 1905	Ac. Kornum- gaard pr. Brønderslev	Burholt, Ac. Kornum- gaard, f. 20/11 1903.	Alise 41, Ac. Kornum- gaard, f. 29/9 1904.	Peter, Landrace, Burholt.	So, Landrace, Burholt.	Taarupgaard, Ac. Kornum- gaard, f. 27/7 1903, Stbg. 43. *	Alvina 32, Ac. Kornum- gaard, f. 25/12 1901.
	C ₂	5	5/10 1905	Ac. Trustrup pr. Randers.	Kornum, Ac. Trustrup, f. 20/12 1903.	Voldum, Ac. Trustrup, f. 20/6 1903.	Holmgaard, Ac. Kornum- gaard, f. 3/4 1902.	Albertine 36, Ac. Kornum- gaard, f. 24/11 1902.	David, Ac. Damgaard, f. 23/12 1899, Stbg. 35. *	Vildbjærg, Ac. Trustrup, f. 20/3 1899, Stbg. 49. *

170	C ₃	5	24/10 1905	Ac. Brorstrup- gaard pr. Nørager.	Støssel, Ac. Brorstrup- gaard, f. 9/6 1904, Stbg. 43	Sørine 108, Ac. Brorstrup- gaard, f. 9/6 1904.	Taarupgaard, Ac. Kornum- gaard, f. 27/7 1903, Stbg. 43. *	Algine 31, Ac. Kornum- gaard, f. 25/12 1906, Stbg. 43. *	Schrøder, Ac. Brorstrup- gaard, f. 5/2 1903, Stbg. 42.	Sara 101, Ac. Brorstrup- gaard, f. 3/5 1903.
	C ₄	3	1/10 1905	Ac. Tødsø Mølle, Nykøbing M.	Orne, Ac. Galtrup, f. 16/11 1904.	Thyra 28, Ac. Tødsø Mølle, f. 25/12 1904.	Mads, Ac. Drastrup, f. 13/6 1903, Stbg. 33.	Nr. 10, Ac. Drastrup, f. 19/11 1901.	Trico, Ac. Tødsø Mølle, f. 5/5 1903. Stbg. 35. *	Tulle 25, Ac. Tødsø Mølle, f. Decbr. 1902.

I Tabellerne Side 104—141 betyder:

„Ac“: *Avlscenter*.

„Stbg.“: *Stambog*, d. v. s. den officielle Stambog over Orner.

Da kun en Del af Ornerne er optagne i Stambogen, er det kun *disse*, der kan optræde under Stambog-Nummer. Men da der under Beskrivelsen af disse findes omtalt andre Orner, tillige med en Del Søer, henvises ogsaa til dem. I dette Tilfælde er der ved Stambog-Nummeret sat en *.