

## 75de Beretning

fra

den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles

Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

---

### 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre.


- A. Paa **Bjernedegaard** ved Sorø med Svin fra sjællandske Centre.
- B. Paa **Elsesminde** ved Odense med Svin fra fynske Centre.
- C. Paa **Rodstenseje** ved Odder med Svin fra jyske Centre.

---

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles  
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

---

København.  
I Kommission hos Aug. Bang.  
Trykt hos J. H. Schultz A/S  
1911.



Hermmed udsendes Laboratoriets 75de Beretning, som omfatter første (og eneste) Beretning om Forsøgsvirksomheden paa *Bjernedegaard*, og anden Beretning om de indvundne Resultater paa Forsøgsstationerne *Elsesminde* og *Rodstenseje*.


For de to sidstnævnte Stationers Vedkommende er denne Beretning altsaa en Fortsættelse af Laboratoriets 67de Beretning og omfatter for Elsesmindes Vedkommende Tiden fra 1. Juli 1908 til 30. Juni 1910 og for Rodstenseje fra 1. Juli 1909 til 30. Juni 1910. For Bjernedegaards Vedkommende, hvor Forsøgsvirksomheden iøvrigt nu er indstillet, omfatter Beretningen hele det Tidsrum, i hvilket der har været Forsøg paa Gaarden, nemlig fra April 1908 til April 1910.

Forsøgsarbejdet paa Bjernedegaard har været ledet af Overassistent *Lunde*, paa Elsesminde af Landbrugskandidat, Assistent *Beck* og paa Rodstenseje af Landbrugskandidat, Assistent *Gommesen*.

Beretningens tre Afsnit er udarbejdede henholdsvis af Landbrugskandidat, Assistent *Lund* og de ovennævnte Assisterter *Beck* og *Gommesen*.

Forsøglaboratoriet i Juli 1911.

*N. O. Hofman-Bang.*



## A. Bjernedegåard.

I Foraaret 1907 var der paa Elsesminde paa Fyn blevet oprettet en Forsøgsstation for Svin, til hvilken Ejerne af de fynske Svineavlscentrer havde forpligtet sig til at sende et nærmere fastsat Antal Grise efter de der kaarede Sører, og hvor under Forsøgslaboratoriets Kontrol og Ledelse Grisene blev ens opdrættede og fedede, for at man derigennem kunde komme til Klarhed over de enkelte Søers og Familiers Egenskaber med Hensyn til Trivelighed og Slagteværdi.

Ideen om paa denne Maade at undersøge Afkommet efter de mest fremragende Avlsdyr i Centrene og derigennem frem-skaffe Resultater af stor Værdi for de ledende i Svineavlens slog stærkt an i alle Landbrugskredse, og længe varede det ikke, før end ogsaa Sjælland og Jylland fik oprettet hver sin Forsøgsstation i Lighed med den fynske. Det er for den sjællandske Forsøgsstation, der her skal gøres Rede.

Efter Opfordring fra Bedømmelsesudvalget for Svineavlscentre i 1ste Distrikt indbød Bestyrelsen for »De samvirkende sjællandske Landboforeninger« i Maj 1907 til et Møde i København for at forhandle om Oprettelsen af en Forsøgsstation med Svin paa Sjælland. Til dette Møde var indbudt: Formændene og Direktørerne for Andelssvineslagterierne, Ejerne af Svineavlscentrerne og de lokale Udvalg, Forsøgslaboratoriet, Statskonsulent Mørkeberg og Konsulent K. M. Jensen, Holbæk. Der nedsattes paa dette Møde, hvor Assistent, Landbrugskandidat Beck holdt det indledende Foredrag og gav Oplysninger om Forholdene paa Elsesminde, et Udvalg paa 15 Medlemmer, der ved et senere Møde i Efteraaret 1907 vedtog, at der burde oprettes en Forsøgsstation med Svin paa Sjælland, og det oplystes, at en saadan kunde faas hos Sagfører *Svendsen* paa B j e r n e d e g a a r d (ved Fjenneslev St.), der er Andelshaver i R i n g s t e d Andelssvineslagteri (Direktør *Pihl*), samt at Forsøgslaboratoriet var villig til at give et aarligt Tilskud paa 1,000 Kr. til Sta-

tionens Drift. Det vedtages endvidere at rette en Anmodning til samtlige Centre i 1ste Distrikt om at levere det fornødne Grisemateriale til Forsøget, idet der hvert Aar maatte afgives to ca. 6 Ugers Grise af hver kaaret So i Centrene til en nærmere fastsat Pris. Fremdeles vedtages det at rette en Henvendelse til Bestyrelserne for Andelsslagterierne paa Sjælland om at yde et aarlige Tilskud, der skulde staa i Forhold til Antal slagtede Svin, til Dækning af Udgifterne ved Stationens Drift. Til at realisere Sagen i sin Helhed nedsattes derefter et snævrere Udvalg, nemlig Sognefoged, Gaardejer *Søren Jensen*, Hyldegaarden, Formand, Landstingsmand *Julius Frandsen*, Nr. Tvede, Næstformand, Direktør *Fr. L. Sieck*, Frederikssund, Kasserer og som Sekretær for Udvalget Konsulent *K. M. Jensen*, Holbæk.

Sagen fremmedes da i Overensstemmelse med det foran fremsatte saaledes, at Forsøget paa Bjernedegaard under Forsøglaboratoriets Kontrol kunde paabegyndes i Foraaret 1908.

Forsøgene gik derefter deres rolige Gang til fælles Tilfredshed for alle deri interesserede Parter indtil Foraaret 1910, da der pludselig indtraf Sygdomstilfælde af smitsom Art blandt Svinene. For at bekæmpe Sygdommen maatte Tilførslen af Grise midlertidigt standses, og Driften som Følge heraf indskrænkes noget. Da Ejer af Bjernedegaard imidlertid ikke mente fremtidig at turde udsætte sig for lignende Afbrydelser i Bedriftens daglige Gang ved eventuelle ny Sygdomsudbrud, blev efter Overenskomst den mellem Ejer af Bjernedegaard og Svineavlsledelsen oprettede Kontrakt op sagt og Forsøgene indstillet.

Man tillagde imidlertid disse Forsøg stor Betydning og vilde nødig opgive dem, hvorfor Svineavlsledelsen satte sig i Bevægelse for at faa Forsøgene fortsat paa en anden Gaard. I sin Søgen efter en saadan henvendte Svineavlsledelsen sig til Lehngreve *Moltke-Bregentved*, der beredvillig gik ind paa at modtage Forsøgene paa B r e g e n t v e d og paa at foretage de endda temmelig betydelige Ändringer og Tilbygninger ved Svinestalden, som nødvendiggjordes af Forsøget. Haslev A n d e l s s v i n e s l a g t e r i gik efter Aftale ind paa at lade Forsøgsslagtningerne foretage der.

Her vil vi imidlertid kun beskæftige os med Resultaterne fra Bjernedegaard.

---

## Forsøgsstalden paa Bjernedegaard.

Stalden, som er  $68\frac{1}{2}$  Alen lang og  $20\frac{1}{3}$  Alen bred, er opført 1904 af Kalksten med hul Mur, Trimpelværk og dækket med Tagpap. Den er delt i 2 Afdelinger, der ialt rummer 75 Stier samt Plads til Opbevaring af Foder og Foderkar. Gulvet i Stierne bestaar af haardbrændte Mursten, fugede med Cement, der er godt Afløb for Urinen til de med Riste forsynede Kloaker. Loftet bestaar af gennemskaarne Granrakter, og Rummet herover stoppes til med Halm om Vinteren. Højden fra Gulv til Loft er 4.6 Alen. Stalden er forsynet med 16 store vinduer, og for Ventilationen er sørget dels ved Aftræksskorstene, dels ved Ventilhuller foroven i Muren under Loftet; Luften i Stalden har altid været god.

Den enkelte Sti, der omtrent var  $21.5 \square$  Alen stor, afgav Plads til et »Forsøgshold« (4 Svin); den var forsynet med Liggeplads for Dyrerne (Træunderlag) og saltglasserede Trug. Ud for hver enkelt Sti var ophængt en Tavle, hvorpaa fandtes opskrevet forskellige Oplysninger om vedkommende Hold (Race, Avlssted, Fødselsdato, Gennemsnitsvægt (ved sidste Vejning) samt det daglige Foder, udtrykt saavel i Pd. som i Foder-Enheder.

Af nedenstaaende Temperaturtaggelser fra 1. Maj 1908 til 1. April 1909 vil det fremgaa, at Staldtemperaturen ikke har været underkastet særlig store Svingninger Aaret igennem, saaledes at der selv i de koldeste Maaneder har været en Gennemsnitstemperatur i Stalden af  $13-14^{\circ}\text{C}.$ , samt at Foderets Temperatur har været noget nær den samme som Staldens, hvilket hidrører fra, at Foderet henstod 24 Timer til Syrning inden Opfodring.

## Bjernedegaard. Temperaturtagtagelser. ° C.

1908—09	Foderet			Stalden			Ude		
	Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften
Maj .....	13.2	15.4	14.7	13.9	14.8	15.6	8.6	13.5	12.5
Juni.....	15.2	17.1	18.1	15.7	18.5	19.0	14.7	18.8	16.5
Juli .....	23.1	25.2	26.0	17.7	17.8	21.9	15.0	21.7	20.2
August .....	17.8	22.6	22.8	16.5	19.5	16.5	12.8	17.4	16.8
September .....	15.7	18.7	18.5	14.9	17.5	17.4	11.5	14.9	13.9
Oktober .....	15.1	16.0	16.1	15.0	15.8	15.9	7.5	11.2	10.0
November.....	15.1	14.9	15.3	15.1	14.5	15.2	1.4	3.9	3.2
December.....	14.4	14.3	14.4	14.5	13.6	13.7	0.9	1.9	1.6
Januar .....	14.6	14.5	14.5	14.5	14.0	14.2	0.6	0.1	0.4
Februar .....	13.6	13.3	14.0	13.6	13.5	14.0	÷ 3.1	÷ 1.4	÷ 1.0
Marts.....	14.8	14.3	14.9	14.9	14.5	15.5	÷ 2.3	÷ 0.3	0.3
Gennemsnit...	15.7	16.9	17.2	15.1	15.8	16.3	6.0	9.3	8.6

## F o r s ø g s p l a n o g A r b e j d s m a a d e.

Efter Aftale har det været ordnet saaledes, at Svineavlssledelsen for Sjælland, repræsenteret ved Konsulent *K. M. Jensen*, Holbæk, har paataget sig Arbejdet med paa Centrene at udtagte Forsøgsgrisene, der udelukkende har bestaaet af Afkom fra de der kaarede Sører. Fra hver So, hvis Afkom ønskes prøvet, er udtaget et »Forsøgshold« paa 4 Grise, der i en Alder af 5—13 Uger er fremsendt til Bjernedegaard. Man har stræbt efter at lade et Hold bestaa af 2 Galte og 2 Sører, men Forholdene har mange Gange bevirket, at man ved Udtagningen har maattet afvige fra denne Regel.

For de til Forsøg udtagne Grise betaltes der Centrene 10 Kr. pr. Gris; heraf betalte Ejeren af Forsøgsstationen den ene Halvdel, Slagterierne den anden Halvdel.

Ved Forsøg af denne Art, hvor man vil belyse den Forskel, der eventuelt findes for Grise fra de forskellige Centre (Stamsør) med Hensyn til Trivelighed (Evnen til at omssætte Foderet) og Slagteværdi (Evnen til at lægge Kød og Fedt paa de rette Steder og i rette Forhold), har det selvfølgelig den største Betydning, at Forholdene i alle Henseender er saa ens som muligt for de Dyr, der skal sammenlignes. Det gælder da i Særdeleshed

om, at Fodring og Pasning varetages saa nøjagtigt som muligt, hvorfor Laboratoriet hertil har antaget og lønnet en Foderemester, som nøje har vaaget over, at alt gik, som det skulde. Han har modtaget og mærket ankomne Grise, udvejet Foderet daglig til hvert Hold, deltaget i eller kontrolleret Fodringen og efter Anvisning for hvert Hold bogført og beregnet det udvejede Foder, Dyrernes Tilvækst m. m. Han har endvidere med den »Storcheske Prøve« ført Kontrol med, om den skummede Mælk og Kærnemælken var betryggende pasteuriseret.

Hvad nu Fodringen angaar, da har man først og fremmest fulgt den Regel aldrig at give Dyrne mere, end de har kunnet æde rent op.

Som Fodermidler er anvendt: Rug, Byg, Skummet Mælk, Kærnemælk, Valle, grøn Lucerne og Runkelroer.

Ved Opgørelsen i Hovedtabellerne er til 1 Foderenhed regnet:

- 1 Pd. Rug eller Byg.
- 6 - skummet Mælk.
- 6 - Kærnemælk.
- 12 - Valle.
- 1 - Roetørstof.
- 5 - Lucerne (indtil 1. Juli).
- 6 - — (efter — ).

Foderets Sammensætning har varieret med Holdets Gennemsnitsvægt efter følgende Plan:

Holdets Gennemsnitsvægt	pCt. Korn	pCt. Mælk	pCt. Lucerne eller Roer
indtil 40 Pd. ....	70	30	—
fra 40 – 60 Pd. ...	70	25	5
- 60 – 90 - ..	70	15	15
- 90 – 120 - ..	70	10	20

Når Gennemsnitsvægten var over 120 Pd., er der pr. Dyr givet  $\frac{3}{4}$  Foderenhed i Mælk,  $\frac{1}{2}$  Foderenhed i Roer eller Lucerne og Resten i Form af Korn.

Sammensætningen af Foderet har altsaa indenfor de forskellige Vægtklasser været ens med Undtagelse af, at der om

Sommeren er fodret med Lucerne, om Vinteren med Roer. Det har undertiden knebet med at skaffe den planmæssige Mængde skummrede Mælk.

Fodermængden har i det væsentligste rettet sig efter Dyrenes Vægt og Tilvækst, der bestemtes hver 14de Dag, og som Regel er Fodermængden forøget med 0.1—0.3 Foderenhed pr. Dyr hver Uge. Vi har dog ikke ment det rigtigt at overholde en bestemt Foderskala, idet Holdenes Ædelyst og Trivelighed til enhver Tid har maattet tages i Betragtning. Vi har bestræbt os for altid at give Holdene en Fodermængde, der gav god Tilvækst uden at overfede eller overfodre Dyrene, og i saa Henseende har vi maattet gøre nogen Forskel paa Holdene.

Foderet er givet i syrnet Tilstand, idet det inden Opfodring henstod 24 Timer i Foderkarret. Hvert Hold havde som omtalt sit Løbe-Nr. og fik sit Foder udvejet i Karret med tilsvarende Nummer; for hvert Hold fandtes 2 Foderkar.

For saa vidt muligt at undgaa Stivsyge tilsattes i Vintermaanederne hvert Holds blandede Dagsfoder lidt Benmel.

Efterhaanden som Dyrene indenfor et Hold ved de 14 døgnlige Vejninger (hver anden Onsdag), hvor hvert enkelt Dyr vejedes, viste sig at have naaet Slagtevægten, førtes de til Ringsted Slagteri for der at underkastes Bedømmelse efter Slagting. Da Forsøgene imidlertid i særlig Grad har omfattet Afkom efter Sører, der maa formodes at have fremragende Betydning for vedkommende Race, har det været ordnet saaledes, at et Center, saafremt der i et derfra leveret Hold viste sig at være en Sogris, der i en eller flere Retninger (typisk Form eller stor Trivelighed) udmærkede sig, paa nærmere fastsatte Betingelser paa dette Tidspunkt kunde købe den tilbage til Brug for Avlen. Sører, som der ikke disponeredes over i saa Henseende, og Galte blev altsaa slagtede og underkastedes den følgende Dag, efter i Mellemtíden at være bleven afkølede til 6 à 8° C., en sagkyndig og meget indgaaende Bedømmelse, hvis Resultat altsaa er et Udtryk for Holdets Slagteværdi.

Ved Bedømmelsen medvirkede hver Gang 3 Slagteridirektører, hvoraf Direktør Pihl altid var den ene, medens de øvrige sjællandske Slagteridirektører skiftedes til at varetage de to andre Pladser. Endvidere har Laboratoriets Repræsen-

tant, Overassistent *Lunde*, der har haft Tilsynet og Kontrollen med Forsøgsstationen, altid medvirket ved Bedømmelsen. Ved denne er benyttet et Pointssystem, spændende fra 15—0, saaledes at 15 = ug, 12 = mg, 9 = g, 6 = tg. s. v. Der er givet

1 Karakter (Tal) for Flæskets Fasthed.

- 1 — — - Bovpartiet.
- 1 — — - Rygflæskets Tykkelse.
- 1 — — - Fordeling.
- 1 — — - Bugens Form og Fylde.
- 1 — — - Skinkens Form og Størrelse.
- 1 — — - Finhed af Hoved, Ben og Svær.
- 1 — — - Totalindtryk.
- 1 — — - Kødfuldhed (i overskaaren Tilstand).

Ved Bedømmelsen har man fulgt den Regel, at Flæskets Fasthed først bestemtes, hvorefter den øvrige Bedømmelse fandt Sted. Fra Efteraaret 1909 har man søgt at faa et Udttryk for hvert Holds Kødfuldhed, idet man fra da af indenfor hvert Hold har udtaget en Side og overskaaret denne paa 2 Steder for i Snittene at kunne konstatere Fordelingen af Kød og Fedt (Marmorerededen), og der er herfor givet Karakter i Lighed med de øvrige Specialkarakterer. Svinene vejedes saavel i kold, slagtet Tilstand som tilskarne til Eksportvare. Hoved og Flomme fra hvert Dyr vejedes for sig, og der foretages forskellige Maalinger vedrørende Kroplængden samt Tykkelsen af Ryg- og Bugflæsket.

I de Hovedtabeller, der findes trykt bagest i Beretningen, vil man kunne finde forskellige Oplysninger over hvert enkelt Hold, nemlig Antal Galte og Sører paa Holdet, dettes Alder ved Modtagelse og Slagtning, Foderets Størrelse og Sammensætning og omregnet til Foderenheder, Holdets Tilvækst og Forbrug af Foderenheder til 1 Pd. Tilvækst, dels for hele Fedetiden, dels for visse Afsnit deraf. Der er saaledes beregnet Forbrug af Foderenheder til 1 Pd. Tilvækst

for en Vægtklasse under 35 Pd.

- — I. fra 35—75 Pd.
- — II. - 75—115 Pd.
- — III. - 115—155 -

for Gennemsnit af I., II. og III.

- — for hele Fedetiden (a).
- — — — (b).

Tallene under a gaelder kun for de Dyr, der har været i Forsøget hele Fedetiden ud, medens under b ogsaa er indbefattet de Dyr, der inden Fedetidens Afslutning er afgaaet paa Grund af Dødsfald, Sygdom eller Utrivelighed. I Hovedtabellerne findes fremdeles detaljerede Slagtningsresultater, saaledes Vægten af Dyrene i hel Tilstand og tilskaaret, Svindet ved Slagtning og Tilskæring, forskellige Maal samt de Points, Holdet i Gennemsnit har faaet tildelt ved Bedømmelsen. Endelig findes nederst i Tabellerne Oplysning om, hvorvidt alle Dyr paa Holdet er slagtet, eller om et eller flere Dyr eventuelt er udgaaet af Forsøget eller tilbagesendt til Avl.

Sidst i Beretningen, Side 84, vil man finde Avlscentrenes Navne og Løbenumre. Naar alle Grise paa et Hold var slagtet, sendtes detaljeret Meddelelse om de indvundne Resultater saavel til det Center, Grisene stammede fra, som til Svineavlsledelsen, der saaledes altid vidste, hvorledes hvert enkelt Center »stod«.

Vi maa henvise de Læsere, der ønsker detaljerede Oplysninger, til Hovedtabellerne, og skal her i Teksten kun fremsætte nogle Uddrag deraf.

#### D e i n d v u n d n e R e s u l t a t e r .

De første Forsøgshold modtoges paa Bjernedegaard den 22. April 1908, og den sidste Forsøgsslagtning derfra foretoges 20. April 1910. Vi har tidligere anført, at Forsøgene maatte afbrydes i Foraaret 1910, og at der paa det Tidspunkt var smitsom Sygdom blandt Svinene, men da denne navnlig optraadte i Foraarsmaanederne 1910, har den ikke kunnet faa Indflydelse af nogen Betydning paa de her omhandlede Forsøgshold. Der var, da Forsøget maatte afbrydes, paa Forsøgsstationen et ret stort Antal Grise, lige fra mindre til næsten slagtefærdige, men vi fandt det under de foreliggende Forhold rigtigst at afbryde med det samme, hvorved Sygdommen som omtalt ingen Indflydelse kunde faa paa de Resultater, der skulde fremlægges derfra.

Der er i det ovenfor nævnte Tidsrum færdigfedet 194 Hold, deraf 20 Hold Yorkshire- og 174 Hold Landsvin. I efterstaende Tabel er givet en Oversigt over Forsøgsmaterialet.

### Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Ialt mod- taget Antal Grise	Heraf slagtede			Tilbage- sendt til Avl	Udgaet af Forsøget		
		Antal	Tuberkuløse			Antal	i pCt.	
			Antal	i pCt.				
Yorkshire..	76	72	5	7.0	1	3	4.0	
Landsvin ..	698	655	31	4.7	11	32	4.6	
Ialt...	774	727	36	5.0	12	35	4.5	

Der er i Henhold hertil ialt modtaget 76 Grise af Yorkshire-race og 698 Grise af Landrace. I Henhold til det tidligere anførte er nogle af de bedste Sogrise (1 Yorkshire og 11 Landrace) udgaaet af Forsøget inden Slagtning og tilbagesejnt til Centrene eller beholdt paa Forsøgsstationen til Avl. Udgaet af Forsøget er af andre Grunde 3 Yorkshirer og 32 Landsvin, ialt 35 Stkr. (4.5 pCt. af ankomne Grise). Det maa dog her bemærkes, at »udgaet af Forsøget« ved dette Forsøg saa godt som altid betyder, at Dyret er afgaaet ved Døden; kun i ganske enkelte Tilfælde, naar Sygdommen fuldstændig havde taget Overhaand, er Dyret utsat paa et tidligere Tidspunkt. Der er slagtet 727 Dyr, nemlig 72 Yorkshiresvin og 655 Landsvin. Af de slagtede Svin havde 36 Stkr. eller 5 pCt. Tuberkuløse; det fremgaar af Tabellen, at Yorkshirerne har været stærkere angrebet end Landsvinene, hvilket dog kan skyldes Tilfældigheder. Af de 31 tuberkuløse Landsvin stammer 16 Stkr. fra nu nedlagte Centre; 13 af disse Grise stammer fra et bestemt Center, hvorfra er ankommet 36 Grise, saaledes at 36 pCt. af de derfra leverede Grise har været tuberkuløse. Fraegner vi de Hold, der stammer fra disse nedlagte Centrer, faar vi, at der fandtes 15 tuberkuløse Landsvin blandt 516 Stkr. eller 2.9 pCt. Af de 5 tuberkuløse Yorkshiresvin stammede de 4 fra et enkelt Center.

I efterstaende Oversigt er der paa Grundlag af de enkelte Hold-Opgørelser anført en Række Gennemsnitsstal, der tjener til at belyse det indbyrdes Trivseligheds- og Kvalitetsforhold mellem de to Svineracer.

### Gennemsnit for alle Hold.

	Gennemsnit for	
	Svin af York- shirerace	Svin af Landrace
Antal Dyr.....	72	655
Dage gamle ved Modtagelsen.....	53.0	49.3
Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning.....	213	209
Pd. Vægt ved Forsøgstidens Begyndelse.....	21.5	22.8
	Slutning.....	
Pd. Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage .....	185.0	187.5
F. E. pr. Pd. Tilvækst i hele Forsøgstiden.....	10.3	10.5
pCt. Svind ved Slagtning .....	3.67	3.73
- Affald .....	27.1	28.2
- Eksportflæsk.....	13.1	14.0
Flæksets Tykkelse : Ryggen cm.....	59.8	57.8
	3.9	4.0
Flæksets Tykkelse : Bugen cm.....	3.2	3.1
Flæksets Fasthed.....	11.7	11.0
Bovpartiet.....	12.5	11.2
Rygflæksets Tykkelse.....	12.6	11.7
	12.1	11.4
Bugens Form og Fylde .....	11.7	11.2
Skinkens Form og Størrelse.....	12.4	11.4
Finhed af Hoved, Knogler og Svær .....	12.6	11.8
Totalindtryk .....	12.2	11.6

Af denne Oversigt fremgaar, at saavel Begyndelses- som Slutningsvægten i Gennemsnit har været meget nær ens for begge Racer, samt at Begyndelsesvægten — ca. 22 Pd. — synes noget lav for Grise, der i Gennemsnit var ca. 7 Uger gamle (Yorkshirerne 53, Landsvinene 49.3 Dage). Alder ved Slagtning har været temmelig ens for begge Afdelinger, nemlig meget nær 7 Maaneder. Landsvinene har dog ved Slagtning været 4 Dage yngre end Yorkshirerne.

Tilvæksten for 1 Dyr i 10 Dage og Forbrug af Foder en heder til 1 Pd. Tilvækst har ogsaa været meget nær ens for begge Racer. Landsvinene er vokset lidt hurtigere end Yorkshirerne, men de har paa den anden Side forbrugt lidt mere Foder til at producere 1 Pd. Tilvækst.

	Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage	Forbrugt F. E. til 1 Pd. Tilvækst
Y orkshire .....	10.8	3.67
L andrace .....	10.5	3.73

Naar Hensyn tages til, at disse Tal repræsenterer Gennemsnit for henholdsvis 76 Yorkshiresvin og 698 Svin af Landrace, tør det formentlig hævdes, at de nogenlunde er et Udtryk for, hvad der ved omhyggelig Pleje og fornuftig planlagt Fodring vil kunne opnaas ved Arbejde med sjællandske Svin. Ganske vist maa man antage, at Grise, stammende fra de bedste Søer i Avlscentrene, saavel i Trivelighed som Slagteværdi staar over det Materiale, der i Almindelighed findes i Staldene rundtom paa Sjælland, men det maa dog paa den anden Side betones, at der mellem det Materiale, der er Tale om her i Beretningen, findes adskillige Grise, som man i Praksis næppe havde haft Taalmodighed til at færdigfede, og som har bidraget til at forringe Resultatet.

Hvis vi sammenligner de ovenfor anførte Tal for Tilvækst og Foderforbrug med de i Laboratoriets 67de Beretning opførte tilsvarende Tal for Elsesminde og Rodstenseje, vil man se, at de paa Bjernedegåard fundne Tal ligger mellem Tallene fra de to nævnte Forsøgsstationer, dog nærmest ved de for de jyske Svin gældende Tal.

	Elsesminde Yorkshire	Rodstenseje Yorkshire
F. E. til 1 Pd. Tilvækst ...	4.08	4.12

Vender vi os derefter til Slagtningsresultaterne, finder vi, at Yorkshirerne har det mindste Slagtes vind, mindst Affald ved Slagtningen og har givet ca. 2 pct. mere Eksportflæsk end Landsvinene. Et Udslag i samme Retning — altsaa til Fordel for Yorkshiresvinene — faar man ved i Oversigtens nederste Afsnit at betragte de Points, der ved Bedømmelsen er givet for de Egenskaber, der betinger Flæskets Kvalitet: Flæskets Fasthed, Bovpartiets Bygning, Rygflæskets Tykkelse og Fordeling, Bugens og Skinkens Form og Fylde samt Finhed af Knogler og Svær, overalt vil man finde, at Y o r k s h i r e r n e h a r været L a n d s v i n e n e o v e r l e g n e, hvilket finder sit Udtryk i de opførte Points for Totalindtrykket, der for Yorkshirerne er 12.2 og for Landsvinene 11.6.

## Bjernedegaard. Kemiske Analyser af anvendte Fodermidler.

			Æggehvide-stoffer	Fedt	Andre organ. Stoffer + Aske	Vand	Tørstof
<i>Korn 1/3 Hvede, 2/3 Byg</i>	26. Maj 1908	pCt.	7.89	pCt.	71.12	pCt.	18.42
—	15. Febr. 1909		8.99		68.42		20.55
— (heri lidt Vikker)	1. Juli —		9.78		70.67		17.01
—	15. Septbr. —		9.26		76.79		11.64
— (1/3 Rug, 2/3 Byg)	10. Jan. 1910		8.58		69.89		19.76
— (1/4 Rug, 1/2 Byg, 1/4 Majs)	28. Febr. —		8.95		69.56		18.58
— (1/3 Rug, 2/3 Byg)	6. April —		8.98		69.68		19.56
Gennemsnit...		8.92	2.27	70.88	17.93	—	—
<i>Skummet Mælk</i>	Maj 1908 .....	3.25	0.13	5.65	90.97	—	—
	Febr. 1909 .....	3.25	0.09	5.79	90.87	—	—
	Juli — .....	3.31	0.08	5.43	91.18	—	—
	Septbr. — .....	3.50	0.11	4.83	91.56	—	—
Gennemsnit...		3.33	0.10	5.43	91.14	—	—
<i>Kærnemælk</i>	Maj 1908 .....	2.18	0.42	3.63	93.77	—	—
<i>Roer</i>	Maj 1908 .....	0.38	—	—	86.82	13.18	
	August — .....	0.34	—	—	89.44	10.56	
	Oktbr. — .....	0.36	—	—	86.99	13.01	
	Febr. 1909 .....	0.43	—	—	87.84	12.16	
	Septbr. — .....	0.41	—	—	90.29	9.71	
Gennemsnit...		0.38	—	—	88.28	11.72	
<i>Grøn Lucerne</i>	Juli 1909 .....	2.30	—	15.40	82.30	—	—

## B. Elsesminde.

De her foreliggende Resultater fra Forsøgene paa Elsesminde med Svin af forskellig Afstamning omfatter 94 Hold (374 Dyr), som i Tiden fra 1. Juli 1908 til 30. Juni 1910 er afgaaede færdig fodrede fra Forsøgsstationen. Disse to Aars Undersøgelser er en umiddelbar Fortsættelse af og nøje knyttet til de i 67de Beretning omhandlede Forsøg paa Elsesminde. Hvad Staldindretning, Forsøgsplan og Arbejdsmaade angaaer henvises her til, hvad herom findes anført i nævnte Beretning.

I Løbet af de to Aar døde der 19 Dyr, og 16 Dyr blev paa Grund af Sygdom eller Utrivelighed udsatte af Forsøget. 8 Sør tilbageholdtes i Avlsøjemed.

Af de paa Forsøgsstationen modtagne 374 Dyr

afgik som syge, utrivelige eller døde.....	35 Stk. = 9.4 pCt.	Ved første Aars Forsøg 21 Dyr = 9.5 pCt.
tilbageholdtes i Avlsøjemed .....	8 — = 2.1 —	16 — = 7.3 —
leveredes til Slagteriet	331 — = 88.5 —	183 — = 83.2 —
Befængt med Tuberkulose var af de slag-		
tede Dyr .....	21 — = 6.3 —	5 — = 2.7 —

Naar Antallet af døde og udsatte Dyr har været forholdsvis stort, da maa Hovedaarsagen hertil søges i, at en ondartet, smitsom Lungesygdom, den saakaldte »Schweineseuche«, i ikke ringe Grad har hærget Besætningen. Ved en grundig Udrensning og Desinfektion af Stalden i Forbindelse med Serumbehandling af de angrebne og truede Dyr er det lykkedes at begrænse Far-soten derhen, at det nu kun er undtagelsesvis, at der opstaar et Sygdomstilfælde af nævnte Art.

Fra 1. Maj 1910 er ikke blot den skummede Mælk, men ogsaa Vallen blevet betryggende pasteuriseret, og forhaabentlig vil denne Foranstaltung, der vedblivende søges opretholdt, bidrage til, at ogsaa Tuberkulosen, hvis Angreb hidtil har været ret foruroligende, fremtidig faar mindre og mindre Indpas blandt Forsøgsvinene.

Af de 21 tuberkuløse Svin stammede 6 Stk. fra et og samme Center, Avlssted Nr. 9, hvilket bliver 19 pCt. af samtlige derfra modtagne Dyr, medens Resten fordele sig paa følgende Maade:

Avlssted Nr. 13 .....	3 angrebne Dyr (11 pCt.).
— - 11 .....	3 — (15 — ).
— - 3 .....	2 — ( 5 — ).
— - 12 .....	2 — ( 5½ — ).
— - 15 .....	2 — (12½ .. ).
— - 2 .....	2 — ( 6 — ).
— - 6 .....	1 — ( 3 — ).

Fra de øvrige Avlssteder, nemlig Nr. 1, 4, 5, 7, 8 og 9, var Dydrene fri for Tuberkulose.

I hosstaaende Tabel I er angivet den gennemsnitlige Varmegrad, taget 3 Gange daglig, saavel i fri Luft som i Stalden i hver af samtlige 14 daglige Perioder indenfor de 2 Aar.

Foderet, der udvejes i Træbeholdere til hvert enkelt Hold ca. 1 Døgn før Brugen, henstaar til Stadighed i selve Stalden, og dets Varmegrad falder derfor ogsaa, hvad spredte Observationer har konstateret, ret nøje sammen med Stalduftens Temperatur.

Hvad Fodringen angaar henvises til Tabel II, der giver Oplysning om, hvorledes Foderets procentiske Sammensætning har været gennem hele det her omhandlede Tidsrum til de forskellige Grupper af Dyr.

Kraftfoderet, der paa det næjeste har været ens sammensat for alle Foderklasserne, bestod overvejende af Byg, Svinefoder fra Odense Eksportslagteri og Majs, omtrent lige Dele af hver Slags.

Indenfor hver Klasse faar alle Dydrene af samme Blanding saa meget Foder, som de begærer, men heller ikke mere; thi det er paa Forsøgsstationen en ufravigelig Fordring, at der skal

Tabel I. Temperaturtagigelser paa Elsesminde.

Tid	C° i fri Luft			C° i Stalden			Tid	C° i fri Luft			C° i Stalden		
	Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften		Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften
1/7 — 14/7 1908 . . . . .	14.3	20.4	21.6	20.1	22.0	21.4	30/6 — 13/7 1909 . . . . .	14.0	18.1	20.5	17.9	19.4	20.4
15/7 — 28/7 — . . . . .	15.4	22.9	23.6	21.7	23.9	23.8	14/7 — 27/7 — . . . . .	13.3	17.7	17.6	17.8	18.9	19.4
29/7 — 11/8 — . . . . .	14.5	19.1	19.6	20.0	21.0	21.2	28/7 — 10/8 — . . . . .	13.1	17.4	18.0	17.4	18.6	20.0
12/8 — 25/8 — . . . . .	12.1	17.2	16.7	19.1	20.4	20.2	11/8 — 24/8 — . . . . .	13.7	17.9	18.0	18.1	18.8	20.1
26/8 — 8/9 — . . . . .	11.3	15.6	15.1	18.6	19.3	19.6	25/8 — 7/9 — . . . . .	11.5	15.5	15.0	16.9	17.8	18.1
9/9 — 22/9 — . . . . .	11.1	14.7	13.9	19.1	19.1	18.9	8/9 — 21/9 — . . . . .	10.8	14.7	14.6	17.4	17.4	17.8
23/9 — 6/10 — . . . . .	11.3	15.8	15.0	18.9	19.9	20.8	22/9 — 5/10 — . . . . .	11.3	15.3	14.6	17.3	17.9	18.4
7/10 — 20/10 — . . . . .	7.0	11.7	11.1	18.6	18.1	19.3	6/10 — 19/10 — . . . . .	10.6	13.6	13.1	17.3	17.1	17.1
21/10 — 3/11 — . . . . .	6.6	8.5	7.1	17.7	17.1	17.4	20/10 — 2/11 — . . . . .	6.9	9.9	9.4	16.0	15.9	16.1
4/11 — 17/11 — . . . . .	2.4	3.2	2.6	14.5	14.8	15.4	3/11 — 16/11 — . . . . .	3.4	5.9	4.6	14.1	13.9	14.7
18/11 — 1/12 — . . . . .	1.3	2.4	2.1	14.2	14.4	15.0	17/11 — 30/11 — . . . . .	0.6	3.0	2.2	14.1	13.8	14.6
2/12 — 15/12 — . . . . .	0.8	1.2	1.9	13.3	13.9	14.8	1/12 — 14/12 — . . . . .	1.9	4.2	3.8	14.2	15.0	15.1
16/12 — 29/12 — . . . . .	1.8	2.5	2.4	14.1	14.4	15.2	15/12 — 28/12 — . . . . .	0.8	1.3	1.1	13.8	14.2	14.8
30/12 08/1 1909 .. . . . .	3.4	3.4	3.1	15.1	15.4	15.6	29/12 09/1 1910 .. . . . .	3.3	4.8	4.5	15.0	15.5	15.7
13/1 26/1 1909 .. . . . .	÷ 0.4	1.0	0.6	13.9	14.1	14.4	11/1 — 24/1 1910 .. . . . .	3.5	4.0	3.3	15.0	15.4	15.6
27/1 — 9/2 — . . . . .	÷ 1.4	0.2	÷ 0.2	14.7	14.4	14.6	25/1 — 7/2 — . . . . .	÷ 0.8	0.9	1.2	14.2	14.3	14.9
10/2 — 23/2 — . . . . .	÷ 2.4	0.8	÷ 0.6	13.6	13.6	14.3	8/2 — 21/2 — . . . . .	1.4	3.9	2.0	14.8	15.2	15.5
24/2 — 9/3 — . . . . .	÷ 3.3	÷ 0.9	÷ 1.6	11.9	12.4	12.4	22/2 — 7/3 — . . . . .	3.0	4.8	4.1	14.6	15.0	15.7
10/3 — 23/3 — . . . . .	÷ 0.9	1.5	0.9	11.6	11.9	12.8	8/3 — 21/3 — . . . . .	3.1	5.9	5.2	15.1	15.8	16.2
24/3 — 6/4 — . . . . .	2.8	4.9	5.4	14.6	15.1	15.8	22/3 — 4/4 — . . . . .	3.5	6.8	5.8	15.2	15.6	15.7
7/3 — 20/4 — . . . . .	4.2	7.0	7.7	15.4	17.1	16.3	5/4 — 18/4 — . . . . .	4.3	8.2	8.0	15.5	16.7	16.8
21/4 — 4/5 — . . . . .	5.0	9.4	10.3	16.2	16.2	16.9	19/4 — 2/5 — . . . . .	6.9	10.4	9.7	16.3	17.1	17.4
5/5 — 18/5 — . . . . .	4.6	9.6	10.7	16.6	16.1	17.1	3/5 — 16/5 — . . . . .	6.8	11.3	11.6	17.0	18.1	18.6
19/5 — 1/6 — . . . . .	9.6	15.7	17.4	18.4	18.7	19.4	17/5 — 30/5 — . . . . .	12.6	17.8	18.0	18.0	18.7	19.1
2/6 — 15/6 — . . . . .	10.1	14.4	16.7	16.9	17.6	18.4	31/5 — 13/6 — . . . . .	13.4	18.1	18.3	18.1	19.0	19.7
16/6 — 29/6 — . . . . .	13.2	18.6	21.6	19.2	20.2	21.4	14/6 — 30/6 — . . . . .	15.4	20.5	20.6	19.4	20.7	21.6

Tabel II. Foderets procentiske Sammensætning i Tiden fra  
1. Juli 1908 til 30. Juni 1910 paa Elsesminde.

Tid	Foderklasse	Foderet bestod af:					
		Kraft-foder	Slk. Mælk	Valle	Foder-sukker-roer	Runkel-roer	Lucerne
1/7—24/8 1908.	I. Dyr under 40 Pd. .... II. — fra 40 til 60 Pd.... III. — - 60 - 90 - .... IV. — over 90 Pd. ....	pCt. 65½ 66 63½ 62	pCt. 32 25 21 16	pCt. — 4 8 12	pCt. — — — —	pCt. — — — —	pCt. 2½ 5 7½ 10
25/8 1908— 31/5 1909.	I. Dyr under 40 Pd. .... II. — fra 40 til 60 Pd.... III. — - 60 - 90 - .... IV. — over 90 Pd. ....	61 61 61 61	30 25 19 14	— 1 2 3	9 13 18 22	— — — —	— — — —
1/6—20/9 1909.	I. Dyr under 40 Pd. .... II. — fra 40 til 60 Pd.... III. — - 60 - 90 - .... IV. — over 90 Pd. ....	68 72 73 74	30 24 21 18	— — — —	— — — —	— — — —	2 4 6 8
21/9—16/11 1909.	I. Dyr under 40 Pd. .... II. — fra 40 til 60 Pd.... III. — - 60 - 90 - .... IV. — over 90 Pd. ....	65 63 61 59	30 27 24 21	— — — —	— — — —	5 10 15 20	— — — —
17/11 1909— 17/6 1910.	I. Dyr under 70 Pd. .... II. — fra 70 til 85 Pd.... III. — - 85 - 100 - .... IV. — over 100 Pd. ....	65 64 63 64	30 26 22 18	— — — —	— — — —	5 10 15 18	— — — —
18/5—30/6 1910.	I. Dyr under 50 Pd. .... II. — fra 50 til 70 Pd.... III. — - 70 - 85 - .... IV. — - 85 - 100 - .... V. — over 100 Pd. ....	67 69 70 71 72	32 24 16 8 —	— 5 10 15 20	— — — — —	— — — — —	1 2 4 6 8

ædes rent op efter hver Fodring. En Gang om Ugen øges Holdenes Foder, saaledes at dettes Størrelse til enhver Tid er i Overensstemmelse med Dyrenes Ædelyst. Afvigelse fra denne Foderregel har af og til fundet Sted overfor syge eller mindre trivelig anlagte Hold, hvor det enkelte Gange har været nødvendigt

for en kortere Periode enten at undlade at give Tillæg i Foderet eller ligefrem at nedsætte den hidtidige Foderration.

**Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Forholdet mellem de forskellige Racer af Svin paa Elsesminde.**

	For Tidsrummet 1/7 1908 – 30/6 1910			Gennemsnit af 67. Beretning	
	Svin af York- shirerace	Svin af Landrace	Kryd- ningssvin	Svin af York- shirerace	Svin af Landrace
Antal Hold .....	25	61	8	14	41
Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning..	231	224	212	223	223
Pd. Vægt ved Forsøgstidens Begyndelse	26.5	29.6	31.5	33.4	32.0
Slutning ..	186.3	188.4	189.5	189.5	188.3
Pd. Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .....	9.2	9.5	10.1	9.6	9.5
F. E. pr. Pd. Tilvækst ( a ) .....	4.19	4.11	4.01	4.08	4.12
i hele Forsøgstiden ( b ) .....	4.22	4.12	4.01	4.07	4.13
pCt. Svind ved Slagtning .....	27.3	29.2	29.0	27.5	28.58
- Affald .....	13.6	14.3	13.5	13.6	14.9
- Eksportfleesk .....	59.1	56.5	57.5	58.9	56.6
Flæskets Tykkelse i cm. Ryggen .....	3.57	3.67	3.73	3.64	3.83
— Bugen .....	3.02	2.89	3.01	3.28	3.01
Kroplængde i cm. fra Snit ved Hals til Hofteskaal .....	90.8	92.2	91.4	90.6	91.5
Points for Flæskets Fasthed .....	12.7	11.6	12.6	13.4	12.2
- - Bovpartiet .....	12.3	11.9	12.3	12.3	11.6
- - Rygflæskets Tykkelse .....	12.2	12.2	12.2	12.7	12.0
- - Fordeling .....	12.5	12.6	12.8	12.9	12.7
- - Bugens Form og Fylde .....	12.2	11.5	12.0	12.7	12.0
- - Skinkens Form og Størrelse .....	13.0	11.7	12.6	13.5	11.6
- - Finhed af Hoved, Knogler og Svær .....	13.1	11.5	12.5	13.6	11.9
- - Kødfylde .....	(12.5)	(11.7)	(12.0)	—	—
- - Totalhindtryk .....	12.5	11.8	12.5	13.1	11.9
Antal Dyr tilbageholdt til Avl .....	1	5	2	3	13
— udgaaet af Forsøget .....	12	23	0	7	13

Tabel III, som er et Uddrag af Hovedtabellerne vedrørende de enkelte Forsøgshold, er fremsat for at vise det indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold mellem de 3 Hovedgrupper af Dyr: Yorkshire-, Landrace- og Krydsningssvin. For Sammenligningens Skyld er tilsvarende Tal fra 67de Beretning (1. Forsøgsaar) medtagne i Tabellen.

I de her omhandlede 2 Aar er der udført Forsøg med 25 Hold Yorkshiresvin, 61 Hold Landsvin og 8 Hold Krydsnings-

svin, ialt 94 Hold eller 374 Dyr. Med Undtagelse af 2 Hold Svin af Landrace, hvor der kun var 3 Dyr paa Holdet, har altsaa hvert af de øvrige 92 Hold oprindelig bestaaet af 4 Dyr.

Yorkshiresvinene brugte i Gennemsnit 7 Dage flere end Landsvinene og 19 Dage flere end Krydsningssvinene for at opnaa Slagtevægten. Den paa Forsøgsstationen producerede Tilvækst var omrent ens for de 3 Racer, nemlig henholdsvis 159.8 Pd., 158.8 Pd. og 158.0 Pd., altsaa dog størst for Yorkshiresvinene.

Den 10-daglige Tilvækst var for Yorkshiresvinene 9.2 Pd., for Landsvinene 9.5 Pd. og for Krydsningssvinene 10.1 Pd. Triveligheden (Evnen til at udnytte Foderet) findes udtrykt gennem de Tal, der angiver Forbrug af F.-E. pr. Pd. Tilvækst. Tallene under a gælder kun for de Dyr, der har fortsat hele Forsøget ud, hvorimod Tallene under b omfatter alle Svinene, heri indbefattet ogsaa de Dyr, der paa Grund af Dødsfald, Sygdom eller Utrivelighed udgik af Holdene før Forsøgets Afslutning. Med Hensyn til Triveligheden stillede Forholdet sig mindst gunstigt for Yorkshiresvinene, bedre for Landsvinene og bedst for Krydsningssvinene. I første Forsøgsaar udviste Yorkshiresvinene derimod, som det ses af Tabellen, en lidt højere Trivelighed end Landsvinene. For øvrigt er Foderforbrugstallene fra de to Opgørelser i ganske god Overensstemmelse; i Gennemsnit for alle Dyr (b) og alle Grupper stillede Forholdet mellem Foder og Tilvækst sig nemlig som følger:

1. Forsøgsaar (12. Marts 1907—30. Juni 1908): 4.11 F. E. pr. Pd. Tilvækst.

2. og 3. Forsøgsaar (1. Juli 1908—30. Juni 1910): 4.14 F. E. pr. Pd. Tilvækst.

Et saadant Foderforbrug staar ret nøje i Samklang med ikke alene, hvad der i sin Almindelighed anses som Norm i Praksis, men ogsaa med de Resultater, der i den paagældende Retning er opnaaet ved Laboratoriets tidligere udførte Fodringsforsøg med Svin. Her maa det imidlertid ikke lades ude af Betragtning, at Hovedparten af de nævnte Fodringsforsøg er anstillede med Svin fra ganske almindelige Besætninger, der vel næppe kan antages at have været i Besiddelse af en saa høj Trivelighed som de Dyr, der inddrages under Forsøgene paa Elsesminde, og som stammer fra anerkendte fynske Svineavlscentrer. Det ligger derfor nær at slutte, at der paa Elsesminde har eksisteret

Forhold, som har bidraget til at hæmme Dyrenes Trivsel, saaledes at Foderforbruget er blevet lovlig højt.

Ligesom »Schaveineuseuchen« sikkert har været en stærkt medvirkende Aarsag til den forholdsvis store Dødelighed blandt Svinene paa Elsesminde, kan det anses som givet, at den nævnte Sygdom ogsaa bærer Hovedskylden for Dyrenes mindre gode Trivsel. Det var især Forsøgsholdene 83, 87, 89, 98, 100, 102, 104, 110, 112, 115 og 147, som blev angrebne af »Schweineuseuche«, og af de herhen hørende 44 Dyr (11 Hold) døde der 10 Stk., medens 2 maatte udsættes som fuldstændig utrivelige. I Gennemsnit fortærede disse 11 syge Hold 4.53 F. E. pr. Pd. Tilvækst, — en Omstændighed — der altsaa har foranlediget en ret stærk Stigning i det gennemsnitlige Foderforbrug for samtlige 94 Forsøgshold. Sygdommen er dog nu efter alle Solemærker at dømme stærkt paa Retour, saa at saavel Dødelighedsprocenten som Foderforbruget i de forløbne 10 Maaneder af 4. Forsøgsaar har været betydelig lavere end tidligere.

Medens Yorkshiresvinene i 2. og 3. Forsøgsaar ikke fuldt ud har kunnet staa Maal med Landsvinene og endnu mindre med Krydsningssvinene, saa har de denne Gang ligesom tidligere hævdet deres Overlegenhed, hvad Flæskets Mængde og Kvalitet angaaer. Yorkshiresvinene har leveret 2.6 pCt. Eksportflæsk mere end Landsvinene og 1.6 pCt. mere end Krydsningssvinene, og paa de Punkter, som er mest afgørende ved Bedømmelsen af Flæskets Kvalitet, nemlig Flæskets Fasthed, Bugens Form og Fylde, Skinkens Form og Størrelsen samt Finheden af Hoved, Ben og Svær har det ligeledes indtaget Pladsen som en smuk Nr. 1. Karakterne var her følgende:

	Yorkshiresvin	Landsvin	Krydsningssvin
Points for Flæskets Fasthed...	12.7	11.6	12.6
— - Bug.....	12.2	11.5	12.0
— - Skinker .....	13.0	11.7	12.6
— - Finhed .....	13.1	11.5	12.5

Det ser imidlertid ud til, at Kvalitetsforskellen mellem Yorkshiresvinene og Landsvinene er blevet noget udjævnet siden 1. Forsøgsaar, hvor den, som det fremgaar af en Sammenligning af Points for Totalindtryk i de forskellige Aar, var adskillig større.

Kødfylden blev ikke bedømt for alle Holdene, og af den Grund er de paagældende Tal sat i Klammer.

## C. Rodstenseje.

De Forsøg, her skal omtales, er alle udførte paa Forsøgsstationen Rodstenseje ved Odder og er nøje knyttet til og en umiddelbar Fortsættelse af de Forsøg, som i 1908—09 er udført samme Sted, og som findes omtalt i Forsøglaboratoriets 67de Beretning, hvorfor ogsaa de benyttede Løbenumre for Holde ne er fortløbende fra 76—161.

Da saavel Forsøgsplan som Arbejdsmaade er i nøje Overensstemmelse med de tidlige Forsøg, skal vi ikke atter gaa i Enkelthederne, men henvise til, hvad der herom er anført i 67de Beretning.

For Fuldstændigheds Skyld finder vi det dog rigtigst at bemærke, at Foderet kun har bestaaet af skummet Mælk og Korn — halvt Byg og halvt Majs —, samt at dette efter at være nøjagtigt udvejet til hvert Hold har henstaaet til Syrning i 24 Timer, forinden Fodringen dermed er paabegyndt.

Foderets Art og Blanding har været ens for alle Hold, derimod har Mængden været afpasset efter Dyrenes Vokseevne, Ædelyst og Anlæg, og vi har befittet os paa at yde dem et i Forhold til nævnte Egenskaber passende Foder, saa de alle af den Grund har kunnet afgive en god Eksporthvare.

Medens Mængden af Mælk, naar undtages den første Tid, har været 6 Pd. pr. Dyr dgl., er Foderforægelsen med Dyrenes Størrelse sket i Korn alene; men naar Foderet blev saa stort, at Mælken ikke kunde opbløde det gruttede Korn tilstrækkelig, blev der givet Tilskud af Vand, dog ikke mere, end at der kunde blive 2 Pd. flydende for hvert 1 Pd. fast Foder.

Saa fremt alle paa Forsøgsstationen opdrættede og fedede Dyr havde samme Anlæg og Egenskaber, kunde Fodermængden fastsættes efter en én Gang afpasset Skala; men havde vi fulgt den Fremgangsmaade, vilde Følgen være bleven, at nogle Hold

havde faaet for stort et Foder og var blevne for fede, medens andre havde faaet for lidt og var blevne for magre.

Da det maaske dog kunne have sin Interesse at se, hvor stærkt Dyrerne har været fodrede, har vi i Uddrag af Fodertabellerne i Tabel I opført den Fodermængde, som har været anvendt ved de forskellige Vægtgrænser, men disse Tal angiver altsaa ikke en Fodermængde, hvorefter der har været fodret, men er et Gennemsnitstal for den Fodermængde, som har været benyttet.

#### Tabel I. Anvendt Foder ved forskellige Vægtgrænser.

Naar Dyrenes Vægt i Pd. var ca... 30 40 50 60 70 80 90  
var Antal F.-E. dgl. i Gennemsnit.. 1.7 2.1 2.6 3.1 3.4 3.8 4.2

Naar Dyrenes Vægt i Pd. var ca.... 100 110 120 130 140 150  
var Antal F.-E. dgl. i Gennemsnit.. 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0

Af ovenstaaende Tal fremgaar, at efterhaanden som Dyrene blev større har Foderet været jævnt stigende, og at der sluttes af med 6.0 F.-E. pr. Dyr dgl., hvortil dog maa bemærkes, at vi for enkelte Holds Vedkommende mod Slutningen har været oppe ved 6.5 F.-E. pr. Dyr dgl.

Fra Juli 1909 til August 1910 er der paa Forsøgsstationen opdrættet og fedet 86 Hold Svin, nemlig 70 Hold af Landrace, 13 Hold af Yorkshirerace og 3 Hold Krydsninger faldne efter Orne af Yorkshirerace og So af Landrace.

I Aarets Løb er 9 Grise døde, 7 er paa Grund af Sygdom eller Utrivelighed udsatte af Forsøget, og 12 Sører er solgte tilbage til Centrene for der at indgaa som Stamdyr.

Sammenstilles disse Tal med det til Forsøgsstationen indgaaede Antal Dyr, faar vi følgende:

Indgaaet 86 Hold = 344 Dyr.

		Ved første Aars Forsøg
16 Dyr udgaaede som syge, utrivelige eller døde .....	4.7 pCt.	3.0 pCt.
12 Dyr solgte til Centrene som Avlsdyr	3.5 —	4.0 —
316 Dyr leverede til Slagteriet .....	91.8 —	93.0 —
Heraf havde 9 Stkr. Tuberkulose, hvilket bliver .....	2.8 —	1.3 —

Til Sammenligning er de procentiske Tal fra første Aars Forsøg vedføjet, og man vil heraf se, at selv om Tallet for døde og utrivelige Dyr er meget begrænset, er det dog lidt højere i Aar end i Fjor, Antallet af tilbagesendte Avlsdyr er procentvis mindre, men i Antal nøjagtig ens, nemlig 12 Stkr. for begge Aar, derimod er Procenten for tuberkuløse Dyr noget større for sidste Aar, men dette har sin Grund deri, at samtlige 4 Dyr i et af Holdene var tuberkuløse. Om dette Hold Svin er i øvrigt at meddele, at uagtet to af Dyrene viste sig at være i høj Grad angrebne af Tuberkulose, trivedes de dog godt og gav ogsaa et godt Slagningsresultat.

Da Tilfældet med, at samtlige Dyr i Holdet var angrebne af Tuberkulose, hidtil var enestaaende blandt Forsøgsdyrene, og vi ved daglig at benytte den storckske Prøve havde forvisset os om, at den anvendte Mælk var smittefri, ligesom der ogsaa paa anden Vis var taget alle Forholdsregler mod Smitte, var vi paa det rene med, at saavel disse som de øvrige tuberkuløse Dyr maa have haft Sygdommen, før de kom paa Forsøgsstationen. I Betragtning af Sagens Vigtighed henvendte vi os til den Centerejer, som havde leveret nævnte Hold Grise, for at søge oplyst, hvilken Behandling der var bleven Grisene til Del, inden de afsendtes til Forsøgsstationen, og det oplystes, da at Grisene havde haft Lov til at løbe frit omkring i Kostalden, ligesom de ogsaa havde faaet ret betydelige Tilskud af ukogt Sødmælk, samt at andre Grise af samme Kuld ligeledes havde vist sig at være befængt med Tuberkulose.

Med saadant Eksempel for Øje benytter vi Lejligheden til at advare Opdrættere imod at fodre Smaagrise med ukogt Sødmælk og at lade dem løbe frit omkring i Kostalden, naar man ikke er vis paa, at Kvægbesætningen er tuberkelfri; ligesom det ogsaa maa betragtes som absolut forkasteligt, hvad jo er ret almindeligt, at Røgteren tager Levninger fra Køernes Krybber og giver til Svinene.

Fradrages nævnte Hold Grise, bliver altsaa tilbage kun 5 tuberkuløse Dyr paa 85 Hold, hvilket synes at tyde paa, at Dyrene fra Avlscentrene gennemgaaende er fri for Tuberkulose.

---

I Hovedtabellerne, som findes sidst i Beretningen, findes anført Gennemsnit af de for hvert Hold foretagne Observationer saavel vedrørende Foder og Tilvækst som de paa Slag-

teriet foretagne Bedømmelser, samt Oplysning om Dyrenes Afstamningsforhold m. m., men da Hovedtabellerne i alt væsentligt er indrettet som i 67de Beretning, og der dér er gjort nøje Rede for Enkelthederne, vil vi ikke atter gentage dem her, men henvise dertil, og da det foreliggende Materiale endnu ikke kan anses for at være tilstrækkelig omfattende til at man paa dette Grundlag kan udlæde noget om de enkelte Slægters Kvalitet, skal vi nøjes med i Tabel II at opstille Gennemsnitstallene for de forskellige Racer, hvorved enhver, som maatte interessere sig deraf, vil have let ved at kunne sammenligne Resultaterne fra de enkelte Hold med vedkommende Races Gennemsnit.

Tabel II.

	Svin af Yorkshirerace	Svin af Landrace	Svin af Krydsninger	Gennemsn. af 67de Beretn.	Svin af York- shirerace	Svin af Landrace
Antal Hold .....	13	70	3	12	60	
Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning	193	189	185	192.0	185.4	
Pd. Vægt ved Forsøgstidens Begyndelse .....	27,0	28.7	32.7	29.0	32.0	
Pd. Vægt ved Forsøgstidens Slutning .....	178.8	179.3	179.8	181.8	180.8	
Pd. Tilvækst pr. Dyr pr. 10 Dage...	11.1	11.3	11.7	11.3	11.4	
F. E. pr. Pd. Tilvækst i hele Forsøgstiden .....	3.59	3.57	3.57	3.58	3.63	
pCt. Svind ved Slagtning .....	23.6	25.2	27.5	25.0	26.0	
pCt. Affald .....	13.6	13.5	13.5	12.7	13.1	
pCt. Eksportflæsk .....	62.8	61.3	62.0	62.3	60.9	
Flæskets Tykkelse, Ryggen cm.....	4.0	4.1	3.8	3.9	4.1	
, Bugen - .....	3.2	2.9	3.1	3.2	2.9	
Flæskets Fasthed .....	Points	12.8	12.4	12.5	12.5	12.4
Bovpartiet .....	-	12.0	11.8	12.4	12.0	11.8
Rygflæskets Tykkelse .....	-	12.2	12.2	13.0	12.3	12.2
Fordeling .....	-	12.4	12.5	12.8	12.5	12.5
Bugens Form og Fylde .....	-	13.0	11.9	12.4	12.3	11.6
Skinkernes Form og Størrelse .....	-	12.6	11.7	12.7	12.8	11.6
Finhed af Hoved, Knogler og Svær -	-	12.7	11.8	13.1	12.9	11.7
Totalindtryk .....	-	12.6	11.7	13.0	12.6	11.7
Antal Avlsdyr sendt tilbage til Avl -	-	3.0	9.0	>	6.0	6.0
Antal Dyr udgaaet af Forsøget -	-	4.0	12.0	>	0.0	8.0
Kødfuldhed .....	-	12.5	11.8	12.5	>	>

Som det fremgaar af første Linie har der været inddraget 70 Hold af Landrace, men kun 13 og 3 af henholdsvis Yorkshirerace

og Krydsninger, og selv om 70 Hold vel nok kan være et Udtryk for de jydske Landracesvin i Almindelighed, saa er Holdene tildels for Yorkshiresvinene, men navnlig for Krydsningerne for faatallige til at kunne være noget fuldgyligt Udtryk for disses Trivelighed og Kvalitet og kan derfor kun benyttes som Fingerpeg.

Yorkshiresvinene har haft den længste Udviklingstid, nemlig 192 Dage mod 189 for Landracen og 185 for Krydsningerne.

Tilvæksten for Yorkshirerne har været 11.1, for Landracen 11.3 og for Krydsningerne 11.7 Pd. pr. 10 Dage, men Foderforbruget har som Gennemsnit for hele Forsøgstiden været ens for dem alle, nemlig 3.59, 3.57 og 3.57. hvilket paa det nærmeste er det samme som Gennemsnitstallene i 67de Beretning, der var 3.58 for Yorkshirerne og 3.63 for Landracen.

Da disse Forbrugstal omfatter Gennemsnitstal for alle 5 Grupper, der tilsammen udgør 158 Hold Svin, kan man vel gaa ud fra, at med en Pleje og Ernæring svarende til den, der er blevet Dydrene til Del paa Forsøgsstationen, er et Foderforbrug af 3.6 F.-E. pr. Pd. Tilvækst et noget nær gældende Udtryk for den Fodermængde, der medgaar til Produktionen af et Pd. Tilvækst for de fra jyske Avlscentre udgaaede Svin. Dermed være ikke sagt, at alle Dyr fra Avlscentrene kan producere Flæsk med den Fodermængde, hvilket ogsaa fremgaar af Tallene i Hovedtabellerne Linie 27; men et Gennemsnitsforbrug, der er fremkommen ved Fodring af 158 Hold Svin, skulde man synes de allerfleste Opdraettere gennem en hensigtsmæssig Avl, god Pleje og passende Ernæring maatte kunne naa ned til.

Slagtesvindet er lavest for Yorkshiresvinene med 23.6 pCt., højest for Landracesvinene med 25.2, hvorimod Krydsningerne staar omrent midt imellem med 24.5, og da Mængden af Affald er ens for alle Grupper, bliver Tallene for Eksportflæsk lavest, hvor Tallene for SvinDET er højest og omvendt.

I de følgende Linier skal kun peges paa, at Landracen har faaet lavest og Krydsningerne højst Points for Bovpartens Bygning, samt at sidstnævnte tillige staar over saavel Yorkshirer som Landrace i Points for Rygfæskets Tykkelse og Fordeling.

Hvad Bugpartiets Form og Fylde angaar, da har Landracen kun erholdt 11.9, Krydsningerne 12.4, men Yorkshiresvinene 13.0 Points, ligesom de tilsvarende Tal for Skinkernes Form og Størrelse er 11.7, 12.7 og 12.6.

Endelig staa i Finhed af Knogler, Svær og Hoved og i Points for Totalindtryk Krydsningerne over Yorkshirerne og disse igen over Landracen, sidstnævnte har ligeledes faaet den laveste Karakter ved Bedømmelsen af Kødfuldhed.

For Sammenlignings Skyld har vi tilføjet de tilsvarende Tal fra 67de Beretning, og man vil lægge Mærke til, at der er god Overensstemmelse mellem disse og de her omtalte, og det hvad enten man sammenligner Yorkshire- eller Landracesvinene indbyrdes.

Tabel III.

	Foderforbrug til 1 Pd. Tilvækst				Gennemsn. af 67de Beretn.	
	Svin af York- shireace	Svin af Landrace	Svin af Kryds- ninger	Svin af York- shireace	Svin af Landrace	
	F.-E.	F.-E.	F.-E.	F.-E.	F.-E.	
Vægtklasse 0 (under 35 Pd.).....	2.68	2.72	2.83	2.37	2.57	
— I (35–75 Pd.).....	2.82	2.77	2.86	2.87	2.92	
— II (75–115 Pd.).....	3.43	3.48	3.37	3.55	3.51	
— III (115–155 Pd.).....	4.08	3.93	3.92	3.94	3.99	
— IV (over 155 Pd.) .....	4.40	4.22	4.50	4.32	4.35	
Gennemsnit for I–II–III .....	3.42	3.46	3.37	3.45	3.47	
Gennemsnit for alle Vægtklasser .....	3.59	3.57	3.57	3.58	3.63	
Hvorlænge det har varet at forøge forøge Dyrrets Vægt med 40 Pd.						
Vægtklasse I .....	Antal Dage	Antal Dage	Antal Dage	Antal Dage	Antal Dage	
— II .....	42	45	42	43	43	
— III .....	33	33	33	34	33	
Sum... .....	31	29	30	29	30	
	106	107	105	106	106	

Dernæst følger i Tabel III en Sammenstilling af hvor mange Dage der for de forskellige Grupper er medgaaet til hver Vækstperiode, samt hvor stort et Foderforbrug der inden for samme er medgaaet til et Pd. Tilvækst, og af de samhørende Tal fremgaar, at der kun er ubetydelige Uoverensstemmelser.

Da det sikkert kan have sin Interesse at se, om der er nogen Forbindelse mellem forskellige Bygningstræk hos Slagtedyrene, har vi i nedenstaende Tabel IV for de hidtil fra Forsøgsstationen slagtede 158 Hold sammenstillet de af Dommerne givne Points for et Par af de Bygningstræk, som tillægges den allerstørste Betydning, nemlig Bugens Form og Fylde og Skinkernes Form og Størrelse, og delt dem i 3 Klasser, kaldet daarlige, gode og ekstra, saaledes at der til de første henregnes de Dyr, som har faaet 10 eller lavere Points, til de gode dem, der har faaet 11 og 12 Points, og til ekstra dem, der har faaet 13 Points og derover.

Som Udgangspunkt har vi benyttet Klasserne med daarligt og ekstra Bugflæsk.

#### Tabel IV. Lave Points for Bug.

Af 68 Dyr med 9 à 10 Points for Bug har 27 eller 40 pCt. faaet 9.4 Points for Skinker.
- 35 — 51 — — 11.5 — - —
- 6 — 9 — — 13.3 — — —

Af Tabellen, som omfatter 68 Dyr, der alle har faaet en daarlig Karakter for Bugen, er der 27, som ligeledes har erholdt daarlig Karakter for Skinker, i Gennemsnit 9.4 Points; 35 Dyr, der har faaet 11 à 12 Points, Gennemsnit 11.5, og kun 6, som er kommet i Klassen ekstra med 13 Points og derover. Dette kunde tyde paa, at daarligt Bugflæsk ledsages af daarlige eller gode, men sjældent af ekstra gode Skinker.

Sammenligner vi paa lignende Vis de Dyr, som har faaet ekstra for Bugen, med de tildelte Points for Skinker, ser vi af

#### Tabel V. Høje Points for Bug.

Af 151 Dyr med 13 à 14 Points for Bug har 71 eller 3 pCt. faaet 7.5 Points for Skinker.
- 76 — 50 — — 11.6 — - —
- 71 — 47 — — 13.5 — - —

Tabel V, at af 151 Dyr, der har erholdt 13 Points og derover for Bug, er der 71 eller 47 pCt., som ogsaa har faaet høj Points

for Skinker, 76 Dyr eller 50 pCt., der har faaet 11 og 12, og kun 4 Dyr, svarende til 3 pCt., der har faaet daarlig Karakter for Skinker.

Af disse Tal fremgaar, at selv om der ogsaa er nogen Uregelmæssighed til Stede, synes der dog at være nogen Sammenhæng mellem Bugflæskets Kvalitet og Skinkernes Form og Størrelse.

Paa samme Maade kunde der af det foreliggende Materiale gøres andre Sammenstillinger, men vi skal denne Gang endnu kun opføre Pointstallene for Skinkernes Form og Størrelse og dermed sammenligne Tallene for Mængden af Eksportflæsk, samt endvidere tilføje de tilsvarende Karakterer for Bugflæskets Kvalitet.

**E k s t r a S k i n k e r :** 168 Dyr, som har faaet 13 Points eller derover for Skinker, gav 62.1 pCt. Eksportflæsk og erholdt 12.0 Points for Bug.

**D a a r l i g e S k i n k e r :** 194 Dyr, som har faaet 10 eller lavere Points for Skinker, gav 59.8 pCt. Eksportflæsk og erholdt 10.9 Points for Bug.

Disse Tal viser tydelig nok, at Dyr med gode Skinker giver meget Eksportflæsk samt en god Bug, og Dyr med daarlige Skinker giver lidt Eksportflæsk samt en daarlig Kvalitet af Bug.

Ved omhyggelig Brug af Ventilationsmidlerne har vi befittet os paa at faa Luften i Stalden og Varmegraden i Foderet reguleret saaledes, at den holdt over 10 og under 20 Gr. C., hvilket ogsaa paa det allernærmeste er lykkedes.

I Tabel VI er opført Gennemsnits-Temperaturen i fri Luft, Stald og Foder for hver 14-daglig Periode.

Da Arbejdet paa Forsøgsstationen skulde bidrage til gennem Forsøg at søge belyst, hvilke Stammer der indenfor Racerne er de bedste med Hensyn til Trivelse (lavt Forbrug af Foder pr. Pd. Tilvækst) og i Retning af at yde en god Kvalitet (lille Slagtes vind, højt Tål for Eksportflæsk, samt høje Karakterer for de af Dommerne bedømte Bygningstræk), og da det har vist sig hidtil at være den eneste farbare Vej for at faa disse Forhold belyst, maa man ogsaa vente, at Opdrætterne ved Udvælg af Tillægstdyr vil tage alt muligt Hensyn til disse Forsøgsresultater, og sker dette, skal det nok ogsaa vise sig, at Arbejdet paa Forsøgsstationerne kan bidrage til at gøre Flæskeproduktionen mere rentabel.

Tabel VI.

Dato	Fri Luft			Stalden			Foderet		
	Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften
24/6 — 7/7 1909 . .	14.0	18.6	17.3	16.5	18.9	19.2	16.5	20.2	18.9
8/8 — 21/7 — . .	14.1	17.9	17.6	16.9	18.8	19.1	16.9	20.2	19.1
22/7 — 4/8 — . .	13.1	16.2	14.9	16.2	17.5	17.5	16.2	20.0	18.1
5/8 — 18/8 — . .	14.3	18.9	17.6	17.5	19.6	19.9	17.2	20.6	19.6
19/8 — 1/9 — . .	13.6	16.4	14.8	16.9	18.1	18.1	17.2	20.7	19.3
2/9 — 15/9 — . .	10.6	15.2	12.9	15.7	16.9	16.5	15.9	19.6	17.8
16/9 — 29/9 — . .	11.8	14.9	13.1	16.3	17.0	16.4	16.1	19.5	17.4
30/9 — 12/10 — . .	10.2	14.4	11.9	15.2	17.3	16.0	15.7	18.4	17.0
14/10 — 27/10 — . .	10.3	12.6	10.3	14.6	15.4	14.5	15.1	18.1	16.8
28/10 — 10/11 — . .	5.1	7.9	6.0	12.0	13.1	12.6	12.1	16.6	13.3
11/11 — 24/11 — . .	÷ 1.3	1.4	0	11.3	12.1	11.6	11.4	14.1	12.3
25/11 — 8/12 — . .	1.6	4.1	3.2	12.5	13.5	13.3	12.7	15.5	14.0
9/12 — 22/12 — . .	0.3	0.9	0.1	11.8	13.0	12.6	11.8	15.4	13.2
23/12 — 5/1 1910 . .	2.3	3.2	2.9	11.9	12.6	12.2	11.3	13.5	12.6
6/1 — 19/1 — . .	3.6	4.6	3.6	11.8	12.4	12.1	11.1	14.0	12.8
20/1 — 2/2 — . .	÷ 2.1	0.7	1.4	11.2	12.4	11.6	11.1	12.6	11.7
3/2 — 16/2 — . .	0.3	1.6	0.9	10.7	11.8	11.9	11.1	14.0	12.6
17/2 — 2/3 — . .	3.1	4.4	4.0	11.2	12.1	12.4	11.5	15.1	13.3
3/3 — 16/3 — . .	2.3	4.7	4.4	12.6	13.6	13.8	11.7	16.4	14.7
17/3 — 30/3 — . .	2.4	6.4	5.1	11.6	12.6	13.1	11.3	15.4	13.8
31/3 — 13/4 — . .	3.1	8.5	7.0	13.1	13.3	13.3	11.2	15.1	13.6
14/4 — 27/4 — . .	6.3	9.4	8.5	12.3	13.4	13.7	12.2	16.5	14.7
28/4 — 11/5 — . .	5.1	10.5	8.8	11.8	14.3	14.1	11.5	16.1	14.3
12/5 — 25/5 — . .	12.0	16.7	16.1	15.5	17.6	17.9	15.1	20.4	18.4
26/5 — 8/6 — . .	12.1	16.4	15.9	15.5	16.9	17.9	15.7	19.6	18.1
9/6 — 22/6 — . .	15.6	21.3	21.8	17.6	20.9	20.9	18.1	22.6	20.9
23/6 — 6/7 — . .	13.4	16.9	16.2	15.8	17.5	17.5	16.2	21.9	18.9
7/7 — 20/7 — . .	17.1	21.9	21.9	18.6	21.9	21.0	19.0	23.0	21.6
21/7 — 8/8 — . .	15.8	19.9	17.8	17.9	20.4	20.0	18.8	22.1	20.5

# **Hoved-Tabeller**

til

## **Raceforsøgene med Svin**

paa

**Bjernedegaard, Elsesminde og  
Rodstenseje.**

---

**1908—1910.**

---

Bjernedegaard Nr.	Linje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Avlssted Mrk. ....	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8		
Antal { Galte .....	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	3	1	
{ Sør .....	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	1	3	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	22/4 08	22/4 08	22/4 08	22/4 08	20/5 08	22/4 08	22/4 08	20/5 08	20/5 08	20/5 08	20/5 08	3/6 08	
{ varede Dage .....	5	185	164	171	161	140	164	171	166	166	166	196	180	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	228	212	217	223	198	215	224	225	216	213	242	230	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	{ Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	626.4	614.4	611.6	629.5	554.8	593.6	626.1	605.4	584.5	588.5	676.5	609.8
	Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Vand .....	9	293	227	268	187	210	227	257	312	287	287	404	385
	— Korn, Majs o. lign. ....	10	464.1	426.8	451.5	412.4	409.3	409.5	438.2	454.8	440.4	449.0	561.7	501.5
	— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Roerterstof .....	12	44.6	37.2	38.3	34.2	35.7	33.0	38.3	45.7	43.7	44.9	64.2	62.4
	— Grøntfoder .....	13	79.7	159.2	137.2	174.4	144.7	142.1	142.5	105.2	73.0	84.7	53.4	45.5
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	626.7	593.3	615.4	581.5	562.3	565.7	605.4	619.3	594.1	606.5	747.8	673.1	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning	{ Begyndelse Pd.	15	14.9	25.4	22.1	30.6	37.6	20.8	23.3	21.3	17.7	26.1	16.1	19.3
	Slutning —	16	179.9	189.5	193.9	190.3	192.7	190.0	190.5	189.8	184.5	190.1	196.3	187.5
Pd. Tilvækst pr. Dyr i	{ Forsøgstiden .....	17	165.0	164.1	171.8	159.7	155.1	169.2	167.2	168.5	166.8	164.0	178.5	168.2
	10 Dage af hele Forsøgstiden	18	8.9	10.0	10.0	9.9	11.1	10.3	9.8	10.2	10.0	9.9	9.1	9.3
	10 — fra 35—155 Pd....	19	9.8	9.9	10.3	9.7	9.8	10.9	10.2	10.2	10.8	9.8	8.3	9.2
F-E til 1 Pd. Tilvækst	{ Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	3.59	3.45	3.63	3.76	—	3.65	3.72	3.07	3.08	3.82	2.82	3.33
	— I ( 35—75 —	21	3.67	3.16	3.26	3.50	3.41	2.92	3.03	2.99	2.92	3.30	3.66	3.17
	— II ( 75—115 —	22	3.43	3.35	2.91	3.77	3.24	2.89	3.09	3.32	3.12	2.98	5.15	4.48
	— III (115—155 —	23	3.88	3.49	3.77	3.11	3.55	3.49	3.89	4.37	4.33	4.21	4.48	4.45
	— IV (over 155 —	24	4.17	4.68	4.35	4.24	4.32	4.01	4.52	4.31	4.28	4.08	—	4.22
	Gennemsnit af I-II-III...	25	3.66	3.33	3.31	3.46	3.40	3.10	3.34	3.56	3.46	3.50	4.43	4.03
	— alle (a) ....	26	3.80	3.62	3.58	3.64	3.63	3.34	3.62	3.68	3.56	3.70	4.19	4.00
	— (b) ....	27	3.80	3.62	3.58	3.64	3.63	3.34	3.62	3.68	3.56	3.70	4.25	4.00

Vægtklasserne	varede	Dage	I .....	28	56	50	51	53	56	47	48	48	46	53	59	50
-	-	-	II .....	29	38	40	35	42	37	34	37	36	33	35	55	47
-	-	-	III .....	30	28	31	30	29	30	29	33	34	32	34	31	33
			Sum...	31	122	121	116	124	123	110	118	118	111	122	145	130
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	129.8	138.3	135.3	140.0	133.3	136.3	135.3	140.3	134.8	134.3	142.0	137.0	
	deraf Eksportflæk	-	33	103.4	110.8	107.9	111.3	106.4	111.0	109.6	111.6	108.0	107.1	114.7	110.5	
	- Hoved	-	34	9.7	9.4	10.3	9.8	10.6	9.1	8.9	10.3	9.0	9.8	9.7	10.3	
	- Flomme	-	35	3.4	3.1	2.5	3.4	3.3	2.9	3.3	3.2	4.6	3.6	3.8	2.6	
	- andet Affald	-	36	13.3	15.0	14.6	15.5	13.0	13.3	13.5	15.2	13.2	13.8	13.8	13.6	
	Bovstykket	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mellemstykket	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Skinkestykket	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind .....	40	27.8	27.0	30.2	30.2	30.8	28.3	29.0	26.1	26.9	29.4	27.7	26.9	
		- andet Svind .....	41	14.7	14.5	14.2	14.3	14.0	13.3	13.5	15.1	14.6	14.3	13.9	14.2	
		- Eksportflæk .....	42	57.5	58.5	55.6	55.5	55.2	58.4	57.5	58.8	58.5	56.3	58.4	58.9	
Tykkelse af	Rygflæk om. ....		43	3.87	3.74	3.59	3.50	3.55	3.80	4.18	3.81	3.85	3.97	4.62	3.94	
	Bugflæk -- .....		44	2.82	3.14	2.79	2.98	3.26	2.93	3.40	3.13	3.18	3.02	2.68	2.99	
Længde af Krop fra Hofteskaal til bageste	Snippet ved Halsen cm.		45	91.4	92.8	96.3	95.0	91.6	91.8	91.1	93.8	92.5	93.8	94.0	95.0	
	forreste Ribben	-	46	72.3	73.1	77.0	76.3	72.5	72.8	71.8	73.3	72.0	73.5	73.7	74.8	
	bageste	-	47	29.3	29.0	32.4	29.7	29.4	28.9	28.8	28.0	29.5	28.6	29.0	28.5	
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed .....		48	10.5	11.0	9.0	9.0	9.5	12.5	10.3	11.5	11.5	11.5	11.7	10.5	
	Bovpartiet .....		49	11.7	11.8	11.6	11.8	12.8	11.4	11.7	9.8	10.8	10.0	10.8	10.8	
	Rygflæskets Tykkelse .....		50	12.1	12.5	10.9	11.4	12.0	12.8	12.5	12.5	12.5	11.3	10.8	12.8	
	- Fordeling .....		51	12.5	11.8	11.8	12.9	12.1	11.4	12.2	11.8	12.3	11.8	11.1	12.6	
	Bugens Form og Fylde .....		52	10.2	10.5	9.3	10.4	11.7	10.8	11.0	11.8	11.0	8.7	9.9	12.8	
	Skinkens Form og Størrelse .....		53	11.2	11.2	10.0	11.1	11.8	12.5	11.6	10.8	10.8	10.0	10.2	10.5	
	Finhed af Hoved, Ben og Svar		54	12.1	11.3	10.4	11.4	11.9	11.9	11.3	10.5	11.5	10.0	11.1	10.2	
	Totalindtryk .....		55	11.2	11.1	10.2	10.9	12.2	11.5	11.4	11.5	11.5	10.3	10.1	11.2	
	Kødfuldhed i hel Side .....		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- i overskaaret Tilstand		57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* Antal Dyr slagtet .....			58	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	
	— udgaet af Forsøget .....		59	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
	— tilbagesendt til Avl .....		60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ...			61	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	

Bjernedegaard Nr.	Linje	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Avlssted Mrk. ....	1	10	4.	4	4	1	1	12	12	13	6	14	15		
Antal { Galte....	2	1	—	2	2	2	1	2	2	3	2	1	2		
{ Sør.....	3	3	4	2	2	2	3	2	2	1	2	3	2		
Forsøget { begyndte Dag.....	4	3/6 08	3/6 08	3/6 08	3/6 08	3/6 08	3/6 08	3/6 08	3/6 08	3/6 08	3/6 08	3/6 08	17/6 08		
{ varede Dage .....	5	142	168	160	165	172	173	160	169	159	155	158	164		
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....	6	201	209	211	207	214	209	214	207	223	209	207	210		
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	537.1	584.2	563.5	577.0	565.2	569.2	557.9	598.4	552.2	532.0	546.1	511.6	
	Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	— Vand .....	9	311	354	333	342	367	357	321	354	322	294	307	323	
	— Korn, Majs o. lign. ...	10	391.6	479.7	444.9	474.3	458.5	465.1	446.6	508.6	435.6	409.0	427.1	447.2	
	— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	— Roerørstof .....	12	40.1	50.3	47.7	52.8	59.7	57.2	50.1	55.2	49.7	47.5	48.5	61.0	
	— Græntfoder .....	13	102.0	69.0	69.3	69.3	42.5	35.9	69.3	69.3	69.3	79.3	68.9	19.2	
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....	14	538.6	639.2	598.4	635.0	619.6	623.2	601.3	675.4	591.2	558.7	578.3	596.7		
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning	Pd. Begyndelse	15	36.6	22.3	22.3	23.7	19.3	15.3	26.5	25.4	22.3	29.1	24.9	21.6	
	Pd. Slutning	16	191.0	194.5	192.3	192.5	188.3	187.7	189.3	200.8	193.3	184.7	189.3	188.8	
Pd. Tilvækst pr. Dyr i	Forsøgstiden .....	17	154.4	172.2	170.0	168.8	169.0	171.5	162.8	175.4	171.0	155.6	164.4	167.2	
	10 Dage af hele Forsøgstiden .....	18	10.9	10.2	10.6	10.2	9.8	9.9	10.2	10.4	10.8	10.0	10.4	10.2	
	10 — fra 35—155 Pd. .....	19	10.0	10.0	10.3	9.8	10.2	10.4	9.8	9.8	10.6	9.3	10.5	10.6	
F—E til 1 Pd. Tilvækst	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	—	3.26	3.11	3.22	3.33	2.71	3.32	3.69	3.23	2.99	3.95	3.33	
	— I (35—75 —)	21	3.36	3.02	2.97	3.04	2.77	2.79	3.06	3.02	2.82	3.45	2.82	2.66	
	— II (75—115 —)	22	2.42	3.89	3.65	3.96	4.20	4.49	3.59	3.88	3.50	3.32	3.47	4.12	
	— III (115—155 —)	23	4.16	4.21	4.04	4.37	3.88	—	4.09	4.27	4.30	3.91	4.03	3.79	3.94
	— IV (over 155 —)	24	4.11	3.90	3.73	3.82	3.90	—	4.03	4.19	3.90	3.69	3.92	3.44	
	Gennemsnit af I—II—III ...	25	3.31	3.71	3.55	3.79	3.62	3.79	3.64	3.73	3.41	3.60	3.36	3.57	
	— alle (a) ....	26	3.49	3.71	3.52	3.76	3.67	3.63	3.69	3.85	3.46	3.59	3.52	3.57	
	— — (b) ....	27	3.49	3.71	3.52	3.76	3.67	3.75	3.69	3.85	3.46	3.59	3.52	3.57	

Vægtklasserne	varede	Dage	I .....	28	55	48	47	49	46	44	51	49	45	58	46	45
—	—	II .....	29	30	40	39	41	43	43	39	41	37	38	38	41	41
—	—	III .....	30	35	32	31	32	29	28	33	32	31	33	30	27	27
		Sum...	31	120	120	117	122	118	115	123	122	113	129	114	113	113
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	138.8	136.5	138.0	136.3	136.0	137.0	136.3	146.0	138.8	136.3	137.8	135.0	
	deraf Eksportflæk	—	33	112.9	108.9	110.8	107.8	108.1	110.7	108.9	117.3	111.5	111.0	110.6	106.3	
	— Hoved	—	34	9.8	9.7	9.2	9.3	10.9	9.8	9.6	10.0	9.4	8.8	9.6	9.9	
	— Flomme	—	35	2.6	4.1	3.6	3.9	2.9	3.7	3.8	3.8	3.1	2.6	3.5	3.4	
	— andet Affald	—	36	13.5	13.8	14.4	15.3	14.1	12.8	14.0	14.9	14.8	13.9	14.1	15.4	
	Bovstykket	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Mellemstykket	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Skinkestykket	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind .....	40	27.3	29.8	28.2	29.2	27.8	27.0	28.0	27.3	28.2	26.2	27.2	28.5	
		— andet Svind .....	41	13.6	14.2	14.2	14.8	14.8	14.0	14.5	14.3	14.1	13.7	14.4	15.2	
		— Eksportflæk....	42	59.1	56.0	57.6	56.0	57.4	59.0	57.5	58.4	57.7	60.1	58.4	56.3	
Tykkelse af	Rygflæk cm. ....	43	3.36	3.61	3.99	4.00	3.98	4.38	3.88	3.82	4.02	3.70	3.47	3.67		
	Bugflæk — .....	44	2.99	3.21	2.96	3.09	2.91	2.88	3.04	3.00	3.14	3.34	3.27	2.90		
Længde af Krop fra Hoffeskaal til	Snippet ved Halsen cm.	45	94.5	95.0	95.3	94.8	92.8	91.3	93.0	97.0	96.1	92.0	94.8	92.3		
	forreste Ribben —	46	75.4	75.0	73.5	74.5	73.0	73.7	72.3	76.0	75.5	71.8	74.3	72.8		
	bageste —	47	30.8	32.4	29.5	31.4	28.5	26.7	28.8	30.5	30.8	29.8	28.6	29.8		
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed .....	48	11.0	11.8	12.0	10.5	10.8	12.3	12.0	11.3	11.8	11.8	8.5	9.5		
	Bovpartiet .....	49	11.7	11.0	10.9	10.4	11.0	10.7	10.1	11.0	9.5	11.0	10.4	10.5		
	Rygflæskets Tykkelse.....	50	10.1	11.0	12.5	11.3	12.5	11.0	11.3	12.3	10.3	11.1	9.5	12.6		
	— Fordeling.....	51	11.1	12.1	12.0	11.4	12.3	11.7	10.6	12.4	11.0	11.5	10.2	11.6		
	Bugens Form og Fylde.....	52	10.2	10.8	11.0	10.1	11.0	10.6	10.0	11.3	9.0	11.0	11.0	10.3		
	Skinkens Form og Størrelse..	53	12.0	10.8	12.0	8.5	11.8	13.0	11.0	10.8	9.8	11.5	10.3	10.3		
	Finhed af Hoved, Ben og Svaer	54	12.0	11.5	11.8	9.4	11.5	12.3	11.3	11.3	10.8	11.3	8.3	12.0		
	Totalindtryk .....	55	10.6	11.0	11.6	9.8	11.5	11.7	10.8	11.0	10.0	11.4	9.1	10.8		
	Kedfuldhed i hel Side.....	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	— i overskaaret Tilstand	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Antal Dyr slagtet .....		58	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
— udgaet af Forsøget .....		59	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
— tilbagesendt til Avl .....		60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....		61	4	—	—	—	—	—	5	—	—	—	6	7	—	

Bjernedegaard Nr.	Linf	25	26	29	30	33	34	35	36	37	38	39	40	
Avlssted Mrk.....	1	16	17	18	11	19	20	20	21	22	19	17	15	
Antal { Galte .....	2	3	1	2	2	1	2	2	3	2	2	4	2	
Sør .....	3	1	3	2	2	3	2	2	1	2	2	—	2	
Forsøget { begyndte Dag.....	4	17/6 08	1/7 08	1/7 08	1/7 08	1/7 08	1/7 08	1/7 08	15/7 08	15/7 08	15/7 08	15/7 08	15/7 08	
varede Dage .....	5	159	137	149	162	159	148	170	167	150	132	146	159	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....	6	213	207	209	215	225	201	223	212	204	223	199	206	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	535.8	503.1	501.8	532.2	497.3	492.4	561.0	585.0	515.6	454.5	533.5	505.3
	Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Vand .....	9	341	342	298	340	354	355	357	438	362	289	317	361
	— Korn, Majs o. lign..	10	446.1	442.9	436.3	466.8	456.9	424.9	446.3	523.8	461.1	378.6	441.7	453.8
	— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Roeterstof .....	12	57.8	52.8	57.6	63.6	68.7	59.3	65.6	70.3	68.3	54.9	64.4	71.2
	— Græntfoder .....	13	42.2	61.4	19.6	8.9	18.4	33.2	18.4	—	17.8	20.3	9.4	—
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....	14	600.2	589.7	580.9	620.6	611.6	571.9	608.5	691.6	618.3	512.6	596.6	609.1	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning	(Begyndelse Pd.)	15	30.6	41.1	24.1	20.7	20.2	28.4	22.5	18.1	28.8	35.2	25.3	23.0
	(Slutning —)	16	193.0	200.8	190.0	191.3	190.3	181.8	171.5	195.0	196.0	182.3	189.5	184.3
Pd. Tilvækst { pr. Dyr i	Forsøgstiden .....	17	162.4	159.7	165.9	170.6	171.1	153.4	149.0	176.9	167.2	147.1	164.2	161.3
	10 Dage af hele Forsøgstiden	18	10.2	11.7	11.1	10.5	10.8	10.4	8.8	10.6	11.1	11.1	11.2	10.2
	10 — fra 35—155 Pd. ..	19	9.6	—	10.8	11.0	10.6	10.1	9.9	11.0	10.7	10.3	11.2	11.3
F—E til 1 Pd. Tilvækst	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	4.57	—	3.06	3.31	2.66	3.15	3.21	2.72	3.59	—	3.22	3.49
	— I (35—75 —)	21	3.02	—	2.75	2.92	2.86	2.80	2.67	3.30	2.87	2.86	2.78	2.56
	— II (75—115 —)	22	4.11	3.65	4.24	3.92	3.93	4.26	4.73	4.45	3.90	3.28	3.79	4.27
	— III (115—155 —)	23	4.05	4.03	3.65	3.81	4.08	4.07	4.15	3.73	4.00	3.92	4.06	3.94
	— IV (over 155 —)	24	3.63	4.00	3.32	4.21	3.91	3.93	—	4.74	4.02	4.07	—	4.67
	Gennemsnit af I—II—III ..	25	3.73	—	3.55	3.55	3.62	3.71	3.85	3.83	3.59	3.35	3.54	3.59
	— alle (a) .....	26	3.70	3.69	3.50	3.64	3.60	3.73	4.08	3.91	3.70	3.48	3.63	3.78
	— — (b) .....	27	3.70	3.69	3.50	3.64	3.60	3.73	4.08	3.91	3.70	3.48	3.63	3.78

Vægtklasserne varede	Dage I .....	28	53	-	45	47	47	46	43	46	46	50	44	41
-	- - II .....	29	41	40	42	38	40	44	50	40	39	35	37	40
-	- - III .....	30	31	32	24	24	26	29	28	23	27	31	26	25
	Sum...	31	125	-	111	109	113	119	121	109	112	116	107	106
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	138.5	144.3	136.0	139.0	134.0	127.0	133.0	144.5	138.5	131.8	134.5
	deraf Eksportflæsk		—	33	111.1	116.5	109.0	111.2	110.5	102.0	106.7	116.8	109.6	106.9
	- Hoved		—	34	9.5	10.0	9.7	9.6	8.9	9.6	9.8	9.8	10.1	8.9
	- Flomme		—	35	3.7	3.6	3.8	3.8	3.3	2.8	2.6	4.3	3.8	2.9
	- andet Affald		—	36	14.2	14.2	13.5	14.4	11.3	12.6	13.9	13.6	15.0	13.1
	Bovstykket		—	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mellemstykket		—	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skinkestykket		—	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind .....		40	28.2	28.1	28.4	27.3	28.0	30.1	28.6	25.9	29.3	27.7	29.0
	- andet Svind .....		41	14.2	13.9	14.2	14.6	12.6	13.8	14.1	14.2	14.8	13.7	14.5
	- Eksportflæsk.....		42	57.6	58.0	57.4	58.1	59.4	56.1	57.3	59.9	55.9	58.6	56.5
Tykkelse af	Rygflæk em. ....		43	3.94	3.63	4.04	3.45	3.85	3.70	3.63	4.61	3.98	3.35	3.49
	Bugflæk — .....		44	2.63	2.87	3.19	2.99	2.85	2.85	3.03	3.23	3.00	3.08	2.70
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snippet ved Halsen cm.		45	91.3	97.8	91.3	96.7	93.7	93.9	94.0	94.3	92.8	91.5	95.5
	forreste Ribben —		46	71.0	76.8	71.0	76.3	74.3	74.3	74.3	74.8	73.5	72.3	76.0
	bageste —		47	29.5	32.0	28.8	28.7	27.7	29.5	30.3	29.0	29.8	28.8	30.3
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed.....		48	11.5	11.8	11.8	9.7	13.0	11.0	10.7	13.3	11.0	13.0	10.7
	Bovpartiet .....		49	10.0	10.5	9.5	10.9	11.7	11.4	11.0	11.1	10.4	11.8	11.0
	Rygflæskets Tykkelse .....		50	12.0	11.0	12.3	11.0	12.8	11.9	11.6	12.0	12.5	12.3	10.5
	- Fordeling .....		51	12.3	10.4	11.8	12.4	13.1	12.0	11.6	12.8	12.6	12.8	11.1
	Bugens Form og Fylde .....		52	9.3	10.0	12.3	12.4	12.6	11.0	10.9	12.2	11.9	10.5	9.3
	Skinkens Form og Størrelse .....		53	11.0	11.3	11.3	10.8	12.6	10.6	11.0	12.5	12.0	12.3	11.4
	Finhed af Hoved, Ben og Svær		54	11.8	10.5	12.0	11.7	12.8	11.8	11.5	12.2	12.3	12.0	11.5
	Totalindtryk .....		55	11.0	10.7	11.6	11.6	12.9	11.5	11.3	12.3	12.4	11.5	10.8
	Kødfuldhed i hel Side .....		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- i overskaaret Tilstand		57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal Dyr slagtet .....		58	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3
- - udgaaet af Forsøget .....		59	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
- - tilbagesendt til Avl .....		60	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr....		61	8	-	-	9	10	-	11	12	-	-	-	13

Bjernedegaard Nr.	Ind	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Avlssted Mrk. ....	1	23	23	12	24	24	25	25	2	11	24	24	8		
Antal { Galte .....	2	2	2	1	3	3	1	3	4	2	2	2	2		
Sør.....	3	2	2	3	1	1	3	1	-	2	2	2	2		
Forseglet { begyndte Dag .....	4	15/7, 08	15/7, 08	15/7, 08	29/7, 08	29/7, 08	29/7, 08	29/7, 08	29/7, 08	29/7, 08	29/7, 08	29/7, 08	12/8, 08		
varede Dage .....	5	174	187	163	146	159	171	170	189	175	167	144	143		
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtedtid.....	6	226	237	212	220	232	215	217	237	210	209	217	190		
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	{	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	570.8	581.5	574.5	522.6	577.2	552.6	556.3	584.8	552.6	570.7	514.7	503.3
		Pd. Valle .....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Vand .....	9	401	420	391	364	416	409	420	455	420	437	357	413
		- Korn, Majs o. lign... .....	10	471.4	489.6	476.6	479.3	471.2	463.6	481.3	497.1	485.8	474.5	453.1	446.2
		- Oljekager .....	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Roeterstof .....	12	71.1	70.4	66.9	67.0	71.0	72.2	71.6	66.5	68.0	75.5	66.1	69.8
		- Grøntfoder .....	13	-	-	9.4	9.3	9.3	-	-	-	-	-	9.3	-
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden.....	14	637.6	656.9	640.8	635.0	639.9	627.9	645.7	661.2	645.9	645.1	606.5	600.0		
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning	{ Begyndelse Pd.	15	16.0	16.6	22.3	31.4	32.7	20.7	22.0	21.4	17.7	24.0	32.2	28.9	
	(Slutning -)	16	183.8	188.3	193.0	197.5	184.7	183.0	196.7	185.5	192.5	183.8	186.2	188.8	
Pd. Tilvækst { pr. Dyr i	{ Forsøgstiden .....	17	167.8	171.7	170.7	166.1	152.0	162.3	174.7	164.1	174.8	159.8	154.0	159.9	
	10 Dage af hele Forsøgstiden	18	9.6	9.2	10.5	11.4	9.6	9.5	10.3	8.7	10.0	9.6	10.7	11.2	
	pr. Dyr i 10 — fra 35—155 Pd. ...	19	10.0	10.2	10.3	10.8	9.2	10.3	10.3	8.8	10.3	9.4	10.6	10.6	
F-E til 1 Pd. Tilvækst	{ Vægtklasse 0 (under 35 Pd.) .....	20	2.95	3.07	2.65	-	-	3.33	3.02	3.14	2.64	2.60	-	2.34	
	- I ( 35—75 — ) .....	21	3.10	3.03	2.90	2.97	2.95	3.15	3.14	4.00	3.17	3.30	2.86	2.78	
	- II ( 75—115 — ) .....	22	4.03	4.54	4.56	4.03	4.24	4.09	3.57	4.46	3.62	4.35	3.80	3.96	
	- III (115—155 — ) .....	23	4.18	3.89	3.82	3.46	5.06	4.01	4.40	3.63	4.21	4.24	4.04	4.26	
	- IV (over 155 — ) .....	24	-	4.35	4.17	4.84	4.61	4.65	3.92	4.45	4.25	-	5.39	4.12	
	Gennemsnit af I-II-III .....	25	3.77	3.82	3.76	3.49	4.08	3.75	3.70	4.03	3.67	3.96	3.57	3.67	
	- alle (a) .....	26	3.80	3.83	3.75	3.82	4.21	3.87	3.70	4.03	3.70	4.04	3.94	3.75	
	- - (b) .....	27	3.80	3.83	3.75	3.82	4.21	3.87	3.70	4.03	3.70	4.04	3.94	3.75	

vægteklasserne	varede	Dage	I	20	49	40	49	47	48	47	49	66	49	52	46	45
-	-	II	.....	29	38	42	45	40	44	39	35	46	36	43	39	39
-	-	III	.....	30	33	28	26	24	39	30	33	25	31	33	28	29
		Sum...	.....	31	120	118	116	111	131	116	117	137	116	128	113	113
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	134.8	137.5	138.5	142.3	132.3	135.3	145.0	133.8	141.8	132.8	132.8	128.5	
	deraf Eksportflæk	—	33	111.8	112.8	111.0	115.6	106.0	108.9	119.0	106.0	115.3	106.0	107.4	101.8	
	— Hoved	—	34	7.8	8.3	9.1	9.5	8.7	9.2	9.2	9.7	9.2	9.2	8.9	9.8	
	— Flomme	—	35	2.9	3.4	4.1	3.8	4.9	3.6	3.8	2.8	4.2	4.0	3.8	3.1	
	— andet Affald	—	36	12.3	13.0	14.3	13.4	12.7	13.6	13.0	15.3	13.1	13.6	12.7	13.8	
	Bovstykket	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Mellemstykket	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Skinkestykket	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	.....	40	26.7	27.0	28.2	27.9	28.4	26.1	26.3	27.9	26.3	27.7	28.7	30.2	
	— andet Svind	.....	41	12.5	13.1	14.3	13.6	14.2	14.4	13.2	15.0	13.8	14.6	13.6	14.5	
	— Eksportflæk	.....	42	60.8	59.9	57.5	58.5	57.4	59.5	60.5	57.1	59.9	57.7	57.7	55.3	
Tykkelse af	Rygflæk cm.	.....	43	3.98	3.75	4.02	4.70	4.13	4.63	4.62	3.83	4.18	4.00	4.16	3.61	
	Bugflæk	—	44	2.97	3.34	3.29	3.22	3.03	3.52	3.77	2.85	3.51	3.42	2.90	2.64	
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snittet ved Halsen cm.	.....	45	92.0	93.3	94.0	94.0	94.8	91.8	92.0	93.8	95.0	93.5	95.3	94.5	
	forreste Ribben	—	46	72.3	73.8	74.3	74.8	75.5	73.3	73.3	74.5	74.5	74.0	75.5	75.0	
	bageste	—	47	27.3	28.5	30.8	29.5	28.8	29.0	27.7	27.5	27.3	28.0	29.0	29.0	
Points (0 - 15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed	.....	48	12.1	11.5	10.0	13.0	13.0	12.7	12.1	11.5	11.9	11.9	13.0	11.0	
	Bovpartiet	.....	49	11.2	11.3	12.2	10.9	11.3	11.8	11.4	11.5	11.8	11.3	11.3	12.5	
	Rygflæskets Tykkelse	.....	50	12.3	12.8	13.3	11.2	12.3	12.0	11.7	12.3	11.8	12.3	12.4	11.8	
	— Fordeling	.....	51	11.8	12.3	13.4	12.1	13.0	12.3	12.8	11.6	12.8	12.1	12.4	12.3	
	Bugens Form og Fylde	.....	52	11.2	11.3	12.8	11.2	10.4	12.3	12.3	10.3	12.8	11.9	11.3	9.7	
	Skinkens Form og Størrelse	..	53	13.3	13.4	11.4	11.8	11.4	12.8	13.3	10.5	12.3	10.8	10.8	10.8	
	Finhed af Hoved, Ben og Svaer	..	54	12.8	13.3	12.2	11.8	12.5	13.1	12.9	11.4	12.5	11.8	12.4	11.7	
	Totalindtryk	.....	55	12.1	12.6	12.7	11.2	11.8	12.3	12.2	11.0	12.4	12.1	11.9	10.8	
	Kødfuldhed i hel Side	.....	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— i overskaaret Tilstand	.....	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Antal Dyr slagtet	.....	58	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	
— udgaet af Forsøget	.....	59	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
— tilbagesendt til Avl	.....	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	—	—	—	—	—	14	—	—	15	—	16	17	18		

Bjernedegaard Nr.	linje	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
Avlsted Mrk.....	1	2	4	26	3	3	27	21	5	5	5	16	16	
Antal { Galte .....	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	
{ Sør.....	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	
Forsøget { begyndte Dag.....	4	12/8 08	12/8 08	12/8 08	12/8 08	12/8 08	9/8 08	26/8 08	26/8 08	26/8 08	26/8 08	26/8 08	26/8 08	
{ varede Dage.....	5	163	189	161	178	187	126	154	164	161	164	177	175	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....	6	215	245	208	242	250	196	202	202	199	204	226	230	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været {	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	545.0	658.8	547.4	570.6	599.3	462.2	528.1	571.0	555.3	569.4	601.4	593.3
Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Vand .....	9	427	469	430	441	488	383	427	388	371	392	419	371	
— Korn, Majs o. lign..	10	462.0	565.1	468.8	458.1	506.4	421.2	481.3	489.5	462.7	490.9	479.6	483.8	
— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Roeterstof .....	12	72.4	74.3	65.8	64.0	62.1	68.7	64.4	58.2	57.3	57.7	59.2	52.6	
— Grøntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden.....	14	625.3	749.2	625.9	617.2	668.4	566.9	633.7	642.9	612.6	643.5	639.0	635.3	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse {	Pd. Slutning —	15	29.5	19.3	22.8	24.2	27.1	45.3	29.0	21.6	20.9	24.2	21.0	19.8
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden .....	17	156.5	171.0	167.2	159.8	164.0	145.5	162.8	168.4	163.1	167.8	168.3	173.5
pr. Dyr i {	10 Dage af hele Forsøgstiden .....	18	9.6	9.0	10.4	9.0	8.8	11.5	10.6	10.3	10.1	10.2	9.5	9.9
Tilvækst {	10 — fra 35—155 Pd. ...	19	9.2	9.0	10.3	8.3	8.2	—	10.5	10.2	10.5	10.3	9.4	9.9
F-E til 1 Pd. {	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.) .....	20	3.03	2.40	2.65	2.63	3.08	—	3.60	2.57	2.78	2.97	2.56	2.69
— I (35—75 —) .....	21	2.95	3.60	3.08	3.92	4.13	—	3.09	3.31	3.24	3.35	3.76	3.35	
— II (75—115 —) .....	22	4.59	5.30	4.08	4.24	4.35	4.07	4.23	4.24	4.00	4.18	4.09	4.27	
— III (115—155 —) .....	23	4.16	4.38	3.95	3.99	3.72	4.17	3.53	4.11	4.14	3.92	3.72	3.37	
— IV (over 155 —) .....	24	4.63	5.09	4.24	3.40	4.30	4.34	4.85	4.10	4.07	4.16	4.07	4.11	
Gennemsnit af I-II-III ...	25	3.90	4.43	3.70	4.05	4.07	—	3.62	3.89	3.79	3.82	3.86	3.66	
— alle (a) .....	26	4.00	4.38	3.74	3.86	4.08	3.90	3.89	3.82	3.76	3.83	3.80	3.66	
— — (b) .....	27	4.00	4.38	3.74	3.86	4.19	3.90	3.89	3.82	3.76	3.83	3.80	3.66	

Vægtklasserne varede Dage I.....	28	46	50	47	68	72	-	47	50	47	50	56	48		
— — — II.....	29	50	52	41	47	50	40	42	41	39	41	44	49		
— — — III.....	30	34	32	29	30	25	32	25	27	28	26	27	24		
Sum.....	31	130	134	117	145	147	-	114	118	114	117	127	121		
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen Pd.	32	132.8	138.5	137.5	131.3	133.3	139.0	140.8	136.5	129.5	137.5	137.5		
	deraf Eksportflæsk	-	33	107.8	111.4	110.9	105.9	107.3	113.1	114.3	111.0	103.8	111.5	110.7	
	— Hoved	-	34	9.2	9.3	9.6	9.4	8.8	9.3	9.4	8.9	8.9	9.1	9.1	
	— Flomme	-	35	3.1	3.8	3.4	3.6	3.0	3.8	3.6	3.8	3.6	3.8	3.9	
	— andet Affald	-	36	12.7	14.0	13.6	12.4	14.2	12.8	13.5	12.8	13.2	13.3	13.8	
	Bovstykket	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mellemstykket	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Skinkestykket	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind.....	40	28.6	27.2	27.6	28.6	30.5	27.1	26.6	28.2	29.6	28.4	27.5	28.9	
	— andet Svind.....	41	13.4	14.3	14.0	13.8	13.5	13.6	13.8	13.4	14.0	13.5	14.0	14.2	
	— Eksportflæsk .....	42	58.0	58.5	58.4	57.6	56.0	59.3	59.6	58.4	56.4	58.1	58.5	56.9	
Tykkelse af {	Rygflæk cm. ....	43	4.08	4.14	3.72	3.99	3.92	4.23	4.44	3.82	3.62	3.80	3.64	3.76	
	Bugflæk cm. ....	44	3.07	3.38	3.19	3.24	3.09	3.63	3.32	3.18	2.87	3.35	3.01	3.10	
Længde af Krop fra Hofteskaal til bageste	{ Snittet ved Halsen cm.	45	93.0	94.8	94.0	94.3	97.3	92.5	95.0	92.0	93.3	94.5	93.7	94.3	
	forreste Ribben	-	46	74.5	75.8	75.0	74.3	74.7	72.8	75.5	73.3	74.0	73.8	73.0	74.3
	bageste	-	47	30.3	30.0	27.3	29.3	30.3	28.5	29.3	26.8	28.5	30.5	28.3	30.8
Points (0-15) ved Bedømmelse af	{ Flæskets Fasthed .....	48	11.4	12.4	11.9	12.8	12.4	13.2	11.3	12.5	11.3	13.1	11.1	11.1	
	Bovpartiet .....	49	11.4	11.1	12.1	12.0	11.6	12.0	11.6	11.9	11.8	12.1	12.0	12.0	
	Rygflækets Tykkelse .....	50	12.2	11.4	13.2	13.5	11.1	12.8	12.1	12.8	12.4	13.2	13.1	13.3	
	— Fordeling .....	51	12.2	11.4	13.4	13.3	11.8	12.4	12.4	12.3	12.7	12.8	12.7	13.1	
	Bugens Form og Fylde .....	52	10.5	12.4	11.8	11.3	11.7	12.8	12.1	11.8	10.9	12.8	10.9	10.7	
	Skinkens Form og Størrelse .....	53	10.9	11.8	12.2	10.8	11.3	12.6	10.8	11.2	11.0	11.6	11.8	11.8	
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	54	11.7	12.3	12.0	11.6	11.7	12.6	11.3	11.8	12.2	12.3	11.3	12.3	
	Totalindtryk .....	55	11.3	11.6	12.4	12.3	11.2	12.9	11.8	12.2	11.7	12.7	12.1	12.0	
	Kødfuldhed i hel Side .....	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	— i overskaaret Tilstand	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antal Dyr slagtet .....	58	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4		
— udgaet af Forsøget .....	59	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
— tilbagesendt til Avl .....	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	-	19	-	-	20	-	-	-	-	-	21	-		

Bjernedegaard Nr.	Lijn	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
Avlsted Mrk. ....	1	1	27	27	27	13	13	13	3	4	9	28	1	
Antal { Galte .....	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	4	2	3	
{ Sør. ....	3	2	2	1	2	2	2	2	3	2	—	2	1	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	26/8 08	% 08	% 08	% 08	% 08	% 08	% 08	% 08	7/10 08	21/10 08	21/10 08	21/10 08	
{ varede Dage .....	5	157	147	143	154	191	168	181	194	150	136	139	149	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....	6	212	216	209	220	247	222	227	245	208	191	185	190	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	529.2	540.8	520.3	548.6	668.8	583.4	631.8	666.6	596.1	509.7	561.8	569.7
	Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Vand .....	9	364	385	364	388	367	340	362	395	336	313	303	296
	— Korn, Majs o. lign..	10	446.8	468.3	454.6	469.9	518.9	478.0	502.6	508.0	491.0	448.9	486.4	459.1
	— Oliekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Roeterstof .....	12	56.6	57.0	58.3	60.6	49.4	46.8	50.4	48.7	45.4	39.8	36.8	36.0
	— Græntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	591.6	615.4	599.6	621.9	679.8	622.0	658.3	667.8	635.8	573.6	616.8	590.0	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning (Begyndelse Pd. —)	15	18.4	27.0	34.5	24.5	17.2	19.7	17.5	18.4	27.0	28.5	23.8	18.8	
	16	185.0	188.3	187.8	179.5	182.5	193.0	188.3	186.3	184.8	186.5	194.3	190.5	
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden .....	17	166.6	161.3	153.3	155.0	165.3	173.3	170.8	167.9	157.8	158.0	170.5	171.7
pr. Dyr i	10 Dage af hele Forsøgstiden	18	10.6	11.0	10.7	10.1	8.7	10.3	9.4	8.7	10.5	11.6	12.3	11.5
	10 — fra 35—155 Pd. ...	19	10.8	10.5	9.9	10.0	9.2	10.7	9.5	8.7	11.3	11.0	12.2	12.9
F-E til 1 Pd.	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	2.62	3.02	—	2.79	3.10	3.30	3.02	2.84	3.59	2.41	3.20	3.43
Tilvækst	— I ( 35—75 — )	21	3.35	3.25	3.36	3.51	4.53	3.43	4.26	4.13	3.58	3.50	3.48	3.10
	— II ( 75—115 — )	22	4.08	4.05	4.47	4.39	3.37	3.64	3.70	3.78	3.66	3.35	3.33	3.36
	— III (115—155 — )	23	3.57	3.87	3.40	4.07	4.08	3.39	3.83	3.99	3.70	3.96	3.90	3.51
	— IV (over 155 — )	24	3.59	4.33	4.54	4.64	5.48	4.04	3.99	4.64	5.69	4.03	3.89	3.77
	Gennemsnit af I-II-III ...	25	3.67	3.72	3.74	3.99	3.99	3.49	3.93	3.97	3.65	3.60	3.57	3.32
	— alle (a) ....	26	3.55	3.82	3.91	4.01	4.11	3.59	3.85	3.98	4.03	3.63	3.62	3.44
	— — (b) ....	27	3.55	3.82	3.91	4.01	4.11	3.59	3.86	3.98	4.03	3.63	3.62	3.44

Vægtklasserne varede Dage I.....	28	48	48	53	50	66	52	63	64	50	53	46	42
— — — II.....	29	39	40	45	43	36	37	37	43	32	31	28	28
— — — III.....	30	24	26	23	27	28	23	26	31	24	25	24	23
Sum... .	31	111	114	121	120	130	112	126	138	106	109	98	93
Vægt i Slagteriet	{ hele Kroppen Pd. 32 132.0 135.8 135.5 131.0 131.0 139.3 133.0 129.0 132.5 133.8 133.7 136.3 deraf Eksportflæk — 33 105.9 110.3 109.0 105.5 105.0 111.9 107.9 103.1 106.8 107.9 108.5 110.0 — Hoved — 34 9.7 9.1 9.4 8.9 10.1 9.9 9.8 9.1 9.1 9.8 8.9 9.2 — Flomme — 35 3.8 3.8 3.8 4.4 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3 3.6 3.2 3.6 — andet Affald — 36 12.6 12.6 13.3 12.2 12.7 14.2 11.9 13.4 13.3 12.5 13.1 13.5 Bovstykket — 37 — — — — — — — — — — — — Mellemsstykket — 38 — — — — — — — — — — — — Skinkestykket — 39 — — — — — — — — — — — —												
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind..... 40 28.6 27.9 27.8 27.0 28.2 27.8 29.4 30.8 28.3 28.3 29.1 28.5 — andet Svind..... 41 14.1 13.5 14.2 14.2 14.3 14.2 13.3 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 — Eksportflæk..... 42 57.3 58.6 58.0 58.8 57.5 58.0 57.3 55.3 57.8 57.9 57.5 57.7												
Tykkelse af	{ Rygflæk cm. ..... 43 4.02 4.22 3.99 3.88 4.08 4.05 3.63 3.70 3.72 4.02 4.87 4.32 Bugflæk — ..... 44 3.07 3.38 3.13 3.73 3.20 2.92 3.07 3.32 3.18 2.99 3.17 2.86												
Længde af Krop	{ Snittet ved Halsen cm. 45 92.5 93.5 94.5 92.8 91.5 95.3 92.5 92.8 94.8 93.5 92.7 92.3 forreste Ribben — 46 74.0 73.3 74.5 72.5 71.8 74.8 72.0 71.5 74.3 73.3 73.0 73.5 fra Hofteskaal til bageste — 47 27.8 28.5 29.0 27.5 28.3 28.8 28.5 29.8 28.3 27.8 27.3 28.5												
Points (0-15 ved Bedømmelse af	{ Flæskets Fasthed..... 48 12.8 12.9 12.8 13.6 12.6 11.1 9.8 13.1 11.9 13.7 13.8 13.5 Bovpartiet..... 49 11.4 11.0 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8 11.7 12.3 11.3 10.7 12.2 Rygflæskets Tykkelse ..... 50 12.6 12.3 12.5 11.5 11.1 11.8 12.7 12.7 12.7 11.8 10.6 11.4 — Fordeling ..... 51 12.0 11.6 12.0 11.7 12.3 11.7 12.7 12.7 12.8 11.7 12.2 12.4 Bugens Form og Fylde ..... 52 11.2 12.4 11.3 11.9 11.3 10.4 11.2 12.5 11.3 10.3 11.6 10.5 Skinkens Form og Størrelse .. 53 12.1 11.1 11.5 11.1 10.7 10.5 10.9 11.3 11.7 10.5 11.8 12.1 Finhed af Hoved, Ben og Sver .. 54 12.2 11.8 11.3 11.9 11.2 11.4 11.6 12.0 11.5 11.8 12.2 11.9 Totalindtryk ..... 55 12.1 11.8 11.7 11.4 11.0 11.1 11.3 12.2 11.8 10.8 11.2 12.0 Kødfuldhed i hel Side ..... 56 — — — — — — — — — — — — — i overskaaret Tilstand 57 — — — — — — — — — — — —												
Antal Dyr slagtet.....	58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
— — udgaact af Forsøget.....	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— — tilbagesendt til Avl .....	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	—	—	22	—	—	23	—	—	—	—	24	—

Bjernedegaard Nr.	Linje	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88		
Avlssted Mrk. ....	1	2	18.	21	20	29	20	9	14	29	29	17	16		
Antal { Galte .....	2	4	3	4	1	2	1	3	3	2	2	3	1		
Sører.....	3	—	1	—	3	2	3	1	1	2	2	1	3		
Forsøget { begyndte Dag .....	4	<sup>21</sup> / <sub>10</sub> 08	<sup>21</sup> / <sub>10</sub> 08	<sup>21</sup> / <sub>10</sub> 08	<sup>21</sup> / <sub>10</sub> 08	<sup>21</sup> / <sub>10</sub> 08	<sup>4</sup> / <sub>11</sub> 08	<sup>4</sup> / <sub>11</sub> 08	<sup>18</sup> / <sub>11</sub> 08	<sup>18</sup> / <sub>11</sub> 08	<sup>18</sup> / <sub>11</sub> 08	<sup>2</sup> / <sub>12</sub> 08	<sup>16</sup> / <sub>12</sub> 08		
varede Dage.....	5	119	159	151	174	146	164	145	141	150	176	124	150		
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....	6	184	204	205	225	189	208	196	196	209	230	183	210		
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	{	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	476.4	593.8	616.6	634.1	550.8	585.8	557.3	563.2	577.6	678.5	516.9	570.1
		Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		— Vand .....	9	294	348	326	343	310	358	313	329	351	398	314	367
		— Korn, Majs o. lign..	10	441.9	488.4	495.7	485.5	483.5	469.8	457.9	484.0	516.4	507.7	446.3	458.5
		— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		— Roerstof .....	12	47.7	40.2	40.0	39.5	35.6	34.5	35.5	33.1	32.9	37.2	32.4	34.0
		— Grøntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgtiden.....	14	569.0	627.6	638.5	630.7	610.9	601.9	586.3	611.0	645.6	658.0	564.8	588.4		
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning	{	Begyndelse Pd.	15	40.3	22.5	25.3	22.0	20.0	16.3	23.3	19.5	19.3	20.8	27.3	24.8
		(Slutning —)	16	198.3	185.0	188.5	182.5	193.8	187.0	186.5	192.8	202.8	186.7	187.0	184.5
Pd. Tilvækst {	Forsøgtiden .....	17	158.0	162.5	163.2	160.5	173.8	170.7	163.2	173.3	183.5	167.0	159.7	159.7	
pr. Dyr i	10 Dage af hele Forsøgtiden	18	13.3	10.2	10.8	9.2	11.9	10.4	11.3	12.3	12.2	9.5	12.9	10.6	
Tilvækst	10 — fra 35—155 Pd. ..	19	—	10.6	11.3	9.6	12.6	11.8	11.8	13.0	12.9	10.9	12.8	11.4	
F—E til 1 Pd.	{	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	—	3.18	3.15	3.06	3.25	3.09	3.08	3.12	3.12	3.66	2.87	3.02
		— I (35—75 —)	21	—	4.05	3.39	4.09	3.19	3.05	3.32	3.10	2.89	2.94	3.12	3.09
		— II (75—115 —)	22	3.75	3.58	3.86	3.88	3.25	3.51	3.17	3.52	3.37	3.74	3.39	3.54
		— III (115—155 —)	23	3.34	4.03	4.22	3.72	3.64	3.72	4.04	3.65	3.46	4.24	3.72	4.01
		— IV (over 155 —)	24	3.90	4.05	—	4.49	4.07	4.26	4.10	4.00	4.34	4.78	4.18	4.48
		Gennemsnit af I—II—III ..	25	—	3.89	3.82	3.90	3.36	3.43	3.51	3.42	3.24	3.64	3.41	3.55
		— alle (a) .....	26	3.60	3.86	3.91	3.93	3.51	3.53	3.59	3.53	3.52	3.94	3.54	3.68
		— — (b) .....	27	3.60	3.86	3.91	3.93	3.51	3.53	3.59	3.53	3.52	4.07	3.54	3.68

vægtklasserne	værede	læge I	28	—	55	47	59	44	43	47	40	41	40	42	45
—	—	II	29	35	31	33	38	28	32	28	29	30	38	29	33
—	—	III	30	22	27	26	28	23	27	27	23	22	32	23	27
	Sum...		31	—	113	106	125	95	102	102	92	93	110	94	105
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	144.0	130.5	137.0	128.3	138.0	134.0	131.3	140.8	142.0	130.7	133.8	131.5
	deraf Eksportflæk	—	33	115.4	104.9	111.1	103.5	111.7	108.6	105.0	114.1	114.8	106.5	108.8	107.5
	— Hoved	—	34	9.9	9.4	9.0	9.4	9.3	8.9	9.6	9.1	10.0	9.1	8.8	8.9
	— Flomme	—	35	3.0	2.8	3.3	3.2	3.3	3.4	2.9	4.2	3.3	3.6	3.3	3.7
	— andet Affald	—	36	157	13.4	13.6	12.2	13.7	13.1	13.8	13.4	13.9	11.5	12.9	11.4
	Bovstykket	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mellemstykket	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Skinkestykket	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ved Slagtning	pCt. Slagteswind	—	40	27.4	29.5	27.3	29.7	28.1	28.3	29.6	27.0	27.7	30.0	28.4	28.7
	— andet Svine	—	41	14.4	13.8	13.8	13.6	13.7	13.6	14.1	13.8	13.9	13.0	13.4	13.0
	— Eksportflæk	—	42	58.2	56.7	58.9	56.7	58.2	58.1	56.3	59.2	58.4	57.0	58.2	58.3
Tykkelse af	Rygflæk cm.	—	43	4.02	3.77	4.27	3.95	4.43	3.73	4.05	4.67	4.05	3.97	3.65	4.02
	Bugflæk —	—	44	2.99	3.15	3.27	3.16	3.21	3.32	3.30	3.40	3.09	3.31	3.12	3.17
Længde af Krop fra Hofteskaal til bageste	Snippet ved Halsen cm.	—	45	96.3	92.5	92.5	91.0	92.3	95.8	90.8	93.3	96.0	92.7	94.3	92.5
	forreste Ribben	—	46	76.0	71.8	73.3	71.8	72.7	74.8	71.0	74.0	75.5	73.0	75.3	73.0
Points (0-15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed	—	48	11.3	12.9	13.7	13.4	11.7	13.1	12.3	13.8	12.3	11.4	11.4	13.7
	Bovpartiet	—	49	11.7	11.9	11.7	12.1	11.3	12.7	11.9	11.6	12.5	11.7	12.1	12.3
	Rygflæskets Tykkelse	—	50	12.4	13.3	12.5	12.4	11.1	13.4	12.3	11.2	12.3	12.7	12.4	12.6
	— Fordeling	—	51	11.9	12.1	12.2	12.8	11.3	13.2	12.0	11.8	11.7	12.3	12.8	12.8
	Bugens Form og Fylde	—	52	10.4	12.2	11.6	11.8	11.2	12.2	10.5	12.6	11.0	12.3	11.3	11.9
	Skinkens Form og Størrelse	—	53	10.3	12.1	11.7	11.8	12.3	11.6	11.3	11.8	11.3	12.1	12.1	12.0
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	—	54	11.3	12.3	12.3	12.8	11.7	12.9	10.3	12.0	12.3	12.6	12.4	13.0
	Totalindtryk	—	55	11.0	12.6	12.3	12.3	11.3	13.0	11.3	11.9	11.8	12.3	12.0	12.5
	Kødfuldhed i hel Side	—	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— i overskaaret Tilstand	—	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Antal Dyr slagtet		—	58	4	4	4	4	3	4	4	4	2	3	4	4
— udgaet af Forsøget		—	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
— tilbagesendt til Avl		—	60	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr....		—	61	—	—	—	—	25	—	26	—	27	28	—	—

Bjernedegaard Nr.	Linje	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
Avlsted Mrk. ....	1	24	19	9	29	15	28	26	21	12	12	6	6	
Antal { Galte .....	2	1	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	
{ Sører .....	3	3	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	16/12 08	16/12 08	16/12 08	16/12 08	16/12 08	30/12 08	30/12 08	30/12 08	30/12 08	30/12 08	30/12 08	30/12 08	
{ varede Dage.....	5	162	184	157	146	146	164	148	154	157	161	173	187	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	217	233	216	207	206	217	207	212	203	207	226	228	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	610.8	670.0	603.2	558.5	573.4	624.4	583.4	611.5	604.0	572.2	635.3	675.9
	Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Vand .....	9	390	450	384	321	316	395	301	357	355	371	381	460
	— Korn, Majs o. lign..	10	516.8	501.5	498.1	479.8	492.1	503.3	468.7	477.1	471.4	484.1	463.8	505.6
	— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Roeterstof .....	12	32.3	30.0	33.1	30.6	33.7	32.2	33.2	34.4	31.5	32.8	32.2	29.4
	— Grøntfoder .....	13	—	36.2	—	—	—	13.1	—	—	17.5	8.7	35.9	66.5
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	650.9	650.2	631.7	603.5	621.4	642.2	599.1	613.4	607.1	614.0	608.9	660.8	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets (Begyndelse Pd. Slutning —)	15	19.3	18.0	19.3	19.3	21.5	17.0	22.3	21.5	20.3	16.8	18.3	13.3	
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden .....	17	170.5	166.3	178.7	166.5	172.3	166.5	164.7	161.0	168.0	167.5	161.0	169.0
pr. Dyr i	10 Dage af hele Forsøgstiden	18	10.5	9.0	11.4	11.4	11.8	10.2	11.1	10.5	10.7	10.4	9.3	9.0
	10 — fra 35—155 Pd... .	19	12.2	9.8	11.9	12.5	12.8	11.3	11.3	10.9	11.5	12.1	10.0	10.8
F—E til 1 Pd.	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	3.37	3.00	2.75	3.05	3.14	2.98	2.97	2.86	2.93	2.75	2.31	2.88
Tilvækst	— I (35—75 — )	21	2.98	4.11	2.96	2.96	2.84	3.23	3.12	3.07	3.33	3.09	3.54	3.27
	— II (75—115 — )	22	3.65	3.34	3.49	3.70	3.39	3.83	3.67	3.79	3.68	3.64	3.79	3.81
	— III (115—155 — )	23	3.93	3.88	4.10	3.81	3.89	3.92	4.16	4.40	3.71	3.88	3.98	4.60
	— IV (over 155 — )	24	5.09	—	3.94	4.45	4.52	5.23	3.79	4.53	3.90	4.76	—	4.82
	Gennemsnit af I—II—III ...	25	3.52	3.78	3.52	3.49	3.37	3.66	3.65	3.75	3.57	3.54	3.77	3.89
	— alle (a) .....	26	3.82	3.90	3.53	3.62	3.61	3.86	3.64	3.81	3.61	3.67	3.78	3.91
	— — (b) .....	27	3.82	3.85	3.53	3.62	3.64	3.86	3.64	3.81	3.61	3.67	3.78	3.91

Vægtklasserne varede Dage I.....	28	42	61	42	41	38	44	44	44	45	43	53	45
- - - II.....	29	31	36	30	31	30	35	33	34	33	31	38	34
- - - III.....	30	25	26	29	24	26	27	29	32	26	25	29	32
Sum... ..	31	98	123	101	96	94	106	106	110	104	99	120	111
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	135.5	131.3	140.8	133.8	140.0	127.3	129.0	130.3	133.5	132.5
	deraf Eksportflæsk		-	33	110.9	107.0	115.1	108.9	113.2	103.3	104.5	106.0	108.3
	- Hoved		-	34	8.2	8.8	10.6	9.1	9.4	8.9	9.0	8.5	8.6
	- Flomme		-	35	3.8	3.1	3.1	4.0	3.3	3.4	3.6	4.1	4.1
	- andet Affald		-	36	12.6	12.4	12.0	11.8	14.1	11.7	11.9	11.7	12.5
	Bovstykket		-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mellemstykket		-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skinkestykket		-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind.....		40	28.6	28.6	28.9	28.0	27.9	30.6	31.0	28.6	29.1	28.1
	- andet Svind .....		41	13.0	13.2	13.0	13.4	13.8	13.1	13.1	13.3	13.4	12.6
	- Eksportflæsk.....		42	58.4	58.2	58.1	58.6	58.3	56.3	55.9	58.1	57.5	59.3
Tykkelse af	Rygflæk cm. ....		43	4.44	4.05	4.26	4.25	4.39	4.23	4.12	4.25	4.19	4.93
	Bugflæk cm. ....		44	3.52	3.15	3.47	3.41	3.05	3.48	3.32	3.67	3.09	3.58
Længde af Krop fra Hoffeskaal til	Snittet ved Halsen cm.		45	91.3	91.0	92.0	92.0	94.7	92.5	96.3	93.5	95.8	92.0
	forreste Ribben		-	46	72.3	71.7	71.8	72.3	75.3	73.5	75.8	73.3	75.5
	bageste		-	47	30.0	29.0	29.0	29.0	29.0	30.0	28.3	28.5	30.5
Points (0-15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed.....		48	13.7	12.2	12.8	11.9	12.0	14.0	13.4	14.3	12.7	13.3
	Bovpartiet .....		49	11.9	11.1	11.3	12.2	11.7	12.0	12.3	12.3	12.3	11.9
	Rygflækets Tykkelse .....		50	11.4	11.9	12.8	12.6	11.7	12.9	12.8	12.9	11.2	10.9
	- Fordeling .....		51	12.5	11.2	12.6	11.9	11.3	12.4	12.3	13.7	12.7	12.3
	Bugens Form og Fylde.....		52	13.0	9.9	11.9	12.3	10.8	12.5	11.5	12.8	11.1	12.9
	Skinkens Form og Størrelse..		53	12.4	11.7	11.8	12.2	10.8	12.4	11.5	12.3	10.7	12.0
	Finhed af Hoved, Ben og Svar		54	12.3	12.8	11.4	12.3	12.0	12.5	12.2	13.0	12.0	12.5
	Totalindtryk .....		55	12.0	11.0	11.8	12.4	11.6	12.6	12.2	12.8	11.8	11.7
	Kædfuldhed i hel Side .....		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- i overskaaret Tilstand		57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal Dyr slagtet.....	58	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
- - udgaaet af Forsøget.....	59	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
- - tilbagesendt til Avl .....	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr....	61	29	30	-	31	32	33	-	34	-	-	-	-

Bjernedegaard Nr.	Linje	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112		
Avlsted Mrk.....	1	24	17	9	15	4	2	28	10	7	13	18	18		
Antal { Galte.....	2	2	2	2	3	1	2	2	1	2	2	2	1		
{ Sør.....	3	2	2	2	1	3	2	2	3	2	2	2	3		
Forsøget { begyndte Dag.....	4	13/1 09	13/1 09	13/1 09	27/1 09	13/1 09	27/1 09	27/1 09	27/1 09	24/2 09	10/2 09	10/2 09	10/2 09		
varede Dage.....	5	159	168	164	157	187	142	161	154	154	147	157	166		
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	216	16	217	205	233	202	206	192	208	214	212	213		
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	{	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	630.7	667.2	641.5	632.8	712.8	594.0	598.0	580.0	580.1	580.0	603.6	638.2
		Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		— Vand .....	9	401	445	417	453	533	370	408	413	480	459	392	464
		— Korn, Majs o. lign..	10	498.6	523.5	509.5	502.9	526.8	466.0	463.3	448.2	432.8	460.9	446.8	484.4
		— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		— Roeterstof .....	12	30.2	32.2	32.2	30.2	30.0	30.5	28.7	28.5	22.8	26.9	24.7	24.5
		— Grøntfoder.....	13	35.9	53.4	43.7	63.0	104.1	27.0	52.5	41.2	126.0	70.0	96.2	121.2
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgtiden.....	14	640.9	677.4	657.3	650.8	695.3	600.9	601.9	581.7	576.2	598.5	590.9	638.2		
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse (Slutning —)	15	17.0	18.8	24.5	21.5	20.5	25.0	20.8	17.5	20.0	23.5	22.8	19.8		
Pd. Tilvækst { pr. Dyr i	16	185.3	183.8	182.5	181.3	189.3	185.0	180.0	185.0	193.8	192.3	187.5	182.7		
Forsøgtiden .....	17	168.3	165.0	158.0	159.8	168.8	156.6	159.2	166.0	173.8	169.3	164.7	162.7		
10 Dage af hele Forsøgtiden .....	18	10.6	9.8	9.6	10.2	9.0	11.0	9.9	10.8	11.3	11.5	10.5	9.8		
pr. Dyr i { 10 — fra 35—155 Pd. ..	19	12.1	11.7	11.0	11.5	9.5	11.9	11.2	12.1	11.3	11.9	10.8	10.4		
F-E til 1 Pd.	{	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	2.60	3.07	3.42	2.71	3.20	2.48	2.76	2.60	2.45	2.55	2.62	2.73
Tilvækst		— I (35—75 —)	21	3.03	3.24	3.29	3.02	3.53	2.79	3.40	3.05	3.11	3.04	3.25	2.69
		— II (75—115 —)	22	3.78	3.93	3.93	3.90	4.10	3.45	3.67	3.46	3.67	3.50	3.38	2.87
		— III (115—155 —)	23	4.09	4.52	4.26	4.65	5.02	4.60	4.36	4.14	3.44	4.01	3.77	3.43
		— IV (over 155 —)	24	5.28	5.57	5.90	5.81	3.98	5.67	4.15	4.08	3.38	3.91	4.41	4.61
		Gennemsnit af I—II—III ..	25	3.63	3.90	3.83	3.86	4.22	3.61	3.81	3.55	3.41	3.52	3.47	3.00
		— alle (a) .....	26	3.81	4.11	4.16	4.07	4.12	3.80	3.78	3.56	3.32	3.53	3.59	3.92
		— — (b) .....	27	3.81	4.11	4.16	4.07	4.12	3.84	3.78	3.50	3.32	3.46	3.59	3.91

Vægtklasserne varede	Dage	I	28	39	42	46	40	50	40	45	41	43	39	48	46
—	—	II	29	33	31	35	33	38	30	32	30	35	31	33	34
—	—	III	30	27	30	28	31	38	31	30	28	28	31	30	35
	Sum...		31	99	103	109	104	126	101	107	99	106	101	111	115
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	131.0	134.8	130.8	131.0	132.0	131.7	131.0	137.3	136.0	137.7	134.3	133.3
	deraf Eksportflæsk	—	33	106.9	108.6	104.6	105.5	104.1	106.7	104.3	112.3	108.4	111.0	107.3	108.2
	— Hoved	—	34	8.5	9.9	9.7	9.3	9.9	8.9	9.1	8.8	10.2	9.3	10.2	9.1
	— Flomme	—	35	3.3	3.4	3.3	3.2	3.4	3.4	4.1	3.4	3.0	3.7	2.6	2.8
	— andet Affald	—	36	12.3	12.9	12.3	13.0	14.6	12.7	13.5	12.8	14.4	13.7	14.2	13.2
	Bovstykket	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mellestykket	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Skinkestykket	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	....	40	29.3	26.7	28.3	27.7	30.3	28.8	29.0	25.8	29.8	28.4	28.4	27.0
	— andet Svind	....	41	13.0	14.2	14.4	14.1	14.7	13.5	14.5	13.5	14.3	13.9	14.4	13.8
	— Eksportflæsk	....	42	57.7	59.1	57.3	58.2	55.0	57.7	56.5	60.7	55.9	57.7	57.2	59.2
Tykkelse af	Rygflæk sk cm.	....	43	4.67	4.27	4.22	4.43	3.40	4.56	4.13	3.52	3.86	3.66	3.80	3.77
	Bugflæk sk —	....	44	3.46	3.24	3.17	3.21	3.22	3.23	2.85	3.52	2.90	3.20	3.03	3.44
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snittet ved Halsen cm.	....	45	92.5	92.5	89.5	90.5	93.8	90.7	91.5	91.7	93.5	93.7	92.5	90.7
	forreste Ribben	—	46	73.0	72.3	70.0	70.8	74.0	72.0	72.0	72.3	73.3	73.7	72.0	71.0
	bageste —	—	47	29.3	28.5	26.5	28.3	28.3	28.7	26.5	29.0	29.8	29.0	27.5	27.7
Points (0-15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed	....	48	12.1	12.6	12.3	12.2	9.8	12.9	13.2	11.8	9.3	12.3	10.7	11.3
	Bovpartiet	....	49	11.6	11.8	11.6	11.3	11.4	11.9	10.7	11.7	10.8	11.2	11.8	10.6
	Rygflækets Tykkelse	....	50	11.8	12.6	12.8	12.1	11.2	11.7	11.8	12.7	12.8	10.6	11.7	12.6
	— Fordeling	....	51	11.8	12.0	12.0	11.9	12.3	11.9	11.3	13.2	12.3	12.2	11.9	12.0
	Bugens Form og Fylde	....	52	12.8	12.2	11.9	11.2	11.6	11.3	9.2	12.6	9.6	11.3	10.9	13.1
	Skinkens Form og Størrelse	....	53	11.7	12.1	11.4	11.8	11.6	12.4	11.2	11.9	12.2	10.9	11.9	11.8
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	....	54	12.6	12.3	11.9	12.0	11.8	12.6	12.7	11.9	10.8	11.8	11.8	11.8
	Totalindtryk	....	55	11.8	12.2	12.0	11.4	10.7	12.0	9.7	12.6	10.3	11.1	11.4	12.1
Kødfuldhed i hel Side	Kødfuldhed i hel Side	....	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— i overskæret Tilstand	....	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
# Antal Dyr slagtet	58	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	3	4	3	3
	— udgaaet af Forseglet	....	59	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
	— tilbagesendt til Avl	....	60	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	35	—	—	—	—	—	36	37	38	39	40	—	41	

Bjernedegaard Nr.	Line	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
Avlssted Mrk. ....	1	27	1	2	13	5	5	5	16	12	4	11	8	
Antal { Galte.....	2	1	2	2	1	3	2	2	2	4	2	3	2	
Sør .....	3	3	2	2	3	1	2	2	2	—	2	1	2	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	10½ 09	10½ 09	24½ 09	24½ 09	24½ 09	24½ 09	24½ 09	24½ 09	24½ 09	10½ 09	10½ 09	24½ 09	
varede Dage .....	5	142	142	150	166	161	180	166	147	147	158	155	154	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	200	200	198	224	203	221	209	197	197	202	215	198	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	566.3	543.6	574.3	637.5	591.8	619.8	605.3	562.0	601.1	571.9	571.2	568.2
	Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Vand .....	9	396	368	469	532	434	481	468	402	460	458	534	478
	— Korn, Majs o. lign..	10	425.3	429.8	457.5	478.7	439.8	442.9	448.1	407.4	475.2	424.6	388.1	428.2
	— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Roerstof .....	12	30.0	28.1	24.6	22.1	16.9	11.6	16.0	22.1	22.2	14.8	14.9	11.8
	— Grøntfoder .....	13	56.9	56.9	110.2	152.2	153.1	191.1	162.1	106.7	106.7	176.4	172.2	196.4
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	561.1	559.9	599.1	635.2	583.9	592.8	595.1	543.8	618.2	567.3	532.4	570.4	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning	(Begyndelse Pd. —)	15	31.8	24.8	25.0	22.0	18.5	14.0	17.0	21.3	24.8	22.5	21.3	25.8
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden .....	17	150.0	157.7	162.5	172.8	173.3	172.5	174.5	166.7	164.0	157.5	171.3	166.5
pr. Dyr i {	10 Dage af hele Forsøgstiden .....	18	10.6	11.1	10.8	10.4	9.8	9.6	10.5	11.3	11.2	10.0	11.0	10.8
	10 — fra 35—155 Pd....	19	11.1	11.8	10.8	10.5	11.5	11.0	11.1	11.7	11.4	10.3	10.7	10.3
F—E til 1 Pd.	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.) .....	20	—	2.51	2.31	2.53	2.81	3.09	2.63	2.44	2.46	2.82	2.19	2.24
Tilvækst	— I (35—75 —) .....	21	2.76	2.97	3.18	3.12	2.93	3.18	2.99	2.72	2.88	3.13	2.63	3.39
	— II (75—115 —) .....	22	3.50	3.11	3.55	4.07	3.52	3.28	3.51	3.54	3.70	3.78	3.30	3.39
	— III (115—155 —) .....	23	4.26	4.34	4.14	3.35	3.38	3.20	3.42	3.51	4.28	3.54	3.01	3.22
	— IV (over 155 —) .....	24	5.14	4.24	4.36	4.55	3.98	4.40	4.14	3.63	4.62	4.55	3.70	4.05
	Gennemsnit af I—II—III .....	25	3.51	3.47	3.62	3.51	3.28	3.22	3.31	3.26	3.62	3.48	2.98	3.33
	— alle (a) .....	26	3.74	3.55	3.69	3.68	3.37	3.44	3.41	3.26	3.77	3.60	3.11	3.43
	— — (b) .....	27	3.74	3.55	3.69	3.68	3.37	3.44	3.41	3.26	3.77	3.60	3.50	3.43

Vægtklasserne varede Dage I .....	28	40	43	48	44	43	48	44	40	41	46	42	52		
— — — II .....	29	34	29	32	41	34	35	36	33	33	42	39	36		
— — — III .....	30	34	30	31	29	27	26	28	30	31	28	31	28		
Sum... . . . .	31	108	102	111	114	104	109	108	103	105	116	112	116		
Vægt i Slagteriet	{	hele Kroppen Pd.	32	131.3	129.8	135.0	137.5	133.8	128.8	132.8	135.8	136.3	128.0	137.7	137.8
		deraf Eksportflæk	—	106.0	103.4	106.9	109.9	107.0	101.6	106.0	108.8	108.6	100.8	109.7	108.8
		— Hoved	—	8.9	9.9	9.8	10.3	9.4	9.6	9.6	9.7	9.4	9.4	10.2	10.1
		— Flomme	—	3.7	3.3	3.3	2.9	2.6	1.9	2.9	3.0	4.1	3.0	2.8	2.3
		— andet Affald	—	12.7	13.2	15.0	14.4	14.8	15.7	14.3	14.3	14.2	14.8	15.0	16.6
		Bovstykket	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Mellemstykket	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Skinkestykket	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ved Slagtning	{	pCt. Slagtesvind .....	40	27.8	28.9	28.0	29.4	30.2	30.9	30.7	27.8	27.8	30.2	29.1	28.3
		— andet Svind .....	41	13.9	14.4	15.0	14.2	14.0	14.6	13.9	14.3	14.7	14.8	14.4	15.1
		— Eksportflæk .....	42	58.3	56.7	57.0	56.4	55.8	54.5	55.4	57.9	57.5	55.0	56.5	56.6
Tykkelse af	{	Rygflæk cm.....	43	3.83	3.74	4.06	3.88	3.64	3.40	3.54	3.79	4.35	3.31	3.52	3.48
		Bugflæk — .....	44	3.30	3.00	2.89	2.93	2.96	2.64	3.02	3.06	2.93	3.13	2.84	2.92
Længde af Krop fra Hoffeskaal til	{	Snittet ved Halsen cm.	45	93.0	89.8	93.0	94.0	93.0	93.0	92.5	92.0	92.8	92.7	93.0	94.0
		forreste Ribben —	46	73.0	71.5	73.3	75.0	72.8	72.8	72.3	71.8	72.5	73.3	72.3	74.0
		bageste —	47	28.3	28.0	28.8	29.0	28.0	29.3	26.0	29.3	28.5	28.7	28.3	30.3
Points (0-15) ved Bedømmelse af	{	Flæskets Fasthed .....	48	12.8	11.5	9.9	10.5	9.0	9.3	8.7	10.1	12.8	10.8	10.3	9.8
		Bovpartiet .....	49	11.7	11.4	11.3	10.9	10.8	11.3	10.7	11.6	11.3	11.2	11.7	11.8
		Rygflæskets Tykkelse .....	50	11.8	12.9	12.1	12.2	11.9	10.2	11.3	12.9	11.8	11.1	12.2	11.9
		— Fordeling .....	51	12.0	12.2	11.9	12.3	11.9	11.3	11.6	13.0	12.3	12.0	12.6	11.7
		Bugens Form og Fylde .....	52	12.8	11.1	10.3	10.6	9.9	9.0	11.3	11.3	9.4	10.9	9.6	11.0
		Skinkens Form og Størrelse ..	53	10.7	11.3	11.0	11.3	11.9	10.8	10.7	11.8	9.7	10.7	10.7	11.0
		Finhed af Hoved, Ben og Svær	54	10.9	11.8	12.0	11.3	10.5	11.0	11.2	11.4	11.3	11.0	11.7	11.4
		Totalindtryk .....	55	11.7	11.8	10.3	10.6	10.3	9.1	10.8	11.8	9.5	10.1	10.2	11.2
		Kødfuldhed i hel Side .....	56	—	—	—	12.7	—	12.3	—	—	—	—	—	—
		— i overskaaret Tilstand	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Antal Dyr slagtet .....	58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
— udgaaet af Forsøget .....	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
— tilbagesendt til Avl .....	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ...	61	—	—	—	—	—	—	—	42	—	43	44	45	—	

Bjernedegaard Nr.	Linje	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
Avlsted Mrk. ....	1	8	25	28	28	5	8	27	10	15	12	1	7
Antal { Galte .....	2	1	3	4	2	4	—	2	1	3	1	1	2
{ Sør.....	3	3	1	—	2	—	4	2	3	1	3	3	2
Forsøget { begyndte Dag.....	4	24/3 09	21/4 09	7/4 09	7/4 09	21/4 09	21/1 09	5/5 09	5/5 09	5/5 09	5/5 09	19/5 09	19/5 09
{ varede Dage.....	5	154	140	154	154	150	154	168	163	193	172	154	172
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	194	196	205	203	201	199	214	206	233	212	202	227
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	7	578.0	521.8	578.7	555.8	531.0	556.9	579.4	605.5	657.1	595.0	552.6	619.7
Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Vand.....	9	500	516	544	516	511	429	494	488	514	503	420	401
— Korn, Majs o. lign....	10	460.6	419.0	443.9	435.2	431.0	430.9	465.1	486.9	511.2	486.4	433.6	511.5
— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Roetørstof.....	12	12.1	5.5	5.3	5.5	3.7	3.5	6.1	5.7	13.2	7.2	6.1	11.4
— Grøntfoder .....	13	196.3	210.7	221.6	204.9	206.8	175.0	174.8	185.1	121.5	174.3	164.0	129.5
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	604.6	549.5	586.1	570.2	559.9	557.4	597.2	625.5	654.1	622.4	559.4	647.8
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse Pd. Slutning —	15	22.5	27.8	21.8	22.5	24.8	24.5	16.8	21.8	14.3	17.0	20.5	17.0
Pd. Tiltvækst pr. Dyr i	16	196.8	181.0	184.3	183.8	189.3	187.7	184.5	191.8	183.3	194.0	183.8	206.7
Forsøgstiden .....	17	174.3	153.2	162.0	161.3	164.5	162.0	167.7	170.0	169.0	177.0	163.3	189.0
10 Dage af hele Forsøgstiden .....	18	11.3	10.9	10.5	10.5	11.0	10.5	10.0	10.4	8.8	10.3	10.6	11.0
pr. Dyr i 10 — fra 35—155 Pd....	19	10.9	10.9	10.8	10.9	11.1	11.1	11.1	10.7	9.8	10.5	11.3	10.9
Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	2.34	3.05	2.68	3.00	2.76	3.94	3.00	2.81	3.18	2.59	2.98	2.59
— I ( 35—75 — )	21	3.25	3.20	2.86	3.14	2.90	2.73	2.63	2.77	2.84	2.96	2.58	2.51
— II ( 75—115 — )	22	3.43	3.39	3.12	2.96	3.01	3.35	3.50	3.49	4.25	3.38	3.32	3.15
— III (115—155 — )	23	3.26	3.70	3.81	3.67	3.30	3.60	3.91	4.27	4.31	3.72	4.00	3.79
— IV (over 155 — )	24	4.27	4.45	4.87	4.90	4.75	4.14	4.13	4.54	—	4.46	4.18	4.41
Gennemsnit af I-II-III ...	25	3.31	3.43	3.26	3.26	3.07	3.23	3.35	3.51	3.80	3.35	3.30	3.15
— alle (a) .....	26	3.47	3.59	3.62	3.54	3.40	3.44	3.56	3.68	3.87	3.52	3.43	3.43
— — (b) .....	27	3.47	3.59	3.56	3.54	3.40	3.50	3.56	3.68	3.87	3.52	3.43	3.52

Vægtklasserne varede	Dage	I .....	28	48	46	45	49	50	48	45	44	48	50	41	45
-	-	- II .....	29	36	38	39	35	34	34	36	37	47	38	36	40
-	-	- III .....	30	26	26	27	26	24	26	27	31	27	26	29	25
		Sum... .	31	110	110	111	110	108	108	108	112	122	114	106	110

Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	142.3	126.5	131.7	127.8	136.0	134.7	132.0	138.8	131.3	138.5	127.5	141.0
	deraf Eksportflæsk	-	33	114.5	99.9	104.3	101.1	107.3	107.0	106.0	113.8	104.5	111.3	100.8	112.5
	- Hoved	-	34	10.1	9.4	9.8	10.3	10.6	11.0	8.9	9.4	10.1	9.7	9.1	11.1
	- Flomme	-	35	2.5	2.6	3.0	1.9	2.8	1.8	3.2	2.8	2.6	2.8	2.3	2.9
	- andet Affald	-	36	15.2	14.6	14.6	14.5	15.3	14.9	13.9	12.8	14.1	14.7	15.3	14.5
	Bovstykket	-	37	-	13.0	13.5	13.0	-	-	-	-	13.5	-	-	14.2
	Mellemstykket	-	38	-	23.2	25.7	22.2	-	-	-	-	29.0	-	-	26.0
	Skinkestykket	-	39	-	12.2	13.5	12.2	-	-	-	-	13.7	-	-	14.5

Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind.....	40	27.7	30.1	28.5	30.5	28.2	28.2	28.5	27.6	28.4	28.6	30.6	30.9
	- andet Svind .....	41	14.1	14.7	14.9	14.5	15.1	14.8	14.0	13.1	14.6	14.0	14.6	14.0
	- Eksportflæsk .....	42	58.2	55.2	56.6	55.0	56.7	57.0	57.5	59.3	57.0	57.4	54.8	55.1

Tykkelse af	Rygflæk cm.....	43	3.90	3.67	4.08	3.70	3.68	3.07	3.95	4.12	3.81	3.76	4.05	4.13
	Bugflæk cm .....	44	2.87	2.67	2.91	2.52	2.71	2.66	3.37	3.14	2.92	3.21	2.60	2.45

Længde af Krop fra Hoffeskaal til bageste	Snippet ved Halsen cm.	45	94.5	93.5	91.7	94.8	93.3	93.3	95.3	95.3	90.8	93.8	94.5	95.0	
	forreste Ribben	-	46	74.8	74.3	73.0	75.0	72.5	73.7	74.8	74.8	70.8	74.8	74.5	75.0
	-	-	47	29.0	29.5	28.0	30.0	29.3	28.0	29.3	32.0	30.3	28.5	29.0	32.0

Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed .....	48	12.1	10.1	13.5	12.5	11.5	9.7	13.3	13.8	11.0	10.7	11.3	13.0
	Bovpartiet.....	49	11.9	11.8	11.8	11.8	11.7	11.9	11.3	10.8	11.6	11.0	11.3	11.2
	Rygflækets Tykkelse.....	50	12.7	12.5	12.0	12.7	12.6	9.7	12.7	12.3	11.8	11.8	12.1	12.7
	- Fordeling .....	51	12.4	12.3	12.4	12.2	12.6	11.4	11.9	11.9	12.0	11.6	11.4	12.5
	Bugens Form og Fylde.....	52	10.8	10.0	10.7	10.7	10.4	10.9	11.8	11.3	10.5	11.8	9.3	10.8
	Skinkens Form og Størrelse..	53	12.9	9.6	11.2	9.8	10.5	11.1	11.1	11.8	10.4	11.6	11.1	11.8
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	54	12.4	11.3	11.9	11.3	10.9	10.1	12.3	12.4	11.6	11.9	10.8	11.8
	Totalindtryk .....	55	11.8	10.3	11.3	11.2	11.3	10.0	12.0	11.8	10.9	11.6	10.4	11.8
	Kødfuldhed i hel Side .....	56	-	11.4	11.3	11.7	11.5	12.3	12.3	12.2	11.5	12.2	11.7	12.5
	- i overskaaret Tilstand	57	-	11.0	11.0	13.0	10.0	15.0	13.0	13.0	12.0	14.0	14.0	13.0

Antal Dyr slagtet .....	58	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2
- udgaaet af Forsøget .....	59	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
- tilbagesendt til Avl .....	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr....	61	-	-	46	-	-	47	-	-	-	-	-	-	48
---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----

Bjernedegaard Nr.	Lijnje	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148		
Avlsted Mrk. ....	1	8	8	16	16	6	6	21	23	8	24	24	4		
Antal { Galte .....	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	3	2	4		
{ Sær.....	3	1	3	2	2	3	3	2	3	2	1	2	—		
Forsøget { begyndte Dag .....	4	2/6 09	2/6 09	2/6 09	2/6 09	2/6 09	2/6 09	16/6 09	16/6 09	16/6 09	30/6 09	30/6 09	30/6 09		
{ varede Dage .....	5	175	153	163	169	178	182	144	149	161	172	181	145		
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	221	208	218	221	234	222	204	197	207	249	260	190		
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	{	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	585.2	565.1	593.8	602.5	633.5	600.9	568.9	536.8	591.3	610.2	638.6	538.1
		Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		— Vand .....	9	539	468	448	500	499	441	531	455	511	488	374	414
		— Korn, Majs o. lign... — Oljekager .....	10	488.7	479.8	478.5	503.9	485.6	488.6	511.3	432.0	500.1	506.2	548.8	458.3
		— Roeterstof .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		— Grøntfoder .....	12	13.8	9.4	11.7	12.7	13.8	17.5	10.5	11.7	13.8	16.9	17.8	14.7
		—	13	124.6	136.7	123.7	146.7	145.4	79.6	158.7	123.2	132.5	63.5	27.6	105.9
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	620.7	606.4	609.8	641.4	629.2	619.5	643.3	553.7	634.5	635.1	677.7	580.4		
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning	{	Begyndelse Pd. —	15	16.7	20.8	19.3	21.8	22.0	11.5	27.5	23.3	19.5	17.5	16.3	29.0
		Slutning —	16	184.0	195.0	192.0	188.3	185.0	183.3	196.3	186.0	193.0	188.3	188.0	179.3
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden .....	17	166.5	174.2	172.7	166.5	163.0	172.0	168.8	162.7	173.5	172.3	171.7	151.3	
pr. Dyr i	10 Dage af hele Forsøgstiden	18	9.5	11.4	10.6	9.9	9.2	9.5	11.7	10.9	10.8	10.0	9.5	10.4	
	10 — fra 35—155 Pd... Tilvækst	19	10.3	11.1	10.9	9.7	9.3	11.0	10.9	10.7	10.3	10.1	10.6	10.2	
F—E til 1 Pd. Tilvækst	{	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	2.33	2.43	2.58	2.43	2.85	2.34	2.10	2.27	2.16	2.24	3.19	2.44
		— I ( 35—75 — )	21	2.97	2.73	2.78	3.16	2.87	2.99	2.81	2.64	2.97	3.18	3.27	3.12
		— II ( 75—115 — )	22	3.48	3.23	3.19	3.54	4.00	3.97	3.70	3.16	3.45	3.92	4.30	4.06
		— III (115—155 — )	23	3.95	4.04	4.08	4.43	4.70	4.04	4.32	3.98	4.34	4.17	4.27	4.17
		— IV (over 155 — )	24	5.72	4.28	4.50	4.93	4.31	4.28	4.73	4.33	4.48	—	4.34	4.50
		Gennemsnit af I—II—III ..	25	3.47	3.33	3.35	3.71	3.86	3.67	3.61	3.26	3.59	3.76	3.95	3.78
		— alle (a) .....	26	3.73	3.48	3.53	3.85	3.86	3.60	3.81	3.40	3.66	3.69	3.95	3.84
		— — (b) .....	27	3.65	3.48	3.53	3.85	3.86	3.59	3.81	3.40	3.66	3.81	3.95	3.81

Vægtklasserne varede Dage I.....	28	56	47	45	54	50	48	42	46	48	53	52	53
— — — II.....	29	36	34	36	40	43	37	39	38	39	39	37	40
— — — III.....	30	25	27	29	30	36	24	29	28	29	27	24	25
Sum... .	31	117	108	110	124	129	109	110	112	116	119	113	118
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	134.5	141.0	139.0	138.8	136.5	134.0	141.0	133.0	140.3	135.0
	deraf Eksportflæsk		—	33	108.0	113.9	111.9	111.6	112.8	110.3	113.9	108.6	113.5
	— Hoved		—	34	10.0	10.3	10.1	9.6	8.3	8.0	9.8	8.5	10.1
	— Flomme		—	35	2.1	2.7	3.1	3.0	2.9	3.3	3.6	2.4	2.6
	— andet Affald		—	36	14.4	14.1	13.9	14.6	12.5	12.4	13.7	13.5	14.1
	Bovstykket		—	37	—	16.5	13.5	14.5	15.0	12.5	14.0	13.5	14.5
	Mellemstykket		—	38	—	31.2	25.2	25.2	27.7	25.0	24.5	23.2	26.2
	Skinkestykket		—	39	—	16.7	14.5	15.5	15.5	13.7	14.0	15.0	14.7
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind .....		40	26.9	27.7	27.6	26.3	26.2	26.9	28.2	28.5	27.3	28.3
	— andet Svind .....		41	14.4	13.9	14.1	14.4	12.8	12.9	13.8	13.1	13.9	13.8
	— Eksportflæsk .....		42	58.7	58.4	58.3	59.3	61.0	60.2	58.0	58.4	58.8	57.9
Tykkelse af	{ Rygflæk cm .....		43	3.82	3.78	4.07	4.09	3.50	3.94	3.88	3.64	3.91	4.14
	Bugflæksk — .....		44	3.17	3.13	2.82	2.80	3.44	3.37	3.02	2.42	3.00	3.22
Længde af Krop fra Hofteskaal til	{ Snittet ved Halsen cm		45	90.5	96.0	93.8	93.0	89.0	91.0	95.3	90.8	91.8	91.0
	forreste Ribben		—	46	70.5	74.8	74.3	74.3	70.5	71.3	75.0	70.2	72.5
	bageste —		—	47	26.0	28.0	29.5	28.5	28.3	27.0	30.0	27.8	29.3
Points (0-15) ved Bedømmelse af	Rygflæskets Fasthed .....		48	12.0	11.9	11.8	12.9	11.8	12.6	13.1	10.5	12.3	12.9
	Bovpartiet .....		49	11.7	11.5	11.0	11.7	11.8	12.2	11.8	11.4	11.4	11.7
	Rygflæskets Tykkelse .....		50	11.5	12.4	12.3	12.7	12.3	12.7	12.5	11.8	12.8	12.9
	— Fordeling .....		51	12.3	12.3	12.3	12.5	12.8	13.1	12.3	11.3	12.5	12.6
	Bugens Form og Fylde .....		52	12.5	12.3	10.1	10.5	12.9	13.2	12.1	9.4	12.1	11.7
	Skinkens Form og Størrelse ..		53	11.2	11.9	11.4	11.8	13.3	12.7	11.8	13.0	12.3	12.0
	Finhed af Hoved, Ben og Svær		54	11.8	12.1	11.9	11.9	13.2	13.2	12.2	13.1	12.6	12.1
	Totalindtryk .....		55	11.8	12.0	11.3	11.6	12.3	13.0	12.7	11.4	12.4	12.1
	Kødfuldhed i hel Side .....		56	11.5	13.0	12.5	12.0	12.0	12.0	11.8	13.0	12.2	11.3
	— i overskaaret Tilstand		57	—	14.0	13.0	12.0	12.0	12.0	13.0	15.0	14.0	12.0
Antal Dyr slagtet .....	58	2	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3
— udgaaet af Forsøget .....	59	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
— tilbagesendt til Avl .....	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	49	—	—	—	—	50	51	—	—	52	53	54

Bjernedegaard Nr.	Linje	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160		
Avlsted Mrk. ....	1	8	19	12	30	18	7	7	16	3	27	27	13		
Antal { Galte .....	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2		
Sør.....	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	1	2	2		
Forsøget { begyndte Dag.....	4	30/6 09	25/8 09	14/7 09	14/7 09	28/7 09	28/7 09	28/7 09	28/7 09	28/7 09	28/7 09	28/7 09	28/7 09		
varede Dage.....	5	162	135	180	154	147	140	143	171	148	151	157	164		
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	206	201	211	227	200	189	192	213	200	194	203	207		
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	{	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	607.4	501.4	645.3	556.8	556.0	505.6	510.9	594.8	550.1	549.1	567.8	594.4
		Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		— Vand .....	9	477	362	381	483	415	413	381	399	409	379	422	420
		— Korn, Majs o. lign....	10	512.9	450.5	517.0	468.8	503.4	485.0	458.5	505.1	496.0	474.9	503.3	536.0
		— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		— Roeterstof.....	12	15.5	17.5	18.9	15.1	18.9	17.4	19.8	18.6	18.5	20.1	19.4	18.0
		— Græntfoder .....	13	98.7	4.2	9.8	90.8	34.1	51.2	33.9	8.7	38.5	10.8	10.5	10.0
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	646.1	552.3	645.1	591.8	620.7	595.3	569.1	624.2	612.6	588.3	619.0	654.8		
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning	{	Begyndelse Pd.	15	23.5	24.3	14.0	33.0	21.5	31.5	26.0	17.8	27.0	19.5	18.8	16.5
		(Slutning —	16	185.7	184.5	180.5	184.5	188.0	196.7	186.3	185.8	188.3	183.7	187.5	189.0
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden .....	17	163.3	160.2	166.5	151.5	166.7	165.2	160.3	168.0	161.3	164.2	168.7	172.5	
pr. Dyr i {	10 Dage af hele Forsøgstiden	18	10.1	11.9	9.3	9.8	11.3	11.8	11.2	9.8	10.9	10.9	10.7	10.5	
	10 — fra 35—155 Pd...)	19	9.9	11.5	12.4	9.3	11.0	10.6	10.7	10.5	10.3	11.3	10.9	11.3	
F—E til 1 Pd.	{	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	2.48	2.19	2.66	—	2.24	2.70	2.58	2.86	2.80	2.55	2.60	2.78
Tilvækst		— I (35—75 —)	21	3.39	3.41	3.77	3.28	2.95	2.72	3.15	3.29	2.92	3.20	3.27	3.51
		— II (75—115 —)	22	4.11	3.68	4.28	4.42	4.04	3.75	3.75	4.00	4.27	3.82	3.90	3.85
		— III (115—155 —)	23	4.47	3.29	3.42	3.82	4.22	4.02	3.91	4.04	4.35	3.72	4.35	3.88
		— IV (over 155 —)	24	4.59	3.72	—	—	4.31	3.98	3.63	3.95	3.88	4.15	3.57	4.50
		Gennemsnit af I—II—III ...	25	3.99	3.46	3.82	3.84	3.74	3.50	3.60	3.78	3.85	3.58	3.84	3.75
		— alle (a) .....	26	3.96	3.45	3.87	3.91	3.72	3.60	3.55	3.72	3.80	3.58	3.67	3.80
		(b) .....	27	3.01	2.45	3.87	3.91	3.76	3.60	3.55	3.72	3.80	3.58	3.67	3.80

Vægtklasserne varede	Dage	I .....	28	52	51	40	57	45	50	54	51	46	47	49	51
-	-	II .....	29	40	33	37	45	37	38	34	36	41	36	35	33
-	-	III .....	30	29	20	20	27	27	25	24	27	29	23	26	22
		Sum...	31	121	104	97	129	109	113	112	114	116	106	110	106
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	130.0	131.0	130.8	131.5	139.3	139.0	134.0	135.3	131.3	132.3	135.8	136.5
	deraf Eksportflæsk	-	33	102.3	107.4	105.3	107.0	114.2	113.0	109.5	110.1	104.3	106.9	111.0	110.9
	- Hoved	-	34	9.8	9.3	9.7	9.1	9.5	8.8	8.3	9.8	9.4	8.9	9.3	10.2
	- Flomme	-	35	2.7	2.3	2.4	3.0	3.3	3.4	3.1	3.5	3.0	2.9	3.2	2.9
	- andet Affald	-	36	15.2	12.0	13.4	12.4	12.3	13.8	13.1	11.9	14.6	13.6	12.3	12.5
	Bovstykket	-	37	14.2	14.5	14.5	13.2	14.0	15.5	16.0	14.7	13.7	13.7	15.0	14.5
	Mellemstykket	-	38	26.0	24.5	26.2	23.2	28.7	29.0	28.0	24.0	27.0	27.7	28.0	26.5
	Skinkestykket	-	39	15.5	14.0	15.0	13.5	15.7	15.5	15.0	14.2	14.7	15.0	14.5	14.0
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind .....	40	30.0	29.0	27.5	28.7	25.9	29.3	28.1	27.2	30.3	28.0	27.6	27.8	
	- andet Svind .....	41	14.9	12.8	14.2	13.3	13.4	13.3	13.1	13.5	14.3	13.8	13.2	13.5	
	- Eksportflæsk .....	42	55.1	58.2	58.3	58.0	60.7	57.4	58.8	59.3	55.4	58.2	59.2	58.7	
Tykkelse af	Rygflæsk cm. .....	43	3.66	4.13	3.80	4.73	4.48	4.14	4.33	4.01	3.81	3.93	4.13	4.09	
	Bugflæsk — .....	44	2.70	3.25	3.33	2.97	3.29	2.88	3.17	3.39	2.70	3.46	3.48	3.17	
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snittet ved Halsen cm.	45	94.7	92.5	91.3	88.5	89.7	93.0	90.3	92.5	94.7	93.5	93.3	93.5	
	forreste Ribben	-	46	75.3	72.3	72.0	72.0	71.0	72.5	70.3	72.5	75.3	73.5	73.0	74.3
	bageste	-	47	27.7	28.8	29.3	29.3	29.3	29.8	29.0	30.0	30.5	28.0	28.0	29.3
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed .....	48	10.8	12.8	11.2	13.4	13.1	13.1	13.1	13.1	11.4	13.0	13.3	12.1	
	Bovpartiet .....	49	12.3	11.3	11.2	11.5	10.6	12.0	11.7	11.0	11.3	11.4	11.9	11.3	
	Rygflæskets Tykkelse .....	50	12.9	12.7	12.3	11.9	11.6	12.8	12.3	13.4	12.4	13.3	13.7	12.8	
	- Fordeling .....	51	13.6	12.3	12.0	12.5	11.7	12.7	12.7	13.0	12.0	12.8	13.1	12.5	
	Bugens Form og Fylde .....	52	10.3	11.7	11.5	10.5	11.2	11.3	11.8	12.2	10.3	12.9	13.1	11.7	
	Skinkens Form og Størrelse ..	53	10.6	11.6	11.3	11.0	12.7	12.2	12.4	12.2	10.5	11.7	11.6	11.4	
	Finhed af Hoved, Ben og Svaer	54	10.4	12.3	11.3	12.4	12.6	12.5	12.8	12.4	11.3	12.3	12.7	11.8	
	Totalindtryk .....	55	10.7	12.3	11.2	11.2	11.3	12.5	12.6	12.5	10.9	12.8	13.1	12.3	
	Kødfuldhed i hel Side .....	56	12.0	11.3	10.8	11.5	12.0	12.5	12.5	12.8	12.0	12.3	11.0	12.8	
	- i overskaaret Tilstand	57	12.0	11.0	10.0	11.0	13.0	13.0	14.0	13.0	12.0	11.0	9.0	12.0	
Autal Dyr slagtet .....		58	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
	— udgaet af Forsøget .....	59	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	— tilbagesendt til Avl .....	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bemærkninger til Hovedtallerne Nr. ....		61	55	—	56	57	58	—	—	—	—	—	—	—	

Bjernedegaard Nr.	Linje	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	
Avlsted Mrk. ....	1	6	18	28	28	10	11	25	1	29	1	5	10	
Antal { Galte .....	2	—	4	4	3	1	2	1	4	2	4	2	1	
{ Sør. ....	3	4	—	—	1	3	2	3	—	2	—	2	3	
Forsøget { begyndte Dag.....	4	28/09	28/09	11/09	11/09	11/09	25/09	25/09	25/09	25/09	25/09	25/09	25/09	
{ varede Dage .....	5	161	148	137	142	150	159	150	171	150	157	143	143	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	209	191	182	181	204	208	196	217	190	201	184	187	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	595.1	539.4	504.0	521.2	557.2	626.5	563.5	635.6	544.2	589.0	528.8	545.6
	Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Vand .....	9	425	411	393	381	413	366	420	446	374	385	399	367
	— Korn, Majs o. lign...	10	530.9	494.5	484.7	481.1	508.9	475.5	498.0	561.6	487.2	517.8	499.1	464.6
	— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Roeterstof .....	12	18.8	19.0	20.5	18.3	18.7	14.7	21.8	13.2	15.3	13.6	17.5	17.8
	— Grøntfoder .....	13	10.0	31.8	9.8	8.7	8.7	—	—	—	—	—	4.0	—
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	650.6	608.7	590.8	587.7	621.9	594.6	613.7	680.7	593.2	629.6	605.4	573.3	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning	Begyndelse Pd. —	15	17.8	23.8	26.5	23.8	21.0	21.0	24.3	19.0	20.0	18.3	26.0	22.3
	16	195.0	187.3	186.7	185.8	185.8	162.3	184.5	191.5	192.5	193.3	194.0	179.5	
Pd. Tilvækst pr. Dyr i	Forsøgstiden .....	17	177.2	163.5	160.2	162.0	164.8	142.0	160.2	172.5	172.5	175.0	168.0	157.2
	10 Dage af hele Forsøgstiden .....	18	11.0	11.0	11.7	11.4	11.0	8.9	10.7	10.1	11.5	11.1	11.7	11.0
	10 — fra 35—155 Pd....	19	10.9	10.7	11.4	11.3	11.8	9.8	10.9	10.7	11.4	11.7	11.4	11.3
F-E til 1 Pd. Tilvækst	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	2.74	2.60	2.59	2.74	2.40	2.48	2.66	2.35	2.20	2.34	2.70	2.36
	— I (35—75 —)	21	3.14	3.03	3.15	3.32	3.23	3.13	3.52	3.67	3.42	3.55	3.30	3.06
	— II (75—115 —)	22	3.76	4.01	3.76	3.86	3.64	4.13	3.84	3.63	3.47	3.75	3.74	3.38
	— III (115—155 —)	23	4.72	4.06	3.98	3.59	3.79	5.11	3.95	4.23	3.48	3.62	3.48	4.61
	— IV (over 155 —)	24	3.40	4.19	4.20	4.09	5.29	—	4.34	—	3.81	4.03	4.09	4.18
	Gennemsnit af I—II—III ..	25	3.87	3.70	3.63	3.59	3.55	4.12	3.77	3.84	3.46	3.64	3.51	3.68
	— alle (a) .....	26	3.67	3.72	3.69	3.63	3.77	4.19	3.83	3.95	3.44	3.60	3.60	3.65
	— — (b) .....	27	3.67	3.72	3.69	3.63	3.77	4.34	3.83	3.95	3.44	3.60	3.60	3.65

Vægtklasserne varede Dage I .....	28	48.	49	49	51	49	49	52	55	53	50	52	46
— — — II .....	29	34	38	33	34	31	35	33	31	30	31	32	31
— — — III .....	30	28	25	23	21	22	39	25	26	22	22	21	29
Sum... .	31	110	112	105	106	102	123	110	112	105	103	105	106
 Vægt i Slagteriet													
hele Kroppen Pd.	32	142.3	136.3	134.5	137.0	139.3	132.5	136.3	139.3	139.0	139.5	140.5	131.8
deraf Eksportflæk	—	33	117.5	110.4	107.7	109.8	114.8	108.0	111.8	111.3	114.1	113.5	114.8
— Hoved	—	34	9.2	9.2	9.4	9.8	9.4	9.1	9.1	9.8	9.6	9.0	9.7
— Flomme	—	35	3.2	2.8	2.9	3.5	2.9	3.5	2.8	3.8	2.8	3.4	3.0
— andet Affald	—	36	12.4	13.9	14.5	13.9	12.2	11.9	12.6	14.4	12.5	13.6	11.7
Bovstykket	—	37	13.7	13.7	12.7	14.7	16.0	—	14.7	14.0	15.0	13.5	14.5
Mellestykket	—	38	25.5	26.7	23.5	27.5	28.5	—	27.0	25.7	27.0	24.2	26.5
Skinkestykket	—	39	14.2	15.2	12.7	14.5	15.5	—	14.0	14.7	14.0	14.2	14.0
 Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind .....	40	27.0	27.2	28.0	27.7	25.0	27.4	26.1	27.3	27.8	27.8	27.6
	— andet Svind .....	41	12.7	13.9	14.3	14.4	13.2	13.4	13.3	14.6	12.9	13.5	13.2
	— Eksportflæk .....	42	60.3	58.9	57.7	57.9	61.8	59.2	60.6	58.1	59.3	58.7	59.2
 Tykkelse af	{ Rygfæsk cm .....	43	3.88	4.01	4.56	4.58	4.04	4.00	4.26	4.18	4.16	4.60	4.17
	Bugfæsk — .....	44	3.46	3.08	2.67	2.77	3.38	3.10	3.35	2.80	3.09	3.04	3.09
 Længde af Krop fra Hofteskaal til	{ Snippet ved Halsen cm.	45	91.8	91.3	94.0	93.5	91.0	94.0	94.5	96.0	97.3	93.3	92.3
	forreste Ribben	—	46	72.3	71.3	74.3	75.0	71.8	73.5	73.5	75.5	76.5	73.8
	bageste —	—	47	29.5	29.0	27.8	30.5	30.8	29.0	31.3	29.5	30.5	28.8
 Points (0-15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed .....	48	13.0	12.9	13.3	12.7	13.4	12.0	13.4	12.3	13.4	13.4	13.3
	Bovpartiet .....	49	11.3	11.1	10.9	11.2	11.3	11.7	11.5	11.2	11.3	11.3	11.5
	Rygflæskets Tykkelse .....	50	13.2	13.3	12.0	11.5	13.2	12.2	12.6	12.0	12.6	11.3	13.1
	— Fordeling .....	51	12.5	12.7	11.5	12.0	12.7	11.5	11.6	12.3	12.2	12.0	13.1
	Bugens Form og Fylde .....	52	13.0	11.5	9.4	9.5	12.2	10.8	11.3	9.4	10.6	10.4	11.6
	Skinkens Form og Størrelse ..	53	13.1	11.6	10.3	10.7	12.6	11.5	10.5	10.2	11.2	10.8	11.8
	Finhed af Hoved, Ben og Sver ..	54	13.1	12.1	12.0	12.0	12.9	11.8	11.7	10.8	12.1	12.0	12.2
	Totalindtryk .....	55	13.3	12.1	10.7	11.0	12.9	11.3	11.6	10.8	11.6	11.0	12.3
	Kødfuldhed i hel Side .....	56	12.3	12.8	10.8	11.5	11.7	10.5	11.8	11.8	12.2	12.0	12.5
	— i overskaaret Tilstand	57	12.0	12.0	11.0	9.0	11.0	—	11.0	11.0	11.0	13.0	12.0
 Antal Dyr slagtet .....	58	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4
— — udgaet af Forsøget .....	59	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
— — tilbagesendt til Avl .....	60	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
 Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	—	59	—	60	—	61	—	—	—	—	—	62

Bjernedegaard Nr.	Linje	173	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	
Avlsted Mrk.....	1	8	11	27	23	28	24	24	21	21	29	29	1	26	
Antal { Galte.....	2	3	1	2	—	2	2	1	2	1	2	4	3	2	
Sør.....	3	1	3	2	4	2	2	3	2	3	1	—	1	2	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	8/9 09	8/9 09	8/9 09	8/9 09	8/9 09	8/9 09	8/9 09	8/9 09	8/9 09	22/9 09	22/9 09	22/9 09	22/9 09	
varede Dage .....	5	150	149	140	136	163	150	140	149	157	149	147	173	149	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	200	203	193	194	213	208	200	186	194	196	194	220	202	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	591.7	551.2	518.3	526.0	592.0	571.2	559.6	586.1	619.8	572.6	557.0	641.9	586.7
Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Vand .....	9	334	357	367	339	380	388	416	392	362	401	388	369	376	
— Korn, Majs o. lign..	10	531.1	470.7	475.4	470.4	490.5	479.6	516.9	522.0	512.2	497.7	481.8	501.7	503.0	
— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Roetørstof .....	12	5.9	6.4	12.0	13.1	2.6	12.0	15.9	9.6	9.7	5.5	3.3	1.5	2.4	
— Græntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....	14	635.6	569.0	573.8	571.2	591.8	586.8	626.1	629.3	625.2	598.6	577.9	610.2	603.2	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning —	15	22.5	20.5	22.5	23.7	17.3	22.5	25.5	19.3	22.0	22.7	20.8	21.5	18.3	
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden .....	17	169.5	160.0	154.3	161.3	159.3	138.0	162.3	163.4	165.3	161.3	159.0	157.3	172.7
pr. Dyr i {	10 Dage af hele Forsøgstiden	18	11.3	10.7	11.0	11.9	9.8	9.2	11.6	11.0	10.5	10.8	10.8	9.1	11.6
pr. Dyr {	10 — fra 35—155 Pd...	19	11.9	11.1	11.4	11.9	11.9	10.2	11.3	12.0	11.5	11.9	12.2	11.2	12.6
F—E til 1 Pd. Tilvækst	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	3.12	2.44	2.04	1.99	3.28	2.00	2.10	2.43	2.41	2.55	2.73	4.50	2.66
	— I ( 35—75 — )	21	3.29	3.10	3.28	3.14	3.21	3.50	3.22	3.04	3.07	3.08	2.99	3.08	2.86
	— II ( 75—115 — )	22	3.76	3.36	3.57	3.39	3.41	3.82	4.00	3.90	3.51	3.38	3.38	3.96	3.33
	— III (115—155 — )	23	3.81	3.85	3.91	3.73	3.55	4.81	3.94	4.08	4.26	4.03	4.18	3.70	4.25
	— IV (over 155 — )	24	4.41	4.75	5.40	4.62	5.80	—	4.88	5.42	4.99	5.05	4.64	—	3.92
	Gennemsnit af I II—III ...	25	3.62	3.44	3.59	3.42	3.39	4.04	3.72	3.67	3.61	3.50	3.52	3.58	3.48
	— alle (a) .....	26	3.75	3.56	3.72	3.54	3.72	4.25	3.86	3.85	3.78	3.71	3.63	3.88	3.49
	— — (b) .....	27	3.75	3.60	3.72	3.54	3.76	4.25	3.86	3.85	3.78	3.71	3.63	3.97	3.70

Vægteklasserne varede	I	28	46	54	51	47	49	53	46	43	45	47	45	45	44
-	- II	29	32	30	31	31	29	34	34	33	30	29	27	35	25
-	- III	30	23	24	23	23	23	31	26	24	29	25	26	27	26
	Sum...	31	101	108	105	101	101	118	106	100	104	101	98	107	95

Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	137.0	130.7	128.5	136.8	127.0	114.2	138.3	133.3	137.0	135.0	129.3	129.0	142.3
	deraf Eksportflæk	-	33	111.0	107.7	104.9	112.5	103.3	93.1	113.5	109.3	112.0	110.5	104.5	103.8	117.8
	- Hoved	-	34	9.3	8.6	9.3	9.2	9.3	8.5	9.4	8.3	9.3	8.6	8.9	8.6	9.0
	- Flomme	-	35	3.4	3.3	3.1	2.8	2.4	3.1	3.5	3.7	3.3	3.1	3.2	2.8	3.1
	- andet Affald	-	36	13.3	11.1	11.2	12.3	12.0	9.5	11.9	12.0	12.4	12.8	12.7	13.8	12.4
	Bovstykket	-	37	13.5	13.7	13.7	13.5	13.0	-	14.2	12.7	15.0	13.7	14.2	13.2	14.5
	Mellemstykket	-	38	25.0	26.5	26.5	27.0	23.5	-	26.5	26.5	27.0	24.7	25.5	25.0	27.0
	Skinkestykket	-	39	14.0	14.7	13.7	13.2	14.0	-	13.5	13.5	15.0	14.7	12.7	14.5	14.5

Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	40	28.6	27.7	27.3	26.1	28.4	28.8	26.4	27.0	26.9	26.6	28.1	28.1	25.4
	- andet Svind	41	13.6	12.7	13.4	13.1	13.3	13.2	13.2	13.2	13.3	13.3	13.8	14.0	12.8
	- Eksportflæk	42	57.8	59.6	59.3	60.8	58.3	58.0	60.4	59.8	59.8	60.1	58.1	57.9	61.8

Tykkelse af	Rygflæk cm.	43	4.03	4.02	4.31	3.77	3.83	3.60	4.12	4.56	4.29	4.70	4.21	4.31	4.28
	Bugflæk	-	44	2.78	3.26	3.37	3.48	2.99	2.98	3.32	3.30	3.43	3.12	2.93	2.96

Længde af Krop fra Hofteskål til	Snittet ved Halsen cm.	45	94.0	93.0	92.5	94.0	93.0	87.0	94.5	88.3	92.5	94.3	94.3	89.0	94.0	
	forreste Ribben	-	46	74.3	73.0	73.0	74.8	72.7	69.2	74.3	69.7	73.5	74.7	74.8	69.3	74.0
	bageste	-	47	30.8	29.7	30.5	31.0	29.0	28.7	30.0	30.0	30.8	29.3	30.3	28.0	29.7

Points (0 - 15) ved Bedem- melse af	Flæskets Fasthed	48	13.0	12.3	14.1	12.6	13.2	13.5	13.5	13.5	12.6	12.8	12.9	12.9	11.6
	Bovpartiet	49	11.8	11.8	11.5	11.8	11.8	11.1	11.4	10.9	11.3	12.0	11.5	11.4	11.3
	Rygflæksets Tykkelse	50	13.0	12.9	12.3	11.7	11.9	11.7	12.3	11.7	12.6	11.5	12.3	12.0	11.6
	- Fordeling	51	13.0	12.6	12.6	11.3	11.6	11.9	11.8	12.4	12.9	12.1	12.1	11.6	11.0
	Bugens Form og Fylde	52	11.0	12.0	11.7	12.0	10.0	10.3	12.3	11.3	12.2	10.6	10.3	10.0	11.0
	Skinkens Form og Størrelse	53	11.8	11.6	11.0	12.8	11.2	10.5	11.4	11.4	11.7	10.5	10.3	11.2	11.8
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	54	11.2	12.0	12.5	13.0	12.0	12.2	11.8	12.6	13.0	12.1	11.8	12.1	12.6
	Totalindtryk	55	11.8	12.2	11.9	12.1	11.1	11.0	12.0	11.9	12.3	10.8	11.1	11.1	11.2
	Kødfuldhed i hel Side	56	11.3	12.7	12.5	12.3	10.7	11.0	12.7	11.0	12.5	11.7	11.3	11.3	12.7
	- i overskaaret Tilstand	57	10.0	11.0	13.0	13.0	11.0	-	14.0	11.0	12.0	12.0	13.0	14.0	-

Antal Dyr slagtet	58	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3
- udgaet af Forsøget	59	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1
- tilbagesendt til Avl	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	-	63	-	-	64	65	-	66	-	67	-	68	-	69
---	----	---	----	---	---	----	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Bjernedegaard Nr.	Linje	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
Avlsted Mrk.....	1	26	5	5	9	30	20	20	28	5	5	13	30	28
Antal { Galte .....	2	2	2	2	1	3	2	2	2	1	3	4	2	2
Sør.....	3	2	2	2	3	1	2	2	2	3	1	—	2	2
Forsøget { begyndte Dag .....	4	22/9 09	6/10 09	6/10 09	6/10 09	6/10 09	6/10 09	6/10 09	6/10 09	20/10 09	20/10 09	20/10 09	3/11 09	3/11 09
varede Dage.....	5	150	147	133	147	122	163	182	161	143	143	164	164	161
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	203	197	189	198	174	204	225	209	203	198	206	212	215
Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	580.5	597.3	532.5	582.2	484.6	637.5	726.6	623.5	603.6	590.1	589.2	629.3	646.4
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Vand .....	9	339	367	360	367	353	385	437	362	406	408	401	413	395
— Korn, Majs o lign...	10	474.6	491.7	477.1	507.7	452.5	509.2	555.7	520.5	532.3	526.0	503.6	533.2	544.9
— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Roeterstof .....	12	2.4	2.4	3.6	1.6	5.6	0.7	0.8	0.7	1.7	1.7	1.5	—	—
— Græntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	573.7	593.6	569.4	606.3	538.9	616.1	677.6	625.1	634.6	626.0	603.3	638.1	652.6
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning	15	19.8	21.3	25.5	20.0	28.5	18.0	17.0	22.0	23.0	22.0	26.3	19.0	18.8
Pd. Tilvækst {	16	179.8	183.0	182.8	187.5	183.5	185.3	180.5	181.7	183.5	185.7	185.5	176.0	178.0
10 Dage af hele Forsøgstiden	17	160.0	161.7	157.3	167.5	155.0	165.3	163.5	159.7	160.5	163.7	159.2	157.0	159.2
pr. Dyr i {	18	10.7	11.0	11.8	11.4	12.7	10.1	9.0	9.9	11.2	11.4	11.1	9.6	9.9
10 — fra 35—155 Pd ...	19	11.9	11.9	12.2	13.0	12.9	11.4	10.8	12.5	11.7	12.2	11.9	11.5	11.9
F-E til 1 Pd.	20	3.27	2.74	2.48	2.91	3.05	2.62	2.51	3.74	2.42	2.60	2.72	3.21	2.72
Tilvækst {	21	3.38	3.10	3.31	3.11	3.01	2.75	2.96	2.96	2.94	3.17	3.04	3.23	2.96
— I ( 35—75 — )	22	3.39	3.47	3.33	3.42	3.31	4.03	3.64	3.48	4.23	3.76	3.79	3.48	3.68
— II ( 75—115 — )	23	3.84	4.11	3.87	3.61	3.82	4.23	4.88	4.13	4.61	4.01	3.99	4.15	4.02
— III ( 115—155 — )	24	4.04	4.59	4.51	4.84	3.98	4.50	—	—	4.71	5.03	4.86	7.26	7.86
— IV (over 155 — )	25	3.54	3.56	3.50	3.38	3.38	3.67	3.83	3.52	3.93	3.65	3.61	3.62	3.55
Gennemsnit af I-II-III ...	26	3.59	3.67	3.62	3.62	3.48	3.73	4.14	3.91	3.95	3.82	3.79	4.06	4.10
— alle (a) .....	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— — (b) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Vægtklasserne varede	Dage	I	28	50	44	46	42	44	38	41	41	40	42	44	43	40
-	-	II	29	27	28	27	27	26	34	29	27	32	29	30	32	33
-	-	III	30	24	29	25	23	23	33	41	28	31	27	29	28	
	Sum...		31	101	101	98	92	93	105	111	96	103	98	101	104	101
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	127.3	133.3	132.3	136.3	130.8	134.3	135.3	126.0	134.3	137.5	137.5	129.7	127.5
	deraf Eksportflæk	-	33	103.5	110.0	108.3	112.0	106.5	109.3	109.2	102.5	108.5	111.8	110.1	104.2	102.5
	- Hoved	-	34	8.6	8.1	8.4	9.4	8.6	8.9	9.0	8.7	8.9	8.6	8.2	8.8	8.6
	- Flomme	-	35	2.9	3.1	2.6	3.1	2.8	2.8	3.6	2.2	3.4	3.6	3.3	3.3	3.2
	- andet Affald	-	36	12.3	12.1	13.0	11.8	12.9	13.2	13.5	12.6	13.5	13.5	15.9	13.4	13.2
	Bovstykket	-	37	12.7	13.7	13.7	13.5	14.7	13.5	-	13.5	15.0	13.7	13.5	-	-
	Mellestykket	-	38	23.5	25.0	25.0	22.0	26.5	25.2	-	25.5	25.5	24.5	25.5	-	-
	Skinkestykket	-	39	13.5	14.5	13.7	14.7	14.0	13.7	-	14.2	14.0	13.7	13.5	-	-
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind	.....	40	29.2	27.2	27.6	27.3	28.7	27.5	27.1	29.2	26.8	26.0	25.9	26.3	28.4
	- andet Svind	.....	41	13.2	12.7	13.2	13.0	13.3	13.5	14.1	13.2	14.1	13.8	14.7	14.5	14.0
	- Eksportflæk	.....	42	57.6	60.1	59.2	59.7	58.0	59.0	58.8	57.6	59.1	60.2	59.4	59.2	57.6
Tykkelse af	{ Rygflæk cm.	.....	43	3.87	4.23	3.84	4.24	4.09	3.85	4.05	4.85	4.57	4.67	4.25	4.68	4.20
	Bugflæk -	.....	44	2.98	3.04	3.14	3.42	3.00	3.19	3.12	2.43	3.35	3.29	3.22	3.21	3.18
Længde af Krop fra Hofteskål til	{ Snittet ved Halsen cm.	45	92.8	91.5	92.0	91.8	90.8	93.7	96.7	93.5	92.5	92.5	92.7	93.0	95.5	
	forreste Ribben	-	46	73.5	71.8	71.5	72.0	71.5	73.3	76.3	73.0	71.3	71.7	72.7	73.2	75.0
	bageste	-	47	30.3	27.5	29.3	28.8	28.3	28.3	29.3	32.0	28.0	29.3	28.7	29.2	29.5
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	.....	48	11.5	11.8	11.0	12.1	12.2	12.8	11.2	13.8	11.9	12.7	12.1	10.8	11.9
	Bovpartiet	.....	49	11.4	11.6	11.3	11.3	11.5	12.0	11.9	10.7	11.3	11.4	11.4	11.0	10.7
	Rygflæskets Tykkelse	.....	50	11.7	12.0	11.7	12.3	12.1	13.4	13.0	11.7	12.0	11.5	12.8	11.9	12.7
	- Fordeling	.....	51	11.4	12.0	11.3	12.3	11.7	13.0	12.9	11.8	11.8	12.2	12.8	10.5	11.8
	Bugens Form og Fylde	.....	52	10.3	11.4	11.1	12.3	10.3	11.1	11.0	8.8	12.0	11.9	11.0	10.8	11.7
	Skinkens Form og Størrelse	.....	53	10.8	11.4	11.3	11.8	10.3	10.7	11.5	10.7	11.3	10.8	11.7	10.0	11.0
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	.....	54	12.0	12.3	10.6	12.3	11.4	12.9	12.5	12.0	12.3	12.2	12.5	11.6	12.2
	Totalindtryk	.....	55	10.8	11.6	10.9	12.3	11.1	12.2	11.9	10.3	11.8	11.7	12.1	10.7	11.7
	Kødfuldhed i hel Side	.....	56	12.0	12.0	11.8	12.3	11.2	12.3	12.3	10.5	11.8	12.0	12.5	11.4	11.1
	- i overskaaret Tilstand	.....	57	12.0	12.0	13.0	13.0	13.0	12.0	-	12.0	11.0	13.0	14.0	10.0	-
Antal Dyr slagtet	.....	58	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	4	4
	- udgaet af Forsøget	.....	59	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	- tilbagesendt til Avl	.....	60	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....		61	-	-	-	-	-	70	71	72	-	-	-	73	74	

Elsesminde Nr.		Lidt	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Avlssted Mrk.....		1	7	13	12	5	13	13	4	3	3	10	10	2
Antal { Galte .....		2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	—	1	3
Sør.....		3	2	2	2	1	2	2	2	2	3	4	3	1
Forsøget { begyndte Dag.....		4	14/1 08	28/1 08	28/1 08	11/2 08	11/2 08	11/2 08	25/2 08	25/2 08	25/2 08	25/2 08	25/2 08	25/2 08
varede Dage.....		5	161	168	178	147	161	164	154	156	154	154	203	168
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....		6	226	220	235	204	215	219	237	220	219	232	254	217
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	615.0	661.9	689.5	622.3	590.5	652.4	588.2	654.7	644.9	578.8	699.5	643.0
	Pd. Valle .....	8	250.2	395.1	470.7	352.8	401.1	470.7	425.4	495.6	488.6	404.9	614.8	564.9
	— Vand .....	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Korn, Majs o. l .....	10	344.5	347.1	364.1	345.3	295.5	359.8	301.1	339.9	342.0	297.6	378.5	335.0
	— Oljekager .....	11	49.2	49.6	52.0	49.3	42.2	51.4	43.0	48.6	48.8	42.5	54.1	47.8
	— Roetørstof .....	12	76.4	49.4	44.9	51.2	37.2	46.9	39.8	38.6	40.4	39.4	39.6	23.2
	— Grøntfoder.....	13	104.2	164.5	196.0	147.0	167.5	196.0	177.3	206.3	203.7	168.8	197.2	229.6
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgtiden .....		14	614.0	620.9	651.9	607.6	538.3	642.8	550.2	615.8	617.4	541.1	676.2	602.0
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse Pd. (Slutning .. —)		15	31.5	26.5	23.0	24.0	27.5	37.0	49.5	33.0	30.5	42.5	23.5	26.5
Pd. Tilvækst { Forsøgtiden .....		17	150.8	157.8	156.3	159.3	135.0	153.8	134.3	145.0	162.0	133.3	165.7	164.0
pr. Dyr i 10 — fra 35—155 Pd. ..	10 Dage af hele Forsøgtiden	18	9.4	9.4	8.8	10.8	8.4	9.4	8.7	9.3	10.5	8.7	8.2	9.8
	10 — fra 35—155 Pd. ..	19	9.2	9.4	9.0	11.0	8.4	8.9	—	9.2	10.3	—	7.6	9.5
F—E til 1 Pd. Tilvækst	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.).	20	2.65	2.80	2.76	2.48	2.65	—	—	—	—	—	2.18	2.71
	— I (35—75 —).	21	3.21	2.94	3.17	2.93	3.40	3.12	—	2.81	2.66	—	3.59	2.87
	— II (75—115 —).	22	3.58	3.66	4.27	3.83	3.93	3.90	4.83	4.49	3.56	4.59	3.63	3.90
	— III (115—155 —).	23	4.58	4.73	5.05	4.39	5.03	4.65	4.00	4.77	4.80	4.26	5.24	4.09
	— IV (over 155 —).	24	—	4.92	—	6.26	—	5.09	4.77	5.18	4.53	4.56	4.79	4.08
	Gennemsnit af I—II—III ..	25	3.79	3.78	4.16	3.72	4.12	3.89	—	4.02	3.67	—	4.15	3.62
	— alle (a) .....	26	4.07	3.93	4.17	3.81	3.99	4.18	4.10	4.25	3.81	4.06	4.08	3.67
	— — (b) .....	27	4.07	3.93	4.17	3.81	3.95	4.18	4.10	4.22	3.81	4.06	4.18	3.67

vægtklasserne	varede	Dage	I	28	53	49	50	40	53	53	-	46	40	-	60	50
—	—	II	—	29	39	39	44	36	45	43	60	45	36	52	50	42
—	—	III	—	30	39	40	40	33	45	39	41	40	40	44	47	34
		Sum...		31	131	128	134	109	143	135	-	131	116	-	157	126
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	126.5	131.5	132.5	130.0	130.0	135.5	131.5	130.3	139.8	128.3	136.3	133.3	
	deraf Eksportflæk	—	33	102.5	105.5	109.8	106.5	104.0	108.5	106.5	106.3	113.8	105.0	112.0	109.5	
	— Hoved	—	34	10.8	11.3	9.7	10.3	10.2	11.8	12.0	11.2	11.7	10.3	11.5	10.0	
	— Flomme	—	35	3.5	3.1	3.2	3.2	4.5	3.1	2.4	2.8	2.9	2.1	2.1	3.1	
	— andet Affald	—	36	9.7	11.6	9.8	10.0	11.3	12.1	10.6	10.0	11.4	10.9	10.7	10.7	
	Bovstykket	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Mellemstykket	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Skinkestykket	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind	....	40	30.6	28.6	26.1	29.1	31.2	29.0	28.5	27.5	27.4	27.0	28.1	30.0	
	— andet Svind	....	41	13.2	14.2	12.7	12.8	13.8	14.1	13.6	13.3	13.5	13.3	12.9	12.5	
	— Eksportflæk	....	42	56.2	57.2	61.2	58.1	55.0	56.9	57.9	59.2	59.1	59.7	59.0	57.5	
Tykkelse af	{ Rygflæk cm.	....	43	3.85	3.66	3.57	3.43	3.70	3.40	3.52	3.52	3.06	3.25	3.41	4.03	
	Bugflæk —	....	44	2.94	2.69	3.16	3.18	2.67	2.73	2.91	3.20	3.21	3.16	3.37	2.93	
Længde af Krop fra Hofteskaal til	{ Snittet ved Halsen cm.	....	45	90.9	89.3	87.9	90.6	92.0	93.3	91.0	91.8	94.3	90.1	91.5	91.8	
	forreste Ribben	—	46	69.8	68.3	66.9	68.9	69.5	70.9	69.3	70.2	72.3	68.8	69.8	69.5	
	bageste	—	47	29.5	29.8	28.3	29.8	32.0	30.4	29.6	30.5	31.6	30.0	29.7	28.3	
Points (0—15 ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	....	48	12.8	12.0	13.3	12.5	11.0	11.0	11.9	11.7	11.8	12.8	11.0	13.3	
	Bovpartiet	....	49	12.1	11.8	11.8	12.0	13.0	11.8	11.9	12.2	12.1	12.6	12.2	12.1	
	Rygflæskets Tykkelse	....	50	12.0	12.0	10.5	12.8	13.0	12.1	11.5	11.2	12.1	12.5	11.7	12.0	
	— Fordeling	....	51	12.2	12.4	11.5	12.8	13.0	12.8	12.3	13.0	12.8	12.3	12.7	12.9	
	Bugens Form og Fylde	....	52	11.6	11.5	12.9	12.8	11.5	11.9	12.1	12.3	12.9	12.6	13.0	12.5	
	Skinkens Form og Størrelse	....	53	11.3	11.3	13.3	12.9	9.0	9.9	11.1	13.3	14.1	13.1	12.5	13.3	
	Finhed af Hoved, Ben og Svar	....	54	11.5	11.1	14.1	11.5	11.5	10.9	11.6	12.2	13.0	13.1	12.0	12.9	
	Totalindtryk	....	55	11.9	12.0	11.5	12.9	11.5	11.8	11.9	12.2	13.1	12.9	12.5	13.0	
Kødfuldhed i hel Side	....	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	i overskaaret Tilstand	....	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Antal Dyr slagtet	....	58	4	4	4	4	1	4	4	3	4	4	3	4	3	4
	udgaaet af Forsøget	....	59	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—
	tilbagesendt til Avl	....	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....		61	1	—	—	2	—	3	4	5	6	7	8	9	—	

Elsesminde Nr.	Linje	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
Avlssted Mrk.....	1	2	10	6	7	8	13	9	1	2	1	6	8	
Antal { Galte .....	2	—	2	2	—	2	3	1	2	2	2	2	2	
Sær.....	3	4	2	2	4	2	1	3	2	2	2	2	2	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	24/3 08	31/3 08	7/4 08	7/4 08	7/4 08	28/4 08	28/4 08	5/5 08	10/5 08	10/5 08	2/6 08	08	
varede Dage .....	5	143	182	154	184	178	154	206	192	133	147	189	170	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....	6	213	242	211	247	234	216	256	237	206	221	235	243	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	574.7	665.4	587.2	647.7	674.5	610.3	766.2	697.3	514.0	560.5	715.8	640.8
	Pd. Valle .....	8	549.2	492.4	609.4	391.6	564.2	596.4	221.9	228.9	579.6	381.5	175.0	178.9
	— Vand .....	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Korn, Majs o. l .....	10	305.9	340.1	328.0	324.1	361.5	356.0	389.7	343.6	310.2	313.3	376.2	329.1
	— Oljekager .....	11	43.7	48.6	46.8	46.3	51.7	50.8	50.4	46.5	44.3	44.8	49.8	44.3
	— Roetørstof .....	12	18.6	41.1	26.4	44.6	44.7	41.2	98.1	79.9	24.6	50.4	102.1	88.2
	— Grøntfoder .....	13	226.1	167.0	217.9	138.1	195.8	205.1	94.3	97.3	199.5	127.4	79.3	79.5
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	550.6	611.1	588.7	580.5	652.1	635.6	700.9	622.1	548.1	555.7	676.1	597.0	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning .....	15	39.3	32.5	39.5	35.0	27.5	39.0	23.5	18.0	46.5	32.5	25.5	35.0	
	Begyndelse Pd.	16	178.3	181.5	194.3	181.3	190.5	195.3	190.3	199.5	191.3	195.3	188.5	191.3
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden .....	17	139.0	148.0	154.8	148.0	163.0	154.0	166.8	181.5	144.8	161.3	163.0	156.3
pr. Dyr i	10 Dage af hele Forsøgstiden	18	9.7	8.1	10.1	8.0	9.2	10.0	8.1	9.5	10.9	11.0	8.6	9.2
	{ 10 — fra 35—155 Pd. ..	19	9.3	7.8	9.4	7.6	8.9	9.8	8.0	9.1	—	10.5	8.4	8.5
F—E til 1 Pd.	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.) .....	20	—	—	—	—	2.41	—	2.83	2.63	—	—	2.82	—
Tilvækst	— I (35—75 —) .....	21	2.81	2.95	2.79	3.30	3.16	2.79	3.51	2.96	—	2.34	2.96	3.11
	— II (75—115 —) .....	22	3.89	4.00	3.56	4.01	3.99	3.97	3.57	3.46	3.45	3.20	4.76	4.17
	— III (115—155 —) .....	23	4.29	4.99	4.08	4.33	4.73	4.19	4.79	4.15	3.84	4.02	4.39	4.11
	— IV (over 155 —) .....	24	5.23	4.85	4.60	4.19	4.46	5.17	—	—	4.78	4.24	5.13	4.08
	Gennemsnit af I—II—III .....	25	3.66	3.98	3.48	3.88	3.96	3.65	3.96	3.52	—	3.19	4.04	3.80
	— alle (a) .....	26	3.96	4.13	3.80	3.92	4.00	4.13	4.20	3.43	3.79	3.45	4.15	3.82
	— (b) .....	27	3.96	4.21	3.80	3.89	4.00	4.13	4.20	3.43	3.79	3.53	4.15	3.82

Vægtklasserne varede	Dage I.....	28	50	59	50	54	48	46	63	49	-	42	53	51
- - - II.....	29	43	50	41	55	43	42	43	43	38	37	54	52	
- - - III.....	30	36	45	36	48	44	35	44	40	31	35	36	39	
	Sum .....	31	129	154	127	157	135	123	150	132	-	114	143	142
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen Pd.	32	126.0	129.0	135.3	127.7	135.0	139.7	132.3	141.5	136.5	135.0	133.3	132.8
	deraf Eksportflæk	—	33	104.0	106.0	109.8	104.3	110.5	112.0	107.3	117.4	112.8	111.7	108.0
	- Hoved	—	34	9.5	10.9	11.2	10.7	11.3	11.4	10.6	10.9	10.7	11.2	10.8
	- Flomme	—	35	2.9	2.2	3.0	2.1	2.7	3.6	4.3	3.1	2.1	2.9	4.2
	- andet Affald	—	36	9.6	9.9	11.3	10.6	10.5	12.7	10.1	10.1	10.9	9.2	10.3
	Bovstykket	—	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mellemstykket	—	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skinkestykket	—	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ved Slagtning	pCt. Slagteswind .....	40	28.8	28.9	30.4	29.6	29.1	28.5	30.5	29.1	28.6	30.9	29.3	30.6
	- andet Svind .....	41	12.4	12.7	13.1	12.9	12.9	14.2	13.1	12.1	12.4	11.9	13.4	13.0
	- Eksportflæk .....	42	58.8	58.4	56.5	57.5	58.0	57.3	56.4	58.8	59.0	57.2	57.3	56.4
Tykkelse af	Rygflæk cm. ....	43	3.73	3.92	3.22	2.81	3.63	3.81	3.83	3.84	4.00	3.27	3.96	3.76
	Bugflæk — .....	44	3.17	3.35	2.82	3.25	3.39	3.17	3.35	3.37	3.28	3.40	2.99	3.03
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snittet ved Halsen cm.	45	88.8	87.8	94.1	93.3	91.9	93.0	93.3	92.0	90.1	92.7	90.4	91.1
	forreste Ribben —	46	67.8	66.3	72.6	71.2	70.1	70.0	73.4	71.8	69.0	71.2	71.4	71.0
	bageste —	47	28.0	28.3	31.3	29.3	29.3	30.8	28.5	28.5	29.3	29.2	27.8	29.1
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed .....	48	13.5	13.0	10.9	9.5	11.9	10.7	11.0	12.8	12.8	12.0	11.4	11.9
	Bovpartiet .....	49	13.3	11.3	11.4	12.0	12.1	11.8	11.9	12.0	11.9	12.7	12.0	11.9
	Rygflækets Tykkelse .....	50	13.0	12.0	11.9	9.2	12.6	12.0	12.3	13.1	12.8	13.7	12.3	12.4
	- Fordeling .....	51	12.8	11.8	12.6	12.7	12.3	12.8	12.6	12.9	12.9	13.5	13.0	12.8
	Bugens Form og Fylde .....	52	13.3	11.8	9.8	11.8	12.3	12.2	12.6	12.4	11.8	12.2	11.0	11.3
	Skinkens Form og Størrelse .....	53	13.0	12.8	11.1	10.2	12.0	11.8	11.8	13.1	13.1	13.3	12.3	12.4
	Finhed af Hoved, Ben og Svær .....	54	13.0	12.5	10.9	11.7	11.9	11.0	12.4	12.0	12.3	13.0	11.6	11.9
	Totalindtryk .....	55	12.8	12.0	11.3	10.7	12.4	12.7	11.6	12.8	13.0	13.3	11.9	11.9
	Kødfuldhed i hel Side .....	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- i overskaaret Tilstand	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal Dyr slagtet .....	58	2	2	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4
- - - udgaaet af Forsøget .....	59	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
- - - tilbagesendt til Avl .....	60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	10	11	12	13	-	14	15	-	16	17	18	-	-

Elsesminde Nr.		Linje	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
Avlssted Mrk.....		1	8	15	5	11	12	3	4	1	1	9	6	6	
Antal { Galte .....		2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	
Sør .....		3	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	
Forsøget { begyndte Dag .....		4	2/6 08	30/6 08	14/7 08	14/7 08	28/7 08	11/8 08	11/8 08	11/8 08	11/8 08	11/8 08	25/8 08	25/8 08	
varede Dage .....		5	168	149	151	191	203	161	161	187	192	185	157	185	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....		6	230	212	210	253	249	203	219	244	235	236	205	236	
Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....		7	656.3	553.5	569.1	729.5	760.9	623.5	639.3	713.6	742.9	720.8	631.9	760.7	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	{	Pd. Valle .....	8	214.3	126.0	84.0	42.2	—	—	—	—	—	—	—	
— Vand .....		9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Korn, Majs o. l. ....		10	358.7	297.8	312.0	414.8	440.0	355.2	365.7	401.8	410.9	401.3	386.0	487.9	
— Oljekager .....		11	48.4	35.9	32.8	26.2	17.8	20.0	20.7	16.6	15.0	17.1	17.2	15.6	
— Roeterstof .....		12	94.4	90.8	103.1	124.0	129.1	116.2	118.3	125.6	124.1	125.7	123.8	144.1	
— Grætfoder .....		13	88.4	51.4	32.6	20.4	5.3	2.8	3.0	2.5	2.1	2.5	—	—	
Ialt F - E pr. Dyr i Forsøgstiden .....		14	644.0	535.8	555.1	693.5	714.6	595.8	611.8	663.6	674.2	664.6	632.3	774.4	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning .....	{	Begyndelse Pd.	15	32.0	48.5	44.3	39.0	20.5	31.5	34.0	25.5	18.5	25.0	35.0	25.0
		Slutning .. —	16	199.7	189.7	190.3	183.3	179.3	183.3	186.8	186.3	188.5	183.3	188.5	195.5
Pd. Tilvekst {	Forsøgstiden .....	17	166.7	140.7	146.0	145.0	158.8	151.8	152.8	159.7	170.0	158.3	153.5	170.5	
pr. Dyr i {	10 Dage af hele Forsøgstiden .....	18	9.9	9.4	9.7	7.6	7.8	9.4	9.5	8.5	8.9	8.6	9.8	9.2	
Tilvækst {	10 — fra 35-155 Pd....	19	9.2	—	—	7.1	8.7	9.2	9.0	8.5	9.4	8.6	9.4	8.8	
F-E til 1 <sup>st</sup> Pd.	{	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.).	20	—	—	—	—	4.38	3.01	—	4.05	3.61	3.83	—	2.55
Tilvækst {		— I ( 35- 75 — ).	21	2.81	—	—	4.54	2.78	2.80	2.89	3.52	2.88	3.30	2.94	3.19
		— II ( 75-115 — ).	22	4.27	3.91	3.23	3.68	3.62	3.48	3.58	3.88	3.93	3.94	3.57	4.34
		— III (115-155 — ).	23	3.90	3.81	4.02	5.33	6.43	4.73	4.74	5.12	4.98	5.25	4.82	5.82
		— IV (over 155 — ).	24	4.60	4.24	4.61	6.07	6.07	5.41	5.32	4.40	4.54	4.78	5.61	5.56
		Gennemsnit af I-II-III .....	25	3.66	—	—	4.52	4.28	3.67	3.74	4.17	3.93	4.16	3.78	4.45
		— alle (a) .....	26	3.86	3.81	3.80	4.78	4.50	3.92	4.00	4.16	3.97	4.20	4.12	4.54
		— — (b).....	27	3.94	3.96	3.80	4.79	4.50	3.92	4.00	4.23	3.97	4.20	4.12	4.54

Vægtklasserne varede	Dage I.....	28	48	-	-	83	51	52	54	63	49	57	54	52		
-	- II.....	29	48	50	40	43	39	39	40	41	41	42	37	44		
-	- III.....	30	34	36	36	44	48	39	39	38	37	40	37	41		
	Sum....	31	130	-	-	170	138	130	133	142	127	139	128	137		
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	138.0	132.3	133.8	128.3	132.5	127.2	129.0	129.7	132.0	127.0	131.5	139.5	
	deraf Eksportflæk		—	33	111.2	108.0	110.3	101.0	108.5	102.5	103.5	104.0	106.3	98.8	104.8	112.0
	- Hoved		—	34	11.1	10.8	10.7	10.9	9.6	10.2	10.1	10.6	10.9	11.1	11.0	11.3
	- Flomme		—	35	2.8	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	3.1	2.9	2.8	3.1	2.9	3.6
	- andet Affald		—	36	12.9	11.1	10.2	13.8	11.7	11.8	12.3	12.2	12.0	14.0	12.8	12.6
	Bovstykket		—	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mellemstykket		—	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Skinkestykket		—	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind.....	40	30.9	30.3	29.7	30.0	26.1	30.6	30.9	30.4	30.0	30.7	30.2	28.6		
	- andet Svind .....	41	13.4	12.8	12.3	14.9	13.4	13.5	13.7	13.8	13.6	15.4	14.2	14.1		
	- Eksportflæk .....	42	55.7	56.9	58.0	55.1	60.5	55.9	55.4	55.8	56.4	53.9	55.6	57.3		
Tykkelse af { Rygflæk cm. ....	43	3.92	3.37	3.43	3.38	3.88	3.31	3.06	3.72	3.46	3.44	3.28	4.01			
	Bugflæk — .....	44	2.97	2.72	3.26	2.53	2.99	2.40	2.51	2.81	3.06	2.51	2.63	2.87		
Længde af Krop fra Hofteskaal til	{ Snittet ved Halsen cm.	45	92.5	93.3	91.6	89.3	86.5	92.3	91.9	88.3	89.0	95.4	90.6	94.0		
	forreste Ribben	—	46	73.0	74.2	72.5	69.5	67.5	72.9	72.9	69.7	69.9	74.6	70.6	74.4	
	bageste —	—	47	29.0	29.5	27.3	26.8	26.6	28.9	28.5	27.2	27.6	29.3	27.8	28.9	
Points (0-15) ved Bedømmelse af	Flæksets Fasthed.....	48	10.8	12.3	10.8	9.0	12.8	11.3	9.3	12.3	11.3	11.3	9.6	9.8		
	Bovpartiet .....	49	11.2	11.8	12.0	11.3	12.0	12.4	11.5	12.0	12.0	12.5	11.7	11.8		
	Rygflæksets Tykkelse .....	50	12.0	10.5	12.9	11.6	12.5	11.3	10.4	13.3	12.3	11.5	10.3	13.0		
	- Fordeling .....	51	11.8	11.2	13.3	12.8	11.8	11.8	11.9	13.0	13.3	12.8	12.8	12.8		
	Bugens Form og Fylde'.....	52	11.2	10.8	12.4	10.1	11.8	10.3	10.3	11.3	12.5	10.3	10.9	12.0		
	Skinkens Form og Størrelse..	53	11.3	12.5	12.1	10.2	13.0	11.8	10.6	12.3	12.0	11.0	10.3	12.0		
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	54	11.8	10.5	11.5	11.0	13.8	12.8	10.8	12.0	12.3	11.3	10.5	10.5		
	Totalindtryk .....	55	11.7	10.2	12.3	11.0	12.5	11.1	10.7	12.3	12.8	11.8	10.6	12.3		
	Kedfuldhed i hel Side .....	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- i overskaaret Tilstand	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Antal Dyr slagtet .....	58	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4		
- - udgaet af Forsøget .....	59	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
- - tilbagesendt til Avl .....	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	19	20	-	21	-	-	22	23	24	25	26	27			

Elsesminde Nr.		Linje	92	93	94	95	96	98	99	100	101	102	103	104
Avlssted Mrk. ....		1	4	1	2	2	2	13	4	5	12	12	9	3
Antal { Galte .....		2	2	2	1	2	2	4	2	2	2	2	1	2
Sør.....		3	2	2	3	2	2	-	2	2	2	2	3	2
Forsøget { begyndte Dag .....		4	25/8 08	25/8 08	6/10 08	20/10 08	20/10 08	19/1 09	19/1 09	19/1 09	26/1 09	26/1 09	26/1 09	2/2 09
varede Dage .....		5	168	185	164	156	161	187	149	196	206	189	171	182
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....		6	227	235	210	215	220	244	212	255	264	249	221	242
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	677.1	750.1	671.7	634.4	653.3	756.5	588.0	826.5	798.7	846.0	741.8	757.3
	Pd. Valle .....	8	-	-	56.7	85.0	113.4	302.3	436.8	321.6	192.5	251.3	348.4	220.9
	- Vand .....	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Korn, Majs o. l. ....	10	401.3	460.7	436.3	409.2	460.1	508.4	460.9	579.4	493.4	565.0	516.3	483.6
	- Oljekager .....	11	15.2	13.8	5.9	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-	-
	- Roeterstof .....	12	122.7	133.1	122.9	123.4	128.6	54.5	83.3	57.6	35.0	44.3	58.4	43.7
	- Grøntfoder .....	13	-	-	-	-	-	127.8	39.4	148.4	171.0	149.2	109.4	143.4
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....		14	652.1	732.6	681.8	649.6	711.2	737.8	686.5	828.6	708.0	798.4	747.8	697.9
Dyrenes Vægt ved Forsøgets (Begyndelse Pd. Slutning .. -	15	23.0	19.0	24.5	31.0	32.0	28.5	43.5	27.0	21.5	21.0	29.0	30.5	
	16	182.0	193.8	189.8	182.5	195.5	186.3	197.7	194.0	182.8	193.3	194.0	184.3	
Pd. Tilvækst { pr. Dyr i	Forsøgstiden .....	17	159.0	174.8	165.3	151.5	163.5	158.3	154.2	168.5	161.3	173.3	165.0	154.7
	10 Dage af hele Forsøgstiden	18	9.5	9.4	10.1	9.7	10.2	8.5	10.3	8.6	7.8	9.2	9.6	8.5
	10 — fra 35—155 Pd... .	19	9.5	9.4	10.2	9.4	9.4	8.0	-	8.6	7.9	9.2	9.8	8.1
F—E til 1 Pd. Tilvækst	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.).	20	2.62	2.52	2.69	2.88	2.94	3.07	-	3.79	3.43	3.50	3.73	2.77
	- I ( 35—75 — ).	21	2.97	3.04	3.04	3.37	3.41	4.12	-	4.60	3.53	4.01	3.11	3.39
	- II ( 75—115 — ).	22	3.95	3.87	4.17	4.80	4.64	4.59	4.10	4.94	4.92	5.07	4.86	5.18
	- III (115—155 — ).	23	5.44	5.52	4.47	4.61	4.47	5.17	4.77	4.81	4.83	4.80	4.73	4.71
	- IV (over 155 — ).	24	4.99	5.28	5.59	4.90	5.16	5.19	5.14	6.55	-	4.89	6.16	5.17
Gennemsnit af I—II—III ..	25	4.12	4.14	3.89	4.26	4.17	4.63	-	4.78	4.43	4.63	4.23	4.43	
	- alle (a).....	26	4.10	4.19	4.12	4.29	4.35	4.66	4.45	4.92	4.39	4.61	4.53	4.51
	- - (b).....	27	4.10	4.19	4.12	4.29	4.35	4.79	4.45	4.58	4.39	4.54	4.53	4.62

Vægtklasserne varede Dage I.....	28	48	49	48	53	55	63	-	58	54	51	45	49
— — II.....	29	39	39	39	43	42	46	39	49	56	45	44	62
— — III.....	30	39	39	31	32	30	41	35	33	42	34	34	38
Sum .....	31	126	127	118	128	127	150	-	140	152	130	123	149
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	129.5	138.0	135.5	126.5	137.5	130.3	142.0	133.5	132.8	139.5
	deraf Eksportflæk		—	33	104.5	110.3	109.5	100.3	109.5	101.7	113.0	105.5	107.5
	— Hoved		—	34	9.7	10.7	10.6	11.4	12.3	11.3	12.5	10.7	10.0
	— Flomme		—	35	3.2	4.4	3.1	2.1	2.1	4.1	3.1	2.6	2.9
	— andet Affald		—	36	12.1	12.6	12.3	12.7	13.6	13.2	13.4	14.7	12.4
	Bovstykket		—	37	—	—	—	—	—	—	14.0	—	15.0
	Mellemstykket		—	38	—	—	—	—	—	—	24.5	—	26.0
	Skinkestykket		—	39	—	—	—	—	—	—	14.5	—	15.0
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind .....		40	28.8	28.6	28.6	30.7	29.7	30.1	27.8	31.2	27.4	27.9
	— andet Svind .....		41	13.7	14.3	13.7	14.3	14.3	15.3	14.8	14.4	13.8	13.5
	— Eksportflæk .....		42	57.5	57.1	57.7	55.0	56.0	54.6	57.4	54.4	58.8	58.6
Tykkelse af	Rygflæk cm. .....		43	3.81	3.98	3.91	3.23	3.64	3.80	4.06	3.62	3.57	4.16
	Bugflæk — .....		44	2.62	2.96	3.13	2.81	2.88	2.47	2.68	2.99	2.85	2.66
Længde af Krop fra Hoffeskaal til	Snittet ved Halsen cm.		45	87.3	92.5	91.9	89.9	93.5	90.5	93.7	94.5	89.3	91.0
	forreste, Ribben		—	46	67.5	73.2	72.4	70.5	73.9	70.5	73.8	74.8	68.5
	bageste —		—	47	27.6	29.0	26.5	27.8	28.0	29.7	29.5	30.3	26.9
Points (0-15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed .....		48	11.0	12.3	12.0	11.3	12.3	11.0	11.7	11.0	12.3	12.7
	Bovpartiet .....		49	12.5	12.3	12.3	12.3	12.3	12.0	11.0	12.5	12.3	12.0
	Rygflæskets Tykkelse .....		50	12.8	13.0	13.0	10.5	11.8	12.3	12.0	12.0	12.5	12.3
	— Fordeling .....		51	13.3	13.3	12.8	12.3	12.8	12.3	11.7	13.0	12.3	11.7
	Bugens Form og Fylde .....		52	10.8	11.7	12.3	11.5	11.3	10.7	11.7	12.5	12.3	11.7
	Skinkens Form og Størrelse .....		53	13.5	12.0	12.5	12.5	12.5	11.0	11.0	13.0	13.3	13.7
	Finhed af Hoved, Ben og Svær .....		54	12.3	12.0	12.3	12.0	12.3	10.7	10.7	11.5	14.0	13.0
	Totalindtryk .....		55	12.3	12.7	12.8	11.8	12.5	11.0	11.0	12.5	13.3	12.3
	Kødfuldhed i hel Side .....		56	—	—	—	—	—	11.3	10.7	11.5	13.3	12.3
	— i overskaaret Tilstand .....		57	—	—	—	—	—	11.0	10.0	11.0	13.0	12.0
Antal Dyr slagtet .....	58	4	3	4	4	4	3	3	2	4	3	4	3
— — udgaet af Forsøget .....	59	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—
— — tilbagesendt til Avl .....	60	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	28	29	—	30	31	32	33	34	—	35	36	37

Elsesminde Nr.	Linje	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	
Avlssted Mrk.....	1	12	12	4	3	12	15	10	6	6	7	8	9	
Antal { Galte .....	2	—	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	
	3	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	2½ <sub>2</sub> 09	2½ <sub>2</sub> 09	2½ <sub>2</sub> 09	16½ <sub>2</sub> 09	2½ <sub>3</sub> 09	16½ <sub>3</sub> 09	16½ <sub>3</sub> 09	23½ <sub>3</sub> 09					
	5	196	175	175	168	168	154	161	194	184	187	182	185	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	257	235	227	215	223	226	220	245	227	236	233	237	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	819.4	685.2	732.4	723.3	733.1	671.1	700.9	888.5	825.3	820.2	814.0	827.4
	Pd. Valle .....	8	192.8	218.4	279.4	192.8	103.4	199.5	177.1	117.8	92.4	70.4	112.5	32.5
	— Vand .....	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Korn, Majs o. l. ....	10	516.8	472.1	503.6	497.3	484.8	475.3	474.4	553.9	516.9	512.6	515.7	493.9
	— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Roeterstof .....	12	37.0	36.0	48.2	31.2	18.0	30.7	26.4	26.1	19.3	17.5	18.3	16.1
	— Grøntfoder .....	13	168.4	133.0	133.0	148.8	176.4	148.3	161.7	197.3	191.4	203.8	193.2	192.9
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	736.4	665.0	721.7	692.3	665.2	661.5	661.6	771.9	714.8	708.0	712.3	683.7	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets (Begyndelse Pd. (Slutning .. —	15	24.5	23.0	25.5	23.5	20.5	35.5	33.5	26.0	24.0	22.0	30.0	22.5	
	16	182.3	198.0	193.0	176.8	183.0	185.7	183.5	189.3	188.2	183.5	192.0	190.3	
Pd. Tilvækst { pr. Dyr i 10 Dage af hele Forsøgstiden ..	Forsøgstiden .....	17	157.8	173.5	169.0	153.3	162.5	149.7	150.0	163.3	164.2	161.5	162.0	168.3
	10 — fra 35—155 Pd....	18	8.1	9.9	9.7	9.1	9.7	9.7	9.3	8.4	8.9	8.6	8.9	9.1
	19	7.8	9.3	9.4	9.6	10.4	9.0	9.0	7.9	8.8	8.8	8.4	8.1	
F-E til 1 Pd. Tilvækst	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.).	20	3.13	2.75	2.55	3.02	3.10	—	—	2.64	2.71	3.00	3.48	2.80
	— I ( 35—75 — ).	21	4.00	3.13	3.80	3.34	3.15	3.57	3.43	3.36	3.60	3.65	3.25	3.77
	— II ( 75—115 — ).	22	5.20	3.68	4.30	4.81	4.59	4.51	4.39	5.69	4.43	4.66	5.52	4.06
	— III (115—155 — ).	23	4.65	4.22	4.48	4.85	4.41	4.88	4.68	4.96	4.62	4.88	4.10	5.41
	— IV (over 155 — ).	24	5.30	4.55	5.17	6.32	5.44	4.76	5.51	5.44	5.02	4.86	4.86	4.77
	Gennemsnit af I-II-III .....	25	4.62	3.68	4.19	4.33	4.05	4.32	4.17	4.67	4.22	4.40	4.29	4.41
	— alle (a) .....	26	4.67	3.83	4.27	4.52	4.09	4.42	4.41	4.73	4.35	4.38	4.40	4.06
	— — (b) .....	27	4.67	4.02	4.13	4.52	4.09	4.45	4.41	4.73	4.35	4.38	4.25	4.33

Vægtklasserne varede Dage I.....	28	55	61	51	48	46	56	55	50	54	55	48	62			
— — — II.....	29	61	37	42	44	38	44	44	60	46	45	62	44			
— — — II.....	30	37	31	35	33	31	34	35	41	36	37	33	43			
Sum.....	31	153	129	128	125	115	134	134	151	136	137	143	149			
Vægt i Slagteriet	{	hele Kroppen Pd.	32	134.3	141.0	134.5	126.5	135.0	130.7	136.8	138.0	133.0	140.5	137.0		
		deraf Eksportflæsk	—	33	108.8	116.5	106.5	101.5	114.0	103.7	108.3	108.0	109.2	103.5	110.0	107.8
		— Hoved	—	34	10.0	10.0	11.5	9.8	11.0	10.0	10.7	10.8	10.6	10.1	12.4	11.0
		— Flomme	—	35	3.4	2.5	2.8	2.4	2.3	3.5	2.3	4.6	3.4	4.4	3.1	4.0
		— andet Affald	—	36	12.1	12.0	13.7	12.8	7.7	13.5	15.5	14.6	14.8	15.0	15.0	14.2
		Bovstykket	—	37	—	—	14.5	13.5	15.5	13.5	—	—	15.6	15.0	—	15.7
		Mellemstykket	—	38	—	—	25.0	25.0	27.0	26.5	—	—	25.6	26.5	—	27.5
		Skinkestykket	—	39	—	—	14.0	14.0	14.5	14.5	—	—	13.9	14.0	—	13.8
Ved Slagtning	{	pCt. Slagtesvind.....	40	26.3	28.8	29.9	28.5	27.3	29.6	25.4	27.1	26.7	27.5	26.8	28.0	
		— andet Svind.....	41	14.0	12.4	14.6	14.1	11.3	14.6	15.6	15.8	15.3	16.1	15.9	15.4	
		— Eksportflæsk .....	42	59.7	58.8	55.5	57.4	61.4	55.8	59.0	57.1	58.0	56.4	57.3	56.6	
Tykkelse af	{	Rygflæk em.....	43	3.73	3.39	3.77	3.73	3.45	3.61	3.63	3.86	3.77	3.99	4.02	4.55	
		Bugflæk — .....	44	3.21	2.82	2.29	2.88	2.63	2.80	3.09	2.77	2.82	2.79	2.80	2.93	
Længde af Krop fra Hofteskaal til	{	Snittet ved Halsen cm.	45	86.6	90.8	88.8	88.4	92.2	87.8	87.6	93.6	93.5	93.6	93.3	91.2	
		forreste Ribben	—	46	66.6	71.5	69.3	68.9	69.2	68.0	67.6	73.6	73.5	74.1	73.0	71.0
		bageste	—	47	27.3	29.0	28.0	28.5	28.7	28.5	28.1	28.6	29.5	28.8	31.8	27.0
Points (0-15) ved Bedømmelse af	{	Flæskets Fasthed.....	48	12.3	13.0	11.0	13.3	12.7	11.3	12.8	10.8	11.5	13.5	11.5	13.0	
		Bovpartiet.....	49	12.3	12.0	11.0	13.0	12.3	13.7	12.8	11.8	12.0	12.3	12.5	11.3	
		Rygflækets Tykkelse .....	50	13.3	13.5	12.5	13.5	12.7	12.3	11.5	12.8	11.8	12.0	11.0	11.3	
		— Fordeling .....	51	13.8	13.0	12.0	13.8	12.7	13.0	12.3	13.8	13.0	13.0	11.5	12.0	
		Bugens Form og Fylde.....	52	13.5	12.5	10.0	12.5	11.3	11.7	12.3	11.5	11.8	11.5	10.5	12.0	
		Skinkens Form og Størrelse..	53	13.8	13.5	11.5	13.0	12.3	13.3	13.5	11.3	12.5	12.3	11.5	11.7	
		Finhed af Hoved, Ben og Svær	54	14.0	12.5	11.0	13.5	12.7	11.7	12.8	11.5	12.0	12.0	11.0	12.3	
		Totalindtryk .....	55	13.5	13.0	11.0	13.5	12.3	12.7	12.5	11.8	12.0	12.0	11.0	11.7	
		Kødfuldhed i hel Side .....	56	12.8	12.5	11.0	13.3	12.3	11.7	12.5	11.8	12.0	11.5	11.5	12.3	
		— i overskaaret Tilstand	57	12.0	—	10.0	14.0	13.0	11.0	12.0	11.0	15.0	10.0	12.0	12.0	
Antal Dyr slagtet .....	58	4	2	2	4	3	3	4	4	4	4	2	3			
— — udgaaet af Forsøget .....	59	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1			
— — tilbagesendt til Avl .....	60	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—			
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	—	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			

Elsesminde Nr.	Linje	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	
Avlssted Mrk. ....	1	11	13	9	15	11	5	3	3	8	5	9	12	
Antal { Galte .....	2	2	1	1	2	2	1	—	1	2	3	1	2	
{ Sør .....	3	2	2	3	2	2	3	4	3	2	1	3	2	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	23/3 09	30/3 09	20/4 09	11/5 09	11/5 09	1/6 09	8/6 09	8/6 09	15/6 09	13/7 09	3/8 09	10/8 09	
{ varede Dage .....	5	164	145	178	150	150	175	159	168	161	147	171	170	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	213	195	246	210	203	223	218	225	208	213	227	219	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	704.2	657.4	820.8	731.2	731.3	781.6	745.0	777.2	750.4	729.4	778.6	768.6
	Pd. Valle .....	8	66.7	77.0	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Vand .....	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Korn, Majs o. l. ....	10	483.9	443.0	510.8	498.1	496.6	438.4	443.8	444.5	439.9	428.1	423.2	439.1
	— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Roerstof .....	12	10.9	12.4	24.1	14.9	16.1	50.4	44.5	51.2	51.5	69.9	89.7	91.9
	— Grøntfoder .....	13	190.2	174.4	176.8	180.3	180.8	81.9	103.8	79.1	72.7	43.1	12.1	7.5
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgtiden .....	14	650.8	602.2	703.2	665.7	665.4	632.9	630.4	638.5	628.6	627.6	644.7	660.3	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning .....	Begyndelse Pd.	15	32.5	31.0	31.0	32.8	31.3	23.5	29.0	19.5	25.3	33.0	31.0	24.0
	Slutning .....	16	189.3	187.0	195.2	193.0	191.8	193.5	192.5	196.0	188.7	190.8	193.5	194.8
Pd. Tilvækst { pr. Dyr i	Forsøgtiden .....	17	156.8	156.0	164.2	160.2	160.5	170.0	163.5	176.5	163.3	157.8	162.5	170.8
	10 Dage af hele Forsøgtiden .....	18	9.6	10.8	9.2	10.7	10.7	9.7	10.3	10.5	10.1	10.7	9.5	10.0
	10 — fra 35—155 Pd....	19	9.2	10.4	8.5	9.9	10.3	9.2	10.0	10.5	10.5	10.1	8.2	10.0
F—E til 1 Pd. Tilvækst	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.) .....	20	—	—	—	—	—	2.36	2.57	2.37	2.44	—	2.27	2.59
	— I (35—75 —) .....	21	3.32	3.15	3.70	3.13	3.04	3.45	3.09	3.07	2.98	3.27	2.87	2.87
	— II (75—115 —) .....	22	3.81	3.48	3.98	4.00	3.93	3.78	3.97	3.68	3.70	3.56	3.83	3.61
	— III (115—155 —) .....	23	4.31	4.44	4.79	5.11	4.76	4.25	3.94	4.00	3.96	4.45	4.52	4.65
	— IV (over 155 —) .....	24	5.42	4.75	4.85	4.54	5.19	4.07	4.88	4.46	5.66	4.81	4.37	4.68
	Gennemsnit af I—II—III .....	25	3.81	3.69	4.16	4.08	3.91	3.83	3.67	3.58	3.55	3.76	3.74	3.71
	— alle (b) .....	26	4.15	3.86	4.29	4.16	4.15	3.72	3.86	3.62	3.85	3.98	3.97	3.87
	— (b) .....	27	4.15	3.86	4.29	4.16	4.15	3.72	3.86	3.62	3.85	3.98	3.97	3.87

Vægtklasserne	værede	Dage	I	28	62	49	63	49	47	58	50	47	48	53	56	47
—	—	II	.....	29	37	34	42	37	36	40	40	37	37	34	41	37
—	—	III	.....	30	31	32	37	35	33	33	30	30	29	32	49	36
	Sum...			31	130	115	142	121	116	131	120	114	114	119	146	120
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	134.3	132.0	141.8	140.0	135.8	138.8	139.8	144.3	137.3	134.8	137.0	143.0	
	deraf Eksportfæsk	—	33	106.3	104.3	109.5	110.6	106.9	109.8	112.4	116.6	109.8	110.3	108.1	115.5	
	— Hoved	—	34	11.0	10.6	12.4	10.4	10.7	11.3	11.6	11.3	11.4	10.5	11.3	11.0	
	— Flomme	—	35	2.9	2.5	3.1	3.5	3.9	2.9	2.6	3.3	3.0	3.1	3.3	2.4	
	— andet Affald	—	36	14.1	14.6	16.8	15.5	14.3	14.8	13.2	13.1	13.1	10.9	14.3	14.1	
	Bovstykket	—	37	14.5	15.5	15.0	15.1	15.7	15.0	14.5	—	—	13.5	15.0	14.0	
	Mellestykket	—	38	25.0	26.0	26.0	25.8	27.0	26.5	26.0	—	—	25.5	27.0	27.0	
	Skinkestykket	—	39	13.0	14.5	14.0	15.6	13.3	14.0	13.0	—	—	14.0	14.5	14.5	
	Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	40	29.1	29.4	27.4	27.5	29.2	28.3	27.4	26.4	27.2	29.4	29.2	26.6	
		— andet Svind	41	14.7	14.8	16.5	15.2	15.1	15.0	14.2	14.1	14.6	12.8	14.9	14.1	
		Eksportfæsk	42	56.2	55.8	56.1	57.3	55.7	56.7	58.4	59.5	58.2	57.8	55.9	59.3	
Tykkelse af	Rygfæsk cm.	—	43	3.79	3.45	3.38	3.82	4.34	3.38	3.36	3.70	3.90	4.03	3.51	3.43	
	Bugfæsk —	—	44	2.81	2.97	2.80	3.12	2.78	3.15	3.23	3.30	2.90	2.98	3.02	2.93	
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snittet ved Halsen cm.	45	93.9	94.2	94.9	94.4	91.5	93.0	90.1	90.4	88.5	93.1	91.0	93.4	94	
	forreste Ribben	—	46	71.3	73.8	74.5	74.1	71.8	73.1	70.4	70.6	68.8	70.5	70.8	73.0	
	bageste —	—	47	34.1	30.3	30.2	30.0	29.2	33.2	30.0	30.0	27.7	28.6	29.1	29.6	
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	48	11.5	10.3	11.0	13.2	12.8	9.6	12.8	13.8	11.7	12.3	11.8	12.8		
	Bovpartiet	49	12.0	11.7	11.8	12.2	11.8	11.8	11.9	11.7	11.4	11.8	11.8	12.5		
	Rygfæskets Tykkelse	50	13.0	12.7	11.5	13.0	12.3	11.2	11.5	13.0	12.4	12.0	12.5	12.5		
	— Fordeling	51	12.8	13.3	12.2	12.2	13.0	12.4	11.8	12.3	12.6	11.4	13.0	12.8		
	Bugens Form og Fylde	52	11.5	11.7	12.0	12.8	11.8	11.4	11.9	12.3	10.6	11.0	11.8	11.3		
	Skinkens Form og Størrelse..	53	11.0	11.3	11.8	12.5	11.5	12.0	12.8	12.6	10.3	11.9	11.0	12.8		
	Finhed af Hoved, Ben og Svarer	54	11.5	10.7	12.5	12.0	13.0	10.4	12.8	13.0	11.7	11.6	11.0	13.8		
	Totalindtryk	55	11.8	11.3	12.0	12.8	12.2	10.6	12.0	12.7	11.1	11.5	11.8	12.5		
	Kødfuldhed i hel Side	56	12.0	11.0	13.0	12.5	11.5	12.2	12.3	11.8	11.0	11.3	11.3	12.8		
	— i overskaaret Tilstand	57	11.0	11.0	12.0	13.0	11.0	11.0	13.0	—	—	10.0	12.0	13.0		
Antal Dyr slagtet	.....	58	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
— udgaet af Forsøget	.....	59	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
— tilbagesendt til Avl	.....	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....		61	—	49	50	51	52	—	53	—	54	55	56	57		

Elesesminde Nr.	Lijn	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	
Avlssted Mrk .....	1	6	1	8	3	6	10	3	11	7	2	9	
Antal { Galte .....	2	2	2	2	—	2	2	—	1	2	3	2	
{ Sører .....	3	2	2	2	4	2	2	4	3	2	1	2	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	10/8 09	10/8 09	17/8 09	17/8 09	17/8 09	24/8 09	24/8 09	31/8 09	7/9 09	7/9 09	14/9 09	
{ varede Dage .....	5	182	150	184	163	157	196	171	168	164	157	157	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	224	203	227	232	204	241	220	212	221	205	211	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været {	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	772.3	718.2	708.9	757.4	716.3	804.6	768.6	740.1	771.1	719.8	706.1
Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Vand .....	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Korn, Majs o. l. ....	10	462.5	398.0	389.0	441.0	412.2	427.0	451.5	438.0	475.6	439.7	410.0	
— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Røeturstof .....	12	92.3	79.9	81.4	86.9	88.1	92.1	95.6	91.3	98.0	92.8	86.5	
Grøntfoder .....	13	6.5	8.9	4.2	5.6	9.6	4.2	3.8	3.1	1.8	1.7	0.7	
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	684.6	599.1	589.2	655.0	621.3	653.9	675.8	653.2	702.4	652.8	614.3	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse Pd. (Slutning .. —)	15	25.5	24.5	21.5	26.0	28.0	22.0	19.0	24.0	30.0	27.5	24.0	
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden .....	17	169.5	160.5	158.3	170.8	163.3	155.0	163.8	159.8	156.0	164.5	150.5
pr. Dyr i {	10 Dage af hele Forsøgstiden ..	18	9.3	10.7	8.6	10.5	10.4	7.9	9.6	9.5	9.5	10.5	9.6
Tilvækst {	10 — fra 35—155 Pd... ..	19	9.4	11.1	8.5	10.4	10.0	8.2	10.3	9.4	9.4	10.3	10.2
F—E til 1 Pd.	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.).	20	3.32	2.77	3.38	2.63	2.21	2.94	2.16	2.36	2.52	2.38	2.73
Tilvækst {	— I ( 35— 75 — ).	21	3.16	2.74	3.26	2.94	2.75	3.79	2.90	3.32	3.26	2.78	3.21
	— II ( 75—115 — ).	22	3.74	3.63	3.48	3.57	3.70	3.81	3.64	4.21	4.29	3.66	3.73
	— III (115—155 — ).	23	4.42	4.34	4.08	4.17	4.45	4.54	5.04	4.42	5.16	4.44	4.89
	— IV (over 155 — ).	24	5.00	4.73	4.43	4.89	4.68	5.88	6.41	5.19	5.85	5.39	5.71
	Gennemsnit af I—II—III ....	25	3.77	3.57	3.61	3.56	3.63	4.05	3.86	3.98	4.24	3.63	3.94
	— - alla (a).....	26	4.04	3.73	3.72	3.83	3.80	4.22	4.13	4.09	4.50	3.97	4.08
	— - — (b).....	27	4.04	3.73	3.72	3.83	3.80	4.64	4.13	4.09	4.50	3.97	4.08

Vægtklasserne	varede	Dage	I	28	58	42	59	48	48	69	45	54	53	46	49
—	—	II	—	29	37	35	37	36	38	41	35	42	40	37	35
—	—	III	—	30	32	31	45	31	34	36	36	32	35	33	34
		Sum...		31	127	108	141	115	120	146	116	128	128	116	118
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	142.5	138.0	124.0	144.5	136.8	129.7	135.5	128.5	139.3	139.3	122.8	
	deraf Eksportflæk	—	33	113.9	110.0	98.0	119.6	107.8	103.7	108.3	101.4	110.8	112.1	95.2	
	— Hoved	—	34	10.7	10.9	10.3	11.3	11.8	9.3	10.5	10.7	10.0	10.8	10.7	
	— Flomme	—	35	4.4	3.9	2.7	3.3	3.7	3.3	3.3	2.5	4.9	3.2	3.0	
	— andet Affald	—	36	13.5	13.2	13.0	10.3	13.5	13.4	13.4	13.9	13.6	13.2	13.9	
	Bovstykket	—	37	15.5	13.0	13.5	14.0	13.5	14.5	—	—	—	16.0	13.5	
	Mellemtystkchet	—	38	26.5	25.0	25.0	26.5	26.5	25.0	—	—	—	26.0	25.0	
	Sk inkestykket	—	39	13.5	14.0	14.0	15.5	13.5	14.0	—	—	—	16.0	13.0	
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	—	40	26.9	26.7	31.0	26.6	28.5	26.7	25.9	30.1	28.9	27.4	29.6	
	— andet Svind	—	41	14.7	14.9	14.5	12.6	15.1	14.7	14.9	14.7	14.6	14.2	15.8	
	— Eksportflæk	—	42	58.4	58.4	54.5	60.8	56.4	58.6	59.2	55.2	56.5	58.4	54.6	
Tykkelse af	Rygflæk cm.	—	43	4.02	3.70	3.24	3.63	4.01	4.23	3.26	3.43	4.33	3.45	3.28	
	Bugflæk —	—	44	2.93	3.13	2.94	3.06	2.72	3.12	3.08	2.75	2.98	2.90	2.65	
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snippet ved Halsen cm.	—	45	93.3	91.5	91.1	92.9	90.4	89.0	91.1	91.4	94.0	92.0	90.3	L4
	forreste Ribben	—	46	72.8	71.3	71.0	72.5	70.8	69.5	71.4	69.8	74.2	72.0	70.5	
	bageste	—	47	29.0	28.3	27.6	30.1	30.0	28.5	30.0	29.0	30.2	28.5	29.1	
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	—	48	12.3	12.3	12.0	12.3	10.8	13.7	13.3	11.8	13.7	12.3	12.3	
	Bovpartiet	—	49	11.0	13.0	12.0	12.5	11.5	12.0	12.5	12.0	11.7	11.8	11.8	
	Rygflækets Tykkelse	—	50	12.5	12.7	11.5	12.5	12.3	12.7	11.5	13.0	12.0	12.0	11.0	
	Eordeling	—	51	13.0	12.7	12.5	12.8	12.0	12.3	12.5	13.0	11.7	12.5	12.0	
	Bugens Form og Fylde	—	52	11.8	12.3	11.3	12.5	11.0	13.0	12.8	11.5	12.0	11.5	11.3	
	Skinkens Form og Størrelse	—	53	11.3	13.0	12.3	12.8	11.3	12.3	12.5	11.5	11.7	11.3	11.5	
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	—	54	10.5	11.7	12.0	13.0	10.0	14.0	13.0	11.5	12.0	12.3	12.5	
	Totalindtryk	—	55	11.3	12.7	12.0	12.8	11.3	12.7	12.3	12.0	12.0	11.5	11.3	
	Kødfuldhed i hel Side	—	56	11.3	12.7	12.0	12.5	11.3	12.0	12.0	11.3	11.0	11.5	11.5	
	i overskaaret Tilstand	—	57	8.0	14.0	11.0	12.0	10.0	12.0	—	10.0	9.0	12.0	9.0	
Antal Dyr slagtet	—	—	58	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
— udgaaet af Forsøget	—	—	59	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	
— tilbagesendt til Avl	—	—	60	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr.	—	—	61	—	58	59	—	—	60	61	62	63	64	65	

Elesesminde Nr.	Løn <sup>g</sup>	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
Avlssted Mrk. ....	1	11	2	13	6	9	5	10	15	12	3	7	
Antal { Galte .....	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	3	2	
Sør.....	3	2	2	2	2	3	1	2	2	2	1	2	
Forsøget { begyndte Dag.....	4	21/9 09	28/9 09	5/10 09	19/10 09	19/10 09	2/11 09	9/11 09	16/11 09	23/11 09	7/12 09	7/12 09	
varede Dage .....	5	154	168	145	156	203	154	168	177	154	161	140	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	203	214	200	214	258	205	222	234	214	217	205	
Foderet har i pr. Dyr været	{ Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	683.5	758.4	664.2	730.1	917.9	714.4	806.8	806.2	751.1	798.7	697.9
	Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Vand .....	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Korn, Majs o. l. ....	10	405.0	460.8	413.2	437.6	501.3	409.7	475.4	455.6	455.2	504.1	434.4
	— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	— Roetørstof. ....	12	87.3	93.0	90.0	97.3	110.8	81.3	104.8	85.2	88.9	104.0	87.0
	— Grøntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	606.2	680.2	613.9	656.6	765.1	610.1	714.7	675.2	669.3	741.2	637.7	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning ..	{ Begyndelse Pd.	15	27.5	25.0	32.5	36.0	24.0	25.0	28.5	25.0	27.0	33.0	34.0
	(Slutning .. —	16	187.3	196.3	187.7	188.8	181.7	186.7	193.7	176.7	189.0	189.3	192.0
Pd. Tilvækst pr. Dyr i	{ Forsøgstiden .....	17	159.8	171.3	155.2	152.8	157.7	161.7	165.2	151.7	160.3	157.7	158.0
	10 Dage af hele Forsøgstiden .....	18	10.4	10.2	10.7	9.8	7.8	10.5	9.8	8.6	10.4	9.8	11.3
	10 — fra 35—155 Pd....	19	10.3	10.3	10.3	9.3	8.1	10.3	9.7	9.2	10.3	9.7	10.8
F—E til 1 Pd. Tilvækst	{ Vægtklasse 0 (under 35 Pd.).	20	2.50	3.05	—	—	2.85	2.82	2.82	4.17	2.68	—	—
	— I (35—75 —).	21	3.07	3.39	3.04	3.28	3.91	3.73	3.25	3.78	3.29	3.25	3.00
	— II (75—115 —).	22	3.59	3.75	3.82	3.75	4.36	3.35	4.06	3.81	4.02	4.08	3.83
	— III (115—155 —).	23	4.27	3.96	4.18	4.82	5.43	4.28	4.89	5.01	4.38	5.55	4.31
	— IV (over 155 —).	24	4.67	4.99	5.05	5.52	6.97	4.00	5.38	5.94	5.43	6.39	5.12
	Gennemsnit af I—II—III ....	25	3.64	3.70	3.68	3.95	4.57	3.79	4.07	4.20	3.90	4.29	3.71
	— alle (a).....	26	3.79	3.97	3.96	4.30	4.85	3.77	4.33	4.45	4.18	4.70	4.04
	— — (b).....	27	3.79	3.97	3.96	4.30	4.87	3.77	4.33	4.68	4.31	4.54	4.04

Vægtklasserne varede	Dage	I	28	50	54	50	56	64	55	47	61	48	47	45
-	-	II	29	35	35	36	36	42	31	39	36	37	39	36
-	-	III	30	32	28	30	37	42	30	38	34	31	38	30
		Sum...	31	117	117	116	129	148	116	124	131	116	124	111
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	132.3	141.3	136.0	136.3	127.3	139.7	153.3	140.5	137.3	138.3	133.5
	deraf Eksportflæk	-	33	104.9	112.8	106.7	109.0	101.5	111.3	124.8	112.5	111.0	112.0	106.6
	- Hoved	-	34	10.7	11.2	10.0	10.4	10.8	10.7	10.7	10.2	10.9	11.1	10.4
	- Flomme	-	35	2.9	3.2	3.6	3.2	3.1	2.6	3.9	3.9	2.9	4.5	3.4
	- andet Affald	-	36	13.8	14.1	15.7	13.7	11.9	15.1	13.9	13.9	12.5	10.7	13.1
	Bovstykket	-	37	14.0	14.5	13.5	14.5	13.0	15.0	17.5	18.0	-	-	13.5
	Mellestykket	-	38	26.0	26.5	25.5	26.0	24.0	27.0	29.0	27.5	-	-	25.0
	Skinkestykket	-	39	13.0	15.0	13.5	13.0	12.5	13.5	17.0	17.0	-	-	14.0
	Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	40	29.4	28.0	28.4	27.8	29.9	28.5	25.9	28.3	27.4	26.9	30.5
		- andet Svind	41	14.6	14.5	15.4	14.5	14.2	14.5	13.8	14.3	13.9	13.9	14.0
		Eksportflæk	42	56.0	57.5	56.2	57.7	55.9	57.0	60.3	57.4	58.7	59.2	55.5
Tykkelse af	Rygflæk cm.		43	3.54	3.86	3.81	3.64	3.48	3.69	3.74	3.67	3.46	3.64	3.30
	Bugflæk cm.	-	44	3.02	2.98	2.95	3.03	2.78	2.88	3.00	3.24	2.61	3.21	2.62
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snippet ved Halsen cm.		45	92.1	93.3	94.5	89.3	92.5	94.0	94.7	96.5	94.7	93.7	95.8
	forreste Ribben	-	46	71.6	73.4	74.2	70.5	72.2	74.5	75.3	75.8	74.8	73.7	76.5
	bageste	-	47	28.8	28.5	30.7	28.3	29.3	30.3	31.8	32.8	30.3	29.7	30.5
Points (0-15) ved Bedømmelse af	Flæksets Fasthed		48	13.3	13.0	12.0	11.5	10.7	12.3	13.0	12.5	12.7	14.3	12.8
	Bovpartiet		49	12.3	12.0	12.7	12.3	11.3	12.7	11.7	11.5	12.3	12.3	12.5
	Rygflæksets Tykkelse		50	13.0	12.8	13.7	13.5	10.3	13.3	11.7	12.5	13.0	12.7	12.5
	- Fordeling		51	13.0	13.0	12.7	13.3	12.3	13.3	12.0	12.0	12.7	13.3	13.3
	Bugens Form og Fylde		52	12.0	11.5	12.0	11.8	11.3	11.3	11.7	12.0	12.0	12.3	11.3
	Skinkens Form og Størrelse		53	11.3	12.5	13.3	12.8	10.3	12.7	12.7	12.5	12.7	13.3	12.3
	Finhed af Hoved, Ben og Svær		54	12.0	12.5	12.7	11.8	11.0	11.7	13.0	12.5	12.7	13.7	12.0
	Totalindtryk		55	12.0	12.5	13.0	12.8	11.0	12.3	12.3	12.0	12.7	12.7	12.3
	Kødfuldhed i hel Side		56	12.0	12.0	11.0	12.3	11.7	13.0	12.7	11.5	13.0	11.7	11.8
	- i overskaaret Tilstand		57	11.0	12.0	10.0	12.0	9.0	14.0	13.0	9.0	-	-	11.0
# Antal Dyr slagtet	4		58	4	4	3	4	3	3	3	2	3	3	4
	- udgaaet af Forsøget		59	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-
	- tilbage sendt til Avl		60	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr....		61	-	66	67	-	68	69	70	71	72	73	74	

Rodstenseje Nr.	Linje	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	
Avlssted (se Hovedtabel 2) .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Antal { Galte .....	2	1	1	—	2	2	2	2	3	1	2	1	3	
{ Sør.....	3	3	3	4	2	2	2	2	1	3	2	3	1	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	¾ 09	½ 09	¼ 09	¾ 09	¾ 09	¾ 09	¾ 09	¾ 09	¾ 09	¾ 09	¾ 09	¾ 09	
{ varede Dage.....	5	117	140	146	129	147	119	125	126	136	143	143	122	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	185	194	198	191	199	172	183	183	193	205	205	175	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	654.0	735.0	733.5	714.0	798.0	672.0	723.0	693.0	756.0	766.5	787.5	672.0
	Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Vand .....	9	182	182	133	157	199	140	171	178	168	182	129	182
	— Korn, Majs o. l. ....	10	398.0	430.5	408.0	406.0	449.6	374.5	408.0	416.5	441.0	432.3	409.5	411.2
	— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Roeterstof .....	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Græntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	507.0	553.0	530.2	525.0	582.6	486.5	528.5	532.0	567.0	560.0	540.7	523.2	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse Pd. (Slutning .. —	15	37.3	27.3	28.3	29.2	21.3	35.5	30.7	31.0	29.5	24.8	27.0	35.8	
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden .....	17	141.2	149.0	146.7	147.3	155.5	144.0	145.8	139.5	148.0	153.7	151.8	142.5
pr. Dyr i	10 Dage af hele Forsøgstiden .....	18	12.1	10.6	10.0	11.4	10.6	12.1	11.7	11.1	10.9	10.7	10.6	11.7
Tilvækst	10 — fra 35—155 Pd. ...	19	11.5	10.6	10.9	10.9	11.0	11.5	11.4	11.1	10.9	11.1	10.3	11.2
F—E til 1 Pd.	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.) .....	20	—	2.61	2.49	1.95	2.85	—	2.52	—	3.00	3.35	2.67	—
	— I (35—75 —) .....	21	2.88	3.60	2.77	3.12	3.24	2.95	2.69	2.73	3.17	3.12	3.02	2.85
	— II (75—115 —) .....	22	3.39	3.52	3.59	3.53	3.73	3.25	3.64	3.75	3.68	3.62	3.56	3.64
	— III (115—155 —) .....	23	3.90	4.04	4.38	4.05	4.15	3.70	4.33	4.87	4.35	3.82	4.07	4.12
	— IV (over 155 Pd.) .....	24	4.37	4.17	4.18	3.98	4.18	3.74	4.24	4.30	4.56	4.40	3.96	4.34
Gennemsnit af I—II—III ..	25	3.39	3.72	3.58	3.57	3.71	3.30	3.55	3.78	3.73	3.52	3.55	3.54	
alle (a).....	26	3.59	3.71	3.61	3.56	3.75	3.38	3.62	3.81	3.83	3.64	3.56	3.67	
— (b).....	27	3.59	3.71	3.61	3.56	3.75	3.38	3.62	3.81	3.83	3.64	3.56	3.67	

Vægtklasserne varede Dage	I.....	28	45	53	39	45	44	44	38	39	42	46	46	44
—	— II.....	29	30	32	36	35	35	32	35	34	36	34	37	34
—	— III.....	30	29	28	35	30	30	28	32	35	32	28	33	29
	Sum...	31	104	113	110	110	109	104	105	108	110	108	116	107
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen..... Pd.	32	132.3	129.0	132.0	131.0	129.3	135.5	132.3	138.7	137.0	131.5	139.0	136.5
	deraf Eksportflæk..... —	33	108.7	106.0	108.4	105.5	106.5	110.8	108.0	114.7	112.8	108.3	115.0	113.5
	— Hoved .....	34	10.0	9.3	10.3	10.0	9.6	10.0	10.1	10.0	9.3	9.5	9.7	9.3
	— Flomme..... —	35	3.4	3.5	2.0	3.6	2.8	2.6	3.7	3.2	4.5	3.4	3.4	3.8
	— andet Affald .....	36	10.2	10.2	11.3	11.9	10.4	12.1	10.5	10.8	10.4	10.3	10.9	9.9
	Bovstykket .....	37	16.3	19.2	—	—	—	19.3	—	—	17.0	14.5	19.0	16.1
	Mellemstykket .....	38	27.6	30.2	—	—	—	27.5	—	—	30.2	25.2	30.7	25.6
	Skinkestykket .....	39	13.7	13.9	—	—	—	14.3	—	—	14.2	13.4	14.3	14.0
Ved Slagtning	pCt. Slagteswind .....	40	24.9	26.8	23.9	25.8	26.9	24.5	25.1	24.4	22.8	26.3	22.2	23.4
	— andet Svind .....	41	13.5	13.1	13.6	14.4	12.8	13.8	13.7	13.1	13.7	13.0	13.5	12.9
	— Eksportflæk .....	42	61.6	60.1	62.5	59.8	60.3	61.7	61.2	62.5	63.5	60.7	64.3	63.7
Tykkelse af	Rygflæk cm.....	43	4.4	4.2	4.0	3.8	3.9	3.9	3.8	4.5	4.1	4.1	4.3	4.4
	Bugflæk — .....	44	2.6	2.9	3.0	2.5	2.7	2.7	2.9	2.7	3.4	2.9	3.5	2.7
Længde af Krop fra Hofteskaal til bageste	Snippet ved Halsen cm.	45	91.7	89.8	91.3	91.8	94.3	95.5	94.5	94.3	93.3	91.5	89.5	91.0
	forreste Ribben —	46	71.0	70.3	71.7	71.0	74.3	74.8	74.5	73.3	72.3	71.5	71.3	71.3
	bageste — —	47	31.0	28.5	30.0	30.5	30.8	30.3	30.3	31.0	32.0	29.5	29.8	30.8
Points (0-15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed.....	48	11.7	12.8	11.3	11.8	12.0	13.5	12.3	14.0	12.8	12.8	12.3	14.3
	Bovpartiet .....	49	12.0	11.5	12.0	11.3	11.8	12.5	12.0	12.0	11.5	12.0	12.0	11.3
	Rygflæskets Tykkelse .....	50	12.0	11.8	12.0	12.5	13.0	13.8	11.0	11.0	11.0	12.5	11.8	10.5
	— Fordeling .....	51	13.0	11.3	11.7	12.5	13.3	13.8	12.3	12.3	11.5	12.0	12.3	12.3
	Bugens Form og Fylde .....	52	12.0	12.0	12.0	10.5	11.0	12.0	12.5	11.7	13.5	12.3	14.3	11.3
	Skinkens Form og Størrelse .....	53	11.7	11.0	11.3	11.3	11.5	11.8	11.5	11.7	11.5	12.5	14.0	11.3
	Finhed af Hoved, Ben og Svær .....	54	12.0	11.3	12.3	11.8	11.3	12.0	11.8	12.7	12.5	12.3	13.8	12.0
	Totalindtryk .....	55	12.0	11.0	12.0	11.5	11.8	12.3	11.8	12.0	12.0	12.5	13.3	11.3
Antal Dyr slagtet	Kødfuldhed i hel Side .....	56	—	—	—	—	11.3	—	11.5	11.0	11.8	12.3	13.0	12.0
	— i overskaaret Tilstand .....	57	9.0	10.0	—	—	—	13.0	—	—	11.0	10.0	9.0	12.0
* — udgaaet af Forsøget .....	58	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
* — tilbagesendt til Avl .....	59	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Rodstenseje Nr.	Linje	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
Avlssted (se Hovedtabel 2) .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Antal { Galte .....	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	3	3
Sør.....	3	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	1	1
Forsøget { begyndte Dag .....	4	20/5 09	20/5 09	20/5 09	21/5 09	27/5 09	27/5 09	27/5 09	27/5 09	2/6 09	2/6 09	10/6 09	5/6 09
voksede Dage.....	5	143	136	138	132	112	135	133	133	140	136	127	126
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	209	192	195	187	167	199	181	191	190	190	193	178
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	{ Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	798.0	766.5	763.0	742.5	640.5	749.0	735.0	714.0	756.0	756.0	729.0
	Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Vand .....	9	157	119	201	157	129	168	182	161	168	178	164
	— Korn, Majs o. l. ....	10	420.0	409.5	431.2	422.3	362.3	386.2	414.7	411.2	425.2	430.5	401.7
	— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Roerstøft .....	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Græntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	553.0	537.2	558.4	546.0	469.0	511.0	537.2	530.2	551.2	556.5	523.2	511.0
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning .. —	{ Begyndelse Pd.	15	27.0	32.5	23.0	29.3	33.5	24.0	27.3	30.0	25.5	26.5	31.0
	{ Slutning .. —	16	180.0	177.0	179.3	175.0	174.5	183.3	183.8	177.5	182.8	181.0	182.0
Pd. Tilvækst { pr. Dyr i	Forsøgstiden .....	17	153.0	144.5	155.7	145.7	141.0	159.0	156.5	147.5	157.3	154.5	151.0
	10 Dage af hele Forsøgstiden ..	18	10.7	10.6	11.3	11.0	12.6	11.8	11.8	11.1	11.2	11.4	11.9
	pr. Dyr i 10 — fra 35—155 Pd....	19	10.6	10.3	11.7	11.4	12.2	12.1	11.4	10.9	11.4	11.5	11.3
F—E til 1 Pd. Tilvækst	{ Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	2.94	—	2.55	2.32	—	2.53	2.69	2.71	2.61	2.45	2.19
	— I ( 35— 75 — )	21	2.99	2.88	2.75	2.99	2.72	2.71	2.97	3.06	2.86	2.86	2.92
	— II ( 75—115 — )	22	3.29	3.86	3.48	3.73	3.36	3.01	3.31	3.46	3.19	3.29	3.49
	— III (115—155 — )	23	4.32	4.20	4.20	3.90	3.57	3.32	3.94	4.19	4.22	4.46	3.80
	— IV ( over 155 Pd.)	24	4.21	4.01	4.60	4.75	4.07	4.33	3.74	3.91	4.17	4.27	3.64
	Gennemsnit af I—II—III .....	25	3.53	3.65	3.48	3.54	3.22	3.01	3.41	3.57	3.42	3.54	3.47
	— alle (a).....	26	3.61	3.72	3.59	3.75	3.33	3.21	3.43	3.59	3.50	3.60	3.46
	— — (b).....	27	3.61	3.72	3.79	3.75	3.33	3.63	3.43	3.59	3.50	3.60	3.46

registreret	værdie	dage	I	28	47	42	43	41	37	42	45	48	44	42	44	40
-	-	-	II	29	33	39	31	35	33	31	31	31	30	30	33	30
-	-	-	III	30	33	35	29	29	28	26	29	31	31	32	29	28
		Sum		31	113	116	103	105	98	99	105	110	105	104	106	98
Vægt i	hele Kroppen.	Pd.	32	135.3	135.3	138.0	133.8	131.0	138.5	137.0	135.3	138.0	139.0	136.3	134.0	
Slagteriet	deraf Eksportfleesk	Pd.	33	110.3	111.0	113.0	110.3	108.5	114.0	111.7	111.3	114.0	114.5	111.0	111.0	
-	Hoved.	Pd.	34	10.1	10.4	10.0	8.8	9.6	9.7	10.2	9.8	11.0	9.7	10.6	10.2	
-	Flomme	Pd.	35	3.5	3.3	4.7	4.2	2.4	3.8	4.1	3.7	2.3	3.4	4.0	3.3	
-	andet Affald	Pd.	36	11.4	10.6	10.3	10.5	10.5	11.0	11.0	10.5	10.7	11.4	10.7	9.5	
-	Bovstykket	Pd.	37	17.0	17.3	16.5	18.0	13.4	17.0	15.0	20.0	20.4	17.0	19.0	18.0	
-	Mellestykket	Pd.	38	26.0	25.6	31.0	21.0	26.0	28.5	24.5	29.0	29.1	29.3	25.7	30.5	
-	Skinkestykket	Pd.	39	14.8	13.3	14.5	15.5	13.7	14.2	12.1	14.0	14.5	13.3	14.6	13.9	
Ved	pCt. Slagtesvind		40	24.4	23.6	23.0	23.6	24.9	24.3	25.5	23.8	24.5	23.2	25.1	25.1	
Slagtning	- andet Svind		41	14.0	13.7	14.0	13.4	12.9	13.4	13.7	13.5	13.1	13.5	13.9	12.8	
-	Eksportfleesk		42	61.6	62.7	63.0	63.0	62.2	62.3	60.8	62.7	62.4	63.3	61.0	62.1	
Tykkelse af	Rygflæk cm.		43	4.0	4.3	4.2	4.3	3.7	4.8	3.6	3.9	3.7	4.4	3.9	4.1	
-	Bugflæk cm.		44	2.6	2.8	3.1	2.8	2.9	2.8	2.6	3.0	3.0	3.0	3.0	2.6	
Længde af Krop	Snittet ved Halsen cm.		45	91.0	89.8	90.3	92.5	92.8	93.0	94.8	93.5	95.3	93.5	90.8	92.3	93
fra Hofteskaal til	forreste Ribben		46	72.3	71.0	71.3	72.3	72.8	74.0	74.5	72.5	74.0	74.3	72.0	72.5	
-	bageste		47	30.0	28.5	29.0	31.8	28.5	30.5	30.5	31.0	31.3	31.0	28.3	31.0	
Points (0-15)	Flæskets Fasthed		48	8.0	13.3	12.0	12.5	12.0	12.5	12.5	10.8	12.0	13.5	13.0	13.5	
ved Bedøm- melse af	Bovpartiet		49	11.7	11.3	11.3	12.0	12.3	12.5	12.0	12.0	11.8	12.0	11.8	11.5	
-	Rygflækets Tykkelse		50	12.7	11.5	12.3	11.8	13.3	11.5	12.5	13.0	13.8	11.5	12.8	12.0	
-	Fordeling		51	13.3	12.3	12.3	12.0	13.3	13.0	12.8	12.8	12.0	12.8	12.8	12.3	
-	Bugens Form og Fylde		52	11.7	11.5	13.7	12.0	12.5	12.0	11.0	13.3	12.8	13.0	12.0	11.3	
-	Skinkens Form og Størrelse		53	12.7	11.3	12.3	12.5	13.0	11.5	11.0	10.3	11.5	11.5	12.8	11.3	
-	Finhed af Hoved, Ben og Svær		54	10.3	10.5	12.7	12.5	13.3	12.5	11.8	11.0	12.3	11.5	12.0	11.8	
-	Totalindtryk		55	10.0	11.5	12.3	11.8	13.5	12.0	11.5	11.0	12.3	11.8	12.3	11.0	
-	Kødfuldhed i hel Side		56	12.3	12.0	11.7	12.3	13.5	11.5	12.0	11.5	11.8	12.0	11.8	12.0	
-	- i overskaret Tilstand		57	13.0	11.0	12.0	9.0	13.0	8.0	12.0	11.0	10.0	9.0	12.0	13.0	
Antal Dyr slagtet			58	3	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	
-	- udgaaet af Forsøget		59	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	- tilbagesendt til Avl.		60	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr.			61	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	

Rodstenseje Nr.		Linje	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Avlssted (se Hovedtabel 2) .....		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal { Galte .....		2	3	2	1	2	2	1	1	2	2	3	2	3
Sører .....		3	1	2	3	2	2	3	3	2	2	1	2	1
Forsøget { begyndte Dag .....		4	17/4 09	20/4 09	24/4 09	1/5 09	1/5 09	22/5 09	22/5 09	22/5 09	12/6 09	12/6 09	14/6 09	16/6 09
varede Dage .....		5	147	130	122	128	140	129	129	145	129	156	125	123
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....		6	198	188	169	183	191	197	184	203	186	203	174	174
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	772.5	705.0	651.0	686.0	756.0	682.5	682.5	757.5	698.5	812.0	673.5	633.0
	Pd. Valle .....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Vand .....	9	157	185	171	145	136	154	161	167	107	121	136	61
	- Korn, Majs o. l. ....	10	434.0	428.5	402.5	350.0	409.5	406.0	404.3	458.0	387.9	429.1	384.8	318.9
	- Oljekager .....	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Roetørstof .....	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Grøntfoder .....	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden .....		14	562.7	546.0	511.0	464.3	535.5	519.7	518.0	584.2	504.3	564.4	497.0	424.4
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse Pd.		15	24.7	28.3	34.5	29.5	22.8	27.5	28.5	23.5	33.0	24.5	30.2	27.3
{ Slutning .. —		16	176.5	176.8	178.3	177.7	174.3	177.3	178.3	183.5	180.3	177.7	181.5	175.0
Pd. Tilvækst { pr. Dyr i	Forsøgstiden .....	17	151.8	148.5	143.8	145.7	151.5	149.8	149.8	160.0	147.3	154.7	151.3	146.5
	10 Dage af hele Forsøgstiden .....	18	10.3	11.4	11.8	11.4	10.8	11.6	11.6	11.0	11.4	9.9	12.1	11.9
	10 — fra 35—155 Pd. ..	19	10.7	11.8	11.2	11.7	11.2	11.8	11.8	11.5	11.1	10.4	11.3	11.9
F-E til 1 Pd. Tilvækst	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	2.95	3.02	-	-	2.54	2.84	2.68	3.00	-	3.56	2.08	2.47
	- I (35—75 —)	21	3.27	3.22	3.01	2.34	3.03	2.88	2.90	2.89	2.75	3.12	2.85	2.67
	- II (75—115 —)	22	3.90	3.61	3.53	2.89	3.52	3.28	3.38	3.56	3.45	3.69	3.32	2.99
	- III (115—155 —)	23	3.66	3.78	4.06	3.56	3.94	4.01	3.78	4.25	3.88	3.97	3.60	2.78
	- IV (over 155 Pd.)	24	4.62	4.66	3.66	4.55	4.42	3.99	3.90	4.27	3.81	3.97	3.65	3.55
	Gennemsnit af I-II-III ...	25	3.61	3.54	3.53	2.93	3.50	3.39	3.35	3.57	3.36	3.59	3.26	2.81
	- alle (a) .....	26	3.71	3.68	3.55	3.19	3.53	3.47	3.46	3.65	3.42	3.65	3.28	2.90
- - (b) .....		27	3.71	3.68	3.55	3.45	3.53	3.47	3.46	3.54	3.48	3.78	3.29	3.61

Vægtklasserne varede	Dage	I	28	49	44	46	43	44	43	44	40	43	47	46	44
—	—	II	29	37	32	32	31	33	30	30	33	33	37	34	33
—	—	III	30	26	26	29	29	30	29	28	31	32	31	26	24
	Sum...		31	112	102	107	103	107	102	102	104	108	115	106	101
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	32	130.0	135.0	129.3	135.0	133.8	132.5	134.0	139.5	136.5	131.3	136.5	131.5
	deraf Eksportflæk	—	33	107.0	111.5	106.3	111.7	110.8	108.3	110.5	114.0	112.5	105.3	113.0	107.5
	Hoved	—	34	9.4	8.8	9.7	9.6	9.5	9.2	9.8	10.2	9.7	9.8	9.8	9.9
	Flomme	—	35	3.3	4.3	3.4	2.7	2.9	3.9	2.8	3.9	2.8	4.1	2.4	3.8
	andet Affald	—	36	10.3	10.4	9.9	11.0	10.6	11.1	10.9	11.4	11.5	12.1	11.3	10.3
	Bovstykket	—	37	15.7	17.2	14.8	17.3	18.4	15.4	17.8	16.6	17.2	17.7	17.7	17.2
	Mellemstykket	—	38	26.3	29.5	22.4	27.7	27.5	25.0	26.7	27.3	26.2	25.8	29.3	27.5
	Skinkestykket	—	39	14.0	14.7	11.5	13.8	13.0	12.8	15.2	13.8	13.9	12.9	14.1	12.9
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	—	40	26.3	23.6	27.5	24.0	23.2	25.2	24.8	24.0	23.1	26.1	24.8	24.9
	andet Svind	—	41	13.1	13.3	12.9	13.2	13.3	13.7	13.2	13.9	13.5	14.6	12.9	13.7
	Eksportflæk	—	42	60.6	63.1	59.6	62.8	63.5	61.1	62.0	62.1	63.4	59.3	62.3	61.4
Tykkelse af	Rygflæk cm.	—	43	4.4	4.6	3.9	3.7	4.0	3.6	4.2	4.1	4.1	3.8	4.1	4.2
	Bugflæk —	—	44	3.1	3.1	2.6	3.1	3.5	2.9	2.7	3.2	3.1	2.8	2.8	2.6
Længde af Krop fra Hofteskål til	Snippet ved Halsen cm.	—	45	90.0	90.0	93.5	91.0	89.3	94.0	91.5	92.8	85.0	92.3	92.0	92.5
	forreste Ribben	—	46	71.8	70.0	72.8	71.3	69.8	73.8	71.8	72.5	68.0	72.3	73.3	72.0
	bageste	—	47	31.3	30.0	31.5	31.7	30.3	31.0	30.0	30.5	30.5	31.0	31.3	32.5
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	—	48	13.5	13.8	11.5	11.7	13.3	12.5	11.5	12.5	12.5	12.0	14.0	14.5
	Bovpartiet	—	49	11.8	12.3	11.5	12.0	12.0	12.0	12.0	11.8	12.0	11.3	12.0	11.5
	Rygflækets Tykkelse	—	50	11.8	11.8	11.3	13.0	12.8	13.3	12.5	13.0	11.0	13.0	12.3	12.5
	-- Fordeling	—	51	12.5	13.3	12.3	12.0	12.3	13.5	11.8	13.3	12.0	12.0	12.5	11.5
	Bugens Form og Fylde	—	52	13.0	12.5	12.0	14.3	13.8	12.0	10.5	13.5	12.0	11.7	11.5	11.5
	Skinkens Eorm og Størrelse	—	53	12.5	12.8	10.8	13.0	12.5	11.5	12.0	12.8	13.0	10.7	11.3	11.5
	Finhed af Hoved, Ben og Svar	—	54	12.8	12.8	11.8	13.0	13.0	11.5	10.8	11.3	14.0	10.3	12.8	12.5
	Totalindtryk	—	55	12.8	12.3	11.3	13.0	13.0	12.0	11.3	11.5	13.0	10.7	12.0	12.5
Kødfuldhed i hel Side	Kødfuldhed i hel Side	—	56	12.0	11.3	11.8	13.0	12.0	11.8	12.0	12.0	13.0	11.3	11.8	11.5
	i overskaaret Tilstand	—	57	12.0	11.0	11.0	13.0	11.0	11.0	13.0	12.0	11.0	12.0	12.0	11.0
Antal Dyr slagtet			58	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	4	2
— — udgaaet af Forsøget			59	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2
— — tilbagesendt til Avl			60	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr.			61	—	—	—	—	4	—	—	—	5	6	—	7

Rodstenseje Nr.	Linje	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	
Avlssted (se Hovedtabel 2) .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Antal { Galte .....	2	3	3	—	2	2	3	2	2	1	3	2	2	
Sør .....	3	1	1	4	2	2	1	2	2	3	1	2	2	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	19/8 09	23/8 09	23/8 09	2/9 09	5/9 09	6/9 09	11/9 09	23/9 09	18/9 09	30/9 09	30/9 09	30/9 09	
varede Dage .....	5	140	120	146	125	137	136	127	133	128	140	133	143	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	185	180	196	191	195	189	173	196	191	193	186	195	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	{	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	735.0	636.0	765.0	709.0	715.5	712.5	687.0	735.0	715.0	756.0	714.0 741.0
Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Vand .....	9	94	115	126	79	136	161	154	150	131	150	136	182	
— Korn, Majs o. l. ....	10	395.5	367.0	417.7	360.1	413.5	430.0	399.1	416.5	368.9	421.7	406.0	439.0	
— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Roeterstof .....	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Grøntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	518.0	473.0	545.2	478.3	532.7	548.7	513.6	539.0	488.1	547.7	525.0	562.5	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse Pd. (Slutning .. —	15	28.0	32.5	24.7	30.0	25.3	25.0	33.0	32.5	36.3	26.3	26.8	23.7	
Pd. Tilvækst {	17	151.0	144.7	153.8	143.3	151.5	155.0	145.8	149.0	141.3	151.5	150.0	152.8	
10 Dage af hele Forsøgstiden pr. Dyr i	18	10.8	12.1	10.5	11.5	11.1	11.4	11.5	11.2	11.0	10.8	11.3	10.7	
pr. 10 — fra 35—155 Pd ..	19	10.7	11.8	10.7	11.4	11.4	12.0	11.1	11.0	10.2	10.8	11.4	10.8	
F—E til 1 Pd. Tilvækst	{	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	2.34	—	2.74	2.86	2.52	3.00	—	—	2.44	2.57	2.76
— I (35—75 —)	21	2.78	2.67	2.96	2.81	3.10	2.87	3.00	3.09	2.86	3.01	2.77	2.94	
— II (75—115 —)	22	3.50	3.24	3.38	3.18	3.59	3.52	3.63	3.33	3.52	3.45	3.37	3.43	
— III (115—155 —)	23	3.79	3.68	3.90	3.14	3.82	3.78	3.52	3.93	3.71	4.16	3.97	4.45	
— IV (over 155 —)	24	4.10	3.76	4.57	4.25	—	4.47	4.33	4.39	3.89	4.46	4.58	4.57	
Gennemsnit af I—II—III ..	25	3.36	3.20	3.41	3.04	3.50	3.39	3.38	3.45	3.36	3.54	3.37	3.61	
— alle (a) ..	26	3.43	3.27	3.54	3.34	3.52	3.54	3.52	3.62	3.45	3.62	3.50	3.68	
— — (b) ..	27	3.43	3.27	3.54	3.68	3.52	3.54	3.52	3.62	3.42	3.62	3.50	3.68	

vægtklasserne varede Dage	I .....	28	45	43	45	42	46	42	46	46	47	45	42	45	
- - - II .....	29	36	32	37	36	33	32	37	34	40	34	33	33	33	
- - - III .....	30	31	27	30	27	26	26	25	29	31	32	30	33	33	
Sum...	31	112	102	112	105	105	100	108	109	118	111	105	111		
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen .....	Pd.	32	135.5	135.6	136.8	131.7	132.0	134.5	133.3	136.8	134.0	134.8	133.5	135.3
	deraf Eksportflæk .....	-	33	111.3	110.3	113.3	106.3	106.8	109.5	109.0	112.0	110.0	110.8	109.7	109.3
	- Hoved .....	-	34	9.4	10.5	10.0	10.3	10.2	9.8	10.1	10.6	10.4	9.8	9.3	10.6
	- Flomme .....	-	35	3.4	3.2	3.2	3.9	3.4	4.5	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	2.9
	- andet Affald .....	-	36	11.4	11.6	10.3	11.2	11.6	10.7	11.4	11.4	10.7	11.2	11.6	12.5
	Bovstykket .....	-	37	17.0	18.1	16.4	20.5	17.0	16.5	13.3	19.8	20.0	18.2	15.2	18.9
	Mellemstykket .....	-	38	30.8	26.4	25.0	25.3	24.3	25.3	27.6	28.0	26.8	28.5	25.7	25.5
	Skinkestykket .....	-	39	14.7	12.9	13.0	13.2	11.2	12.8	13.1	13.7	14.7	14.3	13.3	13.2
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind .....	40	24.3	25.3	23.4	24.3	25.3	25.3	25.5	24.7	24.9	24.2	24.5	23.4	
	- andet Svind .....	41	13.5	14.0	13.2	14.6	14.3	13.9	13.5	13.6	13.4	13.5	13.4	14.7	
	- Eksportflæk .....	42	62.2	60.7	63.4	61.1	60.4	60.8	61.0	61.7	61.7	62.3	62.1	61.9	
Tykkelse af	Rygflæk cm .....	43	4.1	4.1	3.7	3.7	4.1	4.1	3.9	4.1	4.2	4.0	4.1	4.1	
	Bugflæk - .....	44	3.2	2.6	3.1	2.9	2.7	2.8	2.8	2.7	3.0	2.8	3.0	3.2	
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snittet ved Halsen cm.	45	89.5	92.3	90.3	88.0	90.5	92.5	92.8	93.3	87.7	91.3	92.3	91.0	
	forreste Ribben	-	46	70.0	72.0	71.5	69.0	70.8	72.5	72.0	72.0	69.3	71.3	72.8	71.3
	bageste	-	47	30.8	30.0	30.0	30.0	29.8	29.8	29.3	30.5	29.3	30.5	29.8	31.5
Points (0-15) ved Bedømmelse af	Flæsket Fasthed .....	48	12.3	12.7	11.8	13.0	11.3	12.5	11.8	12.8	12.7	11.8	13.8	13.5	
	Bovpartiet .....	49	12.0	11.7	11.8	11.7	11.8	11.8	11.5	12.0	12.0	11.8	12.3	12.5	
	Rygflæskets Tykkelse .....	50	11.5	12.7	11.8	13.0	13.0	12.0	11.3	13.0	12.7	11.5	13.0	12.8	
	- Fordeling .....	51	12.0	11.0	11.8	11.7	13.0	12.5	12.5	12.5	12.7	12.8	13.3	13.0	
	Bugens Form og Fylde .....	52	12.8	10.7	12.3	11.7	11.0	10.8	11.5	10.5	12.3	12.5	12.5	13.8	
	Skinkens Form og Størrelse .....	53	13.0	11.7	12.5	12.7	10.8	10.0	11.0	12.0	12.0	11.5	13.0	13.0	
	Finhed af Hoved, Ben og Svær .....	54	12.0	13.0	12.0	13.3	8.8	12.3	8.8	11.5	13.0	12.0	13.5	12.5	
	Totalindtryk .....	55	12.0	12.0	12.0	12.7	10.0	11.3	9.8	11.8	12.7	11.3	13.3	13.0	
	Kødfuldhed i hel Side .....	56	12.0	11.7	13.0	11.7	11.8	11.5	11.3	12.0	12.0	12.8	12.5	12.8	
	- i overskaaret Tilstand .....	57	12.0	12.0	13.0	10.0	9.0	13.0	10.0	10.0	11.0	13.0	13.0	11.0	
Antal Dyr slagtet .....	58	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4		
- - udgaet af Forsøget .....	59	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		
- - tilbagesendt til Avl .....	60	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....	61	-	-	-	-	8	-	-	-	-	9	-	-	-	

Rodstenseje Nr.	Linje	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	
Avlssted (se Hovedtabel 2) .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Antal { Galte .....	2	1	2	4	3	3	3	2	3	4	2	2	2	
Sører.....	3	3	2	—	1	1	1	2	1	—	2	2	2	
Forsøget { begyndte Dag .....	4	27/9 09	27/9 09	18/9 09	7/10 09	7/10 09	7/10 09	7/10 09	7/10 09	10/10 09	14/10 09	14/10 09	14/10 09	
varede Dage .....	5	125	125	140	133	133	133	129	136	133	129	129	147	
Antal Dage fra Dyrenes Fædsel til gennemsnitlig Slagttid .....	6	173	171	196	186	183	182	192	186	180	185	184	198	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	660.0	660.0	756.0	693.0	693.0	682.5	661.5	703.5	694.5	703.5	672.0	756.0
Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Vand .....	9	157	154	140	177	119	150	175	164	157	182	161	175	
— Korn, Majs o. l. ....	10	409.0	392.4	401.5	408.3	400.2	404.3	423.5	423.5	419.8	432.3	406.0	444.5	
— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Roetørstof .....	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Græntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	519.0	502.4	527.5	523.8	515.7	518.0	533.7	540.7	535.5	549.5	518.0	570.5	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse (Slutning .. —	15	30.3	30.0	26.5	31.5	30.5	29.2	26.3	24.5	30.8	26.7	32.0	22.5	
Pd. Tilvækst {	17	148.2	148.0	147.3	149.7	147.7	148.8	161.0	151.8	149.0	150.8	145.0	155.8	
10 Dage af hele Forsøgstiden pr. Dyr i	18	11.9	11.8	10.5	11.3	11.1	11.2	12.5	11.2	11.2	11.3	11.2	10.6	
pr. Dyr i { 10 — fra 35—155 Pd. ..	19	11.7	11.7	10.7	10.7	11.1	10.8	12.2	11.3	11.2	11.8	11.0	11.2	
F—E til 1 Pd. Tilvækst	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	2.41	2.36	2.99	2.29	—	2.23	2.75	2.41	2.97	2.74	—	2.79
	— I ( 35—75 — )	21	2.80	2.89	3.14	2.52	2.87	2.98	2.83	2.92	2.82	3.03	2.96	2.87
	— II ( 75—115 — )	22	3.37	3.24	3.45	3.82	3.25	3.48	3.22	3.33	3.44	3.28	3.27	3.39
	— III (115—155 — )	23	3.92	3.86	4.08	3.86	3.71	3.92	3.54	4.33	3.97	4.12	4.11	4.30
	— IV ( over 155 — )	24	4.43	3.95	4.24	4.12	4.74	3.92	3.91	4.34	4.59	4.88	4.39	4.88
	Gennemsnit af I—II—III ..	25	3.36	3.33	3.56	3.40	3.28	3.46	3.20	3.53	3.41	3.48	3.45	3.52
	— alle (a).....	26	3.50	3.39	3.58	3.50	3.49	3.48	3.31	3.56	3.59	3.64	3.57	3.66
	— (b).....	27	3.50	3.39	3.54	3.57	3.49	3.48	3.31	3.56	3.59	3.64	3.57	3.66

Vægtklasserne varede Dage	I .....	28	43	44	47	43	47	47	43	43	44	42	48	43	
—	— II .....	29	31	31	34	40	33	34	30	31	33	30	31	32	
—	— III .....	30	29	28	31	29	28	30	25	32	30	30	30	32	
	Sum... .	31	103	103	112	112	108	111	98	106	107	102	109	107	
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen . . . . .	Pd.	32	131.0	131.0	130.0	135.0	135.0	132.5	138.0	131.5	134.3	130.3	134.8	136.5
	deraf Eksportflæsk . . . . .	—	33	107.0	108.3	105.3	110.0	111.7	109.3	113.0	108.3	109.8	105.0	110.8	111.5
	— Hoved . . . . .	—	34	9.6	10.3	10.0	9.6	9.1	9.6	10.4	10.0	10.2	10.0	9.9	9.8
	— Flomme . . . . .	—	35	3.5	2.2	3.2	3.2	3.3	3.0	3.1	2.5	3.1	3.3	3.2	2.8
	— andet Affald . . . . .	—	36	10.9	10.2	11.5	12.2	10.9	10.6	11.5	10.7	11.2	12.0	10.9	12.4
	Bovstykket . . . . .	—	37	18.0	15.1	18.0	17.0	17.7	17.5	18.9	—	18.0	17.7	19.0	21.2
	Mellemstykket . . . . .	—	38	25.4	23.7	26.3	24.9	29.5	26.8	29.7	—	27.0	22.0	28.5	28.0
	Skinkestykket . . . . .	—	39	14.0	11.8	12.7	13.9	13.2	13.2	13.5	—	14.5	13.7	14.5	14.0
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind . . . . .	40	27.0	26.4	25.0	25.4	24.4	25.6	25.9	25.4	25.3	24.7	23.9	23.4	
	— andet Svind . . . . .	41	13.3	12.8	14.2	13.8	13.1	13.0	13.4	13.2	13.6	14.6	13.5	14.0	
	— Eksportflæsk . . . . .	42	59.7	60.8	60.8	60.8	62.5	61.4	60.7	61.4	61.1	60.7	62.6	62.6	
Tykkelse af	Rygflæk cm. . . . .	43	4.2	4.1	3.6	3.7	4.1	4.0	4.4	4.4	3.9	4.0	3.8	4.0	
	Bugflæk — . . . . .	44	2.8	2.7	2.5	2.9	3.1	3.2	2.3	2.9	2.8	3.0	2.9	3.2	
Længde af Krop	Snittet ved Halsen cm.	45	94.3	91.8	94.0	91.0	91.0	91.5	94.7	89.3	92.5	89.7	90.8	92.0	
	forreste Ribben —	46	72.0	72.3	73.7	71.7	71.7	71.8	74.3	69.5	72.3	71.3	71.8	71.5	
	fra Hofteskål til bageste —	47	31.7	31.5	31.3	31.7	29.0	31.5	32.0	30.0	30.5	30.0	30.8	31.5	
Points (0-15) ved Bedem- melse af	Flæksets Fasthed . . . . .	48	12.0	12.0	10.3	11.7	13.7	11.5	10.3	14.5	10.8	12.3	11.0	13.5	
	Bovpartiet . . . . .	49	12.0	12.0	11.7	12.0	11.7	12.0	11.0	11.5	11.8	12.0	11.5	12.0	
	Rygflæksets Tykkelse . . . . .	50	11.3	12.3	12.3	13.3	12.7	13.0	11.3	11.5	13.0	13.7	12.5	12.8	
	— Fordeling . . . . .	51	11.3	13.0	13.0	12.3	13.3	13.0	12.3	12.5	13.0	11.7	13.0	12.8	
	Bugens Form og Fylde . . . . .	52	11.3	10.0	9.7	11.7	13.0	13.0	10.7	12.0	12.5	12.0	11.8	13.0	
	Skinkens Form og Størrelse . . . . .	53	11.7	12.3	10.3	14.3	10.7	12.5	12.0	12.8	12.0	11.3	12.0	12.8	
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	54	10.7	12.0	9.3	12.0	12.7	13.0	10.3	13.0	10.8	12.3	12.5	13.0	
	Totalindtryk . . . . .	55	11.0	12.0	10.3	12.0	12.0	12.8	10.7	13.0	11.5	12.3	12.5	13.3	
Kødfuldhed i hel Side	i overskaaret Tilstand . . . . .	56	11.0	12.0	12.0	12.7	12.7	11.8	12.3	12.5	12.5	11.3	12.5	13.0	
	— i overskaaret Tilstand . . . . .	57	11.0	9.0	10.0	10.0	11.0	13.0	11.0	—	12.0	12.0	9.0	12.0	
Antal Dyr slagtet . . . . .		58	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	
— udgaaet af Forsøget . . . . .		59	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
— tilbagesendt til Avl . . . . .		60	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. . . . .		61	—	—	10	11	12	13	—	—	—	14	15	—	

Rodstenseje Nr.	Linje	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148		
Avlssted (se Hovedtabel 2) .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Antal { Galte .....	2	1	3	2	2	3	2	3	2	4	2	—	1	1		
Sør .....	3	3	1	2	2	1	2	1	2	—	2	4	3	3		
Forsøget { begyndte Dag .....	4	18/10 09	18/10 09	19/10 09	11/11 09	11/11 09	11/11 09	11/11 09	18/11 09	18/11 09	25/11 09	9/12 09	20/12 09	1/1 10		
varede Dage .....	5	138	141	131	136	136	147	131	126	143	126	122	133	140		
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid .....	6	196	191	180	197	202	199	184	188	203	183	179	182	186		
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	{	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	714.0	724.5	699.0	714.0	730.5	735.0	705.0	672.0	777.0	693.0	672.0	735.0	766.5
		Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		— Vand .....	9	182	182	185	161	196	164	175	154	210	168	203	161	196
		— Korn, Majs o. l .....	10	426.2	433.8	431.2	427.0	444.3	432.2	423.0	405.1	473.4	411.2	429.6	430.5	462.0
		— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		— Røterstof .....	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		— Græntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	545.2	554.5	547.7	546.0	566.0	554.7	540.5	517.1	602.9	526.7	541.6	553.0	589.7		
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning .....	15	28.3	24.5	31.8	27.7	29.5	28.5	35.0	38.0	27.7	33.7	36.0	30.5	25.2		
	{ Begyndelse Pd.	16	180.8	176.8	177.8	182.5	186.3	179.0	178.5	179.0	182.5	175.5	182.3	175.8	187.0	
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden .....	17	152.5	152.3	146.0	154.8	156.8	150.5	143.5	141.0	154.8	141.8	146.3	145.3	161.8	
pr. Dyr i	10 Dage af hele Forsøgstiden .....	18	11.1	10.8	11.1	11.4	11.5	10.2	11.0	11.2	10.8	11.3	12.0	10.9	11.6	
	10 — fra 35—155 Pd....	19	11.0	11.5	11.2	11.4	11.5	10.3	10.8	10.6	10.8	11.0	11.3	11.0	11.9	
F—E til	{ Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	2.07	3.32	—	2.42	2.83	3.37	—	—	2.72	—	—	2.72	2.72	
1 Pd.	— I ( 35—75 — )	21	3.15	3.07	3.01	2.78	2.95	3.25	2.76	3.14	2.90	2.94	2.98	3.37	3.03	
Tilvækst	— II ( 75—115 — )	22	3.48	3.35	3.42	3.38	3.31	3.39	3.44	3.34	3.93	3.61	3.66	3.67	3.59	
	— III (115—155 — )	23	4.16	4.32	4.33	3.97	4.00	4.04	4.18	3.88	4.70	4.28	4.04	3.78	4.01	
	— IV (over 155 Pd.)	24	3.79	4.14	4.62	4.47	4.48	4.40	5.34	4.48	4.44	4.41	4.30	4.81	4.31	
	Gennemsnit af I—II—I <sup>III</sup> ...	25	3.60	3.58	3.59	3.38	3.42	3.56	3.46	3.45	3.84	3.61	3.56	3.67	3.54	
	— alle (a) .....	26	3.58	3.64	3.75	3.53	3.61	3.69	3.77	3.67	3.89	3.71	3.70	3.81	3.64	
	— — (b) .....	27	3.58	3.64	3.75	3.53	3.61	3.69	3.77	3.67	3.89	3.71	3.70	3.81	3.64	

Vægtklasserne varede	Dage	I .....	28	50	43	46	42	43	55	45	50	42	44	45	47	40
—	—	II .....	29	28	30	30	33	31	32	34	33	36	34	33	35	32
—	—	III .....	30	31	31	31	30	30	30	32	30	33	31	28	27	29
		Sum..	31	109	104	107	105	104	117	111	113	111	109	106	109	101
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen .....	Pd.	32	132.5	126.3	133.5	136.7	141.8	132.0	134.3	133.5	137.3	131.3	133.5	135.0	139.3
	deraf Eksportflæk .....	—	33	107.5	101.0	107.8	113.3	117.3	108.0	108.8	110.0	112.5	107.5	110.0	109.0	114.3
	— Hoved .....	—	34	9.9	10.2	9.8	9.6	10.3	9.6	10.1	9.7	9.7	9.6	10.1	9.7	9.3
	— Flomme .....	—	35	2.6	2.5	4.3	3.2	2.8	3.7	2.8	2.4	3.7	4.0	2.5	4.4	4.2
	— andet Affald .....	—	36	12.5	12.6	11.6	10.6	11.4	10.7	12.6	11.4	11.4	10.2	10.9	11.9	11.5
	Bovstykket .....	—	37	12.8	17.8	19.4	18.0	19.5	17.0	13.5	19.2	19.7	17.0	19.2	15.6	18.4
	Mellemstykket .....	—	38	25.4	25.7	28.4	30.0	26.0	28.0	27.9	26.7	31.1	28.8	26.5	27.0	29.5
	Skinkestykket .....	—	39	16.7	12.7	13.2	14.0	14.1	12.5	21.2	13.8	14.0	12.8	13.8	13.7	14.8
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind .....	40	26.7	28.6	24.9	24.8	23.9	26.3	24.8	25.4	24.8	25.2	26.8	23.2	25.5	
	— andet Svind .....	41	13.8	14.3	14.5	12.8	13.1	13.4	14.3	13.1	13.6	13.6	13.5	12.9	14.8	13.4
	— Eksportflæk .....,	42	59.5	57.1	60.6	62.4	63.0	60.3	60.9	61.5	61.6	61.3	60.3	62.0	61.1	
Tykkelse af	Rygflæk em. .....	43	3.6	3.7	4.0	4.4	4.1	3.9	3.6	3.8	4.8	4.1	3.6	4.9	4.7	
	Bugtfæk — .....	44	3.0	2.4	3.1	2.7	3.0	2.9	3.3	2.9	3.0	3.2	3.0	3.2	3.8	
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snittet ved Halsen em.	45	91.8	91.5	90.3	91.3	92.0	95.0	94.8	94.5	92.0	88.5	94.3	93.0	95.3	
	forreste Ribben .....	46	71.5	72.8	70.0	70.3	71.3	73.5	73.3	73.0	71.8	68.5	73.3	74.5	72.5	
	bageste — .....	47	30.3	30.8	29.8	31.3	30.3	30.3	29.0	31.3	30.0	30.0	31.0	31.0	32.3	
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed .....	48	12.8	13.5	13.5	11.0	13.8	12.3	11.8	12.5	12.8	13.0	13.0	12.8	13.5	
	Bovpartiet .....	49	11.8	12.0	11.0	12.7	12.0	11.8	12.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.0	11.8	12.3
	Rygflækets Tykkelse .....	50	12.8	13.3	12.0	11.7	13.5	13.8	12.3	13.3	11.3	12.0	11.5	11.3	11.8	
	— Fordeling .....	51	12.0	13.0	12.5	12.7	13.0	13.0	12.0	13.5	11.8	12.5	12.0	11.8	12.8	
	Bugens Form og Fylde .....	52	12.8	10.3	13.0	10.7	12.3	12.3	12.5	11.5	11.3	12.5	12.0	12.3	13.3	
	Skinkens Form og Størrelse .....	53	11.8	9.3	10.8	11.7	12.5	10.8	12.5	11.3	11.5	11.3	12.3	10.5	13.3	
	Finhed af Hoved, Ben og Svaer .....	54	11.5	11.0	12.5	11.7	12.8	12.3	13.3	11.3	12.5	12.3	12.3	11.3	13.5	
	Totalindtryk .....	55	11.5	11.0	11.8	11.0	13.0	12.0	12.5	11.8	11.8	11.8	11.5	11.5	12.8	
Kødfuldshed i hel Side .....	Kødfuldshed i hel Side .....	56	11.8	11.3	12.0	10.7	12.0	12.0	12.0	11.8	10.8	11.5	11.5	11.3	11.8	
	— i overskaaret Tilstand .....	57	11.0	11.0	10.0	12.0	11.0	13.0	10.0	13.0	10.0	12.0	12.0	9.0	11.0	
Antal Dyr slagtet .....		58	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
— — udgaaet af Forsøget .....		59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— — tilbagesendt til Avl .....		60	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....		61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	17	—

Rodstenseje Nr.	Linje	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161		
Avlssted (se Hovedtabel 2) .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Antal { Galte .....	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	4	2	2		
Sører .....	3	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	—	2	2		
Forsøget { begyndte Dag .....	4	$\frac{20}{1}$	10	$\frac{13}{1}$	10	$\frac{20}{1}$	10	$\frac{5}{2}$	10	$\frac{17}{2}$	10	$\frac{13}{2}$	10	$\frac{17}{2}$	10	
varede Dage .....	5	140	136	129	129	124	133	126	126	135	143	150	147	$\frac{17}{3}$	10	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtedid .....	6	199	202	178	181	205	186	183	189	188	199	206	188	182		
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	{	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk .....	7	756.0	745.5	682.5	682.5	687.0	745.5	684.0	693.0	714.0	714.0	766.5	756.0	651.0
Pd. Valle .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Vand .....	9	252	182	150	192	161	131	196	189	168	199	213	203	188		
— Korn, Majs o. l. ....	10	491.9	446.2	402.5	420.0	412.0	396.6	424.0	439.2	428.7	434.0	453.3	441.0	416.5		
— Oljekager .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
— Roetørstof .....	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
— Grøntfoder .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden .....	14	617.9	570.5	516.2	533.7	526.5	520.8	538.0	554.7	547.7	553.0	581.0	567.0	525.0		
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse Pd. (Slutning .. —)	15	29.0	28.0	23.3	24.0	32.0	25.0	25.2	31.8	26.0	23.5	25.0	21.0	34.5		
Pd. Tilvækst { Forsøgstiden .....	17	146.7	158.0	157.0	156.3	149.0	158.5	159.3	160.7	158.5	155.5	156.5	162.5	148.8		
pr. Dyr i { 10 Dage af hele Forsøgstiden	18	10.5	11.6	12.2	12.1	12.0	11.9	12.6	12.8	11.7	10.9	10.4	11.1	12.2		
pr. Dyr i { 10 — fra 35—155 Pd....	19	10.5	11.4	12.4	12.4	12.0	12.5	12.8	12.2	12.4	11.9	10.7	11.8	11.8		
F—E til 1 Pd. Tilvækst	{	Vægtklasse 0 (under 35 Pd.)	20	3.10	2.39	2.45	2.58	—	3.11	2.69	—	3.19	3.50	2.97	2.93	—
		— I (35—75 — )	21	3.23	3.11	2.78	3.08	2.89	2.66	2.94	3.20	2.87	3.08	3.04	3.01	2.90
		— II (75—115 — )	22	4.41	3.45	3.55	3.42	3.34	2.77	3.41	3.23	3.24	3.39	3.76	3.41	3.38
		— III (115—155 — )	23	4.81	4.11	3.58	3.66	3.80	3.19	3.67	3.45	3.72	3.83	4.05	3.65	4.02
		— IV (over 155 — )	24	4.90	4.10	3.59	3.84	4.47	5.04	3.76	3.93	4.27	4.09	4.42	4.32	3.96
		Gennemsnit af I—II—III....	25	4.15	3.56	3.30	3.39	3.34	2.87	3.34	3.29	3.28	3.43	3.62	3.36	3.43
		— alle (a) .....	26	4.21	3.61	3.29	3.41	3.53	3.29	3.38	3.45	3.46	3.56	3.71	3.49	3.53
		— — (b) .....	27	4.21	3.61	3.29	3.41	3.53	3.74	3.38	3.45	3.46	3.56	3.71	3.49	3.53

Vægtklasserne varede	Dage I .....	28	44	43	38	42	40	38	38	44	40	44	47	43	43
--	-- II .....	29	37	32	33	29	31	32	31	30	29	29	36	32	30
--	-- III .....	30	33	30	26	26	29	26	25	24	28	28	29	27	29
	Sum...	31	114	105	97	97	100	96	94	98	97	101	112	102	102
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen..... Pd.	32	130.7	140.3	134.8	131.5	136.3	138.5	136.3	141.3	142.3	133.3	135.8	138.3	138.2
	deraf Eksportflæsk..... —	33	107.7	114.8	111.3	106.0	111.6	112.0	112.3	114.0	117.3	109.7	111.3	114.5	114.2
	— Hoved..... —	34	9.3	11.0	9.0	10.0	9.5	11.0	9.4	11.0	9.1	9.7	9.3	9.3	9.2
	— Flomme .....	35	3.2	3.4	3.3	3.6	3.5	2.7	2.7	3.1	4.2	3.1	5.0	3.7	3.2
	— andet Affald .....	36	10.5	11.1	11.2	11.9	11.7	12.8	11.9	13.2	11.7	10.8	10.2	10.8	11.6
	Bovstykket..... —	37	13.0	12.0	18.2	16.0	13.8	18.0	18.5	18.5	12.7	17.7	17.4	18.4	13.6
	Mellemstykket .....	38	27.7	25.0	24.0	23.4	24.0	25.5	29.0	28.9	27.5	24.7	26.2	30.0	29.3
	Skinkestykket .....	39	17.7	20.0	13.3	12.7	18.0	13.5	15.0	15.2	17.8	13.0	13.0	13.0	19.6
	Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind .....	40	25.7	24.6	25.3	27.0	23.6	24.7	26.1	26.6	23.5	25.5	25.2	24.6	24.6
	— andet Svind .....	41	13.0	13.7	13.0	14.2	13.8	14.4	13.0	14.2	13.4	13.2	13.5	13.0	13.1
	— Eksportflæsk.....	42	61.3	61.7	61.7	58.8	62.6	60.9	60.9	59.2	63.1	61.3	61.3	62.4	62.3
Tykkelse af {	Rygflæk cm. ....	43	4.4	3.9	4.0	4.1	3.6	3.9	4.1	3.9	4.4	4.4	4.7	4.6	4.2
	Bugflæk — .....	44	2.8	3.3	2.9	2.8	3.3	3.3	2.9	2.8	3.2	3.0	2.8	3.4	2.9
Længde af Krop fra Hofteskaal til bageste	Snittet ved Halsen em.	45	95.0	95.8	96.5	94.5	93.7	93.5	98.5	98.8	95.3	94.5	93.5	93.8	95.0
	forreste Ribben —	46	73.0	74.5	73.0	74.5	70.3	76.0	76.3	78.0	75.7	74.0	72.3	71.8	75.8
	bageste —	47	28.3	30.5	30.5	28.8	30.7	31.0	32.0	33.8	32.3	31.0	30.8	30.5	32.2
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed .....	48	12.0	12.8	9.8	12.3	13.3	13.5	13.3	11.0	13.0	12.5	13.8	14.0	12.5
	Bovpartiet .....	49	12.0	11.8	11.8	12.0	12.0	12.0	12.0	11.8	12.0	11.8	12.3	12.0	12.0
	Rygflæskets Tykkelse .....	50	11.7	12.5	12.8	12.0	11.3	13.5	13.0	12.3	11.0	12.3	10.8	11.8	11.5
	— Fordeling .....	51	12.0	12.8	11.8	12.8	13.3	13.0	12.8	12.3	12.7	12.8	12.5	12.5	13.0
	Bugens Form og Fylde .....	52	10.3	12.8	10.3	12.0	13.0	13.0	12.3	10.8	13.3	12.0	10.8	13.3	12.5
	Skinkens Form og Størrelse ..	53	11.0	12.0	12.0	11.3	14.0	12.5	11.5	10.5	10.7	11.0	12.3	11.8	10.5
	Finhed af Hoved, Ben og Svar	54	12.0	12.3	11.8	11.5	12.3	12.5	12.5	8.0	12.0	12.0	13.0	12.8	13.0
	Totalindtryk .....	55	11.0	12.0	11.5	11.3	12.7	12.5	12.3	9.8	12.0	12.0	12.3	11.8	12.8
	Kødfuldhed i hel Side .....	56	12.0	11.5	12.0	11.5	13.7	12.0	11.8	11.8	12.7	11.5	11.5	11.8	12.3
	— i overskaaret Tilstand	57	11.0	10.0	9.0	10.0	14.0	11.0	12.0	12.0	13.0	11.0	12.0	8.0	13.0
Antal Dyr slagtet .....		58	3	4	4	4	3	2	4	4	3	4	4	4	4
— — udgaaet af Forsøget .....		59	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
— — tilbagesendt til Avl .....		60	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr. ....		61	18	19	—	20	—	21	22	23	—	24	—	—	—

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
76	1	3	25/1 1909	Godsejer Castenschiold, Ussinggaard pr. Løsning.	Ussinggaard I, f. 19/6 1905.	Nr. 68, f. 4/6 1906.	Stensballe II, f. i Marts 1904 paa Stensballe	Nr. 23, f. 1904.	Stensballe I, f. 18/3 1903 paa Stensballe.	Nr. 12, f. ?.
77	1	3	26/12 1908	Forp. Hansen, Thyrsbæk pr. Vejle.	Nr. 24, f. 10/12 1907.	Nr. 35, f. 3/10 1907.	Thorvald, f. 25/1 1906 i Boulstrup.	Nr. 24, f. 16/8 1905.	Thorvald, f. 25/1 1906.	Nr. 25, f. 1/6 1906.
79	2	2	5/2 1909	Proprt. Borup, Holmgaard pr. Skals.	Nr. 5, Holmgaard, f. 1/9 1907 paa Holmgaard.	Nr. 27, Trine, f. 4/2 1908 paa Holmgaard.	Brorstrup, f. 6/5 1905 paa Brorstrupgaard	Nr. 5, Tamma, f. 22/9 1905 paa Holmgaard	Rask, f. 2/1 1907 i Honum. Stbg. Nr. 224.	Nr. 22, True, f. 4/9 1906 paa Holmgaard.
80	2	2	25/2 1909	Proprt. N. Jepsen, Søgaard pr. Vamdrup.	Høvding Søgaard, Stbg. Nr. 169.	Nr. 10, f. 16/8 1905 paa Søgaard.	Stambul I, Stbg. Nr. 132.	Stamsø Nr. 1 paa Aalsbogaard pr. Geilsted, f. 14/8 1904.	Boulstrup Søgaard, Stbg. Nr. 88.	Nr. 6, f. 0/8 1903 paa Søgaard.

81	2	2	$\frac{1}{2}$ / 2 1909	Gmd. Knud Rasmussen, Raarup, Gramrode.	Thor, f. i April 1907 i Sønderby.	Nr. 2, f. $\frac{10}{5}$ / 5 1907 i Raarup.	En Orne hos P. Sørensen i Sønderby	En So hos P. Sørensen, Sønderby.	Skovlund, tillagt hos J. J. Jensen, Skovlund.	Nr. 36, f. ?.
82	2	2	$\frac{27}{2}$ / 2 1909	Grdjr. N. O'sen, Vrinders, Rønde.	Turban, f. $\frac{1}{3}$ / 3 1907 i Rørth.	Nr. 8, Dose, f. $\frac{6}{12}$ / 12 1906. Stbg. Nr. 223.	Høvding III, f. $\frac{30}{5}$ / 5 1906. Stbg. Nr. 223.	Nr. 17, f. $\frac{2}{6}$ / 6 1906 i Rørth.	Nr. 127, f. $\frac{24}{8}$ / 8 1904 hos Kuur Rasmussen, Gylling.	Nr. 1, Gylling, f. $\frac{21}{2}$ / 2 1903 hos Kuur Rasmussen, Gylling.
84	1	3	$\frac{3}{3}$ / 3 1909	Proprt. P. Hjorth, Sydtoftegaard, Lundum.	Gylling V f. $\frac{28}{5}$ / 5 1907 Stbg. Nr. 212	Nr. 26, f. $\frac{20}{7}$ / 7 1907.	Gylling Kajbjergr, f. $\frac{12}{11}$ / 11 1905 Stbg. Nr. 140.	Nr. 126, f. $\frac{17}{9}$ / 9 1902 i Gylling Skov.	Varbjerg Nr. 4, f. 1906 hos P. Svendsen, Varbjerg.	Nr. 8, f. $\frac{22}{6}$ / 6 1904
85	2	2	$\frac{5}{3}$ / 3 1909	Enkefru Rasmussen, Vandamgaard, Vejen.	Fajstrup, f. $\frac{14}{3}$ / 3 1908 i Fajstrup.	Nr. 36, f. $\frac{10}{2}$ / 2 1908 paa Vandamgaard.	Gylling Toustrup, Stbg. Nr. 142.	Nr. 31, f. $\frac{10}{11}$ / 11 1903 i Fajstrup.	Høvding III f. $\frac{30}{5}$ / 5 1906 Stbg. Nr. 223.	Nr. 27 paa Vandamgaard, f. $\frac{27}{10}$ / 10 1905.
87	3	1	$\frac{21}{3}$ / 3 1909	Grdjr. Chr. Kjeldsen, Kastbjerg, Havndal.	Kastbjerg Skrødder, f. $\frac{25}{2}$ / 2 1907 Stbg. Nr. 217.	Indkøbt So, f. $\frac{1}{6}$ / 6 1907.	Skrødder, Stbg. Nr. 42.	Nr. 40, Amalia, f. $\frac{20}{2}$ / 2 1905 paa Kornumgaard.	?	?
88	1	3	$\frac{15}{3}$ / 3 1909	Grdjr. H. P. Villadsen, Drastrup, Aalborg.	Mathis, f. $\frac{14}{1}$ / 1 1907 Stbg. Nr. 200.	Nr. 1, f. $\frac{20}{6}$ / 6 1908 i Drastrup.	Grarup, f. $\frac{26}{1}$ / 1 1906 i Grarup.	Nr. 43, f. $\frac{12}{8}$ / 8 1905 i Honum.	Mads, Stbg. Nr. 33.	Nr. 7, f. $\frac{19}{5}$ / 5 1908 paa Enggaarden.
89	2	2	$\frac{25}{3}$ / 3 1909	Grdjr. Chr. Kjeldsen, Kastbjerg, Havndal.	Kastbjerg Skrødder, f. $\frac{25}{2}$ / 2 1907 Stbg. Nr. 217.	Nr. 6, f. $\frac{28}{3}$ / 3 1907.	Skrødder, Stb. Nr. 42.	Nr. 40, Amalia, f. $\frac{20}{2}$ / 2 1905 paa Kornumgaard.	Kastbjerg Essendrup,	Stamsø Nr. 4 fra Ac. i Faarup

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gate	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
90	1	3	24/3 1909	Grdr. H. Hessel-lund, Boulstrup, Boulstrup.	Mikado, f. 18/2 1907. Stbg. Nr. 220.	Nr. 33, f. 5/9 1907.	Aalsbogaard f. 1905. Stbg. Nr. 169.	Nr. 2 R. N. i Rud, f. 24/12 1902.	Hovding Bou-lstrup, Stbg. Nr. 141.	Nr. 17, Boulstrup, f. 16/7 1905.
91	2	2	27/3 1909	Grdjr. I. S. Jensen, Permelille, Samsø.	Labori II, f. 11/2 1908.	Nr. 4, Vallekilde, f. 10/11 1907.	Kai III, f. 10/4 1906, Stamorne i Tranebjerg.	Damgaard II, f. 9/12 1904.	Nordrup, født paa Ac. i Vallekilde. Stbg. Nr. 180.	Nr. 98, Stamso paa Ac. i Vallekilde.
93	1	3	24/3 1909	Grdjr. R. Kuur, Overballe, Ørting.	Kalif, f. 15/10 1907. Stbg. Nr. 215.	Nr. 18 Kis, f. 1/6 1908.	Høvding Honum, f. 17/9 1906. Stbg. Nr. 199.	Ung So, solgt til Brein-holm, f. 21/6 1906 i Overballe.	Gylling Skartved, f. 21/7 1906. Stbg. Nr. 214.	Nr. 15, Kamma, f. 2/7 1906.
94	1	3	9/4 1909	Forp. A. Sørensen, Holbæk Mølle, Allingaabro.	Bacon II, f. 5/11 1907. Stbg. Nr. 213.	Nr. 10, f. 28/8 1907.	Bacon, f. 18/7. 1906. Ø. Grønlund.	Nr. 23 i Hølken, f. 8/1 1907.	Bech, f. 2/9 1906 paa Kornumgaard.	Nr. 7, f.?
95	2	2	6/4 1909	Grdjr. J. P. Jensen, Røgen, Sporup.	Røgen Fabjerg, f. 15/6 1905, Stbg. 153.	Nr. 3, Astrid, f. 11/4 1904.	David II, f. 30/5 1904 paa Kornumgaard.	Nr. 1, Dagmar, f. 1904.	Feliks, f. i Toustrup.	Nr. 1, Amanda, f. 1/6 1902 i Røgen.
98	1	3	31/3 1909	Godsejer Castenschiold, Ussinggaard, Løsning.	Ussinggaard II, f. 4/6 1906.	Nr. 73, f. 19/11 1906.	Stensballe I, f. 18/2 1903, paa Stensballe.	So Nr. 12, f.?	Stensballe II, f. i Marts 1904 paa Stensballe.	Nr. 51, f.?

99	3	1	15/4 1909	Møller J. Chr. Østergaard, Tødsø Mølle, Nyksøbing M.	Tam, f. 19/5 1908 i Vesterhassing.	Nr. 1, Tuna, f. 20/7 1907, i Tødsø Mølle.	Dons, f. 14/10 1906 paa Kornumgaard.	Nr. 121, Dagmar, f. 1903 i Vesterhassing.	Toke, f. 5/12 1905, Stbg. 136.	Nr. 27, Trutte, f. 18/5 1903 i Tødsø Mølle.
100	3	1	27/4 1909	Proprt. N. Jepsen, Søgaard, Vamdrup.	Høvding Søgaard, Stbg. 169.	Nr. 9, f. 16/8 1905, paa Søgaard.	Stambul I, Stbg. 132.	Nr. 1 paa Aalsbogaard, f. 1904.	Boulstrup Sø- gaard, Stbg. 88.	Nr. 6, f. 2/8 1903 paa Søgaard.
101	2	2	23/4 1909	Grdjr. J. Dinesen, Rørth, Odder.	Hølken, f. 18/2 1908.	Nr. 16, f. 27/6 1905.	Mikado, f. 18/2 1907. Stbg. Nr. 220.	Nr. 10, f. i Hølken den 18/3 1905.	Gylling Rud, Stbg. Nr. 12.	Nr. 6, f. 24/6 1903.
102	1	3	8/5 1909	Grdjr. M. Sørensen, Bredal, Hedensted.	Faistrup Enggaard, f. 20/11 1906 i Faistrup.	Nr. 79, f. 9/3 1908.	Frode, f. 5/11 1905 Stbg. Nr. 218.	Nr. 25 i Faistrup, f. 20/9 1905.	Klaus, Stbg. 159.	Nr. 72, Bine, f. 14/5 1905.
105	1	3	15/5 1909	Proprt. N. Jepsen, Søgaard, Vamdrup.	Høvding Søgaard, Stbg. 169.	Nr. 8, f. 15/9 1902 i Rud.	Stambul I, Stbg. 132.	Nr. 1 paa Aalsbogaard, f. 1904.	Torstenæs Rud, Stbg. Nr. 97.	Nr. 125 i Rud, f. ?
106	1	3	28/5 1909	Gmd. M. Ebbesen, Sødalgaard, Ejstrup.	Rud Fovslet, f. 11/10 1907.	Nr. 28, f. 17/5 1907.	Peder Rud, født?	?	Scharles Sødalgaard, Stbg. Nr. 145.	Nr. 12, f. 28/8.
107	2	2	25/5 1909	Grdjr. N. Jepsen, Søgaard, Vamdrup.	Høvding Søgaard, Stbg. 169.	Nr. 4, f. 11/10 1907 paa Fovsletgrd	Stambul I, Stbg. 132.	Nr. 1 paa Aalsbogaard. f. 1904.	Peder Rud, f. ?	Nr. 11, født paa Fovsletgaard.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gæte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfар	Mormor
109	3	1	26/6 1909	Gmd. N. Nielsen, Nebbegaards Mark, Børkop.	Gaardslev, f. 22/4 1908, Stbg. Nr. 216.	Nr. 16, f. 25/10 1906.	Nr. 21, Admiral, f. 8/8 1906. Stbg. Nr. 234.	Nr. 12 i Rud, f. 7/9 1905.	Taarupgaard, Stbg. 158.	Nr 11, f.?
110	2	2	26/6 1909	Proprt. Møller, Kornumgaard, Brønderslev.	Arif, f. 25/10 1906, Stbg. Nr. 205.	Nr. 31, Asra, f. 8/2 1907 paa Kornumgaard.	Høvding Boul- strup, Stbg. Nr. 141.	Nr. 10 i Hølken, f. 18/3 1905.	Skiøder, Stbg. 42.	Nr. 21, Angelise, f. 25/1 1901
111	3	1	29/6 1909	Plantør Nielsen, St Hoverdal pr. Tim.	Stambul Hoverdal II, f. 22/5 1908	Nr. 6, f. 17/4 1908 i Hoverdal.	Stambul Hoverdal, f. 10/5 1907	Nr. 5, f. 11/9 1906 paa Holmgaard.	Stambul Hover- dal, f. 19/5 1907 paa Grønlund.	Nr 3, f. 21/9 1905 paa Hoverdal.
112	3	1	5/7 1909	Forp. A. Chr. Sørensen, Holbæk Mølle, Allingaabro.	Orne, f. 28/8 1908 i Ac. Hadsten.	Nr. 12, f. 12/9 1908.	Kavaller, f. 8/12 1905 paa Langskov Møllegaard.	Alfa, f. 18/8 1905.	Sokrates, Stbg. 139.	Nr. 5, f. 4/9 1909.
113	3	1	24/8 1909	Proprt. Borup, Holmgaard pr. Skals.	Rask, f. 2/1 1907 Stbg. Nr. 224.	Nr. 7, Tommassine, f. 22/9 1905 paa Holmgaard.	Grarup Hunum, f. 26/1 1906 i Grarup.	Nr. 40, f. 11/8 1905	Nr. 10, Major, Stbg. 37.	Nr. 18, f. 11/10 1902 paa Holmgaard.
115	2	2	28/6 1909	Forp. A. Chr. Sørensen, Holbæk Mølle, Allingaabro.	Bacon II, f. 5/11 1907 Stbg. Nr. 213.	Nr. 8, f. i August 1908 paa Holmgaard	Bacon I, f. 18/7 1906, Ø. Grønlund.	Nr. 23, Stamso i Hølken, f. 8/1 1907.	Nr. 10, Major, Stbg. 37.	Nr. 11 paa Holmgaard, f.?

116	2	2	9/7 1909	Grdjr. S. Petersen, Grarup pr. Brande.	Blegind Grarup, f. 3½/2 1907 i Blegind.	Nr. 19, f. 3/7 1906.	Karl Blegind, Stbg. 152.	Nr. 37, Mette, i Blegind, f. 20/5 1905.	Grarup, Dørslund, Stbg. 150.	Nr. 9, f. 16/2 1902 i Hover.
117	3	1	15/7 1909	Grdjr. H. Hessellund. Boulstrup pr. Boulstrup.	Mikado, f. 18/2 1907. Stbg. Nr. 220.	Nr. 25, f. 8/10 1906.	Aalsbogaard, f. 1905. Stbg. Nr. 169.	Nr. 2, R, i Centret, Rud, f. 24/12 1902.	Moseholm, f. 12/11 1905 i Hølken.	Nr. 19, f. 25/9 1905.
118	2	2	27/7 1909	Grdjr. Rask, Thorning Vestergaard pr. Kellerup.	Lange, f. 9/10 1906 Stbg. Nr. 227.	Nr. 9, Dagmar, f. 30/8 1907 i Thorning.	Uff, f. 10/3 1904.	Nr. 20, Britta, paa Syvhøj- gaard.	Bjerre, f. 15/6 1905 i Fabjerg.	Nr. 6, Magda, f. 10/6 1903 i Thorning.
119	2	2	22/7 1909	Grdjr. Knud Rasmussen, Raarup, Gramrode.	Skovlund, f. i Januar 1906.	Nr. 36, f. i April 1904.	Orne hos Jørgen Jensen, Lundgaard, indk. fra Stens- balle Svineavls- forening.	So hos J. Jensen, Lundgaard.	Hans, f.? hos A. E. Ras- mussen, Tebstrup.	Stamso Nr. 31, f. 1901 i Raarup.
120	1	3	18/7 1909	Godsejer Castenschiold, Ussinggaard, Lønsning.	Ussinggaard II, f. 4/6 1906.	Nr. 55, f. 1905.	Stensballe I, f. 18/2 1903.	Nr. 12, f. ?	Stensballe II, f. i Marts 1904.	Nr. 50, f. ?
121	2	2	8/8 1909	Grdjr. P. Jørgensen, Moselund, Jelling.	Nr. 24, Klaus.	Nr. 5.	Baldur Jelling, f. 15/9 1905.	Nr. 24, hos M. Jensen, Jelling.	Baldur, Jelling, f. 15/9 1905.	Nr. 1, Mille, f. 27/12 1904.
122	2	2	8/8 1909	Grdjr. M Basse, Blegind pr. Hørning.	Knud, f. 29/9 1906 i Bredal.	Nr. 42, f. 11/9 1907.	Klaus, Stbg. 159.	Nr. 66, f. 27/12 1907, i Bredal.	Moseholm, f. 24/4 1906.	Nr. 37, f. 28/5 1905.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gæte	Søster			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
124	1	3	10/8 1909	Grdj. R. Knur, Overballe, pr. Ørting.	Kalif, f. 15/10 1907. Stbg. Nr. 215.	Nr. 14, Mille, f. 19/11 1905.	Høvding Ho- num, f. 17/9 1906. Stbg. Nr. 199.	Ung So, f. 21/6 1906 i Overballe.	Gylling, Bou- strup, Stbg. 55.	Nr. 126, f. 17/9 1902 i Gylling Skov.
125	2	2	12/8 1909	Grdj. I. Dinesen, Rørth, Odder.	Rørth, f. 18/8 1908.	Nr. 23, f. 24/11 1906.	Kalif, f. 15/10 1907. Stbg. Nr. 215.	Ung So paa Ac. i Gylling.	Taarupgaard- Rørth, Stbg. 157.	Nr. 16, f. 27/6 1905.
126	4		22/7 1909	Grdj. H. P. Vil- ladsen, Dra- strup, Aalborg.	Mejer, f. 23/7 1908 Stbg. Nr. 204.	Nr. 12, f. 23/7 1908 i Drastrup.	Nyland, f. 8/10 1906. Stbg. Nr. 198.	Nr. 64, Nora II, f. 1/9 1905.	Mathis, f. 14/1 1907, Stbg. Nr. 200.	Nr. 7, f. 5/10 1905.
127	3	1	15/8 1909	Grdj. Joh. Niel- sen, Ø. Grøn- lund pr. Ølgod.	Ølgod Stambul, f. 1/11 1907 paa Aalsbo- gaard.	Nr. 12, f. 25/10 1907 i Ø. Grønlund.	Nr. 21, Admiral. Stbg. Nr. 284.	Nr. 1, f. 19/8 1904 paa Aalsbo- gaard	Stambul I, f. 16/8 1904, Stbg. Nr. 132.	Nr. 4, f. 19/2 1905, Aadum.
128	3	1	18/8 1909	Grdj. P. Laur- sen, Buddum pr. Skelund.	Nyland, f. 8/10 1906. Stbg. Nr. 198.	Nr. 67, Nelly, f. 2/1 1906 i Buddum.	Moseholm, f. 12/11 1905 i Hølken.	Nr. 19, f. 25/9 1905. i Boulstrup.	Nogi, Stbg. Nr. 38.	Nr. 58, Ninca, f. 14/10 1901.
129	3	1	19/8 1909	Grdj. H. Bjerre, Overgaard, Lemvig.	Stambul I, Stbg. 182.	Dine III, f. 25/7 1904 i Fabjerg.	Gylling Boulstrup, Stbg. 14.	Stamso i Boulstrup.	David I, Stbg. Nr. 85.	Dagmar I, f. 1901 i Hurup.
130	2	2	5/8 1909	Grdj. P. Borup, Sinesminde pr. Gistrup.	Flink, f. 10/2 1908, Stb. Nr. 219.	Nr. 8, f. 11/9 1908 i Gistrup.	Høvding III, f. 1906. Stbg. Nr. 223.	Nr. 27, Stamso paa Vandamgaard.	Mads Gistrup, f. 20/10 1906 i Drastrup.	Nr. 2, f. 2/7 1905.

131	3	1	18/8 1909	Grdjr. Chr. Poulsen, Skinnerup pr. Thisted.	Hillerslev- Høvding,	Haabet Nr. 11, f. 8/9 1907 i Skinnerup.	Høvding Honum, f. 17/9 1906. Stbg. Nr. 199.	Nr. 31 i Honum.	Thy, f. 8/9 1906 paa Kornum- gaard.	Bertha, f. 8/9 1905.
132	4		24/8 1909	Møller L. Ringgaard, Refsbøl pr. Hurup.	Jacob, Stbg. 133.	Nr. 2, f. 8/12 1907 i Hurup.	Skrøder, Stbg. 42.	Nr. 101, Sara, paa Brorstrup- gaard, f. 3/5 1903.	Klaus, f. 24/11 1905 i Drastrup.	Nr. 17, Gimring, f. 5/9 1905 paa Holmgaard.
133	2	2	23/8 1909	Grdjr. L. Bak, Vester-Hassing pr. V.-Hassing.	David, f. 8/4 1908 Stbg. Nr. 207.	Nr. 126, Dina, f. 19/1 1906 i Vester- Hassing.	Gylling Toustrup, f. 12/7 1905, Stbg. 142.	Nr. 25, Facinette i Faistrup, f. 20/9 1905.	Darum, f. 20/4 1905 i Fræer.	Nr. 124, Dora, f. 21/4 1904.
134	2	2	20/8 1909	Grdjr. H. Chri- stensen, Honum Rask Mølle.	Blok, f. 15/11 1907. Stbg. Nr. 209.	Nr. 59, f. 25/7 1907.	Rud Kollerup, Stbg. 156	Nr. 43, f. 12/8 1905.	Grane, f. 30/7 1906.	Nr. 50, f. 15/7 1906.
136	1	3	21/8 1909	Propr. Krog-Meyer, Brorstrupgaard pr. Nørager.	Buddum, f. 20/11 1908.	Nr 1, f. 26/7 1907 paa Brorstrup- gaard.	Nyland, f. 8/10 1906. Stbg. Nr. 198.	Nr. 74, Norrie, f. 8/8 1907 i Buddum.	Solon, f. 12/2 1906, Stbg. 135.	Nr. 114, Stella, f. 25/1 1905.
137	3	1	29/8 1909	Propr. Krog-Meyer, Brorstrupgaard pr. Nørager.	Buddum, f. 20/11 1908.	Nr. 2, f. 26/7 1907 paa Brorstrup- gaard.	Nyland, f. 8/10 1906. Stbg. Nr. 198.	Nr. 74, Norrie, f. 8/8 1907 i Buddum.	Solon, Stbg. 135.	Nr. 114, Stella, f. 25/1 1905.
138	2	2	31/8 1909	Grdr. P. Mikkel- sen, Braa Mark pr. Braaskov.	Faks, f. 22/12 1907. Stbg. Nr. 210.	Nr. 6, f. 4/10 1907.	Rud Kollerup, Stbg. 156.	Nr. 40 i Honum, f. 11/8 1905.	Vejby i Rørth.	Nr. 4, i Rørth, f. i Okt. 1904.
139	2	2	11/9 1909	Grdjr. S. Laur- sen, Tendrup, Aagaard pr. Hornslet.	Honum Aagaard, f. 10/1 1908.	Nr. 8, f. 17/9 1907.	Høvding Honum, f. 17/9 1906. Stbg. Nr. 199.	Nr. 54, f. 14/1 1907 i Honum.	Orne fra Brorstrup- gaard, f. 24/10 1905.	Nr. 2, Boulstrup, f. 2/9 1905.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gate	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
141	2	2	20/9 1909	Grdr. A. Andersen, Kollerup Mølle, Lundum.	Kollerup Enner, f. 1/10 1907 i Enner.	Nr. 28, f. 31/12 1908.	Rud. Kollerup, Stbg. 156.	So fra Enner, indkøbt fra Sydtoftegaard.	Rud. Kollerup, Stbg. 156.	Nr. 10, f. 1/11 1905.
143	2	2	17/9 1909	Grdjr. H. Johnsen, Essendrup pr. Laurberg	„Esser“, f. 28/7 1908.	Nr. 28 Narf, f. 27/10 1907.	Nyland i Bud-dum, f. 8/10 1906. Stbg. Nr. 198.	Nr. 64. Nora II i Buddum, f. 1/3 1904.	Høvding, Stbg. 73.	Nr. 18 Musse, f. 23/9 1904.
144	4	»	19/9 1909	Forp. Hansen, Thyrsbæk pr. Vejle.	Charles, Stbg. 145.	Nr. 31. f. 14/8 1906.	Gylling, Boulstrup. Stbg. Nr. 14.	Nr. 6 i Boulstrup, f. 25/11 1901.	Trymer II paa Thyrsbæk,	Nr. 25 paa Thyrsbæk, f. 1/6 1905.
145	2	2	29/9 1909	Grdr. J. J. Lindholm, Hover pr. Vejle.	Karlsen, f. 26/2 1908.	Nr. 34, f. 24/8 1908.	Kam, Stbg. 155.	Nr. 28 Kina II, f. 18/11 1905.	Kam, Stbg. 155.	Kamilla, f. 25/6 1906.
146	»	4	13/10 1909	Skovfoged Rasmussen, Toustrup	Frode, f. 5/11 1905. Stbg. Nr. 218.	Nr. 6 Gerda, f. 29/6 1906.	Skrødder, Stbg. 42,	Nr. 106, f. 1903 paa Brørstrupgaard.	Gylling Toustrup, Stbg. 142.	Nr. 1, f. i Juli 1904.
147	1	3	11/11 1909	H. Christensen, Honum, Rask Mølle.	Blok, f. 15/11 1907. Stbg. Nr. 209.	Nr. 48, f. 1/8 1906.	Rud. Kollerup, Stbg. 156.	Nr. 43, f. 12/8 1905.	Taarupgaard, Stbg. 166.	Nr. 16 paa Holstenhus, f. 12/8 1905.
148	1	3	21/11 1909	Grdjr N. Kuur, Karensminde pr. Ørting.	Eskildstrup, f. 25/12 1908.	Nr. 19, f. 17/8 1908.	Eskild Wiking fra Eskildstrup, f. 19/2 1907. Stbg. Nr. 245.	Ruder Dame, f. ?	Gylling Kajbjerger, Stbg. 140.	Nr. 12, f. 9/2 1905.

149	3	1	22/11 1909	Grdjr. E. Lind, Skartved pr. Kolding.	Nr. 9, f. 7/11 1904.	Nr. 19, f. 20/11 1906.	Jørgen Skartved, f. 29/6 1901, Stbg. Nr. 65.	Nr. 1, f. 4/12 1902.	Rud Kollerup, f. 7/9 1905. Stbg. Nr. 156.	Nr. 12, f. 9/2 1905.
150	2	2	8/11 1909	Godsejer Castenschiold, Ussinggaard pr. Løsning.	Ussinggaard III., f. ?	Nr. 72, f. 12/11 1906.	Stensballe II, f. i Marts 1904.	Nr. 23, f. 1904.	Stensballe II, f. i Marts 1904.	Nr. 27, f. 1904.
151	2	2	2/12 1909	Grdjr. Krakov, Frøstrup pr. Lunde.	Honum Frøstrup,	Nr. 3.	Høvding Ho- num, f. 7/9 1906. Stbg. Nr. 199.	Nr. 56, Honum, f. 2/1 1907.	Gramrode Frøstrup,	Nr. 1.
152	2	2	13/12 1909	Proprt. Borup. Holmgaard, Skals.	Rask, f. 2/1 1907 Stbg. Nr. 224.	Nr. 22, f. 4/9 1906 paa Holmgaard.	Grarup Honum, f. 26/1 1906.	Nr. 40, Honum, f. 11/8 1905.	Brorstrup, f. 6/5 1905.	Nr. 7. Tommassine, f. 22/9 1905.
155	2	2	18/12 1909	Enkefru Rasmussen, Vandamgaard pr. Vejle.	Palle, f. 8/1 1909 i Vroue.	Nr. 42, f. 28/12 1905 paa Vandamgaard.	Rex, f. 1/2 1907 paa Brorstrup- gaard.	Nr. 2, f. 20/2 1907 paa Holmgaard.	Høvding III, f. 30/5 1906. Stbg. Nr. 223.	Nr. 30 Sonja, f. 24/3 1906 paa Vandamgaard.
156	2	2	10/12 1909	Grdjr. P. Chr. Kærgaard, Vroue pr. Skive.	Rask Vroue, f. 22/1 1909 Stbg. Nr. 229.	Nr. 3, f. 20/2 1907 paa Holmgaard.	Høvding Honum, f. 7/9 1906. Stbg. Nr. 199.	Nr. 56 f. 2/1 1907.	Brorstrup paa Holmgaard f. 6/5 1905.	Nr. 7 Tommassine, f. 22/9 1905 paa Holmgaard.
157	2	2	8/1 1910	Grdjr. P. Laur- sen, Buddum Skelund.	Nyland, f. 8/10 1906. Stbg. Nr. 198.	Nuka, Nr. 71, f. 18/2 1907.	Moseholm, f. 2/11 1905 i Hølken.	Stamso Nr. 19 i Boulstrup.	Napoleon, f. 16/3 1906. Stbg. 137.	Nr. 64, Nora II, f. 1/9 1905.
158	2	2	6/1 1910	Grdjr. J. P. Jensen Røgen pr. Sporup.	Kaj f. 5/12 1908 i Gylling Over- balle.	Nr. 14, Gate, f. 5/6 1907. Stbg. Nr. 198.	Gylling Skartved, f. 16/9 1906. Stbg. Nr. 214.	Nr. 15, Kamma, f. 21/6 1906 i Gylling Over- balle.	Røgen Hølken, f. 14/3 1906 i Hølken.	Nr. 7, Karen, f. 23/3 1906.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
159	4	0	20/1 1910	Grdjr. Rask, Thorning Vestergaard pr. Kellerup.	Blegind Thor- ning, f. 12/11 1908. Stbg. Nr. 231	Nr. 7, Pouline, f. 7/8 1905 paa Th Vester- gaard.	Knud, f. 29/9 1906 paa Centret i Bredal.	Nr. 30, Karen, f. 16/11 1905, Stamsø i Blegind.	Mads, Stbg. 164.	Nr. 2, Mine, . 10/6 1903 paa Gaardbogaard.
160	2	2	4/2 1910	Grdjr. A. Andersen, Kollerup Mølle, Lundum.	Maks, f. 17/8 1908 i Gylling Skov.	Nr. 30, f. 31/12 1908.	Gylling Kajbjerg. Stbg. 140.	Nr. 12 paa Centret Karenminde.	Rud Kollerup, Stbg. Nr. 156.	Nr. 10, f. 1/11 1905.
161	2	2	24/1 1910	Proprt. Møller, Kornumgaard pr. Brønderslev	Orne Nr. 26, f. 28/1 1909 paa Kornumgaard.	Nr. 1, f. 11/8 1908.	Arif, f. 26/10 1906. Stbg. 205.	Nr. 26, Adda, f. 2/4 1906.	Arif, f. 26/10 1906. Stbg. Nr. 205.	Nr. 23, Aurelia, f. 21/11 1905.

**Forsøgsdyrenes Afstamning.**  
**Krydsninger.**

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
92	2	2	2/4 1909	Konsulent Gommesen, Grøndalslund, Randers.	Hornbæk Svineavlsvor- enings York- shireorne fra Gaardbogaard.	Nr. 1, Tyksak, f. 1/4 1907 paa Kornumgaard.				
140	3	1	6/9 1909	Grdr. Chr. Pouls- sen, Skinnerup, Thisted.	Yorkshireorne fra Gaardbogaard.	Stamso Nr. 12 i Skinnerup.				
142	3	1	19/9 1909	Konsulent Gommesen Grøndalslund, Randers.	Yorkshireorne fra Gaardbogaard.	Landso, født paa Kornumgaard.				

**Forsøgsdyrenes Afstamning.**  
**Yorkshirerace.**

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gæle	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
78		4	12/2 1909	Proprt. Miller, Houmark, Randers.	Meirup, f. ?	Nr. 14, f. ?	Holywell Knudsbøl, f. 18/8 1905.	Sørine Spencer IV, f. 5/2 1905.	Ravndrup, f. ?	Nr. 8, f. ?
83	3	1	3/3 1909	Grdjr. J. Hind- kær, Mejrup, Holstebro.	Holywell Engegaard, f. 23/8 1907.	Sørine Spen- cer, IV., f. 5/2 1905.	Holywell, f. 14/1 1905.	Nr. 7, Bolka, f. 4/11 1903.	Sam II.	Søri Spencer, f. 8/11 1900.
86	1	3	12/3 1909	Grdjr. Ole Ve- stergaard, Houlkærgaard, Viborg.	Villo II, f. 10/5 1903.	Nr. 1, Komplet II, f. 24/9 1902.	Willo, paa Gaardbo- gaard.	Nr. 19. Sine, paa Gaardbo- gaard.	Adonis, f. 7/12 1897.	Komplet, f. 2/12 1898.
96			14/4 1909	Grdjr. S. Qvist, Korsdalsgaard, Børkop.	Basse, f. 8/5 1906.	Nr. 4, Haabet, f. 10/3 1906.	Wolton Spekulator, f. 1/5 1903.	Nr. 2, Skalbjerg, f. 5/6 1903.	Warren Wonder, f. 8/3 1905.	Susanne, f. 27/9 1904.
97	2	2	17/4 1909	Grdjr. J. Hindkær, Mejrup, Holstebro.	Holywell Engegaard, f. 23/8 1907 paa Engegaarden, Bornholm.	Nr. 9, Valborg, f. 21/11 1907 i Mejrup.	Holywell, f. 14/1 1905.	Nr. 7, Balka, f. 4/11 1903.	Holywell Knudsbøl, f. 18/8 1905 i Skalbjerg (Fyen).	Nr. 5, Valton Rosa, f. 5/11 1905 i Mejrup.

103	2	2	7/5 1909	Grdjr H Olsen, Bakkegaarden, Borris.	Jens Kongsted, f. 5/5 1906 i Kongsted.	Nr. 8, f. 10/7 1908 i Borris.	Varren Wonder, f. 8/3 1905 i England	Nilla, f. 22/7 1904 i Kongsted.	William, f. 16/12 1905, Gaardbogaard.	Nr. 2, f. 20/10 1904 i Kongsted.
104	2	2	11/5 1909	Grdjr. H. Gert- sen, Kongsted, Fredericia.	Warren Wonder, f. 8/3 1905.	Nr. 10, Stella, f. 4/6 1905.	Warren Ellipse, f. ?	Warren Leron, f. 10/3 1903.	Engegaard, f. 10/7 1902.	Nr. 3, Basta, f. 9/3 1902.
108	2	2	16/6 1909	Proprt. Rasmussen, Højrupgaard, Kolding.	Borris, f. 25/10 1906 i Borris.	Nr. 28, Kate, f. 9/10 1906 paa Højrupgaard.	Fritz Spencer, f. 15/11 1905 i Kongsted.	Vibekka Nr. 1, f. 18/6 1904 i Asmild.	Holywel Kongsted, f. 12/8 1900 i Skalbjerg (Fyen).	Nr. 16, Kate, f. 5/5 1904 paa Højrupgaard.
114		4	4/7 1909	Grdjr. Ole Ve- stergaard, Houlkægaard, pr. Viborg.	Nr. 6, f. 25/5 1908 i Asmild.	Holywell Kitting II, f. 25/5 1908 i Asmild.	Willo II, f. 10/5 1903 i Asmild.	Nr. 6. Hollywel Kitting, f. 16/1 1905 hos Sander Spencer.	Villo II, f. 10/5 1903 i Asmild.	Nr. 6, Holywel Kitting, f. 16/1 1905 hos Sander Spenser
123	2	2	22/8 1909	Forst. Møller Nørgaard, Vraa Højskole, pr. Vraa.	Engegaard III, f. 29/7 1907 i Kongsted.	Nr. 1, Asta, f. 27/9 1908.	Engegaard II, f. i Dec. 1905	Nr. 16, Ellen, f. 3/8 1906 i Kongsted.	Varren Vonder, f. 8/3 1905.	Nr. 18, Ingeborg, f. 28/6 1904.
135	2	2	24/8 1909	Grdjr. H. Olsen, Bakkegaarden, Borris.	William, f. 16/12 1905 paa Gaardbogaard.	Nr. 3, Jane, f. 20/10 1904, Kongsted.	Rob, f. 9/2 1904.	Sørine, f. 14/10 1902.	Holywel Flink, f. 6/8 1903.	Rebekka II, f. 9/8 1902.
153	2	2	15/11 1909	Brann direktør R. Rasmussen, Højrupgaard, pr. Kolding.	Borris II, f. 5/10 1908 paa Højrupgaard	Nr. 31, Kate, f. 18/7 1908 paa Højrupgaard.	Borris, f. 25/10 1906 i Borris.	Nr. 29, Kate, f. 9/10 1906.	Højrup Morsø, f. 11/11 1903.	Nr. 8, Kate, f. 1900.
154	1	3	26/12 1909	Grdjr. H Gert- sen, Kongsted, Fredericia.	Engegaard III, f. 29/7 1907.	Nr. 24, Julie, f. 7/8 1907.	Engegaard, II, f. 1905.	Nr. 16, Ellen, f. 3/8 1906.	Engegaard II, f. 1905.	Nr. 15, Dina, f. 8/8 1906.

## Bemærkninger til Hovedtabellerne.

---

Den sidste Linie i Hovedtabellerne indeholder Henvisninger til de Bemærkninger om Holdene, som er opført i Rækkefølge nedenfor:

### Bjernedegaard.

- Nr. 1. En So var i lang Tid syg og utrivelig. En anden So og en Galt viste sig ved Slagningen at have Tuberkler.
- 2. En Galt brækkede et Ben og maatte udgaa  $10\%$ , 1908.
- 3. Soen døde den  $24\%$ , 1908.
- 4. En So havde Tuberkler.
- 5. En So død  $31\%$ , 1908.
- 6. En Galt viste sig ved Slagningen at være »Halvorne«.
- 7. En So fik paa Slagteriet Bemærkningen »tynd«.
- 8. En Galt havde Tuberkler i Halskirtlerne.
- 9. En Galt døde faa Dage efter Modtagelsen.
- 10. En So blev som Avlsdyr sendt tilbage til Avlsstedet.
- 11. En Galt blev kasseret paa Slagteriet paa Grund af Bylder i Kropshulen.
- 12. En Galt havde Tuberkler.
- 13. En Galt døde faa Dage efter Modtagelsen.
- 14. To af Galtene havde Tuberkulose.
- 15. En Galt havde Lungetuberkulose.
- 16. En So havde Tuberkler.
- 17. En So havde Tuberkler.
- 18. Begge Sørerne blev som Avlsdyr sendt tilbage til Avlsstedet.
- 19. En So havde Tuberkler.
- 20. Galten døde  $10\%$ , 1908.
- 21. En Galt døde  $8\%$ , 1908.
- 22. En Galt havde Tuberkler.
- 23. En Galt havde Tuberkler.
- 24. En So blev som Avlsdyr beholdt paa Gaarden.
- 25. En So blev som Avlsdyr beholdt paa Gaarden.
- 26. En Galt viste sig ved Slagningen at være Orne.
- 27. Begge Sørerne blev som Avlsdyr beholdt paa Gaarden.
- 28. En Galt døde  $2\%$ , 1909.

- Nr. 29. Alle Dydrene havde Tuberkler.
- 30. En Galt døde  $^{10}/_3$  1909. En anden Galt havde Lungetuberkulose.
- 31. En Galt havde Lungetuberkulose.
- 32. En So brækket et Ben og slagtet  $^{14}/_4$  1909.
- 33. En So havde Tuberkler.
- 34. En Galt havde Tuberkler.
- 35. En So og begge Galtene havde Tuberkler.
- 36. En So død  $^{7}/_6$  1909.
- 37. Begge Søerne beholdtes paa Gaarden som Avlsdyr.
- 38. En So død  $^{15}/_6$  1909. En anden So og en Galt havde Tuberkler. Galten blev kasseret, af hvilken Grund Flæskets Fasthed ikke blev bedømt.
- 39. En So havde Tuberkler i Halskirtlerne.
- 40. En Galt døde  $^{28}/_4$  1909.
- 41. Galten døde  $^{25}/_2$  1909.
- 42. En Galt fik paa Slagteriet Bemærkningen »tynd«.
- 43. En af Galtene havde Tuberkulose.
- 44. En Galt slagtet paa Gaarden paa Grund af et brækket Ben. ( $^{25}/_8$  1910).
- 45. En Galt døde  $^{28}/_7$  1909. Den var hele Tiden meget utrivelig.
- 46. En af Galtene døde  $^{16}/_7$  1909.
- 47. En af Søerne døde  $^{3}/_6$  1909.
- 48. En Galt døde  $^{23}/_9$  1909. En So blev som Avlsdyr sendt tilbage til Avlsstedet.
- 49. En Galt døde  $^{15}/_7$  1909.
- 50. Galten viste sig ved Slagtningen at være Halvorne. En So havde særlig tyndt Rygflæsk.
- 51. Galten død  $^{29}/_7$  1909.
- 52. En Galt døde  $^{29}/_7$  1909. Soen havde Tuberkler.
- 53. En So havde Tuberkler.
- 54. En af Galtene døde  $^{7}/_{10}$  1909; en anden havde Tuberkler i Halskirtlen.
- 55. En Galt døde  $^{13}/_7$  1909. En anden Galt var stærkt angrebet af Eksem.
- 56. En So var i lang Tid syg af Bylder.
- 57. Galten havde Tuberkler i Halskirtlerne.
- 58. En So døde  $^{11}/_8$  1909.
- 59. En af Galtene havde Tuberkler i Halskirtlen, en anden havde Organotuberkulose i Lunge, Lever og Milt.
- 60. Soen beholdtes paa Gaarden som Avlsdyr og en af Galtene blev slagtet hjemme paa Grund af et brækket Ben.
- 61. En Galt død  $^{4}/_{11}$  1909; en So død  $^{27}/_1$  1910.
- 62. En So havde Tuberkler i Halskirtlen.
- 63. Galten døde  $^{22}/_{10}$  1909.
- 64. En So døde  $^{7}/_{10}$  1909.
- 65. De tre af Dydrene unormale mod Slutningen af Forsøget.
- 66. En So døde  $^{22}/_9$  1909.
- 67. Et Dyr død kort efter Ankomsten.
- 68. Soen døde  $^{7}/_{10}$  1909.

- Nr. 69. En Galt død  $\frac{16}{12}$  1909; den var meget utrivelig.  
 — 70. En Galt døde  $\frac{1}{12}$  1909.  
 — 71. En So blev ikke slagtet og bedømt paa Slagteriet som de øvrige.  
 — 72. Begge Søerne beholdtes paa Gaarden som Avlsdyr.  
 — 73. En So havde »Schweineseuche«.  
 — 74. En So havde Tuberkler i Krøskirtlerne.

### Elsesminde.

- 1. En So fik ved Bedømmelsen Bemærkningen: Rygflæsket lidt for tyndt.
- 2. En Galt fik Bemærkning: Rygflæsket for tykt, en So fik Bemærkning: Rygflæsket for tyndt.
- 3. En Galt sat ud af Holdet paa Grund af Utrivelighed den  $\frac{10}{3}$ . En So skød Endetarmen ud og maatte slagtes  $\frac{1}{5}$ . Den anden So var utrivelig og blev slagtet i Husholdningen  $\frac{21}{7}$ , 1908.
- 4. En Galt fik Bemærkningen: Rygflæsket lidt tyndt; en So fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt og Hoved, Svar og Ben meget grov.
- 5. Begge Søerne fik ved Bedømmelsen Bemærkning: Rygflæsket for tyndt.
- 6. En Galt sat ud af Holdet  $\frac{5}{6}$  paa Grund af Stivsyge; en So viste Symptomer til Stivsyge. Begge Søerne fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.
- 7. To af Søerne fik Bemærkning: Rygflæsket for tyndt.
- 8. To af Søerne fik Bemærkning: Rygflæsket lovlig tyndt.
- 9. Galten sat ud af Holdet  $\frac{7}{4}$ . Hele Holdet har øjensynlig været angrebet af Schweineseuche. En So fik Bemærkning: Rygflæsket lidt tyndt.
- 10. To af Søerne beholdtes paa Gaarden for at bruges som Avlsdyr, men da det viste sig, at de to, der sendtes til Slagteriet, vare tuberkuløse, blev de to tilbageholdte senere slagtede.
- 11. En So udsat  $\frac{21}{4}$ ; en Galt døde  $\frac{20}{5}$ . Den slagtede Galt fik ved Bedømmelsen Bemærkning: Rygflæsket for tykt.
- 12. En So fik ved Bedømmelsen Bemærkninger: Rygflæsket meget for tyndt og Hoved, Ben og Svar for grov.
- 13. Holdet manglede Ædelyst; et af Dyrene udsat  $\frac{2}{6}$  paa Grund af Sygdom. To af Dyrene fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.
- 14. En af Galtene døde  $\frac{10}{5}$ .
- 15. En Galt fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt. En So fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.
- 16. En Galt fik Bemærkningen: Rygflæsket lidt tykt.
- 17. En Galt udsat af Holdet  $\frac{30}{6}$  paa Grund af Utrivelighed.
- 18. En So fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt.
- 19. En Galt fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt. En So udsat  $\frac{30}{6}$  paa Grund af Utrivelighed.
- 20. En So død  $\frac{28}{7}$ . Den anden So og en Galt fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.
- 21. Soen død  $\frac{23}{8}$ ; blev sendt til Landbohøjskolen, hvorfra blev meddelt, at Dyret sandsynligvis havde lidt af »Schweineseuche«.

- Nr. 22. En So fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.
- 23. Holdet har tilsyneladende haft »Schweineseuche«. En So blev  $\frac{3}{4}$ , indsendt til Serumlaboratoriet.
- 24. En Galt og en So fik Bemærkningen: Rygflæsket lidt tyndt.
- 25. Holdet har lidt af »Schweineseuches«, dog i mindre Grad. En Galt havde Tuberkulose i Krøset og begge Søerne havde Tuberkulose i Halskirtlerne.
- 26. En Galt og en So fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.
- 27. En Galt fik Bemærkningen: tyk Nakke. En anden Galt fik Bemærkningen: Flæsket blødt.
- 28. En Galt fik Bemærkningen: Rygflæsket lidt tyndt.
- 29. En So beholdt paa Gaarden som Avlsdyr.
- 30. En Galt og begge Søerne fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.
- 31. Begge Søerne fik Bemærkningen: Rygflæsket lidt tyndt.
- 32. Et Dyr udsat af Holdet  $\frac{18}{5}$ , paa Grund af Sygdom.
- 33. En So tilbagesendt til Avlscentret som Avlsdyr.
- 34. En Galt død  $\frac{8}{4}$  1909; en So død  $\frac{4}{5}$  1909.
- 35. En So døde  $\frac{15}{5}$ , 1909; en Galt fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt.
- 36. To af Søerne fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.
- 37. En Galt død  $\frac{22}{4}$  1909; en So fik Bemærkningen: Rygflæsket alt for tyndt.
- 38. En Galt død  $\frac{15}{2}$  1909, en So død  $\frac{12}{3}$  1909. De slagtede Dyr fik ved Bedømmelsen Bemærkning om, at Lungerne havde været angrebne.
- 39. Den ene So fik Krampe og blev slagtet  $\frac{27}{9}$ , 1909; den anden So blev tilbagesendt til Avlscentret som Avlsdyr.
- 40. En So led af Stivsyge og viste sig ved Slagtningen at være tuberkuløs i Lunge, Lever og Krøs.
- 41. En Galt havde Tuberkulose i Halskirtlerne; en So blev tilbagesendt til Avlscentret som Avlsdyr.
- 42. En So død  $\frac{28}{3}$ , 1909 af Forgiftning.
- 43. En So fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt; en Galt fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt.
- 44. I anden Vækstperiode vare to af Dydrene daarlige og tabte i Vægt.
- 45. Soen havde Tuberkulose i Krøset.
- 46. To af Galtene fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt.
- 47. To af Galtene døde  $\frac{1}{6}$  1909; Soen var daarlig i 2den Vækstperiode og tabte i Vægt; den fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt; Galten fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt.
- 48. En So fik Knuder i Halsen og blev sat ud af Holdet  $\frac{21}{9}$ , 1909; en Galt fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt.
- 49. En So fik Bemærkningen: Rygflæsket lidt for tyndt; en anden So havde Tuberkulose i Halskirtlerne.
- 50. En Galt og en So fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt; en Galt havde Tuberkulose i Halskirtlerne.
- 51. En Galt havde Tuberkulose i Halskirtlerne.
- 52. En Galt havde Tuberkulose i Halskirtlerne.
- 53. To af Søerne fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.

- Nr. 54. En So døde  $\frac{2}{6}$  1909 af Bugløb.  
 — 55. Soen fik Bemærkningen: Rygflæsket lidt tykt.  
 — 56. Galten fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.  
 — 57. En So fik Bemærkningen: Rygflæsket lidt tyndt.  
 — 58. En So fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt; den anden So tilbageholdtes til Avl.  
 — 59. En So fik Bemærkningen: Rygflæsket lidt tyndt; en Galt fik Bemærkningen: Rygflæsket meget for tyndt.  
 — 60. En So var syg og blev slagtet  $\frac{11}{2}$  1910.  
 — 61. To af Dydrene fik Gemærkningen: Rygflæsket for tyndt.  
 — 62. En So havde Tuberkulose i Halskirtlerne.  
 — 63. En So led af Stivsyge og blev slagtet hjemme  $\frac{8}{3}$  1910. Den anden So fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt.  
 — 64. Soen fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.  
 — 65. En Galt led af Knuderosen; hele Holdet blev derfor for at undgaa Smitte sendt til Slagteriet, da Dydrene vejede 174 Pd. Begge Sørerne fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.  
 — 66. En Galt fik Bemærkningen: Rygflæsket lidt tyndt.  
 — 67. En Galt havde Tuberkulose i Halskirtlerne. En So tilbageholdtes til Avl.  
 — 68. En So død  $\frac{6}{11}$  1909; Galten havde Lungehindebetændelse og fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt; en So fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.  
 — 69. En Galt blev slagtet til Husholdningen.  $\frac{23}{3}$  1910. Slutningsvægt 161 Pd.  
 — 70. En So blev slagtet til Husholdningen  $\frac{26}{4}$  1910. Slutningsvægt 154 Pd. Begge Galte fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt.  
 — 71. En Galt var syg og blev slagtet  $\frac{22}{2}$  1910. Slutningsvægt 52 Pd. En So døde  $\frac{14}{5}$  1910.  
 — 72. En So død  $\frac{18}{1}$  1910.  
 — 73. Soen død  $\frac{20}{1}$  1910. En af Galtene havde Knæledsbetændelse og fik Bemærkningen: Rygflæsket for tykt.  
 — 74. Begge Sørerne fik Bemærkningen: Rygflæsket for tyndt.

### Rodstenseje.

- 1. En Galt udgik af Forsøget  $\frac{2}{9}$  1909 paa Grund af en Byld paa det ene Ben.
- 2. En So døde  $\frac{8}{7}$ , 1909.
- 3. En So udgik af Forsøget  $\frac{16}{9}$ , 1909 paa Grund af Utrivelighed.
- 4. En Galt udgik af Forsøget  $\frac{30}{9}$ , 1909 paa Grund af Utrivelighed.
- 5. En Galt døde  $\frac{19}{9}$ , 1909, formentlig af Lungebetændelse.
- 6. En Galt udsat af Forsøget  $\frac{14}{10}$  1909 paa Grund af Sygdom.
- 7. En Galt død  $\frac{14}{10}$  1909; Soen død  $\frac{9}{12}$  1909; begge vistnok af Lungebetændelse. En Galt viste sig ved Slagtningen at være tuberkuløs.
- 8. En Galt udgik af Forsøget  $\frac{20}{12}$  1909 paa Grund af Utrivelighed; ved Slagtningen viste det sig, at den led af Tuberkulose.
- 9. Galten død  $\frac{14}{10}$  1909.
- 10. Tre af Dydrene var Posegrise, et af dem i saa høj Grad, at det maatte slagtes  $\frac{28}{10}$  1909.

- Nr. 11. En Galt døde  $\frac{22}{11}$  1909, vistnok af Lungebetændelse.
- 12. En Galt død  $\frac{28}{10}$  1909.
- 13. Alle Dydrene viste sig ved Slagtningen at være tuberkuløse.
- 14. En Galt viste sig ved Slagtningen at have haft Lungebetændelse.
- 15. En So viste sig ved Slagtningen at være tuberkuløs.
- 16. To af Dydrene har haft Lungebetændelse.
- 17. En So og Galten viste sig ved Slagtningen at være tuberkuløs.
- 18. En Galt døde af Bughindbetændelse kort efter Ankomsten til Forsøgsstationen.
- 19. En Galt havde Bylder i Siden.
- 20. En Galt havde Lungebetændelse.
- 21. En So udgik af Forsøget  $\frac{81}{3}$  1910 paa Grund af Tarmbetændelse.  
En anden So udgik  $\frac{7}{7}$ , 1910 paa Grund af Utrivelighed.
- 22. En So havde Lungebetændelse.
- 23. En Galt havde Lungebetændelse.
- 24. En Galt havde Bylder.

## Avlscentrenes Løbe-Nr.

### Sjælland (Bjernedegaard).

Nr.		Nr.	
1.	Syvhøjgaard.	16.	Daastrup.
2.	Høve.	17.	Havrebjærg.
3.	Bryderupgaard.	18.	Ørslevunderskov.
4.	Kærhave.	19.	Thorslunde.
5.	Lundbytorp.	20.	Aagerup.
6.	Svendsbjærg.	21.	Lynge-Eskildstrup.
7.	Vindsebæk.	22.	Vedbbynørre.
8.	Lindersgaard.	23.	Staureby.
9.	Vilhelmshaab.	24.	Pollerupgaard
10.	Vangegaard.	25.	Remkolde.
11.	Vibede.	26.	Ambæk.
12.	Mødekær.	27.	Børregaard.
13.	Højby.	28.	Bjernedegaard.
14.	Gislinge.	29.	Ondløse Møllegaard.
15.	Vardegaard.	30.	Svendstrup.

### Fyn (Elsesminde).

Nr.		Nr.	
1.	Højrup.	9.	Lykkesborg.
2.	Elsesminde.	10.	Ravndrup Vænge.
3.	Sdr. Esterbølle.	11.	Torpe.
4.	Hjadstrup.	12.	Anhof.
5.	Rud.	13.	Holstenshus.
6.	Taarupgaard.	14.	Landkilde.
7.	Holmstrup.	15.	Aalsbogaard.
8.	Bregnør.		

### Jylland (Rodstenseje).

Se Stamtablerne Side 64.

## O v e r s i g t

over

### de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landekonomiske Forsøg udgaaede Beretninger.

- 1 (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavas Centrifuger. b. Skummingsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre.)
- Tillæg hertil\*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejeringaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
2. (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeren og ikke-centrifugeren Mælk. c. Forøgelse af centrifugeren Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre.)
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tanderup, Ravnholz (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladellundgaard. (50 Øre.)
4. 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Kør (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Kør med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
5. (21de fra N. J. Fjord). 1885. a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre.)
- 6\*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejeringer og dets Forsendelse med Jærnbane og Dampskibe. (50 Øre.)
- 9\*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter „Forskel i pCt. Fløde“ (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre.)
11. 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre.)
12. 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)
13. (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekør i Vinteren 1887—88. (50 Øre.)
- 14\*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof. Dr. med. Bang). (50 Øre.)
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
16. 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Kør og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof. Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)

17. (2de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekør: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 18\*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syning (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekør. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 21\*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvæggets Tuberkulose (af Prof. Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekämpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.)
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blanding af disse. (50 Øre.)
- 24\*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof. Dr. med. Bang).
25. 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof. Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tår Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekør (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre.)
- 28\*) 1893. Samlet Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.)
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekør (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre.)
30. 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvæxt, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.)
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre.)
32. 1895. Syrningsforsøg. (Sammenligning mellem Handelssyrevæktere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre.)
33. 1895. Anden samlede Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ (Fortsættelse af 28de). (50 Øre.)
34. 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekør 1887—1895. (75 Øre.)
35. 1896. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre.)
- 36\*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—96. (1 Kr.)
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesyge hos Hesten, II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen.) (50 Øre.)
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekør. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.)

40. 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
42. 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1895—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringss apparater. (1 Kr.)
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfodring (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen.) (50 Øre.)
45. 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekører (1898—99). Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.)
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer (1 Kr.)
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringss apparater (Fortsættelse af 43de Beretning) (1 Kr.)
48. 1901. A. Forsøg over Smørudhyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftning af den såde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre)
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jærnbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.)
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
53. 1902. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekører 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.)
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarynning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup. (50 Øre).
55. 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekører. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekører. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Reneskumpling ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mækerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
59. 1905. Indberetning til Landbruksministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekører. (2 Kr.)
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekørernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.)
61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.)
- 62\*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekørernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.)
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.)
- Extra 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge af Prof. Carl H. Hansen. (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre.)
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Professor B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkräutuberkebaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.)

67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Afskcentre. (1 Kr.)  
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.  
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jyske Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.)
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130° C.  
B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre.)
72. 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svineslagterierne, Undersøgelser over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltnings af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekør, I. Eorsøg med Mask, II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. (Nærværende Beretning). (1 Kr.)

Desuden foreligger 5 Aargange (1907—11) af Sammenligning mellem rødt dansk Malkekøvæg og Jersykøvæg paa Tranekjær.

---

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaar følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1\*) (1867). Varmegrad i det Indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
  2. (1868). Kogning i Hø (50 Øre).
  - 3\*) (1870). Kogning i Dampkogekedler.
  - 4\*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler
  - 5\*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
  - 6\*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
  - 7\*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
  - 8\*) (1876). do. do. (særlig Snekforsøg).
  - 9\*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
  - 10\*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
  11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug (50 Øre)
  - 12\*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger
  - 13\*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jærbanevogne. Varme i Dampsikbrisrum.
  14. (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge af Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning — den søde Mælk (50 Øre).
  - 15\*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Lavals) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
  16. (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Kør af forskellige Racer: A. Angelisk og jysk Race. B. Korthorns og jysk Race (50 Øre).
  - 17\*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedele: Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med \* mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).

---