

4de Meddelelse fra Statens Planteavlsudvalg

til Vejledning for Landbrugere.

Resultater af Forsøg over forskellige Kartoffelsorters Ydeevne.

Forsøgene ere udførte paa Statens Forsøgsstationer ved Askov, Lyngby og V. Hassing. Der er anvendt 15 à 20 Læs Staldgødning à 2000 Pd. paa Td. Ld. og Kartofflerne ere lagte med 1 Alens Afstand mellem Rækkerne og 1/2 Alen mellem Planterne.

Hovedformalet har været ved Forsøg med et stort Antal Sorter at finde de Sorter, der egne sig bedst til Dyrkning navnlig som Foderkartofler. At fremhæve enkelte Sorter som de bedste under alle Forhold lader sig selvfølgelig ikke gøre, men fremhæves kan det dog, at Richters Imperator, Blaa Kæmpe og Athene blandt nedenstaaende Sorter staar meget højt i Henseende til Ydeevne; af disse har Richters Imperator de største Knolde, er den bedste Spisekartoffel og den tidligste (se 5te Rubrik, hvor mg. t. = meget tidlig, t. = tidlig, md. t. = middeltidlig, s. = sildig og m. s. = meget sildig.)

Tallene ere for alle Stationer Gennemsnit af Forsøgsresultaterne for Aarene 1895—98.

Forsøgsstationen ved Askov. Lermarken.

Let lermuldet Jord med sandblandet Lerunderlag.

Kartoffelsortens Navn	Centner pr. Td. Ld.		Vægt pr. høstet Knold i Kvint	p/ct syge Knolde	Tidlig-hed
	Torstuf	Knolde			
Athene	77	354	14	3	m. s.
Blaa Kæmpe	70	355	19	1	m. s.
Professor Maercker	66	310	12	2	s.
Richters Imperator	64	298	15	4	md. t.
Champion	64	277	11	4	s.
Frigga	61	243	10	0	m. s.
Fürst v. Lippe	61	255	9	3	m. s.
Simson	61	255	8	2	m. s.
Rigskansler	60	252	7	0	m. s.
Wonder of the World	58	298	15	1	t.
Gul skotsk	54	249	9	2	md. t.
Edelstein	51	252	12	11	md. t.
Magnum Bonum	49	247	9	1	md. t.
Tidlig Rosen	43	227	11	8	mg. t.
Æggeblomme	41	202	8	9	mg. t.
Vestjysk Foderkartoffel	40	209	11	6	md. t.
Gul svensk Bordkartoffel	39	212	9	2	md. t.
Jysk Spisekartoffel (Hee)	36	169	9	21	md. t.
Hammersmith	29	154	8	5	mg. t.

Forsøgsstationen ved Askov. Sandmarken.

Meget mager og tør Sandjord med gullig, rødt Sandunderlag.

Kartoffelsortens Navn	Centner pr. Td. Ld.		Vægt pr. høstet Knold i Kvint	p/ct syge Knolde	Tidlig-hed
	Torstuf	Knolde			
Athene	59	244	9	0	m. s.
Rigskansler	53	191	5	0	m. s.
Blaa Kæmpe	52	230	11	0	m. s.
Professor Maercker	52	216	7	0	s.
Simson	51	192	4	1	m. s.
Richters Imperator	50	206	9	0	md. t.
Champion	50	202	6	3	s.
Fürst v. Lippe	48	195	6	0	m. s.
Gul skotsk	47	198	7	0	md. t.
Frigga	46	164	7	0	m. s.
Wonder of the World	46	206	7	0	t.
Magnum Bonum	42	182	6	0	md. t.
Vestjysk Foderkartoffel	39	178	7	0	md. t.
Jysk Spisekartoffel (Hee)	37	161	5	1	md. t.
Æggeblomme	37	165	5	1	mg. t.
Gul svensk Bordkartoffel	37	166	5	4	md. t.
Tidlig Rosen	34	155	6	0	mg. t.
Hammersmith	26	121	5	2	mg. t.

Forsøgsstationen ved Lyngby.

Let lermuldet Jord med gruset, sandblandet Lerunderlag.

Kartoffelsortens Navn	Centner pr. Td. Ld.		Vægt pr. høstet Knold i Kvint	p/ct syge Knolde	Tidlig-hed
	Torstuf	Knolde			
Rigskansler	75	262	9	0	m. s.
Simson	70	258	5	2	m. s.
Blaa Kæmpe	68	304	17	0	m. s.
Richters Imperator	65	261	15	2	md. t.
Champion	63	249	10	4	s.
Athene	61	253	11	2	m. s.
Fürst v. Lippe	61	237	11	4	m. s.
Professor Maercker	60	250	12	1	s.
Frigga	57	208	11	1	m. s.
Edelstein	54	232	10	5	md. t.
Gul skotsk	50	208	11	5	md. t.
Vestjysk Foderkartoffel	48	218	10	2	md. t.
Magnum Bonum	47	214	10	1	md. t.
Tidlig Rosen	46	217	10	5	mg. t.
Wonder of the World	45	215	12	0	t.
Æggeblomme	37	171	6	9	mg. t.
Hammersmith	29	135	6	2	mg. t.

Forsøgsstationen ved V. Hassing (Vendsyssel).

Meget let og tør Sandjord med gult Sandunderlag.

Kartoffelsortens Navn	Centner pr. Td. Ld.		Vægt pr. høstet Knold i Kvint	p/ct syge Knolde	Tidlig-hed
	Torstuf	Knolde			
Athene	77	322	10	0	m. s.
Simson	73	274	7	0	m. s.
Professor Maercker	71	299	11	0	s.
Richters Imperator	70	300	14	0	md. t.
Blaa Kæmpe	67	300	16	0	m. s.
Champion	66	272	11	2	s.
Rigskansler	65	238	9	3	m. s.
Fürst v. Lippe	64	249	9	0	m. s.
Frigga	61	222	10	0	m. s.
Wonder of the World	61	285	13	1	t.
Gul skotsk	56	237	9	3	md. t.
Magnum Bonum	55	249	8	1	md. t.
Svensk Bordkartoffel	49	223	8	2	md. t.
Tidlig Rosen	46	219	9	1	mg. t.
Vestjysk Foderkartoffel	46	222	10	6	md. t.
Æggeblomme	42	195	6	21	mg. t.
Jysk Spisekartoffel (Hee)	40	181	9	12	md. t.
Hammersmith	29	145	7	5	mg. t.

Udførlig Beretning om Forsøgene findes i „Tidsskrift for Landbrugets Planteavl“, 8de Bind. Nævnte Tidsskrift, der er Organ for Statens Forsøg og Undersøgelser vedrørende Markens Avlsplanter, faas gennem enhver Boghandel for 3 Kr. pr. Bind.

NB. Nærmere Oplysninger for særlige Tilfælde faas ved skriftlig Henvendelse for Jyllands Vedkommende til Statskonsulent Fr. Hansen, Askov pr. Vejen, og Forsøgsbestyrer A. J. Hansen, V. Hassing, og for Øernes Vedkommende til Statskonsulent K. Hansen, Lyngby, og konst. Forsøgsbestyrer N. P. Nielsen, Tystofte pr. Skelskør.